

Die Lymphorgane der weiblichen Genitalien und ihre Veränderungen bei malignen Erkrankungen des Uterus ... / vorgelegt von Paul Kroemer.

Contributors

Kroemer, Paul.

Publication/Creation

Berlin : L. Schumacher, 1904.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/pq8jqksr>



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

Die
Lymphorgane der weiblichen Genitalien
und ihre Veränderungen
bei malignen Erkrankungen des Uterus.

Habilitationsschrift

zur Erlangung der

Venia legendi in Arte obstetricia et Gynaekologia

einer

Hohen Medicinischen Facultät

der

Universität Giessen

vorgelegt von

Dr. Paul Kroemer,

Assistent an der Grossherzoglichen Frauenklinik in Giessen.

Mit 6 Tafeln.

Berlin 1904.

Druck von L. Schumacher.

(Sonderabdruck aus dem Archiv für Gynäkologie, Band 73, Heft 1.)

Seinem hochverehrten Chef

Herrn Professor Dr. Pfannenstiel

in Dankbarkeit gewidmet

vom

Verfasser.

Rechts-Professor Dr. Pannier
in Frankfurt am Main
Verlag

Die Lehre vom Lymphapparat der weiblichen Genitalien hat in der letzten Zeit für uns ein erhöhtes Interesse gewonnen, weil gerade auf diesem Gebiet wissenschaftliche und practische Fragen einander decken, beziehungsweise ergänzen und begründen. Wir brauchen genaue Untersuchungen vom Standpunkt des Anatomen, des Patholog-Anatomen und des Klinikers, um unsere Erfahrungen am gesunden und kranken Lymphapparat richtig einschätzen und verwerthen zu können für unser therapeutisches Handeln. Mögen nun biochemische Processe, die man theoretisch auf chemische Formeln zurückführen kann, den Stoffwechsel der Organe reguliren, oder mag wirklich die von R. Heidenhain so zäh vertheidigte vitale Energie der Körperzellen die Hauptrolle spielen, immer bleibt die Lymphe ein wichtiger Träger oder Vermittler chemischer Spannkkräfte im Körperhaushalt — und es ist sicher das Lymphgefässsystem nicht nur ein Seitenreservoir für das überfüllte Blutgefässnetz. Behält so die Frage nach dem Beginn der feinen Lymphspalten und der Lymphbildung ein brennendes Interesse, so werden wir auch für unsere mechanischen und therapeutischen Vorstellungen als Grundlage die groben anatomischen Kenntnisse brauchen, selbst wenn wir nicht die Thure-Brand'schen Heilbestrebungen als Universalmittel verfechten. Eine septische Lymphangioitis der Gebärmutterwand, eine eitrige Lymphthrombose im breiten Ligament werden wir nicht mehr durch intrauterine Eingriffe zu heilen trachten. Wir können bei infectiösen Beckenprocessen geleitet durch anatomische Vorstellungen den Wegen der Infections-

keime folgen, ja — wenn wir die entscheidende Diagnose, ob der Lymph- oder der Blutweg befallen ist, getroffen haben — das Fortschreiten der Mikroorganismen womöglich vorher berechnen und verhindern.

Die malignen Tumoren: „Carcinom und Sarkom“ verhalten sich in gewisser Hinsicht wie eine langsam verlaufende Infection. Auch sie folgen in ihrem Vorschreiten den präformirten Gewebsbahnen. Auch sie befallen die Lymphdrüsen und in früherer oder späterer Zeit entfernte Körperorgane. Da der Krebs vorwiegend auf dem Lymphwege seine Verbreitung findet — dieser Satz bleibt doch von dauernder Giltigkeit — so wird eine erfolgreiche Therapie immer und immer wieder damit rechnen müssen, dass nicht nur der locale Process, sondern auch die verschleppten Keime zu entfernen sind.

Auch hier wieder soll uns die anatomische Untersuchung auf dem Sectionstisch Aufklärung bringen über die Verbreitungsart des Krebses, die Section soll uns aber auch lehren, wie weit wir operativ unsere therapeutischen Bestrebungen ausdehnen können. Der Grundgedanke der modernen Heilbestrebungen, bei Carcinoma uteri den Tumor mit dem zugehörigen Lymphapparat des befallenen Organes zu entfernen, bleibt — um mit W. A. Freund zu reden — per rationem et analogiam, das Idealverfahren, solange wir ein Heilserum für den Krebs nicht besitzen.

Es liegt demnach klar auf der Hand, dass der Gynaekologe auf dem Lymphgebiet der ihn speciell interessirenden Regionen genauen Bescheid wissen will. — Vielleicht interessirt es auch manchen, über die

historische Entwicklung unserer Kenntnisse über die Lymphbahnen etwas zu hören.

Die Erkenntniss, dass ausser den Blutgefässen besondere Chylus- und Lymphgefässe existiren, kam den Medicinern erst relativ spät. Gesehen hat sie bereits Aristoteles (*περὶ Ἀδέρων*). Mascagni referirt darüber: „Aristoteles lib. tertio dicit: „Fibrae intra nervum et venam suam habent naturam et nonnullae humorem saniem appellatum continent, tendunt a nervis ad venas ac inde ad nervos“.“

Herasistratus beschreibt bei Frühgeburten milchgefüllte Arterien, deren „abnormen Inhalt“ er sich durch die Unreife der Frucht erklärt. „Herophilus sah solche Milchgänge in Drüsenkörper münden, während doch sonst alle Adern der Leberpforte zustrebten.“

Caspar Asellius hat zuerst mit Bewusstsein den getrennten Chylustransport in den Darmlymphgängen erkannt und gelehrt.

Wessling (Veslingius) entdeckte den Brustmilchgang. Wenigstens lese ich bei Mascagni eine Stelle aus den Epistol. post.: „Videtur Veslingius aliquam portionem vidisse ductus thoracici ab Eustachio jam descripti, quod etiam Hallerus et alii anatomici suspicati sunt.“

Die eigentlichen lymphatischen, nicht den Chylus führenden Gefäße des Körpers wurden erst um die Mitte 17. Jahrhunderts in der Leiche entdeckt und in ihrer Function am lebenden Thier erkannt: — 1651 von dem Schweden Olaus Rudbek, 1652 von dem bekannten Dänen Thomas Bartholinus und endlich in demselben Jahre 1652 von dem Engländer Jolivius¹⁾ (Georges Jolyff).

Von nun an werden in der Literatur ausser den Chylusgängen (Vasa lactea) auch Vasa „aquosa“, „serosa“, „lymphatica“ erwähnt. Die 3 zuletzt erwähnten Autoren beschreiben bereits Beckenlymphbahnen bei Thieren und nehmen solche auch für den Menschen an, Bartholinus unter Entwicklung merkwürdiger theoretischer Gründe: („Das Kind brauche die Saugadern der Gebärmutter zur Ernährung; denn es habe das Saugen schon im Mutterleibe gelernt.“)

Rudbek zeichnet bereits einen Uterus bicornis, von dessen Hörnern die Lymphbahnen seitlich im Bogen zur Cysterna chyli verlaufen.

Antonius Nuck beschreibt die Lymphbahnen des Uterus bei der Kuh; er lässt sie ebenfalls ohne Sonderung von Corpus- und Collumbahnen, aber unter Annahme der Zwischenstation der Vasa iliaca in die Cysterna chyli einmünden. Die Vasa lymphat. uteri humani nimmt er per analogiam an, hat sie aber nicht darstellen können. Dagegen zeichnet er ganz gut die Ovarialbahnen, die er auch in die Cysterne einmünden lässt.

Es muss zu damaliger Zeit in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts das anatomische Studium der Lymphbahnen gewissermassen als terra incognita ein beliebtes Arbeitsfeld abgegeben haben. Haller erwähnt, dass Johannes Mery zuerst die Saugadern „in utero humano“ zu Gesicht bekam, ferner dass Morgagni und J. B. Winslow bei Frauen, die im Wochenbett gestorben waren,

1) Mascagni berichtet darüber: „Jolivius nihil scriptum reliquit, sed Angli nonnulli gloriam inventionis lymphaticorum vasorum ei tribuunt.“

im ganzen Genitalapparat Lymphgefässe nachwiesen. Also hier bereits war der Nachweis von Lymphbahnen durch Putrefaction bekannt.

Ich übergehe die Theiluntersuchungen und die an Thieren angestellten, vergleichenden Untersuchungen, an denen zu damaliger Zeit wohl jeder bedeutende Anatom betheiligt war. Mascagni berichtet von Ruisch, welcher z. B. die Klappen in den Lymphbahnen darstellte, ferner von Georges Duvernoi, von Alexander Monroe, Richard Hale, Friedrich Meckel; — Johann Gottlob Haase ausserdem erwähnt wiederum Hewson, Cruikshank, Sheldon, und einen Anatomen Werner cum socio laborum Felleri.

Cruikshank wurde durch seinen Lehrer Hunter zu dem uns interessirenden Studium angeregt, nach dessen Tode er das Resultat der gemeinsamen Arbeit herausgab. Cruikshank übte bereits die Quecksilberinjection von grösseren Stämmen aus; ausserdem benutzte er am nicht schwangeren Uterus eine Art Fäulnissmaceration. Er spritzte die Arterien aus und legte den Uterus auf einige Tage in den Macerirtrog. „Es trat dann angeblich die Luft in die Saugadern und stellte sie deutlich dar. Cruikshank hat bereits richtige Vorstellungen. Doch bleiben seine Angaben, abgesehen von den uns nicht mehr geläufigen Bezeichnungen, zuweilen unklar und lassen einen weiten Spielraum zu. Er setzt die Vaginalbahnen in Beziehung zum Plexus hypogastricus und die Uterinbahnen lässt er in den Plexus iliacus internus an der Darmbeinblutader und -Schlagader münden. Er kennt offenbar schon die Verbindung des Collum uteri zu den hypogastrischen und sacralen Drüsen und beschreibt Drüsenknötchen im Parametrium.

Johannes Gottlob Haase hat interessanter Weise in dem Bestreben, den von unten nach oben aufsteigenden Lymphstrom experimentell zu beweisen, durch Quecksilberinjection vom Schenkel aus die gesammten Becken-Lymph-Plexus und die Lumbalstämme bis zur Cysterna chyli und zum Ductus thoracicus anfüllen können. Er steht offenbar bereits unter dem Einfluss Mascagni'scher Erfahrungen, den er auch erwähnt; doch scheint er (1786) das grosse Werk des Italieners noch nicht zu kennen, obwohl die zu letzterem gehörigen Tafeln schon fertig lagen und bereits an die Academieen von Paris und Wien gegangen waren. Haase und sein Prosector Fischer haben die Neigung zu generalisiren. Die drei der Arbeit beigehefteten Tafeln sind nicht absolut überzeugend und für die

Verhältnisse der weiblichen Genitalien unbrauchbar. Doch giebt er an, die von der Vagina, der Blase und dem Rectum kommenden Lymphbahnen gesehen zu haben: „Copiosissima occurrunt vasa; horum ea, quae a vesica urinaria et intestino Recto eorumque imprimis lateribus et in femina a vagina uteri originem habent, magna ex parte in plexum obturatorium, ischiadicum et iliacum internum inseri etiam mea docuerunt experimenta.“

Die Bahnen des Uterus bespricht er nicht gesondert, sondern er referirt nur ihren Verlauf durch die breiten Ligamente zu dem spermatischen Strang, mit welchem sie zum Ductus thoracicus gelangen sollen.

Wichtiger ist seine Eintheilung der Beckenplexus, welche er nach Herausnahme der Eingeweide studirt hat; er unterscheidet

1. den Plexus obturatorius (um die gleichnamigen Gefässe und den zugehörigen Nerven gelegen),
2. den Plexus ischiadicus (am Foramen ischiadicum magnum),
3. den Plexus iliacus externus zwischen den Vasa iliaca externa und dem Musculus psoas,
4. den Plexus iliacus internus zwischen Art. iliaca ext. und Art. hypogastrica,
5. den Plexus hypogastricus an der Gabelung der Bauchaorta und Vena cava.

Bei weitem die bedeutendste Arbeit über die Lymphorgane des ganzen Körpers ist in jener Zeit (1787) von dem Italiener Mascagni in seinem bekannten Atlas niedergelegt worden, und es gilt für dieses Meisterwerk auch heute noch, was er von seinen Vorgängern Rudbeck und Bartholin sagt: „**Post id tempus pauca addita sunt ad explanationem et integram historiam horum vasorum usque ad praesentem nostram actatem.**“ Mascagni hat neben der Injection der Blutgefässe (mit Wachs) die Lymphbahnen mit Quecksilber angefüllt. Er benutzte einen Glas-Tubus, dessen Ende in eine feine rechtwinklig abgebogene Capillare ausläuft. Er kannte die Eigenthümlichkeit der serösen Häute, z. B. des Peritoneums, sich unmittelbar post mortem durch eine in's Abdomen gebrachte heisse Farblösung selbst zu injiciren. M. hat auch bereits seine Injectionsbefunde an den einzelnen Körpertheilen zum Theil durch die Betrachtung unter dem Mikroskop („Dollondi vel Cufiani mikroskopii lentibus secunda vel tertia“) controllirt und erweitert.

Die Tafel XIV stellt die Lymphverhältnisse der weiblichen Genitalien in noch heute mustergültiger Weise dar.

Tab. XIV, so schreibt M. auf pag. 92:

„Historiam vasorum lymphaticorum ad glandulas aortae et cavae in abdomine accumbentes concurrentium prosequitur, cum, sublato peritonei sacco, et visceribus in eodem contentis, splene excepto, et jecinoris portione, ostendat lymphatica in cuiusdam mulieris utero observata ac injecta duodecim circiter post partum diebus emortuae.“

Seiner allgemeinen, zusammenfassenden Schilderung entnehme ich pag. 44:

„In foemina vaginae, ac inferioris uteri partis lymphatica numerosissimis et amplis ramis ex superficie interna et externa originem sumunt, tum etiam ex earundem partium substantia, ideoque diversos formant ordines. In truncos conveniunt, qui dividuntur rursus, ac cum mox dictis in plexibus et glandulis pelvis congregantur.

Ea, quae ex parte uteri superiori, ex ligamentis latis, ex ovariis, tubaque Fallopiana nascuntur, similiter ampla, ac numerosissima se exhibent. Trunci, qui a ramorum unione formantur, plexum sub ovariis gignunt, ex quo duo, aut tres trunci derivant, qui in fasce spermatico excepti cum vasis sanguineis rursum feruntur, cumque in renum vicinia pervenerint, in plurimos ramos dispartiti se immittunt in glandulas aortae antrorsum, ac extrorsum nec non venae cavae antrorsum accumbentes, ac inter easdem sitas; postquam glandulas ipsis aliisque lymphaticis abdominalibus proprias trajecerint, inde tortuoso cursu descendunt primum dein retrorquentur, et glandulas petunt, quo lymphatica inguinalia et abdominalium magna pars concurrunt, ut cum iis retro aortam in ductum thoracicum terminentur.

Nonnulla tamen dictum plexum sub ovario situm praetereunt, ac truncis propriis se orsim cum fasce spermatico ad dictas glandulas producuntur.

Ex uteri externa superficie vasa quaedam lymphatica transeunt in ligamenta rotunda, quae prout injectionibus expertus sum, vasis sanguineis cum lymphaticis implicatis conflantur; hinc vero alia ad glandulas inguinales, alia ad glandulas sub Poupartii ligamento sitas porriguntur.“

Mascagni trennt Collum- und Corpusbahnen, deren parauterinen Verbindungsast, die grosse Seitenanastomose, er selten schön zur Darstellung bringt; er hat auch die praesacralen Drüsen und die Bahnen im Ligam. rotundum injicirt. Erstaunlich genau sind

die kleinsten Drüsen auf der Beckenschaufel (auf dem *Musculus iliacus int.*) und an der *Art. circumflexa ilium* dargestellt.

War so die anatomische Untersuchung bis zu einem gewissen Grade erschöpft¹⁾, so blieb doch noch die Frage, inwieweit die Erfahrungen der pathologischen Anatomen sich mit jenen der normalen Anatomie deckten. Eine Reihe namhafter Pathologen hat sich mit diesen Nachprüfungen beschäftigt, so Soemmering („*De morbis vasorum absorbentium*“) und Andral (*Grundriss der pathologischen Anatomie*, 1832, II. Theil), welch' letzterer 600 Leichen auf krankhafte Veränderungen der Lymphbahnen untersucht hat.

Ergiebiger für unsere Region waren wiederum die klassischen Untersuchungen Cruveilhier's, welcher die durch puerperale Infection natürlich injicirten Lymphbahnen der weiblichen Genitalien prägnant zur Darstellung bringt.

Nach Cruveilhier verlaufen die Collumbahnen

1. zu den *Glandulae hypogastricae* (in der Gabel zwischen den *Vasa iliaca externa* und den *Vasa hypogastrica* gelegen),
2. zu den *Glandulae sacrales* (beiderseits am Sacro-Iliacalgelenk gelegen).

Die Corpusbahnen und die des oberen Collumbereichs verlaufen mit den Lymphbahnen der Ovarien und Tuben zu den Lumbaldrüsen.

Cruveilhier beschreibt als gewöhnlichen Befund bei krankhaften Processen des Uterus die geschwollene *Glandula obturatoria* am gleichnamigen Foramen, zu welcher er eine Anzahl uteriner Lymphstränge ziehen sah.

Teichmann's grosse Arbeit beschäftigt sich mehr mit dem Ursprung und dem Verlauf der Chylusbahnen, des *Ductus thoracicus* etc. Die Lymphverhältnisse der Genitalorgane fanden in den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts erhöhte Beachtung. Zunächst suchte man durch histologische Untersuchungen namentlich der Ovarien und des Uterus der Lösung der allgemeinen Frage nach dem Ursprung der feinsten Lymphcapillaren nahezukommen, so His, Schwarz, Lucas Championnière, Fridolin, Lindgren, Leopold, Fioupe, Miercejewski, die beiden Hoggan's, Wallich.

Während His, Waldeyer und Schwarz sich mit den Lymph-

1) Den von Winkler erwähnten Zeitgenossen Mascagni's Namens Assalini habe ich nicht eruiren können.

bahnen des Ovariums beschäftigten, studirten Miercejewski und Wallich das subseröse Lymphgefässnetz des Uterus. Fridolin beschreibt die Erweiterung der Uterus-Lymphbahnen in der Schwangerschaft, und Lucas Championnière und Fioupe erörtern bei der Besprechung des Puerperalfiebers den anatomischen Verlauf der Bahnen, welche die Infection befällt. Lucas Championnière beschreibt dabei eine Lymphdrüse, welche er im Parametrium an der Grenze zwischen Corpus und Collum fand. Fioupe und später Sappey stellten diesen Befund als unwahrscheinlich in Abrede, konnten ihn jedenfalls nicht bestätigen.

(Lindgren und Leopold sollen später noch Würdigung finden.)

Zwei Franzosen, Sappey und Poirier, haben in neuerer Zeit systematisch die Lymphbahnen der weiblichen Genitalien mit dem verbesserten Quecksilber-Injectionsverfahren nachuntersucht.

Sappey unterscheidet die Parenchymbahnen der Tunica mucosa und der Muscularis von den abführenden, mit Klappen versehenen Stämmen; er bespricht gesondert die einzelnen Bezirke und kommt zu folgendem Resultat:

„Die Lymphe der äusseren Genitalien ergiesst sich in die Gland. inguinales superficiales, d. h. die Drüsen an der Einmündungsstelle der Vena saphena magna in die Schenkelvene (innere Gruppe). Ebendahin entsendet der untere Scheidenabschnitt seine Lymphstämme.“

Die Bahnen, welche von den zwei oberen Scheidendritteln sich sammeln, enden nach S. in einer kleinen Drüse am Ansatz der Vagina aussen am Collum uteri (Glandula uterovaginalis).

Die unteren Collumbahnen biegen im Parametrium sofort nach hinten um und ziehen im Ligam. sacrouterinum zu den Gland. sacrales an der hinteren Beckenwand seitlich vom Rectum.

Die oberen Collumbahnen und die Corpuslymphstämme ziehen im breiten Ligament nach auswärts zu den Drüsen an der Gabelung der Vasa iliaca communia. Nur 1 bis 2 Bahnen des Corpus uteri ziehen mit dem Plexus ovaricus zu den Lumbaldrüsen.

Die Glandula obturat. kennt S. nicht. Trotzdem er das Vorhandensein der Gland. uterovaginalis vertheidigt, will er dieselbe mit den parametranen Drüsen von Lucas Championnière nicht identificirt wissen. — Als nicht constant schildert er die Beziehung des Collum uteri zu einer Drüse am 5. Lendenwirbel und in anderen Fällen zu den Drüsen, welche auswärts von der Vena iliaca externa nahe am inneren Leistenring liegen.

Sappey's Schüler, Poirier, hat die Scheiden-Uterusbahnen mit grossem Fleiss studirt und in schönen Abbildungen dargestellt. Er hat Schleimhaut-, Muskel- und Serosabahnen besonders injiciren können, weiss aber, dass sie alle miteinander communiciren und in dieselben ausführenden Stämme sich ergiessen. Im Gegensatz zu Leopold und Fridolin, welche die ganze Mucosa corporis gewissermassen für einen flächenhaften Lymphsinus ansahen, schildert Poirier das reichverzweigte, regelmässige Lymphcapillarnetz in der Mucosa uteri et vaginae. Die abführenden Bahnen der Scheide verlaufen im unteren Abschnitt zu den Gland. inguinales, im mittleren Abschnitt zu 1 bis 2 Drüsen zwischen Rectum und Arteria hypogastrica im Winkel zwischen Art. uterina, pudenda communis und umbilicalis (Gland. rectovaginales); die abführenden Bahnen des oberen Scheidendrittels endlich verlaufen mit den Collumbahnen zu den Drüsen des Plexus iliacus zwischen Art. iliaca ext. und Art. iliaca int. Die aus dem Collum austretenden Lymphbahnen sammeln sich an der Austrittsstelle der Vena uterina in 3 bis 4 dicke Stämme, welche mit zahlreichen, nach aussen sich öffnenden Klappen versehen sind und im Parametrium hinter dem Ureter liegend an der Basis des breiten Ligaments nach aussen zum Theilungswinkel der Art. iliaca communis ziehen, um hier in 2 oder 3 Drüsen zu enden. P. localisirt genau die Lage der einzelnen Drüsen, bespricht ihre Verbindung mit den Drüsen des grossen Beckenplexus und erwähnt auch eine an der Art. obturatoria gelegene Drüse, die in anastomotischer Verbindung mit dem Uterus stehe. Doch konnte er eine Lagebeziehung dieser Drüse zum Foramen obturatorium, wie Cruveilhier will, nicht feststellen. Die parametrane, von Lucas Championnière beschriebene Drüse hält er für eine Knäuelbildung der hier sehr zahlreichen Lymphbahnen.

Die Bahnen des Corpus uteri beschreibt er ähnlich wie Sappey als zwei starke Stämme, welche mit dem Plexus ovaricus zu den Lumbaldrüsen ziehen und in Höhe des 5. Lendenwirbels mit den Vasa lymphat. ovarii anastomosiren. Poirier giebt klare und übersichtliche Darstellungen seiner Injectionsresultate. Als wichtigen Befund hebe ich noch hervor, dass P. die grosse Anastomose zwischen Corpus- und Collumbahnen als typisch bezeichnet und dass er feine Corpusbahnen im Ligam. rotundum zu den Gland. inguinales verlaufen sah. — Seine Beschreibung der

Ovarialbahnen deckt sich mit derjenigen Sappey's und der Darstellung von Bruhns; sie soll bei diesem noch näher erörtert werden.

Damit schliessen die classischen Untersuchungen über die Lymphbahnen, soweit sie systematisch im grossen Stil an einem umfassenden Material angestellt worden sind. Es dürfte wohl auch in der heutigen Zeit schwer fallen, ein solches Material den Injectionsversuchen zu opfern, wie es theilweise den alten Forschern zu Gebote stand. Bis zu einem gewissen Grade ist dies auch nicht nothwendig. Es genügt ja für Nachforschungen die Feststellung, dass die Resultate regelmässig in der Hauptsache mit denen der Vorgänger übereinstimmen.

Während nun im Anfang des vorigen Jahrhunderts die Bedeutung der groben Lymphbahnverhältnisse offenbar allgemein etwas überschätzt wurde, trat in den letzten Jahrzehnten gerade das Gegentheil ein. Man findet selbst heute noch in den gebräuchlichen Lehrbüchern der Anatomie, Physiologie, sowie unserer Specialwissenschaft die einschlägigen Capitel etwas stiefmütterlich behandelt. — Es ist nicht der kleinste Vorzug des von Chrobak und v. Rosthorn herausgegebenen Werkes: „Die Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane. I. Th. Wien 1900“, dass es in compendiöser Form die Resultate eines Sappey, Poirier, Mascagni in Wort und Bild wiedergiebt. Die in verkleinertem Maassstabe reproducirten Abbildungen der genannten Forscher sind in der That unübertroffen und gewähren auch demjenigen, welcher die theueren Atlanten nicht zur Verfügung hat, ein vollkommenes Verständniss der fraglichen Verhältnisse.

Die Abbildungen Cruveilhier's finden sich reproducirt in E. Martin's „Handatlas der Gynäkologie und Geburtshilfe“, Berlin 1878, Tafel 56 und Tafel 57.

Während nun die Anatomie und Physiologie mit der Untersuchung nach dem Ursprung von Lymphbahnen und -Drüsen und der Lymphströmung sich beschäftigte, haben neuerdings 2 Momente die Untersuchungen über die ableitenden Lymphbahnen wieder angeregt: „Die Aenderung der Injectionstechnik und das klinische Interesse.“ Das alte Verfahren, mit Quecksilber die Lymphbahnen auszufüllen, ist sehr schwer zu erlernen, und es lag nahe, statt des schwerfälligen Stoffes eine leicht flüssige Injectionsmasse zu suchen. In der That hat seit Teichmann fast jeder Anatom sein eigenes Injectionsverfahren und -Instrumentarium, wie man aus dem betreffenden Abschnitt über Injectionstechnik in der Encyklopädie der mikro-

skopischen Technik von P. Ehrlich etc. ansehen kann. Lösungen der verschiedensten Farbstoffe in Wasser, Leim, Celloidin, Terpentin, Wachs, endlich Fettlösungen mit Nachhärtung in Osmiumsäure werden verwendet. Trzasker-Chrzonszczewsky in Kiew empfiehlt seine Methode der physiologischen Injection von Blut- und Lymphgefäßen, wobei gewöhnlich Cochenille-Carminlösungen ins Blut oder in die Körperhöhlen bzw. -Gewebe eines lebenden Thieres gebracht werden. Er studirt dann am getödteten Thier den Verlauf der selbstinjicirten Bahnen. Die Blutgefäße können postletal mit Contrastfarben injicirt werden. Das Verfahren giebt nach Maassgabe der von dem Autor beigegebenen Abbildungen farbenprächtige Resultate und beweist wohl die Thatsache der Diffusion, ohne über das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein der Saftspalten Aufschluss zu geben. Man dachte schliesslich daran, durch Injection von pyogenen Bakterien eine natürliche Eiteranfüllung der Lymphbahnen zu erzielen (Sappey's putréfaction). Es brauchen auch nicht die lebenden Bakterien zu sein. Die leukotaktischen Toxine verrichten denselben Zweck. Das beweisen Amann's Versuche der natürlichen Leukocyteninjection des Uterus. In höchst origineller Weise brachte Amann jr. leukocytenanlockende Substanzen in das Cavum uteri, während er die Wanderzellen durch chinesische Tusche (die er in die freie Bauchhöhle brachte) färbte. Er verband also die Erfahrungen von v. Recklinghausen über die Färbbarkeit der Wanderzellen in der Peritonealflüssigkeit (Kraus) mit den Lehren der Bakteriologie. Auf den Rath Buchner's nahm er als leukotaktische Substanz Aufschwemmungen von sterilisirten Bakterienkulturen. Die schwarzgefärbten Leukocyten sammelten sich in der subserösen Muskelschicht und besonders im Schleimhautstroma. Dabei konnte A. eine directe Ausmündung der Schleimhautlymphbahnen im Collum durch eine Art Vacuolenbildung nach dem Cavum uteri hin beobachten.

Die gebräuchlichste aller modernen Methoden für die Darstellung der Lymphbahnen ist das von Gerota angegebene Injectionsverfahren leichtflüssiger Terpentin - Aether - Farblösungen mittelst der sogenannten Gerota-Spritze. Nicht die Art der Injection, d. h. nicht der interstitielle Einstich ist neu — diesen hat schon Mascagni geübt, — sondern die Lösung und die verwendete Spritze. Das Wesentliche an derselben ist das anzuschraubende Ansatzstück, in dessen konisch auslaufendes Ende eine feine, über der Flamme ausgezogene Glascapillare mittels Handschuhleders

eingedichtet wird. Die Spritze kann durch jede handliche, etwa 10 bis 20 cem fassende Spritze ersetzt werden, und Polano schlägt vor, anstatt der theuren Gerota-Spritze eine Hahn'sche Augenspritze mit dem Ansatzstück nach Gerota zu versehen. (Spritze und Glascapillaren bezieht man bei Altmann-Berlin durch Vermittlung jedes Instrumentenmachers.) Die gebräuchlichsten von Gerota angegebenen Lösungen sind kurz folgende:

A. Blaue Injectionsflüssigkeit. 4 g Preussisch-Blau (Oelfarbe!) werden mit 6 g reinem Terpentinöl in einem Porzellanmörser sorgfältig verrieben, sodass keine Klümpchen mehr sichtbar sind. Unter allmählichem Zusatz von 30 g Aether sulfuric. wird die Lösung leicht flüssig gemacht und durch doppelte Leinwand oder feines Mikroskopirleder filtrirt. Die Lösung hält sich in einer Flasche mit eingeschlifffenem Glasstopfen tagelang, wird aber vor jedem neuen Gebrauch durch Leder in die Spritze eingesogen.

B. Rothe Injectionsflüssigkeit. 2 g feinsten Zinnobers (der sogenannte unter Wasser zerriebene Zinnober!) werden mit 20 Tropfen ungekochten Leinöls 15 Minuten lang sorgfältig verrieben. Nach Zusatz von 3 g Terpentinöl und 5 g Chloroform wird die Lösung in bekannter Weise filtrirt. Die Lösung soll womöglich für jede Injection frisch bereitet werden.

Das Gerota'sche Verfahren hat unleugbare Vorzüge. Es erfordert bei handlichem Apparat zwar Sorgfalt wie jede Injection, verspricht aber doch sicheren Erfolg selbst für den Anfänger. Es ist daher begreiflich, dass es zur Zeit geradezu modern geworden ist, mit dem Gerota'schen Verfahren die Lymphbahnen chirurgisch wichtiger Körperregionen darzustellen (Gerota, Bruhns, Stahr, Most).

Von der uns interessirenden Beckenregion injicirte Gerota selbst die Lymphbahnen der Blase und des Rectums. Auch die schönen Untersuchungen von Bruhns über die Lymphbahnen der weiblichen Genitalien entstanden unter der Anleitung Gerota's. Bruhns stellte seine exacten Untersuchungen an 54 Leichen an. Seine Resultate sind so wichtig, dass wir ihn am besten selbst reden lassen.

Bruhns, Die Lymphgefäße der weiblichen Genitalien. Archiv für Anatomie und Physiologie, Anatomische Abtheilung, Jahrg. 1898 p. 75. Schlussfolgerungen:

Bruhns schreibt: „Zum Schlusse möchte ich meine Resultate noch einmal kurz zusammenstellen:

1. Die Lymphbahnen der grossen und kleinen Labien und die der Clitoris hängen unter einander zusammen. Ihre abführenden Stämme münden in der Regel in die innere und obere Gruppe der oberflächlichen Leistendrüsen. Zu diesen Drüsen scheinen auch die Lymphstämme von der Glandula Bartholini zu verlaufen. Zwischen dem grossen und kleinen Labium der einen Seite lassen sich Verbindungen durch Lymphbahnen mit den Leistendrüsen der anderen Seite nachweisen.

2. Die Lymphbahnen der Mucosa und der Muscularis vaginae hängen unter einander zusammen. Ihre abführenden Stämme pflegen zu den auf beiden Seiten der Art. hypogastrica gelegenen Drüsen zu ziehen. Die Lymphbahnen des dem Hymen benachbarten Theiles der Vaginalwand stehen auch in Verbindung mit den Lymphwegen der Labien und hierdurch mit den Leistendrüsen. Endlich treten von der hinteren Scheidenwand Lymphstämme auf das Rectum und münden in die der Muscularis des Mastdarmes unmittelbar anliegenden Rectaldrüsen, welche bei Anschwellung in klinischen Fällen der Palpation per rectum leicht zugänglich sein müssen.

3. Im Uterus hängen sowohl im Collum wie im Corpus die Lymphbahnen der Schleimhaut wie der Muscularis zusammen. Ferner anastomosiren die Lymphgefässe des Collum und des Corpus uteri unter einander.

Vom Collum uteri her führen Lymphstämme zu den Drüsen im Winkel zwischen Art. hypogastrica und Art. iliaca externa.

Die vom Corpus uteri sich sammelnden Lymphstämme sind in vier Gruppen zu scheiden: Die vom mittleren Theil des Corpus uteri ziehen ebenfalls zu den Drüsen im Winkel zwischen Art. hypogastrica und Art. iliaca externa, die vom Fundus verlaufen zum Theil nach dem Ovarium zu und von hier aus nach oben entlang der Art. spermatica interna zu den Lumbaldrüsen. Eine dritte Gruppe, sehr feine Stämmchen, breitet sich vom Fundus uteri in die Wand der Tuben aus; endlich nehmen noch andere Lymphstämme gleichfalls vom Fundus uteri her, im Lig. rotundum zu den Leistendrüsen ihren Weg.

4. Von der Tuba aus zieht die Lymphe nach dem Lymphplexus am Hilus des Ovariums und von hier aus nach oben zu den Lumbaldrüsen.

5. Aus dem Ovarium sammeln sich sechs bis acht und mehr dicke Lymphstämme, die sich in die zahlreichen Lumbaldrüsen ergiessen.

6. Die sogenannten tiefen, unter der Fascia lata femoris liegenden Leistendrüsen, deren Vorhandensein von Auspitz ganz in Abrede gestellt wurde, kommen doch in der Zahl von zwei bis vier vor, allerdings sind sie nicht constant zu finden.“

Die Bruhns'schen Resultate decken sich somit mit denen von Sappey und Poirier und stimmen mit denen Mascagni's fast absolut überein. Nur Sappey's Sacralbahnen des Collum uteri konnte Bruhns nicht injiciren. Diese Verbindung fand er tiefer von dem oberen Scheidendrittel aus.

Zur selben Zeit entstand im Breslauer anatomischen Institut unter Leitung des Anatomen Stahr, welcher bereits mit viel Erfolg das Gerota'sche Verfahren anwendete, die bekannte Arbeit von Peiser als Beantwortung einer von Küstner gestellten Preisfrage der Universität. Klinisches Interesse stand im Vordergrund. Daher konnte Peiser sich beschränken. Streng genommen berichten seine Injectionsversuche nur von den Collumbahnen. Erfreulicher Weise ergaben auch Peiser's Resultate eine Bestätigung der früheren Untersuchungen. Sie sind nach seinen eigenen Worten eine Zusammenfassung der Angaben von Sappey und Poirier und stimmen am meisten mit den pathologischen Befunden von Cruveilhier überein. Die Glandulae uterovaginales im Ligament bzw. Parametrium dagegen, sowie die von Cruveilhier am Foramen obturatorium beschriebene Lymphdrüse konnte Peiser nicht finden, glaubt aber, dass die unterste Drüse (H_1) im kleinen hypogastrischen Gefässdreieck zu dem Nervus obturatorius in Lagebeziehung treten kann.

Die Peiser'sche Arbeit, vom klinischen Interesse angeregt, verfolgt klinische Interessen. Es galt ja nachzuweisen, ob eine Exstirpatio uteri mit Ligamenten und anhängendem Lymphapparat in continuo möglich wäre. Der Kampf gegen das Carcinom hat in seltener Weise anatomische und klinische Arbeit angeregt (Wertheim, Ries, Rumpf, Clark (Kelly) Halban und Tandler, Feitel u. A. m.). Dieselben Beweggründe, welche wohl zur Zeit in jeder Klinik gelten, haben auch unsere Anstalt veranlasst, neben der klinischen die anatomische Untersuchung in gleicher Weise zu pflegen. Beide sollen sich ergänzen — und so bin ich denn — angeregt durch meinen verehrten Chef — seit meiner ersten Veröffentlichung über unsere Carcinomerfahrungen den anatomischen Untersuchungen treu geblieben, zumal der Verlauf der

Carcinomfrage eines jeden Klinikers Interesse dauernd wach erhalten muss.

Meine eigenen Untersuchungen (bezw. Injections-experimente) erstrecken sich auf 14 Kinderleichen (Neugeborene), 7 an intercurrenten Krankheiten gestorbene Personen (darunter 1 Kind von 7 Jahren) und 9 Carcinomleichen; 4 von den letzteren kamen nach der abdominalen Radicaloperation zur Section. Herrn Professor Pfannenstiel, sowie Herrn Geh. Medicinalrath Professor Dr. Bostroem danke ich an dieser Stelle für das mir überlassene Material.

Zur Injection kamen ausser den Kindern nur 2 Erwachsene — im Ganzen also nur wenig Leichen im Vergleich zu den früheren Untersuchern. Ich stellte aber die Versuche deswegen bald ein, weil sie eine erstaunliche Uebereinstimmung mit Bruhns und den anderen ergaben.

Ausser den an der Leiche ausgeführten Injectionen habe ich eine Reihe operativ gewonnener Uteri, Tuben und Ovarien zu Specialuntersuchungen injicirt. Es empfiehlt sich dies so einfache Verfahren zur Herstellung von klinischen Demonstrationspräparaten ausserordentlich. Namentlich geben injicirte Ovarien die schönsten Bilder auf Durchschnitten bei Lupenbetrachtung. Flache Rasirmesserschnitte werden in Xylol aufgehellt und bei schwacher Vergrösserung (40—60) betrachtet. Man erhält dadurch am leichtesten eine Vorstellung über das räumliche Verhältniss der Lymphbahnen zum Gewebe. So kann man auch (in Xylol) die breiten Ligamente (nach der Injection) von Kinderleichen ausspannen und durchmustern, wobei die zahlreichen Klappen an den Ligamentbahnen mit zierlicher Zeichnung hervortreten. Schwierig ist die Injection der Mucosa uteri. Eine Schleimhaut im ganzen Bereich des Cavum uteri zu injiciren ist mir nie gelungen. Doch ist dies für mikroskopische Zwecke nicht nöthig. Am leichtesten stellt sich das subseröse Lymphnetz dar. Bei allen von mir injicirten Kinderleichen, welche ich nach den Angaben von Bruhns-Peiser durch Wegnahme der Symphyse und Eröffnung der Scheide vorbehandelte, konnte ich bei Einstich in die Portio den ganzen Uterus injiciren. 2 mal war die Theilung der Bahnen in beiden Uterushälften so ausgesprochen, dass beispielsweise bei Injection in die rechte Portiohälfte erst die rechte Portiohälfte und deren ableitende Bahnen sich füllten, ehe die Injectionsflüssigkeit auf der Höhe des Corpus

uteri auf die linke Hälfte übergang. Fig. 2 deutet diese Theilung der Bahnen im unteren Bereich der Gebärmutter durch die rapheartige Grenzscheide auf der Mitte der Hinterfläche des vorgezerrten Uterus an. In 2 Fällen füllten sich zwar die Lymphcapillaren des ganzen Uterus, aber nur auf einer Seite die ableitenden Wege. Der Uterus wird im Moment der Injection länger und dicker und richtet sich etwas auf. — Die Injection der beiderseitigen Leisten-drüsen von einem Vulvaeinstich aus gelingt fast immer. Ich verzichte darauf, die Protokolle der einzelnen Fälle zu geben, um nicht zu ermüden, zumal sie ja meist nur eine Bestätigung schon bekannter Thatsachen bringen, und will mir nur erlauben, bei der nun folgenden Schilderung abweichende oder ergänzende eigene Erfahrungen hervorzuheben.

Zur Injection benutze ich die von Polano neuerdings angegebene Injectionsflüssigkeit.

Polano (Beitr. zur Anatomie der Lymphbahnen im menschlichen Eierstock, Monatsschr. für Geburtsh. und Gynäk., Bd. XVII, H. 3, S. 289) schreibt: „Meine Farblösung wird folgendermaassen bereitet: Preussisch-Blau (Oelfarbe) wird in einem Mörser mit Aether verrieben. Diese Lösung wird auf trockenen, d. h. wasserfreien, pulverisirten Campher gegossen. Es genügen einige Cubikcentimeter, um eine grössere Menge Campher zur sofortigen Lösung zu bringen. Dieses entstandene, äusserst dünnflüssige Gemisch wird schnell durch ein doppeltes Fliesspapierfilter in eine fest verschliessbare Flasche gegossen. Vor dem Gebrauch setzt man einige Tropfen Chloroform auf 10 ccm Farblösung, die eine Gerota'sche Injectionsspritze füllen, hinzu; — nach einigen Versuchen gelingt es leicht, die möglichst concentrirte Stammlösung durch jedesmalige Aetherchloroformverdünnung dem entsprechenden Zwecke anzupassen.“

Diesen Ausführungen Polano's möchte ich noch hinzusetzen, dass man mit dem genannten Verfahren bei Kinderleichen die schönsten Resultate erhält. Bei Erwachsenen versagt zuweilen jede Injectionsart. Zur Injection verwende ich eine gewöhnliche, 20 ccm fassende Spritze, welche man bequem mit einer Hand beherrschen kann. Statt der Eindichtung der Glascapillare mit Handschuhleder verwende ich eine Art Stopfbüchsenverschluss, d. h. das Ansatzstück besteht aus 2 ineinander zu schraubenden Hälften mit correspondirender centraler Bohrung. Die lichte Weite der letzteren beträgt eine Kleinigkeit mehr als die Dicke der gebräuchlichen

Glascapillaren. Nach dem Ausziehen der Spitze über der Flamme wird die Glascapillarröhre [mit einem 2—3 mm langen dünnen Gummischlauch bezogen, welch' letzterer etwa 1 cm oberhalb des weiten Endes der Capillare zu sitzen kommt. Beim Einführen der Glascanüle in die centrale Bohrung der beiden Ansatzstücke sitzt der Gummimantel zwischen denselben und wird nun durch das Ineinanderschrauben der Metalltheile comprimirt, wodurch der enge Spaltraum zwischen Glasrohr und Metallhülse luftdicht abgeschlossen wird. Der Gummischlauch ist wohl in jedem Laboratorium als Aetherzuführungsschlauch an den gewöhnlichen Gefriermikrotomen vorhanden. Das Auswechseln vollzieht sich rasch und bedarf keiner grossen Kunstfertigkeit. Die Spritze wird nach jedem Gebrauch gereinigt und das Ansatzstück neu montirt, so dass beim neuen Gebrauch nur die Spritze auf Schlussfähigkeit zu prüfen ist. Der Spritzenstempel muss vorzüglich schliessen. Die Glascapillare biege ich gern bajonettförmig und ziehe die Spitze lang aus, so dass bei einer unvorhergesehenen Verstopfung trotz Abschneidens der verstopften Partie die Oeffnung genügend fein bleibt, um die Injection fortsetzen zu können. Die Flüssigkeit wird womöglich für jede Injection frisch bereitet. Für die Darstellung der ableitenden Bahnen wählt man gesättigte Farblösungen und injicirt mit nicht zu enger Canüle. Beim Einstich in das schon vorher peinlich gesäuberte Gebiet wird ein leiser Druck auf den Kolben ausgeübt, damit kein Gewebe oder Blut in die Capillare eindringt. Die linke Hand fixirt mit vorsichtiger Gewalt die Injectionsstelle um die Capillarspitze; während nun die rechte Hand ein wenig die Canüle zurückzieht, um der zu injicirenden Flüssigkeit Spielraum zu lassen, wird der Spritzenstempel ganz allmählig mit stetig wachsender Kraft herabgedrückt. Bei gelungener Injection bildet sich am Einstich zunächst eine diffuse Verfärbung, von welcher aus die Netze der Lymphbahnen mit grosser Schnelligkeit sichtbar werden. Die Flüssigkeit schiesst gewissermaassen hinein. Wenn statt der Netzzeichnung dendritische Verzweigungen sichtbar werden, so ist die Injection misslungen, weil die Blutbahnen erfüllt worden sind. Man thut daher gut, vorher die letzteren mit Wachs oder Gelatine auszuspritzen. Natürlich wählt man dabei Contrastfärbung (vgl. Fig. 3).

Für mikroskopische Nachuntersuchungen ist das beschriebene Verfahren sehr zu empfehlen. Eine besondere Nachbehandlung der injicirten Stücke ist nicht nothwendig. Härtung und Einbettung erfolgt nach Belieben wie an anderen Objecten. Die Lymphbahnen

erscheinen wie mit hellblauen Linien ausgezeichnet. Der Aether verdunstet und die Campherfarbmasse schlägt sich an der Wand nieder. Die Färbung bleibt auch bei Hämatoxylinfärbung der Schnitte different genug. Im Uebrigen kann man durch Nachbehandlung der in Hämatoxylin gefärbten Schnitte mit van Gieson'scher Lösung jeden Grad der gewünschten Contrastfärbung erzielen.

Allgemeiner Ueberblick über die Lymphverhältnisse der weiblichen Genitalien.

Vor dem Eingehen auf die speciellen Verhältnisse der Beckenregion scheint mir ein allgemeiner Ueberblick unerlässlich. Das Lymphgefässsystem der Genitalorgane des Weibes ist ausserordentlich reich entwickelt. Schleimhaut, Muscularis und Serosaüberzug haben ihre eigenen Bahnen, die aber alle in jeder Schicht mit denen der anderen Schichten anastomosiren, so dass das Resultat einer Injection auf die ableitenden Bahnen von der Stelle des Einstichs nicht beeinflusst wird. Diese überall in den Organen sich findenden Lymphlacunen bilden unter sich zierliche Netze, wie sie namentlich von Poirier mit seltener Regelmässigkeit für die Mucosa uteri et vaginae dargestellt worden sind. Das System soll am reichsten gegliedert sein in der Vaginalschleimhaut. Von allen diesen Parenchymbahnen unterscheiden sich die abführenden Stämme scharf durch ihren Bau (sie besitzen eine Muscularis und Adventitia) und ihre Verlaufsart. Die ableitenden Stämme anastomosiren unter einander nicht; sie erscheinen im injicirten Ligament wie Perlenschnuren in Folge regelmässiger, seitlicher Aussackungen. Zwischen je zwei solcher Dilatationen ist das Gefäss gleichsam eingeschnürt, weil hier an der Innenwand jedesmal dünne Membranen wie Taschenfalten vorspringen: die sogenannten Klappen, welche alle in demselben Sinne nach dem Venensystem zu sich öffnen, ihre concave Seite somit dem letzteren zuwenden. Man kann also diese Gefässe zwar prograd im Sinne des fortlaufenden Lymphstromes injiciren, aber nicht retrograd, wenigstens nicht ohne übermässige Gewalt.

Alle die zahlreichen ableitenden Bahnen werden an irgend einer Stelle unterbrochen von Lymphdrüsen, welche niemals allein, sondern zu zwei bis vier und mehr sich an Knotenpunkten des Blutgefässsystems finden. Dort, wo grosse Arterien sich gabeln und Venen zusammenströmen, werden beide blutführenden Systeme

umstrickt von den Lymphgefässgeflechten mit den zugehörigen Drüsenknoten. Wir müssen uns nämlich von der Annahme freimachen, dass jede Drüse nur 1 Vas afferens und 1 correspondirendes Vas efferens hat. Die ableitenden Bahnen communiciren zwar während ihres intercurrenten Verlaufes nicht mit einander; sobald sie aber die 1. Etappe des regionären Drüsengebietes erreicht haben, stehen sie wiederum unter dem Gesetz weitgehendster Anastomose. Das Vas efferens einer Drüse gabelt sich in 2 oder 3 Aeste, von denen einer zur Nachbardrüse verlaufen kann. An Stelle eines Vas efferens treten 3 bis 4 heraus. Ein Vas afferens kann also mehrere Drüsen versorgen. Die Vasa efferentia der einen Drüse sind Vasa afferentia der anderen benachbarten desselben und des nächstliegenden Lymphgeflechtes, sodass Verbindungsäste hinauf- und hinuntersteigen und man beispielsweise von einer Drüse im Centrum der Beckengeflechte alle benachbarten vor und hinter den grossen Gefässen injiciren kann. Schliesslich kann ein Vas efferens in seltenen Fällen vor dem Eintritt in die Drüse einen Verbindungsast zum zugehörigen Vas efferens senden (Umgehungsbahn). Die uns interessirenden Drüsengruppen ziehen sich von der Einmündungsstelle der Vena saphena magna (Regio subinguinalis) entlang den grossen Becken- und Bauchgefässen an der hinteren Bauchwand aufwärts bis zum Ursprung der Nierenarterien.

Die Leistendrüsen

liegen theils auf der Schenkelfascie (Lymphogland. inguinales superficiales¹⁾), theils unter derselben (L. gl. inguin. profundae) direct am Einmündungswinkel der Vena saphena magna in die Vena femoralis. Die Angaben Mascagni's über diese Drüsen sind von Sappey und Bruhns nur bestätigt worden.

Die oberflächlichen Leistendrüsen, 7 bis 13 an der Zahl, liegen im Kreise herum um die Saphenamündung. Je weniger Einzeldrüsen sich finden, um so grösser ist jede von ihnen. Gerota berichtet über die Versuche, die betreffenden Drüsen in ein Schema zu ordnen. (Sappey, Auspitz, Quénu, Rauber,

1) Bezüglich der Nomenclatur folge ich dem Vorschlage von His, (Die anatomische Nomenclatur. Arch. für Anat. u. Phys. Anat. Abth. 1895, Supplementband) und bezeichne alle echten Lymphdrüsen, soweit sie als Organa adenoidea und Gefässdrüsen anzusehen sind, als Lymphoglandulae = Lgl. im Gegensatz zu den parametranen noduli lymphatici.

Poirier, Tillaux, Testut, Richet.) Ziehen wir mit Quénu eine gerade Linie, welche mit der Richtung der Vena saphena bzw. mit deren gedachter Verlängerung nach oben auf dem Schenkel identisch verläuft und setzen eine Senkrechte darauf, welche die erste Grade an der Saphenamündung schneidet, so wird dieses stehende Linienkreuz 4 Gruppen von Drüsen trennen, 2 obere und 2 untere, von denen wiederum je eine innere Gruppe von je einer äusseren getrennt ist. Am Schnittpunkt der Senkrechten findet man 1 grosse oder mehrere kleinere Drüsen als Mittelpunkt der ganzen Gruppe. Die obere äussere Gruppe liegt dabei beim stehenden Menschen am höchsten, nahe der Spina ant. sup. oss. ilei. Die beiden oberen Gruppen insgesamt sind nahezu parallel angeordnet zu dem Ligam. Poupartii, bleiben aber unterhalb desselben. Poirier hat mehr den klinischen Verhältnissen Rechnung getragen, indem er eine innere obere Gruppe als Groupe génital, eine äussere obere Gruppe als Groupe fessier (Gesässgruppe) und eine untere als Schenkelgruppe (Groupe crural) unterschied. Ähnlich theilt Sappey diese Drüsen ein.

Nach dem übereinstimmenden Urtheil aller Beobachter bilden die oberen und inneren, zuweilen auch die unteren inneren der oberflächlichen Leistendrüsen die erste Etappe für die ableitenden Bahnen der äusseren Genitalien und die Analgegend (Vasa lymphatica haemorrhoid. inferiora). Die oben erwähnte Eintheilung nach Sappey, Poirier enthält zugleich die Angabe der regionären Gebiete, welche zu den unteren und äussere Drüsengruppen gehören.

Die tiefen Leistendrüsen (Lgl. inguin. profundae) 2 bis 3 selten mehr, liegen dicht unter der Schenkelfascie (Mascagni fand ihrer zuweilen bis 7) von dem Einmündungswinkel der V. saph. mag. in die V. femoral. auf und an der letzteren bis in die Region des Ligam. Poupartii. Injectionen von einer der mittleren Lgl. inguinales superf. werden die tiefen Leistendrüsen, welche von Auspitz geleugnet wurden, immer nachweisen lassen. Die tiefen Drüsen, welche also mit den oberflächlichen anastomosiren, nehmen die Lymphbahnen der tiefen vorderen Beinmuskeln auf und senden ihre Vasa efferentia zu 1 bis 3 Drüsen im inneren Schenkelring, deren grösste median von der Vena femoral. im Anulus cruralis int. constant zu finden ist und als Rosenmüller'sche Drüse bekannt ist. Die andern 2, wenn sie vorhanden sind, liegen auf der Art. und Ven. femoralis.

In dieser selben Region münden die feinen vom Corpus uteri

ins Ligam. rotundum ziehenden Stämmchen, theils in die Lgl. inguin. prof., theils in die Drüsen dicht unter dem Poupart'schen Band. Zu der Rosenmüller'schen Drüsenetappe haben nicht alle Leistendrüsen Beziehung. Ein grosser Theil der aus den letzteren entspringenden Vasa efferentia zieht sich ohne Unterbrechung hinter den Vasa cruralia (zwischen diesen und dem Musculus psoas) nach aufwärts unter dem Ligamentum Poupartii hindurch in die Bauchhöhle hinein, um hier zum Plexus iliacus externus zu werden. In diesen münden auf der Innenseite die Vasa efferentia aus den Drüsen im Schenkelring und weiter aufwärts die Anastomosen von den an der Seitenwand des kleinen Beckens liegenden Lymphdrüsen, welche dem Plexus hypogastricus seu iliacus internus angehören. Tafel XII, Fig. 1 und Fig. 2 in dem Atlas von Mascagni erläutern die Verhältnisse. Namentlich Fig. 1 zeigt, wie reich das Lymphgeflecht an der Hinterseite der Gefässe zwischen Musculus psoas, Os ilei und der Blutgefässscheide ist. Von den im Schenkelring auf und neben den Gefässen liegenden Drüsen ist in pathologischen Fällen eine oder die andere zuweilen vom Abdomen aus zu tasten und wird z. B. bei der abdominalen Radicaloperation wegen Carc. uteri nicht selten entfernt (Amann, Kleinhaus) vergl. auch meinen Aufsatz in der Monatsschr. XVIII, 5.

Diese Drüsen leiten eben bereits über zu den Lgl. iliacae externae, welche auf und an den gleichnamigen Blutgefässen liegen, eine Gruppe wie erwähnt nahe der vorderen Bauchwand 1 oder 2, selten mehr, eine andere weiter aufwärts nahe der Gabelungsstelle der Art. iliaca communis. Die nach aussen liegenden Drüsen liegen gewöhnlich zwischen Arterie und Musculus psoas, die nach innen gelegenen gehören dem kleinen Gefässdreieck an und schmiegen sich oft zwischen Arterie und Vene ein. Andere liegen an der Innen- und Hinterseite der Vene. Schliesslich können an Stelle der letzteren oder ausser diesen besondere Knoten in dem Raum zwischen den Vasa iliaca int. und externa verlagert sein, oder an der Vena iliaca communis von dieser abrücken nach dem Promontorium zu, so dass sie auf das Sacroiliacalgelenk zu liegen kommen und dann als Lgl. sacrales laterales imponiren. Eine ganz constante Lagebeziehung der Drüsen giebt es eben nicht. Die Drüsen am Poupart'schen Band gehen über in die Lgl. iliacae externae, die letzteren in die Lgl. iliacae communes. An der Bifurcation der Vasa iliaca communia in ihre Theiläste treffen sich Plexus iliacus externus und Plexus iliacus internus seu hypogastr. An

diesem Knotenpunkt also trifft man die meisten Drüsen; ebenso sicher aber kann man in der Nische zwischen dem *Musc. psoas* und den *Vasa iliaca comm.* wie *externa* ober- und unterhalb der Communisgabelung grosse Knoten finden.

Aehnlich wie die *Vasa iliaca externa* werden auch die *Vasa hypogastrica* von einem Lymphgeflecht umspinnen, zu welchem, wie erwähnt, eine Reihe von Drüsen gehören. Auf der Aussenseite, besser gesagt an der Vorderseite der Gefässe u. z. oberflächlich im kleinen Gefässdreieck finden sich gewöhnlich 2 Lymphoglandulae, deren tiefer gelegene oft nahe dem Uterinaursprung liegt. An der Hinterseite der *Vasa hypogastrica* zwischen diesen und dem ausstrahlenden Bündel der Sacralnerven, welche hier den Stamm des Nerv. ischiadic. bilden, liegen 2 bis 3 Drüsen, in welche der Plexus lymphat. ischiadicus, d. h. die Lymphe aus der tiefen Schenkel- und Gesässmuskulatur einmündet. Diese Drüsen sind schwer zugänglich, da sie am Foramen ischiadicum magnum liegen. Wenn man nach dem üblichen Verfahren bei der Wertheim'schen Carcinomoperation den Ureter nach aussen zerzt, verdeckt man sich stets den Zugang zu diesen Drüsen und zu 1 bis 2 anderen, welche in der Theilungsstelle der Art. hypogastrica (nach Poirier in dem Winkel zwischen Art. umbilicalis, vaginalis und pudenda communis) liegen und als Rectovaginaldrüsen bezeichnet werden, weil sie die mittleren Scheidenbahnen und die *Vasa lymph. haemorrhoidalia media* (Quény, Bruhns) aufnehmen. Diese Drüsen, zuweilen auch die im hypogastrischen kleinen Gefässdreieck bilden zugleich die 2. Etappe für die ableitenden Stämme der Harnblase.

Endlich fand ich auch stets in der Tiefe des kleinen Gefässdreiecks die Drüse am Nervus obturatorius bei Kindern, wie bei Erwachsenen. An einem von der Portio aus injicirtem Becken sah ich bei dem Ausschälen der gesammten Beckenorgane die blauen Lymphstränge den Nerven mit den zugehörigen Blutgefässen umstricken und bis in den Canalis obturatorius selbst hineinziehen. Ohne Präparation wäre mir dieser überraschende Befund vollständig entgangen. Wie Haase vom Schenkel aus die Injections-masse ins Becken trieb, so kann man sie bis zu einem gewissen Grade auch retrograd heraustreiben. Durch den Plexus lymph. obturator. tritt die Lymphe aus den grossen Schenkeladductoren in den Plexus lymph. hypogastr. ein. Fig. 4, 5 u. 6 erläutern die Lage der fraglichen Drüsen zu den *Vasa iliaca*.

Nach hinten und medianwärts von der Einmündungsstelle der Vena hypogastrica in die Vena iliaca communis — somit bald zum Plexus lymph. iliacus internus (hypogastr.), bald zum Plexus lymph. iliac. comm. gehörig — finden sich die oben schon erwähnten Drüsen, welche auf der Seitenfläche des Kreuzbeins seitlich vom Rectum liegen und daher als Lgl. sacrales laterales bezeichnet werden (die medialen Sacraldrüsen, von Gerota als Lgl. meso-rectales bezeichnet, liegen im Mesorectum).

Machen wir uns noch ein Mal klar, dass die Lymphbahngeflechte die grossen Blutgefässe umspinnen, dass die Drüsen an und neben ihnen, vor und hinter den Gefässen sich zeigen, so erscheint die Bezeichnung der alten Forscher logisch, welche Drüsen und zugehörige Lymphplexus nach den Blutgefässstämmen derselben Gegend benannten. In diesem Sinne ergiesst sich die Lymphe der unteren Extremitäten durch die Leistendrüsen in den Plexus iliacus ext. (jederseits), die des kleinen Beckens und seiner Organe in den Plexus iliacus internus seu hypogastricus. Die Plexus iliac. ext. und int. vereinigen sich zum gemeinsamen Plexus iliacus. und gehen an der Aortengabelung über in den Plexus lumbalis inferior. Dieser letztere vereinigt seine Lymphe mit derjenigen aller darüber liegenden Drüsen bis zum Abgang der Nierenarterien, welche letztere den mächtigen Plexus lumbalis superior bilden. In jeder Etappe ziehen kurze Verbindungsbahnen von Drüse zu Drüse, es münden ferner tiefaufsteigende ableitende Bahnen aus, während andere Lymphstränge ohne Unterbrechung an der Etappe vorüber der nächst höheren zustreben. Aus dem Plexus lumbalis entwickeln sich die 2 mächtigen Trunci lumbales, welche sich mit den Trunci intestinales hinter der Aorta in die Cysterna chyli ergiessen (in Höhe des 2. Lumbalwirbels).

Von dieser Bezeichnung weicht die namentlich in klinischen Arbeiten gebräuchliche Nomenclatur ab. — Man hat sich die Frage mehr praktisch zurechtgelegt. Die grossen Beckengefässe schliessen im Ganzen 3 Dreiecke ein, von denen das grosse Gefässdreieck zwischen den Art. iliacae communes in der Aortengabel, das kleine zwischen Vasa iliac. ext. und Vasa hypogastr. jederseits in der Communisgabel liegt. Da man bei der operativen Ausräumung der Drüsen erst die Aussenseite der Gefässe, dann das kleine Gefässdreieck und endlich die Innenseite absucht, so scheint es einfacher, alle Drüsen ausserhalb der Gefässdreiecke als Gl. iliac. externae zu bezeichnen, die höher gelegenen nahe der Aorten-

theilung rechnet man gewöhnlich bereits dem Pl. lumb. inf. zu; die Drüsen in dem kleinen Gefässdreieck werden mit Cruveilhier als Gl. hypogastricae bezeichnet, die Drüsen im grossen Gefässdreieck endlich sind die Gland. sacrales laterales, welche eben den Drüsen an der Aussenseite — als die entsprechenden Drüsen an der Innenseite der grossen Gefässe (*Vasa iliaca comm. et int.*) — correspondiren. Man muss sich nur vergegenwärtigen, dass die Art. hypogastrica dicht vor der Artic. sacroiliaca liegt und die von ihr entsendeten Art. sacrales laterales (Spinaläste) eigentlich direct nach dem Ursprung in die Foramina sacralia lat. tauchen, ferner dass die obere der seitlichen Sacraldrüsen nahe der Aorten-theilung auf oder an dem Promontorium liegen und zur untersten Gl. lumbalis inf. werden kann, um die Angaben von Mascagni mit denen von Sappey, Bruhns und Peiser vereinbaren zu können. Alle Beobachter sahen dieselben Drüsen (vergl. das Schema von Bruhns mit der Zeichnung Peiser's und der Tafel XIV bei Mascagni). Nur über die Bezeichnung und die Abgangsstelle der zuleitenden Bahnen war oder ist man nicht einig.

Die Form und Grösse der einzelnen Lymphdrüsen kann sehr variabel sein. Sie schmiegen sich als spindelige Körper zwischen Arterie und Vene, sie umgeben als bohnenförmige, breite Masse von vorn oder hinten her die Rundung einer grossen Vene, sie erscheinen kugelig wie Erbsen oder flach linsenförmig, zuweilen wie der Kopf eines Pilzes vom Hilus her ausgehöhlt; allenthalben aber sieht man in der Nähe der grossen Gebilde kleine Nebendrüs'chen, manchmal im Hilus 2 ja 3 (bei den spindeligen Formen an der Spitze im Verlauf des Vas. affer. oder effer.), um welche Nebendrüsen sich die Lymphbahnen knäuel-förmig herumwinden.

Die Zahl der Drüsen ist meist grösser als man erwartet. Der Plexus lumbalis (sup. et inf.) enthält zum mindesten 6—10 Drüsen, ich habe in pathologischen Fällen 16 und mehr grössere Knollen beobachtet. Was die Plexus iliaci betrifft, so finden sich an der Aussenseite der *Vasa iliac. comm.* gewöhnlich 2 Drüsen in der Psoasnische und 3 im Verlauf der *Vasa iliac. ext.*, davon die letzte oder die 2 letzten nahe der vorderen Bauchwand. Im kleinen Gefässdreieck finden sich 3, seltener 4 oberflächliche Drüsenkörper, von denen einer gewöhnlich genau am Theilungswinkel der Art. iliac. comm., 2 mehr nach der Art. hypogastr. zu liegen. Dazu kommen 1—2 Drüs'chen am Nervus obturator. und 2—3 an der

Wurzel des Nervus ischiadic. In der Ausstrahlung der Art. hypogastr. fand ich nie mehr als 2 Drüsen (Lgl. rectovaginales). Die zwischen den grossen Gefässen und dem Rectum gelegenen Drüsen (Lgl. sacrales laterales) finden sich zu 2—3 nahe bei einander liegend.

Es ist somit eine stattliche Anzahl von Drüsen (26—36), welche dem Psoas entlang an den grossen Gefässen bis hinauf zur Niere und im kleinen Becken an allen Austrittspforten und Gefässgabelungen gewissermaassen als Knotenpunkte eines complicirt gebauten Geflechtes stationirt sind. Dabei muss man noch in Erwägung ziehen, dass die kleinen Nebendrüsen, welche ich oben erwähnte, in pathologischen Fällen, wenn eine oder zwei benachbarte Drüsen functionsunfähig werden, hypertrophiren und zu grossen Drüsen anwachsen können, so dass man in der Regel bei Sectionen oder bei Operationen an einzelnen Stellen oder ganz allgemein eine auffällig grosse Zahl von Drüsen finden kann. Ob dies auf einer Neubildung von Drüsen, d. h. von adenoider Substanz aus indifferentem Fettgewebe, oder wie ich nach meinen Untersuchungen annehmen möchte, auf der Ausbildung schon vorhandenen Materiales beruht, wird schwer zu entscheiden sein. Jedenfalls beeinträchtigt die Entscheidung nicht das thatsächliche Bestehen der Ersatzkräfte. Die grosse Zahl der Drüsen, welche wie complicirte Sieborgane in den Lymphstrom eingeschaltet sind, ist ein Schutz bei der Ueberwältigung von eingedrungenen Infectionserregern. Die Bakterien werden von einer ganzen Drüsengruppe aufgefangen. Erliegt eine Drüse im Kampf, so treten neue Nachbarn für sie ein, und es bleiben zunächst noch Drüsen genug, um die normale Function im Körperhaushalt zu versehen. Freilich geht die Regenerationskraft nicht ad infinitum (auch dies spricht für schon vorhandene, in der Zahl begrenzte Reserveanlagen) — auch die Reserven werden endlich erschöpft, und es kann eine dauernde Lymphstauung einer Extremität beispielsweise nach einer acuten Vereiterung der regionären Drüsen (Sack) eintreten, wie sie nach operativer Ausräumung z. B. der Achselhöhle für den Arm genugsam bekannt ist.

Diese allgemeinen Erörterungen mussten den speciellen Besprechungen voraufgehen, weil sie auf alle Etappen Bezug haben und nicht an jeder Stelle wiederholt werden sollen. Es wird ein Leichtes sein, die Ausmündungsstellen der ableitenden Stämme, welche aus den Beckenorganen sich sammeln, in das allgemeine Schema einzutragen. Die abführenden Stämme münden gewöhnlich

an mehreren Knotenpunkten des oben geschilderten Drüsennetzes aus. Es bestehen da offenbar gewisse Variationen. Auch bleiben wohl alle Injectionsversuche unvollkommen, d. h. die Lymphverbindungen aller Organe sind reichlicher, als man es zuweilen nach dem Injectionsresultat vermuthet. Wenn einzelne Bahnen zuweilen nicht injicirt erscheinen, so bedeutet das zunächst noch nicht, dass sie überhaupt nicht vorhanden sind, sondern nur, dass die Technik noch nicht vollendet genug war. Das Mikroskop würde die Bahnen noch nachweisen. Darum erscheint mir die Forderung unerlässlich, unsere Injectionsresultate mit dem Mikroskop nachzuprüfen. Die speciellen Verhältnisse der einzelnen Regionen geben im Folgenden Anlass genug, dies im Einzelnen klarzulegen.

Die Lymphbahnen der vorderen Bauchwand.

Gerota hat neuerdings die Lymphcanäle der Nabelgegend und der Unterbauchwand untersucht und die Ergebnisse der Mascagnischen Forschungen ergänzt. Wie überall, so schliessen auch hier die abführenden Lymphbahnen im Groben an den Verlauf der Blutgefässe an. Die Parenchymbahnen bilden äusserst feine Netze, welche wie überall an der Körperoberfläche ein feines, intracutanes über einem weiteren subcutanen Lacunensystem bilden. Am Nabelschnuransatz erscheinen die Lacunen als ein dichteres Ringgeflecht. In der Nabelschnur selbst könnte ich keine präformirten Canäle nachweisen. Die zarte, durch Injection erzielte Färbung erwies sich stets im mikroskopischen Bild als diffuses Infiltrat, die einzelnen Lücken waren künstlich geschaffene, unregelmässige Rissspalten ohne Endothelauskleidung.

Aus den Parenchymnetzen der Bauchhaut entstehen feine Stämmchen, welche im tiefen, subcutanen Fettgewebe nach oben zum Nabelring, nach unten zur Arteria und Vena epigastr. superficialis hinstreben. Die letzteren, als Vasa lymph. hypogastrica bezeichnet, verlaufen bis zur Mündung selbständig und treten als unbedeutende, feine Röhren in die Lgl. inguinales superfic. (obere Gruppe) ein. Mascagni konnte nicht weniger als 12 hypogastrische Stämmchen injiciren, wie überhaupt die Zahl der in den Leistendrüsen endenden Lymphbahnen eine sehr bedeutende ist. Die Tafel VIII in dem Atlas von Mascagni zeigt z. B. ausser den Genitalbahnen und den 12 eben erwähnten hypogastrischen Stämmen — 37 Lymphgefässe von der Vorder- und Innenfläche des Schenkels entstammend — 12 Bahnen, welche von der Ge-

sässgegend in der Verlaufsrichtung der Vena circumflexa ilei superficialis herantreten — endlich 6 von der Aussenseite des Oberschenkels entspringende Bahnen.

Die am Nabelring sich sammelnden Stämmchen können zuweilen hier in einer kleinen Lymphdrüse münden, welche Gerota 1mal am Nabelring, d. h. wohl auf der Fascie, 1mal hinter dem Nabelring, also präperitoneal, fand. Von hier aus füllen sich bei Injectionen am Nabelring feine Lymphbahnen, welche entlang der Vena umbilicalis im Ligam. teres hepatis eine Strecke weit aufwärts zu verfolgen sind. Am Nabel stehen offenbar die Lymphbahnen aller Wandschichten mit einander in Verbindung. Die Anastomosen verlaufen in gleicher Weise wie die Paraumbilicalvenen (Braune, Sappey), welche die Venen im Ligamentum teres hepatis mit der Vena epigastrica inferior und den Hautvenen verbinden. Erfahrungen aus der pathologischen Anatomie lehren uns, dass hier bei carcinomatöser Infiltration des Peritoneums Metastasen auf dem Lymphwege sowohl ins Ligamentum teres hepat. als nach der Oberfläche hin sich entwickeln können. Auch wir sahen bei Autopsieen und Probelaparotomieen solche Nabelmetastasen bei Care. corporis uteri wie bei inoperablen Ovarialkrebsen. — Die tiefen intramusculären Lymphbahnen der vorderen Bauchwand ziehen zur Art. (Vena) epigastr. inferior, an welchen sie entlang nach abwärts verlaufen, um am Hauptstamm der Arterie in 2 oder 3 kleine Drüsen zu münden. Die Vasa efferentia dieser Drüsen und die selbständigen Stämmchen streben am lateralen Rectusrand nach abwärts und ziehen am medianen Rand des inneren Leistenringes, den Funiculus spermaticus (Ligamentum rotundum) kreuzend, zu den tiefen Leistendrüsen dicht am Ligam. Poupartii oder etwas höher zu den an der Vena iliaca ext. liegenden Drüsen.

Die Lymphbahnen der Harnblase.

Sappey hatte keine befriedigenden Resultate bei seinen Blasen-injectionen. Daher erklärt es sich wohl, dass noch neuerdings seine Annahme, die Blasenschleimhaut entbehre der Lymphbahnen, referirt wird (S. Polano, S. 493). Die beiden Hoggans und Cruikshank haben die Blasenbahnen gesehen, ebenso Albarran, welchen Gerota erwähnt, und endlich hat Gerota selbst sie neuerdings nachgewiesen.

Gerota fand sogar ein sehr reiches Lymphnetz mit engen Maschen in der Mucosa vesic. urin., von dem aus kleine, selbst-

ständige Stämmchen die Muscularis durchbrechen, um mit den Muscularisbahnen zu den regionären Drüsen zu ziehen. Am Trigonum communiciren die Mucosa-Lymphbahnen mit denen der Urethra, und wahrscheinlich ziehen auch in die Ureterenwand, an der Harnleitermündung, Communicationswege hinein.

Die Lymphgänge der Muscularis vesicae urin. laufen in eigenthümlichen querliegenden Schlingen, welche die Arterien mehrmals kreuzen, und unterscheiden sich dadurch auch auf den ersten Blick von dem serös-subserösen Peritonealnetz, welches regelmässige dünngezeichnete Netze bildet und manchmal bei flachen Einstichen in das Corpus uteri injicirt wird.

Die abführenden Lymphstämme der Blasenvorderwand verlaufen getrennt von denen der Hinterwand; beide Arten sind kurz und arm an Klappen. Die Bahnen der Hinterwand enden, an der Art. umbilicalis (vesicalis superior) sich sammelnd, in mehreren kleinen Drüsen (Lgl. vesicales laterales), welche sich ziemlich regelmässig (nach Gerota 7 mal in 10 Fällen) an der Art. umbilicalis finden. Die Stämmchen der Blasen-Vorderwand wenden sich zum Plexus venosus vesicalis ant. und münden hier am Blasen Hals dicht an der Symphysenhinterwand in kleinen Lymphdrüsen, welche Gerota als Lgl. vesicales anteriores bezeichnet. — Die Vasa efferentia dieser Drüsen laufen um den Blasen Hals herum, vereinigen sich seitlich mit den Vasa efferentia der Lgl. vesic. lateral. und ziehen als abführende Blasenbahnen II. Ordnung mit den Artt. vesicales zu der Theilungsstelle der Art. hypogastrica. Sie münden in einer Drüse dicht am Ursprung der Art. uterina (Glandula uretero-uterina), oder sie überschreiten die Art. hypogastr. und das ganze kleine Gefässdreieck und finden erst in den Drüsen auf den Vasa iliaca ext. ihre Unterbrechung.

Die weibliche **Urethra** bildet kein selbstständiges System. Ihre Lymphbahnen communiciren am Blasen Hals mit denen der Blase. Injectionen in die äussere Urethralgegend haben das gleiche Resultat wie alle vulvären Einstiche.

Der Ureter soll nach Sappey gleichfalls frei von Lymphbahnen sein. In der That konnte ich eine parenchymatöse Injection seiner Wand nicht zu Stande bringen. Einstiche in eine der hypogastrischen Drüsen liessen (bei Erwachsenen) nur solche Bahnen hervortreten, welche vor oder hinter dem Ureter verliefen oder ihn kreuzten; aus allen war er glatt auszulösen. Bei Injection in die Ureterwand drang die Injections-

masse in die Drüsen an der Iliaca communis-Gabelung. Die mikroskopische Untersuchung der Ureterenwand ergab jedoch ein wenig befriedigendes Resultat, insofern die Farbmasse zerstörend, aber nicht injicirend gewirkt hatte. Die feste äussere Kapselschicht war abgehoben, und nur wenig endothellose Spalten (Kunstproduct) in der Muscularis ureteris selbst waren blau injicirt, so dass sich mir die Annahme einer freien Lymphströmung in endothelfreien Saftspalten aufdrängte. In dem conisch sich verdickenden Blasenende des Ureters und in dem intramuralen Verlauf der Mündung muss wohl das Lymphnetz der Blase Anastomosen in die Ureterenwand entsenden. Die carcinomatöse Infiltration des Ureters bei Gebärmutterkrebs findet sich hier an dieser Stelle und beginnt vom Blasenansatz aus. Dagegen kann man den in seinem freien Verlauf (im Parametrium) vom Carcinom umwachsenen Ureter rein ausschälen; solange er noch beweglich sich verschieben lässt, ist er carcinomfrei.

Die ableitenden Bahnen des Ureters sah Stahr nach seiner Mittheilung in dem Atlas von Bardeleben im unteren Bereich zu den Drüsen an der seitlichen Beckenwand, im oberen zu den Lumbaldrüsen verlaufen. Auch ich konnte jüngst bei zwei Kindern die entsprechenden Befunde erheben. Während seines Verlaufes an der seitlichen Beckenwand entsendet der Ureter kleine Stämmchen, welche sich auswärts wendend zu den hypogastrischen oder äusseren iliacalen Drüsen begeben. Im Bereich des oberen Drittels gehen Stämmchen medianwärts ab, welche zur Aorta streben (Gland. lumbal. sup.); oben wie unten ziehen die Lymphcanäle z. Th. eine Strecke weit auf dem Ureter entlang, unten sogar bis zur Blasenwand.

Die Lymphbahnen der weiblichen Genitalien.

Auch hier müssen wir die feinen klappenlosen Parenchymbahnen und die klappenführenden, ableitenden Stämme auseinanderhalten. Die ersteren stehen untereinander in weitgehendster Communication. Sie bilden ein feinmaschiges Netz von seltener Regelmässigkeit, wie dies am schönsten von Poirier für Scheide und Uterus dargestellt worden ist. Die Injection der Schleimhaut giebt feinere Netze als der intramusculäre Einstich. Doch bleibt dies ohne praktische Bedeutung, da die Schleimhautbahnen mit den tiefer gelegenen Muskelgängen in directem Zusammenhange stehen, und bei oberflächlicher wie bei tiefer Injection dieselben ableitenden Stämme sich füllen.

Infolge der jüngsten Arbeiten auf diesem Gebiet (Peiser, Bruhns) ist die Nomenclatur nach Cruveilhier und Sappey in der gynäkologischen Fachliteratur so beliebt geworden, dass auch ich dieselbe für die Bezeichnung der regionären Drüsengruppen anwenden möchte. Wir verstehen unter der Bezeichnung Lgl. hypogastricae alle Drüsen, welche im kleinen Gefässdreieck zwischen den Vasa iliaca ext. und den Vasa hypogastrica liegen, — die Drüsen auswärts vom kleinen Gefässdreieck an und auf den Vasa iliaca ext. werden als Lgl. iliaca ext., — die Drüsen einwärts vom kleinen Gefässdreieck zwischen Vena hypogastr. und Vena iliaca communis einerseits und dem Rectum andererseits werden als Lgl. sacrales laterales bezeichnet, — die Drüsen an und auf den Vasa iliaca communia werden als Lgl. iliaca communes benannt, bei hohem Sitz schon als Lgl. lumbales inferiores den Drüsen an der Theilungsstelle der Aorta und Vena cava zugerechnet; — die darüber sitzenden Lymphdrüsen an der Aorta und Vena cava aufwärts bis zum Abgang der Nierenarterien endlich werden wie allgemein als Lgl. lumbales superiores den unteren gegenübergestellt.

Die Vulva und zwar grosse wie kleine Labien mit der Clitorisgegend, Urethralmündung, dem Hymen und unteren Scheidendrittel entleeren ihre Lymphe in etwa 5 bis 8 grössere Stämme, welche von der Vulva an nach auswärts zur oberen inneren Gruppe der Lgl. inguinales superfic. (Sappey) verlaufen. Die mittleren Bahnen verlaufen horizontal, die oberen im Bogen mit nach oben convexer Krümmung, die unteren analog den oberen aber mit entgegengesetzt gekrümmten Bogen. An den Commissuren vorn und hinten findet Gefässaustausch zwischen rechts und links statt, so dass man von einem Einstich aus sowohl direct — durch die ableitenden Bahnen — wie auch indirect auf dem Umwege über das Parenchymnetz die beiderseitigen Leistendrüsen füllen kann. Einstiche in die Bartholin'sche Drüse — selbst tiefe — gaben Bruhns die gleichen eben geschilderten Resultate. — Nach Rille steht diese Region auch in Beziehung zu dem Rectovaginalplexus. — Nach Rille's Zusammenstellung nehmen auch französische Autoren (Hugier, Martin und Léger, Tarnier) an, dass die Lymphbahnen der Gland. Bartholini zu Drüsen im Becken an der Seite zwischen Rectum und Vagina verlaufen, während ein anderer französischer Autor Bonnet dies verneint.

Ich selbst sah bei tiefer Injection in dieser Gegend an der Leiche eines frühgeborenen Kindes zunächst nur die Bahnen oberflächlich zu den Inguinaldrüsen ausstrahlen, offenbar über den Umweg der Scheidenschleimhaut. Nach Wegnahme der seitlichen Beckenwand und Blosslegung der Beckenorgane sah ich zu meiner Ueberschung 2 divergirende, starke Lymphstränge im tiefen, paravaginalen Gewebe nach aufwärts in die Tiefe des Beckens ziehen, deren einer blasenwärts in den Lgl. vesicales ant., deren anderer rectalwärts in den Drüsen zwischen den Endästen der Art. hypogastrica endete. Beide umfassten nach oben divergirend die Vagina. — Damit würde die klinische Beobachtung übereinstimmen, dass bei Bartholinitis relativ sehr selten die Inguinaldrüsen anschwellen, häufiger die seitlichen Rectovaginaldrüsen, welche man in entzündlichem Zustande als schmerzhaftes Knoten vom seitlichen Fornix vaginae aus tasten kann.

Der mittlere Bezirk der Vagina entleert nach Poirier seine Lymphe in eine oder zwei Drüsen, welche zwischen Vagina und Rectum im Winkel zwischen Art. vaginalis, umbilicalis und pudenda communis liegen. Bruhns fand als typisch die Verbindung mit einer oder zwei Drüsen, welche zwischen dem Rectum und der Art. hypogastr. liegen, zuweilen aber auch mit den Drüsen im kleinen Gefässdreieck. Wahrscheinlich bestehen beide Verbindungen.

Je weiter man mit den Einstichen aufwärts geht, um so leichter injiciren sich im mittleren und oberen Bezirke der Scheide zweierlei Bahnen: — bei seitlichem Einstich Verbindungen zu den unteren Drüsen im kleinen Gefässdreieck, vor allem zur tiefsten, an der Abgangsstelle der Art. uterina liegenden Drüse — und beim Einstich im hinteren Scheidengewölbe die Sacralbahnen zu den Lgl. sacrales laterales. Ausserdem konnte Bruhns vom Fornix post. aus eine Reihe kleiner Drüsen injiciren, welche seitlich vom Rectum am Beckenboden lagen; er fand ferner feine Communicationsbahnen zu Drüs'chen, welche auf der Fascia recti, seltener zu solchen, welche unter derselben liegen, also bereits dem Anorectalgebiet angehören. Dieser Zusammenhang beider Lymphgefässsysteme, welcher klinisch durch seine Wechselwirkungen ganz wahrscheinlich gemacht oder bestätigt wird, wird auch von Moran hervorgehoben.

Für den Uterus steht als Hauptverbindung die Beziehung des Collum zu den Lgl. hypogastricae, sowie die des Corpus zu den Lumbaldrüsen fest (s. Fig. 1 u. 2). Vom Collum uteri zunächst

ziehen 2 bis 3 starke Stämme (im Verein mit den oberen Scheiden- und unteren Körperlymphbahnen) mit der Art. uterina den Ureter kreuzend jederseits durch das Parametrium, treten hier, wie ich vorweggreifend bemerken möchte, mit einer Anzahl (2—5) kleiner Drüs'chen (noduli lymphat. parametranes) in Beziehung und erreichen mit der Art. uterina die seitliche Beckenwand, um sich hier nach aufwärts und hinten wendend in die Lgl. hypogastr. des kleinen Gefässdreiecks zu ergiessen. — Die einzelnen mit zierlichen Klappen ausgezeichneten Gefässe gehen vor und hinter dem Ureter weg; sie können ihn auch an der ganzen seitlichen Beckenwand von vorn und hinten einrahmen oder kreuzen. Doch bleibt bei Injectionen vom Uterus her die Wand des Ureters selbst frei (vergl. oben S. 24).

Die zweite Verbindung des Gebärmutterhalses durch das Lig. sacrouterinum zu den Lgl. sacrales laterales — von Sappey beschrieben — ist von Bruhns nicht bestätigt worden. Sie besteht aber und wurde auch von Peiser als typisch festgestellt. Ich selbst konnte sie durch Injection und mikroskopische Untersuchung nachweisen. Diese Etappe ist bei neugeborenen Kindern wohl entwickelt und zwar leicht zu finden, wenn man von der Corpushinterfläche an der oberen Cervixgrenze einsticht und in der Richtung gegen die Cervix mit starkem Druck injicirt. Es erscheinen dann in den Bogenfalten des Sacrouterinbandes, 2 bis 3 in den Faltenabsätzen mit immer grösser werdenden Bogen verlaufende Bahnen, deren tiefste den kleinsten Bogen beschreibt und hart am Rectumrande verschwindet; die höheren sind länger und streben zur Vena iliac. communis-Innen- bzw. Hinterfläche. Nimmt man das Mesorectum und die Art. haemorrhoidalis sup. hinweg oder zerzt es mit dem Rectum (Flexura sigmoidea) medianwärts, so treten die seitlichen Sacraldrüsen im grossen Gefässdreieck wohl injicirt hervor.

Von der Mitte des Gebärmutterkörpers aus ziehen zwei oder mehr mittelstarke Aeste dicht über und mit den seitlichen Collumbahnen zu den oberen hypogastrischen Drüsen in der Gabel der Art. iliaca communis.

Von beiden Uterushörnern strahlen feine Lymphstränge in die Ligam. rotunda aus, mit welchen sie durch den Leistencanal ziehen, um in den tiefen Inguinaldrüsen zu münden. Die Hauptstämme des Corpus jedoch (2 bis 3) verlaufen höher oben von den Spitzen der Uterushörner aus in der Höhe des Ovarialansatzes und zwar

vor oder unter dem Hilus ovarii durch das breite Ligament, tauchen an dessen Seitenrand ins Ligam. ovarioelvic., um hier im Verein mit den Tuben- und Ovarialbahnen aufwärts zu den Lumbaldrüsen zu ziehen. Eine Communication zwischen den ableitenden Corpus- und den Ovarialbahnen scheint nur ausnahmsweise vorzukommen. Sie wurde von Poirier dargestellt, von Bruhns aber nicht bestätigt.

Der uterine Theil der Tube steht in Lymphaustausch mit dem Uteruskörper. Die feinen Bahnen der Pars isthmica und ampullaris (s. Fig. 3) sammeln sich in wenige (meist 2) Stämmchen, welche am unteren Tubenrande im Ligamentum entlangziehen und im Plexus ovaricus mit den ableitenden Lymphsträngen des Ovariums sich vereinen.

Die Pars abdominalis tubae mit dem Fimbrienkranz bildet ein selbständiges ableitendes Gefäss. Verbindungszweige laufen in der Fimbria ovarica von Tube zu Ovarium und im Ligam. ovarii medianum vom Cornu uteri zum Ovarium bzw. umgekehrt. Aus dem Hilus ovarii treten nach Bruhns und Polano 6—9 ziemlich gleichmässig mittelstarke Lymphcanäle, welche durchs Mesovarium zum Ligamentum latum ausstrahlen und hier unter Betheiligung an der Bildung des Plexus sousovarique sofort nach aussen hinten und oben abbiegen in das Ligam. ovarioelvicum; hier ziehen sie, mehr den inneren Rand einnehmend, mit Corpus- und Tubenbahnen zu den Lumbaldrüsen. Bei dem Verlauf durchs breite Ligament machen die Corpusbahnen den vorderen, also grösseren Bogen, die Ovarialbahnen den hinteren, kleineren Bogen; die ersteren betrachtet man besser von der Vorderseite des breiten Bandes, die letzteren von dessen Hinterseite. Vgl. Fig. 1 und Fig. 2. Im weiteren Verlauf sammeln sich die Ovarialbahnen mehr um die spermaticalen Blutgefässe und zeigen in Folge dessen die Tendenz, höher auszumünden (Lgl. lumbales superiores) als die Corpusbahnen, welche zu den unteren und oberen Lumbaldrüsen in Beziehung treten.

An der Bildung des Plexus sousovarique, welcher am Ovarialansatz im breiten Ligament als Durchtrittsknotennetz für obere Corpus-Tuben-Ovarialstämme stationirt ist, nehmen auch abirrende Zweige aller 3 Organe Theil. Die eigentlichen ableitenden Stämme aber treten von vornherein unverzweigt ein und bleiben meist isolirt.

Betrachtet man nach gelungener Injection das Ligam. latum gegen das Licht, so zeichnen sich eine Menge zierlicher Gefässe ab, am oberen Rand unterhalb der Tube alle die Gefässe, welche dem

Ligam. ovario-pelvicum zustreben. Ihr Bündel, Anfangs am Uterushorn schmal, wird nach aussen zu immer mehr verstärkt durch die Stämme der Tube und der Ovarien. Vom Plexus sousovarique erblickt man zierliche Netze in der Mesosalpinx und im Ligam. lat. unterhalb des Ovarialansatzes. Endlich imponirt an der Seitenkante der Gebärmutter nach aussen von den Blutgefässen vom inneren Muttermund bis zum oberen Corpusdrittel aufsteigend: **die grosse Seitenanastomose zwischen Cervix- und Corpuslymphbahnen**, welche zuweilen ein grösseres Lumen besitzt als die ableitenden Stämme. Auch Mascagni zeichnet sie Taf. XIV und ebenso Poirier. Klinisch ist sie wiederholt bestätigt worden (v. Franqué), und ist ihr typisches Vorkommen ebenso sicher als das der Sacraldrüsen.

Während nun im Allgemeinen die abführenden Stämme nicht miteinander in Verbindung stehen, communiciren die regionären Drüsen selbst in weitestgehendem Maasse untereinander und zwar auf- und absteigend, sowie nach den Seiten hin mit allen Nachbardrüsen. Von den uns interessirenden Stationen empfangen z. B. die Lgl. hypogastr. die Bahnen von dem oberen Scheidenabschnitt, vom Collum und unteren Corpustheil, und dieselben Drüsen communiciren weiterhin mit den Lgl. iliacae externae und lumbales inferiores, mit den Lgl. sacrales laterales und endlich retrograd mit den Drüsen in der Tiefe des Beckenzellgewebes in der Hypogastrica-Endausstrahlung (Lgl. rectovaginales), am Plexus nervor. sacral. (Lgl. ischiadic.) und endlich mit der Lgl. obturatoria (Cruveilhier), welche in der Tiefe am Nervus obturator. liegt und nicht zu den oberflächlichen hypogastrischen Drüsen gehört.

Alle Bahnen, welche zu den Gland. hypogastricae verlaufen (Fornix vaginae, Collum, unteres Corpus uteri) können z. Th. wenigstens direct nach aussen ziehen und in die Drüsen an den Vasa iliac. extern. und commun. einstrahlen. — Gewöhnlich sind die letzteren aber bereits II. Etappe.

Die intermediären, kleinen Drüsen im Parametrium — von einigen Untersuchern [Lucas Championnière, Henle, Sappey] hervorgehoben, von anderen (Peiser) bestritten — sind abgesehen von ihrer Kleinheit für die Injection schwer nachzuweisen, weil sie bei Kindern wie bei Erwachsenen dem Lumen der Lymphgefässe [die meisten, jedoch nicht alle] mehr seitlich angelagert sind, während die grossen Drüsen an der Beckenwand richtige Stromunterbrecher darstellen. Bruhns fand zwischen der Art. hypogastr. und der Uterusseitenkante nicht weniger als 5 bis 10 kleine Drüsen

und zwar sowohl nach der Blase als nach dem Rectum zu. Der Grund für die Differenzen der Beobachter liegt in dem Fehlen der mikroskopischen Nachuntersuchung, für welche Polano's Verfahren überaus günstig ist.

Als Hauptergebniss meiner anatomischen Untersuchungen an Leichen von Kindern und Erwachsenen, sowie an dem operativ gewonnenen Krebsmaterial referire ich: „Die Zahl der Lymphverbindungen und der regionären Drüsen des Uterus ist grösser als man bisher annahm.“ Auf die Communicationsbahnen zum Rectum mit und ohne Umweg über das Scheidengewölbe hat Bruhns (Moran) aufmerksam gemacht. Ebenso besteht eine Lymphanastomose nach vorn zur Blase hin. Vergl. Fig. 1, welche ausser dem feinen Netz der Serosabahnen noch einen tiefen Lymphstamm an der hinteren Blasenwand mit charakteristischer Schleifenbildung injicirt zeigt (bei Einstich in die Portio!). — Die hinteren Collumbahnen im Sacrouterinband sind constant; denn sie finden sich bereits beim Kinde vollständig angelegt mit der zugehörigen Drüsenetappe.

Ebenso regelmässig sind die intermediären Lymphknoten im Parametrium bei Kindern wie bei Erwachsenen. — Man ist stets überrascht, in den Parametrien Lymphknoten, Nervenstämme und sympathische Ganglien in Begleitung der Vasa uterina zu finden. Wenn bisher von einer Inconstanz der Drüsenbefunde die Rede war, so möchte ich gerade für eine Constantheit der Drüsenkeime eintreten. Die Drüsen sind vorhanden. Man fühlt und sieht sie nur schwer. — Die von Bruhns an der Ureter-Uterinakreuzung beschriebene Drüse konnten wir bei Carcinomoperationen 3 Mal als besonders kräftige hypogastrische Drüse bestätigen. Diese Drüse — bei Carcinom des Uterus am ehesten gefährdet — leitet von den intercurrenten parametranen Knötchen (welche meist nur als *Noduli lymphatici* zu bezeichnen sind) über zu der I. Etappe der regionären Lymphdrüsen, den *L. hypogastricae*, welche 3 bis 4 an der Zahl im vorderen kleinen Gefässdreieck liegen. Die unterste kann eben bei tiefem Sitz zur Gland. uretero-uterina werden. Injectionsversuche von einer dieser vorderen hypogastr. Drüsen aus erweisen ihre weitgehenden, oben bereits geschilderten prograden und retrograden Verbindungen. Eine Betrachtung der von ihrer Unterlage abgelösten grossen Gefässstämme (vergl. Figur 4—6) lehrt, dass die sogenannten hypogastrischen Drüsen nur ein Theil der in diesem Gefässconflux liegenden Lymphknoten ist. *Re vera* werden

die Vasa iliaca extern., commun. und intern. von den Drüsen und deren Communicationsbahnen allseitig von vorn wie von hinten umspinnen. — Eine anatomische Auslösung der Lymphorgane dieser Region in continuo ist — davon kann sich jeder an injicirten Leichen überzeugen, — ohne Abhebung der Gefässstämme und ohne Abpräpariren der Gefässscheide unmöglich. Unabhängig von den oberflächlichen hypogastrischen Drüsen fand ich in allen untersuchten Leichen die tiefen Beckendrüsen am N. obturator., ischiadic. und in der Ausstrahlung der Art. hypogastrica: — ferner die Drüsen an den Vasa iliaca ext., namentlich die Gruppe nahe an der vorderen Bauchwand, constant auch die grossen Drüsengruppen an den Vasa iliaca comm., Aorta und vena cava. Die Darstellung der Gefässdurchschnitte (Fig. 6) erläutert am klarsten ohne viele Worte die Lagebeziehung der Drüsen, welche häufig an der Hinterseite der Arterien sitzen und die Vene zwischen sich fassen.

Die Drüsen auf der Vena iliaca externa, nahe dem inneren Schenkelring, anastomosiren retrograd mit den Drüsen im inneren Schenkelring (Rosenmüller) und den tiefen Inguinaldrüsen. Sie können also von der Vulva her durch die oberflächlichen Inguinaldrüsen, ferner vom Gebärmutterkörper her durch die im Ligament. rotundum zu den tiefen Inguinaldrüsen verlaufenden Corpusbahnen — in beiden Fällen also prograd über die Inguinaldrüsenetappe injicirt werden. Dieselben Lgl. iliaca ext. können auch retrograd bei Umkehr der Stromrichtung von dem Lgl. hypogastr. aus Keime aufnehmen.“

Als atypische Drüsenbefunde erwähne ich noch die von Gellhorn an der Art. circumflexa ilium bei einer Section gefundenen Knoten. Mascagni's Taf. XIV zeigt ausser den Drüsen an der Art. circumflexa ilium sup. noch ähnliche Noduli auf dem Musculus iliacus. Auch bei meinen Injectionen konnte ich derartige Seitenäste an den Hauptbahnen auf der Beckenschaufel und am unteren Nierenpol darstellen.

Die von Staude auf dem Giessener Gynäkologen-Congress nur summarisch mitgetheilten „atypischen Drüsengruppen des Beckenbodens“ werden wohl unter eine der oben skizzirten Gruppen fallen.

Im Allgemeinen kann man somit überall da Lymphdrüsen erwarten, wo Blutgefässe verlaufen. Die Grösse und die Zahl der Lymphdrüsen wird sich nach dem Volumen des Gefässstammes richten, d. h. die Wurzel eines bestimmten Gefässgebietes ist zu-

gleich der Hauptverdichtungsknoten in dem weit ausgedehnten, complicirt gebauten Lymphsystem. Er wird in unserer hypogastrischen Region, wo die Saugadern des Schenkels, des Gesässes und des Beckens zusammenströmen, besonders mächtig sein. Der Verlauf der Lymphbahnen freilich kann sich — das muss zugegeben werden — von dem der regionären Blutgefässe emancipiren.

Die Lymphgefässe des Anus und des Rectums.

Um die Lymphorgane des Beckens erschöpfend zu behandeln, folgt eine kurze Wiedergabe der von Gerota neuerdings unter Zusammenfassung der früheren Erfahrungen (Mascagni, Sappey, Richet, Quény, Quain Testut) festgestellten Thatsachen. Die Lymphgefässe des cutanen Theils am Anus bilden ein so dichtes Netz, dass bei Quecksilberinjectionen, welche Gerota Anfangs nach Sappey's Beispiel noch anwendete, die Umgebung des Anus den Anblick einer einzigen spiegelnden Quecksilberschicht darbietet. Wenig Einstiche füllen den ganzen Analring und sehr leicht auch die Mucosa ani (was ich für die Polano'sche Injectionsmasse nur bestätigen kann) wegen der zahlreichen Anastomosen. Aehnlich wie die Venengeflechte dieser Region bilden auch die Lymphnetze varicöse, ampulläre Aussackungen. Unter der Haut verbinden sich die in die Tiefe sich fortsetzenden Lakunen zu einem zweiten Netz im subcutanen Gewebe. Aus beiden entwickeln sich jederseits 3 bis 6 abführende Stämme, welche im tiefen Fettgewebe an der Innenfläche des Oberschenkels bald in unmittelbarer Nachbarschaft der Genitalregion, bald mehr unterhalb nach der Vorderfläche des Schenkels ziehen und hier im Scarpa'schen Dreieck in den Lgl. inguinales superfic. münden, und zwar enden sie in der unteren inneren Guppe dieser Drüsen, während die Vulvabahnen in der oberen Gruppe (Sappey) ihre I. Unterbrechung finden. Doch ist dieser Unterschied nicht durchgreifend. Jedenfalls entspricht die klinische Maassregel, bei geschwollenen Leistendrüsen nicht nur die Genitalgegend, sondern auch Anus und Rectum zu untersuchen, den anatomischen Thatsachen, dass genitale und anale Lymphbahnen zuweilen nach denselben oberflächlichen Leistendrüsen verlaufen können, und zwar sowohl nach der oberen, wie nach der unteren, inneren Gruppe. Diese äusseren Analbahnen nennt Gerota nach der von Quény eingeführten Bezeichnung: „Vasa lymphat. haemorrhoidalia inferiora.“

Die Pars mucosa ani, obwohl leicht von der Analhaut aus zu

injciren, sendet die aus den Parenchymnetzen hervorgehenden Hauptgefäße submucös eine Strecke weit nach aufwärts, worauf sie die Muscularis recti durchbrechen, an der Seitenwand der Ampulla recti nach aufwärts ziehen und meist nach kurzem Verlauf in kleinen Drüsen enden, welch' letztere in den Theilungswinkeln der Art. haemorrhoidalis superior und ihrer Aeste liegen. Da die Lymphbahnnetze der Mucosa recti, welche namentlich an den Columnae Morgagni zierliche Bilder liefern, in ihren Sammelstämmen dasselbe Verhalten zeigen, so findet man nach Gerota an der Seitenfläche des Rectums vom Os coccygis bis aufwärts zur seitlichen Umschlagsfalte des Peritoneums zahlreiche kurze aufsteigende Lymphstämmchen mit den zugehörigen kleinen Lymphdrüsen in den Winkeln der Arterienverzweigungen, und zwar begleiten stets zwei Lymphgefäße 1 Arterie und 2 Venen. Die Durchbruchsstelle durch die Muscularis ist für alle 3 Gefäßarten die gleiche. Gerota zieht daher das Facit: „Die Lymphbahnen der Anal- und Rectalschleimhaut finden ihre I. Drüsenetappe in den zahlreichen Anorectaldrüsen, welche an der Seitenwand des Rectums im periproctitischen Fettgewebe eingebettet sind.“ Die Lymphstämmchen selbst nennt er mit Quény Vasa lymphat. haemorrhoidal. superiora. Die Lymphbahnen der Muscularis recti et ani konnte Gerota nur beim Hunde injiciren. Nach Analogie der thierischen Befunde nimmt er an, dass auch beim Menschen die musculären Lymphbahnen den gleichen abführenden Weg wählen, wie die mit ihnen communicirenden Schleimhautlacunen.

Die an der Kreuzbein-Vorderfläche (im Verlauf der Art. sacralis media hinter dem Rectum und höher oben im Mesorectum) liegenden Drüsen (vergl. Taf. XIV bei Mascagni!), die sogenannten Lgl. mesorectales, bilden somit erst die II. Etappe für die rectalen Lymphbahnen. Luschka, Cruveilhier, Tillaux, Testut, Débierre, Beaunis und Bouchard, Hoffmann kennen die Anorectaldrüsen nicht und halten die medialen Sacraldrüsen (Lgl. mesorectales) für die I. Etappe. Die Anorectaldrüsen liegen z. Th. zwischen Fascia propria recti und der Muscularis, z. Th. in der Hülle selbst, die Lglandul. mesorectales (bei Induration gut fühlbar) liegen dicht auf dem Os sacrum zwischen diesem und der Fascia recti. Endlich konnte Gerota (ähnlich wie Quény und dessen Präparator Manson) 2 mal unter 20 Fällen von der Mucosa ani aus mehrere kurze Stämmchen injiciren, welche in dem einen Falle zwischen Musculus levator ani und der Beckenfascie aufwärts

strebend in einer Drüse am Foramen ischiadicum maius endeten, in dem anderen Falle mit der Art. haemorrhoidalis media verlaufend an deren Ursprung ihre Drüsenetappe fanden. Quéný und Gerota bezeichnen diese schwer zu injicirenden Bahnen als Vasa lymphat. haemorrhoid. media. Damit würde auch hier Mascagni's allgemeine Angabe, dass die Lymphbahnen der Pars analis recti in den tiefen Beckendrüsen ihre erste Unterbrechung finden, für einen Theil der Fälle wenigstens zu Recht bestehen.

Mikroskopische Untersuchungen über den feineren Bau der Lymphbahnen des Uterus und seiner Anhänge.

Während die Blutgefässe ein in sich geschlossenes Röhrensystem bilden, stellt das Lymphgefässsystem gewissermaassen einen seitlichen Anhang desselben dar. Aus blind endigenden, mit Endothel ausgekleideten Räumen entstehend, wächst es allmählig zu venenähnlichen Stämmen (mit Intima, Media und Adventitia) an, welche sich sammeln und in das Venensystem ausmünden. Wie die Lymphbahnen die Blutgefässe umstricken, so haben andererseits auch die grösseren Lymphstämme ihre arteriellen und venösen Capillaren, wie dies bereits Mascagni experimentell durch Contrastinjectionen erwiesen hat. Im Allgemeinen aber sind Blutgefässe und Lymphlacunen im Körper räumlich getrennt. Die aus den Blutgefässen in die Gewebe übertretende Flüssigkeit: „das Ernährungsplasma“ muss also auf dem Wege vom Blutgefäss zum Lymphcanal entweder diffundirend die trennende Gewebsschicht durchsetzen oder in feinen endothellosen Saftspalten die einzelnen Zellorganismen umspülen. Ueber das Verhältniss der feinen Lymphcapillaren zu den fraglichen Saftspalten, ja über die Existenz dieser letzteren ist viel geschrieben und gestritten worden. — A priori sollte man eine Diffusion durch eine Endothelmembran für gleich wahrscheinlich halten, mag sie nun einem Blut- oder einem Lymphgefäss angehören, d. h. den Vorgang der Diffusion durch geschlossene Gefässwände, den man für die Blutgefässe annimmt, auch für die Lymphbahnen als die Regel annehmen. Der Sachverhalt liegt aber bei den Lymphbahnen insofern anders, als man hier mit dem Vorkommen von dauernden Stomata rechnen muss. Zum mindesten sind dieselben für die serösen Häute durch v. Recklinghausen's klassische Arbeit über die Fettresorption sichergestellt. Indessen sind die Ansichten über die sonstigen Körperregionen noch sehr getheilt, so dass z. B. Bonnet-Greifswald, wie uns Polano mit-

theilt, die Frage folgendermaassen charakterisiren konnte: „Entweder bilden die Lymphgefässe (-Capillaren) ein in sich geschlossenes System gegen die Saftlücken oder -Spalten im Bindegewebe und nehmen die Lymphe durch Diffusion auf, oder sie sind dauernd offen, oder sie öffnen sich vorübergehend durch Dehiscenz zur Aufnahme der Lymphe, z. B. die Stomata am Zwerchfell. Möglicher Weise kommen alle 3 Anordnungen neben einander vor.

Aehnliche Streitfragen schweben bezüglich der Entwicklung der Lymphgefässe. Entgegen Gulland und Saxer, welche die Lymphbahnen auf eine Erweiterung von Mesenchymspalten mit Auskleidung flacher Zellindividuen zurückführen, wobei schliesslich jede Bindegewebszelle zum Endothelindividuum werden könnte, lässt Ranvier die Lymphgefässe als Anfangs solide, später hohle Epithelsprossen aus dem Venensystem hervorgehen.

Gulland und Saxer sahen bei Schaf- und Rindsembryonen die ersten subcutanen Lymphgefässe als primitive Mesodermspalten, welche zwar von Endothel ausgekleidet waren, aber noch keine zusammenhängenden Gefässe bildeten. Ranvier dagegen konnte bei Schweineembryonen unter 9 cm Länge die Lymphgefässe überhaupt nicht injiciren. Dagegen glaubte er bei älteren Embryonen am Mesenterium ein distal fortschreitendes Wachsthum der Lymphgefässe durch erst solide, später hohle Sprossen beobachtet zu haben. Ranvier nimmt daher an, dass die Lymphgefässe vom Venensystem aus in ähnlicher Weise distal fortwachsen wie eine Drüse mit verzweigtem Gangsystem von einer Schleimhautröhre aus. Damit würden die Lymphbahnen von den Saftspalten principiell verschieden sein und ihr Endothel ebenso different von den Bindegewebszellen, wie das der Blutgefässe, welches man ja als Epithelabkömmling anzusehen neuerdings immer mehr geneigt wird. Ranvier's Annahmen sind im Uebrigen noch keineswegs allgemein erwiesen.

Noch eine kurze Bemerkung über die sogenannten perivascularären Lymphräume, wie sie insbesondere durch His im Centralnervensystem nachgewiesen worden sind. Polano hat neuerdings das Interesse an dieser Frage wieder angeregt, und so ist wohl ein Hinweis auf die modernen Anschauungen der Anatomen berechtigt. Ich begnüge mich mit der Feststellung, welche ich A. Kölliker's Handbuch der Gewebelehre 1902. III. Bd. S. 689 und S. 690 entnehme, dass diese perivascularären Räume — als „Blutplasma“ führende Spalten — nicht mit den perivascularär angeordneten „Lymph-

gefässen, anderer Körperregionen zu vergleichen sind; die letzteren umstricken seitlich anliegend die Blutgefässe, indem die kleineren Lymphröhren sich um die grösseren Blutgefässe spiralg herumwinden, aber die Blutgefässe haben keine Lymphscheide in dem Sinne, dass das Blutgefäss in einem grösseren Lymphgefäss stecken sollte. Eine wahre Einscheidung von Blutgefässen durch Lymphräume kommt nach Ebner (Köl liker) nur im Mesenterium des Frosches vor.

Die histologischen Untersuchungen scheinen eher dafür zu sprechen, dass gerade beim Menschen das Lymphgefässsystem allseitig gegen die sogenannten Saftspalten abgeschlossen ist. Von eigentlichen Poren oder Stomata im Sinne von v. Recklinghausen ist beim Menschen weder am Peritoneum des Zwerchfells noch sonst an einer serösen Haut etwas nachgewiesen worden.¹⁾ Ueberall, wo Lymphgefässe des Zwerchfells Aussackungen nach der Peritonealoberfläche hin treiben, liegt über der Seitenöffnung zum Mindesten noch eine Schicht von Epithel- bzw. Endothelzellen. Wenn allerdings die sogenannte interepitheliale Kittsubstanz im Sinne Flemmings (Anatom. Hefte Bd. 6 p. 1) als von Flüssigkeit erfüllte Lücken anzusehen sind, so gäbe dies eine plausible Erklärung für die Thatsache der Säfteströmung und Zellwanderung aus einer serösen Höhle in die andere und in die Substanz der in der Höhle liegenden Organe hinein.

Die Experimente scheinen dies auch für unsere Region zu bestätigen. — Kraus und Amann benutzten die von v. Recklinghausen eingeführte Methode, die Lymphzellen der Peritonealflüssigkeit durch Tuscheinjection ins Abdomen zu kennzeichnen. Kraus fand die geschwärzten Wanderzellen subepithelial im Eierstocksgewebe. Amann lockte sie durch intrauterin einverleibte, leukotactische Emulsionen durch die Serosa in die Gebärmutterwand bis in die Muscosa, ja bis ins Cavum uteri.

Ebenso wie am Peritoneum des Zwerchfells bei den Injectionen Farbflüssigkeit ohne Zerstörung des Gewebes an die freie Oberfläche tritt, so konnte wohl jeder Untersucher an der Serosa uteri ein ähnliches Verhalten beobachten, und wie ich vorwegnehmen möchte, an der Mucosa uteri verhält es sich ähnlich. Es scheint somit, dass die Lymphbahnen an den Körperoberflächen je nach Bedingungen bald geschlossen, bald an gewissen Stellen durchgängig sein können

¹⁾ Vergl. Köl likers Handbuch d. Gewebelehre. 6. Aufl. III. Bd. S. 688.

— oder kurz gesagt, dass sie ein Porensystem mit guter Schliessregulirung besitzen. Ob der Befund von besonders gearteten Zellgruppen im Oberflächenverband (S. Kölliker l. c.) schon eine Art von Schliesszellenapparat garantirt, wie er in der Pflanzen-Epidermis vorkommt, wird sich schwer erweisen lassen. Man kann eben die v. Recklinghausen'schen Versuche über Fettresorption am Kaninchenzwerchfell nicht am lebenden Menschen anstellen.

Für das Vorhandensein von Lymphporen spricht immerhin die Selbstinjection des menschlichen Peritoneums. Schon den alten Anatomen (Mascagni) war diese Eigenschaft bekannt. Bringt man in die geschlossene Bauchhöhle eines Menschen 12 bis 36 Stunden nach dem Tode eine Farblösung (Aufschwemmung von Tusche, Ocker, Zinnober in heissem Wasser) so zeigen sich nach einigen Stunden Lymphnetze mit den Farbpartikelchen angefüllt auf dem Zwerchfell, auf der Leberoberfläche (zuweilen auch, wie ich mich überzeugen konnte, im Douglas am breiten Ligament und an der Beckenhinterwand).

Auch Kölliker sah an herausgeschnittenen Zwerchfellstückchen des Kaninchens die Selbstinjection, und letztere findet nach seiner Erfahrung noch statt unter widrigen Druckverhältnissen. Ist nicht das Entstehen und Aufsaugen grosser Exsudate, welches in relativ kurzer Zeit vor sich gehen kann, ein weiterer Wahrscheinlichkeitsbeweis für die Annahme eines facultativen Porensystems. Zum mindesten wird der Vorgang dadurch mechanisch verständlich.

Alle diese zumeist am Peritoneum angestellten Versuche und Beobachtungen scheinen dem Lymphgefässsystem des Bauchfells, obwohl es mit den Lymphräumen aller Bauchgefässe breit communicirt, eine gewisse charakteristische Eigenthümlichkeit, eine Art Selbständigkeit zu sichern. Die Erfahrungen der pathologischen Anatomen decken sich damit. Wir wissen, dass der Krebs, mag er vom Magendarmtractus, oder vom Uteruskörper, oder vom Ovarium ausgehen, sobald er in breiterem Umfange die Serosa erreicht hat, einen eigenthümlichen Verbreitungsmodus annehmen kann, den wir mit allgemeiner Bauchfellcarcinose bezeichnen. Auch der Kliniker ist geneigt, das Bauchfell als Organ zu betrachten. Der Chirurg rechnet mit seiner Leistungsfähigkeit bei jedem operativen, intraabdominalen Eingriff. Ihm ist manche postoperative Exsudation eine rettende Secretion, z. B. bei der Bauchfelltuberculose. Diese Secretion „des heilenden Serum“ und die Resorption, auf welche Kraft wir ja oft bauen, werden anatomisch für mich

wenigstens durch den eigenartigen Bau des Lymphgefässsystems in eclatanter Weise erläutert.

Auch im Bereich der Beckenorgane hat die Serosa ihre eigenen Lymphbahnen (vergl. den Abschnitt über die Lymphbahnen der Blase! Fig. 1).

Injectionenversuche zur Anstellung histologischer Untersuchungen sind am Uterus systematisch nur von Leopold gemacht worden. Die von letzterem citirte Arbeit Lindgren's liegt mir im Original nicht vor. Das, was in den Referaten über Lindgren's Schilderung der Collum-Lymphbahnen gesagt wird, kann von mir nicht bestätigt werden.

Leopold untersuchte eine grosse Anzahl Uteri von Thieren (Schaf und Schwein) und menschliche Uteri der verschiedensten Jahresklassen. Die präformirten Lymphspalten der Serosa sind auf seinen Bildern stellenweise sehr schön dargestellt.

Die mikroskopischen Bilder injicirter Schnitte stammen zum grössten Theil von thierischem Material mit Ausnahme von Fig. 8 (Schnitt aus der Muscularis uteri mit Injection der Lymph- und Blutgefässe), welche eine gute Anschauung von der Gefässvertheilung in dem Myometrium gewährt.

Leopold's Anschauung, dass die Mucosa uteri ein flächenhaft ausgebreiteter Lymphsinus sei, in welchem nur Blutgefässe und Epithelschläuche eingebettet seien, bedarf einer Ergänzung.

Die Lehre vom adenoiden Bau des Stroma mucosae uteri, dessen Maschen einen äusserst variablen Gehalt an Wanderzellen aufweisen können, ist so fest in unserer Vorstellung geworden, dass ich darüber kein Wort zu verlieren brauche. Aber wir müssen Leopold's sinnreichen Gedanken ergänzen: „Die Mucosa uteri hat wie jede Lymphdrüse ein wohl entwickeltes System präformirter Lymphbahnen, welches an Reichhaltigkeit dem des Myometriums gleichkommt. Die übereinstimmenden Resultate von Sappey, Poirier und neuerdings von Bruhns haben dies zur Genüge erwiesen. Meine eigenen Befunde mit dem Aether-Campher-Farverfahren sollen in Wort und Bild die neuere Anschauung illustriren. Um die Schleimhautbahnen durch Injection zu füllen, muss man sehr flache Einstiche machen und mit ganz gleichmässigem Druck injiciren. Trotzdem gelingt es sehr selten, grössere Schleimhautflächen gleichmässig gut zu füllen. — Bald entsteht bei zu starkem Druck ein diffuses Extravasat, bald läuft die Injections- masse in die tiefen Bahnen und spritzt eher an den Schnittwunden

des Uterus und der Ligamenta im Strahl heraus, als dass sie in die Schleimhaut dränge. Ich habe eine Zeit lang jeden exstirpirten Uterus in allen Schichten injicirt, bis ich endlich die gewünschten Bilder in genügender Klarheit erhielt. Auch hier empfiehlt es sich, die Blutgefässe mit Contrastfarben (mit Carminleim oder -Gelatine) zu injiciren. Doch genügt auch die einfache Injection der Lymphbahnen, um letztere von den leeren Bluträumen zu unterscheiden. Wenn man übrigens die Schnitte mit Pikrocarmin-Pikrinsäure färbt und etwa 10 Minuten lang in wässriger Eosin-Lösung mit Orange-G-Zusatz nachbehandelt, erscheinen die Blutpfropfe in den braunrothen Gefässen leuchtend roth, jedenfalls different von den blau injicirten Lymphcanälen. Hämatoxylin-Tinction mit van Gieson-Nachfärbung empfiehlt sich nur bei sehr gesättigter Injectionsfarbe, weil doch die Leuchtkraft des Preussisch-Blau durch das Hämatoxylin beeinträchtigt wird.

Für das Studium und die Auswahl der mikroskopisch zu untersuchenden Stellen empfiehlt es sich, in jedem Falle eine genaue Lupenbetrachtung der Präparate vorzunehmen. Ferner untersuche ich regelmässig dünne Scheiben (Rasirmesserschnitte) nach Aufhellung in Xylol mit schwachen Objecten und erhalte gerade hierbei die schönsten Bilder, weil die Bahnen verschiedener übereinander liegender Schichten zugleich sichtbar werden, und somit das Bild zugleich körperliche Anschauung von den Raumverhältnissen gewährt. — Was nun zunächst bei oberflächlicher Lupenbetrachtung der injicirten Mucosa auffällt, ist die Differenz in der Weite der Corpus- und der Cervixlymphbahnen: im Corpus fand ich engmaschige Netze von breiten Lacunen, welche namentlich an den Knotenpunkten sich erweitern, in der Cervix dünne, am unaufgehellten Gewebe oft schwer sichtbare Canäle, deren Anordnung auch nicht so regelmässig ist, wie die in der Körperschleimhaut. Die Hauptsammelstämme laufen in den Mittelpfeilern der Plicae palmatae, und zu diesen strömen die feinen Netze aus den dazwischen liegenden, vertieften Nischen. Die von Poirier dargestellte, gleichmässige Netzformation, welche nach seinen schönen Abbildungen auch in der Cervix ohne Rücksicht auf die Architektonik der Plicae palmatae sich zeigt, scheint wohl nur bei Quecksilberinjection zu resultiren. Die Injection führt fast immer zu einer Ueberdehnung, wahrscheinlich bei dem schwer flüssigen Quecksilber (Poirier) mehr als bei den Aether-Campher-Lösungen.

Fig. 10 giebt die Lymphverhältnisse in der Cervical-

schleimhaut und der inneren Muskelschicht wieder. Die Lymphcapillaren — überall mit Endothel ausgekleidet — dringen bis an die Oberfläche und umspinnen die Drüsen mit zarten, sehr engen Lacunen, die zu einem Netz von oft bizarren Formen zusammenfliessen. An der Oberfläche wie an den Drüsen liegen diese feinen Lymphspalten dicht unter der Epithellage bzw. unter deren Grenzlamelle gegen das Stroma hin. Im Allgemeinen ist man erstaunt über die Engigkeit der Capillaren. Sie umgeben in ihren Anfangsnetzen die Drüsen und die oberflächlichen Gefässe (vergl. Fig. 10) und breiten sich dann in der Grenzschrift zwischen Mucosa und Muscularis interna in mehr längs, d. h. parallel zur Oberfläche verlaufenden Bahnen aus. Letztere (t. S. Lb. Fig. 10) sind bereits etwas an Umfang gewachsen und ergiessen sich in ziemlich starke, perforirende Canäle (p. im Lb. Fig. 10), welche die Muscularis durchbrechen und zu den grösseren Blutgefässen in der äusseren Muskelschicht hinstreben. Fig. 10 erläutert auch das Verhältniss der Lymphcapillaren zu den kleineren Gefässen, welches überall im Genital-System von der Vagina angefangen bis zum Ovarium und zur Tube — sei es in der Schleimhaut oder in der Muskelschicht — constant bleibt. Die Blutgefässe werden von den Lymphbahnen umspinnen, aber nicht eingeschidet. Auf dem Querschnitt kann sich das spiralig sich windende Lymphgefäss als sichelförmiges Lumen um das Blutgefäss herumlegen, aber eine Wandpartie des Blutgefässes bleibt stets in continuo mit dem Gewebe der Unterlage.

Die perforirenden Lymphgänge (p. im Lb. Fig. 10) streben im äusseren Drittel der Cervixwand entsprechend der Verlaufsrichtung der Uterinatheiläste schräg nach aufwärts zur Anheftungsstelle des Peritoneums, d. h. zur Austrittsstelle der Venae uterinae. Die Venen können je von 2 und mehr Lymphstämmen begleitet werden. —

Seitlich oberhalb des Scheidenansatzes an der Cervix mischen sich mit diesen cervicalen Bahnen ähnliche, welche von der angrenzenden Scheide im subvaginalen Gewebe stets in Begleitung der Venen heraufsteigen: „Die Lymphstrasse im subvaginalen Gewebe steht in breiter Communication mit dem Abflusssystem der Cervix. Das bekannte Bild Poirier's (die Lymphgefässe des Collum uteri) giebt eine gute Vorstellung von dem Reichthum der ausmündenden Lymphbahnen, welche sich an der Wurzel des breiten Ligaments in jene 5 oder mehr definitiven Stämme ergiessen, über deren Verlauf bereits oben zur Genüge berichtet worden ist.

Im Ganzen und Grossen bestimmt die Architektur der Musculatur den Verlauf der Lymphgefässe. Schon im Collum uteri zeigen die Lymphcapillaren das Bestreben gewissermaassen in jeder Etage nach allen Seiten Anastomosen zu bilden. Nur lassen sich nicht alle gleichmässig gut injiciren, offenbar wegen der Engigkeit der Röhren.

Um so schöner lässt sich diese Eigenschaft der Parenchymbahnen im Corpus uteri nachweisen (vergl. Fig. 7—11). In allen Schichten kann man auf Sagittal- wie Horizontal- oder Frontalschnitten das Lymphbahnsystem mit einem Netz vergleichen, in welchem freilich die Lacunen einer bestimmten Richtung als die weitesten und somit als die Hauptbahnen imponiren, d. h. die Lymphe hat in jeder Region ihre bestimmte Stromrichtung, aber Sicherheitsventile bestehen nach allen Seiten hin.

Die Betrachtung der durch die Zeichnungen wiedergegebenen Bilder illustriert ganz besonders den Vorzug der dicken Ueberschnitts- bei Xylolaufhellung gegenüber den dünnen Paraffin- oder Celloidinschnitten, welch' letztere zum Studium der Endothelverhältnisse unerlässlich sind. Die in Xylol aufgehellten Schnitte aus der Mittelschicht des Myometriums (Fig. 7) geben ohne die Nothwendigkeit weiterer Erklärungen die beste Vorstellung von der regelmässig netzförmigen Verbindung der intermusculären Lymphgefässe, welche zum grossen Theil unabhängig von den Blutgefässen verlaufen. Dabei bleibt freilich der Satz bestehen, dass die Blutgefässe (Venen) stets von Lymphbahnen begleitet sind.

Je grösser das Caliber des Blutgefässes, um so mehr nehmen auch die Lymphbahnen das Aussehen von dünnen Venen an, d. h. die grösseren Venen werden eben von 2 oder mehr Sammelröhren begleitet. Ausserdem bekommt man zuweilen an oder sogar in der Venenwand feine Lymphcapillaren zu Gesicht; endlich erinnere ich noch an die zahlreichen Bilder in der Nähe kleinerer und mittlerer Blutgefässe, welche als perivasculäre Sicheln seit v. Recklinghausen's Untersuchungen (Seelig) allgemein bekannt sind.

Mit den gröberen Lymphsträngen, welche das oben geschilderte Netz zwischen dem Geflecht der innig miteinander verwebten Muskelbalken bilden, stehen feine und feinste Lymphcapillaren in Verbindung, welche in die Muskelfelder, oder besser gesagt -Bündel eindringen und die kleinen Solitär fascikel umstricken. Dieselben — theoretisch von manchen Beobachtern nach Analogie der Blut-

capillaren angenommen, — konnte ich 1 Mal in der an die Mucosa corporis angrenzenden Schicht darstellen. Fig. 11 (nach einem Gefrierschnitt gezeichnet) zeigt mehrere Bildebenen übereinander, sodass man an zahlreichen Stellen die Capillaren als wirklich präformirte Röhren verfolgen kann. Der gefärbte Campher hat sich nur an den Wänden niedergeschlagen und wie eine Endothelbeize auch die Endothelien gezeichnet. Der Querschnitt dieser Röhren ist stets kreisrund und lässt an der Peripherie Kernzeichnung erkennen. In Folge der von der Mucosaseite her unter starkem Druck erfolgten Injection sind die Lymphbahnen der Schleimhaut und der submucösen Grenzschicht stark dilatirt (wohl zumeist Kunstproduct). Immerhin sind an allen von mir beobachteten Schnitten in der submucösen Grenzschicht wie in den äusseren, subserösen Muskellamellen die Parenchymbahnen stets weiter, als die Lacunen der übrigen Wandbestandtheile. In beiden Regionen können Krebse, wie wir sehen werden, zuweilen auffallend rasch vordringen. Wiederum dictirt der specifische Bau des Organs die Verlaufsrichtung der Parenchym-Lymphbahnen. In der lockeren, submucösen Schicht sowie im subserösen Gebiet steigen Lymphstrassen auf- und abwärts, sie verbinden sich gegenseitig durch Queranastomosen nach rechts und links, nach vorn und hinten. Die Verlaufsrichtung bleibt immer parallel der Oberfläche — sei es der Innenfläche — sei es der Aussenfläche des Organs. Die zwischen diesen beiden geräumigen Systemen sich ausbreitenden Muskelbahnen stellen dagegen perforirende Gänge dar, welche sich, radiär von innen nach aussen strebend, durch das Gewirr der Muskelbündel hindurchwinden und gewissermaassen senkrecht in die längsverlaufenden oberflächlichen Lacunen einmünden.

Ebenso müssen die aus der Mucosa corporis sich sammelnden Bahnen senkrecht zu den Längsbahnen der submucösen Grenzschicht verlaufen, da ihnen in dem adenoiden Schleimhautstroma nur von den Uterindrüsen die Verlaufsrichtung zudiktirt wird. An der Oberfläche des Cavum uteri beginnen diese feinsten, ausserordentlich zahlreichen Canäle als feines Gewirr, dessen Maschen sehr eng sind; die senkrecht zur Schleimhautoberfläche in die Tiefe ziehenden Röhren werden um so geräumiger, je mehr sie sich der submucösen Schicht nähern. Im Uebrigen ist die Zahl der Anastomosen in der Schleimhaut erstaunlich gross; man kann auch hier im Allgemeinen nur sagen, dass die Lymphcapillaren die Uterindrüsen wie die Gefässe umspinnen, ohne letztere einzuscheiden. Fig. 9a

und b zeigt im Sagittal- wie im Frontalschnitt den Reichthum der Schleimhautlymphnetze. Fig. 9a lässt zugleich erkennen, dass die Bahnen sich an der Oberfläche dicht unter dem Epithel, oder vielleicht in demselben frei öffnen. Hier tritt mit Leichtigkeit Injectionsmasse aus, hier wird andererseits ebenso leicht Inhalt des Cavum uteri eingesogen werden können. Fig. 8a demonstriert ferner den Zusammenhang der Muskelbahnen des Uterus mit dem feinen Serosa-Lymphnetz. Die Serosa besitzt also wie überall so auch auf dem Uterus ihre eigenen Lymphcapillaren, welche an zahlreichen Stellen an der abdominalen Oberfläche frei enden. Welche Wichtigkeit dieser Umstand für das Verständniss manches puerperalen Infectionsverlaufes hat, liegt wohl klar auf der Hand.

Die bereits von Leopold geschilderten ampullären Räume, welche in den Verlauf der Serosalymphbahnen unmittelbar unter der Oberfläche in regelmässigem Abstand von einander eingeschaltet sind, fand ich in allen dünnen Schnitten.

Noch einige Bemerkungen zu der sogenannten Gefässschicht, welche von Seelig an der Grenze zwischen dem mittleren und äusseren Drittel des Myometriums angenommen wird. Eine constante Gefässschicht fand ich zunächst nur an der Seitenkante des Uterus entsprechend dem Ansatz des breiten Ligamentes und auch hier vorwiegend an oder in der äusseren Muskelschicht, nicht aber ausschliesslich innerhalb der letzteren. Namentlich in der Cervix ist dieses Verhalten constant und von Waldeyer (Das Becken, Fig. 80 b) in schöner Weise zur Darstellung gebracht. Siehe auch meine Fig. 22, welche nach einem Horizontalschnitt durch den Uterus etwas über der Höhe des inneren Muttermundes angefertigt ist.

Die parenchymatösen Lymphbahnen der Tube.

Die Lymphbahnen der Tube wurden bisher sehr stiefmütterlich behandelt. Die Tube ist in der That ausserordentlich schwer zu injiciren. Wie die Blutextravasate bei Stieltorsion oder Gefässarrosion bei Tubargravidität, so sucht die Injectionsmasse in dem subserösen und submucösen Stratum sich zerstörend ihren Weg, ohne in die engen Capillaren einzudringen; trotz zahlreicher Versuche erhält man immer und immer wieder dasselbe Bild, nämlich auf Querschnitten zwei dicke Ringe von Injectionsmasse, welche nach innen den Schleimhautcylinder, nach aussen die Serosa von der Muscularis abheben. Die Schichten liegen also von

aussen nach innen betrachtet, wie folgt: 1. Serosa, 2. Farbextravasat, 3. Muscularis, 4. Farbextravasat, 5. Mucosa! Dennoch gelang es mir, die Tuba Fallopii an Kinderleichen 48 Stunden post mortem von einem Portioeinstich aus zu injiciren (vergl. Fig. 3). Bei Erwachsenen führte der flache Einstich von der Mucosa der Tubenampulle aus zum Ziel. Eine Betrachtung des Querschnitts Fig. 12 (Lupenzeichnung) lehrt, dass die Lymphbahnen als relativ weite Lakunen im Innern der Tubenfalten beginnen. Sie umgeben auf Querschnitten sichelförmig die Blutgefässe und können bei Lymphstauung (z. B. bei Tubargravidität) die letzteren soweit umfliessen, dass die Blutgefässe halbinselförmig (auf Querschnitten) in das Lumen der Lymphgefässe hineinragen bzw. vom Innern der Lymphräume aus betrachtet in der Wand derselben als randständige Leisten sich geltend machen. An Flachschnitten, welche die Basis der grossen Tubenfalten treffen, sieht man ziemlich regelmässig die Sammelröhren dieser centralen Faltenbahnen (s. Fig. 13) eine Strecke weit längs verlaufend mit den Blutgefässen alterniren, sodass man oft 3 bis 4 mal hintereinander Arterie — Vene — Lymphgefäss abzählen kann. Im Gegensatz zu diesen ziemlich weiten Röhren sind die Muskelbahnen eng und lassen schwer den Endothelnachweis führen. Gerade hier tritt mit Vorliebe die Injectionsmasse aus den präformirten Bahnen zerstörend heraus. Natürlich finden sich auch in der Muscularis und zwar am antimesometralen, wie ganz besonders am mesometralen Rand der Tube stärkere, an kleine Venen erinnernde Lymphbahnen. Das aus dem vereinigten Schleimhaut- und Muskulaturlymphnetz hervorgehende, oberflächliche System in der Subserosa und Serosa ist wiederum sehr reich und zierlich gegliedert und gleicht im kleinen der betreffenden Schicht des Uterus (Vergl. Fig. 1 bis 3). Wenn man unter der Lupe die Serosa der injicirten Tube an einer Stelle einschneidet und abzieht, so bleibt ein Theil der Bahnen an der Serosa, ein anderer Theil auf der Muscularis haften, und man sieht beim weiteren Ablösen der Serosa kleine Stämmchen, welche sich in die Muscularis perforirend hineinsenken, zwischen Serosa und Muscularis sich anspannen, sowohl an der Vorder- wie an der Hinterfläche der Tube. Die subserösen Lymphnetze beider Flächen reichen sich über die freie Tubenkante die Hand — sie gehen in einander über. Nach der Mesosalpinx zu vereinigen sich die zahlreichen kleinen Bahnen der Pars isthmica und ampullaris in 2, seltener in 3 mit Klappen versehene, abführende Stämmchen, welche mit dem Plexus ovaricus

zu den Lgl. lumbales superiores ziehen. Der Tubenmund mit seinem Fimbrienkranz entsendet ein eigenes Gefäss. Polano fand auf der Fimbria ovarica tubae bei Einstichen vom Ovarium aus eine Schleifenbahn. — Ich selbst sah auch bei Tubenjectionen Communicationsstränge an dieser Fimbria entlang ziehen.

Die Pars keratina tubae führt ihre Lymphe zum Uterushorn ab, von dem aus sie auch gewöhnlich sich mit injiciren lässt.

Die Parenchymbahnen des Ovarium sind in letzter Zeit von Polano ausführlich geschildert worden, und kann ich mich dementsprechend kurz fassen. Ich selbst habe nur wenig Ovarien injicirt und kann fast in allen Punkten die Erfahrungen Polano's, z. Th. auch die von Sappey bestätigen. (Bruhns berührt nur die ableitenden Stämme des Eierstocks.)

In der Albuginea fand ich feinste Lymphspalten nur an Stellen, von welchen in Folge von früherer Follikelberstung das feste Gefüge der äusseren, weissen Schicht auseinandergefasert war. — Bei Ovarialcysten, welche vom Innern aus entstehend die parenchymatöse Schicht zu einer papierdünnen Hülle ausgezerrt hatten, sah ich am Ovarialpol zuweilen zierliche Oberflächennetze; wahrscheinlich schimmerten hier die tieferen Lymphgänge durch die verdünnte Albuginea durch. In der Zona parenchymatosa liegt der eigentliche Ursprung der feinsten Lymphspalten. Wie überall in den weiblichen Genitalorganen so konnte auch im Ovarium von keinem der neueren Untersucher ein System endothelloser Saftspalten nachgewiesen werden. Nach den übereinstimmenden Erfahrungen Aller sind bereits die feinsten Lymphcapillaren mit Endothel ausgekleidete, präformirte Röhren, welche aber erst am wachsenden Follikel für die Injection nachweisbar werden. An jedem injicirten Ovarium erkennt man unter der farblosen, weissglänzenden Albuginea die Zone der Primärfollikel, in welche nur wenig Bahnen sich hineinerstrecken. Die Primärfollikel scheinen noch keine Lymphcapillaren zu besitzen.

In der tieferen parenchymatösen Schicht, in welcher sich die wachsenden Follikel finden, umspinnen die Lymphbahnen die Parenchymbestandtheile mit feinen Netzen, welche schon Sappey in klassischer Weise beschreibt. In der That gewährt die Lupenbetrachtung injicirter Follikel von ihrer Innenfläche aus die zierlichsten Bilder reich verzweigter Netze. Ich selbst konnte an dünnen Schnitten die feinsten Ausläufer dieser Netze bis in die

Tunica interna einiger Follikel verfolgen. 3—4 Systeme von anastomosirenden Lymphgängen liegen nach aussen von der Tunica interna und externa in immer weiteren Kreisbogen übereinander. Die Maschen werden nach aussen hin weitläufiger, und an der Grenze der Zona parenchymatosa gegen die Zona vascularis gehen daraus zahlreiche lacunäre Lymphbahnen hervor, welche nun entsprechend dem allgemeinen Gefässverlauf radiär zum Hilus ovarii streben.

In ähnlicher Weise wie die wachsenden Follikel werden auch die Graaf'schen Follikel, die Corpora lutea und deren Endproducte, die Corpora fibrosa (albicantia) von den Lymphcapillaren umspunnen, welche sogar in den bindegewebigen Kern der Corpora lutea und fibrosa vordringen. Nur das Stigma des sprungreifen Follikels verliert nach His, Waldeyer, Polano seine sämtlichen Blut- und Lymphgefässe. Der Follikel hebt gewissermaassen an der Kuppe seine nackte Tunica int. aus dem Gefässgebiet heraus über die Oberfläche.

In der Zona vasculosa bekommen die Lymphbahnen mit dem Wachsen ihres Lumens ausser der Endothelauskleidung eine festere bindegewebige Wand und etwa im letzten Drittel ihres intraovariellen Verlaufes eine Muscularis nach Art zarter Venen. Die ersten Klappen finden sich schon im Hilus selbst, meist erst ausserhalb des Ovariums, im Mesovarium.

Von dem Reichthum des Eierstocks an Lymphbahnen macht man sich eine Vorstellung, wenn man auf fortlaufenden Querschnitten durch das injicirte Organ in jeder Schnittfläche zahlreiche blaue Spalten und Canäle verfolgt.

Die Lymphräume bleiben gerade in der Markschiebt des Ovariums relativ selbstständig ohne Anlehnung an die kräftigeren Blutgefässe, und nur spärliche, dünne, sichelförmige Lumina winden sich durch die dichten Blutgefässknäuel. Erst kurz vor dem Hilus, wo alle Gefässe — ob Blut, ob Lymphe führend — zusammendrängen, sieht man die Lymphbahnen gewöhnlich den Venen an einer Seite flankirend anliegen. Es macht den Eindruck, als ob einige dieser injicirten Lacunen spiralig um die Venen herumlaufen.

So leicht die Injection von Kinderovarien aus die ableitenden Bahnen füllt, so schwer ist es andererseits, an solchen Kinderovarien trotz Injection die Entstehung der Lymphräume zu studiren. Jedenfalls sind auch hier präformirte Räume nachweisbar. In der Zone der Eiballen bilden dieselben ein mehr radiär verlaufendes

System gleichmässig enger Röhren, welche sich durch die Parenchymbestandtheile winden und schlängeln, um in der Tiefe an der Grenze gegen die gefässreiche Markschicht in Beziehung zu relativ weiten, ampullären Sammelräumen zu treten, aus welchen dann die ableitenden Stämme hervorgehen. Von letzteren erwähnten wir bereits, dass sie (nach Bruhns) 6 bis 9 an der Zahl aus dem Hilus ovarii treten und im freien Rande des Ligam. ovario-pelvicum mit den Vasa spermatica zu den L. gl. lumbales superiores ziehen. Die von Poirier gefundene Anastomose zwischen Ovarial- und Corpusbahnen am V. Lumbalwirbel konnte auch ich nicht nachweisen. Die von Polano vom Ovarium aus injicirten Lymphcanäle in der Fimbria ovarica und im Ligamentum ovarii medianum konnte ich von der Tube bzw. vom Uterus her, also in umgekehrter Richtung, darstellen, so dass ihr Bestand wohl gesichert ist. Auch hier stehen die Parenchymbahnen unter dem Gesetz weitgehender Anastomosen.

Die vorzüglichen Abbildungen Polano's machen es unnöthig, meine eigenen Präparate abzubilden, da ich Wiederholungen vermeiden möchte. (Die abführenden Stämme siehe auf Fig. 2!)

Die ableitenden Bahnen und die zugehörigen Lymphdrüsen.

Während die parenchymatösen Bahnen also miteinander zahlreiche Anastomosen bilden, bleiben die abführenden Stämme aller Regionen bis zur 1. Etappe der zugehörigen Lymphdrüsen unverzweigt. Das charakteristische Aussehen der abführenden Stämme, welches man treffend mit „Rosenkranzform“ bezeichnet hat, ist verursacht durch die zahlreichen Klappen, welche nach Art der Venenklappen in regelmässigen Zwischenräumen das Lumen der Canäle unterbrechen und das Kaliber von aussen her eingeschnürt erscheinen lassen. Die Klappen öffnen sich nach dem Venensystem zu. Zwischen je zwei aufeinander folgenden Klappen buchtet sich das Lymphgefäss seitlich aus. Diese Aussackungen lassen sich eben mit den Perlen eines Rosenkranzes vergleichen. Bringt man nach gelungener Injection eines Uterus das herausgeschnittene breite Ligament aufgeheilt in Xylol unter eine Lupe, so zeigen sich die Wandverhältnisse der im Ligament verlaufenden Stämme. Die Zeichnung der Lymphgefässcontouren durch die Aetherkampferfarbe ist so zierlich, dass der beste Zeichner kaum im Stande ist, sie wiederzugeben. In den mikroskopischen Schnitten gleichen die ableitenden Bahnen den kleinen Venen. Nur haben sie viel zahl-

reichere Klappen und eine schwächere Tunica media, die oft den Eindruck macht, als wäre sie zerrissen und gewissermassen liederlich angeordnet. Der Grund dafür liegt in einer Eigenthümlichkeit, welche Flemming aufgeklärt hat. Statt einer geschlossenen Media können zahlreiche Lymphstämme nur ein Geflecht verzweigter, glatter Muskelfasern aufweisen, zwischen welchen in der Aufsicht leere Lücken ausgespart bleiben. Flemming konnte aus der Media solcher Lymphgefässe verzweigte glatte Muskelfasern mit 2 oder mehr Zipfeln isoliren.

In einiger Entfernung vom seitlichen Rande des Uterus zeigen sich zuweilen im aufgehellten Ligam. latum kleine gelblichbraune Knötchen, welche mit der blauen Injectionsmasse mehr oder weniger wie gesprenkelt sind; man findet sie im Verlauf der Vasa uterina an der Vereinigungsstelle von breitem Ligament und Parametrium. Es sind dies die in letzter Zeit vielgenannten parametranen Lymphdrüsen, die ich als *Noduli lymphatici parametranes* bezeichnen möchte. Die Verschiedenheit im Bau dieser Lymphknoten, welche von Mohnkorn- bis zu Haselnussgrösse schwanken, erhellt aus Fig. 17 und 18. In Fig. 17 enthält das Parametrium, soweit es am Uterus geblieben ist, jederseits nur eine Drüse, welche aber mikroskopisch bereits dem Aussehen einer richtigen Lymphoglandula nahek kommt. Beiderseits waren fast auf allen untersuchten Schnitten 3 bis 5 Randfollikel neben zahlreichen Marksträngen zu erkennen. In Fig. 18 erscheinen im Verlauf der Art. uterina ausser den zwei zugehörigen Venen, von denen die vordere durch einen Thrombus verschlossen ist, und einem sympathischen Ganglion g mit Nerv 3 kleine *Noduli lymphatici* von einfachstem Bau. Es sind adenoide Gewebsherde ohne besondere Differenzirung, welche wie Pilze ins Lumen der Lymphbahnen ragen, ohne dasselbe zu unterbrechen. Eine Besonderheit zeigt nur das äusserste der drei Knötchen, indem bei diesem das zugehörige Lymphgefäss an einer Wandseite auch von aussen her mit adenoider Substanz bekleidet wird. Das Vas afferens spaltet sich gewissermassen, um das Lymphknötchen zu umfassen; dabei löst sich aber die vordere Wand auch nach aussen vom Lymphsinus in einen adenoiden Mantelsaum auf. Der Lymphknoten erinnert zwar noch sehr an die einfachen *Noduli lymph.* z. B. des Darmes oder der Respirations-schleimhaut, leitet aber durch Grösse und Andeutung besonderer Randfollikel zu den wahren Lymphdrüsen über. Die nächste Stufe der Entwicklung würde dann durch die Drüsen in Fig. 17 markirt.

Vielleicht lohnt es sich, hier Einiges über die Entwicklung der Lymphdrüsen einzuflechten. Schon früher, gelegentlich meiner Dermoidstudien, war mir der charakteristische Unterschied in dem Verhalten der Noduli lymph. zu den fertigen Lymphoglandulae aufgefallen. Die ersteren liegen dem Lumen der Lymphgefäße seitlich an, die letzteren unterbrechen wie ein Sieb die Lymphbahn. Die einen sind für den Lymphstrom so gut wie keine Hindernisse, da er sie nur an der Oberfläche benetzt, während die wahren Lymphdrüsen als richtige Stromunterbrecher die Lymphe filtriren, indem sie den Strom durch eine Art Wundergeflecht leiten. Gulland und Saxer, welche die Entstehung der Lymphdrüsen bei Thierembryonen verfolgten, geben an, dass die primären Lymphspalten von dem zur Lymphdrüse werdenden, adenoiden Knoten genau so eingestülpt werden, wie die Harncanälchen durch einen embryonalen Nierenknäuel. Oeffnet sich die Gefässwand an der dem Knoten anliegenden Partie, so ragt der adenoide Keim wie ein Pilz ins Lumen des Lymphgefässes, und wir haben das einfache Verhältniss der Noduli lymphatici vor uns. Dass sich diese Noduli ohne selbstständigen Sinus nicht nur im Parametrium der Neugeborenen finden, sondern auch in dem der Erwachsenen erhalten bleiben, ist nichts Wunderbares, zumal doch der Körper an zahlreichen Schleimhautstellen dieselben Primärfollikel zeigt. Vielleicht geben solche Knötchen, die man auch in der Nähe der grossen Lymphdrüsen findet, die Erklärung für die Regeneration von Lymphdrüsen nach entzündlicher Verödung der Nachbardrüsen ab. Drüsenneubildung bedeutet dann nur ein Auswachsen schon vorhandener Anlagen.

Das Verhältniss des Primärfollikels zum Lymphgefäss bleibt ziemlich lange bestehen. Erst spät wachsen im embryonalen Leben in dem primitiven Randsinus, d. i. der Spaltraum zwischen Follikelsubstanz und freier Gefässwand, adenoide Bälkchen und Stränge von der Follikeloberfläche zur Gefässwand hinüber: „Der Sinus wird gegliedert“. Der dem Sinus abgekehrte Pol lässt die Blutgefässe aus- und eintreten. Lassen wir in unserer Phantasie den Lymphknoten wachsen und sich mit immer neu entstehendem Gewebe in den Sinus vorbuchten, so werden wir endlich auf das Schema Fig. 19 kommen, welches die natürlichen Verhältnisse einer kleinen Beckenlymphdrüse wiedergiebt. Die aufgeblätherte, gedehnte Gefässwand der ersten Anlage ist nun zur Drüsenkapsel geworden, welche die schon ansehnliche Drüse bis zum Hilus umfasst. Am convexen Pol mündet das Vas afferens — nun ein kleines Gefäss

im Verhältniss zu dem inzwischen mächtig gedehnten Randsinus. Aus dem concaven Drüsenhilus des bohnenförmigen adenoiden Körpers tritt das Vas efferens heraus zugleich mit der Vene; an derselben Stelle strebt die Hauptarterie hinein, um sich im adenoiden Gewebe zu verzweigen (im Schema No. 19 nicht ausgezeichnet!). Auch die Kapsel mit den Trabekeln hat ihre Blutgefässe, welche aber vom convexen Pol mit dem Vas afferens herantreten. Es sind die Vasa nutricia der zur Drüsenkapsel gedehnten Gefässwand. Die von der Kapsel ausstrahlenden Stütztrabekel sind beim Menschen gewöhnlich sehr zart; sie theilen das eigentliche adenoide Parenchymgewebe in Randknötchen (Randfollikel) und bizarr gewundene centrale Balken, die sogenannten Markstränge. Denkt man sich nun zwischen adenoidem Parenchymgewebe und den Trabekelsepten überall einen lymphgefüllten Spaltraum = den Sinus in „seinen Ausläufern“, so erhellt daraus, dass in jedem Theil der Drüse stets die adenoide Substanz vom Lymphsinus umflossen ist, welcher letzterer wieder von den Trabekeln bzw. der Kapsel begrenzt wird.

Das Parenchymgewebe zeichnet sich durch ein sehr feines Reticulum aus, in dessen Maschen zahlreiche Lymphzellen der verschiedensten Werthigkeit lagern. Von der Oberfläche der Follikel- und Markstränge spannen sich durch den Sinus zu den Trabekeln und zur Kapsel reticuläre Fasern mit groben Maschenräumen, in welchen bald viel, bald wenig Wanderzellen lagern. Da der Sinus der erweiterte Raum eines Lymphgefässes ist, so leuchtet ohne Weiteres ein, dass seine Wände überall auf dem Reticulum und den Parenchymgrenzflächen mit Endothel bekleidet sind. Ebenso versteht man aus der Entstehungsgeschichte, dass die Drüsenkapsel eigene, ernährende Blutgefässe und glatte Muskelfasern enthält. Auch Nervenfasern habe ich in der Kapsel verlaufen sehen. Im Uebrigen treten die Blutgefässe (und Nervenfasern) für das adenoide Gewebe dort ein, wo der ganze Drüsencomplex primär entstand, also am Hilus, und sie verbreiten sich in zierlichen Bäumchen und Netzen im Innern der Markstränge und Randfollikel.

So lange eine Lymphdrüse functionsfähig ist, erscheinen in den Randfollikeln die sogenannten Flemming'schen Keimcentren, d. h. hellere Bezirke mit zahlreichen, in Mitose befindlichen grossen Zellen. Daneben finden sich Phagocyten, Wanderzellen und Degenerationsproducte, die sogenannten tingiblen Körper Flemming's. Die Keimcentren bleiben für gewöhnlich auf die Randfollikel beschränkt; sie sind eine Functionserscheinung und sind der Ausdruck

für die Leukocytenvermehrung, welche in der wahren Lymphoglandula das Drüsensecret darstellt. Es kann hier nicht meine Aufgabe sein, die Lehre von den Lymphdrüsen und -Bahnen im Allgemeinen zu erschöpfen. Ich muss mich auf das Nothwendige beschränken, verweise aber auf die Angaben in Kölliker's Mikroskopischer Anatomie, II, 2, S. 539, auf die Arbeiten von His (Zeitschr. für wissenschaftl. Zoologie, XI—XV), H. Frey, Untersuchungen über die Lymphdrüsen, Leipzig 1861, Flemming, l. c., und Kölliker's Handbuch der Gewebelehre (s. oben).

II. Welche Veränderungen treten im Lymphsystem des Uterus auf bei der Entstehung und dem Fortschreiten eines malignen Tumors in utero?

Zur historischen Entwicklung dieser Frage sei nur kurz daran erinnert, dass Seelig an dem Institut von v. Recklinghausen als der Erste nach Abel und Landau exact das Fortschreiten von Carcinommassen in den Lymphbahnen unserer Region festgestellt hat. Seine Beobachtungen bezogen sich im Wesentlichen auf vorgeschrittene Collumkrebse und sind neuerdings von v. Franqué und Puppel zwar in ihren Schlussfolgerungen angegriffen, anatomisch jedoch bestätigt worden. Seelig's Befunde hat wohl jeder Beobachter gemacht, und so findet man auch in allen neueren Arbeiten über das Uteruscarcinom Angaben über Carcinomthromben in den Lymphbahnen. Mackenrodt's, Russel's, Cullen's Befunde von carcinomatösen Lymphthromben in den Ligamenten, Veit's sprungweise Infiltration der Lymphbahnen im Ligam. latum machten auf die Betheiligung der ableitenden Bahnen beim Krebs der Gebärmutter von neuem aufmerksam, nachdem schon vorher Wagner, Cruveilhier, Blau und Dybowski, sowie Williams, Dittrich und manch Anderer sich mit dem Schicksal der regionären Drüsen bei Carcinoma uteri beschäftigt hatten. Seither hat das Interesse an der Frage der Heilbarkeit des Gebärmutterkrebses die Kliniken fort und fort zu anatomisch-histologischen Studien angeregt. Zwar stellte Winter fest, dass die Recidive nach Krebsoperationen sich zu $\frac{3}{4}$ local einstellen und nur in Ausnahmefällen die Drüsen allein betreffen; indessen haben aber Ries, Rumpf, Clark, Kelly — von der Ansicht ausgehend, dass die regionären

Drüsen frühzeitig befallen würden — wie bekannt das modernste Verfahren: die radicale Entfernung der krebsigen Gebärmutter im Zusammenhange mit den regionären Drüsen, angestrebt. Peiser's Untersuchungen und Schlussfolgerungen mussten die Operateure in dieser Richtung bestärken. Wertheim und zahlreiche moderne Operateure in Europa und Amerika haben den Gedanken aufgegriffen und ausgebaut, so dass bereits jetzt die Fachliteratur aller Sprachen von einschlägigen Arbeiten erfüllt ist und kaum ein Congress von Fachgenossen vorübergeht, ohne eine Debatte über die Krebsfrage zu zeitigen.

Für unsere im Wesentlichen anatomische Fragestellung kann ich die vorwiegend operativ-klinischen Fragen zum grössten Theil übergehen und nur diejenigen Punkte herausgreifen, welche auf den Beckenbefund an der Lebenden und Todten Bezug haben. Dank der grossen Wichtigkeit, welche unser Thema für die operative Therapie besitzt, sind seit Wertheim's Vorgang systematische Untersuchungen der Beckendrüsen zur Zeit wohl an jeder Frauenklinik im Gange, sei es, dass das Material bei der Operation, sei es, dass es bei der Section gewonnen wurde. Ich erinnere nur an die Mittheilungen von Ries, Cullen, Wertheim, R. König, Funke, v. Franqué, Wuelfing, Broese, Kermauner und Lameris, Kroemer, Olshausen (Oehlecker), H. W. Freund, Gellhorn, Tiburtius, Kleinhans, Kundrat, Kroenig, Glockner, R. Meyer, Falkner und die Arbeiten der Belgier und Franzosen, sowie der Amerikaner.

Trotz der Verschiedenheit der Meinungen haben die Untersuchungen schon jetzt bemerkenswerthe Resultate gezeitigt, welche ich hervorheben möchte:

Zunächst erscheinen die Zahlen, welche von den pathologischen Anatomen über die Häufigkeit der regionären Drüsen - Metastasen aufgestellt worden sind, zum mindesten nicht einwandfrei. Blau fand $33\frac{1}{3}$ pCt., Dybowski 28 pCt., Wagner 50 pCt., Dittrich 40 pCt., Russel 44 pCt., Williams 72 pCt., Cruveilhier sah nahezu in allen Fällen inficirte Drüsen bei Carcinoma uteri. Abgesehen von der Verschiedenheit des Materials fällt bei diesen so differirenden Resultaten das Fehlen der mikroskopischen Serienuntersuchung ins Gewicht. Wir wissen durch unsere eigenen Untersuchungen, dass die makroskopische Diagnose der krebsigen Drüsenschwellung ohne mikroskopische Bestätigung täuschen kann. Eine Beweisführung auf Grund obiger Statistiken ist also unmöglich.

— Die Ergebnisse der Kliniker, welche nur die bei der Operation entfernten Drüsen berücksichtigen, sind auch nicht einwandsfrei, da die Operation keine absolute Garantie für die Entfernung alles Kranken giebt, vielmehr die Section der nach der Operation gestorbenen Frauen oft die palliative Natur des sogenannten Radicalverfahrens nachweisen lässt (Kroemer, Gellhorn, Oehlecker). **Das Material des Klinikers ist für den anatomischen Standpunkt ohne Bedeutung, soweit die Resultate nicht durch die Section erhärtet sind. Das Material des pathologischen Anatomen kann dem Kliniker nicht Auskunft geben, wann die Carcinominvasion erfolgt.**

Immerhin bleibt bemerkenswerth, dass die neueren Untersucher unter den pathologischen Anatomen selbst bei vorgeschrittenen, inoperablen Carcinomen der Gebärmutter die Häufigkeit der Drüsenbetheiligung nicht über 35 pCt. annehmen. Riechelmann (1900) fand bei 86 Sectionen (darunter waren nur 14 operable Fälle von Carcinoma uteri) 30 Mal die regionären Drüsen befallen = 35 pCt.! Ja Cullen, dessen bekanntes Werk über den Uteruskrebs zur Zeit die umfassendste Monographie auf diesem Gebiete darstellt, steht nicht an, auf Grund sorgfältiger mikroskopischer Untersuchungen den Satz aufzustellen, dass der Krebs der Gebärmutter, in welchem Theile derselben er auch sitzen mag, erst sehr spät und nach dem Befallensein der Parametrien die regionären Drüsen inficire, so dass unter dem Einfluss seiner Resultate Clark und Kelly die Drüsen-suche bereits aufgegeben haben. Es nähern sich die Zahlen, welche durch die Untersuchung der operativ entfernten Drüsen festgestellt werden, immer mehr den von der Mehrzahl der pathologischen Anatomen gefundenen Werthen, und es scheint das Verhältniss von $33\frac{1}{3}$ pCt. Drüseninfection auf alle Carcinomarten berechnet richtig zu sein. Daher forderte ich, angeregt durch ähnliche Bestrebungen der v. Rosthorn'schen Klinik, die genaue anatomische Untersuchung der einzelnen, mit Carcinominfection der regionären Drüsen einhergehenden Tumoren, um diejenigen Geschwulstarten kennen zu lernen, welche zur frühzeitigen Infection der Drüsen neigen.

Die bisher gewonnenen Resultate und Schlussfolgerungen gab ich in einem kurzen Aufsatz in der Monatsschrift, Bd. XVIII, H. 5 bekannt und habe ich die Genugthuung, dass schon jetzt von Schauta Vieles von meinen Erfahrungen bestätigt wird.

Kehren wir nun zum speciellen Thema zurück, so erübrigt es sich zunächst für mich, in der folgenden Betrachtung die Tumoren

der Bindegewebsklasse (die Sarkome und Endotheliome) von den Epitheliomen (den Carcinomen) zu trennen. Die Verbreitung bindegewebiger, wie epithelialer Geschwülste geschieht in gleicher Weise auf dem Lymph- wie auf dem Blutwege. Nur ist beim Sarkom der Verlauf ein rascherer, der Eintritt der Tumorelemente ins Blut erfolgt meist direct ohne den Umweg über das Lymphgefäßsystem, so dass das klinische Bild mehr von den Blutmetastasen beherrscht wird. Jedenfalls machen die Sarkome (Endotheliome) ebenso wie die Carcinome Lymphdrüsenmetastasen — nach unserer Erfahrung sogar früher als die Carcinome — und der Krebs bricht andererseits auch in Blutgefäße ein. (Goldmann, v. Recklinghausen). Gleich anderen Untersuchern (v. Franqué) fand ich die Gefäßarrosion beim Uteruscarcinom meist nur in Venen und local im Primärtumor. Die entfernten Thromben der Vena uterina im breiten Ligament (s. Fig. 18) sind meistens frei von Carcinom. Alle Tumoren des Uterus wachsen zunächst vom Orte ihres Entstehens aus continuirlich in den endothellosen Bindegewebs-Interstitien. Wird dabei ein präformirter Hohlraum eröffnet, so schiebt sich der Tumor in diesem nach dem Ort des geringsten Widerstandes vor. Geschwülste, welche nur in den Lymphbahnen vordringen, giebt es wahrscheinlich nicht. Man findet in allen, selbst vorgeschrittenen Tumoren jeder Art offene, secretgefüllte, vielleicht neugebildete Lymphcapillaren meist im Zustande der Stauung. Die Richtung der Lymphgefäße in utero richtet sich nach dem Gefüge der Muskelbündel. Das Vordringen der Tumoren hält sich nur ganz im Groben an diese Structur, insofern es in den lockeren, gefäßreichen Regionen rascher sich vollzieht.

Die Vaginalkrebse der Portio, welche nahe dem Fornix ihren primären Sitz haben, dringen gern im äusseren Drittel der Muscularis cervicis nach oben. Portiocarcinome dagegen, welche nahe dem Muttermunde entstehen, wählen den Schleimhautweg aufwärts und zerstören die Collumwand in Form eines sich nach oben verjüngenden Trichters. Merkwürdiger Weise lassen echte Plattenepithelkrebse, welche auf der vollen Portiofläche auskeimen, häufig genug die Mucosa cervicis intact, sie infiltriren zuweilen die volle Dicke des Gebärmutterhalses im ganzen Umkreis, bis auf die Submucosa, so dass beim Zerfall im Stadium der Kraterbildung das intacte Rohr der Cervixschleimhaut wie ein starrer Cylinder in der gähnenden Krebshöhle stehen bleibt.

Cervixkrebse dringen von vornherein seitlich nach den Parametrien vor, denn hier bahnt ihnen ja die Menge der austretenden Blut- und Lymphgefäße den Weg.

Der Krebs der Körperschleimhaut hat erst das dicke Netz der relativ engen, complicirt gebauten Corpus-Lymphspalten zu überwinden und neigt dann noch eher zur Infection der Serosalymphbahnen (s. Fig. 8). Die Lymphlakunen im äusseren Theil der Muscularis (Zona subserosa) sind in der That, wie Seelig betont, weiter als die übrigen Parenchymbahnen, und so werden Krebse, welche diese Schicht erreicht haben, hier am raschesten vordringen. Collumkrebse z. B. erreichen hier ihren höchsten Stand (s. Fig. 17) bis hoch in's Corpus hinauf, und selbst Körperkrebse wandern hier abwärts in die Cervixwand hinein. Fügen wir noch hinzu, dass auch der innere Muttermund keine absolute Grenze für die Corpus- und Cervix-Carcinome bildet, sondern dass diese Linie sowohl aufwie abwärts überschritten werden kann, so werden wir uns die bunten Variationen in den einzelnen Fällen vergegenwärtigen. Das Speculumbild der Portio, das Tastgefühl bei der bimanuellen Untersuchung, ja sogar die Excochleation kann uns in manchen Fällen im Unklaren lassen über die Ausbreitungsart und Grenzen des Tumors.

Im Wesentlichen wachsen also die Tumoren continuirlich, die Sarkome (Endotheliome) freilich mit unregelmässig ausstrahlenden, oft weit vorgeschobenen Ausläufern. Die Thatsache des continuirlichen Wachstums hat für mich nichts Wunderbares; denn das Fortschreiten der Geschwulstzellen bedeutet kein loses Wandern, sondern ein beständiges Sichvermehrten, ein Fortwachsen in dem Sinne, dass Zelle sich an Zelle reiht und mit den Nachbarn sowie mit dem Geschwulstboden festen Contact sucht. Je geringer der Widerstand in der Umgebung, um so üppiger wird der Tumor in dieser Richtung vorwuchern, natürlich am raschesten in den präformirten Lymphspalten. In ihnen finden die Krebszellen genügend Nahrung, vielleicht spielen bis zu einem gewissen Grade chemotaktische Reize eine Rolle, so dass die Lymphkanäle sich ebensosehr mit Carcinomzellen vollsaugen, als sie von den mechanisch vorgeschobenen Elementen infiltrirt werden. Auch in den Lymphbahnen wurzelt der Tumor zum mindesten an einer Wandpartie fest. Vergl. Fig. 16¹⁾, welche das Vordringen von Plattenepithel-Krebszapfen in einer Cervixschleimhaut darstellt. Die infiltrirten

1) Fig. 16 ist in meiner früheren Carcinomarbeit, dieses Archiv, Bd. 65, H. 3, enthalten. Siehe auch die Erklärung der Abbild. am Schlusse.

Lakunen erscheinen bedeutend grösser als die bei der Injection dargestellten normalen Lymphspalten. Das Endothelhäutchen geht auch nie um den ganzen Umfang der Krebszapfen herum; es fehlt an derjenigen Wandseite, an welcher die Tumorzellen am Gewebe haften. Der Krebs hat gewissermaassen die Lymphbahnen zum Bersten gebracht.

Die grosse Zahl der Lymphanastomosen, welche wir in allen Schichten des Uterus annehmen können, wird uns ein zuweilen zu beobachtendes, atypisches Wachsthum des Krebses in einer einseitigen Richtung hin begreiflich machen. Ihr Vorhandensein bedeutet aber nicht, dass der Tumor den von ihnen gebotenen Weg benutzen muss. Man kann nur sagen: Von den vielen Strassen, welche dem Krebs offenstehen, sind diese oder jene im besonderen Falle als besonders geeignet vom Tumor benutzt worden. Ein Vorhersagen der Hauptwachsthumsrichtung irgend welcher klinisch beobachteten Geschwulst ist direct unmöglich.

Trotzdem kann man gewisse Schlüsse aus dem Sitz und der Art des Tumors stellen. Die an der Grenze zweier Epithelarten, in utero also am äusseren oder am inneren Muttermund entstehenden Krebse werden rasche Verbreitung finden, weil ihnen gewissermaassen 2 Lymphsysteme offen stehen, deren Stromrichtung mit ihrer Wachsthumsrichtung correspondirt.

Die in einer einheitlichen Epithelregion entstehenden Carcinome erscheinen uns in ihren vorgeschrittenen Stadien entweder als lokalisierte, runde Knoten — oder als diffuse Erkrankung der ganzen Region. Die ersteren will ich als unicentrische Tumoren den multicentrischen mit diffuser Entstehung gegenüberstellen. Bei beiden grossen Gruppen kann das Wachsthum evertirend nach der freien Oberfläche, oder invertirend nach der Tiefe sich erstrecken. So entsteht aus einem unicentrischen Carcinom der Portio entweder der breitgestielte, polypöse Tumor einer Lippe oder der tiefe Collumnoknoten. Die charakteristischen Vertreter der 2. Gruppe wären der cauliflore Portiotumor einerseits und das verjauchte Höhlencarcinom andererseits, bei welchem Neubildung und Zerfall gleichen Schritt halten.

Von den unicentrischen Tumoren werden die tiefgehenden Formen z. B. die sogenannten tiefen Collumnoknoten besonders bösartig sein, weil sie rascher als die evertirenden Formen das Parametrium erreichen; von den multicentrischen Carcinomen geben die sogenannten lymphatischen Formen die schlechteste Prognose, denn diese — auf einem weiten Gebiet zugleich entstehend — inficiren

gewissermaassen in der ersten Bildung eine Unmenge von Lymphbahnen. Sie infiltriren die Wand der Gebärmutter, welche scheinbar in der Form erhalten bleibt, aber durch ihr wurmstichiges Aussehen und ihre Bröcklichkeit den Tumor verräth. Mag man solche Formen lymphatische Carcinome oder infiltrirende Höhlenkrebse nennen, jedenfalls verhalten sie sich genau so wie die in den Saftspalten und Lymphcapillaren selbst entstehenden Endothelkrebse. Sie erreichen rasch die subseröse Schicht und damit die breite parametranne bzw. intraligamentäre Strasse.

Ganz allgemein scheint die Grösse der localen Neubildung zu contrastiren mit dem Grade der regionären Ausbreitung in der Peripherie. Mächtige Portiocancroide geben eine bessere Prognose als der unansehnliche Cervixkrebs, von welchem man am geschlossenen äusseren Muttermund kaum ein kleines Zöttchen herausragen sieht.

Cullen und Lubarsch haben die Grösse der Zellen ausserdem in Betracht gezogen und glauben, je kleiner die einzelnen Geschwulstelemente sind, je mehr sie sich dem Lumen der Spalten anpassen können, um so eher werden sie zur raschen Verbreitung geeignet sein. Auch diese Eigenschaft kommt den infiltrirenden Cylinderzellkrebsen und den Endotheliomen in gleicher Weise zu.

Fig. 14 und 15¹⁾ demonstrieren die Anpassungsfähigkeit der von den Cylinderepithelien des Uterus ausgehenden Geschwulstzellen für das Corpuscarcinom. Die Schnitte, welche den Abbildungen zu Grunde liegen, entstammen einem breitgestielten Schleimhautpolypen des Corpus uteri. Das Carcinom beschränkt sich auf den Polypen und seine Basis. Trotz der Metaplasie des Oberflächenepithels möchte ich annehmen, dass auch die Drüsen als Ausgangspunkt betheiligt sind. In der obersten Schleimhautschicht (s) erblickt man neben wenigen normalen Drüsen (d) mit erhaltenem Cylinderepithel in den meisten Hohlräumen (m) das Epithel in starker Proliferation begriffen. Ueberall kann man Metaplasie und Mehrschichtung verfolgen. (Aehnliche Bilder aus einem Uteruspolypen bildete jüngst Opitz ab.) Die Membrana propria der veränderten Drüsenschläuche wird durchbrochen und die activirten Epithelien dringen als feine Zellstränge in die Saftspalten und Lymphbahnen der tieferen Schleimhautschichten. Namentlich in der Nähe der Blutgefässe (g — a — v) tritt der bizarre, schlangenartig gewundene Verlauf der inficirten Lymphbahnen zu Tage. In der tiefen Schicht (c) der Mucosa folgen

1) Vergl. die Erklärung der Abbild. am Schlusse der Arbeit.

breite Zellzüge, welche sich etwas von der Wand abgelöst haben, so dass zwischen den grosszelligen Carcinomsäulen und der Endothelgrenze ein Spalt bleibt. Diese Räume entsprechen offenbar den weiten Lakunen in der Schleimhautbasis meiner Injectionspräparate (siehe Fig. 9a und 11). Ihre Ausläufer in der verbreiterten submucösen Schicht (s m) bilden zierliche Netze, deren enge Capillaren um die Venen und Arterien eine Art Strickleitersystem bilden.

Die Figg. 14 a, b und c erläutern im Einzelnen bei stärkerer Vergrösserung das Verhältniss der infiltrirten Lymphbahnen zu den Bluträumen der Mucosa, der submucösen Schicht und der Muscularis. Nirgend ist eine Spur von Einscheidung der Blutgefässe zu erkennen. Beide Gefässarten sind nur aneinander gelagert. Die Lymphgefässe erscheinen als perivascularäre Sicheln. Die von allen Seiten¹⁾ neuerdings hervorgehobene Polymorphie des Corpuscarcinoms hat somit in diesem Falle zu einer natürlichen Injection der Lymphbahnen geführt.

Analoge Bilder — nur entsprechend der schmalen Form der Cervix-Lymphbahnen etwas variirt — erhält man bei den infiltrirenden Cervixkrebsen. Vergl. Gebhard's Abbildung: „Fig. 67. Carcin. cervicis lymphaticum“ auf S. 144 seiner pathol. Anatomie d. weibl. Sexualorgane.

Ein Vergleich dieser letztbeschriebenen Bilder mit Fig. 16, welche eine Partie aus einem infiltrirenden Portiokrebs darstellt, lässt den charakteristischen Unterschied der letzteren Krebsart von den Cylinderzelltumoren erkennen. Der Plattenepithelkrebs der Portio wächst langsam selbst in den präformirten Spalten, indem er sich gewissermaassen plump unter Zerstörung der Lymphbahnen vorwärts drängt.

Die in neuerer Zeit sich mehrenden Beobachtungen von beginnenden Carcinomen in der Mucosa oder in Polypen des Uterus (Keitler, R. Freund, Hofmeier, Winter, Florenzo d'Erchia, Katzenstein, Gessner, Kroemer, Opitz) lassen sich mit der

1) Die von Hofmeier, Fränkel-Wiener, Kroemer, Emanuel beschriebene polymorphe Natur der Cylinderzellcarcinome des Corpus uteri ist neuerdings von Hitschmann bestätigt worden. Das Cervixcarcinom kann unter Umständen das gleiche Verhalten zeigen, wie ich mich an eigenen Präparaten überzeugen konnte. Bilder, welche den von E. Kaufmann wiedergegebenen Adenocarcinomschläuchen absolut gleichen, finden sich neben Plattenepithelsträngen mit und ohne Verhornung in ein und demselben Primärtumor. Ich behalte mir vor, diese Erfahrungen später mitzuthemen.

Theorie der Cohnheim'schen Keimversprengung nicht vereinbaren. Es wehrt sich der Gedankengang des Klinikers immer und immer wieder gegen die Berechtigung der Lehre von den versprengten Keimen, welche wie die schlummernden Vegetationskeime der Pflanzen zu irgend einer Zeit auswachsen können, nachdem man jahrelang nichts von ihnen wahrnehmen konnte. Solche schlummernden Keime trägt ja wohl jeder Mensch mit sich herum, und sie sind ja auch eine sehr bequeme Erklärung für bösartige Geschwülste. Aber wie soll man sich denn, um pro domo zu reden, einen schlummernden Keim in einer Mucosa uteri vorstellen, die sich vielleicht 100mal postmenstruell verjüngt hat, die bei mehreren Schwangerschaften ganz zu Grunde ging, die vielleicht wiederholt ausgekratzt wurde und schliesslich doch den Boden für ein Oberflächencarcinom abgibt?

Es giebt nun dank der Stückchendiagnose Fälle genug, in welchen das Carcinom in getrennten Herden, z. B. in 2 getrennten Buchten eines und desselben Polypen in seiner Entstehung beobachtet werden konnte. Für solche Formen müssten also bereits 2 verlagerte Keime angenommen werden. Diese Schleimhautkrebse des Uterus geben interessante Aufgaben für die Plattenmodellirmethode nach Born.

Die Frühstadien der Uteruskrebse, in denen man das multiple Auskeimen der Krebszapfen von dem Oberflächenepithel und von den Drüsen zugleich verfolgen kann, sprechen ebenso wie die Fälle mit multiplen Carcinomherden im Uteruskörper, falls letztere vom Oberflächenepithel ausgehen, wie im Fall Kunze, gegen die Annahme, dass der Krebs in allen Fällen unicentrisch entsteht. Wenn man sich eine Neubildung von einem Centrum aus wachsend vorstellt, so wird daraus stets mehr oder weniger eine Kugel oder Halbkugel werden, deren Peripherie ja freilich so unregelmässig als möglich gestaltet sein könnte. Wenn man aber z. B. bei einem diffusen Drüsencarcinom der Cervix vom inneren Muttermund nach abwärts bis kurz vor Beginn der Plattenepitheldecke der Vagina in der Nachbarschaft jeder Drüse die beginnenden Carcinomherde gleich weit vorgeschritten sieht, so wird man zugeben müssen, dass die Carcinome auch multicentrisch entstehen können. Man hat dann unwillkürlich den Eindruck, dass in solchen Fällen ein gemeinsam wirkender Reiz, sei er chemisch oder mechanisch oder parasitär, von der ganzen Innenfläche aus wirkend, die Neubildung verursacht habe.

Einen solchen Reiz, welcher unter Umständen Carcinombildung anregt, kennen wir schon in der Tuberculose, die ja ohnedies im Uterus stets mit Epithelproliferation einhergeht. Die aus den Instituten E. Kaufmann's und von Lubarsch bekannt gegebenen Fälle sind nicht die einzigen, wie man aus der interessanten Arbeit J. Wallart's ersieht. In unserer Klinik harrt zur Zeit ein Fall von Cervixkrebs der operativen Erledigung, in welchem auf allen Schnittbildern der Probeexcision die Vereinigung von tuberculösen und carcinomatösen Formationen eine so innige ist, dass man an die Lupuscarcinome erinnert wird.

Auch bei den Corpuskrebsen kann man die unicentrischen Tumoren, welche kaum den 10. Theil unter allen Corpustumoren ausmachen, von den diffusen multicentrischen Epitheliomen unterscheiden. Im ersten Falle findet man einen beetartigen oder knolligen Herd, im letzteren Falle eine Zerstörung der ganzen Corpuswand von innen nach aussen, so dass je nach dem Stadium ein Drittel oder die Hälfte der ganzen Muscularis von innen her eingeschmolzen ist, bis endlich nur noch die allein erhaltene Serosa die weiche Carcinommasse mit ihrem riesigen, centralen Krater einschliesst.

Die Peripherie aller Carcinomarten kann, wie oben bereits erwähnt, unregelmässig strahlige Ausläufer und Vorposten treiben, am ehesten findet man dies Verhalten noch bei den Endotheliomen und bei den Corpuscarcinomen. Zu jeder Zeit ihres Bestandes können Zellcomplexe, welche sich in den Lymphbahnen vorschieben, an entfernten Stellen — hier meist subserös — auskeimen (vergl. Fig. 8 meiner früheren Arbeit über den Gebärmutterkrebs). Die Körperkrebsse machen in Folge dessen im vorgeschrittenen Stadium bei bimanueller Tastung einen vielknolligen Eindruck, so dass man differentialdiagnostisch an multiple Myome zu denken veranlasst wird. (Es sind dies meist relativ sehr grosse Tumoren, die bis zur Grösse eines Kindskopfes und darüber anwachsen können.) In einem solchen Stadium ist bereits das Serosa-Lymphnetz vom Carcinom befallen, und ich erinnere mich zweier eclatanter Fälle, in denen die Autopsie bei der Operation eine multiple Carcinomaussaat auf bezw. in dem gesammten Peritoneum erkennen liess.

Wenn wir uns noch ein Mal kurz die Verbreitungsweise der einzelnen Carcinomarten des Uterus vergegenwärtigen, so greift der Vaginalkrebs der Portio mit Vorliebe nach oben auf den Gebärmutterhals, nach unten auf die Vagina und das subvaginale Gewebe über. Das Cervixcarcinom wächst nach den Seiten in

die Parametrien hinein, der Körperkrebs strebt radiär nach aussen.

Bei der Durchsicht der zahlreichen carcinomatösen Uteri in der Sammlung der Giessener Frauenklinik fand ich die Bestätigung unserer früheren Erfahrungen an dem Breslauer Material. „Die häufigsten Collumcarcinome entstehen als isolirter Tumor einer Portiollippe oder einer Commissur und infiltriren vom Ort ihres Entstehens aus die Wand der Cervix sowie die Vaginalwand, sodass schliesslich das ganze Scheidengewölbe vom Carcinom erfasst sein kann. Je mehr das Carcinom blumenkohlartig wächst, um so länger bleibt das Scheidengewölbe erhalten, und man kommt oft um unförmliche Tumoren noch herum an freien Fornix.“

Seltener ist schon das trichterförmige Wachsthum mit Verjüngung des Kraters nach oben, so dass die Cervicalschleimhaut ganz zerstört ist, die Musculatur nur im unteren Bereich der Krebshöhle. Am seltensten sah ich die gesammte Schleimhaut der Gebärmutter vom äusseren Muttermund bis hinauf in den Fundus vom Carcinom befallen; es sind dies wohl stets Ringcarcinome, welche am inneren Muttermund entstehen und von da nach aufwärts und abwärts steigen. Die metastatische Verbreitung des Carcinoma (colli) uteri durch isolirte Herde in der Wand der Gebärmutter und ihrer Adnexe, der Tube und des Ovariums ist so selten, dass solche Fälle als Ausnahme das Nichtvorhandensein solcher Metastasen als die Regel bestätigen.

Nach persönlicher Mittheilung Prof. Walther's beobachtete Löhlein an der Giessener Frauenklinik eine isolirte Corpuswandmetastase bei operablem Portiocarcinom. Auch Seelig behauptete, dass schon bei beginnenden Collumkrebsen das Corpus inficirt sein könne durch vorgeschobene Posten in den Lymphgefässen. v. Franqué und Puppel wiesen nach, dass Seelig an einem inoperablen Material seine Untersuchungen angestellt hatte, bestätigten jedoch im Uebrigen seine anatomischen Befunde. Nur betonte v. Franqué mit Recht, dass die isolirten Herde gewöhnlich in der grossen Seitenanastomose Poirier's (vergl. den anatomischen Abschnitt dieser Arbeit!) sich finden, welche an der Seitenkante der Gebärmutter nach oben steigt und die Lymphbahnen des Collum uteri mit denen des Corpus verbindet. Blau sah bei 87 Cervixcarcinomen 8 mal isolirte Metastasen in der äusseren Schicht der Corpuswand; einige Knötchen sassen subserös. Auch ich machte die gelegentlichen Befunde von carcinomatösen Lymphthromben in der

Corpuswand wie in der subvaginalen Anastomosenstrasse bei vorgeschrittenen Collumtumoren. Metastasen in der Tubenwand fand Florenzo d'Erchia bei Portiocarcinom, Sondheimer bei Corpuscarcinom, Cullen bei beiden Krebsarten; Cullen's mikroskopische Befunde in der Tubenmucosa sind nach Maassgabe der beigegebenen Abbildungen, wie ich wenigstens meine, nicht beweisend.

Die Betheiligung der Ovarien bei Carcinoma uteri — meist handelt es sich um die Combination von Körperkrebs, seltener von Cervixkrebs mit Krebs eines oder beider Ovarien — erfordert stets eine scharfe, kritische Beurtheilung. Abgesehen von dem continuirlichen Fortschreiten eines Körperkrebses, dessen Ausläufer in den Lymphbahnen der Ala vespertilionis sich bis in den Hilus ovarii vorschieben (Blau sah dies bei 93 Sectionen 25 mal), ist bei den übrigen Fällen mit freiem Ligament die Entscheidung schwer, ob der Primärtumor im Ovarium oder im Uterus sitzt. Nicht die Grösse des Tumors entscheidet, sondern nach Winter (Veit's Handbuch für Gynäkologie) die Art des Uterusherdes selbst. Handelt es sich um diffuse Tumorbildung der ganzen Mucosa corporis oder cervicis uteri, so spricht alle Wahrscheinlichkeit für einen primären Uteruskrebs. Im anderen Falle wird eine localisirte Uteruserkrankung im Corpus oder Collum bei grossem Ovarialtumor als Metastase verdächtig sein. Tritt die Uterusaffectio localisirt in Erscheinung nach operativer Beseitigung der Ovarialtumoren, wie in den beiden von mir beschriebenen Beispielen (No. 1: Corpus- und Cervixmetastase bei [nach] Cystadenocarcinoma ovarii und No. 2: Portiometastase bei [nach] Endothelioma ovarii), so ist die Diagnose klar, sobald beide zeitlich aufeinanderfolgenden Geschwülste mikroskopisch denselben Bau aufweisen. Schliesslich kann ein primäres Uteruscarcinom sich auch jeder Zeit mit einem primären Ovarialcarcinom vergesellschaften.¹⁾

Bei allen isolirten Metastasen — mögen sie in der Wand der Adnexe oder subvaginal sitzen, wie z. B. die Knoten im Urethralwulst unter der intacten Schleimhaut — spricht die grösste Wahrscheinlichkeit für ein Verschleppen der Carcinomkeime in den Venen, wie dies neuerdings Hellendahl wieder hervorgehoben hat.

Mit v. Recklinghausen und Goldmann möchte ich annehmen, dass die Carcinomverbreitung in den Lymphbahnen diffuse Knötchen und Stränge zeitigt, weil die Geschwulstpartikelchen in

1) Glöckner's Arbeit über secundäres Ovarialcarcinom konnte ich leider nicht mehr berücksichtigen.

den Knotenpunkten des Lymphnetzes festsitzen werden. Die retrograde Verschleppung in der Blutbahn, d. h. in den relativ geräumigen, gestauten Venen lässt einen Pfropf leichter an Theilungsstellen der Gefässbahn passiren, ehe er zur Verankerung kommt. Die diffusen retrograden Metastasen im Lymphsystem kann man zuweilen bei sehr weit vorgeschrittenen Collumkrebsen per vaginam als multiple Knötchen tasten.

In der Regel wächst also der Krebs der Gebärmutter continuirlich. Der locale Tumor wird grösser und grösser, er schiebt seine Ausläufer, sobald er das Parametrium bzw. Ligament. lat. erreicht hat, in den breiten, bequemen Lymphstrassen vorwärts in Gestalt eines nach der Beckenwand sich zuspitzenden Keiles (Winter), d. h. er entfaltet die Ligamente (mit Vorliebe auch die Ligamenta sacrouterina), die mehr durch dieses Moment, als durch die entzündliche Infiltration verkürzt werden, und es verändert sich dadurch die Topik der Ligamentgebilde. Die Art. uterina wird nach vorn oder hinten verdrängt, der Ureter wird in Schleifen verzerrt, und da die Lymphbahnen die Art. uterina und den Ureter von vorn und hinten umschlingen, so scheint der Harnleiter schon zu einer Zeit im Carcinom eingemauert, in welcher seine Wand noch vollständig intact ist und er sich in den Carcinomsträngen leicht verschieben, ja sogar intact herauspräpariren lässt. Die carcinomatöse Wandinfiltration des Ureters erfolgt erst in einem Stadium, in welchem die inficirten, parametranen Lymphstränge die Beckenwand erreicht haben, und der locale Carcinomkrater nach der Blase und dem Rectum zu durchbricht, d. h. der Ureter wird von der infiltrirten Blase her befallen. Er steht ja nicht in directer Lymphverbindung mit dem Uterus, sondern mit der Blasenwand und den Iliacaldrüsen.

Zum Schluss kann über dem Carcinomkrater im Becken, der nur noch eine einzige grosse Kloake darstellt, das kleine Corpus mit seinen Adnexen wie eingemauert stehen, und doch kann die ganze Erkrankung streng local geblieben sein ohne Betheiligung der regionären Lymphdrüsen. Cullen hat uns classische Beispiele davon mitgetheilt. Wir selbst verfügen über Fälle, wo mächtige Portiotumoren, welche von anderer Seite mehrfach ausgelöffelt worden waren, weder bei der Radicaloperation noch bei der Section mikroskopisch einen Krebskeim in den geschwollenen Drüsen nachweisen liessen. Aehnliche Fälle beschreiben Broese, Gellhorn (E. Kaufmann). Es scheint, als ob begleitende, schwere Infectionen in solchen Fällen die Lymphstrassen verlegen.

Jedenfalls sind diese Fälle Extreme, obwohl ich mich nie des Eindrucks erwehren konnte, dass Portiokrebse, welche local mächtige Tumoren erzeugen, wenig Neigung zur metastatischen Verschleppung zeigen. Das evertirende Wachsthum begünstigt vielleicht die Drüseninfection weniger, als das infiltrirende.

Der Krebs wächst mit Vorliebe in den Lymphspalten, greift aber — zum mindesten im primären Tumor — auch Blutgefässe (Venen) an, ähnlich wie die Sarkome. Wenn also die Tumoren gewissermaassen mit ihren Vorposten in Lymph- und Blutgefässen stecken, und durch die nachgewiesene Hyperämie und Gefässneubildung ein gesteigerter Säftestrom zwischen der Geschwulst und dem übrigen Körper sich einstellt, so müsste man ja annehmen, dass täglich Geschwulstbestandtheile abbröckeln und in entfernte Bezirke verschleppt werden. Die Verschleppung in den Blutbahnen — stets sind es Venen, welche arrodirt werden — wird glücklicher Weise meist verhindert durch die gleichzeitig mit der Arrosion zu Stande kommende Thrombosirung. Dies Moment fehlt in den wenig widerstandsfähigen und an Zahl viel reicheren Lymphbahnen, welche Schritt für Schritt infiltrirt werden. Solange die wachsenden Zellen am Mutterboden haften und das Lumen des Lymphgefässes ganz erfüllen, ist keine Gefahr vorhanden. Beim weiteren Wachsthum aber muss doch früher oder später ein Zeitpunkt eintreten, wo ein Pfropf in ein grösseres Lumen eindringt, flott wird und zum Wandern kommt. In der That steht der Krebs in Zell- und Säfteaustausch mit dem Körper. Frühzeitige Kachexie und Magensymptome treten zuweilen ein, bevor die nachfolgende Anämie das Bild erklären kann. Es werden — um mit Thiersch zu reden — täglich Stoffe und Zellen vom Krebs in die Gewebe und Säfte der Mutter eingeschwemmt. Aber die Zellen sind zunächst verbraucht, todt, oder sie sterben rasch ab. — Zu ihrem Auskeimen muss ein zweites Moment begünstigend hinzukommen: Sie müssen in einer gewissen Masse und Lebensfähigkeit eindringen und sie müssen einen Locus minoris resistentiae finden.

Während des Transportes der Carcinomzellen in den abführenden Lymphstämmen der Gebärmutter, d. h. in den freien Ligamenten, sind sie schwer nachzuweisen. Menge nimmt daher an, dass die intercurrenten Lymphstämme carcinomfrei sind und dass nur in den Drüsen die gefährlichen Carcinomnester sitzen. Aber man muss sich dabei das Beispiel der Injection vor Augen halten. Auch bei den gelingenden interstitiellen Organinjectionen sieht man erst die

regionären Drüsen sich färben, ehe die zuleitende Bahn, durchs Peritoneum schimmernd, zu Tage tritt, der mikroskopische Nachweis der wandernden Zellen in den makroskopisch freien Ligamentbahnen und Parametrien ist eminent schwer. Man wird nicht erwarten dürfen, jeden kleinen Keim zu finden. Oft durchsucht man die Zellmassen in den Lymphgefässen und kann doch nicht zur Entscheidung kommen, ob die hellen grossen, oder die kleinen, dunkelgefärbten Zellgebilde im Rahmen des Gefässes die Tumorumposten einschliessen. Bis zu einem gewissen Grade bleibt die Diagnose bei den von Seelig und Puppel beschriebenen in dem freien Lumen liegenden „Carcinom“massen stets subjectiv. Angenommen, dass es wirklich Krebszellen sind, woher wissen wir, ob es noch lebendes Material ist. Freilich giebt es unzweideutige Befunde, in welchen gleich wie in den randständigen, inficirten Venenthromben (Goldmann) der Tumor bereits die Endothelien verdrängt hat und in die Gefässwand selbst eindringt (Kundrat).

Unzweifelhaft sind wohl auch alle jene Fälle, in welchen man bereits makroskopisch die Infiltration der Lymphbahnen in den Ligamenten erkennen konnte. Blau, Cullen, Russel, H. W. Freund sahen die Carcinomausbreitung in den Lymphbahnen, welche vom Uterushorn aus entlang der Tube zum Plexus subovarius verlaufen, Cullen auch im Ligamentum rotundum. Ausserdem beschrieben Veit und Mackenrodt carcinomatöse Lymphthromben im Parametrium und in den Ligamenten, Veit bezeichnete diesen Vorgang als „sprungweise Infiltration“ der Ligamentbahnen. Kermauner und Laméris sowie Kundrat konnten gleichfalls unzweideutige Krebsherde dieser Art finden.

Nach meinen Erfahrungen sitzen solche Krebspfropfe stets in der Nähe der inficirten Lymphdrüsen. Die natürliche Infiltration des peripheren Lymphsinus in der Drüse verstopft den Weg, und so stauen sich vor dem Hinderniss die Zellelemente im Lymphstrom. Die Krebszellen können sich daher leichter festsetzen und vermehren. Es ist nichts Seltenes, dass man neben einer Infiltration des Lymphsinus mit Krebselementen eine zweite Aussaat kurz vor der Drüsenetappe im periglandulären Gewebe und in der Drüsenkapsel selbst findet.

Die parametranen Drüsen sind zuweilen nur seitliche Anhänge eines grossen Lymphgefässes und keine echten Stromunterbrecher. Wie die Injectionsmasse an diesen Noduli lymphatici im Parametrium vorüberfliessen kann, ohne sie zu färben, so werden

sie auch zuweilen vom Carcinom übergangen, und man findet häufiger die Drüsen an der Beckenwand inficirt als die parametranen Knoten. Bei 26 positiven Drüsenbefunden der Wertheim'schen Carcinomfälle fand Kundrat nur 11 Mal Carcinomherde in den parametranen Knötchen. Die Zeichnungen Fig. 17 und Fig. 18 stammen von einem Cervix- bzw. einem Portiokrebs mit freien Drüsen.

Anders steht es mit den sogenannten regionären Lymphdrüsen im Verlauf der grossen Beckengefässe. Da sie gewissermaassen als Sieborgane in den Lymphstrom eingeschaltet sind, so werden sie auf jede Veränderung des Primärtumors reagiren müssen. In der That kennen wir bereits eine Reihe typischer Veränderungen dieser Organe.

Um die pathologischen Drüsenerscheinungen kurz charakterisiren zu können, erinnere ich an die typischen Componenten, aus welchen die Lymphdrüsen zusammengesetzt sind, mögen sie in ihrer äusseren Form auch noch so variabel sein. (Vergl. Fig. 19 bis 30.)

Jede Lymphdrüse (Fig. 24) ist von einer bindegewebigen Kapsel umgeben, von welcher zarte, verzweigte Septen — die sogenannten Trabekel —, ins Innere der Drüse einstrahlen. Dadurch wird das adenoïde Drüsenparenchym gegliedert in die runden, peripheren Zellknoten, d. h. die Randfollikel und die strangartig gewundenen, centralen Markstränge. Die letzteren hängen unter sich und mit den Randfollikeln zusammen. Zwischen den Parenchymbestandtheilen und den Trabekeln bzw. Kapselwänden fliesst die Lymphe im sogenannten Sinus, der am convexen Pol als peripherer Randsinus, am concaven Hilus als Toldt'scher Endsinus bezeichnet wird. In den Randsinus mündet das Vas afferens, aus dem Endsinus entstehen die Vasa efferentia. Functionirt die Drüse noch im Körperhaushalt, so enthalten die Randfollikel helle Bezirke (Brutstätten für Leukocyten), die sogenannten Flemming'schen Keimcentren. Das bindegewebige Stützgerüst: „Kapsel und Trabekel“ bekommen platte Nerven und Ernährungsgefässe vom convexen Pol, das Parenchym vom concaven Hilus her.

In einigen Drüsen konnte ich im Parenchym einen directen Zusammenhang kleiner Lymphräume mit den Blutgefässen (Venen oder Capillaren) erkennen.

Fig. 20 erläutert die Verhältnisse des Lymphsinus, welcher überall von reticulären Fasern mit weiten Maschen durchsetzt ist. Die Trabekel sind bei menschlichen Drüsen junger Individuen oft sehr zart, so auch hier. Um so besser erkennt man Markstränge

und Randfollikel, in den letzteren die Keimcentren und in diesen (angedeutet) zahlreiche Blutcapillaren. Die seröse Ueberfüllung der Drüse war hier durch Gravidität verursacht (combinirt mit Carcinoma cervicis). In ähnlicher Weise findet man bei ulcerirten Carcinomen des Corpus wie des Collum uteri den Lymphsinus erweitert, aber dabei sind die Maschen des Reticulums im Sinus erfüllt mit zahlreichen todtten und lebenden Zellen und Zellfragmenten.

Anders das Bild bei einer acuten Infection durch irgend welche Infectionserreger, welche in den ulcerirten Primärtumor eindringen können (s. Fig. 21). Sofort steht das ganze Parenchym unter dem Zeichen der activen und passiven Hyperämie, besonders sind die Venen strotzend gefüllt. Das Markgewebe schwillt, es erscheint vollgepfropft mit Lymphocyten und erdrückt die Keimcentren, welche allmählig verschwinden. Die Function der Drüse erlahmt. Endlich erscheinen im Parenchym diffuse Blutextravasate. Ist die Einfuhr des Infectionsstoffes bedeutend, so kann es zur Abscessbildung und Vereiterung der Drüse kommen. Die Herde machen dann kurz vor dem Einschmelzen den Eindruck todtter Sequester wie bei Infarctbildung. Auch offenbare Folgezustände der stattgehabten, überwundenen Infection kommen bei der systematischen Untersuchung aller Drüsen ab und zu zu Gesicht. Die Drüse fühlt sich dann schon im frischen Zustande hart, wie lederartig an. Im gefärbten Schnitt fallen helle, strahlige Inseln auf, während die sonstigen Drüsen tief dunkel tingirte Bilder liefern. Das Mikroskop löst diese weissen Felder im Herde von sklerosirtem Bindegewebe auf. Wenn der Vorgang ganz allgemein in der ganzen Drüse sich abspielt, so erhalten wir Bilder, wie in Fig. 27. Das Kapsel- und Trabekelwerk, überhaupt der ganze Gefässbindegewebsapparat, tritt gewissermaassen nackt und verdickt hervor, während die Parenchymbestandtheile verkümmern. Die Zeichnung der Randfollikel und Markstränge ist verwischt. Keimcentren fehlen ganz. Die Drüse ist blutleer, der Lymphsinus verödet. Die Gefässwände sind verdickt, das Bindegewebe ist sklerosirt und theilweise im Zustande der hyalinen Entartung.

Auch beim Ausbleiben der Infection kann es unter dem Einfluss von Anämien oder im Alter zur Degeneration von Lymphdrüsen kommen. Das Parenchymgewebe schmilzt dabei vom Drüsenhilus aus ein und wird ersetzt durch Fettgewebe (s. Fig. 23 a u. b). Erst erscheinen einzelne Fettträubchen ganz isolirt in den Marksträngen (s. Fig. 36); dieselben wachsen und confluiren. Schliess-

lich ist vom adenoiden Drüsengewebe nur noch eine convexe, dünne Platte übrig geblieben. Der ganze Hilusbezirk ist vom Fettgewebe ersetzt, und nur der erhaltene Gefässbindegewebsapparat der Drüse, namentlich die isolirten Sinus terminiferi, zeigen die ursprüngliche Grenze und Ausdehnung des Drüsengewebes an. Die Fettzellen erscheinen dabei auch in und zwischen den Randfollikeln, und der Rest des adenoiden Gewebes ist im Zustande der Degeneration. Die Zellen färben sich schwer und erscheinen daher blass. Colliquationsnekrosen sind allenthalben zu sehen, die Grenze der Keimcentren gegen ihren sonst zellreichen Parenchymhof ist verwaschen. Das Reticulum quillt und backt zusammen.

Zehnder und Petrick haben solche Bilder als Drüsenneubildung aus dem Fettgewebe gedeutet. Dagegen spricht aber der Zustand der allgemeinen Degeneration, das Vorhandensein eines Gefässbindegewebsapparates, der gewissermaassen wie ein zu weit gewordener Rock um das schrumpfende Parenchym herumliegt und schwerlich aus Fettgewebe entstehen kann, endlich eine von mir selbst gemachte Beobachtung, welche für die Möglichkeit des raschen Ueberganges von gesunden Drüsen zu diesen Degenerationsproducten zu sprechen scheint: „Bei einem zur Section kommenden Fall von Cervixcarcinom sind die bei der Operation entfernten hypogastrischen Drüsen frisch und ausserordentlich typisch gebaut. Die Operirte stirbt 12 Stunden nach der Operation. Die bei der am folgenden Tage stattfindenden Section entfernten Nachbardrüsen an der Art. iliaca ext. und communis, sowie an der Endausstrahlung der Art. hypogastrica befinden sich im Zustande ausgesprochener, fettiger Degeneration; und doch waren die einen Drüsen makroskopisch von den anderen nicht zu unterscheiden. Auf dem Durchschnitt freilich sieht man sofort die gelbliche Verfärbung des Hilusbezirks. Das Fettgewebe quillt ausserdem vor.“

Unter der wahren Drüsenneubildung möchte ich zweierlei verstehen: 1. das Auswachsen der kleinen Nebendrüsen, welche man so häufig in der Nähe grosser Lymphknoten findet, und 2. eine Erscheinung, welche speciell charakteristisch für Carcinominvasion zu sein scheint. Sobald der wachsende Krebsherd in der Drüse das Parenchymgewebe zusammendrückt, brechen an einzelnen Kapselstellen Follikel heraus und gestalten die Oberfläche der Drüse zu einem welligen Niveau. Selbst in den grössten Lymphdrüsenmetastasen maligner Geschwülste findet man in dem Convolut zwischen den Geschwulstherden und in ihrer Peripherie erhaltenes

adenoides Gewebe, welches in das umgebende Gewebe gleichsam herausspritzt.

Die zahlreichen Rundzellenherde, welche man fast immer im periglandulären Fettgewebe findet — meist in der Peripherie eines Lymphgefässes, — möchte ich noch nicht als eine neugebildete Drüse ansehen. Es ist nur der Ausdruck dafür, dass die Lymphe leukotactische Stoffe führt, oder dass Zellen auch aus den grösseren Lymphstämmen ins Gewebe auswandern. Schliesslich könnte ja auch ein Lymphgefäss einen perivaskulären Mantel von adenoidem Gewebe erhalten. Gleich Hammerschlag möchte ich entsprechend unseren Erfahrungen annehmen: „Die carcinomatösen Drüsen neigen eher zur gegenseitigen Verwachsung als zur Abspaltung neuer Drüsen.“ —

Interessanterweise haben die Forschungen der letzten Jahre ergeben, dass das Carcinom des Uterus, und zwar gleichgültig, ob es ulcerirt ist, oder ob es eine intacte Oberfläche besitzt, in den Drüsen des Beckens, ja in extremen Fällen in allen abdominalen Drüsen eine Reaction auslöst, welche man am besten als **weiche Hypertrophie** bezeichnen könnte. Durch eine rasche Vermehrung aller Bestandtheile der Drüse kommt es zu einer gleichmässigen, wahren Hypertrophie, so dass aus den kleinen Drüsen unförmliche Knollen werden, welche 3 und $3\frac{1}{2}$ cm lang und 1— $1\frac{1}{2}$ cm breit und dick werden können. Der Bau dieser vollaftigen Organe ist absolut normal. Es handelt sich nicht um die sogen. grosszellige Hyperplasie, wie sie für skrophulöse Drüsen charakteristisch ist; denn bei dieser erdrücken gewissermaassen die grossen Keimeentren, welche in Randfollikeln und Marksträngen zugleich auftreten, wachsend und confluirend den Mantel der dunkel gefärbten Lymphocyten, von denen nur schmale Stränge zwischen den hyperplastischen Zellfeldern stehen bleiben. Bei unserer weichen Hypertrophie bleibt das normale Verhältniss der Parenchymbestandtheile unter einander und zum Stroma gewahrt. Fig. 24 demonstriert das gleichmässig grauröthliche Bild und die regelmässige Zeichnung, welche solche Drüsen auf dem Querschnitt darbieten. Es ist eine Reaction, die schon bei intactem Primärtumor auftritt, und es liegt nahe, teleologisch diese Veränderung als Schutzmittel gegen die Krebsinvasion aufzufassen. In der That giebt es Fälle (v. Franqué, Wertheim, Broese, Kroemer, Gellhorn), bei welchen lange Zeit, vielleicht dauernd, diese Drüsengiganten von Carcinom frei bleiben. Gewöhnlich aber kommt es beim Fortschreiten des Krebses

auf das Parametrium früher oder später zur Drüseninfection trotz der Hypertrophie, und die Annahme Petersen's und Mackenrodt's, dass die Lymphdrüsen Carcinomkeime unschädlich machen können, ist durch nichts begründet. Fig. 26 stellt einen zweiten Längsschnitt durch die Drüse (Fig. 24) dar und zeigt demonstrativ den ersten Krebskeim als isolirten Herd im peripheren Sinus. Der extrem seltene Befund abgeschlossener Krebskeime in verkalkten Lymphdrüsen, der wohl nie allein — ohne freie Carcinomherde — vorkommt, kann nicht als Gegenbeweis gelten, da wir doch von der Tuberculose her wissen, dass selbst die ältesten, ruhenden Herde wiederum Stoff zu neuer Infection geben können. Doch wird dies stets Ansichtssache bleiben, zu deren Klärung die Zukunft mehr Material erbringen muss. Jedenfalls möchte ich den Standpunkt anderer Autoren (Vinay und Courtois-Suffit), welche diese Hypertrophie als Begleiterscheinung oder Vorläufer der Carcinominvasion auffassen, für berechtigt halten.

Vinay theilt die bei Carcinoma uteri gefundenen Drüsenveränderungen in 3 Gruppen:

1. Adénopathie inflammatoire précancereuse, (d. i. unsere weiche Hypertrophie), ou Cirrhose précancereuse,
2. Adénopathie cancéreuse proprement dite,
3. Adénopathie inflammatoire ulcération.

No. 3 bedeutet unsere Secundärinfection vom ulcerirten Primärtumor aus mit irgend welchen pathogenen Mikroben.

Auch ich beobachtete neben der einfachen Hypertrophie Vereiterung durch Secundärinfection und Sklerosirung nach überstandener Secundärinfection neben wahren Krebsmetastasen.

Ob die weiche Schwellung, wie die Franzosen angeben, ein sicherer Vorbote der Krebsinvasion sei, möchte ich dahingestellt sein lassen, die Infection durch den Krebs kann eben in jedem Stadium der Hypertrophie, wie der Degeneration eintreten.

Auch die Drüse, Fig. 25, welche multiple, zerstreute Fettherde enthält, war bereits in einem kleinen Bezirk des peripheren Sinus vom Krebs inficirt.

Auch die histologischen Befunde sprechen dafür, dass der Krebs in den Lymphdrüsen kein Hinderniss für sein schrankenloses Wuchern findet. Er erdrückt das Parenchym (Fig. 27 und 32), infiltrirt die Kapsel (Fig. 34), und dann die Umgebung (Fig. 28).

Alle Operateure kennen Fälle, in denen das Abpräpariren der krebsigen Drüsen von der Gefässwand unmöglich war. Selbst bei

der Section bleibt zuweilen nach unseren Erfahrungen die Resection der Gefäßdrüsenconvolute die einzige Möglichkeit die Drüsen zu entfernen.

Die Art der Krebsinvasion in die Lymphdrüsen ist für alle Körperregionen gleich und stimmt für den Gebärmutterkrebs mit den altbekannten Erfahrungen der pathologischen Anatomen und Chirurgen überein (Bozzolo, Gussenbauer, Goldmann, Zehnder, Petrick, Afanassiew u. a. m.). Die Krebszellen infiltriren vom Vas afferens aus den Randsinus und den gesammten Lymphraum der Drüse, indem sie sich auf allen Stütz-Trabekeln aufreihen. Vergl. Fig. 31, welche dieses Verhalten für den Plattenepithelkrebs, und Fig. 33, welche dieselbe Erscheinung an der Metastase eines Cylinderepithelcarcinoms demonstirt. Erst nach der Anfüllung des complicirt gebauten Lymphsinus dringen die Krebszellen in das Lymphparenchym der Follikel und Markstränge und zuletzt in die im Parenchym verlaufenden Blutcapillaren. Meist wird das Parenchym schon vorher nekrotisch (s. Fig. 33!)

Der Gefahr der Krebsinfiltration sind alle Drüsen ausgesetzt, welche als Stromunterbrecher eingeschaltet sind. Ein Durchwandern von Krebszellen durch eine wahre Lymphdrüse, so dass letztere dabei gesund bleibt, ist eine mechanische Unmöglichkeit. Hochsitzende, isolirte Drüsenherde bei gesunder Zwischenetappe (Tiburtius) entstehen durch primär vom Uterus aus höher aufsteigende Bahnen, oder bei verstopfter erster Leitung durch Communicationsbahnen im ableitenden System, welche schon vor dem Hinderniss abzweigen und zur nächsthöheren Gruppe ziehen. Die einmal inficirte Drüse setzt erst dann wieder neue Metastasen, wenn die Krebszellen das ganze Drüsengewebe erdrückt und den Endsinus (Vas efferens) erreicht haben.

Ist die Aussaat in den Drüsen der I. Etappe erfolgt und der Strom hier verlegt, so sind zunächst nicht die höher gelegenen Drüsen gefährdet, sondern gerade die tieferen. Durch die Hindernisse im directen Stromverlauf kommt es zu einer Umkehr der Stromrichtung auf der befallenen Strecke. Das führt aber hier zur retrograden Infection der tieferen Etappen, d. i. der Gl. obturatoria, ischiadica und den Gl. iliacae externae. In den Operationsberichten Wertheims kann man dies häufig genug verfolgen. Auch Amann findet bei seinem transperitonealen Vorgehen die ersten inficirten Drüsen am Leistenring, d. h. an den Vasa iliac. ext. und

von da einen Strang zur höheren Etappe an und hinter der Art. hypogastrica.

Die Infection der höheren Etappen (Gl. iliacae comm. und lumbales) bleibt nicht aus; sie ist entweder — um das Beispiel durchzuführen — eine indirecte, d. h. auf Umwegen über das Corpus uteri erzielte, indem bei verlegten Cervixbahnen der Lymphstrom über die grosse Seitenanastomose in die unteren Corpusbahnen geht, oder die Infection entsteht direct durch einen Collateralzweig im ableitenden System, der noch unterhalb der Gl. hypogastrica abgehend, sofort höher aufsteigt zu den Gl. lumbales. Diese collateralen Zweigbahnen sind offenbar wechselnd. Auch innerhalb derselben Etappe kann eine tiefer liegende Drüse von den höheren aus retrograd inficirt werden, weil gerade im Bereich derselben Gruppe das Vas efferens der einen Drüse zum Vas afferens der anderen wird.

Die directe, prograde Infection führt von den Vasa afferentia aus zur Infiltration des Randsinus (Fig. 26, 31, 36), die retrograde dringt mit dem Vas efferens in einen Endsinus am Drüsenhilus (Fig. 27, 30, 32). Die directen Metastasen infiltriren auch im weiteren Wachsthum vom convexen Pol aus die zunächst in der Form erhalten bleibende Drüse, die indirecten, retrograden Metastasen sitzen als centraler Keim im Herzen der Drüse und erdrücken wachsend wie ein Stempel das Parenchym (Fig. 32 und 41).

Die Metastasen nehmen dabei das möglichst einfache Bild des Muttertumors an, d. h. es findet eine Entdifferenzirung statt, nicht eine über die Differenzirung der Primärgeschwulst hinausgehende Evolution. Ich halte es z. B. für unwahrscheinlich, dass Metastasen eines echten Plattenepithelkrebses der Portio als vollendete Adenomschläuche mit und ohne Flimmern in den regionären Drüsen erscheinen können.

Solche einschichtige Cylinderepithelgänge finden sich in den Kapseltrabekeln, wie auch im Parenchym der Beckenlymphdrüsen (vorwiegend bei Portio-Carcinomen neben einfacher Hypertrophie, sowie auch neben echten Carcinommetastasen in den regionären Lymphdrüsen). Die Veröffentlichungen der letzten Jahre: Ries, Kermauner und Laméris, Wertheim, v. Franqué, Wuelfing, Borst, Kleinhans und meine eigene Arbeit (s. Fig. 35)¹⁾ haben zur Genüge darüber Mittheilung gemacht.

Während nun die anderen Beobachter (Ries, Borst vor allen)

1) Vergl. die Bemerkung bei der Erklärung der Abbildungen Fig. 35.

Uebergänge zwischen diesen Epithelschläuchen und den echten Carcinomkeimen nicht beobachten konnten und infolgedessen diese Bildungen als Abkömmlinge des Wolff'schen Körpers erklären wollten, stand Wertheim zunächst auf dem Standpunkt, dass es echte Krebsmetastasen seien. Seine Beweisgründe sind nicht mehr haltbar, nachdem R. Meyer in carcinomfreien Leichen diese Adenomschläuche in verschiedenen Drüsen des Beckens und des Schenkels gefunden hat und ihre Zellauskleidung als veränderte Lymph-Endothelien anspricht. Meyer's Vermuthung, dass chronische Reizzustände durch langdauernde eitrige Processe, Phlegmonen etc. die Ursache der epithelähnlichen Umwandlungen des Endothel's sind, scheint sich zu bestätigen, nachdem auch Wertheim (A. Fallkner) bei einem Falle von Beckenphlegmone diese Adenomschläuche in paravesicalen Drüsen nachgewiesen hat.

Die Nothwendigkeit, meine Abbildungen zu beschränken, hielt mich ab, einschlägige Bilder beizufügen.

Die Wahrscheinlichkeit der Meyer'schen Erklärung wird fast zur Gewissheit, nachdem Sick bei einem Lymphangiom der Nebennierenkapsel die gleiche epithelioide Schwellung der Endothelien in den Lymphgängen von Becken-Lymphdrüsen gesehen hat.

Dieselbe Erscheinung beschreibt Waelsch in den regionären Lymphdrüsen bei luetischer Elephantiasis vulvae und Proctitis.

Renaut weist darauf hin, dass in Folge von Wassereinwirkung die flachen Endothelien der Lymphcapillaren bis zur Höhe prismatischer Zellen anschwellen. An frischen Gefrierschnitten, welche ich im Wasser durchmusterte, konnte ich mich in der That davon überzeugen.

Anders steht es mit den Riesenzellen, welche ab und zu in den Lymphdrüsen neben Krebsmetastasen gefunden werden. (S. Fig. 37!) Der Vergleich mit einfachen Tuberkeln, welche ich bei meinen vergleichenden Untersuchungen der Beckendrüsen einige Male antraf, lässt die Vermuthung aussprechen, dass diese unförmlichen Gebilde als eine Art von Fremdkörperriesenzellen um eingeschwemmte Bakterien oder Zellfragmente, vielleicht um todt Krebszellen entstehen.

In 2 Fällen sah ich in den Drüsen der höheren Etappe (Gl. lumbales) (bei Infection der tiefer liegenden Drüsen!) eine multiple Einwanderung von Tumorzellen in den ganzen Lymphsinus der betreffenden Drüsen. (S. Fig. 36.) Die grossen Zellkörper liegen in kleinen Verbänden, durch einen Spaltraum vom Reticulum ge-

trennt, in der Lymphbahn. Ihre Färbung ist diffus, tief dunkel und undifferenziert wie bei der Coagulationsnekrose, so dass die Annahme, es handle sich nicht um lebensfähiges Material, gerechtfertigt ist.

Im Gegensatz zu anderen Autoren kann ich ein sprungweises Wandern der Krebskeime in den Drüsen nicht anerkennen. Es waren in unseren Fällen stets ganze Drüsengruppen, niemals einzelne Drüsen befallen. S. Fig. 29, welche die Infection der hypogastrischen und sacralen Drüsen für ein Cervix-Carcinom schematisch darstellt. — Auch nach v. Rosthorn (Kermauner) und Amann sind stets Drüsengruppen befallen, mit Vorliebe die Gl. hypogastricae und sacrales. Amann, Wertheim, Kleinhans fanden inficirte Drüsen an den Vasa iliaca externa nahe dem Schenkelring. Tiburtius wies nach, dass auch beim Cervix-Carcinom zuweilen die hypogastrische Gruppe übersprungen und die nächstfolgende Etappe inficirt wird. Williams endlich nimmt als Einziger bei Corpusearcinom die Betheiligung der Inguinaldrüsen bis zu 25 pCt. an. So oft wir die geschwollenen Inguinaldrüsen bei Carc. uteri untersuchten, waren dieselben frei, oder sie erkrankten erst zur Zeit des Recidiv's.

Die Pathologischen Anatomen, welche auf dem Sectionstische die Endstadien des Gebärmutterkrebses sehen, haben auch die Fälle mit weitgehendster Betheiligung der Lymphdrüsen beschrieben: So berichtet Wagner über carcinomatöse Drüsen in der Beckentiefe an der Art. pudenda communis und am Plexus sacralis, Cruveilhier fand häufig die Gl. ischiadicae inficirt, Winkler beschreibt krebsige Drüsen am sacralen Nervengeflecht mit Infiltration der Nervenstämme (Ernst.). Williams erwähnt Fälle von Cervixcarcinom, welche eine inficirte Lymphdrüsenkette an der Bauchwand aufwärts bis zu den Supraclaviculardrüsen aufwiesen, Petit, v. Ott, Beckmann desgleichen.

Winkler berichtet über die Collumkrebse (Fall Enzmann, Unger und 4 eigene Fälle), bei welchen die verschleppten Krebskeime die ganze Suite der retroperitonealen Drüsen vom Becken aufwärts bis zur Niere befallen hatten und sogar in den Ductus thoracicus eingedrungen waren.

Solche Fälle haben mehr oder weniger anatomisches Interesse. Für die klinischen Verhältnisse bleiben sie Extreme. Bei allen diesen Befunden auf dem Sectionstisch — soweit sie nicht mikroskopisch erhärtet sind — muss man sich neuerdings die Frage

vorlegen, ob denn auch wirklich alle geschwollenen Drüsen Krebseinschlüsse enthielten. Wenngleich es bis zu einem gewissen Grade wahr bleibt, dass bei Krebsinvasion die Drüsen verhärtet oder vergrössert erscheinen, so muss doch andererseits betont werden, dass man nicht im Stande ist, makroskopisch die Diagnose auf Krebs immer mit absoluter Sicherheit zu stellen. Grosse, geschwollene Drüsen können frei, kleine und unverdächtige vom Tumor befallen sein. Der Erfahrene wird im günstigen Falle, wenn der Probeschnitt durch die frische Drüse die richtige Fläche trifft, den wirklichen Krebskeim entdecken, auch wenn er klein ist. Der Krebs geht ja stets einher mit einer Zerstörung des Drüsenbaues (s. Fig. 26 und 27). Bei Sarkomen und Endotheliomen aber war ich zuweilen nicht im Stande, die Tumordinfiltration an den nicht vergrösserten Drüsen zu diagnosticiren, so bei der Drüse Fig. 30. Es kann daher die praktische Operationsmethode, welche sich mit der Entfernung der verhärteten und (oder) vergrösserten Drüsen begnügt, theoretisch nicht für rationell erklärt werden.

Wann kommt es nun zur Bildung der Drüsenmetastasen?

Wollte ich diese Frage im streng anatomischen Sinne beantworten, so müsste die Antwort negativ ausfallen. Wir wissen den Zeitpunkt nicht. Wir müssen zugeben, dass beim Bestehen eines Krebses in jedem Moment die Metastasenbildung einsetzen kann, und dass es bei jugendlichen Personen Carcinome giebt, welche schon frühzeitig bei kleinem Primärtumor die Drüsen befallen. Der Kliniker aber braucht eine Richtschnur. Nicht die Ausnahme, sondern die Regel muss ihm als Wegweiser dienen — mit voller Berechtigung ganz besonders in dieser specifischen Frage; denn jene rasch verlaufenden, von vornherein metastasirenden Krebsformen sind durch kein auch noch so radicales Operationsverfahren heilbar. Die Fälle sind ausserdem so selten, dass sie in der grossen Masse der Gesamttumoren verschwinden.

Für die Gesamtmenge aber gilt gerade heute mehr wie je der Satz: **„Das Carcinoma uteri wächst in der Regel continuirlich und setzt erst im Spätstadium nach dem Befallen-sein von Parametrien und Ligamenten regionäre Drüsenmetastasen!“** Diese von zahlreichen deutschen Klinikern (Olshausen, Winter, Doederlein u. A. m.) vertretene Anschauung ist auch von der Pfannenstiel'schen Klinik seit Jahren verfochten worden. Ries, Wertheim, Irish waren die wesentlichsten Gegner dieser Lehre.

Wertheim begründete vor Jahren die Nothwendigkeit seiner Radicaloperation mit der Annahme, dass die Uteruskrebse frühzeitig und sprungweise bei noch freiem Parametrium die Drüsen inficiren. In jüngster Zeit hat er durch Kundrat das Resultat seiner mühsamen Forschungen veröffentlichen lassen. Von 80 bisher untersuchten Fällen erwiesen sich die Parametrien inficirt in 44 Fällen = 55 pCt. Von diesen 44 Fällen waren 22 mal die operativ entfernten Drüsen carcinomhaltig, 22 mal carcinomfrei. Von den 36 Fällen mit freien Parametrien waren nur 4 mal die Drüsen befallen. Kundrat steht nicht an, auf Grund seiner verdienstvollen Untersuchungen den Satz aufzustellen, dass der Krebs in continuo wachsend und nicht sprungweise die Parametrien infiltrire. Wir können seinen Schluss ergänzen: Bei freien Parametrien sind nur in Ausnahmefällen die Drüsen inficirt, und selbst bei befallenen Parametrien sind noch in der Hälfte der Fälle die Drüsen frei.

Unsere eigenen Erfahrungen können sich zwar nicht auf ein so grosses Material stützen, sie scheinen uns aber nicht weniger gewichtig, da sie fast ausschliesslich an vorgeschrittenen Carcinomfällen gewonnen sind. Durch einen eigenthümlichen Zufall ist uns hier in Giessen (seit April 1902) ein Krebsmaterial zugegangen, welches fast ohne Ausnahme inoperabel war oder auf der Grenze der Operabilität stand. Im Jahre 1903 fanden wir nur ein einziges Carcinom im Frühstadium mit freiem Parametrium, im Jahre 1902 nicht ein einziges.

Da die casuistische Veröffentlichung des klinischen Materials nicht in den Rahmen dieser Arbeit passt, behalte ich mir vor, darüber später zu berichten, nachdem auch die Untersuchung der in vielfacher Hinsicht interessirenden Primärtumoren einen gewissen Abschluss erreicht haben. Für unsere Feststellung genügt vorläufig die Thatsache, dass die Betheiligung der regionären Drüsen — selbst bei unserem stets mit Infiltration der Parametrien complicirten Material — das Verhältniss von 45 pCt. nicht übersteigt.

Die zu den inficirten Drüsen gehörigen Primärtumoren waren fast durchweg Cervixtumoren, nur sahen wir in letzter Zeit einen Endothelkrebs des Corpus, der bereits auf die Cervix übergegriffen hatte, mit Infection der Gl. lumbales inferiores und superiores und der Noduli lymphat. parametranes.

Klinisch infiltrirte Parametrien scheinen uns nach wie vor ein wichtiges Zeichen für den Beginn des vorgeschrittenen Stadiums.

Die infiltrirten Parametrien zeigen meiner Meinung nach dem Untersuchenden an, dass auf der Seite der Infiltration die Lymphbahnen verlegt sind und dass in Folge dessen der Strom über die andere gesunde Seite geht, weshalb man in solchen Fällen die carcinomatösen Drüsen auf der Seite des gesunden Parametrium findet. Sind beide Parametrien verlegt, so geht wahrscheinlich der Lymphstrom über die Sacralbahnen oder durch die Anastomosen zu den unteren Corpusbahnen. Wir scheiden bei der Untersuchung nach Möglichkeit entzündliche Schwarten — welche prognostisch nicht ungünstig sind — von krebsiger Infiltration, welche letztere stets durch die ganz unverhältnissmässig grosse Schrumpfung einseitige Verschiebungen der Beckenorgane, Verzerrung der Blase und des Ureters bedingt. Die Cystoskopie ist in solchen Fällen ein wesentliches Hilfsmittel zur Klärung des Falles. Ein Oedema bullosum, eine Verzerrung eines oder beider Ureteren macht die carcinomatöse Infiltration der Parametrien sicher. Wir rechnen dann von vornherein mit der Nothwendigkeit der Ureteren-Resection, welche sich in den letzten 6 Fällen 2mal als nothwendig erwies. Die resecirten Ureteren erwiesen sich trotzdem als krebsfrei.

Die Ablösung des Ureters von seiner Unterlage ist in den meisten Fällen unvermeidlich. Sie erfolgt, wenn sie bei der Abbindung der Art. uterina an deren Ursprung und bei der Drüsensuche glücklich vermieden wurde, fast mit Sicherheit beim Durchtrennen des Parakolpiums und beim Abschieben der Blase. Die secundäre Ureterfistel wird sich beim Radicaloperiren kaum ganz vermeiden lassen.

Die Drüsensuche, welche bis zu einem gewissen Grade stets unvollkommen bleibt, wird in unserer Klinik nie extrem betrieben, obwohl alle von mir erwähnten Pforten sorgfältig abgesucht werden. Insbesondere scheinen uns die Sacraldrüsen und die Gl. obturat. mehr Beachtung zu verdienen. Die Drüsen in der Beckentiefe (Lgl. ischiadicae und rectovaginales) sind auch bei dem jetzigen Radicalverfahren fast immer unzugänglich. Ihre Entfernung gelingt selbst in der Leiche nur nach breiter Ablösung des Ureters, welcher mit dem Rectum weit nach der Gegenseite hinüber verdrängt werden muss, sowie nach Auslösung der Endausstrahlung der Art. hypogastrica.

Trotzdem muss man theoretisch die Möglichkeit zugeben, dass in gewissen glücklichen Fällen mit den verhärteten und (oder) vergrösserten Drüsen alle Carcinomherde — so weit sie in den Lymph-

drüsen sitzen — radical entfernt werden können. Meist aber zerstört eben gerade in den Fällen, in welchen die Drüsensuche nothwendig war, die eventuelle Section alle vorher gehegten Illusionen, radical vorgegangen zu sein. Die mikroskopischen Befunde in makroskopisch ganz unveränderten Drüsen (s. Fig. 36) auf weit vorgeschobenen Etappen sind geeignet, die Hoffnungen sehr herab zu schrauben.

Eine Betrachtung des Verlaufes der abführenden Lymphstämme im Parametrium und Ligament (s. Figg. 1 und 2), lässt uns nicht darüber im Zweifel, dass eine Entfernung der Lymphorgane in continuo mit dem Uterus ein frommer Wunsch bleiben muss. Der erste Schnitt im breiten Ligament und in jeglichem Haftband der Gebärmutter eröffnet zahlreiche Lymphbahnen. Man kann doch die Beckenorgane nicht wie bei der Section ausschälen.

In meinen früheren Arbeiten habe ich bereits auseinandergesetzt, wie schwierig es ist, ein richtiges Zahlenverhältniss für die Beurtheilung der Drüsensuche aufzustellen.

Meiner Meinung nach bleibt für die klinische Beweisführung der Berechtigung der Drüsensuche einzig und allein die Statistik, aber eine sehr gewissenhafte, gereinigte Statistik. Nur Fälle mit positiver Drüsensuche, in welchen das Mikroskop Krebskeime in den entfernten Drüsen nachgewiesen hat, dürfen als beweisend anerkannt werden.

Wenn die Zukunft lehrt, dass man mit dem modernen Radicalverfahren nur eine gewisse Anzahl vorgeschrittener Fälle mit Sicherheit retten kann, so wird man die Operation zwar anders als bisher, aber nicht geringer werthen.

Nur wird man dann, wie ich glaube, die Drüsensuche nicht als letzten Act der Totalexstirpation nachfolgen lassen, sondern man wird sich von vornherein über die Ausdehnung der Carcinomaussaat in den Drüsen orientiren und danach die Operabilitätsgrenzen ziehen. **Die Drüsensuche muss der I. Act der Operation werden!**

Die Thatsache aber, dass nur gewisse Formen von Tumoren zur Drüseninfection neigen, während bei anderen, selbst vorgeschrittenen Fällen nicht ein Mal verdächtige Drüsen gefunden werden können — eine Thatsache, die selbst durch die Section und mikroskopische Nachprüfung erwiesen ist — muss uns ein Ansporn sein, die malignen Fälle vor den gutartigen erkennen zu lernen, damit man nicht wahllos alle, auch die gutartigen Fälle, der erhöhten Lebensgefahr und der schweren Reconvalescenz (Urin-

fistel!) aussetzt. Geht doch aus allen Statistiken hervor, dass die Häufigkeit der Drüseninfection bei wahlloser Berechnung auf alle operirten Fälle $33\frac{1}{3}$ pCt. nicht überschreitet.

Wertheim	26 : 80 =	32,5 pCt.
Glockner (Zweifel)		18,2 pCt.
v. Rosthorn	 ,	52,5 pCt.

im Durchschnitt für alle drei 34,4 pCt.

Unsere eigene Procentzahl von 45 pCt. bezieht sich nur auf die Fälle mit infiltrirten Parametrien und nicht auf die Gesamtzahl der z. Th. auch per vaginam entfernten Carcinome.

Wie bekannt ist es seit Jahren das Bestreben unserer Klinik, aus dem anatomischen Bilde der Gewebsstructur die Natur der betreffenden Tumoren erkennen zu lernen und wir glauben, die malignen Formen in den polymorphzelligen Cervixtumoren gefunden zu haben, die bald als weiche Geschwülste der Sarkom- und Endotheliomklasse, bald als Adenocarcinome mit infiltrirendem Wachsthum sich darstellen. Mag man nun je nach den persönlichen, pathologisch-anatomischen Anschauungen sich bald mehr für die Diagnose: Endotheliom, bald mehr für die Diagnose: Carcinom entscheiden, die Hauptsache bleibt doch das Erkennen jener malignen Geschwulstformen, welche proteusartig unter den wunderlichsten, histologischen Bildern erscheinen und die Classifizierung erschweren. Ich meine dabei Geschwülste, welche eben in Folge ihrer dem Carcinom für gewöhnlich fehlenden Variationsfähigkeit im Aussehen ebenso sehr dem Sarkom wie dem Carcinom sich nähern, erfahrungsgemäss an den Geschwulstausläufern Uebergangs- oder Entstehungsbilder aus den Lymph- oder Blut- Endothelien erkennen lassen und in Folge einer gewissen Affinität zum Stroma schrankenlos wuchernd mit einer raschen Zerstörung des Mutterbodens einhergehen. Es fehlt die trennende Endothelhaut, welche beim Krebs die Zellpröpfe vom umgebenden Stroma scheidet. Die Zellen dringen wie ausgestreut in unregelmässigen Grenzen vor; namentlich in den Lymphdrüsen-Metastasen kommt diese diffuse Infiltration und die zerissene, gewissermassen lichterliche Zeichnung der Alveolengrenzen zum Vorschein.

Somit bleiben eben diese Tumoren eine wohlcharakterisirte, vom Carcinom zu scheidende Gruppe und verdienen ihre Sonderstellung ebenso wie z. B. die sogenannten Peritheliome, die wohl besser als Angiosarkome zu bezeichnen sind; denn es handelt sich bei ihnen um eine Geschwulstproliferation der gesamten Gefäss-

wandbestandtheile mit Ausnahme der erhalten bleibenden Endothelmembran und der *Elastica interna*. Gerade dass in den Endotheliomen sarkomatöse angiosarkomatöse Felder sich finden, bestärkt mich in der Annahme, sie eher den Tumoren der Bindegewebsklasse als den Epitheliomen zuzurechnen. In vorgeschrittenen Fällen mag es zuweilen schwierig, ja unmöglich sein (Gebhard), die Histogenese differentialdiagnostisch zu klären. Aber wir müssen doch, meine ich, versuchen, durch Differenzirung in der Erkennung der Tumoren weiterzukommen, und dürfen nicht alle Geschwülste des Uterus einfach als Carcinome betrachten. Lehren uns doch die Arbeiten der besten Beobachter (Veit, v. Rosthorn, Pfannenstiel, E. Kaufmann, v. Franqué, Pick, Opitz), dass die malignen Tumoren des Uterus zahlreiche Besonderheiten aufweisen.

Für die klinische Berechnung ist es von grosser Wichtigkeit, alle oberflächlichen Plattenepithelkrebse der Vaginalportion als: „Vaginalcarcinome der Portio“ von den Erosionscarcinomen, welche den Cervixkrebsen zuzurechnen sind, zu trennen. Freilich bilden auch die letzteren Plattenepithel- und Hornkrebsbilder. Aber daneben bleiben wohl immer polymorphe Formationen übrig, welche die Metaplasie aus dem Cylinder-Epithel diagnostiziren lassen. Die Zellen der echten Vaginalcarcinome bilden einförmige, in die Breite sich dehnende Elemente mit flachem Kern, bei den Erosionscarcinomen sind selbst im geschichteten Plattenepithel häufig auf breite Strecken die Kerne nicht flach, sondern längs neben- und übereinander gestellt, wie etwa im geschichteten, embryonalen Uebergangsepithel.

Die Differenzirung der Tumoren nach ihrem Sitz und histologischen Bau erscheint mir um so unerlässlicher, je mehr aus allen detaillirten, klinischen Beobachtungen zahlenmässig ein verschiedenes Verhalten der einzelnen Gebärmutterabschnitte hinsichtlich der Schnelligkeit der Drüseninfection hervorgeht.

Dass die reinen Portio- und die Körperkrebse überhaupt erst sehr spät zur Drüseninfection neigen, ist wohl allgemein anerkannt. Für Cervixcarcinome werden widerstreitende Angaben gemacht. Cullen behauptet: „auch die Cervixkrebsen setzen erst in den Spätstadien Lymphdrüsenmetastasen.“ Belloeuf, Ries, Irish, v. Rosthorn, Doederlein, Oehlecker, Wertheim, ich selbst u. A. m. fanden gerade bei Cervixtumoren frühzeitiger als sonst inficirte Drüsen. Ich glaube, dass nach dem Studium der letzten

Arbeiten auf diesem Gebiet (Kermauner und Laméris, Kroemer, Oehlecker, Tiburtius, Gellhorn), ein Zweifel über die relativ rasche Verbreitung der Cervixtumoren, in deren Rahmen sich ja auch die Endotheliome verbergen, gänzlich ausgeschlossen ist.

Freilich setzen auch die echten Portio (vaginal) - Carcinome Drüsenmetastasen, aber viel seltener und in der Regel im Spätstadium. Man ist erstaunt, in den verschiedenen Arbeiten bei Berichten über reichliche Carcinomaussaat in den Lymphdrüsen am Schlusse der Schilderung des Primärtumors so häufig die Diagnose: „Infiltrirender Cervixkrebs“ zu lesen. Dieser Name schildert nur das charakteristische, periphere Fortschreiten der polymorphen Tumoren, die im Uebrigen local nach unseren Erfahrungen weiche, rasch zerfallende Adenocarcinompartieen neben mehr soliden, alveolären Feldern und infiltrirenden Zügen bilden können. Es ist der Ausdruck: infiltrirendes Cervixcarcinom nicht absolut identisch mit Scirrhus, obwohl auch bei dieser Krebsform nicht selten mächtige Metastasen bei kleinen Tumoren sich finden.

Die klinischen Erfahrungen stimmen mit den obigen Anschauungen überein (v. Rosthorn: „Cervixcarcinome geben die schlechteste Prognose“. Pfannenstiel: Cervixkrebse werden am raschesten inoperabel, weil sie am frühesten die Parametrien erreichen.“).

Natürlich spielt bei der Frage der Metastasirung auch die allgemeine Constitution, die Weite der Lymphbahnen und die Lebhaftigkeit des Säftestromes eine Rolle. Zu Zeiten, wo die Genitalien in besonders reichem Säfteaustausch stehen, wird die Verschleppung eher erfolgen; so bei jugendlichen Krebskranken, vor allem bei denen in graviditate bzw. in puerperio entstehenden Tumoren, an welchem Abschnitt des Uterus sie auch sitzen mögen.

Die Indicationsstellung unserer Klinik sucht diesen Erwägungen Rechnung zu tragen.

Die entscheidende Fragestellung lautet in jedem Falle:

1. „Sind inficirte Drüsen mit Wahrscheinlichkeit zu erwarten?“
- und 2. „Bietet die Drüsenausträumung noch Aussicht auf Erfolg?“

Practisch unterscheiden wir zwischen beginnenden und vorgeschrittenen Fällen und wenden das **abdominale Radicalverfahren** mit Drüsensuche an

a) bei beginnenden Fällen von

1. Sarkom oder Endotheliom, an welchem Theil des Uterus der Tumor auch sitzen mag,

2. jugendlichen und Graviditäts- (Puerper.-) Carcinomen,
3. rasch zerfallendem Cervikrebs mit infiltrirendem Wachsthum;

b) bei vorgeschrittenen Krebsformen

1. der Portio uteri,
2. des Corpus uteri,

soweit sie nicht in a enthalten sind.

Die **vaginale Totalexstirpation** genügt für die beginnenden, reinen Portio- und die Körperkrebse ohne Complication, natürlich stets mit Scheidendammnecision und breiter Mitnahme der Parametrien.

Die vorgeschrittenen, weichen Geschwulstformen der Klasse a sind überhaupt nicht mehr operabel. Bei diesen wird selbst die radicalste Drüsensuche unvollkommen bleiben, was bisher noch alle Sectionsergebnisse demonstirten.

Als nothwendige Folge meiner Ausführungen muss ich somit 3 Forderungen aufstellen:

1. Zur Indicationsstellung ist eine Probeexcision mit peinlich genauer, mikroskopischer Untersuchung unerlässlich,
2. In den Statistiken müssen die Radicaloperirten mit positiver (mikroskopisch als nothwendig erwiesener) Drüsensuche von den Uebrigen getrennt werden,
3. Das zur Section kommende Material muss für die mikroskopische Untersuchung ausgenutzt werden.

Die Section soll uns zeigen, was die Drüsensuche anatomisch leistet, die klinische Beobachtung, welche Erfolge für die Operirten daraus resultiren.

Das Material, welches der vorliegenden Arbeit zu Grunde liegt, ist mir von meinem hochverehrten Chef, Herrn Professor Dr. Pfannenstiel zur Verfügung gestellt worden. Dafür und für das Wohlwollen, mit welchem er diese meine Untersuchungen gefördert hat, sage ich ihm an dieser Stelle meinen wärmsten Dank. Auch Herrn Geheimen Medicinalrath Professor Dr. Bostroem danke ich für die gütige Ueberlassung des Sectionsmaterials.

Literatur-Verzeichniss.

A. Anatomischer Theil.

- 1) Amann jr., Ueber den Beginn und die Verbreitung der Lymphgefäße im Uterus. Vortrag in der Gesellschaft f. Morphologie u. Physiologie zu München. 17. Februar 1891.
- 2) Aristoteles, *Περὶ Ἀδένων* nach der Uebersetzung von Mascagni s. unten.
- 3) Asellius, Caspar, De lactibus, sive de venis lacteis; Dissertatio. Mediolani. 1627.
- 4) Auspitz, Die Bubonen der Leistengegend. Archiv für Dermatologie u. Syphilis. 1873. Bd. V. S. 443.
- 5) Bartholinus, Thomas, De lacteis thoracicis in homine brutisque nuperime observatis. Disputatio Hafniae. 1652.
- 6) Bonnet, Des kystes et abcès des glandes vulvo-vaginales. Gazette des hôpitaux. 1888. S. 637.
- 7) Bonnet, R., Grundriss der Entwicklungsgeschichte der Haussäugethiere. Berlin. 1891. (Ref. in Merkel-Bonnet's Jahresberichten. 1891. Bd. 1.) Confr. Polano.
- 8) Beaunis et Bouchard, Nouveaux éléments d'anatomie descriptive. 3. éd. 1888.
- 9) Braune, Hinterlassene Schriften. Cit. von His, Die anatomische Nomenclatur. Archiv f. Anat. u. Phys. Anatom. Abth. Jahrg. 1895. Supplementband.
- 10) Bruhns, C., Ueber die Lymphgefäße der weiblichen Genitalien. Archiv f. Anat. u. Phys. Anat. Abth. 1898. S. 57.
- 11) Lucas-Championnière, Lymphatiques utérins et lymphangite utérine. Thèse. Paris. 1870.
- 12) Chrobak und v. Rosthorn, Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane. I. Theil. Wien. 1900.
- 13) Trzaska-Chrzonszczewsky in Kiew. Ueber meine Methode der physiologischen Injection der Blut- und Lymphgefäße. Virchow's Archiv f. path. Anat. etc. Bd. 153 S. 110.
- 14) Cruikshank's, William und Paul Mascagni's Geschichte und Beschreibung der Saugadern des menschlichen Körpers. Uebersetzt von Ludwig. Leipzig. 1789.
- 15) Cruveilhier, Anatomie descriptive. T. III. Paris. 1834.
- 16) Derselbe, Anatomie pathologique du corps humain. Livre III et XIII.
- 17) Debierre, Traité élémentaire d'anatomie de l'homme. 1890.
- 18) v. Ebner, V., A. Kölliker's Handbuch der Gewebelehre des Menschen. 6. Aufl. III. Band. Leipzig. 1902.
- 19) Encyclopaedie der mikroskopischen Technik mit besonderer Berücksichtigung der Färbelehre von P. Ehrlich, R. Krause, M. Mosse, H. Rosin, C. Weigert. Wien. Urban u. Schwarzenberg. 1903.

- 20) Fioupe, Lymphatiques utérins et parallèle entre la lymphangite et la phlébite utérines. Thèse de Paris. 1876. Confr. Bruhns.
- 21) Flemming, Zur Anatomie kleinerer Lymphgefäße. Archiv für mikroskopische Anatomie. Bd. 12.
- 22) Derselbe u. seine Schüler, Ueber die Zellvermehrung in den lymphoiden Drüsen. Archiv für mikroskop. Anat. Bd. 24.
- 23) Freund, W. A., Ueber die Methoden der tot. Exstirpation des Uterus etc. Beitr. zur Geb. u. Gyn. Vol. I.
- 24) Derselbe, Referat über Carcin. uteri zum IX. Congress der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie. Giessen. 1901.
- 25) Frey, H., Untersuchungen über die Lymphdrüsen. Leipzig. 1861.
- 26) Fridolin, P., Des vaisseaux lymphatiques de l'utérus gravis. Russische Militärärztl. Zeitschr. Petersburg. 1872. Confr. Bruhns.
- 27) Gerota, D., Zur Technik der Lymphgefäß-Injection. — Eine neue Injectionsmasse etc. Anatomischer Anzeiger. 1896. Bd. XII. No. 8.
- 28) Derselbe, Ueber die Lymphgefäße und die Lymphdrüsen der Nabelgegend und der Harnblase. Anatom. Anzeiger. 1896. XII. S. 89.
- 29) Derselbe, Die Lymphgefäße des Rectums und des Anus. Archiv für Anat. u. Phys. Anatom. Abth. 1895. S. 240.
- 30) Gulland, Ueber die Entwicklung der Lymphknoten. The Journ. of Pathol. and Bacter. Edinburgh. 1894. Vol. II.
- 31) Haase, J. G., De vasis cutis et intestinorum absorbentibus plexibusque lymphaticis pelvis humanae. Annotationes anatomicae cum iconibus. Lipsiae. 1786.
- 32) de Haller, Albert, Elementa Physiologiae. Lausanne. 1757. Vol. VII.
- 33) Hansen, Armaner, Beitr. zur normalen und pathologischen Anatomie der Lymphdrüsen. Virchow's Arch. Bd. 56.
- 34) Heidenhain, R., Vorlesungen über Physiologie. Breslau. 1893—1894.
- 35) Herasistratus, De Administr. Anat. Lib. VII.
- 36) Herophilus, De usu partium. Liber IV, c. 19.
- 37) His, Ueber die perivasc. Lymphdr. Zeitschr. für wissenschaftl. Zoologie. Bd. XV. S. 127.
- 38) His, Die anatomische Nomenclatur. Arch. für Anat. u. Phys. Anat. Abth. 1895. Suppl.-Bd.
- 39) His, W., Beobachtungen über den Bau des Säugethier-Eierstocks. Arch. für mikrosk. Anat. Bd. I. 1865.
- 40) Hoggan, G. u. F., Comparative anatomy of the lymphatics of the uterus. Journ. of anatom. and Physiol. 1882. XVI. S. 50.
- 41) Hugier, Mémoire sur les appareils sécrétoires des organes génitaux externes chez la femme et chez les animaux. Annales des sciences natur. III. Se. T. XIII.
- 42) Hoffmann, Carl, Lehrbuch der Anatomie des Menschen. 1877. I. u. II.
- 43) Jolivius (Georges Jolyff), Nihil scriptum reliquit, cfr. Mascagni's Atlas, pag. 3.
- 44) Kölliker, A., Mikroskop. Anatomie. II. 2.
- 45) Derselbe, Handbuch der Gewebelehre. 6. Aufl. Bd. III.
- 46) Kraus, E., Ueber das Zustandekommen der Krebsmetastasen im Ovarium etc. Monatsschr. f. Geb. u. Gyn. XIV. H. 1.

- 47) Leopold, Die Lymphgefäße des normalen, nicht schwangeren Uterus, Dieses Archiv. Bd. VI. S. 1.
- 48) Lindgren, Studier öfver lifmodrens byggnad hos menniskan. Stockholm 1867, cfr. Leopold. Med. Arch. III. Bd. III. No. 13.
- 49) Luschka, Die Anatomie des menschl. Bauches. Tübingen 1863.
- 50) Mascagni, Vasorum lymphaticorum corporis humani Historia et Ichno-graphia auctore Paulo Mascagno, publico Anatomes professore, Senis, ex Typ. Pazzini Carli. 1787.
- 51) Martin, E., Handatlas der Gynäk. und Geburtsh. Berlin. 1878.
- 52) Martin u. Léger, cit. nach Bruhns. No. 10. S. 66.
- 53) Miercejewski, Recherches sur les lymphatiques de la couche sous-séreuse de l'utérus. Journal de l'Anat. et de la Physiol. 1879. p. 201.
- 54) Moran, Remarques sur les vaisseaux lymphatiques des organes génitaux de la femme et leurs anastomoses avec ceux du rectum. Comptes rendus de la Société de biologie 1894. No. 33. p. 812.
- 55) Nuck, Antonii, Adenographia curiosa uteri feminei anatome nova. Lugd. Bat. 1691.
- 56) Peiser, E., Anatom. u. klinische Untersuchungen über den Lymphapparat des Uterus mit besonderer Berücksichtigung der Tot. exst. des Uterus. Inaugural-Dissertation. Breslau 1898. Zeitschr. f. Geb. und Gyn. Bd. 43. S. 259.
- 57) Poirier, P., Lymphatiques des organes génitaux de la femme. Progrès médical. 1889. II. p. 491ff.
- 58) Derselbe, Du rôle des lymphatiques dans les inflammations de l'utérus, des annexes et du péritoine pelvien. Progrès. méd. 1890. I. p. 41 ff.
- 59) Derselbe, Quinze leçons d'anatomie pratique. Paris. 1892.
- 60) Polano, O., Zur Technik der Darstellung von Lymphbahnen. Deutsche med. Wochenschr. 1902. No. 27.
- 61) Derselbe, Beitrag zur Anatomie der Lymphb. im menschlichen Eierstock. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäk. 1903. Bd. 17. H. 3 u. 4.
- 62) Quénu, Vaisseaux lymphatiques de l'Anus. Bulletins de la Soc. anatom. de Paris. 1893. Juin. Fasc. No. 16.
- 63) Quain's, Anatomy. 8 éd. 1876.
- 64) Ranvier, Ueber die Entwicklung der Lymphspalten. Archiv d'anatom. mikroskop. T. 1.
- 65) Derselbe, Comptes rendus de l'Acad. des Sciences. T. 123. p. 1038.
- 66) Derselbe, Du système lymphatique. Leçons — Progr. méd. 1873.
- 67) Rauber, Lehrbuch der Anatomie. 1893. 4. Aufl. Bd. II. S. 223.
- 68) Recklinghausen, Zur Fettresorption. Virchow's Archiv. Bd. XXVI.
- 69) Derselbe, Die Lymphgef. u. ihre Beziehung zum Bindegewebe. Berlin. 1862.
- 70) Derselbe, Das Lymphgefäßsystem in Stricker's Handbuch der Lehre von den Geweben. Leipzig. 1871.
- 71) Richet, Anatomie médico-chirurgicale. 4 éd. 1874.
- 72) Rille, J. H., Bartholinitis u. Leistendrüsen. Arch. f. Dermatol. u. Syphilid. 1896. Bd. XXXVI. S. 381.
- 73) Rudbekius (A. Rudbeck), De sero eiusque vasis. Upsal. 1661 denue in Selectis Halleri Tom. VII edita; nova exercitatio anatomica exhibens ductus hepatis aquosos et vasa glandularum serosa. Arrosiae 1653.

- 74) Sack, Ein Fall von allgemeiner Lymphstauung (Stauungsödem) der Haut nach Vereiterung des grössten Theils d. region. Lymphdr. München. med. Woch. 1903. No. 3.
- 75) Sappey, Ph. C., *Traité d'Anatomie descriptive*. Ed. 4. Paris. 1888.
- 76) Derselbe, *Description et iconographie des vaisseaux lymphat. considérés chez l'homme et les vertébrés*. Paris. 1885.
- 77) Saxer, Ueber die Entwicklung der Lymphknoten. *Anatom. Hefte*. Bd. 6.
- 78) Schwarz, A., Ueber die Lymphg. des Ovarium. Ref. bei Miercejewski 47.
- 79) Stahr, In dem Atlas der topograph. Anatomie des Menschen von K. v. Bardeleben u. H. Häckel. 2. Aufl. Jena. 1901. Fig. 118.
- 80) Tarnier, Cit. nach Bruhns (10). S. 66. Note 4.
- 81) Teichmann, *Das Saugadersystem*. Leipzig. 1861.
- 82) Testut, *Traité d'Anatomie humaine*. 1893.
- 83) Tillaux, *Traité d'Anatomie topographique*. 1887. p. 918.
- 84) Waldeyer, W., *Das Becken*. Bonn. 1899.
- 85) Derselbe, *Eierstock und Ei*. Leipzig. 1870.
- 86) Wallich, *Recherches sur les vaisseaux lymphat. sous-séreux de l'utérus gravide et non gravide*. Thèse de Paris. 1891.
- 87) Wessling (Veslingius), *Epistolae post.* Cit. nach Mascagni (44).

B. Pathologisch-Anatomischer Theil.

- 1) Abel und Landau, Beitr. zur normalen u. patholog. Anatomie des Gebärmutterhalses. *Dieses Archiv*. XXXVIII. S. 199.
- 2) Afanassiew, *Centralbl. f. d. medic. Wissensch.* 1876.
- 3) Amann, J. A., Jr., Zur Technik der transperiton. Exstirpation etc. *Monatsschr. für Geburtsh. u. Gynäk.* Bd. XVI. S. 290.
- 4) Baier, K., Ueber die Regeneration u. Neubildung der Lymphdrüsen. *Prager Zeitschr. f. Heilkunde*. Bd. 6. S. 105 und Bd. 7. S. 423.
- 5) Beckmann, W., Einige klinische Beobacht. über Uteruscarcinom. *Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.* Bd. 45. S. 492.
- 6) Belloeuf, *Thèse de Paris*. 1900.
- 7) Blau, Einiges Pathologisch-Anatom. über den Gebärmutterkrebs. In: *Dissertation*. Berlin. 1870.
- 8) Borst, *Die Lehre von den Geschwülsten*. Wiesbaden. 1903.
- 9) Bourgéry et Jacob, *Traité complet de l'Anatomie de l'homme*. Paris. 1851.
- 10) Bozzolo, Verbreit. der Krebsneubild. in den Lymphdrüsen. *Centralblatt f. d. medic. Wissensch.* 1876.
- 11) Broese, Demonstrat. in der Berliner geburtsh. Gesellsch. 9. VI. 1899. *Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.* Bd. 41.
- 12) Chrobak, R., *Wiener klin. Wochenschr.* 1900. No. 40.
- 13) Clark, J. G., A more radical method of performing hysterectomy for cancer of the uterus. *Johns Hopkins Hosp. Bull.* 1895. Vol. VI.
- 14) Derselbe, Ten cases of cancer of the uterus operated upon by a more radical method of perform. hysterectomy. *J. Hopk. Hosp. Bull.* 1896. Vol. VII.
- 15) Courtois - Suffit, *Journal des Praticiens*, 1901, No. 21 über Lymphdrüsenveränderungen bei Uteruskrebs.

- 16) Cruveilhier, Anatomie pathologique du corps humain. Paris. 1832 bis 1842.
- 17) Cullen, T. S., The cancer of the uterus. 1900.
- 18) Derselbe, Med. Record. Dec. 9. 1899.
- 19) Cushing, J. of Am. med. Ass. July 26. 1902.
- 20) Dittrich, Pathologisch-Anatom. Bericht. Vierteljahrschr. f. pract. Heilkunde. Prag. 1845. 46.
- 21) Doederlein, A., Ueber abdomin. Exstirp. d. carcin. Uterus nach Wertheim. Centralbl. f. Gynäk. 1903. No. 26. S. 681.
- 22) Dybowski, Zur Statistik des Gebärmutterkrebses u. seine Metastasen, In. Dissert. Berlin. 1880.
- 23) Florenzo d'Erchia, Beitr. zum Studium d. prim. Uteruskr. Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Bd. 38. H. 3.
- 24) Ernst, Verbr. des Carcin. in den Lymphb. der Nerven. Verhandl. der Deutsch. pathol. Ges., 4. Tag. Hamburg. 1902. Ref. Centralbl. f. Gynäk. 1902. No. 38.
- 25) Emanuel, Hornkrebs d. Corpus uteri. Zeitschr. f. Geburts. u. Gynäk. Bd. 32. S. 477.
- 26) Derselbe, Ueber gleichzeit. Vorkommen v. Drüsenkrebs und Hornkrebs im Uteruskörper etc. Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Bd. 46. S. 434.
- 27) Falkner, A., Zur Frage der epithelialen Einschlüsse in Lymphdrüsen. Centralbl. f. Gynäk. 1903. No. 50.
- 28) Fränkel E. u. G. Wiener, Drüsenkrebs d. Uterus. Hegar's Beitr. z. Geb. u. Gyn. Bd. II. H. 3.
- 29) v. Franqué, O., Das beginnende Portiocancroid u. d. Ausbreitungswege d. Gebärmutterkrebses. Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Bd. 44. H. 2.
- 30) Freund, A. W., Ueber die Methoden d. Tot.-Exstirp. d. Uterus etc. Beitr. zur Geb. u. Gyn. Bd. I. S. 343.
- 31) Derselbe, Carcinoma uteri. Referat für den IX. Congress d. Deutsch. Ges. für Gynäk. Giessen. 1901. (Referat und Verhandlungen.)
- 32) Freund, H. W., Zur erweiterten Freund'schen Oper. bei Krebs d. Gebärmutter. Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Bd. 46. S. 206.
- 33) Freund, R., Unteres Uterinsegment u. beginnendes Cervixcarcinom bei einem Fall von fibrösen Polypen des Cervix. Hegar's Beitr. z. Geburtsh. u. Gyn. 1900. Bd. 3. H. 2.
- 34) Funke, A., Beitr. zur abdomin. Tot.-Exstirp. etc. München. medicin. Woch. 1901. S. 309 und Zeitschr. f. Geb. u. Gynäk. Bd. 36. 1897 und Bd. 39. 1898.
- 35) Gebhard, C., Patholog. Anatomie d. weibl. Sexualorgane. Leipzig. 1899.
- 36) Derselbe, Eine Mischgeschwulst d. Uterus. Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Bd. 48. S. 111.
- 37) Gellhorn, G., The Lymph Glands in Uterine Cancer. Repr. from American Gynecology. Nobr. 1902.
- 38) Gessner, Carcinomatös degenerirter Drüsenpolyp d. Corpus. Verh. d. Berlin. Ges. f. Geb. u. Gyn. 8. Novbr. 1898.
- 39) Derselbe, Ueber den Werth u. die Technik d. Probecurettements. Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Bd. 34. S. 3.

- 40) Derselbe, Münchener med. Wochenschr. 1902. S. 78.
- 41) Glockner, Verhandl. d. Deutsch. Ges. f. Gyn. 3.—6. Juni 1903. Würzburg.
- 42) Goldmann, Anatom. Untersuch. über die Verbreitungswege bösartiger Geschwülste. Bruns Beitr. z. klin. Chirurgie. 1897. Bd. 18.
- 43) Gussenbauer, Ueber die Entwicklung der secundären Lymphdrüsen-geschw. Prager Zeitschr. f. Heilkunde. 1881. Bd. 2.
- 44) Hammerschlag-Schlan, Ueber Vermehrung erkrankter Lymphdrüsen. Verhandl. d. Deutsch. Patholog. Ges. 22.—26. Septbr. 1902. 5. Tag. Karlsbad. 1902.
- 45) Hellendahl, H., Ueber Impfcarcinome am Genital-Tractus. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk. Bd. VI. S. 422.
- 46) v. Herff, O., Zur Drüsenausräumung bei Carcin. uteri. Hegar's Beitr. zur Geburtsh. u. Gynäk. Bd. 6. S. 1.
- 47) Herzfeld, Wiener klin. Wochenschr. 1900. No. 48.
- 48) Hitschmann, Ein Beitr. zur Kenntniss des Corpuscarc. Dieses Archiv. Bd. 69. H. 3.
- 49) Hofmeier, Zur Anatomie u. Therapie des carc.corp. ut. Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Bd. XXXII. 2. S. 171.
- 50) Derselbe, Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gynäk. 1866 und 1894. — Verhandl. d. Deutsch. Ges. f. Gynäk. 1901. Giessen. 9. Tagung.
- 51) Joerss, Cit. nach Goldmann (No. 42).
- 52) Irish, J. C., Abdominal Hysterectomy for Cancer of the Cervix. Boston Med. and Surg. Journ. 1899 p. 251.
- 53) Jordan, Die chirurgische Behandlung der Uteruscarcinome Zeitschr. f. Geburtsh. und Gynaek. Bd. 45. S. 300.
- 54) Katzenstein, Demonstr. eines seit 16 Jahren bestehenden Carcinoma corporis uteri. Zeitschr. f. Geburtsh. n. Gynaek. Bd. 42. S. 176.
- 55) Kaufmann, E., Lehrbuch der patholog. Anatomie. II. Aufl.
- 56) Derselbe, Eine eigenartige Form carcinom. Entartung des Endometr. corporis uteri. Verhandl. d. Schles. Ges. f. vaterländ. Kultur. 5. Mai 1894.
- 57) Derselbe, Untersuchungen über das sogenannte Adenoma malignum, speciell dasjenige der Cervix uteri nebst Bemerkungen über Impfmatastasen in der Vagina. Virchow's Archiv f. path. Anat. Bd. 154. 1.
- 58) Keitler, H., Zur klinischen Dignität der Cervicalpolypen. Hegar's Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk. Bd. III. H. 2. S. 309.
- 59) Kelly, H. A., Notes on an Improved Method of Removing the Cancerous Uterus by the Vagina. Bull. J. Hopkins Hosp. March. 1900.
- 60) Derselbe, The Present Status of Operations for Cancerous Uteri. Journ. Americ. Med. Ass. 19. May 1900.
- 61) Kermauner u. Laméris, Zur Frage der erweiterten Radicaloperation des Gebärmutterkrebses. Beitr. z. Geburtsh. und Gyn. Bd. V. No. 1.
- 62) Kermauner, Diskussionsbericht über 52 Fälle von abdomin. Radicaloperationen aus der Grazer Frauenklinik ref. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Bd. XVIII. H. 4. S. 614.
- 63) Klein, G., Die operative Behandlung des Gebärmutterkr. Münchener medic. Wochenschr. 1903. No. 11 und 12. S. 472 und 513.

- 64) Derselbe, Die chirurgische Behandlung der Ut. carc. 4. internat. Congr. zu Rom. Ref. Centralbl. f. Gynäk. 1902. S. 1353.
- 65) Derselbe, Carcinoma uteri. Naturforsch.-Vers. zu Karlsbad. Centralbl. f. Gynäk. 1902. S. 1146.
- 66) Kleinhans, F., Erfahrungen über die abdominale Radic.-Op. des Uteruscarc. Prag. med. Wochenschr. No. 48, 49, 50 u. 51.
- 67) Koenig, R., Abdominale Radical-Op. bei Uteruscarcinom. Hegar's Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk. Bd. II. H. 2. S. 402.
- 68) Kraus, E., Siehe im Literatur-Verz. Theil A.
- 69) Kroemer, Klinische und anatomische Untersuchungen über den Gebärmutterkrebs. Dieses Archiv. Bd. 65, No. 3.
- 70) Derselbe, Ueber die Lymphorgane der weibl. Genitalien und ihre Veränderungen bei Carcinoma uteri. Monatsschr. f. Geburtsh. und Gynäk. Bd. XVIII. H. 5. S. 673.
- 71) Derselbe, Ueber Drüsenbefunde bei Carcin. uteri. Verhandlungen d. d. Deutschen Gesellschaft für Gynäk. Bd. X.
- 72) Kroenig, B., Zur Technik der abdom. Totalexstirp. des carcinomat. Uterus. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Bd. XV. S. 879.
- 73) Derselbe, Gleichzeit. Vork. von Uterus- u. Magencarc. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Bd. XV. S. 896.
- 74) Derselbe, Die doppels. Unterb. der Aa. hypogastr. u. ovaricae. Zur palliat. Beh. des Ut. carc. Centralbl. f. Gynäk. 1902. S. 1073.
- 75) Derselbe, Diskussionsvortrag über d. Wertheim'sche Oper. Ref. Centralbl. f. Gynäk. 1902. No. 26.
- 76) Küttner, H., Die perforirenden Lymphg. des Zwerchfells u. ihre pathologische Bedeutung. Beitr. z. klin. Chirurgie. Bd. 40. 1903. S. 136.
- 77) Kuestner, O., Ueber die Freund'sche Operation bei Gebärmutterkrebs Samml. klin. Vortr. No. 204.
- 78) Derselbe, Verhandl. d. Deutsch. Ges. f. Gynäk. Bd. IX. 1901. S. 100.
- 79) Lubarsch, Geschwülste, Ergebnisse der allgem. Pathologie u. pathologischen Anatomie. 1895. Jahrg. I. Abth. 2.
- 80) Kundrat, Ueber die Ausbr. d. Carcinoms im parametr. Gewebe bei Krebs des Collum uteri. Dieses Archiv. Bd. 69. S. 355.
- 81) Kunze, Ein Fall von zahlreichen Impf-Metastasen eines primär. Plattenepithelkr. der Cervix auf d. Mucosa des Cavum ut. Hegar's Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk. Bd. 4. S. 31.
- 82) Mackenrodt, A., Beitr. z. Verbesserung der Dauerresultate der Total-exstirp. bei Carc. ut. Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Bd. 29. 1894.
- 83) Derselbe, Verhandl. d. Deutsch. Gesellsch. f. Gynäk. 1901. IX. S. 139.
- 84) Derselbe, Verhandl. der Deutsch. Gesellsch. f. Gynäk. 1903. X. und ebenda 1902. S. 1207.
- 85) Derselbe, Centralbl. f. Gynäk. 1901.
- 86) Derselbe, Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Bd. 47. S. 126 und 152, ebenda Bd. 48. S. 188.
- 87) Martin, A., Verhandl. d. Deutsch. Gesellsch. f. Chirurgie. XIII. Berlin. 12. April 1901.
- 88) Menge, Diskussionsvortrag zur Frage der Radical-Operat. bei Carc. ut. Centralbl. f. Gynäk. 1902. No. 26. S. 701.

- 89) Meyer, R., Ueber epitheliale Hohlräume in Lymphdrüsen. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. u. Gynäk. zu Berlin. Zeitschr. f. Geburtsh. und Gynäk. Bd. 49. S. 554.
- 90) Odebrecht, 1 Fall von lange best. Uteruscarcinom ohne Metastasen. Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Bd. 42. S. 177.
- 91) Oehlecker, Drüsenuntersuchungen bei 7 Fällen von Uteruscarcinom. Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Bd. 48. H. 2.
- 92) Olshausen, R., Zur Statistik u. Operat. des Gebärmutterkrebses. Verhandl. d. Deutsch. Gesellsch. f. Gynäk. IX. S. 156.
- 93) Derselbe, Ueber Impfmetastasen und Spätrecidive nach Carcinomoperationen. Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Bd. 48. H. 2.
- 94) Derselbe, Zum Vergleich der vaginalen u. abdominalen Operationsmethode bei Carcinoma uteri. Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Bd. 50. H. 1. S. 1.
- 95) Opitz, Zwei ungewöhnliche Uterus-Carcinome nebst Bemerkungen zur Theorie der bösartigen Geschwülste. Bd. 49. S. 169.
- 96) v. Ott, Dimitri, Ueber die operat. Behandlung des Gebärmutterkrebses. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Bd. 12. S. 261.
- 97) Peiser, E., Anatom. u. klin. Untersuchungen über den Lymphapparat des Uterus etc. Zeitschrift f. Geburtshilfe und Gynäkologie. Bd. 43. S. 259.
- 98) Petersen, Verhandl. des 13. Congresses der Deutsch. Gesellsch. für Chirurgie. Berlin 1902.
- 99) Petit, A., Ganglion sus-claviculaire gauche cancéreuse dans un cas de cancer de l'utérus. Bull. et Mém. Soc. Méd. d'Hôp. Paris. 1888. 26.
- 100) Petrik, Ueber die Verbreitung des Carcinoms in den Lymphdrüsen. Deutsche Zeitschr. f. Chirurgie. Bd. 32. 1891.
- 101) Pfannenstiel, J., Ueber die Heilerfolge bei Krebs der Gebärmutter. Centralbl. f. Gyn. 1901. S. 361.
- 102) Derselbe, Ueber das gleichzeitige Auftreten von Carcinom am Collum und am Körper des Uterus. Ebenda. 1892. S. 841.
- 103) Derselbe, Beitr. zur pathol. Anat. u. Histogenese des Uteruskrebses etc. Ebenda. 1893. No. 78.
- 104) Puppel, E., Ueber die Ausbreitung des Gebärmutterkrebses in präformierten Lymphbahnen. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Bd. 13. S. 76 und Beitr. zum Studium der Ausbreitung des Gebärmutterkrebses etc. Inaug.-Dissert. Königsberg. 1900. (Virchow's Archiv. Bd. 140.)
- 105) v. Recklinghausen, Ueber die venöse Embolie und den retrograden Transport in den Venen und in den Lymphgefäßen. Virchow's Archiv f. pathol. Anat. etc. 1885. Bd. 100.
- 106) Ribbert, Ueber Regeneration und Entzündung der Lymphdrüsen in Ziegler's Beitr. zur path. Anat. etc. Bd. 6 S. 187.
- 107) Riechelmann, W., Eine Krebsstatistik vom pathologisch-anatomischen Standpunkt. Berl. klin. Wochenschr. 1902. No. 31—32.
- 108) Ries, E., Eine neue Operationsmethode des Uteruscarcinoms. Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gynäk. 1895. Bd. 32.
- 109) Derselbe, Eine neue Operationsmethode des Uteruscarcinoms. Ebenda. 1897. Bd. 37.

- 110) Ries, E., Results of the Extended Operations for carcinoma of the Uterus. *Americ. Gyn. and Obst. Journ.* Vol. 13 p. 570.
- 111) Derselbe, Recent Developments in Our Knowledge of Cancer of the uterus. *Americ. Journ. of Obstetr.* Vol. 44 p. 29.
- 112) v. Rosthorn, A., Erfahrungen über die momentanen Heilerfolge etc. *Centralbl. f. Gynäk.* 1901. S. 588.
- 113) Derselbe in Chrobak und Rosthorn, Die Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane.
- 114) Derselbe, Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie. 29.—31. Mai. 1901. Giessen. IX.
- 115) Derselbe, Ueber Schleimhautverhornung der Gebärmutter. *Festschr. der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie.* Wien. A. Hölder.
- 116) Derselbe, Demonstration zum Chorionepitheliom. *Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie.* 3.—6. Juni 1903 zu Würzburg.
- 117) Ruge, C., Ueber Adenoma uteri malign. und die verschiedenen Formen desselben. *Zeitschr. f. Geburtsh. und Gynäk. und Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie.* Berlin. S. auch Winter's Lehrbuch der Diagnostik.
- 118) Rumpf, Zur Radicaloperation. Demonstration eines Carc. ut. *Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.* 1895. Bd. 33. S. 212.
- 119) Russel, W. W., The Operative Significance of Metastases and Post-operative Recurrences in Carcinoma of the Uterus. *Americ. Journ. of Obstetr.* Bd. 34. p. 851.
- 120) Schauta, Ueber Krebsoperation. *Demonstr. in der geburth.-gynäk. Gesellschaft in Wien.* R. *Centralbl. f. Gynäk.* 1902. S. 209.
- 121) Derselbe, Die Operation des Gebärmutterkrebses mittelst des Schuchardt'schen Paravaginalschnittes. *Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.* Bd. XV. S. 133.
- 122) Seelig, A., Path.-anat. Untersuchungen über die Ausbreitungswege des Gebärmutterkrebses. *Inaug.-Dissert.* Strassburg. 1894.
- 123) Staude, C., Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie. IX. 1901. S. 177.
- 124) Derselbe, Ueber Totalexstirpation des carcinomatösen Uterus etc. *Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.* Juni 1902.
- 125) Sick, Ueber Lymphangiome und Flimmerepithelcysten in der Nebennierenkapsel und in einer Beckenlymphdrüse. (Aus dem pathol. Institut in Bern.) *Virch. Arch. f. pathol. Anat.* Bd. 172. H. 3.
- 126) Sondheimer, Primäres Corpuscarcinom mit Haematom und Haematocolpos bei Atresia vag. senilis. *Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.* Bd. I. S. 348.
- 127) Stein, Beiträge zur Kenntniss der Entstehung des Gebärmutterkrebses. *Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.* Bd. XVII. S. 209.
- 128) Terrier, *Gaz. des Hôp.* July 22. 1900.
- 129) Thiersch, Der Epithelialkrebs namentlich der äusseren Haut. Leipzig. 1865.
- 130) Tiburtius, Collumcarcinom von kurzer Dauer und geringer Ausbreitung bei hochgradigen Lymphdrüsen-Metastasen. *Hegar's Beitr. zur Geburtsh. u. Gynäk.* Bd. VII. H. 1.

- 131) Veit, J., Ueber Operationen bei vorgeschrittenem Uteruscarcinom. Berl. klin. Wochenschr. 1899. No. 5.
- 132) Derselbe, Verhandlungen der Deutsch. Gesellsch. f. Gynäk. 1901. IX.
- 133) Derselbe, Zur Anatomie des Carcinoma uteri. Verhandlungen d. Berl. Gesellsch. f. Geburtsh. u. Gyn. 26. April 1895. Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gynäk. 1895. Bd. 32.
- 134) Vinay, C., Ueber Carcinom in den Lymphdrüsen. Lyon. Méd. 1901. No. 38.
- 135) Waelsch, L., Ueber die Beziehungen zwischen Rectumstrictur, Elephantiasis Vulvae und Syphilis. Arch. f. Dermatol. u. Syphilis. Bd. LIX. H. 3.
- 136) Wagner, Gebärmutterkrebs. Eine patholog.-anatom. Monographie. Leipzig. 1858.
- 137) Waldeyer, Das Becken. Bonn. 1899.
- 138) Werder, X. O., A New Operation for the Radical Treatment of Cancer of the Cervix. Americ. Journ. of Obst. 1898. Bd. 37. S. 289.
- 139) Wertheim, E., Zur Frage der Radicaloperation beim Uteruskrebs. Dieses Archiv. Bd. 61. H. 3.
- 140) Derselbe, Ein neuer Beitrag zur Frage der Radicaloperation etc. Dieses Archiv. Bd. 65. H. 1.
- 141) Derselbe, Kurzer Bericht über eine 3. Serie von 30 Uteruskrebsoperationen. Centralbl. f. Gynäk. 1902. S. 249.
- 142) Derselbe, Vergl. auch die Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie in Giessen. IX. und X. in Würzburg. Desgl.
- 143) Derselbe, Die chirurgische Behandlung des Uteruscarcinoms. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Bd. XVI. S. 576 und IV. internat. Gynäkologen-Congress in Rom.
- 144) Derselbe, Zur Frage der Radicaloperation bei Uteruscarcinom. Centralbl. f. Gynäk. 1902. S. 693.
- 145) Wertheim, E., Demonstr. (Wien. Ges. f. Geburtsh. u. Gynäk.) Centralbl. f. Gynäk. 1902. S. 1251.
- 146) Derselbe, Zum Aufsatz Winter's über die Principien der Carcinom-Statistik. Centralbl. f. Gynäk. 1902. No. 4. S. 225.
- 147) Derselbe, Zur Frage der Carcinomstatistik. Centralbl. f. Gynäk. 1902. S. 633.
- 148) Derselbe, Zur Kenntniss der regionären Lymphdrüsen beim Uteruscarcinom. Centralbl. f. Gynäk. 1903. No. 4. S. 105.
- 149) Williams, W. R., Ueber den Krebs der Gebärmutter, übers. von Abel u. Landau. Berlin 1890.
- 150) Derselbe, The Clinical Features of Uterine Cancer. Lancet 1896. II. S. 1074.
- 151) Derselbe, The Surgical Treatment of Uterine Cancer. Lancet 1899. Bd. II. S. 1086.
- 152) Winter, Ueber die Revidiv des Uteruscarcinoms etc. Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Bd. XXVII. S. 101.
- 153) Derselbe, Carc. corporis ut. mit Metastasen im Ovarium. Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Bd. XXX. 1. S. 285.
- 154) Derselbe, Zur Frage der Carcinomstatistik. Centralbl. f. Gynäk. 1902. S. 81 u. S. 545.

- 155) Derselbe, Verhandl. der Deutsch. Gesellsch. f. Gynäk. IX u. X.
- 156) Derselbe, Anatomie des Carc. uteri in Veit's Handbuch d. Gynäk.
- 157) Derselbe, Ueber die Radicaloper. bei Carc. ut. Referat f. d. Verhandl. d. Deutsch. Ges. f. Gynäk. Giessen 1901.
- 158) Winkler, Ueber die Betheiligung des Lymphgefäßsystems an der Verschleppung bösartiger Geschwülste. Virchow's Arch. Bd. 151. 1898.
- 159) Wuelfing, H., Zur Pathologie der Geschwulstbildung im weibl. Geschlechtsapparat. Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Bd. 44. S. 1.
- 160) Zehnder, Ueber Krebsentw. in den Lymphdrüsen. Virchow's Arch. Bd. 119. 1890. S. 261.
- 161) Derselbe, Ueber regenerative Neubildung der Lymphdrüsen. Virchow's Arch. Bd. 120. 1890. S. 294.
- 162) Zweifel, P., Die chirurg. Behandl. des Uteruscarc. 4. internationaler Gynäk.-Congress zu Rom. Centralbl. f. Gynäk. 1902. S. 1212.
- 163) Derselbe, Discussion zu Wertheim's Vortrag. Centralbl. f. Gynäk. 1902. No. 26. 696.
- 164) J. Wallart, Ueber die Combinat. von Carc. u. Tuberculose des Uterus. Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Bd. 50. S. 243.

Erklärung der Abbildungen auf Tafel I—VI.

Figur 1. Verlauf der Lymphbahnen des Uterus (von vorn betrachtet) im breiten Ligament. Der Uterus ist nach der linken Seite dislocirt und die r. Tube emporgezerrt zur Entfaltung des br. Ligaments.

- 1. Die tiefen, zu den Iliacalgefäßen ziehenden Collum- und Corpusbahnen.
- 2. Die hohen Corpusbahnen verlaufen zum Ligam. ovariopelv. und in diesem zur Aortengegend. Ihr Verlauf im br. Ligam. entspricht dem Hilus ovarii. Blase und Tube sind von dem einen einzigen Einstich aus (in die Portio) mit injicirt.

Figur 2. Verlauf der Lymphbahnen des Uterus und des Ovarium. Der Uterus ist stark anteflectirt über die Symphyse gelegt und nach vorn geklappt.

A. Vasa lymphatica colli:

- 1) zu den Lymphoglandulae sacrales laterales durchs Ligam. sacrouterinum und
- 2) zu den Lymphoglandulae hypogastric. et iliacae extern. ziehend.

B. Vasa lymphatica corporis uteri:

- 3) die Bahnen des unteren Corpusabschnittes verlaufen wie die Collumbahnen 2;
- 4) die Bahnen des oberen Corpusabschnittes verlaufen mit den Ovarial-Lymphbahnen zusammen zu den Lymphoglandulae lumbales.
- 5) Die Ovarialbahnen.

Figur 3. Die Lymphbahnen der Tuba Fallopii (von der Vorderseite des br. Ligaments aus betrachtet). Die Arterienanastomose zwischen Art. uterina und Art. spermat. ist mit rother Masse injicirt. (Lymphb.-blau).

1. Sammelgefäss der Fimbria ovarica tubae.
2. Die zwei Sammelgefässe der Pars ampullaris u. isthmica tubae (No. 1 u. 2) tauchen ins Ligam. ovarioelvic. Die Lymphe der Pars keratina tubae fliesst zum Corpus uteri.

Figur 4. Das Lageverhältniss der Lymphoglandulae hypogastricae, iliac., ischiadic. und rectovaginales zu den grossen Beckengefässen am herausgeschnittenen Präparat.

Figur 5. Die Drüsen vor und hinter den Gefässen stehen in Lymphcommunication.

Figur 6. Durchschnitt durch die Vasa iliaca haemat. Die Drüsen liegen an der Hinterseite der Arterien und umgeben die Vene von vorn und von hinten. Der Ureter-Querschnitt macht die Vorderseite kenntlich.

Figur 7. Interstitielle Injection der Lymphbahnen im Myometrium des Corpus uteri. (Dicker Rasirmesserschnitt in Xylol aufgehellte) bei schwacher Vergrösserung (80 f.). Die dunkel umrandeten hellen Stellen markiren Blutgefässe.

Fig. 8. Interstitielle Injection der Lymphbahnen des Corpus uteri (dicker Rasirmesserschnitt in Xylol bei 80f. Vergrösserung gezeichnet). Das Bild zeigt die äusserste Muskelschicht mit der Serosa, welche ihr eigenes Lymphgefässsystem hat. Die feinen Lymphröhren der Serosa communiciren in der Tiefe mit den sternförmigen Lakunen der Muskelschicht. An der Oberfläche mehrere freie Oeffnungen.

Fig. 9. Interstitielle Injection der Lymphbahnen in der Mucosa uteri (Rasirmesserschnitt in Xylol aufgehellte).

9a. Längsschnitt. Die Schleimhautdrüsen sind nicht eingezeichnet. 1. Das System der senkrecht aufsteigenden Bahnen mit zahlreichen Queranastomosen mündet in die Längslakunen (2) der Grenzschicht. Mit diesen communiciren die diffus sternförmig anastomosirenden Lymphräume des angrenzenden Myometrium.

9b. Flachschnitt. Die Schleimhautdrüsen undeutlich kenntlich — entsprechend der Schnittdicke — werden von den Lymphkanälen umspinnen.

Fig. 10. Interstitielle Injection der Lymphbahnen der Cervix uteri. (Rasirmesserschnitt.) Die Lymphbahnen der Schleimhaut bilden feine Netze: LK, welche bis unter das Epithel der Oberfläche [Ob. Ep.] und der Drüsen (Dr.) heranreichen; in der submucösen Grenzschicht verlaufen die Lymphbahnen horizontal (t. S. Lb.) und erreichen ein grösseres Lumen, um dann senkrecht die Muscularis int. zu durchbrechen (p. im. Lb.). Die Blutgefässe [Bl. g.] sind leer.

Fig. 11. Interstitielle Injection der Lymphbahnen in der inneren Muskelschicht des Uteruskörpers. (Gefrierschnitt 15 μ , Vergrösserung 240f.) Zwischen den groben Sammelröhren, welche zu den Venen streben, breitet sich ein reiches Netz feinsten Capillaren aus, welche im In-

- neren der grossen Muskelfelder die einzelnen Bündelchen umspinnen. An der submucösen Grenzschicht fallen 3 weite Lakunen auf, künstlich durch Injectionsdruck dilatirt. In der angrenzenden Schleimhaut ebenfalls präformirte Bahnen, welche die Drüsen umgeben.
- Fig. 12. Querschnitt einer Tube mit interstitieller Injection der Lymphbahnen bei Lupenbetrachtung.
- Fig. 13. Lymphstauung der Tubenschleimhaut bei Gravidität. Die Lymphbahnen L sind blau injicirt und umgeben Arterien und Venen sichelförmig, so dass die Blutgefässe sich an einigen Stellen in die Lymphbahnen vorbuchten. Die Muskelbahnen sind eng und lassen kein Endothel erkennen.
- Fig. 14. (S. Fig. 5 Taf. XVII dieses Archiv. Bd. 65. H. 3 aus meiner früheren Arbeit über den Gebärmutterkrebs!). Natürliche Injection der Lymphbahnen durch Krebszellen bei einem Corpuscarcinom: a) in der mucösen, b) in der submucösen, c) in der musculären Schicht.
- Fig. 15. (S. Fig. 4 Taf. XVI dieses Archiv. Bd. 65. H. 3 aus meiner Arbeit über den Gebärmutterkrebs!) Natürliche Injection der Lymphbahnen in der Mucosa uteri und in der submucösen Grenzschicht. (Sm.) durch ein Carcinoma corporis uteri. Die Lymphbahnen umstricken die Blutgefässe.
- Fig. 15. (S. Fig. 6 Taf. XVII dieses Archiv. Bd. 65. H. 3 meiner früheren Krebsarbeit!) Vordringen eines Carcinoma portiois uteri in den Lymphspalten der Mucosa cervicis. Ueberall hebt sich von den Carcinommassen die Endothelschicht ab; bei L. Einbruch in ein grösseres Sammelgefäss.
- Fig. 17. Horizontalschnitt durch einen wegen Carcinoma cervicis entfernten Uterus. Der Krebs ist in der mittleren Zone der Muscularis am höchsten gedrunken und hat hier die Höhe des inneren Muttermundes überschritten. Das Cavum uteri ist dicht über dem inneren Muttermund getroffen. Die gefässreiche Zone Seelig's findet sich aussen am Ligamentursprung; in dem Verlauf der beiden Parametrien rechts und links je eine Lymphdrüse mit Andeutung von Randfollikeln; beide Drüsen sowie das Cavum uteri im Körper sind frei von Carcinom.
- Fig. 18. Schrägschnitt durch das linke Parametrium. 3 kleine Lymphknoten (L. Kn.) ragen pilzförmig in das Lumen der cervicalen Lymphbahnen, welche mit den Vasa haemat. uterina verlaufen. Art. ut. = Arteria uterina; V. ut. thr. = thrombosirte Vena uterina; G = Ganglion sympath. mit Nervenstamm.
- Fig. 19. Lymphoglandula (halbschematisch nach einer pararectalen Drüse gezeichnet).
- Von der Kapsel K gehen spärliche zarte Trabekel Tr. in's Drüsengewebe. K. G. = Kapselblutgefässe; V. aff. = Vas afferens; V. efferens; R. F. = Randfollikel; K. C. = Keimcentrum im Follikel; R. S. = Rand-Sinus; die hellen Ränder um die Randfollikel und zwischen den inneren Marksträngen (M. Str.) stellen den Lymphsinus der Drüse dar.

- Fig. 20. Randschnitt aus einer Beckenlymphdrüse bei Gravidität (complicirt durch Carc. cervicis). Der Lymphsinus ist durch den Reichthum an seröser Flüssigkeit maximal erweitert. K. = Kapsel; L. S. = Lymphsinus; R. F. = Randfollikel; K. C. = Keim-Centrum. Tr. = Trabekel; M. Str. = Markstränge. Die Drüse ist frei von Carcinom.
- Fig. 21. Acute Entzündung einer Beckenlymphdrüse. Activ-passive Hyperämie, Degeneration der Keimcentren; Parenchym und Lymphsinus sind überschwemmt von Wanderzellen.
- Fig. 22. Ausgang einer acuten Adenitis in Sclerose: Verödung des Lymphsinus, Verdickung der Kapsel, der Trabekel und des gesammten gefässführenden Reticulums. Die Drüse ist blutleer, die Zeichnung der Follikel, Keimcentren und Markstränge ist verschwunden oder verwischt.
- Fig. 23. a beginnende, b vorgeschrittene Degeneration einer Beckenlymphdrüse. Das ausfallende Parenchym wird vom Hilus her durch Fettgewebe ersetzt. Das Gefässgerüst bleibt stehen. Fg. = Fettgewebe. N. Dr. = Nebendrüschen.
- Fig. 24. Gutartige Hyperplasie einer Beckenlymphdrüse bei Carcinoma uteri. (Adénopathie précancéreuse).
- Fig. 25. Fettige Degeneration einer geschwollenen Lymphdrüse. Bemerkenswerth sind die reichen Gefässe am Hilus und die kleine Nebendrüse.
- Fig. 26. Beginnende Krebsinvasion in den Randsinus einer geschwollenen Beckendrüse vom Vas afferens aus.
- Fig. 27. Vorgeschrittene Krebsinvasion vom Hilus (Vas efferens) aus. Der Carcinomknoten hat die Lymphdrüse L. Dr. zersprengt.
- Fig. 28. Verwachsung der krebsigen Lymphdrüsen mit ihrer Umgebung bei 1; und mit der Vena iliaca communis; bei 2 bricht das Carcinom ins periglanduläre Gewebe. Lupenzeichnung (4fache Vergrößerung). art. = Arterie.
- Fig. 29. Schematische Darstellung der mit einem Carcinoma cervicis operativ entfernten Drüsen. Links sind die Lgl. parametranes, hypogastricae, iliaca communes und sacrales entfernt, rechts die Lglandulae hypogastricae. Die Lymphdrüsen enthalten alle Carcinomherde.
- Fig. 30. Sarcommetastase im Centrum (Vas efferens) einer erbsengrossen, nicht verhärteten Lymphdrüse.
- Fig. 31. Beginnende Krebsinvasion in den Randsinus einer Beckenlymphdrüse. K. = Kapsel; R. S. = Randsinus; R. F. = Randfollikel; K. C. = Keimcentrum.
- Fig. 32. Krebsinvasion vom Hilus (Vas efferens) aus, also retrograd. Das Carcinom C. in continuo wachsend erdrückt das Lymphdrüsenparenchym L. Dr.; K. = Kapsel.
- Fig. 33. Infiltration einer Lymphdrüse durch einen Cylinderzellenkrebs der Cervix. Die Zellen reihen sich auf allen Fasern des sklerosirten Reticulum und der Trabekel auf. Das eigentliche Parenchym P. liegt als nekrotische Masse abgelöst in den krebsigen Hohlräumen.

- Fig. 34. Hornkrebs in einer Leistendrüse bei Cancroid der Vulva beobachtet. R. F. = Randfollikel; K. C. = Keimcentrum; K. = infiltrierte Kappe. Das Bild K₂ stammt von derselben Drüse. Die Krebszapfen enthalten schollige Einschlüsse (Riesenzellen?).
- Fig. 35. (S. Fig. 20 Taf. XIX dieses Archiv. Bd. 65. H. 3 aus meiner Arbeit über den Gebärmutterkrebs!) Flimmerepithelschlauch in der Kapsel einer Lymphdrüse aus dem Gefässdreieck zwischen den Vasa iliaca ext. und int.
- Fig. 36. Schnitt durch eine tiefe Beckendrüse (Gland. obturatoria) zeigt das erste Einschwemmen von noch nicht ausgekeimten Krebszellen.
- Fig. 37. Riesenzellen in einer Lgl. iliaca bei Carc. cervicis (Fremdkörperriesenzellen und Carcinomzellen?).

Fig. 2




Fig 4.




Fig. 5




Fig. 3



Fig. 6





Fig. 7




Fig. 8



Fig. 9^a




(Die Drüsen sind nicht eingezeichnet)

Mucosa uteri.
System der aufsteigenden Bahnen mit zahlr. Queranastomosen.

Grenzschicht mit Längslücken

Blutgefäß
Muscularis mit sternförmigen Längsmuskeln.

Fig. 9^b



Drüsen

Blutgefäße




Fig. 12



Fig. 10





Fig. 13

Fig. 11






Fig. 17.



Fig. 18



Fig. 21.



Fig. 22.



Fig. 20




Fig. 19.



Fig. 23^a.

Fig. 23. b.








Fig. 26. Care.




Fig. 25



Fig. 27. Fettgewebe



Care.

LDr.

Fig. 28



Fig. 29




Fig. 30



Fig. 31

