

Observationum anatomicarum decas. Additae sunt epistolae. Quibus singularia scitu digna, lactearum nempe thoracicarum, & vasorum lymphaticorum natura, embryonisque per os nutritio ... exponuntur / [Johann Daniel Horstius].

Contributors

Horst, Johann Daniel, 1616-1685.

Publication/Creation

Francofurti : Apud Wilhelmum Serlinum & Georgium Fickwirthum, 1656.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/yxz233cf>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

19
JO. DANIELIS HORSTII
OBSERVATIONUM
ANATOMICARUM
Decas.

Addita sunt

PISTOLÆ, QVIBVS SINGVLARIA SCI-
tu digna, Lactearum nempe Thoracicarum, & Va-
forum Lymphaticorum natura, Embryonisq; per
os nutritio, atque alia rariora exponuntur.



FRANCOFVRTI,
Apud V Vilhelmum Serlinum & Georgium
Fickwirthum.

ANNO M DC LVI.

Observatio Anatomica

I.

De Abscessu Cerebri.

Racturas in genere non tractabo jam, quod multorum aliàs fuit argumentum, & primi quidem quod sciam Medicorum Atavi, Hippocratis Divi. Galenus operæ duxit eam operam resumere, eamque etiam optime executus est, quem secuti deinde innumeri alii, ac novissime quidem post *Fabritium ab Aquapend.* Germanorum nostrorum Galenus, *Sennertus*, inquam, noster, Vir de Republica Asclepiadea quam optimè optimorum Virorum decreto meritis. *Fracturam Cranii in specie* hac saltem vice delibabo, dum, sic exigente officio meo, certi cujusdam subjecti actionem instituere cogor.

Cranii inquam, cujus *varias fracturas* latius aliàs videre licet apud *Celsum, Aeginetam, Gentilem, Arantium, Botallum, Langium, Tacetium, Vidium, Fallopium, Nic. Florentinum, P. Pavium, Am. Lusitanum, Paræum, Variolam, Spererium, Fab. Hildanum, I. And. de Cruce, Brassavolam, Nic. Mass. Arcæum, Nicol. Fontanum, Berengarium, Petraum nostrum, nostrumque Genitorem p. m. Greg. Horstium*, atque primo limine citatos *Hippocratem, Galenum, Fabrit. & Sennertum*. Noster verò casus, cujus gratiâ hæc quæ a qualia instituuntur, talis est.

Michael Sneider Sarnaviensis, rusticus cœlebs annorum 30. sanus & mihi habitus, ebrius à compotatoribus ejusdem farine sociis aliquot vulnera in occipite & vertice ad calvariam usq. accipit, postquam prius verberibus inimicorum Commilitones atrociter totum ipsius caput, nucham & sinistram axillam cecepissent. Vulneratus primâ quidem vespere vulnera Chirurgo nostro fortissimo *Erico Braunio* liganda commiserat, sequentibus verò diebus opere scio quarum herbarum consolidantium, spreto & vale dicto Chirurgo

ad cicatricem ferè ea perduxerat, cum non à vulnere die febris & scotomia supervenit, & decimâ quartâ sinistri brachii ac cruris resolutio: quibus presentibus Chirurgum denuo in auxilium & consilium vocat. Chirurgus necessariis adhibitis nil proficiens die 21. rem ad me defert, quâ pensiculus examinatâ, & cum Collegis communicatâ, Trepanum adhibendum duxi. Divino igitur auxilio implorato, & cute die eâdem 21. per chiasmum sectâ, die seq. 22. Cranii perforationem, non obstante tum Plenilunio, modiolis & Alisq. presentibus & annuentibus Excell. Colleg. & Medic. D.D. Filemanno, D. Erico Dexbach, Chirurgo Braunio, & aliquot Medicinæ studiosis, institui, præmissis prius clystere, capitisque convenienti inunctione. Exsecto offe testuæ menynge incumbentes sublatae sunt, & membranæ ipsi melrosaccum impositum est. Os verò tectum fuit linamentis siccis mollissimis, cum pulvere cephalico, totoq. curationis tempore tam quoad externa quam interna nil intermissum fuit, quod ipsa fractura Cranii aliàs requirit. Septimâ die lethargico sopore captus dextri oculi & oris occlusionem crebrasque vomitiones patiebatur; sequentibus verò melius habuit emanante per foramen pure foetido, pauxillo tamen, ac non à quidem pedē movere cepit, recurrente tamen 14. die sopore, emanantibus autem vomitibus, venis verò frontis arteriisque elatis ac turgentibus. Decimâ quintâ nulla nec ad pejus nec ad melius mutatio secuta. Decimâ verò sextâ & seqq. Scotomia major facta, accedentibus oculorū convulsionibus & distorsionibus, adeo ut vigesima quartâ (quæ erat 14. Novembr.) horâ 4. pomerid sine tamen accessione aliorum symptomatum animam exhalavit. Sectione post mortem institutâ, sanies inventa est purulenta in ipsa Cerebri substantia in dextra occipitis parte pelliculâ instar abscessus contenta, unciarum quatuor. Ipsum Cranium plurimis contusionibus contortum, Mattis verò duræ venulæ subfusco sanguine instar picis distentæ, hæcque ipsa & pia menynx discolores, illaque à contusionibus lesa, erant. Saniei autem supra dictæ globulus alius purulentus vasculo carneo inclusus proximè adhærebat, ut mirum non sit quod mortuus fuerit, mirum tamen sit quod tam diu sine gravioribus symptomatibus delirio potissimum supervixerit.

De Tempore vero, quando sit aperiendum Cranium, quo morbi die, & sub qua cœli constitutione, non convenit inter authores. Cum Celso plurimi ultra quartum diem trepanum haut differendum putant; alii contra cum Mercato omnino differendum putant, quod sub initium mate-

ria non sit fluida, ac meninges *p.n.* sint inflatæ nimis, uti alias in *Plenilunio* *s.n.* esse solent. Nos verò uti ex dictis patet *die 22.* adhibuimus trepanum, ac Lunâ quidem turgidâ. *Utilis est Astrologia Medico*, sed non necessaria semper; uti enim sub quovis cœli statu purgandum quandoq; corpus venit, ita etiam vena sæpius secâda, Cranium aperiendû, ferrum & ignis adhibenda sub quovis cœli statu, si scil. *electitium tempus* non detur, si morbus non ferat moras. *Utilis inquam est Astrologia.* Astrorum enim in hæc inferiora magnus influxus quotidie observatur. Si verò ut dixi tempus *electitium* non detur, sub cane sæpè purgandum; in ipso plenilunio sæpè cranium aperiendum; hac tamen cautelâ, ut arte evitentur incommoda, quæ alias inde evenire docet ipse noster *Hippocrates*, quæque omnium optimè discere poteris ex *Moussino*. Nostrum igitur erit, potius instar *Guidonis Brocensis*, brumali tempore trium horarum spacio plantas instrumento Solis loco operante, producentis; obstantibus & maleficis sideribus, calori & frigori peccanti inde emananti, corporisque nostri adversitatibus & incommodis insequentibus obviam ire; quàm ægro remedia subtrahere ad benigniores remotos & distantes Planetarum aspectus, frigidiorē aut calidiorē aëris clementiam, Lunæque deliquium; præ quibus sæpe moriendum esset ipsi ægro.

De ipso autem *Trepano* non tantum dubitant multi, *an tutò adhibeatur*, sed & sunt qui omninò id rejiciant, dum statuunt, *quamvis Cranii fracturam sine trepano, sine cranii apertione curari posse*. Non diffiteor absque Cranii perforatione multas fracturas Cranii præsertim hyberno tempore & apud nos *Germanos*, quibus non ita lethales ut *Neapolitanis*, *Bononiensibus* & *Florentinis* accidunt, curari posse; uti etiam non ita pridem *Consultissimus quidam Vir*, *Amicus noster Honoratissimus* solâ enema-
rum, Venarum sectionum &c. adhibitione, ita suadente mecum *Dn. Collegâ D. Tilemanno*, feliciter hic curatus est; Imò si ita in initio statim tractatus fuisset *noster demortuus vulneratus*, & illius accidentia *Deo Volente* annon præcaveri potuissent? Multas autem Cranii fracturas absque perforatione curari sæpe posse, notanter dixi, non omnes, nec semper; uti alias statuunt antiqui *Hebræi*, & *Vgo Lucanus*, atque *Theodoricus* alii-
que; quorum alii internis vulnerariis potionibus id fieri posse profi-
tentur, alii verò extrinseca medicamenta commendant, spreto & rejecto

trepano. Ast sæpè in Crânii fracturis non potest removeri materia exiccanda (loquor verbis Galeni) nisi apertio fiat ob defectum scil. ligaturarum: præsertim si ῥωγμὴ accidat internæ laminæ salvâ manente externâ quâ de V. Fallop. lib. Hipp. vuln. c. 13. αὐτὸς εἰρηφονεῖ; quamobrem tunc Chirurgus (Avenzoaris) adhibendus, ossique (Avicennæ) particula circa fissuras eximenda, ut virus (Averrois) egrediatur per viam liberam osse scil. amoto. Multæ gigitur fracturæ crânii curari possunt & sæpè sine apertione; si simplex φλάσις contingat, si ῥωγμὴ tanta sit ut materia exire possit. Sed non omnes, ut notavi jam antea, nec semper, quemadmodum ante quinquennium Doctor quidam Iuris apud nos nullis medicamentis externis aut internis menti & sanitati restitui potuit, qui tamen trepano adhibito salvus evasit: uti etiam Nobilem ante sexennium Gissæ feliciter à me & Greilachio curatum recordor.

Quando verò adhibendum trepanum? quando rejiciendum? Si certò constet cranium non depressum nec ita fractum esse, ut cerebrum inde ledatur, sique saniei tam exigua quantitas sit, tantumque natura robur, ut medicamentis absorberi & dissipari facile possit, & contrarii certa symptomata desint, trepano non opus est. Sæpe enim à contusione cranium ipsum non læditur, sed nervus (quem casum proponit Hippoc. 58. aphor. 5.) aut vena, è qua effusus sanguis in ipsa cerebri substantia putrescit sæpè & mortem infert, uti nostro agro accidit, & Herculi de Marschottis apud Ber. Aliquando evenit (inquit Celsus) ut os quidem totum integrum maneat, intus verò ex ictu aliqua vena rupta aliquid sanguinis mittat, qui concoctus dolores infert oculosque obcæcat. Quo in casu summè conducit Phlebotomia & clysterum ulus, uti quàm optimè scribit & describit Rasès ex Galenò, lib. 1 Contin. Præmissò autem clystere secundùm Haly l. 5. theor. cap. 10. phlebotomia primâ hora fiat, inculcante Paulo, ac ex cephalica quidem docente Avicenna cap. de cura sodeæ.

Quemadmodum enim clysteres attrahunt materiam (loquor verbis Serapionis) ad partem contrariam parti ægritudinis, ita & phlebotomia causam apostematum (Avicennæ) abscindit, quæ aliàs sæpius (Dini) ex fluxu sanguinis oriri solent. Sæpè etiam interna purgantia exhibentur, si temperamentum phlegmaticum sit & frigidum, corpusque robustum sine feбри. Quo ad localia commendatur emplastrum Andromachi, M. Anselmi de Ianua, Unguentum de Matrisilva Argelati, de Centaureo Guidonis, de
heto-

betonica Henrici Bertapaliæ gratia Dei dictum, *Emplastrum Conciliatoris*, Berengarii. Variæ item *aqua vitæ* usurpantur, de quibus consule citatos authores. *Potiones* autem *vulnerarias* commendat allegatus *Theodoricus l. 2. chir. c. 3.*

Si verò id non certò constet, & *accedant accidentia mala* incisio instituenda. Cum etiam fracto Cranio facilè festuæ & frustula membranas lædant, ac in ipso fissuræ loco enata humiditas in saniem abeat & ad membranas destillet, unde communiter interire solent, qui à capitis vulnerib. moriuntur; maturè cranium aperiendum, ut *sanies* exire possit, ut *festuca* &c. *res. n.* removeantur, quarum præsentia febris, vertigo tenebricosa, scotomia, dolores acuti, vomitiones, sopor, torpor, paralyfis, delirium & epilepsia; nunc *conjunctim* nunc *sigillatim*, pro alia atque alia vulneris, subjecti, loci & aëris constitutione, indicare solent. Febris si accidat post 7. eo scil. tempore quo terminari debebat, concurrentibus simul iis quibus *noster* vexabatur, *putredinis* in Cerebro, *menyngibus* aut Cranio certum fit indicium vel *Hippocratis* decreto, ob quam etiam potissimum & nos apertionem moliti sumus.

Idem autem ferè nobis evenit in nostro ægro, quod *Glandorpio* in Bremensi pugili, alio tamen ac diverso successu. Cum pugili illi graviter in capite vulnerato tertia die gravia symptomata supervenirent, & *Glandorpius* suspicaretur materiam intra cranium collectam esse, cranium aperuit. Cum verò nihil efflueret per foramen, *duram* quoque *menyngem* (de hujus vulneribus lege *Io. Andr. à Cruce, Matthiolum & Paræum*) in tumorem elatam scalpello incurvato aperuit, quæ saniei intra duram & per eam matrem contentæ maximam copiam emisit, quâ ipsâ hoc modo evacuatâ & adhibebitis simul necessariis aliis æger sanitatem pristinam recuperavit. Ita etiam in nostro ægro exigua portio saniei per foramen exivit, ut non potuerimus non existimare, *intra tunicam* aut ipsam Cerebri substantiam anguem latitare.

Ipsa quidem apertio in *decliviori* parte, uti par est, *lateris dextri*, juxta *suturam lambdoidem* facta est. In *decliviori* inquam, non in *inferiori*, cui loco os subtrahere maximum periculum pronunciat *Nicolus*. *Berengarius* vero contrarium aliquoties se vidisse probat, *Principis*, & *Pauli Ungari* exemplo. Nec etiam *magnum* foramen factum est, uti alias in *vertice* fieri solet, adhibitaque sunt, tum *interna* tum *externa* medica-

menta præstantissima, *dieta* simul convenientissima accuratè observatâ.

Maximâ autem admiratione dignum est, quod *omnis delirij species* expers fuerit, & quod *tam longissimum tempus* vitæ natura dederit 46. scil. dies? An quod substantia saltem læsa fuerit non spiritus, non ipsi nervi? Et quod ægri quandoque al quot menses supervivant etiam ipsis menyngibus læsis? *testante P. Paw lib. Hipp. de vulner. etiam sine delirio referente Valleſio com. in l. 5. Epidem.*

Antiqui non credebant *Cerebrum inflammari* posse; at hic casus eos refutat; refutat etiam Galenus 2. de caus. sympt. c. ult. Paulus l. 3. Avicenna 3. l. Petrus Salius Diverſus c. 1. de aff. part. & alij Doctores quorum tamen pler que *delirium* adfuisse testantur.

Sed nec in *membranarum*, nec in ipsius *Cerebri inflammatione* semper adest *delirium*. Illud olim probavit Nerei filia (Hippocr. 5. epid. 47.) ut & æger in Dealcis horto decumbens (l. 3. s. 1. agrot. 3.) Quod vero ipsius *Cerebri inflammationem* spectat, ea quandoque non *delirium*, sed *sensuum obliterationem* tremulas, obscuras & detrectabiles desipientias, ex 1. Prorrh. 33. periculosiores tumultuariis, infert, si scil. non ipsi nervi, nec ipsi spiritus consequenter afficiantur.

Id verò maxime mirum est quod amicus noster refert Excell. Fontanus, se vidisse puerum in quo cerebrum deletum fuerit, *respons. & Curat. medic. l. 1. p. 16.* qui aliquomodo rationis manserit particeps. *Epit. Vesal. annot. p. 28. & 29.* cum tamen aliqui quorum leviter est læsum Cerebrum delirent graviter, *uti ipse expertus in puero duodecenni, pag. 3. Analect.*

Illorum (ita absentiam delirii in puero cerebro destituto excusat Amicus) postquam ad ætatem proventi sunt, *vitiata organa* refici non possunt, nec aliud quidpiam commodè effici, quod læsi organi munere fungatur. Hic verò cui statim ab initio ortus, vel ante, ab infusa anima vitiatum est organum, potuit naturali vi in tam flexibili mollique materia aliud insolitum organum efficere, quod supplere valet defectum organi vel læsi vel absentis. Hoc fuit ut testantur præsentēs Medici *membrana illa duplo crassior ordinariis, quæ sensibus subministrabat spiritus vitales, & animæ etiam rationali suas instrumentali-ter subiciebat intelligibiles species.*

Ast hoc non solvit nostrum dubium, non inquam satisfacit Hipp. aphor.

aphor. 50. f. 7. Imò non ausim dicere puerum illum cerebro caruisse. Et si enim non habuerit massam aliquam albam instar intestinorum convolutam, habuit tamen membranam duplo crassiorē cerebri loco positam, quæ vulnerata vel siderata facillè delirium peperisset, & mortem ipsam accelerasset.

Ut dixi, *non semper læsum cerebrum sequitur deliriū, nec semper ipsa mors necessario tertio scil. die: nisi cerebrum syderatum sit.* Syderatum autem est me iudice, si ita læsum aut vulneratum & inflammatum est, ut spirituum animalium tam fixorum quam mobilium constitutio præternaturalis fiat; ut illi ipsi spiritus tum fixi, tum mobiles non sint temperati, tenues, puri, lucidi & ordinati, nec certo quodam ac regulari modo moveantur. Et hæc dicta de hoc casu sunt.

Observatio Anatomica

II.

Cū in vicino oppido Reinheimb opulenti civis Philippi Reimichii uxor, concivis egeni Pleneri conjugem ultimo mense gravidam, non tantum diris jurgiis prosequeretur, sed & dextræ parti capitis, ipso tum ardente Syrio, colaphum impingeret, editus paulo post infans in ea ipsa, qua mater concussa erat parte continui solutionem passus est, uti notarunt præter obstetricem adstantes, & Pastor baptismi gratiā vocatus.

Re itaque per Pastorem loci, Virum quæ vitam, quæ eruditionem Præstantissimum, ad me delatâ, misertus pauperulæ ocyus illuc concessi, atque deprehendi continui solutionem ad ipsum cerebrum penetrare, portionemque ipsius cranii fractam, jam putredinem concepisse. Licet autem externa & interna roborantia fuerint nocturna diurna que manu exhibita, putrida etiam portio cranii exsecta, multa que foetida purulenta materia excreta, brevi tamen infans demortuus sequentia notanda dedit. Venulæ fuerunt turgidæ, ventriculi cerebri aqua repleti, cerebri substantia flaccida. Inter cerebrum & meninges aderat collectio materiæ purulentæ & foetidæ. Cætera naturæ ordine habentia & naturalia.

Quærebatur à Magistratu an Reimichii uxor alteram verberans fuerit causa huius mali? Ego quod sic, cum à minis partium conformatio non solum vitari possit in fœtu teste Gemma Cosmocr. l. i. c. 6. qui narrat infanti eadem calvaria parte, cui in Matre acies minitabatur, magnam continuitatis divortium apparuisse: sed & multo magis à plagis ipsis teste Genitore, qui narrat l. i. p. 2. obs. 34. embryoni ob matrem in ventre graviter offensam epar extra umbilicum procidisse. Cum facilè imaginationi sit formationem mutare etiam in ultimis gestationis mensibus, teste Sennerto pag. 321. l. 4. part. 2. s. 4. c. 7.

Quomodo vero hoc fiat, id citatus Sennertus, Parensque noster *de causa simil. & dissimil. in fœtu* exponunt, qui consulendi, ut & Zacutus lib. 3. histor. Princip. Non autem tantum in Microcosmo videmus plasticam sæpè lædi & defectu atque excessu quandoque peccare, sed & Macrocosmum eidem juri subiectum non rarò notamus. Ita pluvia quandoque cruentæ destillant. Ita in succino sæpe varia animalcula & alia apparent, formæ muscarum, culicum, aranearum, papilionum, ranarum, lacertorum, straminis: uti testantur qui in Borussia ad littora Insulæ Sudaviæ id colligunt. Multi quidem putant succino adhuc liquidum illa animalcula involvi & insinuari. Sed alii, cum omnia pestu- cida sint, id negant, docentes, quod ex sola Cœli imaginatione imprimatur tale quid subiecto succino, uti in Microcosmo sæpè varia vis plastica fœtui inducit. In Comitatu Mansfeldensi mineræ eruuntur, quæ pisces, dentes, cornua, animalia & alia exprimant. Juxta sylvam Semanam ad radicem Arcis Brunsvicensis Scharfeld vidi erui ossa, dentes, mandibulas varias, Ursarum, Leonum, hominum & aliorum animantium æmulas. Varia talia fossilia possideo in Musæo meo, & inter alia cranium futuris apprime distinctum. Sennertus allegat similia Eilingrodæ inveniri. Est Clarissimo Dn. Conerdingio, Archiatro Brunsvicensi Excellentissimo, spina dorsi, in saxo reperta, affabrè vertebris & spinosis processibus instructa, admiratione longè dignissima. Id vero magis mirum, quod Bolducius p. 715. narrat, bufonem in medio saxi dum secaretur inventum apud Augustodunum, & in Latio Martino V. Pontific. serpentem in media petra dum scinderetur repert. esse. Ita vis plastica non raro aberrat & ludit in Macrocosmo, uti in homine & brutis se admirandam sæpe præbet, maximè exemplo La- zari

zari illius Genuensis, cujus ex ventre pendulum erat corpus nominis Johannis, quale exemplum olim Lycollhenes vidit Basileæ. In Sabaudia quoque 1519. natus est alius infans ex cujus ventre etiam corpus pendebat cum pedibus, sine tamen capite & brachio. Leporem Ulmæ captum recorder duplicatum quasi, octo pedibus instructum, ac si par leporum dorsis esset conglutinatum. Aët. de his pluribus in Phys.

Observatio Anatomica III.

IN Anatomia Serenissimi Principis Apoplectici, J. H. L. cui præfuit D. Bunccius, 4. Aprilis 1652. observata sunt sequentia. Cutis per universum corpus ab humoribus serosis distenta. Epidermis separatu facilis, vesicis multis prægnans & turgida. Musculi lividi & nigricantes. Abdomen totum flatibus tumidum. Ventriculus laxatus extenuatus & extensus in tantum, ut nullum extiterit fibrarum vestigium, tunicarumve discrimen. Orificium superius flaccidum plane, ob quas causas tantam nauseam & vomitus Augustus Heros passus est. Epar coloris plumbei, totumque ichorosum. Vesicula bilis grandior unciiis duabus bilis referta. Lien atro carbone nigrior, & durus plus justo. Cor minus, atque coloris fusci. Arteria venosa & Aorta nigro humore (qualem Princeps in lingua & faucibus per aliquot tempus magna cum difficultate habuerat) repleta. Pulmones flaccidi & purulenti. Cerebrum magnum & grande sero & pituita plusquam refertum maxime in ventriculis.

De nigra illa materia atramento non absimili sutorio, quæritur unde oriunda? Ego lienis fœces judico, à quibus non raro vomitus atros expertus sum.

Observatio Anatomica

IV.

A Natomia Illustrissimæ Catharinæ Elisabethæ, N.D. Principis Puellæ, XXVI. Mensium, Junii XVII. die, Anni 1641. defunctæ, sequens fuit. Venter & intestina mucositate & vermibus scatebant. Epar magnum & floridum unius libræ. Splen bene habebat. Renes naturales grandiores tamen, unciarum nempe quatuor. Pulmo cavernulis penitus quasi cavatus. Cor nigro sanguine repletum, Cerebrum autem copiosissimo sero. Circa os ethmoides vero aderant vermiculi & mucus. Patet hinc falli Sebastianum Scarabricium in hist. Ignis febr. pag. 511. dum in viventibus negat vermes generari posse nisi in intestinis solis. E naribus prodeuntes viderunt inter alios Benivenius & Cruccius, ex oculis Amatus, ex auribus Schenkus, in capite Bartholinus. Confer si placet Manud. ad Med.

Observatio Anatomica

V.

A Nno 1644. Decembr. die XX. Nobilissima Marrona quinto mense se gravida, post fluxum triduanum uteri cruentum, abortum patitur, atque foetum rejicit masculum, quoad omnes partes perfectum quidem, quantitate tamen deplumatum turdum vix æquantem, exicuumq; & aridum. Vasa umbilicalia erant instar filorum communium usualium, collo circumvoluta & quasi alligata; non tamen brevia, uti duplici exemplo exponit Hildanus: nec disrupta, uti alias Bauhinus notavit. In dissectione notabantur partes singulæ discretæ, hepar albicans & exuicum, cor pallidum, vasa umbilicalia sicca. Sub noctem secundina prodit putrida & fatida. Causam hujus abortus retulerim ego in exilitatem & tenuitatem vasorum umbilicalium cum Sennerto

pag. 404. l. 4. part. 2. sect. 6. cap. 2. de Abort. ubi similem propemodum narrat historiam. Quænam autem causa (inquit) vitii hujus vasorum umbilicalium fuerit, invenire difficile est. An debilitas uteri post primum partum laboriosum contracta in causa fuerit, ut semina non rectè misceri, & ignobiliores partes & inter eas vasa umbilicalia, non rectè conformari potuerint, sed exilia tenuia atque infirma remanserint, quæ postea accedentibus vomitibus enormibus quibus prægnans semper insigniter infestata fuit, facile abrumpi potuerint: An vero quia semen virile quidem, idque satis potens adfuit, & ex eo partes spermaticæ nobiliores formatae sunt, scæmineum vero semen, ex quo imprimis, aut certè ex eo præcipuè cum masculino mixto, ignobiliores partes, ligamenta & vasa etiam umbilicalia formantur, ob callum vasi ejaculatorio fundi uteri inserto, ob partum laboriosum defuerit, vel paucum adfuerit: atque ita ob seminis scæminini defectum vel paucitatem, vasa umbilicalia perfici non potuerint & tenuia & exilia remanserint, penes lectorem sit judicium.

Hæc non incommodè quadrant in nostrum quoque casum. Abortum enim nostrum partus quoque difficilis præcesserat, quo filius in lucem edebatur (adhuc superstes LUDOVICUS) tam exilis & debilis, ut de ipso actum arbitrarentur adstantes, clysteribus inter alia maxime refocillatus.

Observatio Anatomica VI.

CORPUS defuncti Generosissimi Militiæ Ducis Generalis, Jacobi Ramsayi, Scoti, ante annos XVI. 19. Junii à me apertum sequentia notanda dedit. In musculis observabantur *ερεοφάγματα* & Ecchymomata tot & tanta, ut majores musculi plerique putridi fuerint, maxime oblique ascendentes & transversi in sinistro latere. Peritonæum in eodem latere nigricans & putridum conspici batur. Vasa Mesenterica crassâ materiâ biliosâ turgebant. Venter cum intestinis modicum aquæ continebat. Hepatis verò color quoad concavam par-

tem nigricans & cinereus, quoad externam flavescens: substantia autem schirrhosa erat. Renum loco portionem pinguem quasi; Lienis vero loco ovi gallinacei quantitate nigrum fructum, sanguinis coagulati facie, inveniebamus. Cavitas circa vesicam abdominis aqua repleta erat, ut & scrotum circa sinistrum testiculum potissimum dextro longè minorem. Vasa testiculorum varicum modo consistebant. Dextri testiculi substantia spongiosa & putrida, tunicaque adnata erat in dextra Scroti parte caro adiposa. Pulmones copiosè pus dabant. In cerebro nil poteramus p.n. aut notabile notare, præterquàm magnitudinem ingentem omnino. Omnes vero venæ destitutæ ferè erant sanguine, refectæ seio.

*Verba hæc
sunt Cla-
riss. Franc.
Sylvii, Me-
dici Excell.
qui primus
Vulnerato
adfuit.*

Occasio Morbi & Mortis talis fuit. Accepit Nobilissimus Ramæus XIII. Februar. 1638. (inclinato parum antrorsum corpore) in sinistra natis partem superiorem & externam introrsum & deorsum leviter tendens vulnus ex quo statim concidit, cum insistendi illi cruri impotentia, necdum remittente. Effluxit ex hoc vulnere & quidem statim in principio, satis copiosè sanguis: nullo notabili ex uestione (quæ utpote levis admodum 5. die remisit) labiorum vulneris adjacentiumve partium tumore aut inflammatione suborta, sed generato paulo post laudabili, licet paucopure: unde confestim ad cicatricem properavit vulnus, quod 25. Martii planè occlusum quamvis etiam num lividum sit, & doloris particeps.

Præmis diebus obortus est, adhuc durans, etiam auctus, circa lumborum inferiorem & sacri, imo totius Ischii ossis sinistri regionem dolor vehemens, per intervalla maximè ad aëris mutationem, nunc remissior, nunc intensior, cum tensione & sursum per totum spinæ dorsū ductum ad cervicem, deorsum vero ad extremos articulos usque tractione convulsiva, eaque valdè molesta, ad oleorum tamen nephriticorum inunctionem aliquo modo emendata, licet sæpius recurrente.

Huic comes factus est sinistri cruris dimidiam & externam partem infestans, & contactum pati nescius, atque cum stupore aliquo formicans dolor ad articulorum extremitatem protensus.

Die Martii XII. obortus est circa sinistrum pedium & in metapedio, in parte exteriori maximè tumor expansus, cum dolore mediocri
ad

ad contactum tamen ingravescente, qui applicatis à Chirurgo ad utrumque malleolum vesicatoriis & effusa aqua citrina, intra triduum subsedit & evanuit; relicto ad hoc tempus ibidem dolore.

His accessit circa Martii diem XXII. sinistri testiculi cum tumore & summo dolore inflammatio, quæ tamen nunc magnam partem sublata, remanente solum levi duritie, rubore & dolore.

Circa idem tempus emisit urinam albicantem cum simili sedimento, eoque crasso, tenaci & paucò.

Percipit præterea, ad internam sinistri femoris inflexionem, prope illum locum quo fertur in Scrotum spermaticis vasis dicata peritonæi productio, dolorem satis molestum: nullo adhuc, nec hic nec alibi apparente tactui, multo minus visui tumore aut stabili saltem rubore.

Quibus tandem adde miram quandam, quamque exprimere nequit, in abdomine temporibus incertis divexantem molestiam, & talem quidem, quæ nec proprium ferat contactum.

Re itaque deliberatâ cum Excell. Dn. D. Faufio, Elector. Palat. moderno Archiatro Meritissimo, licet dictus Nob. Dn. Sylvius, & post eum Cl. D. Georgius Moltherus non intermiserint omnem lapidem movere pro salute recuperanda: tumor vero in scroto indies augeretur, atque ecchymata insuper partes non tantum externas, sed & fauces, linguam & palatum occuparent, doloresque dorsi magis magisque urgerent, meum quoque consilium expetiit.

Vocatus deprehendo Herniam, non ventosam ob defectum flatuum: nec simplicem aquosam, quia scrotum nec lucidum, nec aqua turgidum: nec carnosam simplicem ob dolorem: nec simplicem varicosam ob nimium tumorem: sed herniam ex aquosa, carnosâ & varicosa conflata. Aquosam quidem inculcat tumor instar ovi oblongus cum testiculi occultatione quoad tactum & visum.

Accedit & hoc quod sinistro lateri aquosæ herniæ valdè sint familiares, quod nempe vena spermatica sinistra oriatur ab emulgente. Carnosæ vulnus ad sinistræ natis partem superiorem vergens ansam dare potuit & causam. Generatur enim hæc hernia ex sanguine testes & scrotum obruente ibique in molem carneam mutato: cui affluxui vulnus potuit, ut dixi, ansam dare, ut non solum in principio statim Testiculi sinistri inflammatio sed & dolor secutus fuerit. Suppetias fert sanguis

guis adustus melancholicus à vitio lienis oriundus: Renisque sinistri debilitas. Varicosam monstrat dolor, qui exacerbatur in distensione vasorum spermaticorum, unde erectionem penis cruciatus intensissimi comitantur.

Præter Herniam hanc noto quoque Ecchymomata supra jam tacta, ad quorum aspectum memoriam meam non poteram non excitare ad illa, quæ Parens meus exhibet part. II. observ. l. 4. obs. X. Ast verebar non critica esse in Ramsæo, uti fuerunt in puello epileptico & sexagenario Arthritico. Suspicabar à debilitate viscerum sanguinem adustum ex venis per subsultum quasi effundi in musculos.

Suasor fui ut I. materia adusta Tartarea in hypochondriis incuneata præpararetur & evacuetur, ut II. renes & sinister maxime ab heterogeneis, viscidisq; puri non absimilibus humoribus excrementitiis liberaretur, ut III. viscera singula concoctionis firmarentur, atque IV. herniæ quoque & V. ecchymomatis prospiceretur.

Præter ulla autem quibus hætenus ulus quoad I. suasi per octiduum usum Mellicrati A. cum laxativa potione coronidis loco sumenda, B. & post hæc mane pulvisculi C. portionem, cum aqua D. Quoad II. scopum pilulas de Terebinth. E. cum syrupo F. non neglecto Unguento G. & Emplastro H. Quoad III. Electuarium I. Quoad IV. fomentum K. Cataplasma L. & Linimentum M. cum Cerato N. Quoad V. intermedios sudores. Diætam imperavi convenientem & debitam.

Ast omnia in cassum. Captivitatis diuturnæ plusquam satur ira & inedia voluntaria omnem mihi spem abscindens seq. Mense moritur.

Ecchymomata autem illa à causa interna non sunt valde familiaria, uti nota sunt quæ à causis externis, contusione aut casu fiunt. Nero Imperator in sui imperii exordio ob hæc Thapsiam magni fecisse perhibetur. Illi quidem, dum noctu incederet incognitus & in multos impetus faceret, non semel facies sugillata cutisque livida facta fuit. Confestim ex Thapsia, thure & cera facto linimento à fœda sugillatione liberatus faciem populo ostendens facinus occultabat. Ecchymomata, transfusiones; melasmata denigrationes Schirrhis affines putat Galenus. Fiunt enim illi affectus sanguine ex ipsis venis effuso, nunc tunicis earum contusis, nunc ipsarum finibus refferatis. Hinc in Ramsæi venis fere nullus sanguis fuit repertus, nuda aqua & serum.

Obser.

Observatio Anatomica VII.

IN Anatomia Christophori Richteri, cui Mense Aprili Anno 1637. præfente paulo ante nominato, & nunquam non sine honore nominando D.D. Georgio Molthero, & Chirurgo Jo. Henrico Greilachio, aliisq; præfui; notavi sequentia. Omentum & Mesenterium penitus fere erant absumpta & corrupta. Lienis quoq; exigua portio aderat, nigra, sanguinis congelati instar. Hepar verò insolitæ magnitudinis conspiciebatur, coloris tamē ex parte plumbei & in sinistra parte nigricantis; atq; insuper assatum & torrefactum quasi. Vesicula bilis continebat nigricantem materiam grumosam atq; aliquot lapillos lentium quantitate. In abdomine collectam videbamus aquam citrinam; In Pectore vero purulentam, adeo copiosam, ut pulmonum corruptorum & exulceratorum residuæ particulæ in pure quasi natarent. Venæ phrenicæ pure instructæ. Cor flaccidum erat. Pericardium autem drachmas tres continebat aquæ solitæ. De lapillis in vesicula bilis repertis egi in Manud. Cum pronuper aliquot ab obitu horis cadaver Innocentii X. Pontificis Romani exenteraretur, ut pro more balsamo & aromatibus condiretur, in vesicula fellis duo calculi juglandis magnitudine reperti sunt. Viscera ipsa in aqua natabant, pulmo nigris maculis distinctus, jecur vitiatum, alter renum semiustus, Cerebrumq; multa aqua repletum. De puris purgatione Nellanus Clacanus in Cursu medic. pag. 785. Harvejanam sanguinis circulationem contemnit. Sed tam certum est hoc inventum, ut nullam mereantur negantes replicam.

Observatio Anatomica VIII.

CUM Nobilis Matrona W. à T. nata S. de S. ob hæcticam ab ulcere pulmonum, lienisq; scirrho oriundam, anno ætatis 38. moreretur,

(C)

atque

atq; cadaveris Anatomen à me peteret Consanguinei, inter secandum præter alia notatu digna in Corde reperi ossiculum, de quo olim Pergamenus Doctor cap. 19. lib. 6. de U. P. p. 583. & c. 10. lib. 7. de An. Adm. pag. 358.

Ipsa defuncta 4. liberorum mater, siccioris fuit constitutionis & calidæ, animi pacati, corporis habitus macilenti, crebris capitis destillationibus obnoxia, alimenti calidioris amica, atque non semel febribus tentata. Ante tria lustra Dei ope à petechiis liberata, hypochondriacas molestias & lienis tensiones non raro postea, & annuatim quasi circa solstitia maximè & Æquinoctia passa est. Suppetias his tulit spuria penultimæ costæ in dextro latere à casu ante biennium in Autumno facta, læsio, succedensque tussis vehemens cum catarrhis prolixis, pulmonumque calida intemperie, quæ mala tamen, cum obviam ivissem appropriatis, remiserunt ad tempus, donec Thermis Wisbadensibus me non suadente adhibitis, catarrhi, tussis, anorexia & hypochondriorum tensiones reverterentur, hecticaque superveniens finem vitæ cum fine anni elapsi imponeret.

Pectus incisum aqua repletum inveni, pulmonesque in sinistro latere fere absumptos. Dextra eorum portio superstes purulenta conspiciebatur. Cor nimia quantitate excedebat, ut tam magnum adstantes summè admirarentur, atque hoc exemplo verum deprehenderetur, Cor magnum esse placidis & timidioribus, uti fortibus & magnanimis, Gloriosissimi Suecorum Regis, aliorumque Heroum exemplo parvum & minus. In Pericardio erant uncia quinque aquæ, ad cujus aspectum memoriam meam non poteram non excitare ad Simiam Galeni pag. 112. l. 5. de loc. affect. atque ad illam, quam phthisi mortuam Marpurgi ante annos sedecem dissecai. In phthisicis scilicet magna copia aquæ hic se colligit, cum tamen in statu naturali vix drachinam unam aut alteram continere soleat Pericardium. Eximius Bartholinus in hecticis exiguum credit. Contra P. Vascus Castellus nostram observationem confirmans, hanc aquam per æstum febris hecticæ sæpè in tantum adaugeri scribit, ut eâ distentum pericardium totam cavitatem occupet, forsan ob bonorum corporis humorum atque adipis cordis consumptionem, quâ de re musteam vide disserta-
tionem

tionem Sneideri, Professoris Wittebergensis eximii. Ita quoque J.C. Claudinus parcius in sanis, copiosius in ægris illam aquam colligi colligit p. 235. Adipe Cor pœnè erat destitutum, quod ob calorem p. n. nec colligi nec coire ibi poterat, ut olim jam monuit Pergam. p. 56. l. 2. de temp.

Quoad venam cavam, venam arteriosam, aortam, & arteriam venosam, ante Cordis dissectionem nihil notatu dignum occurrebat. Decenter quoque habebant nervuli, vasa coronaria, & lymphatica, à frequenti potu adhuc, serique copia ex parte conspicua. Sinistra auricula major apparebat dextra.

Inciso corde omnibusque particulis ejus examinatis, deprehendimus valvularum semilunarium circumferentiam osseam, quam pro officulo extraximus. In sinistro ventriculo papillæ carneæ tres eminebant. Septum foveis videbatur instructum, sed non perviis, ut ut sedulus inquisiverim.

Lien erat scyrrhosis, appendice ovum columbinum æquante instructus; hepar è contra magnum & floridum. Ventriculus & Intestina omni ferè humore destituebantur, mesenterium vero atro succo refertum erat. In renibus vesica & utero nil notatu dignum aut singulare observatum est, uti nec in Cerebro.

Officulum Cordis, ut pauca hac de re proferam, negat *Plempius* partem esse arteriæ aortæ ossifactæ, cum in ipsa substantia Cordis observetur, quandoque unum, quandoque duo, quandoque etiam rudimentum tertii, ut ita firmitus aorta nectatur ad Cor. In senioribus hominibus observari dicto loco duriusculam substantiam & veluti neurochondroden. *Rosfinccius* videtur innuere, valvularum semilunarium circumferentiam cartilagineam & osseam reddi, qualem vidit in vetula sexagenaria; & aliis senibus circa radicem aortæ. In Urbani VIII. Pontif. Rom. sinistro Cordis ventriculo officulum invenit *Trullus*. Audiamus *Galenum* lib. 7. Adm. Anat. cap. 10. pag. 354. Quæ ut retuli, inquit, melius corde animali exempto inspiciuntur, ac magis in animali grandiore. Omnibus similiter enim insunt, cum nulla ob magnitudinem in illis sit differentia, sicut *Aristoteles* autumat: sed clarior in magnis cordibus est speculatio: quoniam & ipsius os quod magnis inesse animalibus autumat,

atque his non omnibus, etiam aliis omnibus natura concessit, hanc tamen os universis exactum, tamen cartilaginem. Sic enim in totum res se habet, in cunctis animantibus, & membranae quas trifurcas diximus appellari, & arterialium vasorum radix substantiae durae omnino appensa est, sed non in omnibus aequae durae, quoniam in minutis leviter cartilaginosa est, in grandioribus exacta cartilago, in valde grandibus cartilago ossea: & quanto animantis genus corporis mole vastius fuerit, tanto plus osseae substantiae cartilago sortita est. Et in maximis, ubi plus osseae substantiae gignitur, convenit ipsam tunc appellare non cartilaginem osseam, sed os cartilagineum. Quod enim in minutis animalibus producit, non cartilaginis adhuc exactae naturam, sed corporis ex nervo & cartilagine conflati representat. Nullum vero miraculum est in minutis ipsum animantibus confectionum rudes penitus ignorare, cum & in grandioribus frequenter ipsos lateat. At quid dico in grandioribus? Nuper Elephantum maximo Romae jugulato plerique Medici ad ipsius dissectionem venerant discendi gratiam, duosne cor haberet vertices an unum, & ventriculosne duos, vel tres. Ego autem ante confectionem asserabam, eandem cordis structuram cum aliis omnibus animalium ex aëre respirantium inventum iri, quae etiam ipso diviso apparuerunt. Idem os ipsius sine negotio reperi, una cum familiaribus digitos admolitus.

At in exercitati sperantes, id quod in aliis animantibus non apparet, ita in magno se inventuros, ne elephantum quidem Cor os habere putabant, ego autem ostensurus ipsis eram nisi familiares risisset, quod attonitos illos ac sensus expertos propter loci ignorantiam conspicerent: & cum adhortarentur, ne indicarem subitici: Corde vero à Caesaris coquis exempto, misi aliquem ex familiaribus in huiusmodi exercitatis, rogatum coquos, ut os ipsius eximi sinerent: atque sic factum est. Servatur idem apud nos etiam hodie, eximiae adeo magnitudinis, ut ab iis qui intuentur, nullo modo credi queat, tantum os Medicos latuisse. Ita sane in exercitati multa ignorant. In magnis, scribit idem Galenus lib. 6. de U. P. cap. 19. pag. 583. animalibus os cartilagineum: in parvis vero admodum

νευροχονδριον τι σωμα, hoc est, corpus quoddam ex nervo & cartilagine conflatum, inest, Omne igitur Cor duram quandam eo modo habet substantiam, earundem utilitatum gratiâ, in omnibus animalibus institutam: Quod autem Cor majus ejusmodi substantia duriore eguerit, minimè mirum id videri debet. Nam quod durissimum est tum ad ligamentorum principia tutius colliganda, tum ad totius Cordis firmitatem in corde magno est aptius. Hæc Galenus. Nos nuper in Ursæ majoris corde officulum quoque invenimus, uti quoque Leo non ita pridē Dresdæ mortuus & dissectus elegans exhibuit. Penes Pharmacopolas, ait Plempius, officula de Corde Cervi adservantur in usus Medicos: quorum pleraque puto esse ossa hyocidæ: sunt enim illis hæc non dissimilia in figura: & fortassis etiam in facultatibus. At revera dissimilia sunt quo ad figuram. An facultatibus similia sint equidem nescio.

Officula de Corde Cervi in gravissimis morbis debellandis mihi præstant certum auxilium, in febr. v. gr. pleurisi & difficultate partus, atque aliis. Non tamen fido, nisi à fidistraditis, vix fido iis, quæ passim prostant, cum non credam tot in orbe occisos esse Cervos per lustrum, quot officula quotannis Materialistæ soli Francofurtenses accipiunt.

Quoad vasa lymphatica, quorum supra feci mentionem, notandum illorum esse negari non posse, an verò diversa sint à lacteis Asellii, & an liquorem deferant ad Cor pro sanguine diluendo, meritò dubitari posse, quod lacteæ hepaticæ diverso tempore diversum quoque imbibant humorem, & non raro quoque eundem cum lymphaticis exhibeant, quod tacitè forsitan concedere cogitur Cl. Bartholinus, dum scribit in jejunis & longè post pastum apparere vasa lymphatica felicius, quàm alio tempore, & vasa ipsa lactea jam chylum jam serum continere: quò etiam trahere possumus Kohlhansii observationem, quam thesi 59. vacuo ventriculo, nullo nempe præsentē chylo notavit satis pulchrè & eruditè ad Doctiss. Dn. Israelis manu ductionem.

Altius vero quo ad usum hi Artis nostræ Heroes gradiuntur, atque lympham hanc pro menstruo habent Alcahest Microcosmico. Magis seriò ultimus hac tempestate quod sciam hac de re agit D. Schenkus Jenensis in historia feri sanguinis.

Observatio Anatomica

I X.

PRæcedentibus annis, 4. Augusti Illustrissimus quidam Comes, magnæ & præclaræ spei Juvenis, variolis correptus ob febris & Dysenteriae vehementiam septimo die morbi mortuus est.

Dissecto jecur, lien, pulmones & intestina haut secus, atque ipsa cutis sordidissimis papulis manantibus scatebant, uti in aliis idem Fernelius notarunt atque Pareus: Unde forsân factum, quod in extis Gloriosissimi Romanorum Regis talia quidam notantes, dixerint gravissimis affectibus obnoxium fuisse optimum Regem, quos propter ad senium non aspirasset.

Si ullius autem morbi signa, maximè variolarum & Morbillorum signa dubia omnino sunt & fallacia, ut inter alios bene inculcat Fracastorius, cum non facilè dignoscantur adesse, priusquam pustulæ ipsæ malum prodant. Quamquam etiam à variolis interna viscera non raro ita afficiantur, tamen apud Athleticum & Sanguineum in visceribus dictis fomes sæpe continetur, vitæ brevis, non supervenientibus variolis, index: unde fit, ut interna à variolarum virulentia tum facilius tam fœdè corripiantur.

Alvi fluxus sanguineus aliàs per se lethalis esse solet in Variolis, adeo ut Riverius confiteatur ex omnibus pueris variolis laborantibus unicum evasisse: atque Pachetus tensionem & meteorismum ventris signum mortis habeat. Non hoc possum profiteri, cum multos liberatos recorder, non tamen sine magna difficultate, uti in filio meo natu majori expertus sum.

Cum autem alvi fluxus & meteorismi tam sint lethales & periculosi, proinde in cura variolarum & morbillorum caute agendum cum purgantibus, ne naturæ motus mutetur, alvi fluxus funestus excite-
tur. Melius & tutius me iudice faciunt, qui in principio variolarum ab electivè purgantibus abstinere, & clysteres exhibent, atque Præsente indicatione sanguinem mittunt, ut san-
guinis

guinis ebullitione ita sublatâ, natura feliciter expellere heterogenea possit.

Sed & non raro purgantia adhibenda esse in Variolarum cura ratio & experientia suadent, si enim manifesta repletio sit extra vasa, atque potissimum quidem in regione prima, sine fluxu alvi, nec medicamenta calidiora aut acriora exhibentur, ipsaque constitutio non adeo epidemica, pestilens aut lethalis & funesta sit: non sine ratione tale datur pharmacum; quam ob causam Ranchinus etiam lactantes non raro purgandos statuit.

Plethoræ dum mentionem facio, non possum non detestari opinionem illorum, qui omnem tam ad vasa, quam ad vires negant, atque Venæsectionem penitus damnant. *Helmontius* Nobilissimus passim hoc inculcat, & post hunc aliquo modo *Insignis & Clarissimus Cnōselius* in curat. febris malign. contra *Corradeum*. Habet vero plures hæc tempestas Corradeos tales Medicos, mendicos totos, nisi strenue purgarent sanguinemque mitterent.

Videas sæpe audaculum medicastum, qui homini etiam quoad vires & annos seni, emaciato in media bruma, citra ullam indicationem dare cathartica, quæ ἀνὰ καὶ κῆτω crudeliter purgent; alteroque die largiter sanguinem furari, ad Junoniæ avis cantum non erubescant, Verè δέχεται tunc ἐκκαθάρσιν.

Dolendum sanè tam nobilem artem scèdari ejusmodi excrementis myrmillonibus & histrionibus, verendumque ne tota abeat iterum in periculosam & truculentam Empyricam, cum non tantum vulgus & plebs, sed & Magnates sæpe illis impostoribus aures præbeant, imò illos in arte peritis & solide doctis quandoque anteponant. Deus Bone! quam audacter & impunè illi medicastri occidunt! Non tamen rejicienda in totum purgantia, nec damnanda penitus Venæsectionis, sed intempestiva & inconvenientia.

Quam generosum enim remedium sit sanguinem mittere in febribus & inflammationibus, atque variolis notorium est. Imò si Medicus naturæ minister, & natura ipsa non raro sanguinis imminutionem instituit, cur non, si necessitas id efflagitet, naturam imiteretur & venæ incisionem suadeat, doctus & peritus Medicus? Cum grano itaque salis sumenda sunt, quæ de Venæsectione & Purgatione proponit

Eximius

Eximius Dn. Cnōfeliū, qui nec ipse omnia purgantia damnat, nisi fallat epistola Arcissevii pag. 59. Sic quoque quoad sanguinis missionem debitam non dissentit, uti digito monstravi in mea ad Medicinam manu ductione, potius tacite consentit in eam, cum abusus non tollatulum, ab ipsa Magistra Natura seriò & providè inculcatum.

Plethoram enim ad vasa ab ebullitione sanguinis proveniente, Venæ sectio, si nihil obstet, feliciter sistet, acquisito nempe spacio. Ita quoque, si causa sit fermentationis, Venæ incisio non poterit non prodesse, ut nempe una cum sanguine turgente & calorem suffocante, evacuetur. Macilentos vero excusat calor copiosus pabulum absumens. Unum quoque idemque vas esse potest pro humore debito & naturali, atque p. n. & abundante. Abusum Venæ sectionis meritò detestari debet Medicus doctus, usum vero magnifacere, sæpe enim fermentum sanguinis non potest præcaveri, aut postmodum tolli, nisi ebullitio sanguinis sistatur & Venæ sectio instituatur; unde in febribus malignis, variolis, morbillis, non quidem ratione malignitatis, sed ob febrem & sanguinis vehementem ebullitionem non raro cum successu sanguis mittitur, ipsa sæpe naturâ viam monstrante. Nec illi qui penitus damnant V. S. longè vivaciores sunt nobis Meridionalibus V. S. assuetis. Quæ omnia tamen sumenda & intelligenda sunt de V. S. secundum rationem instituta & convenienti. Annon pronuper ab inconvenienti & sæpius repetita crudeli sanguinis depredatione Serenissimum Cardinalem obiisse refert Helmontius, & evincit Plempius? Idem fatum incumbet aliis, si majorem fidem habere pergant agyrtis sanguis & argenti fugis, quam cordatis & in arte solidè versatis Archiatris. Sed ad rem nostram.

In variolis sanguinis evacuationem necessariam probat ratio & experientia, tam ob humorum in venis abundantiam deplendam, ut natura exonerata impuritatis colluvie (loquor verbis Bauhini) alacrius expellat reliquias: quam ob febris ardorem atque humorum fervorem & ebullitionem sistendam, temperandam, tollendam: ratione simul habitâ ætatis, temporis, loci, quantitatis & regionis, ipsiusque veneni; ut pulchrè exponit citatus antea Ranchinus & alii.

Hinc probè notandum, si natura ipsa quandoq; neglectum medicinarium illicidio motu critico in Variolis compenset, quod non statim &

etiam & temerè ille fluxus sit sistendus. Vocatum ferretulit mihi D. D. Pabst, Archiater Dresdensis, Medicus verè πολυμαθής, aliquando ad Nobilissimam puellam variolis correptam cum narium hæmorrhagia critica. Ibi Matrem & adstantes seriò urfisse fluxus illius sublationem.

Imò tandem contra ipsius præceptum adhibito magico remedio, frustulo nempe panis cui cum sanguine inscriptum erat *Consummatum est*, inhibutum fuisse, pro armis medicis cum Biarmis beneficiis ita assumptis. Ast quid fit? Cesante illa hæmorrhagia secuti cruenti alvi fluxus, vomitus, mors.

De variolis unum adhuc notandum nimio æstu ægros non semper torquendos esse, ne calor febrilis augeatur, vires decedant, & ipse ægrotans suffocetur: Præsertim si magnam caliditas (loquor verbis Domini Doctoris Suevi Electoris Saxoniz Personæ Medici Primarii diss. de Variolis) & valida inflammatio adsit, nec ulla post variolarum vel morbillorum eruptionem sentiatur sublevatio, atque virium exsolutio, atque syncope imminere videatur.

Non possum hic mihi temperare, quin è plurimis duo exempla notatu digna allegem, quorum unum hic, alterum Ratisponæ in nuperis Comitibus, contigit.

Missum erat lectissimum Illustrissimorum juvenum par ex Polonia Viennam, non tam studiorum, quam rituum & morum Germanorum, exercitiorumque equestrium addiscendorum causa. Viennâ Præfectus Ratisponam duxerat ipso ardente Syrio, ubi paulo post adventum natu major variolas accipit, à quibus calidoque ad Itali cujusdam Medicastrum rigida monita hypocausto, brevi moritur. Singulis horis data sunt pretiosa alexiteria sudavitq; vehementer, donec animam ipsam emitteret; Sæpe medicus parum doctus multum vero sedulus quam officiosissime occidere potest. Natu minor eodem morbo paulo post corripitur, atq; Dn. D. V. Vechtleri Medici Cæsarei Cl. Clarissimi que Dn. D. Helvigii, meaq; curæ cōmittitur. Nos tam vehementi æstu ægrū non torquendo, alterantib⁹q; febris furorē mitigando sanguinis ebullitionem sistendo,

simulque adhibitis bezoarticis non adeo calidis, brevi, Dei ope convalescantem vidimus.

Hic vero Nobilissimæ Viduæ cum quatuor liberi semel correpti variolis essent, gemelli quidem pueri, filiaque natu major meæ curæ committerentur, altera vero filia certas ob causas alterius ope uteretur: meis sub initium dedi haustum vini passulati à Parente descripti, alterantia post & bezoartica, quibus Dei ope brevi convaluerunt. Quid vero de altera factum? Illa non nisi alexiteriis usa, lectis semper curio- se recta, largis sudoribus enervata, inflammatione & febris ardore au- ctis, ebullitione sanguinis ingravescente brevi, uti prædixeram, mor- tua est.

Observatio Anatomica

X.

Sole Cancrum tenente in ipso Plenilunio nascitur Puellus eufarcus, & coloris per universum corpus subrubri, partu autem difficili præcedente.

In Parentibus satis bene valentibus prædominatur plethoræ, temperiesq; calida & humida, maximè in matre, nondum vix annos nata. Pater annorum tum 24. hæreditario vitio, hypochondriorum malis insuper non semel tentatus autem fuit. Recens autem nato puello ante mammæ exhibitionem, ut sordes retentæ abstergerentur, diamygdatum datum fuit ex ol. amygd. d. & sacharo penid. succeden- te sic feliciter nigræ & piceæ materiæ excretionem. Habuit hinc benè & pancreaticè floridus puellus, nutricem nactus boni corporis habi- tus, ætatis vegetæ, mammarumque non adeo laxarum aut pendula- rum, sed benè conformatarum; Nec gulosam primiparam etiam. Lac ipsum quidem non adeo recens, sed ultra 20. menses aberat à partu, bonum tamen substantiæ, coloris, saporis, odoris ratione. Cùm autem quotidie puello bis daretur pulmentum ex lacte, farina & ovo, atque in pulmento aliquid pulveris ex rad. & sem. pæon. cum

Croco

Croco & Sacharo, post pulmentum vero aliquid *cerevisiæ* instillaretur, & quotidie post pulmentum balneum aquæ dulcis adhiberetur: die verò decimo *nativitatis* nutritrix & astantes conquererentur de Puelli ventris inflatione, alvi obstructione, cordis palpitationibus, crebris anhelationibus tumoreque sinistri hypochondrii: dedi iterum felici cum successu diamygdalatum, & suasi, ut quotidie aliquid exhibeatur pulveris Marchionis aucto pondere Margaritarum sine croco; ut pulmentis non addantur ova; ut præbeantur semel in die, & in minori quantitate, quod lactis boni copia adsit & excrementa alvi sint viscida & viridia; ut butyrum recens cum pulmentis detur: ut balneum intermittatur; utque post pulmentum à *cerevisiâ* imò omni liquore per horam abstineatur. Mense Augusto melius habuit præterquam quod excrementa nunquam naturalia, semper viridia, tenacia & viscida rejecta fuerint, venterque inflatus manserit; atque circa æquinoctium nephriticos dolores pateretur, cum excretionem arenularum. Sole vero Capricornum ingressu, diarrhæa non levis virium dejectionem & atrophiam causabatur, cui (in consilium adhibitis D. D. Petro de Spina, D. D. Metzgero, Collegâ Honoratiss. & aliis Medicis Clarissimis) obviamivi Syrupo ros. solut. & diasereos causâ removendæ gratiâ, & corroborantibus. Dejectiones erant viscidæ, nigræ, virides. Lien durus. Venter inflatus & hypochondria tensa. Usurpatis his mediis malum videbatur inducias dare usque ad mensem, uti ad me peregrinè profectum scriptum est, Februarium, quo denuo venter magis magisque intumescebat, lienis tumor crescebat atque flatus augebantur. Data sunt enemata ex Juris Gall. ℥iv. cum fl. camom. coct. & colat. cum sach. rubr. ℥ij. & ol. amygd. dulc. ℥iij. Internè verò Manna, Syr. ros. solut. diafer. Usurpata sunt quoque externè linimenta varia & inunctiones. Post enemata tumor ventris auctus est, non obstante, quod rejecta fuerit magna copia peccantis materiæ. Quo ad diætam quantitate & qualitate ea fuit emendata, ita quidem ut pulmenta data fuerint in minori quantitate & loco lactis decoctum gall. & carnis bubul. in pulmentis sit, bono cum successu, adhibitum. In Aprili autem me adhuc absente, non tantum tumor abdominis indies auctus est, sed & cachexia totius atque inflatio pedum, manuum & faciei non leviter apparuit, quibus malis averruncandis adhibita varia

sed frustra, & adeo quidem, ut Ascites ingens cum Tympanitide, me-
judice, optimum puellum occuparet.

Ad lares itaque relatus dedi 2. Maij Syr. de carth. & Syr.
ros. solut. & felici quidem, uti apparebat, cum successu,
cum sexies alvum dejecerit, atque multum serosæ materiæ
excreverit. Nox tamen secuta inquieta & calor præter natu-
ram auctus. Quinto melius habuit, atque Decimo iterum
sumsit Syrupum laxativum, non intermissis roborantibus &
aliis necessariis tam externis quam internis. Excreta per al-
vum & vesicam magna quidem copia aquæ, tumore tamen
ventris & atrophia cum succedente pectoris angustia incremen-
tum majus indies sumentibus: ut omnino pro desperato mor-
bus habitus fuerit. Nullas tamen ferias egimus, sed quan-
tum ætas & vires flagitarunt, cottidiè pulsioni succurrimus, fru-
strà tamen & præter successum, cum vigesimo primo Junij na-
turæ debitum tandem solverit. In examine autem viscerum de-
functi hujus puelli per sectionem instituto, sequentia notata sunt;
Primò quidem Cutis circa regionem Ventriculi, Umbilici & Ingui-
num maculis atropurpureis instar ecchymomatum picta erat. Ex
abdomine per sectionem Umbilici leviter factam, humores serosi,
biliosi, lutescentes, & fœvidi, instar aquæ per canaliculum ductæ,
ad tres mensuras profusiebant. Quibus subductis, & aperto
abdomine Omentum penitus putrefactum notabatur; Inte-
stina cum Ventriculo aliquo modo inflata; Pancreas verò
ita consumptum, ut ejus nullum ferè vestigium animadvertere
liceret. Venæ Mesaraicæ glutinosa materia refertæ. Lien
monstrosè tribus appendicibus instructus, nigri coloris, &
induratus, sinistroque Reni arctissimè annatus, ut sine se-
ctione digitis avelli non posset. Renes ipsi satis grandes. He-
par sanguineo colore suo amisso, cineritium ferè, & qualis
in costis aliàs observatur, habebat, incisumque copiosum et-
iam serum, & copiosius quam Lien, stillabat. In Hepate au-
tem & Liene foveæ aquâ plenæ apparebant. Bilis in vesicula au-
reo colore coruscabat.

Pericardium aquâ, ejusdem cum supra dicta coloris & fœtoris, distentum erat, cui Cor innatabat. Ipsum autem Cor planè exsuccum ne guttulam quidem sanguinis intra se continebat, quod in aliis etiam visceribus observabatur. Nullibi enim sanguis notari poterat, etiam in Venæ Cavæ & Arteriæ Magnæ incisione, sed tantum aqua, loturæ carnis non abfimilis. Pulmones flaccidi & ex parte unâ purulenti erant.

Prædixeram non semel talem catastrophem: verebarque ne anguis in herba latitaret. Non defuerunt quidem promissis divites, qui Parentibus levem morbum, facilemque curationem facerent, quod puellus nunquam non cibum avide assumeret & satis hilarem ac liberalem se astantibus exhiberet. Ego tamen, non in primæ concoctionis læsione malum incuneatum, deprehendens, non potui non à prima invasione morbum fonticum & in tantilla ætate curatu difficilimum profiteri.

Fauftis quidem natus erat sideribus; crebræ tamen anhelationes, ventris tumor, phlogoses, dejectiones alvi adeo præternaturales, lilenisque tumor, à prima nativitate indies magis magisque affligentes, color faciei certus in sanguificatione defectum monstrabant. Clysteribus hæc mala facile averruncari posse, suadebant & jurabant nonnulli. Alii cane pejus & angue fugiendas esse injectiones clamabant, quod visceribus laborantibus suppetias nullas ferre possint. Hic immorari parum, & cui potissimum parti subscribendum sit, ex natura & usu clysterum cum morbi idea collatis, penitus inquirere placet. Clysteres, ut in Arte tyronibus constat, medicamenti genus *πλὴν ἄριστον* est, quod in extremis sæpe morbis delicatulis etiam & ad alia nauseabundis expetitas suppetias spondet, quoque unico, cæteris vel generosissimis in cassum adhibitis, ægrum tantum non extinctum erigimus sæpè & velut ab inferis revocamus. Ut vel hoc nomine illorum intempestiva, ne quid gravius dicam, verecundia, scutica digna sit, qua ad nomen etiam clysteris expallescent, & hujus mentione facta, de vita jam actum & conclamatum esse clamitant.

Generosus quidem Helmontius clysteres in jus vocat, diffamat & præter meritum è Medentum schola relegare tentat, tanquam pudentum Medicorum subsidium, remedium homine indignum, intestinis infensum, omnibus exosum & inefficax. Ast æquius de his sentiebat

prisca ætas, majoremque ut merentur, honorem iisdem deferebant olim non modo Ægyptii, sed & Græci atque Arabes, quos Hispani, Galli, Itali, Germani sequuntur. Antiquissimus Medicorum Parens Hippocrates in epidem. ubi longum catalogum ægrotantium enumerat, clysterum & suppositoriorum mentionem facit frequentem. Ægyptiis, Herodoto teste, clysterum usus menstruus erat *περὶ φυλάξεως ἐν ἐνέκῃ*. Civium suorum ore Mercatus ad omnes morbos extollit clysteres.

Subscribunt Rondeletius, Mercurialis, Primi Rosius, & qui non? Experientia enim nolentibus volentibus confessionem extorquet. Non tamen occupant universalis Medicinæ titulum, non enim perpetuo & omnibus malis, omnive tempore medentur.

Temporibus Medicina valet: data tempore profunt,

Et data non apto tempore, vina nocent.

ob quam causam intempestivum clysterum usum exprobrant Tulpius, Heer, Riverius & alii.

Suos itaq; clysteres limites habent & usus particularibus affectibus determinatos, ac præcipuè quidē intestinis infunduntur, ut horum infirmitatibus primariò succurrant, intemperies emendent, segniores alvum officii sui admoneant, vitiosamque ventris primarumque viarum saburram ē corporis culina ēverrant: quo potissimum nomine veteribus in usum Medicum venire, utebanturque hi solā mulsā cum oleo ad alvum emolliendam ut ex Hipp. & Galeno constat. Et hic usus satis notus est.

Majori difficultate premitur alter, an vicinas etiam partes afficiant, iisque in subsidium veniant? Contra negantem quotidiana praxis militat, quæ talibus in casibus ad sacram hanc anchoram securè confugit. Ita in renum & vesicæ calculo clysteribus quid est laudatius? quid ad dolores placandos præsentius? Ita in hystericis affectibus materiam peccantem feliciter educunt, & uterum faciliè corrigunt. Nec sine ratione hoc fit. Quod si enim malè affectis intestinis, uterus, renes, vesica in contagium trahuntur, adeoq; propter vicinum malum & ipsa aliquid mali experiri cogantur, quod præter experientiam expressè docet Hippocr. 5. aphor. 58. 7. aphor. 27. quidni iisdem suavi medicamento virtute delibatis in suavem etiam consensum vocentur. Porro sicut

sicut externa fomenta, linimenta, emplastra in interiorum viscerum obstructionibus eximendis, tetrīs flatibus discutiendis, ipsarum partium dyscrasiis emendandis palmam non raro merentur: ita clysteres intestinis insinuata, non solum grato tepore suo vicinis partibus blandiuntur, opitulantur, & robur sæpe afflant; sed ad ipsam affectam partem penetrant; non quidem per occulta illa veterum perspiracula, huc enim confugere opus non est, ubi viæ manifestæ patent; nec longiori recepto tamen hætenus per hepar & cor itinere, vix enim has per ambages virium jactura caveri potest; sed per lacteos ductus brevissimâ ex intestinis viâ jam ad renes, jam ad uterum, certis ad hunc à natura fabricatis ductibus vix assumpta transire possint. Ad uterum quidem adhuc ignorantur, nisi cum Clarissimo Harvejo arterias uterinas allegare placeat. Quicquid sit, aut non sunt negandi, aut portæ satis digna alia monstranda est, cujus ope medicamenta hysteriis aut in partu laborantibus vix infusa utero statim communicantur, viribus, colore, substantia integra. Hærebit, aliam qui quæret, scio. Crocum exhibuere Heurnius & Heer: & utraque mater foetum enixâ croco tinctum penitus, & altera quidem ab exhibitione dimidia quadrante citius. Bertrandus Rozius apud Salern. c. 129. cum semine vim & virtutem pharmaci transfudit in uxorem. Idem recordor Nobili cuidam mihi amicissimo Aureliæ in Gallia contigisse, qui scorto post horam jusculum ferenti inter meretricios amplexus per coitum assumpti pharmaci efficaciam insinuavit, ut αὖν καὶ κατὰ vehementer decies purgaretur. Anne & hic accusandi prædicti ductus? Sed ad rem!

Id de clysteribus exponendum, quomodo iis in longè remotiora viscera jus concessum sit, ut nempe pleuritici, epileptici, apoplectici, paralytici suppetias ferant; circa quam rem Autores hæsitare videntur. Galeno tamen teste, & ratione ipsa id inculcante, quicquid agunt clysteres hoc in passu, id revellendo præstant.

Ex quibus dictis patet, primum usum, quoad demortuum Puellum, exiguum imo nullum esse potuisse, cum vitium primum non in ventriculo aut intestinis latuerit, nec alvus indiga fuerit, ut uno vel pluribus clysteribus quotidie stimularetur, cum suapte & sponte indies plus justo responderet.

Nec

Nec secundus etiam aut tertius scopus clysterum quotidianum usum & frequentem reiterationem indicabant. Et si enim hypochondria & in his hospitantia viscera Lien, hepar malè affecta sæpè non exiguum à clysteribus levamen sentiant: hoc tamen non nisi in eorundem intemperiebus aut obstructionibus ratione causæ antecedentis sperandum est; at in habituali & nativa viscerum corruptione qualem signa manifestissimè præ sagiebant, tantum abest, ut quid laude dignum præstent clysteres, quin potius malum exasperent, vires perpetuo & inani stimulo magis magisque prosteruant, inflationes augeant, & mortem forte ante diem accersant. Quod in præsentī casu evenisse jurarunt adstantes mulierculæ, quæ ad quemlibet clysterem injectum (qui tamen omnes præter unicum & primum quidem, statim ut injecti erant, per inferiorem gutturem, (ut amicus loquitur,) redierunt, abdomen sensibilibiter in majorem molem intumuisse, respirandi difficultatem excrevisse, conquerebantur.

Sed revellere, inquis, materiam peccantem potuisse, adeoque maturo consilio in usum adductos fuisse. Ausculta ergo, quid valeant revellentia. Revellentium medicamentorum est, materiam non illaplasm, sed influentem & ad partem tendentem; non extravasa, sed in vasis fluctuantem; non à parte recipiente, sed mandante retrahere. Et hæc discere potuisses ex Sennerti Institutionibus, quæ in omnium etiam tyronum manibus sunt. Ut autem quæ in pectore hærent, ita facile per alvum evacuari non possunt, ita nec, quæ in abdomen effusa sunt; sed ex 7. aphor. 55. quibus hepar refertum aqua erumpit in omentum, his venter aqua repletur & moriuntur. Si ubi tamen interdum evacuatio talis quid levaminis affert, sive naturâ, sive arte fiat, salvis visceribus fiat, & juxta Hippocr. in εὐσπλάγχνοις: ἀτὲρ σπλάγχνιαν semper negavi, mecumque abdominis à nativitate intumescencia, hypochondriorum præsertim sinistri inflatio, color faciei cereus, atque nimis crebræ anhelationes. Parum itaque & hac ratione spei in clysteribus positum fuit, licet vel vicies, ut quidam Thraſonicè satis loquebatur, paucos intra dies injecti fuissent: sed abdomine ob collectam aquam & flatus copiosos, rupturam jam minante æger tandem viribus exhaustis inter lusus & jocos adstantium animulam exhalavit.

Unde aquarum hæc colluvies in tenella hac ætate primam scaturiginem sumserit, multos habuit sollicitos. Ast illam facile invenit, qui internorum viscerum sive œconomix naturalis structuram & faciem examinat. Meo quidem iudicio collectionis hujus culpa, si non omnis certè potissima in Lienis à primo ortu vitiosam dispositionem redundat. Lien enim sanguinis partem melancholicam à Corde per Cœliacam recipit, innatâ vi fermentat & defæcat. Hoc ubi præstitit, sanguinem depuratum, quantum ad sui nutritionem requirit, apponit, & quod relinquitur sanguinis purioris mediante ramo splenico in portam & jecur, indeque per venarum anastomoses in cavam, tandemque in Cor reducit, ut Spiritu & calore denuo instructus, omnibusque excrementis exutus in aortam pro partium nutritione propellatur. Excrementa vero nunc ad mesaraicas, nunc ad hæmorrhoidas per alvum, nunc ad renes per urinam, nunc ad alias naturæ lege ordinatas vias promovet.

Quando vero Lien officio suo malè, ut in nostro casu, fungitur, humor ille à sanguine negligenter separatus, in corpore cummulatur & malorum lernam introducit. Et quidem in propria Lienis substantia restagnans obstructions parit, tumores, nec raro, partibus tenuioribus absuntis, scirrhum. Quod si insuper suo non contentus hospitio, per ramum splenicum una cum sanguine revertente ad hepar ruat, malum malo cumulat, hepatis crasin frangit, calorem debilitat, unde lienis tandem culpa & hepar vapulat, obstructionem & intemperiem vicini negligentia contrahit, suoque satis officio facere nequit circa sanguificationem, sive sanguinem ulterius non satis excoquendo, sive excrementa debito modo & mensura non separando: sive lympham vasis obstructis in venas cogente. Aquosus itaque, serosus, frigidus sanguis cuditur, cui ferendo cum hepar non sit, in cavitatem destillat vel viscus disrumpendo aut erodendo, vel per membranarum poros transudando. Ita extravasatus putrescit & fœtorem induit. Reliquus etiam sanguis aqua adulteratus in partium nutrimentum non omnis cedere potest: aquosus enim non nutrit, hinc quod boni restat sanguinis quotidie, imò momentaneè exugunt partes, co

res, eo gaudent, vigentque: at ubi bono jam absumto, crudus, aqueosus succedit, cessat nutritio, partes decrescunt, contabescunt: hocque eò citius fit, quando lienteria se associat, & cibus crudus vix assumtus statim per alvum redditur, quæ præsentî agro contigisse vidimus, non solum ob retentricem debilem, sed & ob mesaraicarum obstructionem, quæ vicinis lacteis compressis viam transituro chylo intercludebant: ubi tamen ipsas etiam lacteas ab omni obstructione non facile absolverim.

Aquæ foveæ in hepate & liene apparebant, in illo tamen copiosiores, forte quod à Liene expeditius & facilius serosus humor mediante rene annexo (uterque enim ren satis grandis ad ultimum vitæ usque halitum officium suum debitè faciebat, urina quotidie ad votum fluente) subducebatur. Hepatis color pallidus, cineritius sanguinis defectum accusabat. Inflatio ventriculi & intestinorum cruditatem coctionis sequebantur. Pancreas ad putredinem natura facile, non potuit non corrumpi, putridæ paludis innatans ut & omentum. Pericardium aqua turgidum inventum, quod in dissectis phthisicorum corporibus non infrequens ad tres sæpe uncias. Nec ipsi pulmones satis sibi vigilare potuerunt, quin à transmissis acribus, fœtidis humoribus labem & corruptionem tandem contraxerint: Sed in hac totius corporis anatomie pertractatione aqua pro sanguine, excrementum pro nutrimento surrogatum est, quod admirationem vix meretur. Corde autem ex ucco & sine sanguine existente, quæ vita superesse potuerit, miratu dignius est. Si conjecturæ locus est, crediderim postremis diebus Cor ex vaporibus partim à chylo, partim à medicamentis confortantibus, tum per lacteos ductus thoracicos, tum per peculiarem meatum œsophago implantatum communicatis, refectioem percepisse. Talis autem refectio cum perpetua esse non posset, æger tandem hic veluti lipothymia (qua durante morbo sæpe tentabatur) sine ulla graviore commotione, nutrimento partium subtracto, instar lampadis trepidantis, expiravit. Ita sentio de hoc casu, mecumq; idem D. Metzgerus, Collega & Parastata meus fidelissimus.

F I N I S.