

**Dissertatio inauguralis medica de hydatidibus ... / publicae disquisitioni
offert Joh. Jacob. Martini.**

Contributors

Martini, Johann Jakob.
Winckler, Friedrich Christian, active 1665-1684.

Publication/Creation

Heidelbergae : Literis Samuelis Ammonii, 1681.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/s89rvnng>


License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>





DISSERTATIO IN AVGVRALIS MEDICA
DE D. C. 6
HYDATIDIBVS

QUAM
FAVENTE NV MINE
CONSENSV ET AVTHORITATE
ANEPASSIMÆ FACVLTATIS MEDICÆ
IN ELECTORALI ET PERANTIQVA
VNIVERSITATE
HEIDELBERGENSI
SVB PRÆSIDIO
VIRI
~~OBILISSIMI EXCELENTISSIMI ET~~
~~EXPERIENTISSIMI~~

DN. FRID. CHRIST. WINCLERI,

D. ARCHIATRI ELECTORIS PALATINI,
ET IN HAC VNIVERSITATE PROFESS. MED.
PRIMAR. p. t. FACVLTATIS EIVSDEM
DECANI SPECTATISSIMI

DN. PATRONI, PRÆCEPTORIS AC

PROMOTORIS SVI ÆTERNVM COLENDI,

PRO SVMMIS IN ARTE MEDICA

HONORIBVS, INSIGNIBVS ET PRIVILEGIIS

DOCTORALIBVS RITE CONSEQUENDIS

PUBLICÆ DISQVISITIONI OFFERT

JOH. JACOB. MARTINI,
HEIDELB.

AD DIEM SEPTEMB. M.DC.LXXXI. H. L. Q. C.

HEIDELBERGÆ,
LITERIS SAMVELIS AMMONII,

SERENISSIMO PRINCIPI AC DOMINO
DOMINO

CAROLO
D. G. COMIT. PALAT.
AD RHEN. S. R. I. ARCHITHES.
ATQVE PRINCIPI ELECTORI, DVCI
BAVARIÆ,
&c. &c. &c.

PATRIÆ PATRI,
PIO FELICI AVGUSTO
DOMINO SVO CLEMENTISSIMO

In sui studiorumque suorum commendationem
Hanc Dissertationem Medicam, cā, quā par est, animi submissione,
Consecrat & offert

SERENITATIS EJVS ELECTORALIS

Subiectissimus Servus

JOH. JAC. MARTINI



Antequam ipsam rem describam placet etymologiam, synonymiam & homonymiam præmittere,

Hydatidum vocem Græciæ suam debere originem notum est; derivatur autem proculdubio à Gr. ὕδας, ατρο, aqua, g̃ia. pro quo ὕδωρ receptum est, hinc possent deduci ὕδατια, ὕδατωθης, &c, de quibus consule Græcos lexicographos.

Alias

Varia sortiuntur nomina. Hydatica appellantur Joh. Andr. *Synonyma* SCHMITZ: comp. med. pract. p. m. 185. Vesicæ pustulosæ sero plenæ HOCHSTETTER. decad. 6. cas. 6. Vesicæ serosæ & abscessus a quosi BARTHOLIN. cent. 2. hist. anat. 67. pustulæ aqua plenæ eid. BARTHOLIN. cent. 3. obs. 80. abscessus aquâ clarissima pleni. BORELL. cent. I. obs. 38. SCVLTET. arm. chir. obs. 10. & 11. abscessus serosus s. cystis sero referta BONET. anat. pract. l. 1. sect. 1. obs. 46. §. 2. cystis s. sacculus serosum humorem continens. RIVER. obs. additar. 7. Globuli splendidâ lymphæ gelatinâ pleni. Thom. BARTHOLIN. de biblioth. incend. §. 6. Membranacei aquâ scatentes folliculi. Henr. GLASER ap. PEYER meth. hist. anat. Med. cap. 6. Ova ap. SCHENCK obs. med. lib. 5. de dorso & spina obs. 5. immò vesiculas, seu potius ova s. n. alii hydatides appellant, vid. R. de GRAAF de O. M. p. m. 298. ut alia synonyma præteream. Germani appellant Wasserblasen. Lanio quidam in Helvetia hydatides Schmelzblättern vocabat, ceu colliquationis affectum; Nam oves hisce abundantes dicebat esse macilentiores ap. Joh. Jac. WEPFER Eph. Germ. cur. ann. 3. obs. 167.

Differentiam nostrarum hydatidum & certarum hydatidum in palpebris inferius trademus.

Considerato jam nomine ad ipsam rem me accingam.

Depinguntur autem à variis variè hydatides. Theoph. BONET. Anat. pract. l. 1. sect. 2. in schol. ad obs. 15. & l. 2. sect. 8. obs. 6. in schol. dicit quòd sint pustulæ aqueæ, vesiculis illis non absimiles, quæ ab emplastris vesicatoriis seu epispasticis solent excitari; utrobique enim summa pelliculæ tenuitas & aquæ copia.

Homonymia.

HARTMANN. cum notis CARDILVCII prax. chimiatri. c. 126. scribit, quod sint tumusculi exigui pustulis similes seroso seu flatulento spiritu plerumque repleti. Quæ tamen minus conveniens vel Hydatica sunt vesicæ aquâ plenæ in pulmonibus, jecore, &c. secundum Job. Andr. SCHMITZ compend. med. pract. loc. d.

Descri-
ptio.

Taceo alias descriptiones, ubi dixero posse melius describi, quod sint vesicæ aqueum continentes liquorē, tunicā dupli. ut plurimum præditæ, magnitudine & numero variantes, figuræ potissimum orbicularis in omnibus ferè corporis humani partibus repertæ, ex vasis lymphaticis ortæ, & obdifficilem cognitionem, adeoque curationem varia inducentes symptomata, uti ex sequentibus satis dilucide apparet.

Vesicas appello ob similitudinem; ut enim vesica urinaria & felixa appellatur membranacea cavitas in qua liquor continetur; ita non in commodè eandem ob causam hydatides vesicas vocare licebit, cùm contineant lymphaticum vel serosum liquorē & membrana cingantur. Serum vel lympham eas continere demonstrat ipsa *autophœ*.

Tunica dupli ordinariò constant hydatides; teste GRAF de O. M. c. XII. triplici tamen præditas tunica vidit BALLONIVS parad. 186.

Magnitudo variat. Nucis avellanae magnitudine vidit WILLIUS act. Hafn. Th. BARTHOLIN. anno 1674. 75. 76. obs. 76. Jacob. GREISEL. Eph. Germ. ann. 1671. obs. 5. & VVOLFSTRIGEL Eph. ann. ejusd. obs. 6. Christoph. HARDER Eph. Germ. ann. 1672. obs. 180. BOINET. anat. pract. l. i. sect. I. obs. 2. KERCKRING. obs. anat. 66. WEPFER hist. apopl. XV.

Juglandis WEPFER Eph. Germ. ann. 1672. obs. 129. VVILLIUS l. a. Ludov. SALTZMAN disp. inaug. de abscessu interno cum hydrope &c. Argent. 1671.

Ovi columbini. Joach. CAMERAR. MEY disp. de hydrope dextra tuba uterina. Ultraject. 1678. DIEMERBROECK anat. l. i. c. 12. KERCKRING. spicil. anat. obs. 10.

Ovi gallinacei. MEY l. a. DIEMERBROECKI. c. INGRASSIAS de tumorib. p. n. c. 1. HARVEIVS act. Societ. Angl. ann. 1668. & 1669. KERCKRING. obs. 10. BLASIVS obs. rar. 5. part. 5. SCVLTETVS armament. chir. obs. 10. & 11. WEPFER hist. apopl. XIV.

Pyrimedioris idem WEPFER Eph. Germ. ann. 3. obs. 167.

Pomi PLATER: obs. l. 3. p. m. 635. VVILLIUS act. Hafn. l. c.

Malus

Mali cydonii BAVHIN. append. ad ROVSSET: de partu casar.
hist. 7.

Pila lusoria. VVOLFSTRIGEL Ephem. Germ. ann. 1. ob-
serv. 43.

Ovi anserini KERCKRING obs. anat 10.

Pugni. VVILLIUS l. d.

Duorum pugnorum COITER obs. anat. & chir. WILLIUS l. a.

Capitis infantis alicuius Greg. HORST. l. s. obs. 33. immo

Bovinae vesica urinariae praegrandis magnitudinem superabat illa hy-
datis ap. ZACVT. prax. adm. l. 2. obs. mibi 45.

Vt verò magnitudine, ita & numero variant hydatides; s2.
erant ap. ZACVT. Lusitan. med. princ histor. l. 2. hist. 124. obs. 25. Ultra
70. ab utero excretas observavit à VEGA art. med. l 3. sect. 10. c. 13.
Plures quam ducentas SOLENANDER sect. s. consil. 15. vers. II. &
RIVER. obs. hinc inde decerp. XV. Ultra 300. Joach. CAMERAR.
Ultra 800. CORDÆVS. comm. s. ad. l. I. HIPP. de morb. mul. Intra 15.
dies 1000. fere vesiculae humore aquoso refertæ egressæ ap. Dominic.
PANAROLL. pent. I. obs. 16. Numerum non admittebant ap. WIL-
LIVM l. d. & VVEPFER Eph. Germ. ann. 1672. obs. 129.

Sed relicto numero, videamus figuram hydatidum, quæ plerumque orbicularis cernitur. Thom. VVARTHON. adenogr. cap. XI.
attamen ad latera compressas, angulosas & acuminatas vidit VVEPFER Eph. Germ. l. a. angulosam itidem idem VVEPFER
hist. apopl. XV.

Quoad causas hydatidum, optimam ut ego arbitror, opinionem
fovent qui earum generationem à lympha extravasata & lymphaticis
vasis ruptis deducunt. Ruptis enim vasibus lymphaticis interdum contingit
lymphaticum liquorem non effundi in abdominis cavitatem, sed inter vi-
cinas membranas effluere, atque tunc inde vesiculae producuntur hydati-
des appellatae, quibus hepar interdum intus, sed frequentius foris, non
nunquam etiam mesenterium, aliæque in abdome parte scatere
deprehenduntur. Isbrand. DIEMERBROECK anat. l. I. c. 12. ubi
fusius.

Si contingat lymphæductus obstrui, quia valde fragiles sunt, fa-
cile rumpuntur, & aquas suas exspuunt; Sin vero vasorum horum
membranulæ fuerint tenaciores, ita ut distensionem notabilem absque
laceratione ferant, in vesiculos quasdam aqua turgidulas attolluntur,

quas hydatides vocant; quamlibet autem vesiculam inter binas dictorum vasorum valvulas quam proximas efformari contingit; quia verò aqua nec prorsum propter obstructionem, nec retrosum fluere potest ob valvularum interceptionem, interstitia intumescunt in figuram orbicularem, *Thom. WARTHON.* adenogr. cap. XI. iisdem ferè verbis quoque utitur *CHARLETON* exercit. pathol. IX. §. VI. conf. *Thom. BARTHOLIN.* spicil. 2. de vasis lymphat. cap. 5. p. m. 88.

Vasa lymphatica ad excitandas hydatides eo usque symbolum conferunt, quatenus male suo defunguntur officio, intemperiem aut obstructionem passa. *Joh. Theod. SCHENCK* exercit. anat. 6. l. 1. sect. 2. c. 25. conf. *BONET.* anat. praet. l. 1. sect. 2. in schol. ad obs. 51. & l. 2. sect. 8. in schol. ad obs. 6. atque *Ol. RVDBECK* de vas. glandul. seros. cap. 9. hinc incurunt hydatides illi plerumq; qui à motu æltuantes frigidam aquam copiosè ingerunt; Lepores velocissimo cursu canibus tergora præbentes in hunc affectum incidunt frigidam subito nacti, ut ait dictus *SCHENCK* hist. seri sanguin. c. 7. §. 25.

Cùm ergò vesicæ aqueæ originem suam debeant vasis lymphaticis, illa verò ubiq; sese diffundant, hinc est quod ejusmodi vesicæ omnibus penè partibus innascantur, atque in plerisque visceribus hydatides notaverit *BARTHOLIN.* spicil. 2. de vas. lymphat. cap. 5. conf. *Theophil. BONET.* anat. praet. l. 3. sect. 21. obs. 21. §. 2. in Schol. Recentiorum namque docuit diligentia vix ullam corporis nostri partem vasis lymphaticis carere, teste *Joh. van HORNE* microcosm. §. 30. p. m. 44. vid. *J. T. SCHENCK.* hist. seri sanguin. cap. 4. §. 50. p. m. 24. Sic

Pinguedinem vasa lymphatica penetrant; *BARTHOLIN.* de vasis dictis p. m. 204.

Inter musculos abdominis & peritonaeum repunt vasa serosa. *RVDBECK* de vas. glandul. seros. c. 9.

In Omento lymphatica observata sunt; *Joh. de MVRALT.* clav. med. exerc. 8. in annex. §. 1. Gualter. *CHARLETON* aconom. animal. exerc. 9. §. 4. p. m. 223.

Vt & in Ventriculo. *HORNE* l. a. *MVRALT.* l. c. *Th. BARTHOLIN.* A. R. l. 1. c. 9. edit. noviss. *VVEPFER* hist. apopl. X. in schol. p. m. 356. eaque æri incisa exhibet *RVDBECK* tab. 5. in messe aurea anatom. *HEMSTERHVSII*, Contrarium statuit *Franc. GLISSON.* tr. pecul. de ven.

de ventriculo & intestin. cap. 3. inquiens, credibile est nullos lymphæ ductus in ventriculo reperiri.

Intestinis vasa lymphatica non detrahit VVEPFER l. d.

Per mesenterium multa lymphatica decurrunt, teste DIEMER-BROECK anat. l. i. c. 8 circaq; illud luxuriant, ita censente BARTHOLINO cent. 2. hist. anat. 67.

Pancreas quoque multis vasculis lymphaticis donatur. DIEMER-BROECK anatom. l. i. c. 9. BARTHOLIN. anat. ref. l. i. c. 13. edit. dict.

In hepate dari vasa lymphatica extra omnem dubitationis aleam positum est, vid. Thom. BARTHOLIN. de vas. lymphat, ubi passim, præsertim c. 3. & hist. anat. l. d. ut & A.R. l. i. c. 14. DIEMERBROECK anat. l. i. c. 12. & 13. & HORNE l. a. VVEPFER l. c. CHARLETON l. d. &c.

Ex vesicula fellis oriuntur quoque lymphæ ductus. BARTHOLIN. de vas. lymph. cap. 5. A.R. l. i. c. 15. edit laudat. & in explicatione figura ari incise p. m. 204. ap. HEMSTERHVIS mess. anatom. CHARLETON acon. animal. exerc. 9. §. 6.

In Liene licet secundum CHARLETON l. a. exerc. 9. §. 4. p. m. 223. nulli adhuc sint reperti lymphæ ductus, quo cum etiam sentit GLISSON. anat. hep. c. 45. MOEB. fund. phys. de usu lien. p. 381. Th. VVARTHON. adenogr. cap. 4. p. m. 13. attamen Frideric. RVYSCH, Medicus Hagiensis, anatomicus solertissimus & cadaverum conditor eximius, (uti laudatur à Fr. de le boë STLVIO prax. med. l. i. c. 24. §. 1.) ex liene plurima vascula lymphatica non tantum ex ipsius superficie, verum etiam ex interiore parte arteriam splenicam nervosque concomitantia prodire observavit, & singularem methodum, quā illa inveniri possint, describit lib. de valv. lymphat. eaque notat in omnibus animalibus ejusdem generis non esse æquè copiosa, & humanum lienem pauciora habere quam vitulinum, allegante DIEMERBROECK anat. l. i. c. 12. & Th. BARTHOLIN. A.R. l. i. c. 16. imò inter utramque lienis membranam excurrunt lymphatica copiosa, instar retis cuiusdam, teste eodem DIEMERBROECK l. i. c. 15. conf. HORNE microc. l. d. Joh. Jacob. VVEPFER hist. apopl. X. in schol. p. m. 356. Jerem. LOSSIVM Profess. Witteb. disp. de languore lymphat. anasarca Witteb. 1673. & Joh. FLAMMERDING. disp. inang. de tumorib. lienis thes. 8. Lugd. Bat. 1671. nec non Mattb. TILING. anat. lien. cap. 15. per totum. Franc. de le boë STLVIVM disp. med. V. Marcell. MALPIGH. de viscer. struct. exerc. de liene cap. 1.

Renum vasis sanguiferis exilia quædam lymphatica interjici nonnullis putatur cit. DIEMERBROECK anat. l. i. c. 17. conf. BARTHOLIN. de vas. lymph. c. 7. & A. R. l. i. c. 17.

Capsula atrabilaria s. renes succenturiati lymphatica vasa quoque habent. Th. BARTHOLIN. A. R. l. i. c. 18.

In lumborum regione circa ramos iliacos vasa lympham vehentia luxuriant. BARTHOLIN. cent. 2. hist. anat. 67.

In testibus virilibus lymphatica vasa sunt reperta. MVRALT. clav. med. exerc. 9. in annex. §. 9. Regn. de GRAAF de V. O. p. m. 35. seqq. HORNE microc. §. 66. p. m. 103. & §. 30. microc. p. m. 44. nec non epist de genitalib. ad ROLFINC. annex. microc. ejusd. p. m. 120. WILLIS de anim. brut. part. i. c. 5. VVEPFER. l. c. RVDBECK de vas. gland. seros. tabul. VII. DIEMERBROECK anat. l. i. c. 21. Thom. BARTHOLIN. A. R. l. i. c. 22. &c. pariter quoque inveniuntur in femininis. MVRALT. l. a. HORNE l. c. Regn. de GRAAF de O. M. c. 12. p. m. 296. BARTHOLIN. A. R. l. i. c. 26. conf. VVARTHON. ap. DIEMERBROECK anat. l. i. cap. 23.

In Utero vasa lymphatica concedunt J. J. VVEPFER l. a. & hist. apopl. XIII. in schol. p. m. 383. GRAF. d. O. M. c. 8. p. m. 247. HORNE microc. p. m. 44. Guern. ROLFINC de org. generat. part. 2. c. 26. RVDBECK de vas. seros. tab. 8. GLISSON. & VVARTHON. ap. BARTHOLIN. A. R. l. i. c. 28.

In Placentâ, s. uterino hepate venis & arteriis intermisceri lymphatica vasa, eaque simul cum iis fetus umbilicum ingredi putat VVARTHON ap. DIEMERBROECK anat. l. i. c. 29. qui conf.

In mammis lymphæductus adesse non est quod quis dubitet, inquit DIEMERBROECK anat. l. 2. c. 2. & copiosa occurunt. BARTHOLIN. A. R. l. 2. c. 1.

Lymphæductus per thymum decurrentes & in venam sub claviam se exonerantes frequenter se vidisse refert occultatissimus VVARTHON. alleg. DIEMERBROECK anat. l. 2. c. 4. BARTHOLIN. A. R. l. 2. c. 4. &c.

Pericardii liquorem ex lymphaticis quibusdam vasculis in illud deponi suspicatur STENO cit. saepius dicto DIEMERBROECK anat. l. 2. c. 5. conf. BONET. anat. pract. l. 2. sect. 8. obs. 6. in schol. pericardio quoque ut & Cordi lymphæductus tribuit Gualter. CHARLETON. acon. animal. exerc. 9. §. 5. p. m. 224. &c. BARTHOLIN. A. R. l. 2. c. 5. & 6.

Pulmones totos ingens satellitum vasorum lymphaticorum perreptat, uti anatomica

anatomica àutoψia constat, teste WILLIS pharm. rat. part. 2. sect. 1.
cap. 1. & 13. Lymphatica vasa in pulmonibus se vidisse scribit prosector
accuratissimus Frid. RVYSCH. lib. de valv. lymphat. citante DIEMER-
BROECK anat. l. 1. c. 12. & l. 2. c. 13. eadem vasa per pulmonum super-
ficiem proserpentia observavit & depinxit Ol. RVDBECK de vas. se-
ros. in mess. aurea. HEMSTERHVIS. edit. HEIDELB. 1659. tab. 1.
fig. 1. & tab. 2. conf. Joh. van HORNE microcosm. § 30. p. m. 44.
BARTHOLIN. A. R. l. 2. c. 9.

In mediastino. conf. HORNE l. d. Th. BARTHOLIN. A. R.
l. 2. c. 4. eaque æti incisa exhibet RVDBECK l. c. tab. 3.

In capite esse vasa lymphatica satis copiosa, observationes in-
signium anatomicorum posteritati exhibitæ vel hoc tempore evin-
cunt. Joh. MVRALT. exerc. 2. de lymph. & saliv in annex. §. 4.

Vasis lymphaticis cerebrum destitui non putat FLAMMER-
DING. disp. de apopl. thes. XI. consentit BARTHOLIN. cent. 4. hist.
38. atque BONET. anat. pract. l. 1. sect. 12. obs. 6. in schol.

Sub cerebri meningibus triduo post mortem militis à contusione cra-
nii mortui & disseceti hinc inde manifestè vasa lymphatica disseminata
conspexit Jerem. LOSSIVS M. D. & Profess. Witteb. in dictâ disp. de a-
nasarca. §. 10. & Exc. D. PRÆSES in nosocomio SERENISSIMI. in mi-
litis apoplexiâ mortui cadavere eadem observavit ann. 1665.

Vt de aliis partibus taceam, ex gr. de vasis lymphaticis in pal-
pebris, quæ industriâ singulari Henrici MEIBOMII Prof. Helmstadi-
ensis celeberrimi detecta habemus; hæc tamen adenographo accura-
tissimo STENONI attribuit HORNE microc. §. 54. p. m. 84. conf.
eund HORNE p. m. 44.

Vasa salivalia in buccis debemus Nic. STENONI Thaumatur-
go & anatomico excellentissimo.

In narium septo observata quoque lymphatica; teste HORNE
p. 44.

In cute id. STENO ap. BARTHOLIN. A. R. l. 1. c. 2. p. m. 20.
& 21. Hæc sufficient; omnes enim illas partes recensere, in qui-
bus lymphatica visa, nimis foret prolixum; rectissimè ergò faciunt
illi, qui in omni ferè corporis parte vesiculas aqueas generari sta-
tuunt, quod & sequentes testabuntur observationes. Sic

In cadavere mulieris sexagenariâ majoris ascite extinctæ mem-
brana pinguedini substrata hydatidibus hic illic scatebat, uti observa-

In mem-
branâ pin-
guedini
substrata.

vit Dr. GLASER ap. Th. BONET. *sepulchret.* l. 3. sect. 21. obs. 21. §. 1.
quæ obortæ sunt sero pelliculas à subjectâ pinguedine divellente;
GLASER in schol. ap. BONET. l. a.

In abdomi-
nis muscu-
lis.

In apertione cadaveris feminæ hydropicæ *abdominis muscularum* tota facies interior in vesicularum quoddam corpus continuum, majorum & minorum, partim aquâ limpidâ, partim mucore refertarum conversa fuit, vel, quod credibilius, *abdominis musculi extre- mè attenuati unâ cum peritonæo à membranâ carnosâ abscesserunt,* aqua ibidem fluctuante. Joh. AICHOLTZ apud SCHENCK *obs. l. 3. de hydrope obs. 4. p. m. 431.* quæ proculdubio acciderunt seroso humore cum sanguine ad capillares venas, quæ visceribus & partibus ventris inferioris inseruntur, delato, ibique exitum quærrente, quem cùm ob densitatem membranarum non inveniret, vesiculæ hæ fuerunt excitatæ. Dan. SENNERT. *Med. pract. l. 3. part. 6. sect. 2. c. 3.*

Generationis hydatidum *inter musculos abdominis modum se- quentem tradit naturæ arcanorum scrutator maximus* (uti laudatur à Joh. van HORNE *microcosm.* §. 30. p. m. 45.) OL. RVDBECK *de vas. glandul. seros cap. 9.* Si vasa, inquit, serosa quæ inter musculos abdominis & peritonæum repunt, (videre ea licet in tabulâ ejus II. fig. 1. h. h. h. h.) aliquo obstaculo occluduntur, vesiculæ eo in loco generari possunt.

In & ex
abdomine.

Femina annor. circiter LX. abdominis tumore defuncta exhibuit in abdome inter uterum & vesicam urinariam corpus quoddam heterogeneum mentulam virilem mentiens substantiâ membraneâ, intus inæquali, ob plurimos globulos membranaceos ibidem affixos, quibus adfuit aqua limpidissima infaretu suo mentulæ rigiditatem concilians: ad hujus mentulæ radicem ovalia duo corpora, testibus similia conspiciebantur aquâ plena: inficto huic heterogeno corpori vulnere mox vesicæ & globuli membranacei plurimi erupere cum magna vi aquarum, aderant quoque vesicæ aut involucra, & in his itidem minora, humore farcta limpido, sed neq; in his eadem erat ubique dispositio: quædam enim involucra septem duntaxat, vel octo vesicas prodebant, rotundas & duras instar pilatum vento turgidatum: quibus dissectis minorum globulorū membraneorū stupenda caterva emersit aquâ plenorum & similiū ovis sine testâ. Alia involucra incre- dibilem vesicarum struem continuere variæ magnitudinis, promi- scue

scè & turmatim erumpentium , nec , uti priores , gravidarum . Contentorum varietas diversam vesicis globulisque tincturam indit ; erant enim albi , rubri & opaci ; humor plerisque fuit limpidus , tenuis & pellucidus , aquæ instar purissimæ . Ex observatione D. de HOVPPEVILLE Gallicè editâ , Latinè redditâ à Nobil. Dn. J. C. PEYER , amicè communicata BONET anat. pract. l. 3. sect. 21. obs. 35.

In apertione cadaveris ancillæ hydropicæ ann. 1671. d. 26. April. in abdomen infinitæ erant hinc inde hydatides variæ magnitudinis (de qua supra.) Ludov. SALTZMAN disput. med. inaug. de abscessis interno insignis magnitudinis cum hydrope & aliis notatis dignis in ancilla Argentorat. observato ann. 1671.

Anno 1591. in feminæ octogenariæ hydropicæ infernâ abdominis capacitate copiosa filamenta nervea , quæ eodem ferè modo , ut in ventriculis cordis , ast copiosiora erant , & hinc inde vesiculos fecerant , quibus pertulsi aqua effluebat deprehendit P. PAWIVS obs. anat. V.

In plerisque abdominis locis hydatides adnatas in pueru maniaco vidit Th. BONET. sepulchret. l. i. sect. 8. obs. 2. in schol.

In tumore infra cartilaginem ensiformem aperto eruperunt plurimæ vesicæ , partim disruptæ partim integræ tenui & pellucidâ aquâ refertæ ; Vesicularum secundum observationem Medicorum & adstantium fuisse ultra trecentas compertum , quæ vix capaci satis vase , quod quatuor libras continebat , excipi potuerunt . Ex observatt. Joachim. CAMERARII.

Ex abdomen hydropici vesiculos plures quam ducentas , quæ referabant ova gallinarum , sed mollia , aquâ putridâ plena , extraxit Reiner. SOLENANDER sect. V. conf. XV. versicul. XI.

Virgo 20. circiter annorum suspitiosa & cacheotica ann. 1655. scirrho hepatis , tempore exulcerato , laborans per foramen ventris ulcerosum ac squalidum , paulò supra umbilicum adapertum , hydatides seu vesiculos aqua turgidas aliquot vicibus , & quidem primò XI. post VIII. tertio ad XII. usque ; copiosas itidem aqua plenas , quas ipsemet vidi , adhuc integras , atque discidi , iterum ejecit , summaque vi protrudit , ut dicit Felix. PLATER. Fel. ex Fr. Thom. Med. nep. obs. selectior. mantiss. Fel. PLATER. obs. adjectar. obs. 18.

Rusticus quidam hydropicus factus abscessum passus est in dex-

tra parte abdominis, eoque aperto infinitus prope modum vesicula-
rum aqua repletarum numerus egressus est, ut ducentarum nume-
rum excederet, idque per plurium dierum spaciū, & sic omnino
curatus est. Lazar. RIVER. obs. hinc inde excerptar. XV.

In Perito-
q. ut &
inter peri-
tonium &
intestina.

In phthisici & hydropici peritonaeo vesiculos inæquali magnitudi-
ne aquâ limpidâ plenas, notavit Volcher COITER obs. anat. p. 117.

In muliere, quæ novem menses uterum gestare putabatur, sed in-
stante partus tempore præ dolore ob abdominis tumorē mortua est,
peritoneum vesiculis aquâ limpidissimâ plenis, triplici tunicâ præditis,
obsitum erat: BALLONVS parad. 186.

In femina pluribus annis de tumore ventris queribunda inter
peritoneum & intestina, binas vesicas, quarum una bovinæ vesicæ u-
rinariæ (mirum dictu) prægrandis magnitudinem superabat, qui-
bus disruptis tanta fœtidæ lividæque aquæ copia mucoso humoris
permixta effluxit, ut vas triginta librarum capax adimpleret, invenit
Nicol. FONTAN. ap. ZACVT. Lusitan. prax. adm. l. 2. obs. m. 45.

In femina quinquagenaria ascite ex subpressis hæmorrhoidibus
orto laborante inter peritoneum & intestina numerosam vesicarum stru-
ctem, quæ bullæ aquatilis instar molles & lucidæ, inter se conjun-
ctæ numero 52. erant, & ovi magnitudinem non excedebant, vidit
ZACVT. Med. princ. hist. l. 2. hist. 124. obs. 25.

In omento.

Anno 1580. in cadavere mulieris hydropicæ multis vesiculos intra-
particularem pelliculam per se aquam continentes circa omentum per-
eiusque substantiam dispersas; & eodem anno omenti portionem cum
vesiculis multis aquâ repletis apertâ in umbilici regione vomica ex-
cidisse observavit. Hippol. BOSCVS de facult. anat. lect. 2. p. 17.

In muliere, quæ novem menses uterum gestare putabatur, sed
instante partus tempore præ dolore ob abdominis tumorem mortua,
epiploon vesicalis aqua putissima & limpidissima plenis, obsitum erat;
Et quod magis mirandum, unicuique vesiculæ triplices erat tunica,
& in columnis integraque à corpore, sive esset superficies, sive interior
substantia detrahi poterat. BALLON. parad. 186.

Anno 1666, die 15. Maij in femina 23. annor. phthisica circa o-
mentum hydatides plurimas, quarum una ex pluribus compacta erat,
& materiam continebant subacidam, invenit Leidensium Æsculapius
Magnus ille Franc. de le boë SYLVIVS ap. Alard. Herm. CVMMEN.
in Ephem. Germ. cur. ann. 1672, obs. 119.

Sie mense Decembris ann. 1679. ut & d. 14. Januar. & 9. Decembris 1680. in omento porcino hydatidem insignem, limpida aqua plenam, reperi.

In mulieris hydropicæ ventriculo cystides pendulæ conspectæ aqua citrina oppletæ. Maurit. CORDÆVS comm. §. ad lib. 1. Hipp. de morb. mul.

In muliere annor. 48. hydrope ventriculi correpta, ejus membranam interiorem multis hydatidibus, partim integris, partim excisis conspersam, ut & in medio pylori ipsiusque limite cystidem pendentem, longitudinis medii digiti, pollice paulò crassiorum, aqua pellucida plenam, cavitatemque duodeni subintrantem vidit Anton. JODON. obs. Laz. RIVER. communicat. p. m. 663. 664.

Circa glandulas conglobatas quasi scrophulosas circa ventriculum in foemina 23. annor. phthisica multæ erant hydatides, uti observavit Franc. SYLVIVS ap. Alard. Herman. GVMMEN. in Ephem. Germ. cur l. d.

Intestina in feminis hydropicis vesicis scatuisse notavit Maurit. CORDÆVS la.

In phthisici & hydropici cadavere ubique intestinis vesiculos inæquali magnitudine, easque aqua limpida plenas, adhaerentes invenit Norimbergensis reipubl. Poliater, anatomicus & chirurgus celeberrimus (sic laudante Herm. CONRING. introd. in univ. art. Med. cap. 4. §. 9. p. m. 88.) Volcher. COITER obs. anat. p. 117.

In juvene frigore propemodum enecto & tandem apoplexia mortuo ab intestino colo hydatides plurimæ aqua limpida turgidæ pendebant: vid WEPFER hist. apopl. XVI. p. m. 423.

In colo intestino peculiare hydatidum genus (quarum describitio habetur de vesicis in hepate) in lepore annotavit J. V. WILLIVS aet. Phil. & Med. Hafn. Thom. BARTHOLIN. ann. 1674. 75. 76. vol. 3. obs. 76. De hydatidibus in intestino recto vid. supra de vesiculis in ventre.

Loco glandularum mesenterii vesicas venulis ejusdem implicitas & tectas, uti & toti mesenterio hinc inde adnatas ultra XX. diversæ magnitudinis, aqua limpidissima turgentes, quarū una omnium maxima

(capitis infantis alicujus mole) erat, à quâ maximâ sex adhuc pâllo minores pugnum æquabant, quæ omnes inter se connexæ ova gallinacea, partim ad maturitatem perducta, partim adhuc variâ magnitudine succrescentia egregiè repræsentabant, in fœminâ tumore ventris laborante vidit experientissimus Greg. HORST. lib. V obs. XXXIII.

In mesenterio hinc inde vesicas pustulosas sero plenas luxuriantes notavit HÖCHSTETTER. decad. VI. cas. 6.

In mesenterio hydatides aliquoties in nosocomio Medicinæ studiorum exhibuit Isbrand. de DIEMERBROECK anat. l. 1. c. 12.

Virgo dissecata post obitum ob aquam intercutem, ostendit in mesenterio suo insignem tumorem, ponderantem libras XX; tecum quidem extrinsecus membranæ involucro, sed intus refertum pluribus vesiculis limpida aqua distentis; uti vidit consul Amstelodamensis dignissimus, & Medicus, sicut in praxi felicissimus, ita in observationibus accuratissimus (hoc encomio afficitur à Theod. KERCKRING spicul. anat. obs. X.) Nicol. TVLPIVS lib. 2. obs. cap. 34.

Circa mesenterium vesiculis variæ magnitudinis hydropicorum aquas inclusas detineri observavit eruditissimus & in praxi Medica versatissimus Wolfgang. HÖFER. Hercul. Med. lib. 3. c. 2.

In muliere mesareum vesiculis triplici tunica præditis aqua purissima & limpidissima plenis, quæque integræ à corpore detrahi poterant, obsitum erat. BALLON. parad. 186.

Vesiculos plurimas liquore plenas in adolescentis phthisico-hydropici anatomie universum ad intestinorum cellulas usque mesenterium occupantes, atque illius glandulas & vasa omnia abscondentes, ut detegi difficulter potuerint, se vidisse scripsit Job. JAC. HARDER ad Job. Conrad. PEYER, in meth. hist. anat. Med. cap. 6. in schol.

In phthisici & hydropici cadavere mesenterio ubique vesiculos inæquali magnitudine, easque aqua limpida plenas, adhærentes reperit Volcher. COITER obs. anat. p. 117.

Abscessus aquoso humore & liquore differtos ann. 1578. in mesenterio feminæ sexagenariæ notavit PAREVS lib. 23. c. 36.

Vesicas limpidissima aqua plenas mesenterii porcorum adnascit lañii saepius se observasse prædicarunt & aliquoties ostenderunt Felice PLATERO obs. l. 3. p. m. 635.

In mul-

In multis porcis ann. 1653. apparuerunt ova quædam sine testâ ~~in~~
mesenterio, quæ magnitudine ova gallinacea æmulabantur & subventanea
vila, sed præter aquam limpida nihil continebant, diutius enim coctis
non induratus fuit liquor. Unde abscessus credo aquosos esse, seu ves-
cules serosas ex vasis nostris lymphaticis, quæ circa mesenterium luxu-
riant, exortas. Th. BARTHOLIN. cent. 2. hist. anat. 67.

In mesenterio aliisque locis capreæ multas vesiculos splendentes, quæ
dissectæ intra folliculum seu tunicam singularem serum salsum seu muci-
laginem recondebant, humoris vitrei instar, cum alia flavente substan-
tia, conspexit idem Th. BARTHOLIN. hist. anat. var. cent. 2. hist. 49.

Mesenterium peculiari hydatidum genere (uti describentur intra de
hydatidibus in hepate) gravatum in sectione leporis animadvertisit Ioh. Va-
lentin. WILLIUS act. Med. Hafn. Thom. BARTHOLIN. ann. 1674. 75.
76. vol. 3. obs. 76. p. m. 135.

Hydatides sive vesicas quasdam aqua plenas pellucidas ~~epatis~~ ^{In hepate,} substan-
tie, membrana ejus ab humore aquoso distenta, annatas fuisse, nunc
majores, pugni scil. magnitudine, nunc minores, nunc plures, nunc pau-
ciores, sæpè observatum est, non solùm in homine, sed & brutis: teste
Dan. SENNERT. Med. pract. l. 3. part. 6. sect. 1. c. 6. conf. Godofr. MOEB.
fundam. Med. physiol. cap. 14.

Ann. 1673. in pueri annor. 12. hepatis profundo hydatides observatax
à GLASERO alleg. BONET. sepulchret, l. 3. sect. 21. obs. 4. §. 11.

Ann. 1678. d. 17. Junij in virgine annor. 43. abdominis tumore la-
borante hepar extrinsecus multis hydatidibus, quarum aliæ ovi columbi-
ni, aliæ ferè ovi gallinacei, aliæ minoris erant magnitudinis, obsitum e-
rat. Ioh. MEY disput. de admirando dextræ tubæ uterinae hydrope. Ultrajecti
habit. ann. 1678.

Hydatides plurimas, magnitudine eadem qua proximè anteceden-
tes, in suspensi furis cavâ hepatis parte anno 1647. demonstravit Guil.
STRATENVS ap. Isbrand. de DIEMERBROECK anat. l. 1. c. 12.

Ad hepatis regionem vesiculos minores, quæ discissæ aquam conti-
nebant, vidit Thom. BARTHOLIN. cent. 4. obs. 25.

In N. N. hepatis parte gibbâ repartam esse vesicam grandiorem, in-
star nivis candidam, pellucidam, aquoso confertam humore, hydropsis
prænunciam, notat A. THONERVS l. 6. epist. med. 2.

Vesicas tenuissimas, pellucidas, aqua distentas, pomì magnitudi-
nem nonnunquam æquantes, majores, minores, hepatis substantie ac-
crevisse

crevisse in cachecticis dispositis ad hydropem, uti & ascite mortuis sæpè inventit, & similes ex hepate & liene simiæ quam plurimas citra sectionem expressit, integrasque seroso humore subrubro refertas manibus exceptit. *Felix PLATERVS obs. l. 3. p. m. 635.* & *prax. l. 3. cap. de extuberant. p. m. 254.*

Comitissæ asciticæ *hepar* hinc inde fissum, in coque vesiculas multas sero citrino plenas & turgentes illic adnatas vidi *Thom. PLATER.* ap. *Fel. PLATER. obs. l. 3. p. m. 648.*

Ex tumore juvenis è directo regionis *hepatis* ad subputationem tendente & scalpello aperto, mirandum dictu, multæ vesicæ gallinarum ova, seu, ut melius dicam, internos piscium globulos repræsentantes apparuerunt, quæ aquoso humore repletæ & integræ & fractæ quotidie cum pure modico egrediebantur, ita ut intra XV. dies & amplius ferè mille vesiculæ sint egressæ, sed cùm æger in deterius laboretur, mortuus est. Secto corpore *hepar* in convexâ parte totum vesiculis tam parvis quam magnis refertum erat. *Dom. PANAROL. pent. V. obs. med. XVI.*

Tres vesiculas minores, quæ discessæ aquam continebant, ad *hepati* regionem in matrona hydropica notavit *Th. BARTHOLIN.* cent. 4. obs. 25.

Hepar in muliere sæpius allegata vesiculis aquâ purissimâ & limpidissima plenis, obsitum erat. *BALLONIVS parad. 186.*

Hepar hydropicæ vesicis tectum obpresumque foris invenit *Maurit. CORDÆVS comm. 5. ad. l. 1. Hipp. de morb. mul.*

Hepata extrinsecus vesiculis aqua limpida repletis scatentia invenit *Isbrand. DIEMERBROECK anat. l. 1. c. 12.*

In hydropico *hepati* multas aqua limpida plenas vesicas adhæsisse observavit *Volcherus COITER obs. anat. p. 117.*

Hydropici dissecti *hepar* quam plurimis vesicis aqua plenis scatuuisse Patavii vidi *Joh. BILGER ap. Greg. HORST. l. 4. obs. 47.*

In viri cardialgia extincti hepate vesiculas nonnullas aqua plenas, quibus disruptis aqua profluxit fusca, foveam post se relinquens, causticam dixisses, offendit id. *BILGER ap. HORST. tom. I. p. m. 142.*

Pecudum boumque jugulatorum jecur hydatidibus scatere sæpè deprehensum est. *Joh. FERNEL pathol. l. 6. c. 8. & GALEN. ap. OLRVDBECK de duct. hepat. aquos cap. 4. conf. Christ. à VEGA commis. ad eph. HIPP. §. sect. 7.*

In leone seniore in *hepatis convexâ parte* duas hydatides reperit Laurent. WOLFSTRIGEL *Eph. Germ. cur. ann. 1671. obs. 6.*

Boum & multarum vaccarum respiratione anhelâ & tussiculâ laborantium *hepar* innumeris replebatur aquosistumoribus; membrana crassissima corneæ oculorum nec duritie cessit nec colore. Vulnerati tumores quidam aquam salsam, plerique vel flavescentem, vel viridiusculam amarescentem effuderunt. Rarus erat tumor magnus, cui non complures minores includerentur, pari omnino tunica vestiti, nonnullis ex eadem membrana parietes erant & septa. Joh. Valentin. WILLIUS in *act. Med. Hafn. Thom. BARTHOLIN. ann. 1674. 1675. 1676. vol. 3. obs. 76. p. m. 132.*

Hepar porci, in cuius cor bacillus acutus, puerilem digitum minorem longitudine æquans jam à semestri adactus erat, vesicis aquâ flavâ plenis refertissimum Basileæ ap. Fel. PLATER. vidit Henr. ab HEER *observ. Med. oppido rar. XI.*

In multis porcis 1653. mactatis apparuerunt ova quædam sine testâ, in *hepate*, quæ magnitudine ova gallinacea æmulabantur, & subventanea visa, sed præter aquam limpidam nihil continebant; diutius enim coctis non induratus fuit liquor. *Thom. BARTHOLIN. hist. anat. rar. cent. 2. hist. 67.*

In duorum porcorum *hepatibus* hydatides satis magnas, tunicisque robustis constantes in circumferentia adnatas vidit Henr. PETRÆVS nosolog. harmon. tom. 2. dissert. 35. §. 14.

Epar suis domesticæ voracissimæ totum aquæ vesiculis plenum observavit Joh. BILGER. l. a.

Ann. 1679. mense Decembr. in *jecore* porci hydatidem rotundam satis capacem, & limpidissima aqua refertam, ego inveni.

Vesiculos aqueas albicantes numero multas, quæ dissectæ intra folliculum seu tunicam singularem serum cum pituita seu mucilagine recondebant, aliamque flavam substantiam in capreæ cicuratæ *hepate* vidit Th. BARTHOLIN. A. R. l. 1. cap. 14. & *histor. anat. rar. cent. 2. hist. 49.*

Vesiculos splendidas in capreæ sylvestris *hepate* frequentes notavit dictus *Thom. BARTHOLIN. de vas. lymphat. cap. 7. & histor. anat. l. a.*

In sectione felis *hepar* vesiculis humore ex albo flavescente plenis intamuisse animadvertit Olaus RVD BECK *de duct. hepat. aquos: cap. 4.*

In muris alpini convexâ hepatis lobi maximi parte abscessus conspiciebatur pustulosus, & quodammodo cartilaginosus, hydatidibus satis magnis respersus, quæ compunctæ aut dissectæ, aquam puram fundebant, *Georg. Hieronym. VELSCH. Ephem. Germ. curios. ann. 1670: observ. 160.*

In gallo Indico emaciato post obitum dissecto pendulus *sub cavo ad parenchyma jecoris enatus folliculus sero plenus adparebat*, qui postquam lancetta pertusus, mirum quanta inde seri copia effluens universam galli alvum & mensam inundaret; *Joh. Theod. SCHENCK exercit. anat. VI. l. 1. sect. 2. c. 25.*

Peculiare genus hydatidum anno 1675: in lepore masculo ruri mortuo vidit *Joh. Valentin. WILLIUS in act. Phil. & Med. Hafn. Th. BARTHO-LIN. ann. 1674. 75. 76. vol. 3. obs. 76. p. m. 135.* *Hepar nigrius solito innumeris hydatidibus refertum erat*, quæ racematin sibi cohærebant, & uno quasi pediculo membranæ hepatis adnascebantur. Ultra decadem horum botrorum hepati adhærebant, funiculis quidam saltem, quidam etiam vesiculis. Singula botri bacca peculiari tunica à reliquis separabatur, omnes tamen communis in unoquoque botro membrana involverat. Cristalli instar omnes splendebant, quasi tot humores crystallini uno racemo contenti & pellucidissima pellicula tecti essent, quæ tamen sat valida densaque erat singulis, & vulnerata humorem exprimi passa est vitro oculorum haud absimilem. Quælibet tamen etiam bacca maculam albam habuit, instar chalazzæ ovorum, quarum icon videre est apud eundem l. a.

Circa hepatis venas hydatides quamplurimas videre sæpius contigit prosector in nobilissimo juxta ac felicissimo *Theod. KERCKRING*, Medico Amstelodamensi celeberrimo (uti laudatur à GARMANNO *dissert. de ovo human. §. 10. p. m. 4.*) spicil. anat. obs. LXX. & X.

Hydatides ab hepatis membranâ liberatae in cavitate abdominis hinc inde discurrent, quod admirationem utique meretur. *Joh. Theodor. SCHENCK hist. ser. sanguin. cap. 7. §. 24.*

Vesicas tenuissimas citrina aqua turgentes è bilis vesicula exemit felix ille *Felix PLATER. obs. l. 3. p. m. 635.*

In feminæ hydropicæ abdomine lienem totum vesicis pendulis testum obpressoq; foris observavit *Maurit. CORDÆVS lib. sæpius dicto.*

In muliere ap. *BALLON. parad. 186.* sæpius dicta, *lien* vesiculis aqua purissima & limpidissima plenis obsitum erat.

Ex bilis vesicula.

In Liene,

In phthi-

In phthisici & hydropici cadavere *lien* vesiculas inæquali magnitudine aqua limpida plenas, ubique adhærentes invenit COITER *obs. anat.*

In suspensi *sub liene* deprehendit vesicam duorum pugnorum magnitudine aqua plenissimam, & eam à vicinis partibus absque læsione separavit dictus COITER in *obs. anat. & chirurg.*

Vesicas tenuissimas ex *liene simiæ* quamplurimas citra sectionem expressit, integrasque seroso humore subrubro resertas manibus exceptit Felix PLATER *obs. l. 3. p. m. 635. vid. ejusdem prax. l. 3. de extuberant. p. m. 254.*

Vesiculas *in liene ovis*, conformes iis, quæ hepati interdum adnascentur, deprehendit Matth. TILINGIVS *anat. lien. sect. 3. cap. 3. p. m. 412.*

Lieni vicinam vesicam aquâ plenam in ascitico vidi Carol. RAYGER *Eph. Germ. cur. ann. IV. obs. 3.*

Per *lien* longitudinem substratam vesiculam humore flavo crasso plenam reperit CRVCIVS *de quaest. cent. 1. p. 25.*

In anatome celeberrimi Med. Doct. Phil. Jac. SACHS à Levvenhaim. S. R. I. Acad. nat. curios. Adjuncti *ren* *sinister* extrinsecus nonnullis hydatidibus erat conspersus, teste J. D. MAJOR memor. SACHSIAN. cap. I. annex. Ephem. Germ. cur. ann. IV. & V.

Renes intus & extra hydatidibus refertos in puero maniaco reperit Theoph. BONET, *anat. pr. l. 1. sect. 8. obs. 2.*

In rene sinistro & dextro viri cuiusdam phthisi extincti plures hydatides & cavitates aqua limpida repletas invenit ingeniosissimus Th. WILLIS (optimè de anatomia meritus, cuius diligentiam suspicit, scientiam veneratur KERCKRING *obs. anat. VIII. pathol. cerebr. cap. 9.*)

Anno 1675. *in vitro* annor. 56. hydrope pectoris mortuo, renes, dextrum præsertim, hydatides obsidebant. BONET. *anat. pract. l. 2. sect. 1. obs. 127. ex communicatione Stephan. DENTAND chirurgi Genevensis.*

In sectione nobilis ascitici vesicas aliquas aquâ plenas *renum corpori* adnatas vidi Fel. PLATER *observ. l. 3. p. m. 647. & prax. l. 3. l. 3. p. m. 260.*

Aperto abdome puellæ 17. annorum cachecticæ, supervenit entibus convulsionibus mortuæ ren dexter defuit, ejusque locum occupat vesicula lympha turgida, renis naturalis magnitudine, cui plurimæ aliæ vesicæ aqua plenæ erant annexæ, rene sinistro magnitudinem naturalem excedente, uti anno 1680. Basileæ observavit Joh. J. HARDER M.D. & Phil. Profess. ibid. ceu hac habeo ex relatione D. Davidis ZOLLICOFERI Med. St.

In renis dextri externa superficie circa extremitatem superiorem vesicam pellucidam sero repletam, quæ nihil aliud erat, quam propria & proxima tenis membrana, à regurgitante per obstructi renis substantiam sero ita elevata, in vitro ischuriæ mortuo vidi Georg. SEGERVS Eph. Germ. cur. ann. 1671. obs. 23.

In mercatoris ischuria demortui rene dextro vesiculos aqueas notavit Lucas SCHROECK, F. Luc. Eph. Germ. ann. IX. & X. obs. 179.

In rene dextro pueri marasma defuncti vesiculos plurimas sero impletas vidi Salom. REISEL. Eph. Germ. ann. VIII. obs. 31.

In anatome viri hypochondriaca affectione mirè divexati tandemque hæmoptoici renem dextrum in parte superiori extrorsum cystide, ad magnitudinem pilæ lusoriæ, sero subflavescente turgida, qua disiecta humor cum impetu profluit, donatum invenit Laurent. WOLFFSTRIGEL Eph. Germ. ann. I. obs. 43.

In renibus viri cardialgia extincti vesiculos nonnullas aqua plenas fusca offendit Joh. BILGER ap. Gr. HORST. tom. I. p.m. 142.

In renibus cystides pendulas aqua citrina oppletas conspexit Maurit. CORDÆVS comm. 5. ad l. 1. HIPP. de morb. mul.

In rustici annor. CLII. & IX. mensium anteriore renum facie non nulli aquei abscessus, ut videbatur, reperti sunt; quorum unus magnus erat instar ovi gallinacei, flavescente aqua repletus, quæ orbicularem in rene impresserat figuram. Guil. HARVEJVS in act. Reg. Societ. Angl. ann. 1668. & 1669.

Hydropicæ mulieris vesicam vesicis plenam reperit CORDÆVS I.a.

Per meatus urinarios & anum hydatides excerni aliquando observavit WARTHON. adenograph. cap. XI.

Inter vesicam & intestinum rectum in ariete hermaphrodito occurrit hydatis insignis pyri mediocris magnitudine ad 3ij aquæ limpidissimæ continens. J. J. WEPFER Eph. Germ. ann. 3. obs. 167.

omisqA

50

In femi-

In feminæ ascite extinctæ lumborum regione hydatides frequentes conspexit D. GLASER ap. BONET. an. pr. l. 3. f. 21. obs. 21. §. 1.

Versus lumbos frequentes hydatides seu membranaceos aqua scatentes folliculos in adolescenti XVI. annor. ascitico observavit idem Henr. GLASER ap. J. C. PEYER meth. hist. anat. Med. c. 6.

In multis porcis apparuerunt ova quædam sine testâ lumborum vertebris appensa. ovorum gallinaceorum magnitudine; præter aquam limpida nil continentia. Thom. BARTHOLIN. cent. 2. hist. anat. 67.

Quia vasa lymphatica in testibus tum virilibus tum femininis reperta sunt. (vide supra) in testibus p. n. quandoque observantur hydatides. MVRALT. l. a. §. 10. & GRAAF. de O. M. c. 12. p. m. 297. In Testiculis.

In puella, quæ XX. annum non longè prætervecta videbatur, hydatidem testiculi sinistri locum occupantem, (is enim aberat,) quæ magnitudine ovum anserinum longè superabat, & in cane circa dictum locum ad magnitudinem ovi gallinacei, invenit Theod. KERCKRING spicil. anat. obs. X.

Semel in tex tantum modò mensium puella hydatidem ad dextrum testiculum magnitudine ovi columbini reperit idem KERCKRING. l. a.

In femina annor. 40; ascite lenta & hydrope pectoris mortua testiculo sinistro accrevit vesicula aqua plena, avellanæ majoris magnitudine. Christoph. HARDER Ephem. Germ. cur. ann. 1672. obs. 180.

Mulieris hydrope testium extinctæ testis sinistra magnitudinem mali cydonii excedens, multis magnisque hydatidibus scatebat, ut & in dextro testiculo circum circa multi parvi tumores, sive hydatides. Caspar. BAVHIN. append. ad Rousset. de partu cæsar. histor. VII. p. m. 361. 362.

Vesiculam magnam lympha refertam in testibus infanticidæ Hafniae invenit Thom. BARTHOLIN. A. R. l. 1. c. 26. edit. noviss. & vesiculam aliam sero plenam loco dextri testiculi in adultera Parisina notavit BORICHIUS allegant. BARTHOLIN l. a.

Dissecto cadavere feminæ annor. 50. fluore albo copioso correptæ, circa testiculos, utroque in latere, hydatides sat magnæ conspiciebantur, lymphæ turgentes insipida. Ex literis Joh. de MVRALT. ad Joh. Conrad. PEYER Med. Schafbus. d. 27. August. 1677. amicè BONET. communicat in anat. pract. lib. 3. sect. 36. obs. I. §. I.

Ancillæ ex subpressis mensibus tumore ventris laborantis testes plenos vesicis aquosis vidit Joh. HEINZIUS ap. SCHENCK obs. 1.3. de hydrop. obs. 6. p. m. 432.

Ex splendidis vesiculis per testium substantiam hydatidum in modum dispersis simplici tunica resecta copiosum serum manasse in puerpera observavit Thom. BARTHOLIN. cent. 1. hist. anat. 92.

In ovariis piscis torpedinis hydatides seu vesiculæ aquosæ apparuerunt, teste Olig. JACOBÆI act. Hafn. Med. Thom. BARTHOLIN. ann. 1677. 78. 79. obs. 97.

Hydatis minor inter vasa ejaculatoria in ariete hermaphrodito sita erat. Joh. J. WEPFER Eph. Germ. cur. ann. 1672. ob. 167.

Hydatides intra elythroidem testium tunicam deprehendit Joh. Theod. SCHENCK. hist. ser. sang. c. 7. §. 24.

Quoniam verò in testiculorum substantia, vel ejus membranis vesicularum genus ovis persimile quandoque reperitur, differentiæ inter illud & ova sèpius observatae sunt tales; Vesicularum illud genus hydatidum nomine notum, dupli ordinario constat tunica, cuius interior licet tenuissima sit, ab exteriore tamen haud difficulter separatur, nec liquor in illis contentus coctione facilè indurescit: (quod verum esse in liquoris duarum hydatidum instituta coctione nuper expertus sum) consentit quoque Th. BARTHOLIN. cent. 2. hist. anat. 67. atque Casp. BARTHOLIN. Th. F. de ovarius mulier. p. m. 53. & 60. Contra v. communes ovarorum tunicas à se invicem ægrè dividuntur, atque illorum liquor coctione facilè indurescit; hinc semper, quotiescumque vesiculas in excoctis testibus indurato, liquidoque humore plenas invenimus, has hydatides, illas ova esse judicavimus: quibus addendum, quod hydatides aliquando à testiculorum membranis, veluti à pediolo propendeant, quod nunquam de veris fœmellarum ovis hactenus observare potuimus. Regn. de GRAAF de org. mul. generat. inservient. cap. XII. p. m. 301. 302.

Anno 1678. d. 17. Junij in virgine paupercula annor. 43. per 18. annos abdominalis tumore laborante dextra uteri tubæ superficie externæ multæ vesiculæ aquosæ adhærebant, & in latere obposito eodem in loco tumor conspiciebatur continens in se plurimas vesiculas limpido humore repletas. Joh. MEY, disp. de admirand. dextra tubæ uterina hydrope præside Joh. MVNNICKS Anatom.. Lectore publ. Utrecht. 1678. conf. ex eo Nicol. de BLEGNY Zodiac. Med. Gallic. ann. I. seu 1679. mensis Iunii obs. IX. p. m. 102.

In uteri
subis.

allionA

Anno

Anno 1675. in puellæ XIV. circiter annor. ventris intumescentia laborantis tubâ uteri dextrâ vesiculas multas, quarum quædam materiam continebant aqueam, claram, tenuem, aliæ subrubram, viscidam, glutinosam, animadvertisit Gerhard. BLASIVS obs. Med. rarior. IX. part. I.

In Anglâ muliere, quæ Leucorrhæâ per plures annos decubuit, & tandem corrosivis matricis ulceribus miserè obiit, unâ cum Fr. de le boë SYLVIO ann. 1668 d. 14. Maij Lugd. Batav. ad testes, *in tubarum extremitate, hydatides utrinque magnas adfuisse deprehendit f. de MVRALTO exercit. de lymph. & salivâ in annex. §. XI.*

In apertione cadaveris feminæ gravidæ, hypochondriacæ & hæmoptoicæ variæ vesiculas aquâ repletas, hydatides dictas, *in extremâ parte turbarum uteri observavit Francisc. de le boë SYLVIVS, teste Mattbia PAISENIO in Ephem. Germ. Acad. nat. curios. ann. IV. & V. obs. CXCV.*

Circa alas vespertilionum, & tubos cacos FALLOPIANOS sæpè hydatides vidit Theodor. KERCKRING spicil. anat. obs. X.

In foliaceo tubarum ornamento quandoque hydatides excrescunt.
R. de GRAAF de O. M. cap. 14. p. m. 337.

Notandum *in uteri collo inter rugas, seu fibras potius, sæpenu-* In & ex
mero hydatidas diversæ magnitudinis reperiti. Regn. de GRAAF de Vtero.
O. M. c. 8. p. m. 237.

In femina hydropica uterum vesicis aqua limpida plenis scatentem vidi. Maurit. CORDÆVS loc. sapius cit.

Mulier ann. 50. in uteri hydropem incidit; cuius toto ambitu & membrana exteriore, magis tamen in sinistra parte, vesiculæ erant majores quædam, aliæ minores, humore viscido, pituitoso & albicante plenæ, quæ vitrum liquefactum præ se ferebant. Ex obser. vatt. Adolph. OCCONIS. cit BONET. A. pract. f. m. 1137.

Hydatides variæ in sinistro latere uteri ligamento aliformi inhærebant, magnitudinis valde diversæ, granum hordei ferè repræsentantes, liquorem dissecctæ exhibebant clarum, aqueum, ast lendum aliquo modo. Similis conditionis una, at longè reliquis major, in dextro latere notabatur. Gerhard. BLASIVS obs. anat. pract in homine p. m. 24.

Anno 1675. in cadavere mulieris annor. 30. per 7. menses fluxu albo laborantis in utroque latere, loco testibus vicino, cornubus ulti.

uteri adhærebat vesica , quarum dextra ovi gallinacei magnitudinem habebat , liquore gelatinoso, pellucido . subflavo repleta, sinistra vix juglandis , aquosa magis. BLASIVS obs. rar. V. part. V.

Vtrumque hydtopicæ uteri cornu continuisse novem circiter aquæ purisque libras, inclusas innumeris vesicis, quarum aliquas etiam ostendebat extima uteri tunica, notavit Nicol. TVLP. obs. l. 4. cap. 45.

Molam rotundam ex pluribus vesicis, juglandis magnitudine, compositam, quæ admodum erant crassæ & tenaces, aqua repletæ, obductæ & intertextæ multis fibrosis ligamentis in utero observavit Frid. LOSSIVS obs. 16. l. 4.

In nobilis matronæ utero post mortem aperto, globuli connexi splendida lymphæ gelatina pleni inventi, quorum particulas etiam ante excrevit, quām fatis cederet. Thom. BARTHOLIN. dissert. de bibliotheca incend. §. 6.

De muliere, quæ, cùm prægnans crederetur, post sex aut octo gestationis menses magnis abortis doloribus ingentem peperit membranaceum globum vel substantiam vesicis rotundis, tumidis, pellucidis & aqua plenis refertam, tanta copia atq; numero, ut comprehendendi posse nullo pacto viderentur; ut & de alia uxore, quæ & ipsa patrem membranam bullis innumeris confertissimam post sex gestationis menses (& ipsa quoque decepta) ejecit. vid. VALLERIOL. lib. 1. obs. 10. f. m. 52, ubi de harum vesicarum causis & remediis congruis, quibus hæ duæ convoluere, fusiùs.

Mulier secundo vel tertio ingravidationis mense vesiculam quandam aqua plenam per muliebria absque placenta, sub sequente maximo lochiorum fluxu per VI. vel VII. menses durante, excrevit ap. Regn. de GRAAF de org. mul. cap. 8. p. m. 250. & Eph. Germ. cur. ann. I. obs. 128.

Femina, quæ constantissimè contendebat se in utero gestare fœtum vivum, quem moveri dicebat, remediis adhibitis supra septuaginta vesicas membranosas ac membranis hærentes, aqua pallida plenas, castanæ quantitatis, sexto mense ab utero excrevit. Christoph. à VEGA l. 3. sect. 10. cap. 13. art. Med.

In placenta hydatides quatuor invenit Joh. Guilelmus RIVA Eph. Germ. cur. ann. 1670. obs. 39.

Ex dorso extractæ. Bononiæ fabro cuidam lignario maximus in dorso tumor, ita ut gibbosus videretur, exortus fuit. Cumque maturationis signa appare-

In Placenta.
za.

Ex dorso
extractæ.

appararent, abscessus novaculâ apertus. Quo facto s. ova, seu vesiculæ tenuissimâ membranulâ obductæ, intus limpidissimâ aquâ plenæ repertæ sunt. SCHENCK obs. Med. l. s. de dorso & spinâ obs. s. p. m. 371. ex SCHOLZII obs. propr. communicat.

Diaphragma, parte quâ imum ventrem respicit, hydatidibus coopertum in puerò maniaco à se dissecto observavit Theoph. BO-
NET. sepulchret. l. i. sect. 8. obs. 2. & in schol. ad l. d. In Diaphragma-
te.

Hydatides aliquot ingentes limpidâ aquâ repletas ad diaphragma in cadavere viri repentinâ morte extincti reperit. Ott. HEVRN.
obs. 14. & Thom. BARTHOLIN. cent. 2. obs. 66.

In phthisici cadavere ad diaphragma & pleuram vesicæ aliquot insignes aquâ turgentes se offerebant. Ott. HEVRN. obs. 18.

In celsissimi cuiusdam Principis melancholia hypochondriaca affe-
cti medio ventre visæ sunt duæ hydatides, ab humero usque ad septum transversum, inter pulmones & pleuram, aqua, velut glaciata, re-
pletæ. Anton. de POZZIS Ephem. Germ. curios. ann. IV. & V.
obs. 29.

In plerisque pectoris locis hydatides adnatas in puerò maniaco conspexit Theophil. BONET. anat. pract. l. i. sect. 8. obs. 2. in schol.

In femina hydropica pericardium vesiculis plenum observavit Maurit. CORDÆVS loc. sèpius alleg. In Pericardio.

In cordis membranâ in palpitationi cordis subjectis ægris hyda-
tides reperit celeberrimus Jenensium Aesculapius Guern. ROLFINC.
epit. meth. cogn. & curand. particul. c. h. aff. l. 2. part. 2. cap. I.

Secto cadavere mulieris sèpius supra citat. ex BALLON. parad. In corde.
Cor ipsum obsitum erat vesiculis aqua purissima plenis, nihilque graveolens habebat.

In Corde feminæ hydropicæ cystides pendulæ, aqua citrina opple-
te conspectæ à Maurit. CORDÆO l. d.

In corde puellæ quadrimestræ circa eam partem, ubi arteria magna exoritur, vesicula propendebat dupli tunica. instar ipsius arteriæ prædita; in qua succus continebatur aliquam amaritudinem resipiens. Theodor. KERCKRING. spicil. anat. obs. 83.

Cordis ventriculum dextrum p. n. mollem & flaccidum apertum hydatidibus obsessum ann. 1671. d. 26. April. in ancilla hydropica observavit Ludov. SALTZMANN disp. inaug. de abscess. intern. cum hy-
drope Galii, Argentor.

In anatomia leænæ junioris hectica cum hydropo laborantis cor hydatide ad magnitudinem avellanæ versus dextram articulam affectum spectabatur. J. Jacob. GREISELIVS *Ephem. Germ. Curios.* ann. 1671. obs. V. & Laurent. WOLFSTRIGEL *Ephem. Germ. cur. ann. 1671.* obs. 6.

In Pulmo-
nibus.

Cognatum hydropi malum sunt hydatides pulmonis, vesicæ scilicet aqua plenæ, quæ externam ejus superficiem occupant, quæque oriuntur ex seroso & tenui humore, qui ratam pulmonis substantiam pertransit, & sub membrana ejus, quæ densior est, hæret & subsilit, ut ait Dan. SENNERT. *Med. pract. l. 2. part. 2. cap. 9.*

De quo HIPP. *l. de intern. affect. sect. 25. §. 9. 10. 11. 12. p. m. 226. oper. Hipp. vol. 2.* (ut in enim editione Job. Antonid. van der LINDEN *Lugd. Batav. ann. 1665. in. 8.*) Fit hydrops, si tubercula in pulmone fuerint enata & aqua repleta & in pectori erupta. Quod autem fiat etiam à tuberculis aqua intercutem, testimonium habeo & in bove, & incane, & in sue. In his enim quadrupedibus maximè fiunt tubercula in pulmone, quæ aquam habent; Si enim dissecueris, citissimè cognoveris, nam fluet aqua. Hæc HIPPOCRAT. l. a.

In Pulmone Cardinalis Gaetani asthmatici vesicas, quibus apertis aqua exibat flavum colorem referens, deprehendit *Lælius à FONTE* consult. VIII.

Pulmo in nobili adolescenti orthopnoea inveterata & febre funesta laborante vesicis humore consistente lentoque & pellucido instar albuminis ovi prægnantibus refertus erat. Carol. PISO *morb. thorac. intern. à serosa colluvie p. m. 216.*

In puella hydropo thoraci suffocata pulmones multis parvis hydatidibus erant obfitti. J. V. WILLIUS *act. Hafn. Th. BARTHOLIN.* ann. 1674. 75. 76. vol. 3. obs. 76. p. m. 134.

Borum respiratione anhela & tussicula laborantium pulmones immumerabilibus hydatidibus erant referti; In vacca unius pulmonibus numeravi 17: exterius, sed copiosiores intra ipsos pulmones latentes numerum non admittebant. Non tenues pelliculae has in volvabant, sed crassæ membranæ, vulneratae limpidum cruentem profuderunt, quedam at pauciores, flavescentem. In alia vacca dexter pulmo una hydatis videbatur. Job. Valentin. WILLIUS *act. Med. BARTHOLIN. l. a. p. m. 132.*

Pulmonem vesicis quibusdam aqua viscidâ plenis repletum annotavit Hieron FABER ap. SCHENCK obs. l. 2. de pulm. p. m. 232.

In inferiore pulmonum loco ad diaphragma hydatides aliquot ingentes limpida aqua repletas, quæ fontis instar thoracis dextram partem aquarum copia inundaverant, & thoracis hydropem acciverant, in vitro repentina morte extincto invenerunt p. m. Thom. BARTHOLIN. cent. 2. obs. 66. & O. HEVRN. obs. 14.

Pulmones vesiculis aqua purissima & limpidissima, nihilque graveolens habente plenis, triplici tunica pæditis, & quæ integræ à corpore detrahi poterant, in muliere ob abdominis tumorem mortua obsiti erant. BALLONIVS parad. 186.

Vesiculas, quæ Gr. ὕδατίδες dicuntur, in pulmonum interstitiis frequenter observavit Marcell. MALPIGHIVS de pulmon. epist. I. ad Alphons. BORELLIVM annex. BARTHOLIN. diatrib. de motu & substantia pulmon. p. m. 109.

Rusticum, qui vesicas aqua refertas, veluti piscium, extussiendo rejiceret, vidit OETHÆVS ap. SCHENCK obs. Med. l. 2. de pulmonib. p. m. 250.

Anno 1569. tabida mulier triennali tussi vexata, cùm nullis medicamentis levaretur, tandem phlegmatica multa exscreavit, paulò post etiam vesicellam, colore, magnitudine, & forma cyprini pisces, per screatum rejicit & convaluit. SCHENCK l. a.

In fetus abortivi cavitate thoracis sub jugulo dextro lucidam vesicam aqua plenam asperæ arterie adhærentem, quæ copiosa humoris inundatione, quam recipiebat à capite in pueris valde humido, eventilatorem cordis prohibuerat ipsum suffocando, invenit Dom. PANAROL. pent. 1. obs. V.

Rustica malè diu habens ex ventriculo à circumforaneo educta Per Os ex-ex colocynthide biberat, quo facto multa pituitosa cum vesicula, cui creta. inclusa fuit aqua flavescentia, evomuit. Esaias MEICHESNER. ap. SCHENCK l. 3. obs. 2. tit. de lumbricis.

Anno 1671. in infante XIIII. septimanarum capitum tumoribus variis illud deformi reddentibus laborante tumor quidam vesiculam repræsentabat hydatidibus variis donatam. Continebant hæ figura & magnitudine differentes, lympham modò liquidam modò viscidiorum: quod verò ab hydatidibus liberum, limpidissimam exhibebat aquam. Gerhard, BLASIVS obs. rarer Med. l. part. 1.

Ex pulmo-
nibus re-
jectæ.

In nari-
bus.

D. Paulo MOTHO Archiatro Regio, etatis ingravescens, per narium cavitatem prolabitur vesicula oblonga, rotunda, candida, sero plena, ea vero vesica membranosa saepe in narum medio subsistit, saepe extra nares propendet, levi digitorum impulsu sursum ad caput retruditur, naresque deserit; sed circa os ethmoides olfactum & spirationem impedit; uti inquit Th. BARTHOLIN. cent. 6. hist. 37.

In Palpe-
bris.

Ab his nostris hydatidibus planè diversus est affectus palpebrarum vðatris, Lat. vesica, seu aquula dictus. AVICENN. 33. tract. 3. cap. 17. Alsarnac appellatur ap. ZACVT. Lusitan. de Med. Princ. histor. l. 2. dubio 26. quæ est substantia quædam pinguis palpebræ cuti p. n. substrata. Paul. ÆGINETA de re Med. lib. VI. c. 14. quem conf. ubi pluribus. vid. MANARD. l. 7. epist. 2. tit. de ocul. affectib. seu

Tðatris nihil aliud est quam substantia pinguis, ut adipis frustulum sub palpebræ superioris cute latitans, unde tota palpebra in infantibus œdematosa fit; uti describitur à Job. Andr. SCHMITZ compend. Med. pract. p. m. 185. vel

Est substantiæ unctuosæ in palpebrâ superiore incrementum humorem ante lucanis præse tim horis perpetuo fundens. Job. JONSTON. Syntagma univ. Med. pract. part. 3. l. 3. tit. 3. cap. 1. & ÆGINETA l. a. Hydatides itaque palpebrarum pinguedinem, nostræ vero aquosum liquorem continent.

In nervis
opticos.

Anno 1590. virgo annor. 18. paucis ante obitum diebus cœcitate correpta fuit, qua uterque oculus clarus quidem existebat, nec aut in membranis, aut humoribus vitii aliquid apparebat, ipsa tamen nec lumen quidem candelæ oculis admotæ percipiebat. Aperto cranio insignem vesicam, quæ nervos. opticos occupat circa crucifixionem; & qua novacula pertusa circiter libra semis aqueæ materiæ limpidissimæ effluxit, reperit Pet. PAWIVS obs. anat. 2.

In Cerebro,
ejusque
partibus.

In puella sine cerebro nata deprehendi totam cerebri putatitudinem esse corpus ex plurimis vesiculis à summo ad basin craniæ seu conglomeratum seu combinatum, quæ vesiculæ nunc caltro nunc digitis segregatae tenuissimis cohærebant fibrillis, per spatia intermedia vasis sanguiferis intercedentibus, & quamlibet vesiculam minutissimis ac rutilis vasis decorantibus. Vesicularum numerum inire nequivi; quædam juglandis magnitudine, pleræque multò minores conspectæ fuerant; figura inæquales erant, quædam rotundæ, quædam

dam ovales, quædam ad latera compressæ, angulosæ & acuminatæ, prout scil. complementum cerebri hujus spurii situm illarum & figuram nunc hanc, nunc illam natura omne spatium inane declinans, postula verat: Omnes, paucissimis exceptis, aquam limpidissimam intra sinus suos coercebant, quam fauciæ & pressæ cum impetu projecerunt, integræ v. ne guttulam quidem vel profuderunt, vel vicinæ subpediârunt, ceu omni exitu privatæ, hydatidum plerarumque more, quæ alibi nonnunquam in cadaveribus animalium reperiuntur. Totus vesicularum accervus tantus erat, ut cerebrum & cerebellum fetus humani vel æquaret, vel superaret; sunt verba I.I. WEPFER. Eph. Germ. cur. anno 1672. obs. 129. cum. schol.

Anno 1659 in puellæ annorum circiter octo, quæ per plures annos & ad obitum usque de gravitate capitis conquesta fuit, medio cerebro inventus abscessus serosus sive cystis sero referta. Theoph. BONET. anat. pract. l. 1. sect. 1. obs. 46. §. 2.

In cerebri substantiâ cystis seu sacculus, robusta membrana compactaque contextus, undique serosum humorem continens, in fundo exiguum foramen habens, unde novam materiam nervis linguae suggerebat, in viro, ob perpetuam, quam diu vixit, ad nervos motui linguae destinatos destillationem balbutiente, auctaque fluxione extincto, inventus. Lazar RIVER. observ. additar. VII.

In mercatoris ann. XL. cephalalgiâ extinti anteriore cerebri parte circa frontem repertus exiguus abscessus avellanæ magnitudine, sero plenus, ad levem attactum dissiliens. Vid. BONET. an. pract. l. 1. sect. 1. obs. 2.

Anno 1648, in puellâ annor. XII. dolore fixo verticis mortuâ aperito crano chirurgus digitis abscessum rupit, natibus & infundibulo cerebri inhærentem, ex quo statim aqua clarissima cum impetu, & ad libras duas exivit, quasi è fonte scaturiens, & in altum profiliens. Petrus BORELL. obs. cent. 1. obs. 38.

Anno 1634. inter cerebrum & piam matrem abscessum instar vesicæ piscium, aqua limpidissima repletum in ovicula vertigine laborante, ut & anno. 1645. in oviculâ simili vertigine interemtâ in sinistro occipitis quasi latere sub dura matre folliculum instar piscium vesicæ, crassum, aqua repletum; nec non in muliere, quæ per annum de sola vertigine gravissimas querelas habuit, & tandem apoplexia fortissima subito obiit, in sinistro cerebri latere tumorem, quo ad folliculum & materiam conten-

In ventriculis cerebri tam superiorum duorum postremo non absimilem, qui magnitudinem ovi gallinæ mediocris adæquans tertium cerebri ventriculum ex parte compressit, observavit SCVLTEVS armament: chirurg. obs. X. & XI.

Vesiculas aquæ & seroso humore plenas, in tertio ventriculo confinxit totius medicinæ ornementum (teste Frid. HOFFMAN de M. M. p. m. 34.) Guern. ROLFINC: dissertat: anat: lib. 1. c. 13.

In juvenæ crebriùs in pascuis vertigine correptæ ventriculo cerebri sinistro vesicam tenerimam totam ejus anteriorem partem occupantem, quam citra ulteriorem lacerationem integrum extraxit, superantem ovum gallinaceum magnitudine, vertiginis causam anno 1650. invenit WEPFER exercit. de loc. affect. in apoplex. p. m. 69..

Ex ventriculo cerebri jumenti vertigine laborantis aliquot hydatides extractæ. Verùm cùm pluribus hydatidibus, quarum quædam nucemoschatâ non minores erant, eductis vertigo non cessaret, jumentum maestatum fuit. In cuius ventriculis cerebri, præcipue sinistro, & pariete intergerino cerebrum à cerebello distingueente, ubi cerebrum respicit, plurimæ inventæ pleræque instar ovorum serpentinorum aut lacertarum cohaerentes, & tum internæ ventriculorum membranæ medullam operienti, tum dicto parieti accretæ. WEPFER de apoplex. hist. apopl. XIV. in schol. p. m. 405.

In virginis 23 annor. dextro cerebri ventriculo abscessum ovi gallinacei magnitudine, peculiaritunica, crassiusc pennæ columbinæ vestitum, quo folliculo inciso aqua turbida subfuscâ effluxit, reperit idem WEPFER hist. apopl. XIV.

Inplexus choroidei supra corpus callosum supradicti corporis callosi, aliquot rotundæ, albidae, humore pituitoso repletæ, supra corpus callosum inventæ fuerunt; Domin. PANAROLL. pent. 1. obs. XVII.

In dextro plexu choroideo feminæ apoplectica plures hydatides, quarum quædam piso majores, in sinistro itidem plures, quatum una nuce avellana major, angulosa, instar humoris crystallini perspicua, solidaque, visæ sunt à Joh. Jac. WEPFER, dissertat. de apoplex. hist. apoplect. XV. p. m. 415.

In femina apoplectica aliquot hydatides parvulas plexui choroideo adnatas observavit idem WEPFER. hist. apopl. III. p. m. 14. quod & GALEN. se vidisse refert alleg. Joh. FLAMMERMING. diff. de apopl. th. X,

In femina apoplectica plexui choroideo hydatis parva adhæsit; teste dicto

dicto WEPFER. hist. apopl. 2. p. m. 10. & FLAMMER DING.
disp. de apopl. l. a.

In vituli anniculi inter armenta sua ob vertiginem semper ad latus inclinantis ab aliquot septimanis, *plexu choroideo*, ubi ejus ala cum sinistra jungitur, prope glandulam pinealem, hydatis apparuit. Job. fac. WEPFER. hist. apopl. XIV. in schol. p. m. 406.

In pueru præ nimia pinguedine extincto *plexum choroideum* hydatibus obsessum, quarum una ad nucis avellanæ excreverat magnitudinem, invenit Theodor. KERCKRING. obs. anat. LXVI.

In *plexu choroide* parvas hydatides aliquot vidi dictus KERCKRING obs. X.

In illustri matrona annor. 80. valde plethorica, apoplexia extinta *plexus choroides* per omnem suum intra ventriculos anteriores decursum vesiculis aqueis tumidissimis adunatis & congregatis refertus erat. Ex observatt. Carol. DRELINCOVRT. Lugd. Batav. Professor. pract. & anat. ap. Job. FLAMMER DING. l. a.

In suspensi furis *plexu choroide* plurimas vesiculos vidi Th. BARTHOLIN. hist. anat. rarior. cent. I. hist. 32. §. 34.

Circa arterias raro licet, vel nunquam hactenus, præterquam in obs. infrà citand. hydatides invenerit KERCKRING (uti ipse fatetur observat. X. & LXX.) quamplurimas tamen circa arterias temporales in pueru in caput cadente, maximis capitis doloribus laborante, &c. & postremò apoplexiâ extincto hydatides reperit dictas Theodor. KERCKRING. chymicus & prosector celeberrimus spicil. anat. obs. LXX. quarum pars incrassatis humoribus atheromata, pars steatomata, & quædam etiam melicerides referebant. (sic in abdomen fœminæ hydropicæ primo lympham tenuem & fluidam, deinde gelatinam, tertio concretam, tandem duram & steatomasticam vidi practicus apud Amstelodamenses celeberrimus Paulus BARBETTE prax. l. 4. c. 4.)

Circa arterias temporales.

Rarum circa arterias temporum emersisse hydatides, cum venas tantum lymphatica vasa ambire anima iversum sit, Theophil. BONET. anat. pract. l. 4. sect. 3. obs. 2. §. 6. in scholiis attamen plurima vascula lymphatica arteriam splenicam nervosque concomitantia ex interiore lienis parte prodeuntia obseruavit Frid. RVYSCH. cit. DIEMER-BROECK anat. l. 1. c. 12.

Signa diagnostica hydatidum tradere difficile esse superius diximus, cum oculatissimum ea lateant Medicum, & vix nisi per cultrum anatomicum detectæ in conspectum veniant, nisi in illis saltem partibus ubi excernuntur, de quibus supra. Interim tamen si quis post motum violentum frigidam copiosè hauriat, vid. p. 6. nec debitâ quantitate & modo iterum excernat, nullam congelationem sanguinis indeque nata symptomata sentiat, sed successu temporis ardorem in partibus internis hinc inde dispersum, continuum tamen & mordicantem observet, si adsit gravitas vel lassitudo in partibus hydatidibus obfessis citram causam, vel si hæc & similia signa in illis manifestentur qui debilitate viscerum aut cachexia laborant, vel qui siti urgentur paucissimas verò reddunt urinas, nec hydropici evadunt, hydatidibus illos laborare credibile est; ita dantur & alia signa communia partis affectz, e. g. Vertigo in capite &c. de quibus in prognosi.

Quod attinet noxam ex hydatidibus nostris oriundam, varia illa est.

Hydrops illas sæpè esse causas si rumpantur, non opus est ulteriori probatione & satis superque testantur historiæ hydropicorum, multi n. eorum, quos allegavi, hydrope fuere extinti: non tamen semper hydropem pariunt ita cœidente *SCHENCK.* exerc. anat. 6. l. 1. sect. 2. c. 25. nec sunt ipse hydrops. conf. *Theod. KERCKRING.* obs. anat. 10.

In renibus existentes ischuria causæ esse possunt, teste *Georg. SEGER. Ephem. Germ. ann. 1671. obs. 23. conf. Luc. SCHROECK. Eph. Germ. ann. IX. & X. obs. 179.*

In pericardio palpitationi cordis subjectorum hydatides reperit *ROLFINC. epit. meth. cogn. & curand. particul. corp. hum. aff. l. 2. part. 2. c. 1.*

In pulmone hydatides asthma & orthopnæam creare posse testantur historiæ *Lelii à FONTE, Valentini WILLII, atque Car. PISONIS II. dd.*

In pectore disruptæ & aquas in thoracis cavitatem dimittentes pectoris hydropem producunt. *Thom. WILLIS pharm. rat. part. 2. sect. 1. cap. 13. uti in capite hydrocephalum &c.*

In illis, qui cephalalgia sunt extinti, abscessus serosi in cerebro sunt inventi, teste *BONET. anat. pract. l. 1. sect. 1. obs. 2, & obs. 46. §. 2. BORELL. cent. 1. obs. 38.*

*Vertiginum gravissimarum causam nonnunquam esse vesiculas a-
queo humore plenas in ventriculo cerebri tertio conspicabiles plus vice sim-
plici in ovibus & semel in homine animadverit ROLF INC. *dissert. anat.*
L. I. c. 13. hydatides cerebri vertiginis causam agnoscit quoque WEPFER.
exerc. de loc. affect. in apopl. p. m. 69. hist. apopl. XIV. in schol. p. m. 405.
*& 406. & Job. SCVLTETVS. armament chirurg.. obs. X. & XI.**

*Hydatides supra corpus callosum apoplexia immediatam fuisse caussam
existimat fuit ap. PANAROLL. pent. I. obs. 17.*

*In plexu choroides ubi inventæ, plerumque fecerunt apoplecticas vid.
WEPFER hist. apopl. 2. p. m. 10. hist. 3. p. m. 14. & hist. XV. p. 415.
Job. FLAMMER DING *diss. de apopl. thes. X. Lugd. Batav. 1671.*
præside Carol. DRELINCOVRT. conf. Theodor. KERCKRING. spicil.
anat. obs. 70. & SCVLTETVS l. d.*

Curationem tandem quod attinet, cum hæc in multis conveniat cura
hydropsis ascitis curatione, eaque passim apud Authores præstantissimos
præscripta inveniatur, & in hac aliisque cathedris defensa sit, non erimus
fusiores; in genere itaque præmonuisse sufficiat curationem hujus morbi
aggressurum, ne eam, nisi prævio prognostico, in se suscipiat; cum ob ma-
lum latens facile decipi possit. 2. ne desperet de successu & operatione re-
mediorum, si effectus non statim sequatur: morbus enim chronicus est,
qui interdum inducas, interdum variantia requirit remedia, nec uno iectu
vel brevi tempore expelli potest. 3. ut fortis constantique exinde sit animo,
ut, ubi mitioribus medicamentis nihil proficit, generosioribus remediis ma-
lum expugnare, cautâ sagacitate, possit, 4. ne quoad methodum, depen-
deat à sola Authoritate celebris alicujus Practici: sed potius quid doceat
diligentissime examinet; Non enim sentimus cum illis, qui Hippocratem
nec fallere nec falli posse stulte sibi persuadent.

Sentimus verò cum iis, qui primò suadent aperientia, qualia sunt
inter cætera cochlear. carduus benedict. fœnicul. pimpinell. nasturt. aqu.
gratiol. laureol. soldanella. flores genist. summitat. juniper. absinth. rad.
raphan. Armor. allii. cost. ver. gramin. cyclamin. petrosel. pimpin. rub.
Tarax. urtic. Samb. Sem. napi. nigell. petros. decoct. lignor. vel chin.
cum rad. sarsaparill. &c. Spir. armon. ♂. spir. hypochondr. spir. tartar.
nitr. sal. terebinth. mixtur. de trib. & simil.

Brodbequius laudat salia acida & lixiviosa, crystall. tartar. tartar.
vitriol. nitr. præpar.

Excell. D. Præses commendat tincturam suam, quam anodyniam vocat, tincturam mari veri, spirit. vitrioli Martis. &c..

Sequantur deinde purgantia, ex quibus alii laudant decoctum Colocynthid. extract. diaesul. veratri nigr. pilul. cochiar. magister. lapid. Lazul. gumm. gutt. trochiscos alhandal. & similia : alii Magisterium gialapii ; alii Mercurium dulc. recte patatum, qui in forma pilularum tutius quam in alia ex mente Brodbeckii datur, e. g..

R. Extract. panchymag. Croll. gr. xvij.

Q. dulc. ritè sublimati gr. xij.

ol. carv. gt. ij.

cum Syr. diafer. Andernac. F. pilul.

videantur & alia c. l. descripta..

Nos tamen à Qii dulcis ab aliis parati usu meritò abstinemus, edocti aliquot exemplis ; quamvis experti ritè parati egregiarum virium. Præferimus tutiora. iniusque suspecta ex antea dictis, e. g..

R. Magister. gialap..

Extract. cochiar.

diagryd. aa. 9 3.

F. l. a. pilul. No. xxx.

S. Pilulen. auff etliche mal.

vel **R.** Extr. elater.

diaesul.

Magist. gialap. aa. gr. iv..

M. F. pilul. No. xii..

S. Purgierpilulen.

vel **R.** Magister. gialap. gr. iiiij..

Sal. tartar.

gumm. gutt. aa. gr. iiij..

fach. cand. alb. 3j.

M. exactiss. l. a. d.

S. Purgierzucker.

Varia enim & innumerabilia ferè in hunc usum concinnari possunt, ut ingens sylva harum in practicis videtur, ut vix videoas quod alteri præferas, nisi individua & idiosyncrasias attendas.

Interim hæc non semel aut simul exhibere conveniet ; sed requiriatur judicium sagacis doctique Medici, qui & terminum & intervalla purgantium heujusmodi probè determinet, ut plurimum tamen bis per septimanam purgantia apta in hoc affectu exhibuisse sufficit.

In-

Intercalantur interea diligenter dicta aperientia. Nec reticenda videantur diaphoretica apta, qualia sunt salia volatilia viperar. serpent. succini, C. C. pulvis Comitis de Kent, (cujus descriptio vera typis nondum commissa est; quæ enim jam extant, adulteratæ, mancæ vel ineptæ existunt, & effectum eundem cum vero laudato arcano præstare nequeunt.) Laudant etiam hic electuarium Oruietanum, cuius descriptionem veram ex Camera Imperatoris Majestatis b.m. Magno Fausio communicatam latere nolumus, est vero sequens:

Rx. Theriac. Androm. opt.

Mithridat. opt. a. 3j.
pulver. rad. anthor. 3*lb.*
lap. Bezoard. or. 3*lb.*
confect. alcherm. 3*lb.*
conserv. ros. antiq. 3j.

flor. borragin.

cichor. aā. unc. 5.

Syrup. de succ. citr. q. s. pro consist.

F. Electuar. l.a..

Alias descriptiones hujus electuarii tradit Cl. Simon Pauli in quadripart. botan. Class. 2, p. m. 125, & 126.

Laudat etiam Roflinckius diaphoreticum, aquas destillatas Sambuci, carduibenedicti, CC. philosophice calcinatum, sal absinthii, magistrium spinæ viperæ, spir. urin. spir. sal. volatil. sal. dulc. & similiz aperientia & sudores vel urinas pellentia.

R. Sal. stipit. fabar.

genist.

ebul. vel sambuc. an. 9j.

S. Harnstreibend Saltz.

vel R. Sal. genist.

absinth.

fim. columbin. an. 3*lb.* S. u. f.

In casu desperato cantharides nonnullos exhibere Brodbeckius c. l. docet e. g.

Rx. Cantharid. i. absque cap. & ped.

sem. frig. maj. mund. an. 3*lb.*

sach. cand. violat. 3j.

gummin. ceras. aut tragacanth. 3vj.

F. pulv. dos. 3j.

Nos vero de hoc pulvere parum emolumenti nobis pollicemur, nec credimus ullum inde periculum imminere.

Præferimus succum lumbicorum terrestrium cum aqua vit, amifat, & spiralis, vel sequens Fausianum Rx. ciner. stipit. fabar.
genist.
summit. juniper.
vitis
clematis. flammulæ vulg.
āā. Mj.

cum aqu. & via. F.l.a. lixivium.

Proderunt & millepedes ppt. in vehiculo conveniente exhibit. & simil.
Sed satis etiam de his.

Hæc dum exhibentur facultati vitali quoque erit prospiciendum;
Commendamus eum in finem aquam Danicam, mirabilem dictam, spiritum Mastichinum D. Simonis Pauli, & Electuarium arcanum Rudolphi Imperatoris sequens:

Rx. Nuc. moschat. condit. No. iiij.

Myrobalan. Chebul. condit. No. iiiij.

rad. satyr. condit. 3j.

choccolat. Ind. ver. 3iiij.

Syr. cinam. spagyric. ppt. unc. iiij.

confect. alcherm. Monspel. unc. i.

ol. cinam 3j.

nuc. moschat. destillat. 3f.

essent. Ambr.

mosch. āā. 3ij.

M. F. l. a. electuar.

S. Krafftlatzverge.

quæ aliis sane medicamentis in hunc finem exhibitis non cedent.

Dictam quod concertavit hæc pro ratione instituti calefaciens & siccans esto ; qualem facile Medicus prudens præscribere, vel mutat. mutand. ex materia. Medica Tilemanni &c. suadere poterit.

Ad specialiorem cuiusvis partis afficetæ curationem hac vice descendere non licet, ne limites dissertationis transgrediamur : dabitur vero forsan in conflictu occasio fusiūs de ea agendi.

Hæc sufficient. Tu Archiater Cœlestis benedicas cœptis, ut quem sibi præfixerunt scopum, fausto attingant sidere !

Tibi sit Laus, Honor & Gloria
in sempiterna secula.