

Disputatio medica de dolore hypochondriaco, vulgo sed falso putato splenetico ... submittit ... ad diem 4 Maji. Anno M.DC.LXXI ... / [Emanuel Blum].

Contributors

Blum, Emanuel, active 1671.
Ettmüller, Michael, 1644-1683.
Universität Leipzig (1409-1953)

Publication/Creation

Lipsiae : Apud Nicolaum Scipionem, 1683.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/ektnzvd2>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

DISPUTATIO MEDICA

De

DOLORE HY-
POCHONDRIACO,
vulgò sed falsò
putato
SPLENETICO,

Qvam

Sub Præsidio

Viri Nobilissimi & Experientissimi

MICHAELIS ET MULLERI,

Phil. & Med. D.

Publicæ Philiatrorum censuræ submittit

Author-Respondens

EMANUEL BLUM,

Hamburgensis.

Addiem 4. Maji. Anno M. DC. LXXI.

H. L. Q. S.

LIPSIAE,

Apud NICOLAUM SCIPIONEM.

Anno M. DC. LXXXIII.

Q. D. B. V.

PROEMIUM.

E Legans certè est illa comparatio , qvam inter hominis, anniqve ætates instituit Ovidius lib. Metamorph. 15.

Nam tener, & lactens , pueriq simillimus ævo
Vere novo est. tunc herba recens, & roboris expers
Turget. & insolita est : & spe delectat agrestes.
Transit in æstatem , post ver, robustior annus :
Fitq valens juvenis. neqve enim robustior ætas
Excipit Autumnus , posito fervore juventæ,
Maturus ; mitisq inter juvenemq, senemq;
Inde senilis hyems -----

hominis & anni ætatibus illæ Scientiarum , Artiumqve respon-
dent; nam, ut rectè Sapiens loquitur Seneca : Multum egerunt majores
nostrí, sed non peregerunt , multa agenda restant posteris ; nec ulli post centum
annos exercendi ingenii deerit occasio : Ita legimus , Artis Pictoriæ adeò
tenera principia fuisse , ut rebus pictis nomina addiderint, eandem
verò progressu temporis ab Apelle vel optimè exultam, ac Naturæ
matris fætum egregiè adumbratum fuisse ; Ita medicamentorum
luxuriosa jam seges , de eorum singulatim agnitâ virtute surrexit ;
In primis tamen, cum illis comparari potest, partium Humanæ Cor-
poris structuræ & usus cognitio : Hæc olim paulò obscuriori cali-
gine mersa erat, inde verò ab Harveo, Conringio, & forsan priùs à Pau-
lo Sarpa Veneto, motum sanguinis indicantibus , nonnihil firmiori
talo inniti cœpit , ac etiamnum novas vires & robur acqvirit, ma-
iores à seculi hujus felicitate expectans. Maximè verò omnium
controversa fuit haec tenus sententia de verâ structura & usu lienis , ve-
teribus hujc multos morbos adscribentibus, recentioribus verò ipsi
patrocinantibus. Et horum quidem Clarissimorum Virorum ve-

stigiis insistentes, & nos in præsentiarum lienem à doloribus ipsi vulgo tributis vindicare, eosdemqve colo potius adscribendos esse, demonstrare conabimur.

CAPUT I.

Historiam doloris Hypochondriaci recenset.

§. I.

Siqvæ alia totius corporis regio, utique tertius venter, abdomen qui vocatur Anatomicis, variis ac frequentissimis cruciatur doloribus. Inter plurimas autem, quas hic includit partes, primariò *Intestina* dolorosè affliguntur in morbo scicet iliaco, dysenteriâ, tenesmo, dolore lumbari, colicâ, passionibus Mulierum hysterics, doloribus in & post partum, doloribus scorbuticis, convulsivis, nephriticis, aliisque similibus. Causas frequentiæ horum dolorum inqvirentes principem locum tenere videmus confluentiam succi biliosi salin. volat. oleosi, & succi pancreatici salin. acidi, cum chylo, ejusque relicto intestina incrassante muco; nam ex horum sub finem duodeni concursu, non potest non à particularum inprimis salinar. hos liqvores componentium, diversimodâ constitutione insignis oriri agitatio & effervescentia, quæ in sanis quidem blandè ac sine omni molestiâ operagit, in statu verò morboſo hæc ipsa sæpius augetur, subinde etiam insigniter depravatur, quando videlicet vel chylus, in ventriculo non benè coctus, contumaciter spernit *Imperium Triumvirale* (ut hoc nomine succum biliosum, pancreaticum, & pituitam intestinalem indigitare cum *Sylvio* liceat) vel etiam quando horum unus alteri prædominari studet, vel ex læsa constitutione vitiosè cum altero effervescit, hinc enim illæ lancingiones, distensiones, tormina, frigora, æstus, similesque molestiæ modò vagæ modò fixæ in abdomen oriuntur, de quibus ægrotantes acerbè ut plurimum conqueri solent. Altera ab hac causa est frequentia flatum, vitiosæ effervescentiæ perniciosa proles, quibus dum à pituitosâ intestinorum dilutâ crustâ, similiter ac à præcipitatis partibus debitò terrestrioribus, feculentioribus, viscosioribus, via intercludi-

tur, fit, ut intestina distendantur vehementius, & quasi violenter divellantur cum acerbo patientium cruciatu. Accedunt his tertio loco, nervei funiculi, intestina freqventer cingentes, ex infi- gnioribus ac mirabilibus eorum in mesenterio plexibus, ut ad alias abdominis partes, ita specialiter ad intestina distributi, à qvibus sive per essentiam irritatis, sive per consensum cum aliis corporis partibus affectis, varii spasmodici, convulsivi ac acerbissimi dolores, modò in unâ abdominis parte separatim, modò verò conjunctim in omnibus ferè simul excitantur.

§. 2. Hos inter dolores, si quis alius acerbus contumax & sæpè recurrens, est iste dolor abdominis, qvi percipitur sub hypochondrio sinistro, & qvem ad imitationem *Clariss. Sylvii lib. i. prax. cap. 14. §. 6.* *Hypochondriacum* vocabimus. Percipitur scilicet dolor gravissimè lacinans & pungens, interdum simul distendens & vehementer vellicans, fixus sub hypochondrio sinistro, & tam cavitatem illam, qvam ibidem costæ spuriæ efformant, occupans, qvam se etiam interdum latius extendens, ac partem illam molliorem lumbis conterminam obsidens, intumescientia sæpiùs ibi locorum manifestè appetet, nunc mollis & compressioni cedens, nunc verò tactui pertinaciùs resistens. Gravius ut plurimum urget dolor dum ægri supini jacent, uti & dum inspirant, tunc enim punctiones atrociores percipere se conqueruntur, admotâ verò manu regioni dolenti, hacqve compressâ remissio doloris & qvoddam levamen percipitur; respiratio adeft simul difficilis, non tantum ob punctiones tunc perceptas, sed qvod inspirando thoracem sufficienter distendere nequeant, qvin impedimentum aliquod in hypochondriis, mediaqve regione epigastricâ, se opponere videatur. Præterea appetitus ferè semper simul est prostratus, supervenientibus interdum, si atrocior fuerit dolor, vomitibus contumacibus tam ingestorum qvàm liqvarium flavescentium, viridium, viscidorum, crassorum, tenuium, &c. sub quo vomendi conatu ægri miserabiliter de dolorem exacerbatione conqueruntur. Denique alvus ut plurimum est obstructa, rariùs naturaliter fluida, rarissimè nimis laxa, urgetqve simul flatuum copia, quo- rum

DE DOLORE HYPOCHONDRIACO.

5

rum excretionē levamen aliquod, sed parvum, nec diu durans percipiunt ægri. His interdum accedunt, & vel potissimum in sexu seqviori, dolores totum abdomen occupantes, & ad genitalia excurrentes, qvi parturientium dolores ferè imitantur, hinc ad lumbos dorsumqve reflexi tandem disparent, successivè denuò recurrentes. Clysmata injecta, & primariò quidem ex emollientibus, ac abstergentibus hinc & carminantibus, malum levare solent. Similiter quoque remedia externa ex oleis destillatis penetrantibus, aromaticis, regioni abdominis stomachali, s. scrobiculo cordis ut vocant, item hypochondrio sinistro, & ubi totum abdomen occupatur, umbilici orbitæ successivè illita conducunt. Interius vero egregium usum habent blandè laxantia & viscosa abstergentia, nec non aromatica, item semina & radices sapore nonnihil acri, ac odore svavi pollentes. In genere vero omnia salia volatilia partibus oleosis & spirituosis attemperata, item opiate addita magnarum hic virium esse experientia docet.

§. 3. Adstantes ubi audiunt ægrorum querelas, subito *Lienis* & affectum & culpam incusant: His pleno ore assentiuntur ipsi ægri, *lienis* pessimum viscus execrantes, qvin non rarò ipsi Medici aut falsâ opinione seducti, aut ut auram plebeculæ captent, similiter morbum *lienis* vocant, *Die Milz-Beschwerung*. Applicantur ob id emplastra splenetica usitata, de ammoniaco, de cicuta, meliloto, mucilagine semin. psyllii, &c. fiuntque inunctiones cum oleis capparum, oleo & extracto nicotianæ, oleo amygdalarum, oleo irino, lil. albor. nardino, tamariscino, juniper. latérin. rutac. anethin. qvæ diutiùs continuata, tandem non sine fructu sunt. Assumuntur etiam per os usitatè Spiritus cochlear. nasturt. aq. & essent. spleneticæ, essent. splenis bovis, eff. fumar. compos. Tinct. essent. flor. croc. & salia martialia, saccharum, Saturn. Remed. ex Tartaro parata, similiaqve qvibus & aperiatur obstructus *lien*, & dissolvatur ejusdem infarctus, ut humoribus liber exitus concedatur, indeqve isti dolores sopiantur.

C A P U T II.

Subiectum Doloris Hypochondriaci declarat.

§. I.

Splenis viscus usitatè incusari, ex dictis non minùs qvàm qvotidianis vulgi querelis patet; Nos tamen adæqvatum affectus hujus Subiectum esse dicimus intestinu sub hypochondrio sinistro delitescentia, tam tenuia, qvàm primariò crassa, & ex his qvidem frequentius intestini coli istam partem, qvæ hypochondrium sinistrum occupat, & ubi colon ex ampliori cavitate arctius nonnihil constringitur, ut optimè observavit C. Bauhinus, simulqve angulari figurâ curvatum ad renem sinistrum descendit; Est enim hic locus aptissimus, in quo aut scybala indurata hærere, aut mucilagines acidæ stagnare, aut flatuum impetus cohiberi, retrudi, ac retroflecti possit; Ex quibus qvidaliud qvàm dolorum varii cruciatus, lancingationes, rosiones, punctiones, distensiones subnasci possunt; teste Hildano cent. 5. obs. 53. ubi ita habet: *Cum excrementa, in superiori & capacissimâ intestini coli parte, in globos magnos, prout capacitas ferebat, indurata, à flatu versus hanc angustiam magnâ cum violentiâ pellantur, accidit, ut non nisi summo cum dolore permeare possint; Ex intestinis vero tenuibus, eam jejuni partem, qvæ à lumbis liberiùs in hypochondrium sinistrum assurgit, ibique incurvatur, simili dolore interdum quoque sed secundario tantum affici, omnino cum Sylvio asserimus. V. Sylv. prax. p. 147. utut rariùs hoc ipsum contingere soleat.*

§. 2. Qvod si exactè consideremus, qvæ circa tales ægros eveniunt, vel spontè asserti nostri veritas semanifestat; Situs enim doloris, exactè ad coli situm & conformatiōnem ibidem locorum se conformat, descendens subinde deorsum nonnihil ad renem usqve finistrum, aut extendens se sub costis nothis non parùm versus hypochondrium dextrum; Imò evenit interdum, ut similis dolor, qvi antè erat in hypochondrio dextro, successivè transferatur ad sinistrum, ibique fixâ sede firmatâ atrocius affligat; Unde etiam est, qvod Clysmata tam potenter ferant opem, præsentaneumqve interdum sint remedium, qvod & contactus & virtus eorum huc in primis pertingat. Accedit, qvod qvò contumaciore est alvus, eò dolor sit atrocior, & qvo illa fluidior, eò hic remissior; Item qvod excretio flatuum malum levet, qvos ex liene proficiisci

quis afferat? qvin hi ipsi potius nullibi magis *quam in Intestinis* spe-
cialiter verò in *colo* stabulantur. Econtrà *lien* ratione sitùs, qvi
est sub costis, ita ut ultimam harum infimo suo extremo vix ac ne
vix qvidem contingat, tumorem vel visibilem oculis offerre, vel
manu palpabilem tactui repræsentare nullo modo potest, id qvod
tamen veterum volunt asserta; nisi forsan *laxata admodum vel rupta*
sint vincula, qvibus diaphragmati, omento, ventriculo, locisqve vi-
cinis annectitur; qvale exemplum in Obs. 3. M. Bogdan. affixis *Cultrō*
Anatomico Lyseri prostat; *vel ab humore in eo stagnante* in immensam mo-
lem assurgat, de qvo Vid. *Malpigh. de structur. & usu viscerum, ubi de liene,*
vel etiam ipsum lienis parenchyma, modò texturā hanc membranosam
ita appellare fas sit, enormiter excrescat; observante *Bartolin. C. i. ep.*
62. p. 254. & C. 4. ep. 13. Qvæ omnia tamen rarissimè fiunt, cùm dolor
hypochondriacus sit freqventissimus; & posito illa aedesse, tamen
talia symptomata qvalia hypochondrio sinistro dolentes ha-
bent, non inferunt, de qvo infrà. Præterea, ratione parenchyma-
tis adeò inflari nequit *lien*, ut in sinistro hypochondrio extuberet,
& admotâ manu cum murmure tumor intùs occultetur, id qvod so-
li *colo* ibi locorum proprium: Nam *splenis* parenchyma, adeò in-
emptum est extensioni à flatibus, ut etiam nisi magnâ vi in exempto
exticcatoqve fieri non possit. Omnes itaq*ves splenis* dictas inflatio-
nes, potius flatuum aut in *jejunio* aut potissimum in *colo sub hypochon-
drio sinistro* coacervationes dixerim. Exemplum sit inflatio ista sple-
nis, qvæ est apud *Forestum lib. 20. Obs. 4. p. m. 276.* qvam in *colo* fuisse
cæcus sit, qvi non apertè videat. Proptereà namq*ue* etiam evenit in
tali *hypochondrii dolore*, qvod manus loco dolenti cum forti compres-
sione admota, qvatenus flatuum agmina disjiciuntur, dolorificæ
distensionis, lancingationisq*ue*, levamentum adferat.

§. 3. Sed ne solis speculationibus indulgere videamur, vel
observationes Practicæ idem oculariter testantur. Vid. *Salmuth. Cent.*
I. Obs. 24. Qvæ observatio luculentissima est, ad confirmandam no-
stram hypothesin, scybalis per sesquiannum in *colo* retentis, af-
fectum & dolorem vulgo habitum *splenicum*, exactissimè cum
omnibus symptomatibus inferentibus. Cui simile sed magis adhuc

stupendum, infarctus talis per sexennium continuati, pro scirrho
 contumaci habiti, exemplum recenset *Fernelius lib. VI. de partib. morb.*
 & *symp. c. 9.* Nec minus eleganter nostram opinionem illustrat,
Obs. 58. in Cent. I. Hildan. Qvibus adjungatur observatu dignissimus
 affectus & cura, relata à *Sylv. prax. c. 14. p. 168.* Pertinet etiam hūc *ca-*
sus 36. Cent. I. Gabelchouer. qvem splenis dolorem, *colicam hypochondria-*
cam fuisse, curatio ejus testatur. Vix dubito, qvin & *Obs. 21. Pa-*
naroll. Pent. 2. huic albo inscribam, scilicet, qvia mucilaginosæ
 fordes, à jusculo cum spir. vitrioli, attenuatæ solutæqve fuerunt,
 unde transitu per anum reperto, *spleneticus* putatus liberatus suit.
 Hinc cautè monent omnes Practici, cavendum, ne *dolor hypochon-*
drii sinistri cum dolore *lienis* confundatur. *Vide sis Hildan. cit. loc. &*
Forestum l. 20. Obs. 2. Schol. p. 275. qvo loco libenter concedit, *dolorem*
colicum distendentem acutum & interdum mobilem, *dolorem* vero
lienis gravativum tantum esse. Reliqvi Practici, ubi ad diagnosin
 doloris ex vitio & affectu *lienis* perveniunt, potius alia signa ad-
 ducunt, qvibus is affectus cognosci debeat, qvam ut proprium
splenis dolorem monstrare possint: Et tamen hæ ipsæ notæ, qvibus
splenem laborantem exprimere conantur, de gravitate, videlicet in
 hypochondrio sinistro, de dolore à longâ ambulatione, eqvitatio-
 ne aliove vehementi exercitio, de appetitu prostrato, fluxu hæmor-
 rhoidum ablato, spiritus difficultate, mæstitia, somniis turbulentis,
 de utilitate supervenientis dyarrhoeæ, dysenteriæ, humorumqve
 acidorum vomitus, item qvas de colore cutis atro, excretis nigris,
 rugitu & murmure in sinistro hypochondrio referunt, ea omnia
 partim *colo & intestinis* affectis vel maximè convenire dicimus, partim
 verò antiquam istam *Galeni & Avicennæ* Doctrinam sapiunt, & fal-
 sæ ac präconceptæ illi opinioni de officio *Lienis* circa humorem
 melancholicum superstructa sunt. Nimis *Lienem* ex Epate per
 vas venosum attrahere crassum ac limosum succum, ipsis vocatum
 Melancholicum, illum alterare, ac ex ipso conveniens sibi alimen-
 tum elaborare, reliquo inutili ad Ventriculum, per vas breve-
 amandato: Qyod si jam eveniat, addunt, ut transitus hic denegetur
 excrementum hoc in totum corpus redundans, id ipsum necessario
 inqui-

inqvinat, variosqve morbos, imprimis verò icterum nigrum, Scorbustum, Affectionem hypochondr. inducit, simili modo ac ex obstructione vesiculæ felleæ icterus flavus generetur. Qvorum tamen omnium explicatio, ex aliis longè fontibus haurienda.

§. 4. Res ut pateat ulterius, consideremus saltem dolorem istum punctorum hypochondrii sinistri, qvi post vehementiores corporis motus, & exercitia accidere solet, & in specie post evitatem torqvæ, uno ore das Milzstechen vocatus; unde etiam natum vulgare illud dogma, eximi posse aut saltem debere, cursoribus Lienem, ut citra punctorias has molestias, citiori cursu pergere possent, de quo consulatur Cl. Mæbius in fundament.physiolog. Verum hunc Dolorem non esse Splenicum, ipse Sennertus, qvi tamen alias ex hypothesi vulgari Lieni ejusqve dolori multum adhuc tribuit lib. 3. prax. pag. 498. libenter fatetur. In eo tamen à nostra opinione declinat, qvod Peritonæo illum acceptum ferat, cum potiori jure intestinis ibidem locorum arctatis, & in specie Colo, ejusqve angustiori peripheriæ in curvaturâ sit adscribendus. Unde etiam est, qvod post pastum crebrius assurgat talis dolor, qvando scilicet & copiosiores flatus ex alimentorum recenti assumptione & distributione, intestina distendunt, & colon à vicino ventriculi fundo magis comprimitur, & angustatur: ita & impressio digitorum in locum puncturæ, aut fortior manus applicatio, dolorem sopit, qvatenus flatuum impetum retrudit ac retroflectit, qvorum emissione dolor sensibiliter levatur, id qvod ex Liene qvomodo deduci possit non video; Prætereà dolores hujusmodi eis in specie graviores incumbunt, qvi affectione hypochondriacâ laborant, ac indè largiori flatuum ditati sunt proventu. Dum E. per motum & exercitium in concalvatis intestinis flatus impetuoso turgescentiâ vagantur, sub hypochondrio sinistro ex qvacunqve causa hærent, dolorum istorum punctiorum causæ existunt.

§. 5. Intestinorum si consideramus substantiam, Doloribus acutis concipiendis aptissimam, (sicut reverâ, qvam acuti sint & torquentes, tantum non quotidiè experimur) è contra verò Lienis parenchyma qvam his ipsis sit ineptum, magis magisqve nostra

confirmatur opinio. Est enim totum *Lienis* corpus membranarum congeries in Cellulas, & concamerationes efformatae sive distincta; quæ apum veluti favos aptè repræsentant; In his cellulis copiosissimæ & ferè innumeræ sunt glandulæ ovales, coloris albi, racematis tanquam uvæ botrus, invicem contextæ, cum septem vel octo singulus quinq̄ue botrus conglobetur: Has inter sparguntur arteriarum & venarum capreoli, quibus intertexuntur fibræ copiosæ, cum numerosa ramulorum sive fibrillarum sobole, prognatæ ab interiori membranâ *Lienis*, sive à capsulâ ejusdem, ad robur mollioris substantiæ, sive ut sint tanquam trabes, pro firmando parietibus vasorum sangvineorum & nervosorum ac cellularum. Hanc *Lienis* structuram, hactenus omnium Anatomicorum sedulitatem eludentem (Hoffmannus enim & alii parenchymatosam carnem appellant, *Higmarus* verò concretum sangvinem vocat; omnesq; Anatomici uno consensu sangvinem congruumatum circa fibras nerveas pronuntiarunt; decepti, quod vel levissimâ cultelli admotione, arteriarum & venarum quasi filamenta sanguinem pro supplemento spatiolorum, quæ sunt inter glandulas illas, effundant, ac sic densam caliginem oculis offundant) uti primus lustravit *Malpighius*, ita & idem ad absconditas symptomatum hujus visceris causas, facilius penetrare potuit; Nimirum vel à copioso humorum per arterias nervosq; affluxu ad glandulas has vel vitio vasis auferentis, vel appulsæ materiæ energiâ, *Lienem* interdum laxum & ut plurimum amplum reddi, continuato nihilominus perpetuò sanguinis affluxu in tumore jam facto. His ita trutinatis, dolorem *pulsatorium* ex sanguinis arteriosi motu, aut *gravativum* ex parenchymate ejus, variis excrementis infarcto, aut *Teste Bartholin.* cent. 4. ep. 14. ultrà molem naturalem excrescente, ipsis libenter concedimus; imò ut largiores simus, & *tensivum* quendam, obscurum tamen dolorem, ex distensione ejus membranæ, tandem largimur: sed acutum, pungentem, lacerantem, terebrantem & tam atrociter torquentem dolorem ut inferat parenchyma ejus minus sensile & cujus structura huic omnino repugnat, nulli admittimus, quin hos soli *Colo* & aliqvando *Intestino tenui* ibidem

dem locorum inclusō constanter adscribamus; Nam & duri tumores & scirrhi *Lienem* infestant, qvi tamen citrā ullam insigniorem molestiam, sēpē etiam insensibiliter succrescere solent, pluresq; ad annos circumferuntur.

§. 6. Dolenda interea est *Lienis* conditio, cujus structura & usus legitimus, ut hactenūs plane stetit incognitus, ne dicam neglegētus, ita nihilominus tot malorum morborumq; à vulgo ignaro habetur sentina, ut tantum non relegare istud & exterminare ex Republica microcosmīca, volupe ducant; Sed innocentiam ejus egregiè defendunt *Sylvius* diss. de usu *Lienis*, ob id à qvibusdam malevolis titulum Patroni *Lienis* adeptus, item *Coring. Tr. de gener. & usu sanguis*. Nam neq; ve scorbuti, neq; ve Mali Hypochondriaci, neq; ve icteri nigri fomes & focus est *Lien* obstructus, vel alio modo vitiatus; nec magis *Qvartanæ* cubile est *Splen*, qvam *Tertianæ* *Hepar*. Et posito qvod Emplastrum *Helmont. Tr. de febrib. p. 776.* *Splenis* regio- ni appositum centenas *Qvartanas* tutò persanārit, nihilominus tam- men hoc ipsum, non magis sedem esse ejus in *splene* probat, qvam qvod Emplastrum febrile *B. D. Michaëlis* ex fuligine Therebinth. camphor. &c. qvo carpis manuum applicato, in sene decrepito ali- qvando, eandem *Qvartanam* curavit, (non secus ac similia externa sēpiùs mirabiles edunt effectus) probare deberet, eandem alias yé intermittentes residere in carpis manuum. Plura alia *Helmontii de Splene* lepidè asserta, tam qvo ad jus duumviratus, qvam qvo ad somni vigilariūm q; radicem, nec non vim genitalem ex eo derivatam, sufficienter infringit canis sine *splene* optimè se habens, & omnes actiones qvā vitales, qvā animales & genitales, alacriter obiens. Neq; tamen hæc ita accepta volumus, ac si in totum *Lienis* morbos negaremus, ac universaliter omnes ejus obstrunctiones rejiceremus, nam inquisitiva Anatomicorum manus, plus satis easdem ad scirrhosam lapideamq; duritiem impactas, nobis detexit; sed hoc tantum urgēmus: I. Sæpius incusari *Lienem* ejusq; parenchyma, tanq; obstructum & infarctum in morbis Chronicis, in primis verò affectibus appellatis melancholicis, ut ut id sola præconcepta opinione, sine ratione manifesta, sine signo saltem probabili ad-

struatur, qvod confirmat experientia *Cl. Sylv.* qvi *disp. de Liene* testatur, se in cadaveribus longè ultrà 100. dissectis, & ex his plurimis per omnem vitam Malo Hypochondriaco, melancholiā &c. laborantibus, imò ob illam extinctis, semper satis sanum ac floridum, observāsse hoc viscus, nunquam verò inflatum, induratum, vel obstructum. 2. Tumores, scirrhos, & infarctus hujus visceris, qvi non rarò in morbis chronicis deprehenduntur, & qvidem specialiter in *Qvartanā*, non tam radices esse horum morborum, aut fomites, qvam producta morbosā istis inveteratis supervenientia, ac ex vitio primæ digestionis orta, simili modo, ac calculus producētum est morbosum, ex certâ istâ ametriâ salium, qvâ eadē se facile coagulant, ipse verò morbus est lithiasis: adeoqve hi *Lienis* tumores obstructionesqve effectus potius morbosī erunt, qvam causæ radicales.

C A P U T III.

Causas Doloris Hypochondriaci materiales & formales scrutatur.

CAUSARUM dum studemus evolutioni, has melioris doctrinæ gratiâ, in proximas & remotas, ex rebus non naturalibus desumptas, dividemus; Inter proximas I. se offerunt scybala, s. *feces alvinæ induratae*, id qvod fit I. dum, vel à diuturnâ retentione exsiccantur, qvatenus aliæ fluidæ chylosæ partes à venis lacteis absorbentur, & forsan aliæ tenuiores agiliores & volatiliores perpetuò per poros cutis transpirant, unde partes crassiores & terrestriores suo vehiculo destitutæ, magis concentrantur & compinguntur, ac ob molem suam neqve motu illo peristaltico, neqve compressione à partibus vicinis promoveri queunt: Tale exemplum est in *Salmuth. C. i. obs. 24.* qvando per sesquiannum *Scybala fuisse retenta* dicit, item in *Cent. 3. obs. 45.* Id qvod etiam accidere potest à sudore copioso vel ab exercitio vehementi, &c. 2. dum à coagulatione nimiâ indurantur, id qvod in primis accidit, aut vitio Succorum sub finem Duodeni miscendorum (qvod *Grafius* succi pancreatici vitiosæ aciditati, ac austeriori adscribit) aut assumptorum,

qvan-

quando hæc duriora, viscosiora, ac in ventriculo non bene cocta, neque in intestinis cum bile & succo Pancreatico satis permista fuerint. Ex his enim & similibus causis, scybalæ prædictæ facile subsistunt, in cellulæ *Coli*, in specie tamen ubi sub *hypochondrio sinistro angustatur & incurvatur*, ac adeò dolores & sæpius duritiem tactui resistentem inferunt. Teste præter obs. *Salmuth.* suprà allegatam, *Schenck.* in obs. lib. 3. ubi plura adducit similia exempla: Qvo simul facere videntur *Colicæ aureæ ex nummis aureis deglutitis observatae à Bartolin.* Cent. 3. ep. 69. & *Borello* Cent. 4. obs. 25.

§. 2. Post Scybalæ sese offerunt, sordes mucilaginosæ & viscidæ, eæ scilicet qvas vulgò *pituitam vitream* nominant, Paracel-fus verò, in sensu latiori, *Tartarum fecalem & mucilaginosum*, qvod succo illi, qvi in vino circà doliorum parietes concrescit, qvodammodo similis, & acidum subtile coagulans feces, ejus sit primordium, appellat. Producuntur autem hæ sordes in nimiâ copiâ, modò ab alimentis difficulter digestilibus, viscidis &c. de qvibus inferiorius dicendi erit occasio: modò à fermento stomachico deficiente in digestionis negotio & loco chyli volatilis falsi, liqvamen viscidum tenax mucilaginosum & ut plurimum vitiosè acidum producente: interdum etiam ex inertia f. deficiente acrimoniâ succi pancreatici & biliosi non abstergentium, nec resolventium mucum intestinalium superfluum. Ab his & similibus causis, pasta crassa, viscida, ac tenax, sæpius acida & pontica, generatur, ventriculi & primario intestinalium lateribus agglutinanda & infacienda. Teste *Salmuth.* Cent. 5. obs. 78. Vedit Dn. Peucerus in Italo qvodam *Colicâ* consumpto, dissectoqve, totum Colon pituitâ obductum relicto saltē foramine digitâ crassifie. Huic proximè accedit, qvod refert *Sennert.* l. 3. prax. de Cl. Lipsio: hunc sc. aliquando materiam adeò lentam & tenacem paulatim in totâ intestinali fistulâ à vitâ sedentariâ ac in studiis contabescente, coacerwatam ejusqve figuram retinentem per alvum rejecisse, ut se omnia intestinalia effudisse putarit. Affinis his est locus ille *Fernelii* suprà allegatus, ubi *Coli* ex toto à pituitâ infarcti legitur exemplum. Hæc pituita, si simul, id qvod ut plurimum contingit, vitioso acore, sive ex stomachi errore, s. ex succi pancreatici vitioso acore omnibus partibus membrano-

branolis hostili, inquinata ac in *Colo sub hypochondrio sinistro collecta* fuit, fixum continuò lacinantem, &, quasi aculeis pars perforatur, atrociter pungentem apto vocabulo terebrantem appellatum, dolorem infert.

§. 3. Freqventes dñiqve dolorum vulgò dictorum *plenorum* causæ flatus sub hypochondrio sinistro inclusi. Hi, ipsi non à calore neqve à frigore, ut veteres voluere & in qvam mentem loquitur *Forestus lib. XX. obs. IV. inschol.* Generatur igitur ventosa flatulentia, Teste *Aetio ex frigiditate membrorum eundem producentium, & cit. loc. addit: aromatica propinare nolui, ne materia illa frigida in flatus dissolveretur*, sed per vitiosam generantur fermentationem, probante id *Kergero tr. de ferment. 3. c. 4. p. 223.* prædominante in hâc vitioso ac p. n. acido, idqve sæpiissimè in subiectâ materiâ viscidâ. Generari dixi flatus per fermentationis modum, ita ut reverâ non inexstantiis assumptis, sed de novo producantur ex eisdem, sive in stomacho sive in intestinis hoc fiat; Non secus ac ex musto fermentante erubatur gas copiosum flatulentum, qvod anteà in eo non erat, sed per fermentationis demum modum excitatur. Hinc est qvod hypochondriaci, ex qvibuscunqve fere assumptis copiosos generant flatus, cum contra robustus stomachus, vulgò flatulenta dicta, citrâ eorum proventum potestate sui fermenti digerat. De quo videtur accuratius *Helmontius tr. de flatib.* Sunt nempè flatus, novum qvod damens spirituosum, spiritus scilicet sylvestres incoercibiles & non coagulabiles, qvos ex defectu Etymi nomine *Gas* appellatur. Helmont in suis scriptis, & qvos neqve præcisè salinæ, neqve sulphureæ naturæ esse, sed ex utriusqve actione aliquod emanans tertium, aptè asserit *Becher. phys. subterrani, l. i. f. s. c. 2.* Hi E. flatus impetuosijs per amplitudines *coli* delati, impingunt in lateris sinistri eâ parte, qvâ id incurvatur ac angustatur, unde in se coacti cum murmure & borborygmis non rarò sensibilibus retro flectuntur, & molestum distensionis lacerationisqve sensum inferunt, tunc imprimis quando respirationis actione diaphragma deorsum pulsus, *Colon* ibidem substratum premit, ac ita flatus in angustum spatium cogit, unde non rarò tumor elevatur, qvi affectione hypochondriaca laborantibus potissimum familiaris est & malè *inflatio Lienis* dici solet. §. 4.

§. 4. Fuerunt hæ causæ proximæ; accedo ad remotas, ex sex rebus non naturalibus desumendas: has inter 1. est *aer* frigidus abdomen vestibus non benè munito susceptus; qvod si enim juxta Hippocrat. Densam ac duram cutim habentes facile offenduntur, qvod excrementis in corpore contentis, non pateat liber exitus per cutim, multò magis frigus, non modò poros claudens, sed etiam pereos se forsan in corpus insinuans, subinde intestinorum varios dolores inducere, pituitamq; ipsam inspissando, malum hoc excitare posse opinamur; Sic *Forestus* dicit fratrem ipsius statim à refrigeratione pedum dolorem *Colicum* incurrisse lib. XXI. obs. IV. id qvod etiam Hippocr. S. 3. aph. 5. & 17. testatur 2. *assumpta* vel *qualitate*, qvā fermentum stomachale obruunt, ita ut hoc tantæ activitati insufficientis reddatur; vel *qualitate suā*, scilicet quatenus aut difficulter sunt coquilia, aut viscida aut mucilaginosa, aut astringentia, ad hanc passionem disponunt. In horum classe constituti sunt pīces, freqventer comestī, item castaneæ, mespili, & alia vulgaris notitiæ; ita ex *Mæb. instit. p. 43.* patet, ex spirarum in nimiā copiā assumptione dari alvum obstructam; ita *Schenk. l. 3. obs.* ex cerasorum cum nucleis devoratione, alvum per 3. septiman. clausam fuisse, & eosdem post id tempus per alvum demum exiisse notat. Ita *Cornarus* ova indurata & comesta alvum adstringere observat.

Conf. 4. Ita *Sennertus* ex *Platero* annotat, qvendam *Colicis* cruciatibus diu vexatum post clysmatum usum casei (qvem copiosum anteā assumferat) concreti induratiq; magnam copiam per alvum excrēsse; ita *Uvæ* cum pelliculis comestæ, lethalem alvi contumaciam aliquando induxerunt; pelliculæ enim harum cum facultati digestivæ reluctantur, ac insigniter acidæ ē stomacho in intestina elabantur, fit ut coagulentur excrements, ac sic pertinacissima obstructio seqvatur. Consideranda venit etiam ipsa stomachi cruditas acida, ex qvā in intestinis postmodum per vitiosam fermentationem producuntur flatus, infarciente eadem de causa copioso muco intestina, & in specie colon ejusq; cellulas. Id qvod in iis ad oculum patet, qvi affectione hypochondriacâ laborant, in his enim acidum hoc nimium & vitiosum in stomacho modo dictos effectus, tanquam pedisseq; secum ducit.

§. 5. Præter talia, & flatulenta & in specie fermentativa assumpta, dolorosas has in sinistro latere dant turbas; Est scilicet, quorundam assumptorum hæc natura, ut sub digestione stomachi fermentativa, copiosum gas eructent v.g. ex uvis comestis, it. ex ceps, quod partim sub ruetuum nomine per os exhalat, partim per pylorum erumpens intestina flatibus replet, unde talia flatulenta dicuntur; sed & in primis fermentativa assumta hic consideranda sunt, ut fructus horœi, item musti potus, omniaque mellita ac saccharata, quæque ad horum naturam accedunt; talia enim in passione hypochondriacâ virorum & suffocatione hystericâ mulierum, quæ ferè coincidunt, cum vitioso acido effervescendo, copiosos flatus producunt, & sic doloris hypochondriaci fomitem ministrant. Novi mulierem, quæ ex potu vini tenuis cum saccharo probè edulcorati, in atroces abdominis & in specie hypochondrii sinistri cruciatus incidit; Cumulârat autem ea antea ex ineptâ diætâ copiosam pituitam, unde ex potu fermentativo superingesto, flatus excitati ac in colo hinc inde coerciti & oberrantes, tam atroces dolores inferabant; simile exemplum refert *Forestus de mercatore quodam*, cui ex flatulentorum ciborum ingestione, & potatione musti, & tumor insignis & ingens dolor in latere sinistro exortus fuit, qui cum copioso flatuum exitu finiit.

§. 6. *Somnus* & ipse nimius ad intestinorum infarctum ac scybalorum aut viscidiorum excrementorum in *Colo* hæsionem plurimum disponit. Id quod etiam *de quiete* valet. Quemadmodum enim motu ac exercitio corporis sanguinis circulatio, ejus vitalis fermentatio ac spirituum volatilium generatio augetur, unde & alimentorum fermentatio, assimilatio, distributio & heterogeneorum separatio, ac præcipitatio promoverur, ita è contrario *somnus* nimius generandis & coacervandis crudis succis inservit, & omnes excretiones sensibiles confyetas, dum dormiens 7. horarum spatio, occultè, salubriter, & sine violentiâ perspirare solet, duplò magis, quam vigilans teste *Sanctor. in Med. Static. f. 4. aph. 2.* tam propter spirituum animalium tardiorem motum, quam propter partium agiliorum transpirationem insensibilem transßudationemque sen-

sensibilem impedit, undē & ipsa excernenda imminuta, indeqve intestinorum retenta plurimum aucta tandem dolorem nostrum inferunt, ut ex dictis patet: Ut namque alias legitimum sanitatis conservativum est motus, vicarius nempe omnis V. S. purgationis aut aliis cujuscunqve sanguinis correctionis, id qvod rusticorum & mechanicorum gens prae aliis sana confirmat, ita somnus immoderatus & nimia qvies plurimis in specie diuturnis ægritudinibus fenestram aperiunt. Animi affectus ad motiones spirituum & humorum commode referuntur, unde in qvibus minus hi agitantur & moventur, ut in mœrore, tristitia, metu &c. ad dolorosum hunc affectum disponunt, in qvibus verò iidem vehementius moventur, ut in irâ, gaudio &c. potius hunc ipsum curant.

§. 7. His ultimo loco ex rerum naturalium genere, annetenda venit peculiaris qvorundam Idiosyncrasia, qvâ miræ stipticitati alyi qvidam sunt obnoxii; qvod utut citra insignius incommodum fieri soleat, tamen periculo non vacat, qvin diutiùs retenta scybala in *Coli anfractu sinistro* dolorem hunc inducant. Cujus Idiosyncrasiae exempla videantur in *Sennert. l.3. prax. p. 2. f. 2. c. 4.* Item *Bartol. c. 4. hist. 40. Panaroll. pentec. 1. obs. 1. & 17. Sylvatic. Conf. 46. l. 3. Rodio cent. 2. obs. 81. Salmuth. c. 2. obs. 65. & c. 3. obs. 36. Schenk. lib. 3. obs. Meibom. de usu flagror. p. 7.*

§. 8. Fuerunt hæ causæ materialiter consideratae, videamus jam earum efficaciam formalem, seu rationem, sub qvâ talem inferant dolorem, sæpè miseros ejulatus extrudentem; scilicet, qvicquid obstinatius tanquam hostile irritat sensum Intestini *Coli*, in ea parte ubi angustatum & incurvatum sub hypochondrio sinistro incedit, hoc istâ irritatione molestâ, sub qvâ intestinum dolere incipit, istud in contracturas, & spasmos convulsivos cogit, à qvibus doloris mira exacerbatio & crudelitas, cum intestina velut per crampum contracta corrugataqve dolorem manifestent suum. Nam contractura est evideat sensationis irritatæ s. doloris effectus s. consequens, nihilominus tamen hac accedente mirè augetur dolor, adeò ut quianteà ferè insensibilis esset, nunc crudelibus tormentibus partem, spasio convulsam qvodammodo dilacerare videatur. Oculari

exemplo hoc confirmat *Helmont. Tr. de flatibus* §. 38. & *de Lithias.* c. 9. §. 132. Mitiora hæc sunt, ubi scybala indurata solùm intestinum obfident, ast si mucilago tenax acore peregrino rosivo imbuta pertinaciter ipsi adhæserit, hujus ponticus acor in viscidâ materiâ obstinate hærens & continuò rodens, partem perforare quasi videtur, & ad ejus propulsionem frustraneam tamen, irritata intestina sese convellunt, & corrugant, unde crudeles lationes & torsiones, subindeq; recurrentes pungentes lancinationes misero modo ægros torquent: simili ratione atq; purgantia medicamenta, qvatenus eorum particulæ subtiliores intestinis inimicæ his pertinaciis affixæ hærent, horum spasmos ac dolorificos cruciatus inducunt; Sic antimonium in substantiâ assumptum, membranas Intestinorum vellicando tormentosam hypercatarsin infert, uti & resinæ vegetabilium, item arsenicalia incautè usurpata, horrendos vomitus ac hypercatarses dolorosissimas inducunt. Periculosior est flatum procella, qvi ex vitiosa, à p. n. acore, fermentatione excitati, & sub hypochondrio sinistro nonnihil coerciti, sui acrimoniâ & exoticâ impresione grāvem dolorē inferunt, unde convulso contractoq; intestino & exitus ipsis præcluditur, & simul retropelluntur, undē vagos ac oberrantes, in primis tamen sinistro in latere frequentius recurrentes, cruciatus excitant: Distendunt namq; hi intestinum, & hac violentiâ sensationē dolorificam inferunt, authore contracturæ & conseqventer torquentis convulsionis. Vid. *Helmont. loc. suprà cit.* Dicitis lucem affundit experientia ocularis Magnif. Dn. D. Welschii Mæcenatis & Hospitis mei omni observantiâ colendi; qvi dum Anatomicas fasces gereret, in sectione colicis cruciatibus enecati, deprehendit totum Colon à flatibus immensū distensum, sub insertionem v. in intestinum rectum, ubi simili modo ac mediâ sui parte sub hypochondrio sinistro in gyros contorqvetur, adeo coarctatum, ut nil magis visum fuerit, qvam planè ibi coaluisse; ipse v. defunctus per quatuordecim dies sævisimis terminib; cum sonitu ac fragore sæpius horrendo, dilaceratus fuerat.

§. 9. Qvod si spasmi hi intestinales frequentius recurrentes, per nervulos eorum ad plexus communes in mesenterio deri-

ventur, ex his ipsis contracturæ istæ spasmodicæ in alias quoq; vi-
cinas partes, ex eisdem plexibus nervos accipientes (nam vix in in-
fimo ventre datur pars præter Diaphragma, qvæ non de iis nervos
participet) contorquentur, unde totum abdomen excruciantes do-
lores ex vago & inordinato hoc spirituum motu occupant; qvare
& vomitus pertinaciores subinde superveniunt, qvin & in mulieri-
bus similes cruciatus, ac si foetus enitendus foret, inferuntur. Id qvod
clarius patet, modò consideremus Colicam Nephriticam, s. istos ab-
dominis dolores ac vomitus sæpè crudeles, qui calculo Renum tor-
tori superveniunt, nam & hi ipsi non nisi per tales spasmos, à re-
num nervulis mesenterii plexibus communicatos, & hinc ad inte-
stina & stomachum vibratos, ibi qve convulsivos tales dolores in-
ferentes, producuntur.

C A P U T IV.

Signa Diagnostica & Prognostica proponit.

§. I.

Diagnosis Doloris Hypochondriaci ex ejus historiâ cap. 1. recensitâ
per se patet; Saltem distinctiva evolvenda sunt signa, qvibus
& causæ inferentes à se invicem distingvantur, & qvomodo à
cognatis sibi affectibus discriminetur, intelligatur; Ex qvibus judi-
cium formari poterit, an brevi vel diu duraturum sit malum, & an
graviora symptomata malum redditura sint periculosius, an v. mi-
nus pericolosum ista remissiora.

§. 2. A scybalis malum oriri docet dolor fixus sub costis
nothis, cum qvodam gravitatis & ponderis sensu; tumor tunc du-
rus, interdum ad coli situm deorsum versus protenditur, ut hoc in
exemplo à *Sylvio prax. c. 9. §. 57.* recensito elucet; Adeo contumax
alvi obstructio; Præcesserunt causæ externæ ad excrementorum
indurationem & retentionem disponentes, qvales sunt balneum,
sudores, exercitaq; nimia, assumpta duriora ac viscidiora, potus
parcior haustus, uti & vitam sedentariam dispositivè concurrere, &
urinam copiosius redditam illas producere testatur ipse *Hippocra-*
tes aphor. ultim. sect. 4.

§. 3. Mucilaginem ponticam, acidam, pertinacius *coli celi*
lulis in sinistro hypochondrio adhaerentem, esse causam hujus doloris ex
eo ferè patet, qvòd dolor sit perterebrans, fixus, & ferè continuus,
qvod adsit sensus contorsionis in isto loco admodum dolorosus,
& punctiones cootinuatæ: qui dolores si fuerint graviiores, subin-
dè & reliqvis intestinis & mesenterio per consensum affectis per
totum abdomen succesivè, & hinc ad lumbos detorquentur.
Eandem ulterius manifestant ciborum fastidium, singultus, vomi-
tusqve pituitosi, ætas consistens, crapula freqventior, & alvi rese-
ratio sine doloris remissione.

§. 4. Flatus esse causam horum dolorum, ex hoc elucet,
qvòd vagi sint & modò cessent perinde recurrent, adsint simul bor-
borygmi & murmura avpominis, regio hypochondriaca tumeat
& turgeat non secus ac sæpius totum simul abdomen, manu fini-
stro lateri admotâ cesset dolor, flatus per inferiora erumpentes
malum levent, subinde etiam ructus per superiora misfi dolorem
minuant, adsit difficilior ac impedita nonnihil respiratio, ipse æger
fit Hypochondriacus & aliæ flatuum generationi obnoxius, præ-
cesserint assumpta alias dicta flatulenta, item effervescibilia, de quib-
us cap. præcedente dictum.

§. 5. A cognatis sibi affectibus discriminatur facile, & 1.
quidem à peritonæi & musculorum doloribus; qvia hypochondriacus
est profundior & qvod musculorum ille, faciliè tactu deprehendi
posit, nam compressi leviter dolorem inferunt teste Sennerto prax.
p. 488. 2. Minus facile à cardialgiâ, oriunda, videlicet, ex iisdem,
ferè causis in stomacho, ex quibus hic noster affectus in intestinis,
undè & inconvenienter licet, colica ventriculi vocatur: Hæc ipsa
sæpius per συμπάθειαν dorsum supremamqve lumborum regionem
affligit, interdum etiam inferiora petit ac egregiè dolorem Colicum
mentitur, undè non rarò errores in curatione nascuntur, observan-
te id Schenk de quibusdam Medicis, ægrum de dolore anteriori
stomachi converentem, pro cardialgiâ laborante habentibus, qui
tandem Clystere utiliter applicato, dolores hos à Colo provenisse,
cognoverant. 3. Ab Iliaco dignoscitur, ratione loci qvod hic circà

umbilicum magis torqueat, item quod scybalum magis quam
naturam rejiciantur, quodque brevioris sit morae. 4. Inter dolorem
Hypochondriaco colicum & nephriticum, ob vicinum situm & per ple-
xus mesenterii nerveos conjunctionem, sibi multum affines, id di-
scriminis observatur, quod hic minus sit tensivus, sed gravans & fi-
xus, deorsum tendat ac ureteres laedat, & urinas colore lacteo feret
cum copioso sedimento tingat, id quod non fit in illo; Licet etiam
5. Hæc passio hypochondriaca sèpè complicitur cum hysterica passio-
ne in mulieribus, dum dolores in hypochondrio sinistro incipientes,
in medium abdomen contorquentur, & ad spinam dorsi lancingan-
tes, vehementes præcordiorum angustias inferunt, imò interdum
in inguina descendunt & q.s. foetus enixum representant; qualem
dolorum mulieri inde à tempore abortus saepius recurrentem & sem-
per ex hypochondrio sinistro incipientem, & abdomini tormenta
inferendo ad inguina & lumbos descendantem, carminantium ta-
men & pituitam acidam evacuantium usu cessantem observavit.
Dominus Praeses: attamen à se invicem discriminantur, quod rarius
in suffocatione hysterica fixa hypochondrio sinistro inhærent do-
lores, & quod in passione hysterica majores borborygmi ac tumultus
orientur in medio abdominis, quod item majores præcordiorum
angustiae ac anxietates, non rarae quoque lypothymiae adsint, id
quod in dolore nostro evenire non solet; ut taceam faucium an-
gustias, vertigines, ac horrendos, saepius etiam ridiculos gestus, qui
passionem hysterica comitari solent. Qvibus notis ulterius di-
stinguendus sit *Hypochondriacus*, à reliquis abdominis doloribus affi-
nibus, dicere supersedeo, & facile cuivis patebit, qui partem affe-
ctam situmque ipsum doloris attendet.

§. 6. Prognosin quod attinet, caret malum hoc omni ferè
periculo, si pars modò coli in primis verò circà finem laboret, cly-
steribus è facilè penetrantibus; minus verò facilem medicaminis
se præbet, si totum intestinum fuerit infarctum, tunc enim diu-
turna mora, sui acerbitate, vigiliis, inquietudine, similibusque, vi-
res insigniter dejicit, idque è magis si malum hæreat in intestino te-
nui hypochondrio sinistro substrato. Contumacissimum curatu-

est, si à mucilagine ponticâ & pituita vitrea oriatur, nam supervenire solent convulsiones, abdomen saepius quasi excavantes, & umbilicum interiora versus retrahentes. Nec minus periculosa est hæc passio, si oriatur à scybalis diutius retentis, periculum enim est, qvin ad volvulum aut inflammationem partem affectam disponat; si verò à flatibus originem ducat in tympanitidem abiçe potest, aut distendendo nimis abdomen, ad umbilici intumescentiam, aut herniam disponere, observante id *Forsto lib. XXI. obs. V.*

C A P U T V.

Medendi rationem Doloris Hypochondriaci docet.

§. I.

UT denique compescatur tam atrox furia, salutares opem ferunt Medicorum manus; qvæ procelloso morbi turbine sedato, exoptatam corpori serenitatem reddunt; remedia scilicet hæ afferunt, qvibus malum auferunt, inventa per indicationem mediante ratione, confirmata per experientiam, illustrata per analogismum. Ut dolor eqvidem sistatur, anodyna in genere dicta, item, in specie narcotica reqviruntur; Ut causæ removeantur variæ, varia tentanda sunt, scybalæ dura emollienda & evacuanda, mucilago viscida incidenda, abstergenda & expurganda, flatuum proventus inhibendus, & eorum ex acido origo destruenda: Qvibus coronidis loco, præservationi ab hoc malo dicata, adjungenda erunt.

§. 2. Fontes ex qvibus hauriuntur remedia salutaria, pro his scopis sunt Chirurgicus, Pharmaceuticus, & Diæteticus; prior vel pauca vel nulla subministrat auxilia, pro nostro eqvidem affectu, mitioribus ferè succumbente, nec crudelem Chirurgi opem postulant; ob id ea, qvæ à Pharmaciâ ex tribus regnorum divitiis, & ex diæticâ fuggeruntur, in primis producemus: initium faciendo à causarum remotione, ut eo tutius postmodum ipse affectus dolorosus deleri possit.

§. 3. Si E. induratæ fæces obsefferint coli cellas, & qvæ sub hypochondrio sinistro sunt, angustias, optimum erit, eas primâ qvâ-

quaque occasione per consuetam portam inferiorem educere: Convenit tamen his præmittere emollientia, quibus humorum crassities attenuetur & diluatur, ac viarum impedimenta amoventur. Utrique scopo satisfaciunt, in primis clysmata, licet enim Helmont eorum usum ceu pudibundum & quod vix citra ruborem à Medico svaderi posse auxilium, rejiciat, tamen argumentis ejus non nihil satisfecit Hoffmann. opere de methodo medendi c. X. l. I. & quotidiana experientia ipsi aperte contradicit, quæ saluberrimum clysmatum usum creberrime ostendit, quem etiam ulterius sufficienter confirmat Mæbius in differt. eruditâ & eleganti de usu clysterum medico, cuius verba sunt: *Clysmata cunctis intestinorum ægritudinibus levamento sunt, s. calida s. frigida ad sit intemperies, eam corrigere poterunt;* & paulò inferius addit: *Ut autem alvus non à fæcibus exsiccatis tantum, sed etiam à flatibus induratur, ita & illis exterminandis & dissipandendis clysteres inseruent;* & rursus: *in affectu hypochondriaco scorbutico, mel' ancholiâ hypochondriacâ, febribusq; intermittentibus, ubi alvus ferè semper est adstricta, incredibilem ferunt fructum clysmata, s. molliendo s. purgandorem tractare velis &c.* Clyisma itaque tale pro usu emolliendi injecisse è re erit. R. Rad. alth. Rad. lil. albor. aa. ȝȝ. H. Malv. Summitat. melilot. aa. mii. coq. in s. q. ȝ hord. Colat. R. ȝ ix. add. bened. laxativ. ȝj. olei lili. or. albor. rapor. aa. ȝȝ. vitell. ovor. Num. j. M. pro Enemate: vel hujus loco lac vaccinum cum melle ȝ ali instar clysmatis injectum, & fæces emollit, & lubricando vias eductionem facilitat; Clyster etiam ex solo oleo lin. & rapor. aa. ȝ iv. aa ȝ v. injectus & ad tempus retentus, mirus est ad alvum à scybalis impetitam resolvendam; Clyster hic actui potest cum ȝȝ. vel ȝvj. olei diacolocynthid. Quercetan. Hinc namque ferè simili ratione alvum pertres hebdomades pertinaciter à fæcibus induratis obstructa, aliis omnibus irritis referavit Rulandus injectis singulis horis ȝ iv. olei olivar. unde emolitis post ȝ. horas scybalis, hisque præduriis copiosè rejectis æger est restitutus. Vid. Thesaurus Rulandi p. 233. Qvalem successum idem author cit. loco p. 236. per oleum lini ad ȝv. nunc solum, nunc cum ȝȝ. trochiscor. alhandal injectum, obtinuit. Qvod si tamen contumaciora stercora hæc & similia lenia non promoverint,

ad acriora pergendum, & clysmatis lenientibus Θis gemmæ ʒj. ad ʒij. permiscendum: hoc enim ex experientia luculentā *Foresti lib. 21. obs. 5.* scybala emollit, ac intestina ad eorum expulsionem irritat; ubi tamen observetur: omittenda tunc esse oleosa, & mucilaginosa ingredientia, ne his ipsis obtundantur aculei incidentes, emollientes & stimulantes Θis gemm. Qvod si v. neqve hæc sufficere, videantur, pulp. collocynt. in petiâ ligata istis incoqvenda est, v.g. Rx. flor. mellot. verbas. Chamomill. aa. mj. sem. lin. ʒ vj. pulp. colocynth. in petiâ ligat. ʒβ. ad ʒj. coq. in s. q. ▽ simpl. colatur. Rx. add. Electuar. laxat. ʒβ Θgemm. ʒj. M. F. Enema. Hisce Em-matis injiciendis, externa emollientia applicanda loco dolenti, aut fomenta ex sacculis emollientibus vulgo notis in lacte coctis, item alia decocta emollientia adhibita, suppetias ferunt, uti & oleis linimentis ac unguentis emollientibus, cum felle ȝ, aut ungvento v. g. de artanitâ, dialthæâ acuatis & hujusmodi aliis epomphalicis dictis, simul stimulantibus illitis, natura adjuvatur.

§. 4. Qvin & non incommodum erit, assumptis simul per os, emollientibus dura, aut lubricantibus intestina, scybala dolorifica loco suo sub hypochondrio sinistro deturbare. Usitatus hic est eus largior butyri, aut oleum amygdal. dulc. ab ʒj. ad ʒij. sive plures in juscule calido sumpti; qvo potentius adhuc & certioris effectus est oleum lini singularissimum hoc antipleuriticum, de qvo *Vid. Gabelchouer. C. 4. cur. 68.* qvo ub ʒj. ad ʒij. cum syrup. de jujub. vel violar. & aliquot gutt. olei destillat. anis. (ut hoc odor fastidiosus, illo verò sapor. nauseosus corrigatur) exhibito, mirè sol-vuntur ac abluuntur scybala dura, torminum Hypochondriacorum authores. Pertinet hūc mica pānis tosta, & oleo olivar. irro-rata manē deglutita, remedium à. *Borell. l. 2. obs. 14.* commendatum. Lactis qvoqve largior haustus aut qvod melius est serum (cujusvis Θosa intestinorum abstersiva mira hīc præstat) vel solum vel cum melle attemperatum assumpsisse conductit. Inprimis verò passulæ minores salutarem hic ferunt opem, sive pulpa earundem, sive decoctum cum stimulo ♀ eo assumatur, hoc namqve blandissimè al-vum subducendo fæces induratas hinc inde hærētes abstergit, emol-lit.

mollit atque lubricat, unde speratus vix fallet successus; Idque eò magis si uno alteroè blando laxativo acuetur eorum virtus. *Hypochondriacus* sanè, quibus ob induratas alimentorum scorias, sive ob acidum pancreatis austерum, nimis eas coagulans, s. ob pituitam acidam vitio digestionis stomachicæ prognatam, eas glutinoas reddentem, tantum non continuò obstructa est alvus, optimè conducunt passulata, quæ inter seqq. potio palmam obtinet & assular. min. 3 j. contund. in mortar. lapid. ad consistentiam pult. oq. in v simpl. It. iii. Colatur. fervent. tib. j. infund. fol. senn. s. tipitib. 3 iij. tremor. Fri 3 j. fl. violar. p. iij. stent in loco calido per noctem, mane filtretur D. S. Eröffnender Tranch. cuius haustus mediocris esidente stomacho assumendus, palato gratus & blandissimum *Hypochondriacus* laxativum existit, fæcesque induras aut viscidas ssvavissimè educit. Aut usurpetur pulpa passularum cremore & ΘFri subacta, & aliquot gran. extract. trochisc. lhand. acuata, quæ dat Electuar. non inconveniens ad scybala ssvater promovenda, & ibidem natos dolores Hypochondriacos fitendos. De passulis & prunis laxativis communiter notis, nil adlere placet.

§. 5. Juscula quoque & ex blandis emollientibus parata decocta quibusdā in usu sunt: quorum formulas præscribit *Barbett. prax. m. 73.75. It. Horstius C. 5. obs. 8.* Quibus emolliendo dura ac sensim lubricando intestina subducitur alvus. Sed his levioribus missis, si pertinacior fuerit induratarum fecum infarctus, ad sum vivum ceu sacram anchoram configendum erit; & propinari poterit ab 3j. ad 3b. & plures, pro ratione circumstantiarum; & sanè hujus permeans fluxibilitas, etiam impactissima stercora permeabit, & excernibilia reddet, quin & volvuli hinc oriundi metum omnino eximet; cuius felicem usum deprædicatum, vid. apud *Henr. ab Heer obs. 2. Fontan. conf. & respons. p. 35. Mænichen. obs. 6. ad cultr. anatom. Lyseri annexa.* Præ ceteris efficacia ejus ex seqq. patebit epist. ad B.D. Michaëlem à Celeberrimo Erbenio exarata, ad hunc vocor febricitantem, & pertinaci constipatione, variorum catharticorum fortissimorum enematum, per XI. dies ontentrice, ad brachia usque tumefactum. Fussi alvo applicari ex arte fol-

lem ferrarium, ut beneficio inflationis excrementa illa indurata & perusta febrili calore ab intestinis coherentibus liberarentur, sed irrito conatu. Unde ipsi propinavi lib. iij. & vivi, qvi mole suâ & mobilitate patientem inter deambulationes primùm, mox saltationes, denique ventionem curru über Pfaste und gebaute Acker alvo rebelli & morti imminentि eriperet; Sed omnis conatus fuit vanus. Lento processu suo & labore & us excrementa ita liquefecit ut nocte, ab assumpto & io, blande effluerent, dormiente nec advertente paciente, donec ex parte factus stratum ac cubiculum pollutum, atque ex & io à mensu microcosmico resoluto inargentatum videret: sine seqq. convulsioneibus.

§. 6. Qvod si v. non tam induratae feces, quam, qvod frequentissimè contingit, mucilago acida & austera parietibus coli inflexi adhærens, cruciatum hypochondriacorum terebrantium & contorquentium extiterit causa, (licet cum hæc flatus ut plurimum concurrant, de quibus inferius dicetur) hæc incidenda, attenuenda & per inferius guttur rejicienda venit. His usibus nunc injecta clysmata, nunc applicata fomenta & emplastra, nunc appropriata pharma propinata inserviunt. Clysmata itaque incidentia, & resolventia superius allegata; in primis ex & colocynthide; hic etiam erunt appropriatisima: item quæ fiunt ex jure pisorum cum saccharo, melle & & æ, nam & hæc eleganter detergunt mucilaginosas fordes viscidas: quibus ubi fortius agendum est, addit suam & benedictam Rulandus (loco cuius infusum vel decoctum vulgaris croci metallorum substitui potest) dum in desperatis ferè abdomini doloribus seqq. clysterem subinde repetendum, felici cum successu applicat. Rx. Juris pisorum ʒvij sacchari ʒβ. & benedict. nostri ʒij β. olei commun. ʒiv. Misce aa, & injice quavis horâ doloris re crudescens calidè. Confer. River. Cent. 1. obs. 67, & cent. 2. obs. 1 & cent. 3. obs. 22.

§. 7. Hisce succurrendum est externis emollientibus, & pituitam viscidam resolventibus: quæ inter excellunt gummata emplastri formâ loco dolenti, ac à pituitâ obsesto applicata; Gumi ammoniacum hic cæteris palmam præripit, unde & emplastrorum spleni tributorum, non minus quam ad tumores scirrhosos quoscum que, etiam scrophulas, applicandorū ferè existit basis: convenienter

er itaqve usurpatur *emplastrum spleneticum Aqvapendentis*, ex duabus artibus ammon. in F soluti, unâ succi nicotianæ, dimidiâ resinæ & herebinth. & succi ebulicum oleo de capparibus & q. s. ceræ mistis aratum; Item *emplastrum de cicutâ & ammoniaco Heurnii & Sennerti ad plenis scirrhos aliasq; obstrukções usitata, malaxanda cum oleo succini vel capparum.* Præ cæteris elegans est *emplastrum carminarium Sylvii*, qvod exhibit *praxeos* ipsius p. 169. ad liqvescendam & emolliendam viscidam hanc pituitam optimum: Alii tale emplastrum applicandum svadent. R . Gumm. ammon. in F solut. $\frac{3}{j}$. Tacamah. Emplastr. de mucilaginib. aa. $\frac{3}{\beta}$. Sal. armoniaci $\frac{3}{ij} \beta$. M. v . Emplastr. in formâ debitâ loco affecto imponendum. Ante v. orum applicationem, non incommodum fuerit præmittere inunctionem loci ab hâc pituitâ obsessi, cum oleo laurino, capparum, ll. albor. nicotian. cum oleo destillato laterino, vel ammoniaci, cœtido licet, permistis. Item adhiberi commodè poterit unguenum martiatum purgans, his ipsis oleis dilutum.

§. 8. Sed rarò sufficient externa, aut infusa clysmata, ut plurimum internis pituitam acidam s. austera detergenteribus, resolventibus ac evauantibus, simul succurrendum. Primatum denuò sic obtinent gummata vulgò nota, in specie ammoniac. undè etiam eodem paratæ pillulæ & potiones, ad corrigendam & detergendam hanc pituitam sunt optimæ; ita prostant pillulæ *Quercetina ex ammoniaco*, item lac ammoniac. *Bartoleti Encyclopæd. lib. s. culimo* paratum ex ammoniaco, cum F ex citri succo & ato; facit & huc spirit. ex gumm. ammoniaco cum virid. aer. & $\frac{1}{2}$ atus, admodum incisivus, penetrans, & resolutivus pituitæ viscidæ vitreæ. Ad ammoniaci vires proximè acedunt reliqua gummata vulgò nota: bdellium, tacamah. sagapen. opopan. myrrh. & mastich. &c. Ad evauandam v. pituitam istam viscidam, colocynthide & ex hac paratis extract. trochisc. alhand. ac aliis nullum præstantius datur, quemadmodum & seqq. hæc potiuncula, licet ingrata, expertissima tamen est in simili dolore à pituitâ vitreâ & ponticâ, tam in intestinis, quam in specie sub hypochondrio sinistro stabulante. R . menth. $\frac{3}{j}$. cinnam. $\frac{3}{\beta}$. gummi ammoniac. in F solut. scrup. j. ad

ʒ. ʒ. Fri. Φlat. scrup. β. ad gr. xv. scāmmon. rosat. Extr. trochifc. al-hand. aa. gr. ij. syrup. de pomis ʒ. M. F. potio, qvæ unā vice hau-sta x. s. xij. interdum ultrà xv. vices, viscosa & mucilaginosa, cum præsentaneo ægri levamine & doloris cessatione eduxit. Præ-ter hæc est & ♀ dulcis cum laxantibus propinatus, pituitæ vitreæ præstantissimum detergens, unde hujus optimum eradicativum non sine ratione has pillulas appellat *Deodatus in valetud. p. 246.* Ex. MP. cochiar. min. scrup. j. aqvilæ alb. dulcis gr. xvij. aut xx. olei anisi gutt. ij. M. F. pillul. pro unâ dosi. D. S. &c.

§. 9. Nec hic prætereunda sunt ♀ea, qvorum virtus pitui-tam hanc viscidam & acidam incidendi & detergendi manifesta-erit, si attendatur constare ♀rum primariò ex copioso acido subtili, qvod junctum est sufficente Θe volat. de naturâ alcalium, præter feculentias qvasdam terrestres cum pinguedine qvadam ♀eā inter-textas, ratione qvorum Θium experti usus est tremor ♀ri impri-mis cum sal. tartari junctim propinatus; similiter qvoqve condu-cit ♀rus Φlatus, sed non communi modo ex spiritu Φli sed ex ipso Φlo soluto modo *Tacheniano* paratus. *Vid. hujus clavis ad Hippocra-tem chym.* non minus qvam spiritus ♀ri volat. in primis v. ex fecibus vini prolicitus, beneq; rectificatus, aut qvi ex ♀ro cum Φ per Retort. tubulatam in Sp. vini propellitur, & post rectificatur, ac sa-porem & odorem perfectè urinosum volatilem acqvirit; spiritus carminativi nomine alias decantatus. Cui præferendus adhuc est spiritus volatilis, qvi ex ♀ro cum proprio alcali fermentato instar spiritus Θ*ci subtilis elaboratur, hi ipsi enim convenientissima sunt auxilia, ad corrigendum saudem acrem, ac consistentiam te-nacem pituitæ istius viscidæ. Horum ♀orum vires exaltari pos-sunt, si cum oleis aromaticis convenienter fuerint maritata, sic nam-qve potentius hanc ipsam mitigant & corrigunt, cum ipsa aroma-tica non sint ultima qvæ hanc pituitam alterent & inde orta mala corrigant; De qvibus cum jam occasione flatuum plura dicendi ansa suppedetur, ea vel innuisse sufficiat.

§. 10. Nam flatus sunt, qvi ut plurimum cum pituitâ viscidâ & acidâ juncti, dolores immensum augent, & varia simul abdomi-nis

s Symptomata inducunt: qvorum originem jam supra ex vitio-
fermentatione, ab acido peregrino in intestinorum muco viscido
eduximus. Compescunt E. optimè eorum vim & impetum aro-
matica, hisqve cognata alia de Θe volat. oleoso participantia,
mediante qvo & acidum fermentativum tanquam hujus contrarium
teratur & destruitur, oborta fermentatio tollitur, & mucilago vis-
da resolvitur. Usurpantur talia qvatenus nunc clysmatum formâ
funduntur, nunc unguentorum specie abdomini illinuntur, nunc
qvidorum modo propinantur. Simplicia carminantia naturæ aro-
maticæ, ordinaria clysterum horum ingredientia, in vulgus nota-
nt, sufficiat formulam (ut ex ungve Leonem) hic annexisse R. rad.
angelic. levistic. aa ʒβ. herb.chamomill.roman. Menth.aa m.i.bac-
r. lauri ʒj. juniper. ʒβ. sem.annif. carvi. aa zij. coqv. in s. q. ▽. sim-
ic. colat. R. ʒix. in qvibus dissolv. Electuar. de baccis lauri ʒj. mel.
utac. ʒβ. s. ʒvj. olei Σat. anif. fænicul. aa ʒβ. olei succini gutt.v.vi-
ll. ovor. Num. i. M. pro clysmate. Huic opem ferat loci dolentis
unctio, parata primariò ex oleis Σatis insigniter penetrantibus
cum nihil aliud sint qvam Θia volat. ab acido volat, subpingvi in
corpus oleosum concentrata) qvorum virtus exaltabitur ponendo
super lapidem probè calefactum: Parantur tales inunctiones ex
leo chamomill.anethin.castor.laurin.cortic. Σat.aurantior.carv.
amin.fænicul.anif.rut.Zedoar.Angelic.macis & similibus, modò
paratim modò conjunctim inungendis. Stöckeri experimentum
uit litus ex oleo laurin. ʒβ. cum ʒj. castorei paratus. Parari etiam
otestunguentum h. m. R. olei castor ʒj.olei stillat. angelic. cort. au-
rantior.cumin. anif. aa ʒβ. chamomil. sapphirin. ʒj. cum s. q. corpo-
ris probalfamo D.S. **Gålblein gegen die Blähung.** Pertinet huc
tiam Galbanetum Paracelsi, ut aliàs in colicis & iliacis doloribus
conveniens, ita & in nostris non minus egregium.

§. II. His associanda sunt debita interna & ipsa aromatica;
væ inter agmen ducunt sem. calida, dicta majora (Helmontio mi-
ora) scilicet anif. cumin. aneth. fænicul. carv. dauci &c. qvorum
por & odor aromaticus in oleo volat. fundatus, miras habet aci-
um vitiosum Gas flatuosi generativum, corrigendi & flatus inhi-

bendi dotes; cum præterèa singulariter intestinis stomachoqve sint amica & ob id intestinorum solamina recte ab *Helmont.* vocantur *Tr. de flatib. §. 75.* Non enim flatus discutiunt, qvod inimaginabile, qvi alias sponte modo viæ sint apertæ exitum qværunt, sed materiam undè flatus exsurgunt alterant & corrigunt, & istam fermentationem vitiosam sistunt, ac ita impediunt, qvo minus concretum materiale in flatus s. in Gas Spirituosum vertatur, id qvod etiam reliqua vulgò appellata carminantia & in genere qvæcunque aromatica præstant. Modus utendi est, ut in vino semina hæc propinentur, in qvo lenitè prius ebullierint, ad imitationem *Helmont.* Vel ut freqventibus cohobationibus Spirit. vini benè rectificatus earum virtute imprægnetur: aut qvod elegantius evadit remedium; Spirit. vini cum Θevolat. Θ * ci arcte conjunctus, ab iisdem saepius est abstrahendus, aut cum eorum & atis oleis conjungendus, sic enim egregium contra flatus habebitur remedium. Sed præter hæc semina & aromatum, in specie v. Galang. Zedoar. mac. caryoph. cardam. cubeb. virtus, in Θevolat. acriori, oleoso tamen, fundata, stomacho & intestinis flatibus infestatis potentes fert opes: Qvibus ex nostratis cognata & qs. occidentalia aromata sunt bacc. juniper. laur. cort pom. aurantior. chamomil. menth. angelic. cumin. salvia & sim. qvorum spiritus & essent. sic dictæ omnibus sufficienter cognitæ. Singulares inter has obtinet virtutes essent. chamomill. in specie roman. combinata cum rad. aromaticâ Zedoar. & cum Spiritu proprio parata, usurpanda à gutt. XX. ad XXX. Nec ultimo loco reticenda est, virtus amygdalar. amarar. qvæ artificiose præparatæ singularem planè vim carminantem obtinent. Hisce vegetabilibus animalium aromata addenda: e.g. castoreum & omnia ex eo parata, it. Zibeth. interno pariter ac externo usu commendatis simum & à Paracelso in *Colico* dolore umbilico inunctum; Qvibus & stercora animalium non minus interdum fragrantia specialiter v. eqvinum addo, qvod in flatulentis abdominis affectibus præsentissimam affert opem, undè pariter colicæ ac hystericæ passioni succurrit. Excreta hæc animalium manu nos ducunt ad Θ mirabile concretum Θnum, ex iis ut plurimum petens natales, & inter

carminantia vel maximè enitescens. Inprimis v. Spiritus ejus probè cum Spī-
ritu vegetabilium dulcificatus, & ab acore nimio temperatus hic convenit. Eli-
gendus v. pro hoc scopo erit spirit. vini ab aromaticis carminantibus cohobatus,
& horum partibus volatil. probè imprægnatus, cuius descriptionem egregiam
suggerit *Sylvius prax. p. 90.* hujus duplum cum Spirit. Θ part. i. junctum &
cohobando unitum, egregium subministrat spirit. carminantem. Non dissimili
ab hoc modo *Spiritus anticolonius B. Michaelis paratur*, qvo excellentius pro
hoc malo eradicando non datur.

§. 12. Et hac ferè ratione causæ tolluntur, qvibus extirpatis cessare etiam
atqve evanescere solet, ipsa dolorifica passio. Verum si tormentosa hujs subinde
recurrant vestigia, aut si mox in principio talis sit vehementiæ, ut aliis præter-
missis huic ceu primariò urgenti occurrentum sit, sui remotionem innuit per
anodyna & narcotica usurpanda, qvæ inter papaverina emicant remedia, ho-
rumqve princeps opium, in primis si in laudatissimum exaltatum fuerit lauda-
num, cuius saluberrima usurpatio, omnes dolores ex spasmodicis intestinorum
convulsionibus obortos à qvâcunqve hi excitentur causâ occasionali exoptatò
sedabit. In primis si cum aptis specificis combinetur, in specie qvidem cum se-
minibus istis calidis supra laudatis, aut inde elicitis remediis, aut cum castoreatis
medicaminibus, qvæ singulari virtute convulsivos intestinorum motus, indeq;
natos dolores sedant & quietant. Laudanum commendavi opiatum, s. istud
qvod ex correcto hoc paratur; Cujus correctiones omnes superat qvæ fit per fer-
mentationem cum succo cydoniorum videnda *in epist. 45. Cent. 3. Bartolin.*
Eandem etiam cum succo pomorum Borstorffiorum instituere *Dn. Praeses in-*
more positum habet. Juxta hanc est optima ea, qvæ per alcalia fixa, primariò
qvidem Fe_3 hinc Θ i, per Fe_2 vegetabile carbonum præparat. instituitur. Qvibus
modis paratum opium tutum ac omni laude majus evadit remedium, qvod
ipsum etiam pro circumstantiarum urgentiæ cum purgantibus propinari pot-
est, præunte nobis non tantum *Rbumelio* in compositione pillular. antipoda-
gricarum, qvas ob laudanum admistum vocat, *Veni Amice surge & ambula :*
jatreo chym. p. 725. Sed etiam *Stöcker.* qui in *prax. cap. 36. p. 197.* ceu expertas in-
signiter ad colicum dolorem commendat has pillul. Rx. aloës succotr. vel pil-
lul. aleophangin. 3j. s. scrup. jv. opij, croci, aa. gr. i. vel 2. M. F. pillulæ jejuno
stomacho exhibendæ, qvas I. dolorem lenire, hinc etiam blandè evacuare afferit,
cum speratâ denuò salute. *Confer. River. C. 1. obs. 63. & C. 2. obs. 1. Poter. 3. c.*
27. &c. His & similibus internè usurpatis, nullum dubium est, qvin cessaturus
sit dolor; Nec minus hos sedat opium cum Clysmatisano injectum à gr. iij. ad
x. mistum, sed caute & ultrà qvam dosin vix ascendendum *Vid. Borell. C. 4.*
obs. 92.

§. 13. Hęc sunt remedia ex fonte Pharmaceutico contrā dolorem *hypochondriacum* desumpta; Diæticum qvod attinet fontem, hic circa 6. res non naturales dictas, medias inter statum sanitatis & ægritudinum, & vel ad hunc vel ad illum pro varietate circumstantiarum disponentes, primariò versatur. Eminet inter has aer, qvi vitetur frigidus, moderate verò calidus eligatur. Ab hoc sunt *assumpta*, ex qvibus respuenda sunt crassa, viscida, dura, & cruda, ut carnes sumo induratae, aut conditæ copioso Θe comm. qvia scilicet proprio Θe volatili sunt exutæ, difficilis coctionis, parcí nutrimenti, ac copiosi & vitiosi excrementi, hinc pisces, castaneæ, cydon. pyrus, &c. it. qvæcunqve astringentia, & fructus horœi, qvia hi fermentando facile acescunt, & copiosas flatulentias producunt. Nocet etiam si qvod aliud, vinum largius haustum, nam aciditate suâ volat. extrà stomachum toti corpori pestiferâ, intestinis tormina colica, artibus v. paræses inducit: Lactis usus est suspectus, ex eodem verò, separatâ parte caseosâ & butyros à, emergit serum, medicina, *malo hypochondriaco* non inconveniens, videlicet, qvatenus abundat Θe volat. Ofo de naturâ armoniacali & ita sordes primarum viarum abstergit, simulqve alvum blandè stimulat; Convenit etiam aromatuni usus omniaqve aromatïca: it. allium & alliata, cepaceaqz. colicæ ex mucilagine acida & inde productis flatibus sunt remedia. Capparum esus est optimus, cum detergent & incident sordes mucilaginosas. Panis seligendus est benè fermentatus huic enim; & in primis secalino; inest spirit, acidus volat. stomacho amicus, qvia qvodammodo ejus fermento est homogeneus; qvâ ratione coctionem reliqvorum ciborum multorum adjuvat. Condimenta ex sinapi utiliter adhibentur, item pruna & hinc decocta Potus sit cerevisia probè fermentata, non triticea, qvæ sèpius est crassa hinc fermentativa & consequenter flatulenta, non recens, non acida. Vinum absinth, & heleniatum conductit, si malum non sit ab induratis fæcibus. *Somnus* moderatus ut dolorem lenit, ita qvies egregiè ejus exasperationem prohibet. *Motus* nimius in lecto & jactatio inquieta dolorem exasperat, ac violentâ corporis contorsione abdominis qve compressione, mutuum intestinalium in se invicem ingressum, ac tandem ileum inferre potest demonstrante hoc Cl. Sylvio prax. Cap. 15 §. 19. *Altus*, quantum fieri poterit, servetur aperta, eadem obstructa arte provocetur. Vomitus hic est utilissimus, eumqve singulis mensibus semel provocandum esse, vel op timè monet *Langvius lib. 1. ep. 30.* id qvod in primis vitam sedentariam agentibus dictum esto. Deniqve ne malum hoc exasperetur cum vehementiores animi affectus, tum præcipue ira, viperino sangvine pejus est vitanda.