

**Disputatio medica de oedematis natura & cura ... / respondentे Carolo
Friderico Luthero.**

Contributors

Luther, Carl Friedrich, 1663-1744.
Pauli, Johann Wilhelm, 1658-1723.
Universität Leipzig (1409-1953)

Publication/Creation

Lipsiae : Literis Johannis Georgii, [1685]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/c5jsuy99>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

Q. D. B. V.

DISPUTATIO MEDICA

De

OEDEMATIS
NATURA & CURA,

Qvam

Gratiostiss. Facultate Medica

Indulgente

Pro

L O C O

In Eâdem suô tempore ob-
tinêndô

Ad diem 5. Jun. A. C. M. DC. LXXXV.

Publicè ventilandam sistit

JOH. GUILIELMUS PAULI

Lipſ. Phil. & Med. Doct.

RESPONDENTE

CAROLO FRIDERICO LUTHERO,

Vrat. Siles.

H. L. Q. C.

LIPSIÆ.

Literis JOHANNIS GEORGI.

London 2. May 1801

B. C. D.

PRAELOQUIUM.



VI Humorum in Corpore nostrò vivente absolvitur Circulus, obeundis rite partium solidarum actionibus adeò reqviritur necessarius, ut statim ac ille qvocunq;e turbatur modò, varia in his læsionum exsurgent genera. Qvotidiè hoc in morbis observare est internis non minùs ac externis, ceu in qvorum plerisq;e Humorum Motus aut primariò, aut secundariò ad minimum, existit vitiatus. Sic etiamsi v. g. Catarrhi ab irritante qvôdam proximè inferantur, subsequentis nihilo minùs fibrillarum crispaturæ occasione mox ab impedito lymphæ concomitantur motu. Sed qvò vitium tale magis, primarium in medium afferatur, exempli loco è Tumorum nonnullis (Humoralibus qvoq;e propterea appellatis, qvod eosdem humor qvidam stagnans, i. e. in motu suô impeditus, tanq;am Causa Materialis proxima constituat) unicum denominâsse Oedema sufficiat, Disputatione præsenti sub duplici capite pluribus ita ventilandum, ut in primô Theoreticô Natura, in alterô verò Practicô ejusdem Cura cuvis patescat.

Faxit DEUS Opt. Max. Feliciter!

Caput I. THEORETICUM.

§. 1.

Quānam Oedema suā intuitu originis, quam Græciā ἀπό τοῖς οἰδεῖν, i. e. tumere seu inflari debet, Tumorem quemvis in genere morbosum Hippocrati significet, temporis nihilominus successu' apud Medicos obtinuit & adhuc obtinet usus, ut specialem magis ac partialem in corpore nostro Extuberantiam præternaturalem exprimat sequenti circumscriptam definitione: *Tumor est Humoralis, albicans, mollis digitisq; ita cedens ut horum vestigia retineat aliquamdiu impressa, calore nullo, nec dolore, aut saltem paulisper tensivō, molestus, in cute alicubi ac partibus subcutaneis à crassioribus seri moleculis intraporos istarum nimium coacervatis excitatus.*

§. 2.

Generis hic proximi locum Humoralis sibi vindicat Tumor, eò, quod cœdematosa extuberatio talem in parte quādam corporis auctam designet magnitudinem, ad cujus post partum productionem Humor proximè facit, non Flatus, nec solidioris alicujus partis in alteram Decubitus, nec Res etiam quædam totò genere præter naturam, aliis alias tumorum speciebus progenerandis, v. g. Tympaniti, Herniis variis, diversis Luxationibus, it. tumoribus calculosis, pilosis, verminosis &c. inservientes, à quibus Oedema tamen per datum oppidò discrepat genus, velut iis solummodo Extumescentiis, quas humor pariter quidam procreat, commune, e. g. Inflammationi, Erysipeli, Scirro &c.

§. 3.

Specificam verò Differentiam Oedemati, quâ ab humoralibus etiam istis discernatur tumoribus, conciliant: primò Qualitates quatuor in cœdemate sensibiles, instar proprietatum ipsi essentialium se. se habentes; deinde Subjectum, ac Causa deniq; Continens; quæ singula quidem nunc eodem quoque ordine essent enucleanda, sed cùm scrutinium essentialium cœdemati adjunctorum, subjecti ejusdem ac causæ supponat præcognitionem, ab horum potius perlustratione initium licebit desumere.

§. 4.

S. 4.

Subjectum equidem Oedematis in genere spectatum occurrit duplex : *invasionis* alterum, alterum *radicationis*; quorum tamen illud solum, quia adaequatum, in definitione expressum, hoc vero in §. 9. etiam denominandum. *Invasionis* scilicet subjectum, seu pars in oedemate affecta adaequata, Cutis partesque existunt subcutaneae: ita quidem, ut in Cute tertiam cum primis ejus laminam, praeter omnis generis vascula ex tendineis fibris glandulisque interspersis contextam ac recentissime a Bidloo *Anatom. Corpor. Human.* Tab. 4. per opticum instrumentum nitide depictam, affici statuam; è subcutaneis vero partibus, pinguedinem musculosque, tam subcutaneos, quam alios nat' εζοχην' sic dictos cum membranis suis pati eò lubentius existimem, quod Excell. Dn. Meibomium Helmstadii in Dissertatione quâdam de Tumoribus pedum sub Umbone Ejus A. 79. habitâ, sectionis ope deprehendisse videam, humorem in pedibus oedematosum non sub cute tantum, sed & sub membrana muscularum, & in ipsis quoque musculis, solito laxioribus, habere sedem.

S. 5.

Sed dubium exemplò hic sese sistit, annon internæ quoque corporis partes ab oedemato interdum affligantur tumore? & ut verum fatear, non adeò aberrare videtur Fabricius ab Aquapendente in partibus internis ac externis oedemata oriri *Oper. Chirurg.* p. m. 32. scribens; etenim quamvis rariores hic, si ullæ, Autorum oedemata interna enarrantium prostent observationes, probè tamen si consideretur, constitutionem scirrhosam, quæ interna saepius vexat viscera, æque à sero ac oedema, magis saltem coagulato proficisci, vix absonum erit suspicari fortassis oedematosam internè aliquandò prius subesse habitudinem, quam perfectus ibi gignatur scirrus: nihilominus cum interna talia oedemata omnem Medici eludant explorationem, in tradendo oedematis subjecto ad externum malum respicere tanquam tale, de quô Medici & Chirurgi unicè ferè solent disquirere. Interim si quod subjectum oedemati utrique communem à me veniret exhibendum, illud commode per fibrosas simpliciter & glandulosas partes ubivis describerem obvias,

§. 6.

De cætero cutim ac partes subcutaneas magis, quam alias partes esse commodas, ut ab œdematoso occupentur tumore, præter Autopsiam modò §. 4. confirmatam, ipsa earundem apta conformatio aptusque satis persuadent situs: Cum enim hujus respectu incumbentis Atmosphæræ attractui quandoque satis injurioso maximè sint expositæ, ratione autem illius à minoribus longè irrigentur arteriolis, quām quarum interdum pulsus lymphæ ad vascula sua crystallina urgenda ac protrudenda sufficiat, utroque sanè modò facilius hīc, quam alibi lymphæ refluxui objici remoram & per consequens œdema introduci elucescit,

§. 7.

Quinimò ex consideratō partium situ clarum quoque evadit, cur pedibus præ partibus aliis œdemati frequentius sint obnoxii, adeò, ut nonnulli statim ac erectam corporis posituram plus debitō continuant noctisque præsertim tempore sedentes somnum capiunt, pedum ejusmodi incurvant tumores. Supposito enim, ceu verissimè à *Borello de Mot. Animal. Part. 2. Cap. 5.* monstratō, magnam Cordis musculosi pro sangvinis pulsu requiri virtutem ad eam, quæ in vasis jam dum propter sunginem ibi existentem deprehenditur, exsuperandam renitentiam. Quod si itaque quacunque ex causâ hanc cordis quodammodo vim contingat immuni, prout somni etiam tempore accidit, ratione duplicitis effectus, qui sangvinis quoad motum in verticali corporis situ sequi ferè debet, dum primò quidem sangvis arteriosus propriò haud difficulter pondere inferiora versus ruit, dein tamē venosus propter eandem gravitatem difficiliter longè ascendit, perquam promta seri crassioris intra pedum poros habebitur collectio, i. e. tumor formaliter œdematosus,

§. 8.

In eō quippe consistit ratio, quā subjectum œdematis in genere afficitur, ut pori ejus sive interstitia, vel fibras inter, vel glandulas relicta, à continente plus debitō distendantur causâ, undē ad proportionem, quā hæc ibi coacervatur, tumor ipse œdematosus vel major evadit, vel minor. Minus proin necessè est, ut in omni semper Oedemate Cutis æque ac omnes partes subcutaneæ simul patian-

patientur, cum sola nonnunquam cutis, ubi Oedema non adeò profundum affligit, nec nimis diffusum, videatur sufficere. Neq; frustra in definitione pars affecta particulâ alicubi fuit limitata, qvia si cutis secundum totam, aut saltem maximam sui peripheriam in mollem ejusmodi elevetur extuberantiam non Oedema amplius, sed Leucophlegmatia potius salutatur Practicis.

§. 9.

Radicationis autem *subjectum*, seu ea affecta pars, in quâ antecedens Oedematis causa velut delitescit sopita ipsa videtur *Massa sanguinea*, unicus ille in corpore nostô Humor universalis, qui à cordis impulsu ad omnes corporis viventis partes tam internas quam externas, continuò vibratus hisce illaudabiles pariter, si adsint, ac laudabiles simul adportat particulas, in tumore nostrô ita constitutus, ut serosæ ejus massulæ vel plus justò abundant, vel præternaturali etiam plus minus viscidâ gaudeant crassitie, è causis quemadmodum mox evolvendis uberius constabit.

§. 10

In definitione siquidem proxima & continens causa crassiores serî subinnuntur moleculæ intra partis affectæ poros nimium coacervatæ, sive crassities ejusmodi his naturalis magis fuerit, sive præternaturalis. Est videlicet serum altera integralis Massæ Sanguineæ pars, in quam & cruorem hæc sibi relicta spontè sua, vel in tubulis vitreis setâ haud crassioribus annotante *Antoniô de Heide Anatom.* *Mytul. p. 175.* facescit, ratione texturæ suæ ex particulis magnitudinè ac figurâ differentibus, sensibiliter sub aquâ & gelatina comprehensis, conflata. Candelæ enim ardoris flammæ in cochleari expositum serum aqueam exhalare portionem, gelatinosam verò servare restitatem, notissimum. Jam uti serî crassitiem naturalem eam dico, quam particulis suis gelatinosis benè se habentibus, decentique sub proportione aqueæ parti combinatis, refert acceptam; ita ex opposito præternaturem ejus crassitiem voco istam, quam à particulis chyli crudioribus plus minus pituitosis ac viscidis, digestionis primæ culpa enatis, adipiscitur. Quibusunque itaque ex crassioribus his serî moleculis, sive naturalibus sive præternaturalibus, in partium externalium poris stagnare ac modò successivè, modò repente coacervari ibi datum est, continens tumoris cœdematosi

matosi eo ipso evadunt causa, quod nimium coacervatae totam loci affecti dimensionem reddant audiorem.

§. 11.

Cognita hucusq; continente oedematis causâ, serum idem in vasis adhuc fluctuans causa antecedentis habebit rationem tantò magis, quantò vel copia ejus adest major, vel consistentia crassior. Sicut namque alias ea seri ad cruorem in corpore nostro est proportio, ut hujus quantitas decies ad minimum ab illô. Excell. nostrê D. D. Bobnio Act. Erud. Lips. A. 1682. p. 127. accurate ostendente, excedatur; ita si pondus hoc, respectu vel ad rubicundam sanguinis partem, vel totum etiam corpus habito, notabile sui capiat incrementum, serum tunc gelatinæ suæ simul auctæ intuitu efformando cedemati admodum redditur dispositum. Nihilominus præter hanc seri quantitatem, & consistentiam ejus præternaturaliter crassorem cedemati producendo sufficere, Cachectici pituitosi, Senes ac Mulieres, suo quotidie testantur exemplo, utpote qui fere ratione crassioris seri frequentius quam alii, tumoribus ejusmodi deprehenduntur succumbere.

§. 12.

Causæ autem Procatarctice omnes, moventes serum, quò continens Oedematis exsurgat causa, in genere quidem seri adjuvant stagnationem, attamen in specie earum aliæ in vasa magis, aliæ in locum affectum, aliæ denique immediate in serum ipsum suas exerunt operationes. Primum in vasa, serum à partibus revehentia, tam venosa quam lymphatica operantur cuncta, quæ ab extra ista comprimunt, comprimendoque efficiunt, ut serum vel ultrà pergere impotens vel vasa quoque lymphatica disrumpens, in poris copiosè detineatur partium, v. g. Uterus ingavidatus tali vasorum compressione ultimis gestationis mensibus cedematosos in gravidis inferens pedes. Huc itidem spectare videntur luxationes &c. cedematosis interdum extuberantiis, Autore Richardo Wiseman in the seyerall Chirurgicall Treatises p. 81. pariter ansam suppedantes.

§. 13.

Deinde in locum hic affectum Causæ occasionales agunt ex, quæ vel fibras ejus stringere, vel laxare valent: priori enim modò serum partis interstitiūs velut infigitur, posteriori vero fibræ partculis

eulis serosis ad vascula sua propellendis redduntur ineptæ. Illud contingit maximè in doloribus, v.g. podagræ dictæ vulgò frigidæ, it. vulnerum &c. hoc autem in Inflammationibus, Contusionibus &c. quando his cœdemata nonnunquam succedunt, evenire videtur; quinimò à tali fibrarum laxitate petenda ratio, cur eadem loca, quæ semel cœdema fuerunt passa, levi data occasione denuò ab hōc affligantur.

§. 14.

Tandem immediate afficiunt serum occasionses, quæcunque hujs vel abundantia, vel crassitie præbent ansam, sive sex rerum nonnaturalium, sive præternaturalium accensendæ veniant classi. Sic rebus nonnaturalibus admunerantur: primò Aer humidior & frigidior, quorum ille seri non saltem quodammodo adauget copiam, sed & consistentiam ejus magis inspiiat unà cum frigidiori habitum quoque corporis multùm vellicante. Hinc Alimenta solida atque ac fluida, vel in nimiâ assumpta copiâ, vel crassiora etiam, viscida & acida &c. deglutita. Tùm Quietis ac Somni excessus, humorum retardandò circulum crassitiem sero præternaturalem inducens. Porro Excreta & Retenta, v.g. Urinæ in renib. is secretio imminuta, it. in mulieribus menstrua suppressa. Ex Animi denique Affectibus Tristitia imprimis, Timor ac Terror &c. qui singuli figurendò spiritus humores in motu magis lentoſ & in crassi plus minùs crassos efficiunt.

§. 15.

Inter res autem præternaturales agmen quasi dicit depravata alimentorum in Ventriculo digestio talis, quæ ad pituitosam, vel acidam quoq; dictam vergit cruditatem, Cacochymia pituitosæ, à quâ Cachexia similis hic pariter consideranda, mater genuina. Hinc Phthisis diuturnior adest, pulmonum exulceratorum occasione variis heterogeneitatibus inquinans serum. Febres demùm tam acutæ, quam chronicæ se offerunt, crassi Mæ Sæ ita turbantes, ut curas easdem cœdematosi nonnunquam crurum sequantur tumores, idq; eò facilius, quò liberius ægrì convalescentes suo denuò indulgent genio &c.

§. 16.

Perlustratis ita hactenus subjecto cœdematis atque causis, ad

quatuor adjuncta ipsi essentialia, cognitum nunc faciliora, reverti licet : horum primum albicans est color a sero ipso crassiori in tertia cutis laminâ contento, partim ratione proprii coloris, partim & ratione impediti sanguinis versus corpus cutis reticulare influxus, conciliatus. Alterum mollities determinata cernitur, talis videlicet, quae digitis & cedit, & horum vestigia aliquamdiu ostendit impressa, antequam ad pristinum redeat seu resiliat statum, à crassioribus partiter seri exorta particulis debiliori instructis elatere, quam ut è momento quasi priorem reassumere queant locum. Tertium calor is (sub intellige p. n. potius quam naturalis, licet & hic imminutus sit) habetur absentia ex eō, quod partium in cedemate sensibilis deficit irritatio, spirituum ac sanguinis uberiorem ad partem affluxum, à quō in Inflammatione alias & Erysipelite p. n. dependet calor, determinans. Quartò denique dolor observatur nullus ob eandem irritationem absentein, in vellicatione quippe potius, quam in solutione continui, consistere doloris essentiam sufficienter demonstrat Borellus de Motu Animal. Part. 2. Cap. 18. Aut si exilis nonnunquam combinetur dolor, tensivus saltem is est à sero poros replente ac fibras non nisi pondere vellicante enatus.

§ 17.

Differentiae Oedematis pauciores considerari merentur : Primo ratione magnitudinis, quā cœdema in loco affecto se extendet, aliud circumscriptum est, quod minus occupat spatiū ; aliud diffusum, quod per majus sub tumoris cœdematosi diffunditur nomine. Hinc originis intuitu, Oedema vel primarium existit, vel secundarium : quorum illud aliud non àque morbum sequitur, ac hoc, quod ab aliò dependet, v.g. Phthisi, Hydrope &c. Tùm respectu temporis, Oedema recens aliud, aliud inveteratum occurrit. His demum Autorum nonnulli v. g. Barbette Chirurg. p. m. 99. aliud discrimin adiungit à qualitate causæ petitum, quō Oedema aut perfectum aut imperfectum, & hoc rursus vel phlegmonodes, vel erysipelodes, vel scirrhodes esse, pronunciant : verum cum cœdema ipsis imperfectum dictum sub definitione verâ haud comprehendatur, differentia ista negligenda potius esse videtur, quam pluribus enodanda.

In *Signorum Diagnosticorum* censum venientibus ipsis sensibilius cœdematis qualitatibus §. 16. evolutis, non est, cur ad *Prognostin* pergere cessem. *Ratione eventū*: Oedema aliud periculosest, aliud periculō vacat: periculosest, quod à periculosò dependet morbō, v. g. hydrope, phthisi &c. periculō autem vacat id, quod primarium est, aut saltem secundarium tale, morbum quod minūs periculosest insequitur, v. g. Luxationes, vulnera &c. In genere alias cœdema recens facilius sui admittit Curationem, quam inveteratum, ceu eandem sāpius penitus eludens. *Ratione temporis*: Oedema diu satis, tanquam morbus chronicus, perdurare solet, ita ut, si minūs resolvatur, *Guillemeau aux Oevres de Chirurgie* p. 535. quinquaginta definiat dies, antequam suppuretur, *Ratione* quippe modi eventū, hic, modò cœdema sit legitimum, per resolutionem semper contingere observatur: ubi verò in imperfectum forsan degeneret, v. g. phlegmonodes, vix nisi per suppurationem terminatur. Si deniq; durum ac dolorosum evadat cœdema mctum subesse, ne in Scirrum transmigret, indicat *VVijeman loc. cit.*

Caput II. PRACTICUM.

IN Oedematis Curatione circumspiciendum ante omnia, an primarium hoc fuerit, an secundarium; secundarium enim si affligat, omnis in ejus remotione conatus, nisi & ipse morbus primarius removeatur, erit frustraneus. Pro primariō autem feliciter extirpandō triplici *Indicationi* in genere, *Curatoria* scilicet, *Præservatoria* ac *Vitali* venit satisfaciendum. In *Curatoriā*, quæ causam continentem respicit, adeoque circa tumorem ipsum auferendum versatur, crassiores seri particulas in partis affectæ poris coacervatas esse tollendas, præcipitur.

Duplex autem deprehenditur via, quâ ejusmodi amotio suscipi potest, ordinaria alia, alia extraordinaria. Per viam ordinariam

riam serum stagnans removetur admovendo ea, quæ decentem ipsi, quò vasa denuò sua revehentia subintrare suumque ibi circumlum repetere possit, conciliant fluxibilitatem. Diaphoretica præter interna mox § 8. depromenda, præstant hoc imprimis Topica extrinsecus tumorī applicita, talia videlicet, quæ ratione substantiæ salinæ plus minus acris, quæ pollut, dum stagnantes serì moleculas crassiores comminuunt, comminuendōque veluti resolvunt, Discutientia plerumque audiunt.

§. 3.

Discutientia ejusmodi Pharmacia suggestit varia sub consistentiâ vel humidâ, vel siccâ, vel mediâ denique, in usum trahenda. Humida quæ adhibentur sunt primò variorum Simplicium, e. g. Rad. Bryon. Helen. Herb. Absinth. Rorismar. Puleg. Origan. Hyssop. Lupul. Fl. Chamamill. Hyper. Bacc. Laur. Juniper. &c. aut cum ∇ simpl. aut c. vino parata Decocta, calidè loco affecto, vel lotionis, vel fomenti vice, prout commodum magis videbitur, applicanda. Hinc olea habentur & Balsama, v. g. oleum laurin. cer. mastichin. &c. Balsam. Peruvian. it. Balsam. ♀ tam vulgaris, quam ♂. à Collectaneis Chymicis Leidensibus t. 31. descriptum. Omnibus tamen hisce paria tandem, si non superiora, ex fluidis observantur lixivia cum calce vivâ, Θe ♀, it. cineribus vitis, quercus, fagi &c. ad imitationem Plateri Prax. tom. 3. p. 297. confecta, aliquali Sp. V. additione magis nobilitanda.

§. 4.

Sicca verò sub fomentorum siccorum titulo in auxilium vocantur tām Vegetabilia, modò §. 3. recensita, quam animalium quorundam stercore, e. g. bovin. ovill. columb. &c. ita quidem, ut vel immediate admoveantur cuti, vel sacculo priùs inclusa. Fatendum tamen operationes ejusmodi siccorum medicaminum, convenienti quia fluido, cum quo magis penetrare queant, destituuntur, vix adeò notabiles esse posse, nisi sacci forsitan eum saltem in finem usurpentur, ut calidi emplastris v. g. superimpositi horum caloris ratione promoveant aetivitatem.

§. 5.

Convenientius proin eadem ingredientia l. a. in Cataplasmatis rediguntur consistentiam; Cataplasma enim sunt & Emplastra, quæ

quæ mediâ demùm humida inter & sicca fruuntur texturâ. Ex Emplastis autem proficua sunt : Emplast. Oxyroc. Dia Δ . Diaphoret. Minsicht. ad Hydrop. August. de Galban. Crocat. Mins. &c. oleo præsertim si quodam v. g. ♀. lign. quajac. laurin. &c. antea fuerint malaxata. Ordinariò equidem Discutientia hucusque descripta in principio ac incremento cœdematis cum Repellentibus dictis jubentur jungi, verùm, cùm sola Discutientia illo quoque tempore proposito exactè respondeant scopo, Repellentia penitus omittere placuit. Interim quò Topica ipsa externa operentur citius, non inconsultum erit convenientes ipsis, si affecta ferat pars, defuper applicare Deligationes, & comprimendo, & calorem partis intendendo adeò præstantes, ut *VVifeman in the severall Chirurgicall Treatises.* p. 83. absque his nil magni momenti in tumorum pituitosorum curatione posse perfici pronunciet proptereaque tibalia, manicas, & Chirothecas, quæ de die in diem stringantur firmius, commendet.

§. 6.

Sed per extraordinariam magis viam serum educitur tunc; quando medicamina modò lustrata & adhibita faustus effectus excipit nullus : tunc enim è Chirurgia Scarificationes in subsidium ducendæ exque, cùm serum educendum crassius, κατὰ συρμὸν potius seu per tractum & cæsim, quam κατὰ πληγὴν s. verberatim & punctim, instituendæ; attendendo unâ, an Oedema superficiale magis fuerit, an profundum, quò incisuræ patiter vel superficialiter, vel profundè infligantur cuti.

§. 7.

In Præservatoriâ porrò Indicatione, quæ circa Antecedentem causam occupata est, & mox unâcum Curatoriâ hic consulenda, Serum vel abundans imminuendum, vel crassius incidendum atque eliminandum esse, Ventriculi it. digestioni plus minus læsæ succurrendum, ostenditur. Ut itaque seri, si adsit, tollatur copia, Evacuantia universalia, speciatim Cathartica, Diaphoretica & Diuretica conducunt. Ex Catharticis inserviunt ea, quæ Phlegmagoga & Hydragoga vulgo nuncupantur : nempe è Vegetabilibus Rad. Jallapp. Bryon. Herb. Soldanell. Asar. Pulp. Colocynth. Sem. Cartham. Agaricus, Gumm. *c. de Peru &c. Ex Mineralibus verò dulcis præstò est, it. Pilul. *Lares à Dn. Boyle of the Usefulness of natural*

*Philosophy Tom. 2. p. 110. adeò laudata & p. 308. descriptæ : quibus
ꝝ. vit. quoque poterit addi. c. dupl. vel tripl. Ⓛi prius fixatus ad
eum modum, quem *Carol. de Maetz in Prodrom. Chym. Ration.*
*p. 28. edocet.**

§. 8.

Diaphoretica verò inter ea seligenda veniunt, quæ naturæ sunt
ꝝinæ volat. simplicia non minùs, quam præparata, v.g. Rad. An-
gel. Chin. Card. bened. Helen. Sarsapar. Levist. Herb. Fumar. Salv.
Rut. Card. bened. Origan. Rorismar. Thym. Lign. Sassafr. Junip. Gu-
jac. &c. Sp. Ⓛ * c. simpl. & aromatisatus, e.g. anisat. caryophyll. &c.
it. Sp. & Ⓛ vol. C.C. sangvin. hum. &c. quæ singula serum crassius & cū
incidendo ac abundans per diaphoresin ejiciendo non absque suc-
cessu operantur.

§. 9.

Quinimò pleraque ex hisce diaphoreticis, si neglectâ sudoris
curâ usurpantur, egregiâ serum abundans per utinam evacuandi
pollent virtute; quibus nihilominùs diureticum in scopum adjici
adhuc poterunt ea omnia, quæ alias in Hydrope diuresin ciere lau-
dantur: v.g. ex Simplicibus Rad. Bardan. Rusc. Fœnicul. Asparag.
Gramin. Herb. Fœnicul. Ap. Aneth. Petroselin. Bacc. Juniper. Fru-
ctus Alkekeng. Sem. Dauc. &c. ex præparatis verò Spiritus aperitiv.
Penot. Sp. Ⓛ & Ⓛ præsertim Sp. V. ritè dulcificati, it. Sp. mileped.
ꝝ volat. succin. Ⓛ genist. stipid. fabar. &c.

§. 10.

An V. Sonem autem Evacuantibus recensitis semper præmitte-
re sit consultum, jure meritòque hæreo. *Thevenin* equidem *des Tu-
meurs p.m. 250.* magnum sangvinis missioni etiam repetitæ in nostrō
affectu attribuit effectum; ast, cùm rationes ejus tanti haud videan-
tur momenti, quæ indifferentem V. Sonis hic usum nobis, infrigidiori
præprimis climate viventibus, valeant persuadere, vereor ne Au-
tor sibi, tanquam Chirурgo, magis forsan, quam ægroto genero-
so tali consulat remedio. Quod enim aliquā sangvinis parte de-
tractâ calorem naturalem facilius per vasa distribui dicitat, vix nisi
plethora præsente habet locum, adeoque & V. Sonem tunc saltem,
quando Plethora juncta maximè urget, instituere convenit.

§. 11.

§. 11.

Hinc quò serum crassius comminuatur, partim Θsa, v.g.
Θ*c. ♀. Plat. Crystall. ♀. Arcan.duplic.it.liquor terræ fol. ♀ &c.
partim Θino. ♀ea, e.g Rad Ari. Gentian. Imperat. Herb. Menth.
Cinam. Caryophyll. Zingib. Piper. Essent. absinth. centaur. min.&c.
it. Tinct. ♀. simpl. & composit. &c. sive sola, sive invicem commista
usurpentur, multum præbent præsidii. Salsa quippe remedia, præ-
terquam quod pituitosas in primis viis cruditates serumque in Mâ
Mæ Sâ crassius attenuent, & hoc commodi præstant, ut comminutas unâ
Mæ Sæ. particulas easque inutiles ac è corpore proscribendas per di-
uresin blandè eliminent. Salinosulphurea verò præter eundem
comminutionis effectum, Ventriculi quoque digestioni plus minus
læsæ optimè simul prospiciunt, eamque si ad pituitosam vergat cru-
ditatem corrigunt.

§. 12.

Etenim si acida Ventriculi nonnunquam combinetur cruditas,
à quâ seri eatenus dependere potest crassities, quatenus chylus sapo-
re simili plus minus infectus ubi commiscetur sero, hoc in coagulum
facillimè modò eodem cogit, ac spiritum v.g. Θis talem in extra va-
satô sero edere effectum observamus : tunc eorum medicaminum,
quæ acidum corrigunt, expetendum auxilium, sive hæc terrea sint
acidum in primis viis absorbentia, v.g. ocul. 69. lap. percar. man-
dib. luc. pisc. C.C.corall. &c. sive Θia alcalia acidi texturam inver-
tentia, tam fixa, uti Θabsinth. centaur. min. ♀. &c. quam volatilia,
e.g. Spirit.lumbricor.terrestr.per putrefactionem paratus. &c.

§. 13.

Sola Indicatio Vitalis breviter adhuc supereft consideranda,
ad virium conservationem Diæta talis, qua antecedenti causæ nul-
lum accrescit incrementum, collimans : in hac proin præscribenda
eo minus exigitur laboris, quò magis nocivus sex rerum nonnatura-
lium usus è Cap. i. §. 14. jamdum patuit. Quo intuitu Aer calidus
seligatur & siccus ; Alimenta parciori capiantur manu & concoctu
faciliora, it. aromatibus rite condita ; Quieti ac Somno indulgeatur
moderatè ; cura detur sedulò, quò excernenda excernantur & reti-
nenda retineantur ; tandem evitetur tristitia, & lætitia potius exultet
animus,

§. 14.

Atque hæc de Cura Oedematis perfecti & per resolutionem
terminantis impræsentiarum annotasse satis est, quomodo enim cœde-
mati, si durum evadat, emollientibus, quæ intergummata prima-
tum ducunt, succurri debeat, item quomodo cœdema, ubi in imper-
fectum degenerarit, v. g. phlemonodes &c. sit tractandum,
sicco hac vice præterire lubet pede properan-
ti ad

F I N E M.

