

**Exercitatio academica, sistens aegram purpura alba majori laborantem ... /
respondens Carol. Leopold. Lisenmann.**

Contributors

Lisenmann, Karl Leopold.
Camerarius, Alexander, 1696-1736.
Universität Tübingen.

Publication/Creation

Tubingae : Typis Joh. Cunradi Reisii viduae, [1723]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/f9gcmnf2>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

Q. D. B. V.

16

EXERCITATIO ACADEMICA,
SISTENS ÆGRAM

PURPURA ALBA
MAJORI

LABORANTEM,

QUAM

ASSISTENTE DIVINI NUMINIS GRATIA,
CONSENTIENTE FACULTATE GRATIOSA,

PRÆSES

D. ALEXANDER CAME-
RARIUS,

MED. PROF. ORD. ACAD. NAT. CUR.
HECTOR IV.

FACULTATIS MED. b. t. DECANUS,

ET

RESPONDENS


CAROL. LEOPOLD. LINSENmann,
ROTHWILANUS,

*PLACIDO PHILIATRORUM EXAMINI
SUBMITTUNT.*

AD D. XXV. SEPT. ANN. MDCCXXIII.
IN AUDIT. MEDICO.


T U B I N G E.

Typis Joh. Cunradi Reisii Viduæ.





Σ. Θ.



*Ebre acutâ continuâ laborans Fæmina, cùm videretur ipsi ministrantibus insolitum exhibere phænomenon per superficiem pectoris, mihi jam prius ipsam visitanti, ejusque curam gerenti, sed nunc properè advocato, ad examinandum, & consultandum quoque desuper cum **B. Parente**, fuit commendata. Liceat igitur referre, quæ tum viderim & egerim, imò reflectendo super ista, casum hunc ipsum integrum exercitii gratiâ proponere ad disputandum publicè. Videbatur n. operæ adhuc esse pretium, & attentionem omnino mereri Medicam morbus, quibusdam dictus apud nos planè novus, aliis frequentior modò fieri creditus. Quandoquidem verò morborum & miseriae humanae satis omnino est, si non nimis, itaque sub auspicio laboris nostri Deum veneramur, velit per Filium Suum Unigenitum, Soterem generis humani Unicum, ab omnimalonos liberare, animæ corporisque morbos curare!*

Erat autem tunc in morbi statu ægræ illi pectus anticum superiorius, versus collum & utrinque ad axillas, obsitum magno numero vesicularum, tenuissimæ cuticulæ, magnitudine non semi-nis milii, sed lentium majuscularum, quæ candidæ, clarâ aquâ plenæ,

plenæ , discretæ , absque cohaſione aut confluxu , ſimiles pen-
dulis forte guttis lacrymarum , vel potius & exactius floris Co-
ronæ imperialis , aut totidem quaſi margaritis , ſuper cutem aspe-
ctu vix mutatam , superficie non inflammatæ , turgidulæ , lenio-
res ſub calore conclavis & lecti , quām ſub & ab aëre libero , ut
ut æſtivo , medicam omnino merebantur attentionem . *Nihil*
tale erat tunc in facie , aut dorſo , nec per inferiora corporis ;
poſtmodum tamen ſe extendit ad latera , & descendit ad umbi-
licum ; Fuit autem omne illud *sine* ardore , dolore aut pruri-
tu cutis , uſquedum ſiccari cuticula & abſcedere inciperet ,
quod quidem diu valde ferè per totum corpus factum fuit ,
tunc demum ſubprurientes invitatabant ad fricandum . *Ni-*
hil iſpis intersperſum , vel alibi per corpus obſervatum ,
ullarum macularum , vel efflorescentiarum plurium , alia-
rum ; nec hæ veficulæ abierunt in ſuppurationem quandam ,
ſed tactu facile crepantes parum dederunt madoris aquei , indè
aruerunt . Sic poſtquam per aliquot dies fuerunt conſpicuæ ,
transierunt & evanuerunt , novâ progenie non niſi rarâ & pa-
câ repullulante , nec ſubſequente per pectus aut inferum cor-
pus alterius generis eruptione cutaneâ .

Ad declarandam hanc obſervatiunculam facient phæno-
mena antecedentia , conjuncta ſ. concomitantia , & ſuccedanea ,
quæ ſequuntur . Anno decimo octavo , tempore febrium urbi
epidemiarum , loco non illo Disput . Dn . Lic . Elwerti , Matris il-
lius duæ filiæ laborarunt ſatis graviter *febre continentे* , per
ſept . & octobrem , viſæ reportaffe illam à viſitatione ita febricitan-
tis Cognati : evaſerant tamen . Fuerat ſilentium in ædibus uſque
in Junium decimi noni . Tunc Patrefamiliæ occultâ de cauſâ q̄s.
pleuriticè correpto , & nono morbi die acutè abrepto , jam ſene-
ſcens muliercula illa , annorum cc . 60 . parvula , tenera , querula
ſæpè de catarrhis , eryſipelatibus , ſplenis uterique moleſtiis , in
primâ statim à mariti obitu horâ insolitam iſpi , at perparcam ,
è na-

è naribus *hemorrhagiam* passa, & uti facile creditur, valde afflita, post curas, vigilias, labores, ad noctem ejusdem diei letum petens, *horridâ* quâdam cum *alteratione* cubitum properavit, altero jacuit eâdem cum defuncto camerâ, sub inquietudine turbulentâ, jam qs. *subdelira*; ad meridiem tertii surrexit, & intersuit exequiis, sed ægerrimè. Nec sequebantur dies indè meliores, sed fuit illud acuti quidem, longioris tamen, morbi principium. Erant autem querelæ uxoris prioribus nuper mariti ferè similes, de *dolore* in primis lateris dextri, imi *pectoris*, velut punctorio, qui dein ad dorsum & sursum protendi visus; progressu in artus diffusus; ut maneret tamen locus ille primus præcipuus & constantior, sæpè in ipsam usque declinationem tam exacerbatus, quam renovatus: primò ferè sine tussi, sed superveniente modò tardè, nec durante per morbum; sine gravamine etiam respirationis, præter offendiculum illud doloris: Cum *sputo* autem primò paucò, subcuento, non diu, sed deinceps admodùm molesto, diffici: In *calore* febrili magno. *Caput* interim, præter morem aliàs febrilem & malignum, mansit tantum non liberum à dolore, non æquè à confusione quâdam phantasie, non tamen magnâ.

Cùm à vesperâ diei 22. Jun. ad diem 2. Julii ista ægram affixissent acriter, visa fuit, post noctem quietiorem & somnum, quædam manè *remissio*, sputo etiam albo liberiùs & faciliùs prodeunte, ut cibi quid tunc poposcerit, & ederit: Sed *brevis* fuit illa; invaluit citò iterum febris, cum omni symptomatum vehementiâ. Simul autem fuit observatum, comparere per interiora *oris* & linguam *vesiculas* albas, & augeri numero per dies sequentes usque magis, ad secessum & dependentiam tandem qs. laci-niarum multarum. Jam cum fluxu, ferè primùm dubio an è pectore vel faucibus, sputi vel salivæ, sed certè tandem & clare cum *ptyelismo*; ad magnam molestiam & dolorem deglutitionis, liberiore manente respiratione; semper cum levamine, quant-

do & quandiu procedebat & promovebatur sputatio, screatus, statim pejus his remittentibus, & sub tenacitate muci diffici: *Sine vomitu, absque singultu, nec cum sono delapsūs assumptorum*, qui in marito fuerat observatus.

Hæc cùm in summo essent, cùm quereretur ægra de dolore à faucibus per medium sternum, qs. pungeretur & lacinaretur in deglutitione adeò ægrâ, & os vix aperire valens loquere-
tur modo ac sono qs. infantili: Interim sub calore morbi, lecti
& æstatis, utut aërem liberiorem se ferre non posse non semel
cum damno jam experta, & ipsa poscens hypocauustum calefie-
ri, cùm sæpè tamen removeret stragula, locum mutaret, tenta-
ret surgere, non valens tamen durare unquam extrà lectum, sed
pejus semper inde habens, ut ipsâ diei sexti Julii, decimo quar-
to morbi, vesperâ grave ipsi supervenerit *deliquium*: Tunc vocatus
fui ad conspiciendum comparentes insuper, & nescio quo præ-
cisè temporis articulo primū animadversas, pectoris vesiculos.

Tandem phænomena subsequentia fuerunt præcipue longæ
de afflictis *faucibus* querelæ, tunicarum qs. laciniis secedentibus,
primò albis, dein subfuscis, cum rubore sub ipsis & teneritudi-
ne, ad frequentem sensum delapsūs acris liquoris, vel passionem
acrimoniæ irritantem: Calores vespertini, inquietudines noctur-
næ, languores longi; erat autem etiam molestus calor æstatis;
serus *pedum tumor*, sine dolore, cum sensu modò ponderis, ad
decrementum tamen sub sudore, cum pruritu & secessu cuticu-
læ, sponte nec tardè subsecutum, absque tamen scabie; sed oc-
ciput erysipelaceo qs. modo *pustulis* mordacibus obsecsum, cum
ardore cervicis, & exacerbatione multarum querelarum ab
extricatione sub finem capillorum, imò tandem ad delapsum eo-
rum sensim qs. omnium. Tunc aperta qs. *auris* dextra, quam
priùs minus liberam, sed occlusam, non æquè attenderat, vel cu-
tarat. Paucis, tarda convalescentia, à medio Julii ad principium
Augusti, languore ad usque acutarum terminum per quadrage-
simam

simam medicam extenso , felix tamen & plena , cùm ipsa super sit adhuc , & , quod huc etiam spectat , neminem adstantium vel domesticorum corripuerit febris vel similis , vel quæcunque alia , urbi tunc epidemia.

Si quis Therapiam quoque requirat hujus affectus , præcipua dabimus censuræ Ipsius capita . Ex Fonte Chirurgico Venæ se-
tio instituta fuit demùm d. 26. junii , suo suorumque consilio ,
cruor exceptus post moram comparuit sine crustâ, mundus & pul-
cher in superficie. Vesicatoria brachio & pedi fuerunt posita de-
mùm d. 29. tardè & ægrè vesicas excitarunt . Emplastrum la-
teri dolenti fuit impositum , sæpè renovatum , de meliloto & dia-
chylon s. cum camphorâ mixtum ; vicinæ & ulteriori dolori da-
tus fuit spir. vini camphor. & matricalis . Injectiones in summo
faucium afflictarum gradu mane & vesperi à chirurgo fuerunt
cum solitis suis decoctis diu continuatæ . Habuit insuper per dies
& noctes frequentioris usûs cremorem hordei , butyrum cum
nitro , mucilaginem seminum cydoniorum , cum syrupo tam do-
mestico violarum , paralyseos , quâm de jujubis , mell. rosat.
&c. Singulis tum ferè diebus injici voluit Enema domesticum ,
lene , molle , multum levaminis indè observans . Naribus pro
refectione data non modò suavis aqua hungariæ , sed & fortior ,
fœtida quidem , grata tamen fœminis & conveniens castorei es-
sentia cum spir. salis ammoniaci .

Ex pharmaciæ a. penu pro usu interno præscripta &
exhibita fuerunt , non simul & semel , sed successivè , per morbum
non brevem sqq: Quod primò statim largiusculè datum fuerat
ol. amygdal. dulc. desideratum porrò fuit ab ipsâ diu , quâm
maximè per dies afflictarum faucium : Vomitum ibi non movit ,
hîc leniendo , expediendo tenacitatem muci , laudem meruit mul-
tam . Pulveres absorbentes & diaphoreticos fixos , antimon.
diaphor. corn. cerv. ph. c. matr. perl. ocul. cancr. ppt. cum
pectorali. spec. diair. glycyrrh. mixtos , sæpè , variè ; Cortic. cha-
quer.

querille semiscrup. subindè : bis terve etiam nitri scrup. sem. cum grano camphoræ, & tribus sulphuris. Infusum domesticum veron. beton. meliss. hyperic. Decoctum hordei, liquirit. fœnic. pectoral. calidum largiter : Noctibus alternis emulsiones sem. carduorum, melon. cum aq. card. bened. scabios. taraxac. saccharo perlato edulcoratas ; & pilulas extr. card. bened. liquirit. helen. chaquer. cum & sine castoreo, bezoardico. Tandem, cùm ægrè procederet deglutitio, ut erat dosum parcarum, at frequentium appetens, spir. ammon. anis. scrup. dimid. cum drachm. dim. alkermes in aq. scabios. unciâ & syr. jujub. drachmâ. Item Essent. chaquer. pimpinell. pectoral. aa. cum syr. helen. ad p. o. guttatum in aq. til. meliss. syr. paralys. Muci & sputi difficultati oppositus etiam fuit non semel gumm. ammon. semiscrupulus, aq. chærefol. solutus, syrupo ad grat. edulcoratus.

Hâc autem occasione notandum, cùm, ut dictum, aqua hungariæ data fuisset pro recreatione naribus, in summo aphtharum ægra ipsam linguâ etiam lambere cœpit, & aliquandiu non adeò parcè continuavit, ut caveret, ut abstineret, fibi persuaderi non passa. His adde vel propria ægræ desideria, per arrostian dianoeas, vel suggestiones nescio quorum vel quarum, de dando, concedendo vino, lacte frigido concreto, item acidulis, paucis fragis, cerasis, & quidquid erat talium medicè negatorum, clam, ut fieri amat, nescio utrum vel quantum, exhibitorum.

Sic etiam comparatum erat cum *Regimine*, per inquietudines & inconstantias, mutandi locum in lecto, surgendi, cùm tam en durare nunquam posset, plerumque pejus inde haberet, stragula movere, captare aërem liberum, mox iterum, & sèpè quidem, mediâ æstate calidâ, velle calefieri hypocauustum. Quis sufficeret dirigendis omnibus in bonum, præcavendis, quæ dannum minantur. Non semel, sed semper, juvantia & nocentia declarando, officium si fecerit Medicus, nihil habet ultra, nisi ut reliquum Deo committat.

Tan-

Tantum de *Historiâ*. Ad *Theoriam* progressuri circumspiciemus, quid de Medicorum dogmatibus applicare possimus ad ipsam, pro resolutione casûs nostri. Ante omnia quidem *Affectionis* dicendus erit Febris Acuta Continua Exanthematica; an *Miliaris*? quoniam exhibuit singularem efflorescentiarum speciem, quam vesicularum eruptionem ut in ore *Aphthas*, sic in cute *Purpuram Albam* vocare solent. Convenire enim videntur ista duo, quanquam descriptiones quorundam miliaris, & aliorum purpuræ, diverso aliquantum modo proponantur, differentia tamen videtur esse modò à conditione personarum, temporum, locorum, & similiūm circumstantiarum, varietatem sæpè non parvam in morbo specie eodem importantium. Nec obstat *magnitudo*, illam seminis milii multùm superans, siquidem cætera convenient, & hoc accidens rem ipsam non variabit, nisi quòd hinc dici possit & debeat *Purpura Alba Major*. Necest, quòd hoc ineptum vel indictum videatur Aliis: præter alios C. Raygarus hujus majoris notæ expressè mentionem fecit, & dixit: *den weissen ausschlag*, uti vulgò alibi der oder das weisse friesel audit.

Non fuit ergò *Purpura Rubra*; cui rectius nomen illud competit, cùm albæ nihil sit purpurati: Nec mixta seu confusa rubræ, quod *Hamilton* alias notavit; Nec rubræ succedanea vel prævia, aut cùm ipsâ permutata, quode dubitatur in *Actis Berolin*. Rubræ tamen cognata videtur fuisse hæc alba, instantum, quandoquidem illa visa fuit per urbem, non modò in febricitantibus, quibuscum huic ægræ nihil erat commercii, sed etiam in domesticis, sc. filiabus ante annum, marito nuper.

Non fuit porrò purpura *Urticata*, quippe cuius descriptio à *Lochnero*, *Alberto*, tradita differt benignitate, amplitudine tenuitatis vesiculosæ, & inflabundâ rubidine, urticatæ parti consimilis: Quæ quidem recentiorum *nesselsucht* propriùs accedit ad nostratum *wibelsucht*, affectum ab olim hîc loci diu satis notum, non

magni habitum, s. quibusdam sub latitudine sanitatis negligenter habitum.

Non fuit denique purpuræ illa species rarer, dubia q.s. *Variolacea*; quia descriptiones *Raygeri & Aet. Berolin.* non quadrant. **A**variolis ergo, morbillis, petechiis, & cæteris cutaneis maculis & vesiculis ita differt, ut pluribus hîc non sit opus.

Subjectum est superficies in hoc casu tantum pectoris, cuticula: Affectus non pustula, si quidem huic à pure nomen est, quod hîc non fuit observatum, sed vesicula, cuticulæ à cute separatio, elevatio, aposasma, clarum aqueum hquorem continens, cui num convenientius sit nomen papulæ, viderint critici. Similiter comparatum cum membranâ obductâ interioribus oris & faucium; nisi quòd hæc crassior secedens laceras & pendulas partes separatæ tunicae exhibuerit, sub quibus denudata q.s. excoriata teneritudo subjectæ substantiæ acrem sensum importavit. Quàm clarum hoc, tam dubium & obscurum, quod fuerit *causa subjectum*, quis hujus morbus? Gula, Stomachus, pro aphthorum ascensu vel descensu? Obsessa viscera pro purpurâ desuper efflorescente? vel potiùs Massa Sanguinea, utrinque secundum partem suam albam, quæ vehiculum præbuit materiæ tenuiori per diapnoen, crassiori per salivæ fontes expellendæ.

Febris quidem naturam hîc non disputabimus, inquinationem, turbationem mixturæ, concitationem motûs fatentur omnes, qui dein dissentient controvertendo, *utrum ex necessitate dispositionis ille excitetur, vel ex prudentiâ instituatur & dirigatur ad finem.* Hoc potiùs meretur disquiri: qualis illa fuerit *febris?* an *inflammatoria?* sive, quæ fuerit & cuius visceris intus & subtus læsa dispositio? an *inflammatio.* Num, ut aliâs huic gangrenam minanti sunt vesicæ malignæ: Sic & comparentes extus & supra vesiculæ subjectarum periclitantium partium sint signa? *Bærhave* quidem de purpurâ ferè silens, ex professo tamen de aphthis agens, caput ipsis dedit singulare, post morbos acutos cum inflammationi-

tionibus viscerum. Et quæ in Disput. B. Parentis de *Apoplexiâ c. Febr.* legitur efflorescentiæ talis copia (non illa ex Hamiltono citata, sed altera, posterior, ex propriæ quondam praxeos penu desumpta) non fuit febris miliaris apoplexiæ accersens, sed purpura alba apoplexiæ superveniens, ob febrem s. ab ultimo naturæ conatu, s. ex inflammatione gangrenosâ interiorum capitis à sanguine congesto & extravasato.

Causa verò ipsa in genere quidem facile accusabitur, venenum, fermentum, miasma, secundum partem sui subtiliorem per glandulas subcutaneas, secundum crassiores per salivales expellendum: Sed speciem hujus objecti naturæ humanæ adversi & noxii exprimere, cuius originis sit, mineralis, vegetabilis, aut animalis, s. specificam differentiam pro diversitate exanthematum determinare, cum suam hîc ignorantiam fateantur, qui magis sapere videntur, quis à nobis postulabit. Quanquam ergo contentos ita esse oporteat generali conceptu materiæ inquinantis, irritantis, fermentescentis; specialior tamen adhuc foret quæstio: *Utrum insuper hæc nostra mereatur prædicatum, quod in Stahlii Disp. d. Exanthem. Retrocess. citatum legimus, scorbuticæ? & hujus per potentias salinas explicandæ?*

Mortonus, Hamilton, & aphthas & purpuram tradunt, sine respectu ad Scorbutum; qui tamen in Angliâ subesse febribus & earum efflorescentiis præsumitur. Ex Belgio Bærhave aphtharum patriam, temporis & ætatis rationem recensuit, gentibus scil. borealibus, paludosa loca inhabitantibus, tempestate calida pluviosâ, præter infantes senibus frequentes; quorum priora verba scorbuto convenient maximè: sed in prolixo hujus symptomatum catalogo præter febres & stomachacem binæ illæ species expressè non occurunt.

Verùm enim verò Pechlinus singulari observatione aphtharum historiam, theoriam & therapiam complexus, hoc tandem reliquit topicum: Morbum in Belgio popularem esse, nec facile

febrem ullam ardenter absque eo solvi. Ne tamen septentrio-
ni omni vel toti communes credas, addidit: in cimbriæ plagâ
occidentali & maritimâ sibi etiam fuisse notatas, in reliquâ ta-
men regione oppidò raras. Ejusdem verò cimbriæ locis nonnul-
lis porro anniversariam scripsit purpuram, exantheinatum tamen
talium colores recensens, ruborem, flavedinem, nigredinem di-
xit, non albam. Scorbuti tandem schema graphicè depinxit, ex
quo eminet *Perihydrosis Scorbatica Virginis indomita*, à pustulis,
quas hydatides vocat, s. vesiculas hydragogas, ad excoriationem
utrinque simul, per superficiem corporis & oris, ut illa mutatio-
nem linctorum non permitteret, hæc non vocis nec linguæ u-
sum; cum quâ proin conferri meretur Frid. Hoffmanni Ægra, affe-
ctu raro scorbutico pustulari laborans, quam pecul. disput. quondam
proposuit. Cæterùm evolvi hîc atque legi etiam poterunt, quæ
de *Aphtharum*, non oris modò atque faucium, sed & partium *in-
ternarum*, proventu in *scorbuticis* suo quondam tempore obser-
vavit B. Avus, unde in Disp. c. t. *Thes Pract. Triga*, medio loco
pro thesi posuit: Aphthas internas frequentiores esse, quâm vul-
gò putant.

Vetulæ igitur, ex præmissâ ipsius descriptione personali, se-
rum salsum acre scorbuticum tribuerem, nisi falsè riderent patho-
logiam falsam Stahliani: Poterit tamen cum grano salis forsan
ita explicari, ut conciliationem adhuc admittat apud concor-
diæ studiosos.

Pechlinus analogiam proposuit triplicem, s. comparando ve-
siculas istas cum similibus notioribus, ita declarare studuit. Pri-
mò ex chymicis sublimationem florum & salium præ oculis ha-
buit, quæ perindè summum vasis, per gradus tamen, affectare
soleant, ac aphtharum flores surgere, & vel in extrema oris
aut faucium cava erepere. Sic & *Sydenham*, ut declararet depu-
rationem & despumationem materiæ febrilis duplicem, pro se-
cretione non solùm fæcum, sed & florum, provocavit ad exem-
pla

pla liquorum, spumæ forsan & fæcis, quam utramque exhibet fermentans mustum & cerevisia.

Secundò, spinam cuti infixam, causam excitatæ pustulæ, applicare voluit: Ob adeò fœcundas qs. pustulas, non aliter ac si alia ex aliâ suppeteret materies, aut conica salis acumina subtilitate suâ cutem quidem extollere, sed ob basin latiorem pervadere omnino non possent. Posset huc referri modus demonstrandi cuticulam, s. aquâ fervidâ, s. igne; quin & vesicatorii exemplum, juxta modum ab *Helmontio* ad quæstionem (cur cantharis cutem vivi vesicat, non cadaveris) expositum.

Tertiò, phænomenon à superficie rerum putrescentium visus sibi fuit vidisse, vesiculis utique præ maculis non absimile. Scilicet est hoc sitûs putredinisque proprium, ut secretæ fæces in speciem flocculorum aut spumæ sese efferant, quod adeoque in scorbuto, qui & ipse sanguinis putredo est, fieri probabile est, & hinc non malè sitûs vocabulo scorbutum appellari maculosum, neque inconsultum fuisse Belgam, qui toto libro, ubi morbum hunc describit, *schimmel* nominavit, ut nominari vulgo solet floridus humidorum situs. Sed hoc phænomenon fatiscentis naturæ & transeuntis in statum alterum *Malpighius* accuratiùs consideravit, scilicet per microscopia, & docuit, esse quandam qs. vegetationem muscosam, fungulosam. Hâc autem occasione liceat quærere: quid videatur de *Gallis* ab *Ipsò* quoque declaratis. Utrum vesiculæ & pustulæ aliquæ per morbos, & quænam in specie, per analogiam quandam dici poterunt vel debebunt Gallæ Animales? Quidquid sit de hoc, in schedis tamen paternis legi, simile illud placuisse, aut visum satis congruum fuisse fœminæ cuidam è plebe quidem, sapere tamen visæ, ad describendum modum, quo comparuerit superficies corporis in febre malignâ mariti sui: Sub declinatione scil., cùm spes jam esset evadendi, cutem ipsi fuisse obsitam qs. *situ mucido*, vel innumeris minimis *guttulis*, perinde ac forte vetustus paries

compareat cellam subterraneam intrantibus. Sed & hinc patet, tale quid inter nos fuisse notatum & olim, priori adhuc seculo, sub principium ultimi decennii.

Medicè autem laud. *Autor* vesiculos & oris & cutis declaravit per crisin imperfectam, metastasin quasi criticam. Et in hoc consentientes habet Autores plerosque omnes. Duplex tamen hinc orietur quæstio : Prior, quo jure mereatur nomen bonum? Altera, utrum potius ipsi conveniat nomen criseos per apostasin, ex communi sanguinis oceano, vel per metastasin, ex certo viscere?

Certè male passim audit purpura alba. *Mortonus* vesiculis aqueis per *pyretol.* part. 1. & 2. nullibi videtur tribuisse prædicatum criticum : nec eas cum aphthis in eadem febris specie conjunxisse. Gradui potius malignitatis, & veneni prævalentis primo & secundo deleterio, illas per collum & pectus sparsas eruptiones miliares, morbillosæ efflorescentiæ contradistinctas, assignat. Nec vesicularum aquearum per interstitia variolarum mentionem repetit, nisi inter signa maligna, quæ funestum præmonstrant eventum. Præter autem illas habet quoque inflammationem herpeticam, quæ per cutem serpens ante & post exulcerationem semina milii referat. Sed pro aphthis albis (nigrorum enim alia, tristis, & peior est ratio) & crisiū & partium secernentium respectum ad invicem, atque subordinacionem ubique observat & applicat. Sic in febre continentे naturæ venenum superantis crisin declarat etiam aphthis, decessentibus, aut colorem saltim in melius mutantibus: cùm è ductibus salivalibus rivulus lymphæ sanæ os colluit, illæ absterguntur, brevi sanescunt, & sitis extinguitur: Et, quanquam salivatio aphthas albas comitabunda longa quidem lèpè sit & tarda, quin hoc ipso molesta, certam tamen esse & salutiferam. Sic in dysenteria, virulentia per ductus salivales expulsâ, ope aphthorum & salivationis immensæ supervenientis quosdam liberatos meminit; ad argumentum in tali casu suæ continentis. Sic inter-

dira

dira *phthiseos* à febre putridâ salivationem, inflammationem, exulcerationem, aphthas, dolorem guttulis molestum, ad singulum usque, tristi ordine recenset, tanquam molimen in cassum ita excernendi materiam, sed per alvum atque alias portas (etiam arte) præpeditam: Perinde ac in *variolis* à cute ad salivæ fontes, urinæ vias, ad extremos usque artus, communem materiam deducit. Et hoc quidem bene, criticè, sed illud triste non meretur ita bonum prædicatum.

Bærhave aphtharum etiam rationem non simpliciter posuit in conditione loci, sed in respectu potius superarum faucium cum alvo inferâ. In febre quidem cum diarrhæâ & dysenteriâ in fine morbi aphthas dixit à calefacentibus & adstringentibus; præcavendas autem purgante in morbi principio dato, quod hîc moris non est in dubio inflammationis internæ metu. Interim & *Pechlinus* respexit in earum curatione ad subductionem lenem cacochymiae primarum viarum.

Quia sic deventum est ad causam & *culpam* alibi commissam, aliundè ad faucas reflexam, sub respectu tamen critico, corrugandi utcunque, quod malè fuit perpetratum; talium autem errorum plures citantur alibi: quapropter & horum facienda mentio, habenda ratio. *Albertus* & *Jünckerus* in commotione jam tum febrili congestionem Stahlianam ad caput & fauces imputant etiam *refrigerationi* partium inferarum, item *venæsecctioni* institutæ in partibus superioribus; & redarguunt tam regimen calidum, quam curationem febris catarrhalis malignæ per methodum nimis refrigerantem.

Quantum ergò culpæ redundarit in nostro casu in omnes illas personas, quas habet Aph. Hipp. primus, ex historiâ disputari posset. Dicerent illæ forsitan pro se: Tales causas, quibus imputari vult effectus, vesiculæ oris & cuticulæ, esse frequentiores, quam ut ipse possit inde deduci, quia rarer; Et, observari forte phænomena talia, ubi desunt illæ rationes, quibus vellent imputari.

Re.

Respectus autem mutuus utrinque istarum vesicularum non eodem explicatur modo: In laud. praxi ex retrocessione purpuræ albæ nonnulli aphthas, & affectus incurunt anginodes. Juxta Hamiltonum observare est, eodem tempore aegeri aphthas, pustulasque miliares exarescere. E contra, simul ac lingua aphthis nudata fuerit, pustulas miliares elevari. Et nonnunquam febris reliquias, post desiccationem pustularum, in aphthas nutriendas derivari. Inde pryalismus in hâc febre juxta ipsum plerumque copiosior, quam in ardente. Ideoque hic sitis plerumque minor est, & lingua viscoso humore minus obducta. Sed notante Bærhavio, crusta aquosa primò exitum liquidorum per sua emissaria impedit; crustis autem deciduis major jam per dilatata vasa jam aperta humorum effluxus, unde salivatio, diarrhæa; quæ bonæ, si non renascuntur crustæ. Hinc in vernaculâ nostratis nomen *prunellæ albæ*, humidæ, hoc ipso contradistinctæ prunellæ absolutè dictæ, vel & anginæ. Conferri poterit *mundfaüle* infantum, plerumque cum rhagadibus papillarum lactantis.

Ad Rationes Symptomatum. Sed talia sunt principiata, qualia fuerunt principia. Quo fato fœmina illa tunc temporis *sola rariore* hoc affectu fuit correpta? Solam dico, quia mihi non constat per annum illum & priorem, ad minimum meos inter ægros, quorum visitavi non paucos, nec ex auditu de aliis, purpuram albam perpessis. Rariorem quoque dico, quia fortè numerari adhuc possent per urbem, s. inter nos, qui eam fuerunt passi. Purpuram quam dicunt rubram frequentiorem observamus: Utrum hoc nomen mereatur etiam efflorescentia quorundam, cætera sanorum, per æstatem benè calidam & siccum, quales fuerunt istæ: perindè ac à balneo fortè calidiori observari solet; aut in cuticulâ teneriore ab illitu oleorum calidiorum, acriorum, frequentiori? viderint, qui dubitant. Certè similis fuit asperitudo cutis rubra, mordax, pruriens, qs. morbil-

billosa. Nee dissimilis illa puerarum etiam frequentior, sanguinearum, calidiorum, sub regimine sudabundo; respectivè benigna. Et tale quid erupit quibusdam tempore tertianæ epidemio continenter febricitantibus: Et in horum censu fuerunt tam filiæ, major natu in primis, in summo gradu, quam maritus sub finem, per superiora dorsi modò, dubiè, lividi asperatus; sed omnes albæ purpuræ expertes, quâ mater sola habuit pectus obsitum. Unde specie diversam ab illâ reputavimus.

Sub finem tamen ejusdem æstatis visitavi puellam, cui facies erysipelaceo modo rubens, sed & tumens (die rose und flug, rosam & volaticam vocant vulgo:) talium vesicularum, sed ministrarum, itaque miliarium, magno numero fuit qs. conspersa, per latus primò sinistrum, ut ferè visum fuisset, à liberaliori spir. vini camphorati usu id factum: Sed cum & alterum latus, dextrum, illo intactum, inflammaretur & obsideretur similiter qs. albâ purpurâ, hinc externæ illi causæ soli hic effectus non potuit imputari. Interim per faciem solam fuit illa fugax efflorescentia per reliquum corpus nihil tale. Subnasci autem hinc voluit dubium: Quid quantumve ad istum fœminæ vesicularum proventum contribuerint externa, spiritus in primis & emplastrum. Quandoquidem verò hoc, ut dictum, fieri alias solet, cum insigni rubore, ardore, mordacitate, quæ in nostro casu defuerunt; effectus autem se latius extendit, quod litus externus non pervenit; aphtharum proventus internus sine datâ tali causa erupit; & de cætero quæ de purpurâ albâ leguntur apud tot Scriptores pleraque omnia hoc quadrant: Quapropter nec nostrum phænomenon ab istorum traditis separandum duximus.

Phænomenon urbi novum non ausim dicere: Norint hoc Seniores. Suspicio tamen non vana est, parvulas s. minimas interdum vesiculas limpidas, aut albidulas, vel non semper vel non ab omnibus tanti habitas, sed inter sudamina, *bizbläterlen*, recensitas fuisse *epinyctides Pechlini*, quæ calore leæti provocantur, prurigine molestæ. Perinde ac per interstitia variolarum inter nos interdum, at raro, visas audio fuisse creditas & dictas ul-

teriores, imperfectas, immaturas, parvulas variolas. An sic & aphthæ venerunt variolarum oris & faucium nomine?

Utrum ratio pro purpurâ albâ nostri casûs desumi potest à famoso purpuræ progressu. Diu est, quod *Etmüllerus* & *Scriptores Saxonum* alii ejus fecerunt mentionem, tanquam sibi q.s. propriae. Post dimidium seculum demùm inde venit in Marchiam, ut ex *Act. Bero!in.* in Franconiam, ut ex *Misc. Nat. Cur. in specie app. d. pareira brava B. Lochneri* discimus. De Sueviâ inter alios *Agnatus* & *Consobrinus Dn. D. Planerus*, & (qui *vñ ēv aylōis.*) *G. A. Camerarius* quondam in literis: Et de Burgundiâ, refert ab itinere Montbelgardenensi per *D. G. feliciter redux Dn. D. Zeller.* Sed unde venerit in Saxoniam? Quæ sit purpuræ patria? Ego non dixerim. Norint septem subjecta trioni loca, s. eorum incolæ. Anglos quidem istos nec ut novum quid, nec tanquam aliundè allatum referre video. Sed thema hoc purpuræ albæ se extendentis & proprius accedentis dignum est examine Aliorum, quibus plus est subsidiorum pro formandâ & complendâ historiâ, ex quâ dein erui fortè possit ætiologia. Præter commercia populorum vix constat de modo & medio propagandi miasma. Aer, si vel maximè valet ad deferendum in viciniam, adeò in distans valere ad provehendum, exemplis specierum luis contagiosæ alterius, vix comprobatur. Quid autem solitus sum de propagatione hujus mali ad populos vicinos, siquidem ex relatione *Hamiltoni* hæc febris eâdem malignitate ac petechialis grassetur apud *Indos*; sc. perinde cò delata.

Quidquid autem sit de progressu illo, rationes tamen ipsius ad casum nostrum forent applicationis difficilis. Si vel Saxo ad nos venerit, & apud nos affectus ipsi patrius* erumpat; (uti quidem id

con-

* At ne hoc quidem constans est; Recordor enim jam duorum adulorum, rum, variolis decumbentium, quorum prior juvenis viator Argentinensis, in medio suppurationis cursu miliaribus insuper notatus Stutgardiae & monstratus mihi fuit ab ipsius Medico, *Dn. D. Seegero*, nunc ibidem *Protophyisco*: Alter vero Studiosus Juvenis Tönningensis, adeoque Pechlini atque Saxonum vicinus proximus, hic Tubingæ variolas passus, meaque curæ concreditus, graviter quidem decubuit, feliciter tamen istas superavit, nec quidquam purpuræ exhibuit,

contigisse novimus Stutgardiae, in milite nobili, fato valde acuto) vel Nostras è peregrinatione inde redux tale quid reportaret, citius tardiusve erupturum; Si ab utroque horum similiter inficerentur plures: non miraremur. Ast de fœminâ illâ, post diligentem inquisitionem, de tali contagio, & à quo peti potuerit, nobis non constat. Nisi, ut dictum, de purpurâ rubrâ domesticorum. Idem dixero de puerperâ quâdam prioribus annis albam passâ, sed feliciter transmissâ, & de primiparâ aliâ, aliquot annis post iisdem miliaribus correptâ, sed & acutè abreptâ. Scil. ipsas non accessisse quenquam, nec venisse ad eas quenquam, à quo potuerint ipsam reportare. Quâ quidem occasione addendum & hoc duplex phænomenon: Ex cæteris, quæ ad purpuram istam notantur facere, in hâc ægrâ desiderari duo; Non fuit puerpera, sed vetula; Non habuit variolas, petechias, quas *comites* vel *prævias* scribunt *Stahl, Raiger, &c.* Forsan ex his ipsis circumstantiis peti poterit ratio: Cur evalebit ægra? quæ aliâs adeò malè audit purpura alba, cur malignè hîc non fuerit terminata.

Sive ergo febris illa miliaris fuerit species cuicunque alii contradistincta, orta à causâ specificâ, determinatâ aut determinante ad hanc non aliam febrem: *sive* febris fuerit continua acuta simpliciter, conveniens genio anni & loci, sed pro symptomate modò habuerit vesicularum genus utrumque: *aut* scorbutus, à maritimis ad mediterraneos non tam in genere, quâm in individuo hanc ægram, translatus; (certè *Pechlinus* in medio reliquit: Sua purpura, quæ ipsi Belgæ, in Cimbriâ viventi, per Europam olim peregrinabundo, bene nota creditur, *an Scorbutici salis fructus sit*, vel proprio veneno assurgat?) utrinque ægrè ad ægram solam applicatur rara causa.

Quandoquidem tamen medicè dicitur esse satis, corruptiō nem nosse specificam, epidemiam quibusdam locis, materiam subtilem fermentescentem, cuius natura ignoratur, quæ jungi etiam possit & soleat suis qs. conspeciebus, non clarioribus in se, ad multiplicationem inquinamenti, cum variolis, petechiis, &c. juxta deductiones *Jünckeri* & *Alberti*; oportebit omnino vel materiam s. cau-

sam occasionalem dici novam , novum insolitum objectum , vel novam agentis rationem, institutum novum apud nos, purgandi ita suum corpus per cutem, per fauces, more modoque non pristino, sed singulari, alibi introducto, mira s. obligatione s. informatione.

Non prætermittenda circumstantia temporis, & notabilis durum exanthematum conjunctionis. Non comparuerunt, uti morbilli, variolæ, erysipelas cum bubone, &c. citò, post apparatus vel turbationem brevi- aut longiusculam ? sed supervenerunt febri continuæ demum circa diem decimum, vel undecimum. Vulgo quidem modus computandi variat. Si die identur 24. horæ, si ab horrido in lectum ingressu fiat initium, post superatum diem nonum suspectum, versus alterius septimanæ indicem fuerunt observata. Notabilis illa remissio per noctem in mane diei 2. Jul. sed inconstans. Abhinc pejus iterum, & abhinc demùm illæ eruptiones. Hoc non solùm & Aliis observatum, & in primis quidem notatum ab III. B. D. Brunn, in Eph. Nat. Cur. ægros, cùm sibi viderentur valere melius, in peius relapsos ad purpuram; verùm etiam ante annum modò rursus observatum abs me fuit in fæminâ, quæ octavo graviditatis mense febre continentente graviter decumbens, remissiones tamen singulis diebus matutinas exhibens, septimo ejusdem die melius valere visa, indè demum verâ continuâ, satis exquisitè tali, correpta, nullam remissionem amplius exhibuit, usque ad dictum modò alterius septimanæ indicem, diem sc. ab exaltatione σύρεχης in σύροχοι undecimum, quo, post noctem paulò prioribus quietiorem, manè tota se recollegisse visa, & fœtum mortuum feliciter enixa, ad meridiem usque jacuit quieta, taciturna, in statu dubio, certè debilitatis majoris quàm caloris ; post meridiem verò, ad vesperam, denuò accensus calor, aspectus oculorum torvus, frequens singultus, maxillæ rigor, pulsus durus, tendinum subsultus, manuum tremor & digitorum rigor, post superatam utcunque noctem, sequenti die protulerunt purpuram albam, sed ordinariam, minorem, satis largiter prorumpentem, & feliciter quoque terminatam ; ut hác iplâ occasione permotus disputationem hanc conscribere constituerim. *Utrum morbus ipse id tulisset? vel erratum, peccatum*

fuerit, in quo? à quo? ut fiet i solet in perplexâ perturbatione ægrî & familiæ, determinare nequeo: Cavendum, ne uni fortè circumstantiæ tribuam, quod esset plurimum, quod morbi ipsius, sub conditione tamen personæ & regiminis.

Oportet autem materiam despumationi aptam, vel impuritatem, quæ naturæ fuerat offendiculo, fuisse multam, aut novam usq; per morbum genitam, & intentionem movendi ad superiora & exteriora jugem & multiplicem; Siquidem præter efflorescentias priores subsecuta fuit non quidem scabies corporis, scabiosi tamen quid per postica capitis. Quale quid non adeò infrequens auditur à fœminis, & erysipelaceo euidam modo & motui imputatur. Compli- catio & intricatio capillorum, cum suffocatione qs. madoris, non parum videtur contribuisse. Et extricatio in declinatione non facta fuit sine novâ quâdam, levi tamen & brevi, turbatione.

Congestionem & extensionem ad interiora vicinæ auris arguit observata barycæa. Sed cur auris solùm alterius, dextræ? An, quia respondit visceri, quod subest è directo, cat ixin. Et cur sublata sponte, absque usu topicorum? utrum ipso morbo declinante, & naturâ sensim redeunte ad quietem? vel erumpente illo madore pustuloſo pruriētate occipitis & cervicis? aut alvo per enemata & laxantia solicitatâ, apertâ, & invitatâ deorsum materiâ opplente? an biliosâ? vi aph. 28. 60. S. IV. Interim qui de alvo in præjudicium superiorum, ut hîc oris ad aphthas, clausâ monent practici, & qui de alvo leniter movendâ s. laxandâ in febribus agunt, in Msc. Nat. Cur. possent pro instituto suo allegare usum enematum frequentem hîc s. tolerabilem s. proficuum: Et observatam in puerperâ modò citatâ alvum lubricam, liquidis frequenter sponte solutam, vesiculis nihilominus feliciter succedentibus; planè conformiter illis, quæ leguntur in Disp. Alberti d. Purpurâ c. Febre.

Et quæ ratio subsequi pedum tumoris, utriusque perinde, absque dolore, non contumacis? Forsan ipsæ istiusmodi evacuatio- nes, patula excretoria, inclinantem eò materiam, vel naturam potius, qs. invitârunt ad non sinendum diu infra, sed promo- vendam

vendam illam adhuc mobilem; opellam contribuentibus etiam paucis externis. Sed de hoc themate pluribus quondam aetum fuit occasione *Oedipi*.

Quia serosa fuit stagnans illa materia, itaque phænomenon non *Urinæ*, in historiâ prætermissum, hîc inserere licebit. Illa quidem per febrem istam non brevem nunquam tamen transmissa vel conspecta fuit febrili tincta rubidine, sed *decolor*, nec multum deponere solita, varians tamen in gradu tenuitatis & crassitie. Certè per declinationem multum cruditatis habere visa tabis metum injecit. Applicarem illud: Urina bona, &c. nisi subsecutus fuisset eventus prosper. *Hamilton*: Urina nonnumquam, ferè ut communis aqua, pallida; alias naturalem præ se fert colorem. Ex tali, quia decolor, sanorumque similior emititur, quam in febre ardente, sanguinem & succum nervosum, acrimoniam potius acidâ imprægnari conclusit, quam particulis sulphureo-salinis; has pustulis rubris magis assignavit.

Non est ab urinâ separandum quod sequetur phænomenon *Sanguinis* è venâ sectâ missi. *Utrum* non fuisset instituenda? vel otiùs? vel loco magis congruo, infrâ? qualia in culpæ censum vocari voluerunt, transmittam, quia non mei, sed ægræ, adstantium & chirurgi arbitrio res fuit gesta. *Color* modò oblati die quarto cruoris meretur reflexionem. Caruit crustâ, superficie fuit mundæ. Et dat materiam quæstioni: *Cur* desideratum fuerit, quod *Bærhave* dedit inflammationi? *An* ex ratione *Bagliivi*, ubi talis cruor signum malignum, venæsectionis contradicans? Divinent, qui possunt, *utrum* si porrò missus fuisset, crustam quoque fuisset exhibitus. Sed de hoc themate ex professo quondam egit *B. Paren*s.

Et colorum quidem istorum eò magis ratio notabilis, quò major suspicio *inflammationis*. Dolor utique lateris punctoriis pleuritidem inferiorem, vel superiorem & exteriorem hepatitidem minabundus; Respiratio primùm ægrior & sputum ex pectore procedens, at postmodum è fauibus magis, cum difficultiori respiratione, vix sputum, externum, catarrhale modò & rheumaticum quid arguunt. Nec tamen apostematodes, sed *erysipela-
cea* potius, tenuior, mobilior videtur fuisse, quæ subfuit, inflammatio.