Dissertatio medica inauguralis de malo hysterico ... / Publicae ventilationi submitti [sic] Petrus, Samuel de Chaufepié.

#### Contributors

Chaufepié, Pierre Samuel de, 1730-1784. Esgers, Johannes, 1696-1755.

#### **Publication/Creation**

Lugduni Batavorum : Apud Joannem Heyligert, 1752.

#### **Persistent URL**

https://wellcomecollection.org/works/zsbjsh42

#### License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org

### DISSERTATIO MEDICA INAUGURALIS

DE

# MALO HYSTERICO.

ANNUENTE DIVINO NUMINE

Ex Auctoritate MAGNIFICI RECTORIS

### D. JOANNIS ESGERS,

S. S. THEOLOGIÆ DOCTORIS, EJUSDEMQUE FACULTATIS, UT ET ANTIQUITATUM HEBRAICARUM IN ACADEMIA LUGDUNO-BATAVA PROFESSORIS ORDINARII.

NEC NON

Amplissimi SENATUS ACADEMICI Consensu, & Nobilissima FACULTATIS MEDICE Decreto,

PRO GRADU DOCTORATUS,

Summisque in MEDICINA Honoribus & Privilegiis, ritè ac legitime confequendis,


Publicæ ventilationi submitti


PETRUS, SAMUEL DE CHAUFEPIÉ, HAMBURGENSIS.

Ad diem 28. Junii 1752. bora locoque solitis.



LUGDUNI BATAVORUM, Apud JOANNEM HEYLIGERT, MDCCLLL





ationis and nducentis under complutes

in Juperiora afcendere sterum.


core tam arete chufo ut froe non

E. Sed DISSERTATIO MEDICA

ර අදුරු අදුරු අදුරු අදුරු අදුරු අදුරු අදුරු අදුරු අදුරු

is the second for the

### sculoram obtenebrationes. & LO HYSTERICO. ons convultiones cum vel fine





SOADUNGUARO NO

um varia sit forma sub qua se manifestare folet affectus iste five potius ingens illa pasfionum cohors quæ mali hyfterici nomine nobis venit, nec femper iisdem fed fatis diversis sæpe symptomatibus stipata incedat, operæ pretium effe exiftimo primo omnium veram & accuratam ejus historiam paucis suppeditare. Incipit autem ut pluri-

mum dirus hic affectus cum infigni virium proftratione, fenfuum ac mentis torpore, languore totius corporis, cibi inadpetentia & omnium rerum fastidio. In nonnullis observatur adpetitus vagus frequenter absurdus, coniunctis fimul pertinacibus vomendi conatibus. Mox fuccedit dolor tenforius lum-A 2 b0-

borum, cum frigoris & horripilationis sensu. Percipiunt dein ægrotæ flatulentas & moleftas tenfiones præfertim in regione hypochondrii finistri successive invalescentes, & borborygmos atque ructus experiuntur frequentifimos, accedit refpirandi difficultas, fenfus suffocationis & constrictionis in faucibus, ingens circa præcordia anxietas & infignis cordis palpitatio. Pulfus est rarus, parvus, inæqualis imo quandoque intermittens, alvus constipata & adstricta ita ut nonnumquam ne clysma quidem admitti poffit, adeft fimul ingens ad urinam stimulus quæ tenuis mingitur & clara instar aquæ. Nonnumquam in ejusmodi ægrotantibus fumme dolorifica notatur umbilici versus interiora retractio & motum quali globi cujusdam fentiunt ex inferiore ventre ad hypochondria & diaphragma ascendentis & suffocationis sensum inducentis unde complures fibi perfuadent mulierculæ verfus fuperiora afcendere uterum. Non raro etiam superveniunt oculorum obtenebrationes, & eorumdem inversiones ac rotationes cum varii generis deliriis. fub quibus fæpe multa abfurda & ridicula loquuntur, nec non atroces artuum & totius corporis convulsiones cum vel fine pollicum complicatione, fudores frigidi in capite prorumpentes cum doloribus hemicranicis. Aliæ in terram fyncopticæ concidunt, voce amiffa & ore tam arcte claufo ut fæpe non nifi magna vi adhibita diduci queat. Aliæ denique animi deliquiis corripiuntur quandoque levioribus ita ut quamquam videre & loqui nequeant audiant tamen quæ loquuntur adstantes; quandoque vero gravioribus, adeo ut nullum omnino vitæ fignum edant, quo factum est ut aliquando ejusmodi misellæ pro defunctis perperam habitæ viventes adhuc terræ fint traditæ atque fepultæ. Notandum autem eft non omnia atque fingula ifthæc modo commemorata pathemata conjunctim in quibuslibet occurrere hyftericis; quin potius pro differenti mali gradu atque vehementia nunc eorum pauciora & mitiora nunc plura & graviora observantur. petentia & ommun return f

adpetions vagus frequenter abfurdus, conjunctis fimal pertings

e0.2

bas vomendi constibus. Mox faccedit delor teafer as lam-S.IL. tius extrations diffenditer, .Jef dergque acris ille no notabine

frigor regionem lumbarem in invitencis quardonue opennana

Multum fane convenit affectus nofter cum virorum pathematibus hypochondriacis, & mitior ejus gradus a malo fic di-Eto hypochondriaco parum vel nihil differt, unde etiam a nonnullis recentioris ævi medicis pro uno eodemque cum hoc affectu habetur. Sic utrasque has paffiones confundunt Higmorus, Sylvius, Sydenham aliique, qui si aliquam faltem admittunt differentiam, ea tantummodo fexum respicit, ita ut pasfio hypochondriaca ad potiorem, hyfterica ad fequiorem reftringatur, de reliquo autem utriusque indolem ac naturam pro una eademque habendam effe cenfent. Exinde autem potiffimum natus videtur error plurimorum auctorum utrosque hos affectus confundentium quod in determinanda mali hyfterici genuina fede atque prima origine hallucinati funt, dum nempe illam in ventriculo, pancreate, mefenterio, vena portæ perperam quæsiverunt, nec quidem in mentem illis venerunt illæ afflictiones quæ specialissime circa uterum & ejus partes in hystericis occurrunt. Quod fi utrosque hos affe-Etus accuratius confideramus & ad fe invicem comparamus, magnam fane inter illos intercedere differentiam deprehendimus. Quamvis enim nonnulla modo recensitorum fymptomatum utrique morbo convenire videntur, in quovis tamen diversam & peculiarem agnoscunt causam. Sic in utroque morbo respirandi observatur difficultas, sed in hypochondriaco ab inflato ventriculo & liberam diaphragmatis actionem impediente, in hysterica passione vero a violenta illa musculorum abdominis compressione & contractione. Symptomata infuper nonnulla cuivis malo propria magnam difcrepantiam oftendunt. Hystericæ fæpius & de improviso infultibus fyncopticis corripiuntur gravioribus & fatis diu durantibus, cum globi ex imo ventris ad fuperiora afcendentis fenfu & vehementiffima faucium constrictione ac strangulatione quod in hypochondriacis non observatur. Musculi abdominis & un bilicus in mulierculis hyftericis vehementia fpasmorum introrfum retrahuntur, in hypochondriacis a flatibus venter po-A 3 tius

14.5.5

6

tius extrorfum diftenditur, nec denique acris ille ac notabilis frigor regionem lumbarem in hyftericis quandoque occupans in malo hypochondriaco obfervatur. Alius præterea folet effe mali hypochondriaci in morbos alios transitus, alius vero hyfterici, illud frequentius in melancholiam, fcorbutum, febrem lentam atque morbum nigrum abit, hoc vero in febrem acutam, fyncopen lethalem, epilepfiam & furorem uterinum infelici eventu terminari folet. Anatomica denique fectio corporum utroque hoc malo defunctorum infignem prodit differentiam, dum fcilicet in hypochondriacis vifcera abdominis, hepar, lien, atque pancreas indurata, fcirrhofa & male affecta ut plurimum deprehenduntur, cum e contrario in hyftericis vitium atque labes potius in utero & ovariis reperiatur.

# rici genuena fede acque pi la lorigine hallucinari funt, dam

Quod ad naturam attinet hujus affectus, fi quis alius certe nofter fummo jure ad paffiones generis nervofi convulfivas referendus mihi videtur. Nulla enim fere in tota machina noftra animali eft pars vel nervofa vel fibrofa, quæ non vehementifimis & plane effrænatis convultionibus & fpasmodicis constrictionibus exagitetur & torqueatur, de quibus fatis teftantur alvi ftrictura, suffocatio & constrictio faucium, umbilici retractio, cordis palpitatio, animi deliquia omniaque illa jam fuperius S. I. enarrata fymptomata. Paffionum hyftericarum primam origiuem fi spectemus, cum Medicis antiquiffimis & cum celeberrimo Hoffmanno mihi perfuadeo primam illarum fedem in utero effe quærendam, unde propter exquifitiffimum quo uterus cum cæteris visceribus imo cum toto genere nervolo gaudet confenfum, spasmi in utero originem agnoscentes ad alias partes propagantur & extenduntur. Anatomicam uteri & partium ad ipfum spectantium hic quidem exhibere defcriptionem minime mihi est animus, sed sufficiat faltem indicaffe fingularem uteri cum vena portæ & hinc ejus cum omnibus fere abdominis visceribus confensum (vid. Winflow. com. IV. p. 64. & 65. §. 617. & 618.) unde fit ut fanguis propter fpa-

spasticas constrictiones in utero vigentes ad partes vicinas regurgitare cogatur, & fic uteri male adfecti vitium ob labis communionem mox & fentiant reliqua abdominis viscera. Nec minoris momenti mihi effe videtur nervorum uteri confideratio, quos accipit uterus a lumbaribus, a nervo offis facri & ab intercostali de quibus vid. Winflov. tom. III. p. 66. S. 623. quæ omnia fatis luculentam fymptomatum §. 1. recenfitorum fuppeditare videntur rationem. Spasmodicæ scilicet uteri affe-Etiones statim fe diffundunt in lumborum nervos, indeque ob confenfum medullæ fpinalis nerveas membranas fucceffive occupantes, latius & ulterius fe extendunt, ex quibus facillime explicari poffunt moleftæ illæ quæ circa regionem dorfi & lumborum sentiuntur tensiones ut & abdominis durities, alvi conftipatio, umbilici retractio &c. Sic etiam iidem spasmi diaphragma nervos intercostales ipfumque par vagum petentes difficillimam & cum fuffocationis metu conjunctam efficient refpirationem, unde impedito libero fanguinis circulo, cordis palpitationes, animi deliquia, atque turbato ejus per cerebrum motu deliria mentisque pro tempore inducuntur alienationes.

para, alba, cellulofa & aby I adile ; in vera internam ovarii

externam non multum uteri fabrices eit ablimilis, ell chim fii-

-my sounds hon

Exposita igitur mali hysterici indole atque sede, jam ad caufas accedamus eruendas quæ dirum huncce affectum producere possent. Duplicis autem eas, potissimum esse generis cum superius laudato Hoffmanno mihi persuadeo. Vel enim 1°. humor aut lympha ista coagulabilis quæ in mulierum reperitur ovariis, vel 2°. cruor menstruus, uterque ex stagnatione & diuturniori mora corruptus atque vitiatus, tantas in tota nostra machina animali nervosarum partium turbas excitare posse videtur, quæ binæ causæ duplici iterum ratione hysterica ista pathemata producere possent. Non minus enim humor iste seminalis, quam iste fanguis stagnans & subsistens vel teterrimos & systemati nervoso infensissimos generat & emituit vapores, quorum quanta stagnanta in immutandis & invertendis dis motibus ad machinæ nostræ occonomiam confervandam & fustentandam necessaris, statis constat, & de quibus legi meretur Hoffin. vel vasa distendendo & distrahendo magnam in partes membranaceas ac nerveas exferunt violentiam, ex quarum vellicatione & irritatione necessario vehementissimi oriuntur spasmi per totum genus nervosum se dissuante distributer. Ut vero eo clarius pateat mens nostra & eo evidentius appareat ex quo jure lympham nutritiam stagnantem & cruorem menstruum in utero retentum, tanquam causas passionum hystericarum accusamus, unamquamque harum causarum sigillatim examinabimus & accuratiori indagatione perlustrabimus.

explicari pollunt molellas ille que circa regionem dorfi de lumborum fentiuntur tentiones N de 12 dominis durities, alvi confiloatio, umbilici retrachio dec. Sic etum iidem foasmi dat-

Ut igitur eundem quem jam fecuti fumus fervemus ordinem, primo nobis erit dicendum de lympha in overiis stagnante. Ovaria corpora funt oblonga utrimque compressa in duplicatura ligamenti lati retro tubas fita, cum ipfis tubis mediante ligamenti lati expansione conjuncta. Quod ad fabricam attinet externam non multum uteri fabricæ elt abfimilis, eft enim ftipata, alba, cellulofa & absque adipe; fi vero internam ovarii faciem spectemus bullas reperimus vel vesiculas rotundas lympha coagulabili refertas, in fæminis viro maturis magis turgentes quam in junioribus, Affirmat Clariffimus Hallerus plerumque ante conceptionem intra aliquam ovarii veliculam nafci coagulum flavum fæpius a fe vifum quod valde auctum. evanescente membrana vesiculæ, in corpus abit hæmisphæricum, acinofum, luteum, intus cavum in qua cavitate fecundum iplius fententiam continetur ovulum, five membranula cava minima, fedes futuri hominis. Simul ac pubertatis annos attigit puella circa fecundi plerumque vitæ feptenarii finem vel paulo ante, quo eodem tempore femen virile generari incipit, nova etiam in feminis contingit mutatio. Sicut enim illo tempore major in maribus ad teftes pro fecernendo femine & erigenda genitalia observatur affluxus, ita pariter in femellis, ma-

major fanguinis quantitas versus uterum congeritur, ad ovum fi adeft fæcundandum, in cujus defectu per vias menstruas iterum ex corpore eliminatur & removetur. Sic etiam copiofior ille humorum tunc temporis ad loca uterina contingens affluxus mammarum producit efflorescentiam, pilos expellit hactenus latentes, clitoridis auget incrementum, plexus vaginæ cavernofos dilatat & veneris excitat appetitum. Nec filentio prætereundus mihi videtur mirificus ille mutuus ac plane fingularis qui statim a pubertatis termino in utroque fexu obfervatur, animi cupiditatum cum majori humorum ad partes generationi dicatas determinatione, nexus; quo efficitur fimul ac ab objectis venustis in anima veneris excitantur defideria. ut protinus etiam major fanguinis & humorum ad partes genitales infequatur affluxus & vice quoque versa quando humores majori in copia ad organa procreationi infervientia aguntur, illico veneris accendantur ftimuli. Quando igitur quacunque demum ex caufa humores magis ad uterum & ovaria determinantur, & vel ob folidarum partium vitium, vel ob ipfius fluidi conditionem lympha nutritia ibidem stagnat & corrumpitur caulam habemus ingenerando malo hysterico sufficientem. Quod equidem affirmant testimonia illorum, qui corpora hocce affectu defunctarum diffecuerunt. Hystericarum ovaria fæpe pila grandiora & modo luteo, modo alio graviter olente humore referta a se inventa fuisse scribit Vesalius Lib. V. de humani corporis fabrica. Cap. XV. Binningerus Cent. II. obf. XL. ait fe in hystericis vafa spermatica & tubas valde turgidas, atque ovaria craffo, albo, & ex parte indurato humore inftar steomatis repleta dimidiæ libræ deprehendiffe. Riolanus anthropol. fuæ Lib. 2. pag. 35. ovarium pugni magnitudinem exfuperans induratum fe vidiffe refert. Manageta in M. N. C. D. 1. a. 1. obferv. XXXII. uterum turgidum & ovaria materia feminali corrupta cafeo recenter coagulato non absimili infarcta a fe vifa notat. Et Diemerbroekius Anatom. Lib. I. de ventre inferiore Cap. XXIV. fe plerumque in hystericis uterum excedentis magnitudinis, in eoque liquo-B rem

10

rem quendam æruginofum croceum aut flavefcentem reperiffe teftatur.

for file humorum tune tertpVis is ice eterine contingent

Altera nobis adhuc explicanda reftat mali hyfterici caufa, quam diximus effe fanguinis menstrui in utero recentionem & propter longiorem ibi moram contractam corruptionem. Difficiliorem fanguinis per uterum fieri circulationem constat 1°. ex ipfa uteri fabrica valis pleniffima quæ mirifico inter fe contorta funt modo. 2º. ex ipfa vaforum natura, dum arteriæ quidem peramplæ funt, venæ autem pro portione minus latæ eæque firmioris texturæ quam alibi, quo 3°. accedit quod valvulæ in iisdem non reperiuntur nifi paucæ in fpermaticis, unde fit ut fanguis ad uterum delatus fatis difficulter per venas redeat. Hinc aliis adhuc accedentibus caufis quarum mentionem faciemus in sequenti §. non potest non sublistere sanguis in utero, qui fi diu ibi moratur in corruptionem abit & alteram fic mali hyfterici conftituit caufam. Non autem femper requiritur ut fanguis in utero stagnans ibi corrumpatur, & per longiorem temporis moram ibi fublistendo putrescat, fufficit aliquando folus fanguinis menstrui per vafa uterina impeditus circuitus quo fit ut propter turgida & cruore distenta vasa, fibræ uteri nerveæ ad spasmodicas proritentur stricturas, ex quibus ulterius ad alias partes nervofas delatis & propagatis omnes malo hyfterico propriæ calamitates nafcuntur. Nec minori aliquando jure iftæ uteri paffiones nimiæ fanguinis inopiæ vel vaforum inanitioni, quam eorundem repletioni & excedenti humorum quantitati mihi videntur tribuendæ. Corpus enim fanguine hinc etiam viribus exhauftum ob circulationem minus vegete fuccedentem nec non dejectum vaforum robur, & non parum imminutas excretiones, omnibus fere patet spasmodicis afflictionibus, quæ fiquidem ad interiora convertuntur, non prius cellant donec aut naturæ energia aut artis præsidio, turbatæ excretiones revocatis motibus reftituantur, quod ex illarum apparet exemplo, quæ, post perpessas largiores ab abor-

abortu hæmorrhagias, aut post immodicum & diutius perfeverantem lochiorum fluxum leviori caufa externa accedente in paffiones incidunt hystericas. Quamquam autem frequenti conftet experientia, virgines quando inftat pubertatis terminus, ob difficiliorem fanguinis perruptionem & inde fubfequentem vasorum distensionem gravislimis multari passionibus hystericis, quod idem etiam fæminis evenire folet in quibus vel parcius fuccedit vel nimis præmature ceffat menstrua excretio, neutiquam tamen criticam hance evacuationem vitiatam aut turbatam femper tanquam mali hyfterici caufam proximam acculandam effe existimo, siquidem nota sunt exempla virginum non minus quam fæminarum ætate provectarum quæ pertinaciter laborarunt malo hysterico quibus tamen menses fatis liberaliter profluxerunt. Sæpius interim observamus & quidem maxime in fenfibilioris naturæ fubjectis, repentinam purgationis menstruæ suppressionem gravislima post se trahere pathemata hysterica quin etiam aliquando epileptica. Notandum denique eft quod fanguinis menstrui turbata excretio, aliquando mali hysterici potius sit effectus & symptoma quam ejusdem caufa; interdum enim evenit ut fub ipfo malo hyfterico fluxus iste faluberrimus turbetur & supprimatur ob infensissimam illam spasmorum naturam & indolem quæ omnis generis excretiones pervertit & fufflaminat.

#### I.I.V. Non Se fuccedens in paerperis

Jam a nobis postulare videtur ordo & instituti nostri ratio ut causas exponamus quæ cum illis quas in præcedentibus indicavimus §. ad nostrum affectum ingenerandum simul concurrunt. In genere autem dicimus omnia ista quæ 1°. copiosiorem sanguinis & liquoris genitalis ad loca uterina affluxum excitare, aut 2°. sanguinis menstrui eruptionem atque excretionem sistere aut impeditiorem reddere valent, optimo jure ad hanc classem esterenda. Ex censu illarum causarum quæ fanguinem & lympham nutritiam majori in copia ad loca uterina determinant statim fe nobis offert temperamentum fangui-B 2 neum neum atque cholericum, tenerior corporis habitus, ætas conjugio opportuna, denegatus antea autem affuetus concubitus. diæta lauta, vinofa, exæstuans, gravior corporis commotio, exagitatio, vel refrigeratio, vehementiora animi pathemata præsertim suppressa, curæ, solicitudines, animus jucundarum phantafiarum delectatione fe depascens & denique pro fingulari fubjectorum idiofyncrafia fuaveolentium & fragrantium odor. Et hæc quidem funt præcipua quæ nobis circa hanc primam caufarum speciem notanda occurrunt. Complura horum fecundæ etjam caufarum claffi funt communia, adhuc in specie accedunt nimia sanguinis & humorum abundantia, eorumdem fub vita deside, sedentaria & minus laboriosa inspissatio, vi-Etus nimis opiparus, craffus acidus & flatibus ingenerandis aptus, quæ omnia tardiorem sanguinis & passim impeditum circuitum inducendo, partesque folidas debilitando ad mali hyfterici generationem haud parum conferunt. Huc quoque pertinent graviora animi pathemata mœror, terror, iracundia corporis refrigeratio infignior, præsertim fi fluxui uterino aut gestationi superveniunt, errores in diæta & regimine circa illud tempus committi, usus calidorum, expansivorum, nervosque vel interno ufu vel folo percepto odore graviter afficientium ut ambræ, zibethi, moschi imo aliquando rosarum aliarumque florum jucundum odorem spargentium. Denique etiam ad malum hystericum disponunt crebriores abortus, molæ, hæmorrhagiæ infigniores, non rite fuccedens in puerperis lochiorum fluxus, nec non perversæ medicationes, dum fub qualicunque prætextu vel menfes pellendi, vel cruditates in ventriculo & primis viis hærentes eliminandi, fæmellis tenerioris ac fenfibilioris texturæ, fanguineo-cholericæ constitutionis fortiora efferuntur emmenagoga, purgantia aut vomitoria, quæ non folum horum vifcerum tonum magis dejiciunt. fed etiam spasmos excitant vehementiores inæqualem & impeditum humorum circulum inducentes, & maxime in uterum propter minorem quam ibi inveniunt reliftentiam vim fuam atque fævitiem exercentes.

§. VIII.

#### S. VIII.

Ex his igitur fatis patet quænam fint fubjecta malo hylterico præ aliis obnoxia. Potifiimum nempe adgreditur affectus nofter virgines & fœminas animo ac corpore teneriores fanguinis & fucci plenas. Virgines imprimis in hunc morbum incidunt instante prima mensium eruptione, fed eo etiam corripiuntur licet non suppressi fint menses maxime fi victu utuntur calido, vino nempe generofo multisque delicatis ferculis venerem excitantibus, fi in otio vivunt & gravioribus animi pathematibus vehementique & diutius inhærente defiderio aut amore vexantur. Plerisque autem hæ contingunt afflictiones intra annum XL. & L. ubi menfes ceffare incipiunt, vel ubi parere & utero concipere defierunt, præfertim fi neglectæ fuerunt afluetæ fanguinis ventilationes. Non raro mulierculis supervenit hicce affectus ex uteri labe maxime per frequentius puerperium, infelicem abortum, malum in puerperio regimen nec non molæ aut polypoli concrementi in utero generationem. Familiaris præfertim eft fæminis quæ mobile habent genus nervolum, ad animi affectus funt proclives quæ molliter educatæ vitam agunt fedentariam & hanc ob caufam. vitiofa & imperfecta laborant digeftione & chylificatione. Non adeo frequenter e contrario occurrit in mulieribus plebeiae fortis, robuftis, laboriofis & phlegmaticæ conftitutionis, nec adeo graviter hæ diro hocce affectu convelluntur & discruciantur, sed potius in crebriora incidunt animi deliquia.

#### §. 1 X.

Poftquam igitur pathologice noftrum morbum confideravimus, fupereft ut ejus curam & medicationem fubjungamus. Ad curam mali hyfterici rite adornandam maxime neceflarium eft ut medicus qui illam fufcipit non folum folicite caufas eruere ftudeat quæ fæviffimum huncce affectum producuut atque fovent, quo accommodata illis apponere poffit auxilia, fed B-3 etiam etiam ut accuratiffime cognitam & perspectam habeat individui ægrotantis naturam atque indolem, quæ tantopere aliquando inter fe differt ut idem remedii genus quod in uno fæpe fubjecto falutarem edit effectum in also nullum omnino adferat levamen imo interdum quidem non leve excitet damnum. Eundem autem in therapeutica postri affectus tractatione fervabimus ordinem quem antea in pathologica ejus fecuti fumus confideratione. Quod fi igitur primæ caufæ nempe liquori feminali in utero & ovariis stagnanti juxta §. V. suos debet natales, tunc maxime quidem eo ftudendum est ut humori retento quocunque modo exitus inveniatur. Maxima & præcipua in hoc cafu a diæta convenienti exfpectanda videtur utilitas, quapropter ex cibis proferibantur omnes craffiores, calidiores, frixi, placentæ ac panificia, ova dura, vina dulcia, potus commendetur dilutior, sufficiens, motus corporis placidus continuatus, pediluviis tepidis ante cubitum adhibitis fanguis ad inferiora invitetur & denique aër frigidus & humidus interdicatur. Quod fi nondum profluxerunt aut fuppreffi funt menses profunt blandiora emmenagoga prudenter exhibita. Quem in finem commendari poteft infuf. per epicrafin laxans verfus novilunium exhibendum quod concinnari poffet ex Rad. Vincetox. Pimp. alb. Polypod. Levift. Gram. Hb. Marrub. alb. Adianth. aurei. Meliff. Artemif. rubr. Abrotan. mont. Fl. Cheiri, Bellid, min. Bacc. lauri. Semin. fœnic, adjecta radice Bryon. aut Rhabarb. Fol. f. f. f. Croc. orient. aut Borrac. venet, cum quo fimul conjungi poteft ufus pillutarum balfamicarum Hoffmanni vel Stahlii aut aliarum ad illarum imitationem fequentem ferme in modum paratarum, g. Extract. abfynth. Cent. min. Card. bened. Cochlear. Fumar. Helleb. nigr. ana Drachm un. Aloës rofat. vel violat. Drachm. unam cum dimidia. Gummi Heder. Juniper. Myrrh. elect. Therebinth. coct. ana Drachm. unam ex quibus cum Eff. abfynth. fimpl. fiant pillulæ grani unius. Egregii etiam funt effectus pillul. Becherian. quarum genuinam compositionem in Dispensatorio invenies brandenburgico fub titulo pill. polychreft. item in Frauendorferi tabula Imaragdina, pag. 286, Nº. 475. Ad fedan-

dandas spasmodicas abdominis stricturas convenit Mixtura leniens & antifpafmodica e. g. ex Effent. cortic. aurant. Liquor. mineral. anodyn. Hoffmanni partibus duabus & Eff. caftorei & Liqu. Cornu Cervi fuccinati parte una, nec minus egregie fe habet Aqua chamæmeli composita pharmacopææ Bateanæ ad cochlear unum fubinde exhibita. De reliquo alvus interdum subducatur, & servetur aperta non fortioribus quidem purgantibus, fed leni potius atque blando clyftere. rhabarbarinis, ac passulis corinthiacis. Denique ut & ventriculus per confensum in hoc morbo afflictus & debilitatus roboretur & bonæ infimul ac laudabili studeatur digestioni & chylificationi Eflentia præscribatur post pastum sumenda ex ftomachicis & carminativis hunc fere in modum adornanda. Be Effent. Gentian. rubr. Galang. Trifol. fibrin. Centaur. min. Effentiæ aromaticæ Wedelii ana Drachm. unam & dimidiam Spiritus Nitri dulc. Drachm. unam. m. vel B. Comar. Abfynth. Summitat. Cent. minor. Hb. Card. Bened. Tanacet. Trifol. fibrin. ana. manip. unum, Cortic. aurant. recent. Cortic. Cascarill. ana drachm. fex, Cinnamom. unc. dimid. Cardamom. drachm. duas, quæ concifa contufa infunde cum fpiritu vini rectificatiflimo ad trium digitorum eminentiam & blanda digestione extrahe. Sic habebis effentiam stomachico carminativam cujus pro dofi guttæ XL. & ultra egregio cum effectu & falutariter porriguntur. Si manifelta urget plethora & venæ fectionem expofcit, in pede potius inftituatur quam in brachio ob majorem humorum derivationem, fi vero illam inftituere non confultum fuerit vifum, ad eundem fcopum pervenire licebit fanguinis confumtione & eliquatione, fed opus est ægroto patiente & rectis ac bonis confiliis locum permittente. De reliquis autem auxiliorum generibus in fequenti fufius & uberius agemus J. Monendum adhuc reftat aliquando nullis nec optimis ex pharmaceutico fonte petitis præfidiis cedere hunc affectum, imo nonnunquam plane ab illis exacerbari. Quæ fi ita fe habent, unicum superest a conjugio exfpectandum auxilium, cujus fummam ad fanandum noftrum morbum vim atque virtutem præter celeberrimorum virorum tefti.

testimonia atque auctoritatem experientia atque ratio egregie commendant. Hujus enim beneficio, liquor feminalis stagnans excernitur, humorum motui a genituræ virilis spiritu novum veluti conciliatur robur, & partibus etiam folidis debitus & conveniens reftituitur tonus atque vigor. Jubet hanc ob caufam Hippocrates ut virgines quæ noftrum affectum patiuntur quam citiffime viris cohabitent & conjugium tanquam præstantissimum adversus hoc malum remedium commendat in libro de virginum morbis, Cap. III. Valescus de Tarant. philon. pharm. Lib. VI. Cap. X. fi fiat, inquit in virgine affectus propter retentionem spermatis, nubat illa & morbum effugiet. Legi quoque merentur notabiles & infignes quas in fananda paffione hyfterica deprædicant & observationibus confirmant vinculi matrimonialis virtutes Duretus in enarratione ad caput LIX. Hollerii, & Zacutus Lusitanus prax. medic. admirand. observation. 91. Plurima etiam passim in Hoffmanni confultationibus medicis invenies exempla. Interim tamen & illis quibus malum jam inolevit & diuturnitate inveteratum eft confilium hocce non femper fufficere ad falutem & fanitatis recuperationem crebra experientia docet.

#### 6. X.

Accedimus jam ad caufam mali hyfterici fecundam impeditam nimirum cruoris menstrui per vafa uterina circulationem. vid. G. VI. Circa autem mali noftri tractationem ac curationem, alia quidem funt fub ipfo paroxysmo in auxilium vocanda, alia vero extra illum adhibenda. Totus enim medelæ ac curationis in eo versatur cardo, ut medicus sæviente paroxysmo mali ferociam mitigare studeat, id quod efficit per topica & antifpasmodica, imo aliquando per anodyna, tempore autem intermiffionis caufas quæ hunc morbum excitaverunt & in præfenti fovent atque fustentant, corrigere & removere, laudabilem reftituere chylificationem, & influxum liquidi nervei blande provocare allaboret. Dispiciamus igitur primo quid præfente paroxysmo tentandum fit medico, videbi-

bimus deinceps quid superato illo ipli moliendum reftat. Commodam & efficaciffimam in ipfo paroxysmo hyfterico præftant operam ad infringendam & imminuendam mali ferociam graveolentia atque fœtida naribus admota, ut afa fœtida, caltorina, fumus plumarum perdicum, quæ remedia mulierculis familiarisfima & fatis nota hystericas sæpe moribundis similes ex profundo quafi fopore ad fe revocant. Egregie etiam spirituofa conveniunt naribus applicata, nec non volatilia & urinofa, ut fal volatile ammoniacum, aqua hirundinum acida, similiaque, institutis simul frictionibus, cum pannis asperioribus circa præcordiorum regionem atque in plantis pedum. Horum enim beneficio languens & propemodum exftinctus humorum reftituitur circulus, ipfaque falina ac fpirituofa fubtilitate fua in membranas cerebri nervofas penetrantia, illasque irritantia, toto generi nervolo novum quali vigorem exhibent ad expediendam & liberiorem reddendam vim fystalticam in paroxysmo oppressam. Pro puerperis affectu nostro laborantibus abdominis commendatur cum cingulo ex corio moscovitico compressio, cujus odor hystericis valde amicus ac jucundus effe dicitur. Magnum porro adfert levamen alvi cujus pertinaciffima obstructio cum passione hysterica vulgo conjungi folet, leni & blando ex carminativis & uterinis parato clystere facta subductio. Quod si autem spasmorum atrocitas ob stricturæ vehementiam clysteres non admittit, præmiffis fomentationibus injectio oleofa tepide calefacta cum fyringa applicetur, ex oleo lini, chamomillæ vulgaris, liliorum alborum, pinguedine castorei, axungia taxi, impetrata vero aliqua relaxatione clyster injiciatur, & tamdiu repetatur donec mitigati fuerint spasmi. Nec in atrociori cafu fructu fuo carent emplastra ex graveolentibus, v. g. ex opponace, fagapeno, afa fætida, galbano & oleo castorei parata abdomini impofita. Sic etiam in ufum vocari poflunt linimenta ex antihystericis & oleis relaxantibus composita quæ imo ventri illita, fuperimpofitis dein vel facculis paregoricis, vel linteaminibus calidioribus infignem sæpe exferunt efficaciam. Interdum quoque utiliter adhibentur peffi uterini ex oleo nuciftæ ex. TELI-

expresso & Zibetho vel moscho confecti. Magnopere laudant antiquiores medici fuaveolentia utero immissa ut moschus, zibethum, Styrax & Benzoe, item fuffimigia ex illis parata, atque ex illorum ufu craffi & putridi ex utero humoris effluxum fecutum effe notaverunt. Denique & venæsectio si præsto sit fanguinis notabilis abundantia mirum in modum spasmorum & convultionum infringit vehementiam atque præfentaneum aliquando adfert levamen. Illa vero præfertim in ufum vocetur, in feminis 'aut virginibus plethoricis quæ ex menfibus repente vel per prægreffum terrorem vel aliam quamcunque ob causam cohibitis in passiones hystericas incidunt, & fine fenfu ac motu, spiratione intercepta, decumbentes, faciem oftendunt valde rubicundam & apoplecticarum inftar tumidam, Tantoque magis in hoc affectu postulatur venæsectio si infuper ægrotæ huic fanguinis evacuationi affuetæ illam fortaffe neglexerunt aut omiferunt. Largior autem pro ratione abundantiæ fanguinis effe debet, & fæpius aliquando repetenda. Præter innumera hyftericarum exempla quæ vehementisfimis spasmis correptæ & exagitatæ sola instituta sanguinis missione protinus ad se redierunt, etiam complures veterum medicorum venæfectionem ubi affectus a nimia humorum abundantia & menstrui fluxus retentione fovetur, tanquam omnium præsentissimum & efficacissimum deprædicant remedium, illudque fæpe omnibus cæteris palmam longe præripere affirmant. Ex horum numero funt Panarollius in jatrologismis, sententia II. observ. 30. Higmorus Libr. de passione hysterica, Hoechstederus Dec. IV. Cafu II. Riverius, Septalius, Mercatus & Rodericus a Castro multique alii. Mitigata ficaliquantum mali ferocia & quiescentibus jam spasmis vehementioribus, superest ut Medicus causas diri hujus affectus removere & eradicare studeat. Huic scopo ut satisfaciat, opus est ut ante omnia primas vias a fordibus & impuritatibus quibus plerumque scatent & quæ eo magis augentur quando sub paroxysmo graveolentia & anodyna liberaliori manu exhibita fuerunt, remediis convenientibus expurget & liberet, secundo. ut fanguinis & humorum motum per antispasmodica & diaphoreti-

retica æquabilem reddat & ad exteriora revocet, gio ut menfium fluxum, five ejus vitium hujus morbi caufa exftiterit, five fub ipfo morbo critica hæcce excretio turbata fuerit in ordinem redigat, 410 denique cum hoc malum facile redire vel in alium morbum chronicum degenerare foleat, ut partibus afflictis robur & tonum fuum reftituat, & per accommodata nervina & roborantia debilitati ex morbo remanenti confulat. Ad primas officinas a faburra vitiofa & impuritatibus poft morbum reftitantibus liberandas, alvus expurgari poteft per blanda falina, in usum fimul vocatis abstergentibus & incidentibus. Huic fcopo conducunt fal anglicanum fal ebfonienfe, abfynthii & fimilia. Illis vero qui falina respuunt, propinari poteft rhabarbarum, rheum, fyrupus cichorii cum rhabarbaro, folia fennæ fine stipitibus aut ejusmodi blanda & lenia laxantia. Maximam autem præ reliquis laudem merentur pillulæ balfamicæ quas in fuperiori commendavimus §. becherianæ aut stahlianæ vel cum hisce convenientes, quibus si stimulus defideratur pauxillum addi poteft extracti panchymagogi Chrollii. Nec incongruæ quoque funt pillulæ de fuccino Cratonis, tartareæ Schroederi, marocoftinæ aliæque ejus naturæ. Robuftioribus subjectis sequentes possunt propinari ne Extracti Fumariæ, Card. bened. ana. Drachm. duas, Milleped. fcrupulos duos, Refinæ Jalapp. Drachm. dimidiam, Gummi ammoniaci fcrupulos duos, Cinabaris factitiæ fcrupulum unum. ex quibus fiant pill. grani unius, quarum pro ratione fubjectorum XV-XX. pro dofi porrigantur. Hisce remediis ad alvum apertam fervandam, & novam fordium generationem præcavendam, femel vel bis per octiduum prout postulat neceffitas uti poffunt ægrotæ. Juvat quoque interdum ufum digestivorum interponere atque absorbentium vel eundem laxantibus præmittere. Quod ad fecundam noftram attinet indicationem, liberam scilicet & æquabilem circuli humorum reftitutionem atque falutaris fub morbo fuppresse perspirationis revocationem, notandum eft, sponte nonnunquam folius naturæ beneficio folvi hyftericas affectiones per fudorem largiorem. Cum vero in affectu nostro ficut in omnibus spasmodi-C 2 . cis

cis omnis generis excretiones infigniter turbantur & fufflaminantur, & fæpiffime idem a caufis externis provenire folet ut ab admisso frigore, unde præsertim in subjectis sanguine copiofo & impuro fcatentibus, ad internas partes compulfus fanguis varias efficit congestiones, pro quarum diversitate, differentes etiam observamus spasmodicas atque convulsivas nec non aliquando epilepticas afflictiones; fatis utique patet quanta ab illis præfidiis exfpectanda fit utilitas, quæ virtute fedativa & fimul diaphoretica gaudentes, humorum circulum ad externum corporis ambitum dirigunt, & fic reftituta liberiore perspiratione feri vitiosi & impuri difflationem adjuvant. Ex horum autem classe præ aliis commendari merentur, omnia illa que ex regno animali defumta fulphure anodyno blando vaporofo prædita, aridam & ob fpasmorum vehementiam exfuccam cutim ejusque coarctatos & angustatos tubulos, aperiendi & laxandi vi pollent. Hujus indolis funt Spiritus cornu cervi vel eboris per rectificationem depuratus, liquor cornu cervi fuccinatus, fpiritus tartari rite præparatus, fpiritus Bezoardicus Buffii & fimilia, quæ remedia in refracta dofi exhibita & aliquando infuper pro circumstantiarum ratione cum effentia croci, castorei, vel cum aliquot laudani liquidi Sydenhamii guttulis remixta egregium exferunt effectum. Si vero magis pulverum arridet forma, iidem parari poffunt, ex blandis antispasmodicis & bezoardicis, qualia exhibent offa cornua ac dentes animantium ufta & philosophice præparata, eorundemque lapides, falina porro & nitrofa, præparata antimonialia, ut antimonium diaphoreticum, ceruffa antimonii. ejus magisterium, cinnabaris nativa, factitia, antimonii, quibus etiam pulveribus ad augendam vim eorum antifpasmodicam, fi neceffitas postulat, castorei, massa pillularum de cycynogloffa, de ftyrace, Starckeyanarum vel Wildeganfianarum unum alterumve adiici poteft granum. Jam ordine devenimus ad tertiam nostram indicationem, quæ lad negotii menstrui respicit vitia. Maximum fane tum ad præcavendum quam ad curandum noftrum affectum in faluberrimæ hujus evacuationis, quando modo, quantitate, tem-ET3 .

tempore peccat, plane deficit aut vi quadam cohibetur. expeditione & revocatione politum est præsidium. Quamvis autem plurima ad hunc fcopum obtinendum fuppetunt auxiliorum & remediorum genera, attamen cum menftruæ excretionis vitia a multiplicibus & diversis provenire poffunt caufis, facile patet quantis vitiatæ hujus' evacuationis revocatio & restitutio sape prematur difficultatibus. Pro diversa etenim natura caufarum quæ negotii menstrui induxerunt turbationem & quarum ratio habenda est exquisitissima, differenti quoque medicatione uti convenit. Quod fi igitur forte nimia fanguinis copia, quæ vaforum infigniter minuit tonum & elafticitatem, imminuti vel suppressi fluxus causa est, nullum tunc præstantius & efficacius sanguinis detractione datur remedium, quæ ut eo major fiat revulsio & derivatio in pede instituatur. Si vero e contrario potius a fanguinis & laudabilium humorum inopia, menfium provenit vitium quod in illis obfervamus qui largiores experti funt hæmorrhagias, quique fimul ob dejectum ventriculi atque inteftinorum tonum vulgo imperfecta laborant digestione & chylificatione; co potisimum anniti debet medicus, ut jusculis nutrientibus, alimentisque euchymis & gelatinofis fanguinis fubveniat defectui, & digeftionis ac chylificationis negotium per convenientia remedia adjuvet & in ordinem redigat. Nonnumquam vitiati fluxus caufam fubministrat prava humorum conditio & hinc provenientes vaforum obstructiones & infarctus, in quo casu maxima ab incidentibus, antiscorbuticis, & speciebus sic dictis per epicrasin laxantibus exspectanda est utilitas. Hoc nomine commendari merentur infusa ex emmenagogis specificis parata & jam in antecedente §. laudata, item decocta ex radicibus atque herbis, aperientibus & uterinis, addito levi quodam ftimulo ut boracis vel croci, concinnata, nec non laxantia balfamica versus menstruæ evacuationis periodum propinanda. Egregium quoque prudens aquarum mineralium usus offert præsidium, ex quibus pro interno Thermæ præfertim Carolinæ, pro balneo vero & externo usu Tæplicenses omnibus fere cæteris palmam præripiunt. Priores enim humores lentos & vifcidos C 3 in-

incidunt, refolvunt, & evacuant, atque tubulos minimos referant, posteriores vero stricturas spasticas mitigant & sic impeditum humorum optime expediunt circulum. Si a tubulorum spasmodica confirictione cruoris uterini remoratur & impeditur effluxus, omnia illa quæ demulcendi & mitigandi vi pollent, exoptatifimam ferunt opem, cujus indolis funt millefolium, crocus, castoreum & quæ ex illis parantur, nec negligenda funt pediluvia, balnea, fotus & clyfteres. Quod fi denique a folidorum vitio, a fibrarum & vaforum dejecto robore atque tono provenit negotii menstrui ataxia, tunc optime fe gerunt illa quæ fale tenui volatili, & principio leni adstringente in fibras debiles agunt easque folantur, hujus generis sunt aromata calidiora, gummata, bdellium, sagapenum opoponax, myrrha, fuccinum, ex herbis meliffa, fabina, fatureja, rosmarinus, item baccæ lauri & juniperi, nec non martialia mitiora, tincturæ ex illis paratæ & falia volatilia. Atque hæc de tertia sufficiant indicatione. Restat adhuc quarta & ultima quæ jubet roborare partes sub morbo afflictas, illisque tonum fuum restituere, quo & debilitas adhuc remanens auferatur, & hoc ipfo novi infultus præscindatur metus. Eo vero inprimis respicere debet medicus huic indicationi fatisfacturus ut utero labefactato pristinum reddat tonum, & fimul bonæ digeftioni & chylificationi ftudeat. Utrumque hunc scopum iisdem remediis obtinere, & sic duos ut ajunt una fidelia dealbare licet parietes. Optime autem illa noftræ indicationi fatisfaciunt remedia, quæ principio fulphureo balfamico, vel terreo paulo fixioris naturæ, five faponaceo & amaricante prædita, humores lentos & viscidos incidunt & dissolvunt, vafa infarcta & obstructa liberant, simulque fibris a tono fuo dejectis, amissam vim contractilem & elasticam iterum conciliant. Ex horum cenfu præ aliis jucunda fe commendant efficacia balfamica temperata, ut myrrha, fuccinum, opoponax & fimilia & ex his ad modum Becherianarum vel Hoffmannianarum concinnatæ pillulæ, item extracta amaricantia & carminativa ut zedoariæ, cardui benedicti, abfynthii, fumariæ, corticum aurantiorum cum menstruo non nimis spirituoso in

in Elixirium redacta. Nec minori fe probant utilitate infufa ex herbis fic dictis uterinis & blande adftringentibus ut artemifia, ariftolochia longa & rotunda, matricaria, meliffa turcica & noftrate &c. Denique & chinæ atque cafcarillæ cortex. prudenter exhibitus, item tenuiffimi martis croci & effentiæ fcopo roborandi egregie fatisfaciunt & fæpiffime id præftant quod aliis non facile obtineri poteft remediis. Hæc igitur funt illa quæ quartæ noftræ indicationi convenire videntur, quæque affectus a labe vifcerum in malo hyfterico contracta provenientes optima ratione arcent. Supereft adhuc ut quasdam quæ circa mali hyfterici curationem occurrunt cautelas huic tractationi fubjungamus, id quod in fequenti faciemus paragrapho.

§. X I.

Primo autem omnium monendum mihi videtur, probe difcernendas effe individuorum ægrotantium naturas, adeo fæpe inter se differentes ut frequentissima constet experientia illa quæ ut plurimum in nostro affectu præsentislimam & exoptatiffimam ferunt opem nonnullis adeo contraria effe ut fymptomatum potius inde experiantur exacerbationem. Sic aliquando nonnullæ reperiuntur fæminæ quæ graveolentium tam externum quam internum ufum nullo modo ferre poffunt, qui tamen in quamplurimis hoc morbo ægrotantibus infigni fe commendat effectu. Aliis spirituofa, & illa quæ vulgo in graviori fyncope in auxilium vocari folent remedia nihil omnino adferunt levaminis, fed potius fola aquæ adspersione ad fe revocantur. Nec quidem unum idemque remedii genus quod femel in ægro profecit in alio tempore ipli prodeft. Non enim ubique & femper eadem partium nervofarum est conditio & difpolitio. Id quod observamus a balneorum, fotuum, nervinorum calidiorum nec non anodynorum & opiatorum ufu. Interdum quoque & quidem imprimis quando affectus eft hæreditarius, vel quando potifimum ab anomalia motuum quæ in confuetudinem abiit provenit & fustentatur, optima quælibet & huic malo tollendo alias fatis idonea remedia parum vel om-

omnino nihil proficiant, fed potius a mutatione ætatis, aëris, vitæ generis atque victus illud exspectandum eft quod in remediis ex pharmaceutico fonte petitis frustra quæritur. Licet vero remedia quæ in superioribus apposuimus paragraphis tempore fuo adhibita caufis mali hyfterici toliendis fatis fint accommodata, sunt tamen nihilominus circa rectum eorum usum cautelæ quædam obfervandæ quarum jam recenfebimus præcipuas. Quod igitur venæ fectionem attinet notandum eft illam fæpe quidem præfentaneam ferre opem, nonnumquam tamen eandem vel intempeltive adhibitam, vel largiorem aut crebrius repetitam plurimum nocere. Sic post graves & largiores hæmorrhagias ubi corpus fanguine & viribus exhaultum eft, nullum locum invenit fanguinis millio, quippe quæ spasmos a vaforum inanitione provenientes magis auget & exacerbat, congestionibus ansam præbet, vires pessundat & malum reddit pertinacius. Anodyna & illa quæ fopiendis motibus fpafticis & convulfivis conveniunt non equidem utilitate fua carent, dummodo non ante folutam plethoram & primarum viarum repurgationem exhibeantur. Summa vero in eorum ufu opus est circumspectione & prudentia quoniam liberaliori manu propinata infignem fibris debilitatem conciliando maximum inferunt damnum, neque nimium illorum usui est fidendum. quippe spasmos equidem ad tempus egregie mitigant, neutiquam vero ad materiam lædentem removendam fufficiunt. De falinis notandum est illa in fubjectis tenerioris texturæ paulo largiori & justo crebrius repetita dosi oblata sape effectum magis noxium exferere quam utilem. Stimulante enim fuo principio sensibiles intestinorum fibras & reliquas partes membranaceas fortius irritant atque stricturas spasticas hac ratione intendunt atque augent. Quapropter scopo alvum subducendi iis præferenda omnino videntur temperata balfamica quæ blanda fimul gaudent virtute roborandi. Balneorum & pediluviorum fingularis ad ftricturas spafticas relaxandas eft efficacia, fi vero paulo fuerint calidiora nimium quantum genus nervofum debilitant & paroxysmos non raro iterum revocant atque exacerbant ideoque non nisi temperata adhiberi debent. Notandum

dum quoque eft balnea & pediluvia dum aliquo modo humores commovent plethoricis effe infenfiffima & hanc ob rationem ante illorum ufum nimiam fanguinis copiam conveniente venæ fectione subtrahi debere. De roborantibus pauca adhuc mihi fuperfunt monenda. Quemadmodum maximus ex illorum ufu exspectandus est fructus, si ad partes debilitatas restaurandas & ad præscindendam recidivam cum judicio & prudentia porriguntur, ita e contrario longe maximum inferunt damnum quando ante spasticorum motuum cessationem vel fordibus impuris adhuc in primis viis hærentibus, item ante debite imminutam plethoram ejusmodi exhibentur remedia. Quippe enim caufam morbi non tollunt & materiam lædentem fi quæ adeft non subtrahunt, ad tempus tantum aliquando nonnullam sublevationis præbent speciem, re vera autem vel recidivam, vel novum eumque sæpe priori deteriorem morbum inducunt. Caute præfertim cum roborantibus est mercandum, quando neceffitas talia subjectis valde imbecillibus vel exquisitiore fenfibilitate præditis exhibere jubet, quippe facillime spasmos ad quos ejusmodi homines valde funt proclives iterum revocant atque exacerbant. Hinc uti in omni remediorum genere, leniora & mitiora remedia semper activioribus præferenda sunt, ita in præfenti cafu admodum hac cautione opus eft, nec unquam ad martialia & roborantia fortiora est descendendum ubi blandiora qualia funt temperata balfamica ad fcopum obtinendum fufficere videntur.

#### §. XII.

His igitur excuffis reftat ut paucis mali hyfterici tradamus prognofin. Conftat vero in genere de affectione hyfterica, quod licet vulgo maximum incutere foleat terrorem, attamen per fe raro fit lethalis, nifi forte imperita & imprudenti tractatione exacerbata fuerit vel a gravibus animi commotionibus & notabilioribus in diæta & regimine vitiis incrementa fumferit, vel denique corpora invaferit infirma & jam ante valetudinaria. Longe autem faciliorem adfectus nofter admittit fanationem quando in junioribus occurrit fubjectis ubi menfes D non

nondum penitus ceffarunt, quam quidem in annofioribus, interdum enim per largiorem fudorem, per folam menfium fupprefforum vel hæmorrhoidum eruptionem funditus tollitur. Pro bono & brevi fubsecuturæ morbi folutionis figno habentur fternutationes in ipfo paroxysmo fupervenientes, item prodeuntes copiosi ructus, magnum quoque ex flatuum eruptione levamen percipiunt ægrotæ. Affectus hystericus quando ex hæreditaria provenit dispositione remediis frustra oppugnatur. fibi relictus fub debito & conveniente regimine fæpe fua fponte cum ætatis mutatione, imo nonnumquam inito conjugio evanescit. Pertinacius redditur malum nostrum ubi vetustas accessit quo diutius enim durat & quo sepius recurrit eo magis chronica extimescenda sunt pathemata, quæ sæpius ipli fe jungere folent, ut viscerum labes aut scirrhofæ indurationes cedemata, hydrops, incongruæ fanguinis per vomitum aut mictum eruptiones nec non paralytici & arthritici affectus. Notandum autem est de his afflictioni hystericæ supervenientibus affectibus, quod illis magis invalescentibus mitescant pathemata hysterica, fimulac vero adhibentur topica promte iterum ad interiora recurrunt & ibi eo majorem exercent fævitiem. Gravidis fuperveniens noster affectus dum abortum. minitatur femper est periculosior, perinde etiam puerperis ob facile inde provenientem lochiorum suppressionem. Quando malum ab uteri labe ex infelici abortu, difficili puerperio, aut molæ vel polypoli concrementi in utero generatione contracta fuos ducit natales, raro perfecte curatur, fed admodum frequenter & facile ex leviffima quacunque caufa recurrit. Similiter quoque valde rebellis & diuturna observatur passio hysterica, quando cum malo hypochondriaco ut fæpius ex vitiis in diæta & regimine commillis fieri folet, conjungitur & complicatur. Quamvis vero fæpius evenit ut hyftericæ mortuarum inftar, non quidem per horas fed per integros fæpe decumbant dies ne ullum quidem vitæ fignum edentes, ita ut nullus quoad fenfus amplius fuperstes esle videatur calor, nullus pulsus nullaque respiratio; attamen cum plurima prostent exempla ejusmodi ægrotas pro defunctis habitas & fæpe jam elatas & fepultas post fatis notabile temporis spatium iterum ad fe rediffe.

diffe, non statim omnis prorfus abjicienda est spes fed potius tentandum num per crebriorem & continuatum convenientium auxiliorum usum excitari poffint. Quod fi autem lethali eventu terminatur paffio hyfterica, tunc mors vel apoplectico vel epileptico contingit infultu.

maile mini

# fost if i X vagi ex. fola verminofa in uvie. Ingrasi enim tales hofoites vel

Antequam vero tractationi huic finem imponam, mentionem adhuc faciam morborum quorundam qui cum nostro quoad affligendi modum maximam habent affinitatem, revera autem magnopere ab illo different & hinc plane diversam exposcunt medicationem. Sic dirus noster affectus multa sæpe cum pasfionibus nephriticis communia habet fymptomata, adeoque nonnunquam accurate calculum mentitur, ut is qui non exquifitam habet rationem pathematum morbo nostro peculiarium, qualia funt difficilis & intercepta respiratio, suffocatio fauciumque strangulatio nec non animi deliquia, vix certus effe poffit utrum malum ab utero an a calculo proveniat. Non raro quoque spasmi uterini vesicam urinariam ob ejus viciniam & arctiffimum cum utero confenfum infestantes, sphincterem vesicæ constringunt & urinæ exitum præcludunt, non fecus ac fi calculus meatum urinarium obstrueret cum tamen nullus omnino adfit. Eoque propius spasmi uterini ad vesicam propagati ad calculi accedunt genium, dum fere femper moleftiffimo illo & calculofis adeo familiari tenesmo ftipati fe oftendunt. Præter vero illa quæ paroxysmum hyftericum a spasmis ex calculo provenientibus distinguunt signa, aliud infuper quo hunc affectum ab hyfterico dignofcere poffamus discrimen nobis exhibet conditio urinæ, quæ in hystericis clara & limpida prodit, a calculofis vero tenuis alba & turbida excernitur cum fedimento viscido lutofo & fere argillaceo, ficut etiam in nephriticis craffior fabulofa rofei vel lateritii coloris imo aliquando intenfe rubicunda effe folet. Non abfimile porro paffioni hystericæ malum interdum constituit rheumatismus scorbuticus, qui vagis & spasticis cruciatibus nunc hanc vel illam partem externam obfidentibns, nunc ad in

oblervarur airectas

interiora recurrentibus ægros mirandum in modum divexat & potiora fæpe morbi hyfterici imitatur fymptomata. Cum vero potiffimum a fordibus impuris acribus & biliofis in primis viis stabulantibus & hinc inquinatis humoribus originem ducit hoc malum, remediis antihystericis minime cedit fed diversam & fingularem expofcit medicationem. Interdum etiam varii observantur affectus spasmodici vagi ex sola verminosa in corpore hærente colluvie. Ingrati enim tales hofpites vel teneras & fenfibiles inteftinorum membranas arrodendo & vellicando torminofos atque strangulatorios excitant affectus pathematum hystericorum scenam exquisite sepius æmulantes, vel mortui & in corruptionem abeuntes acres caufticos & putridos emittunt vapores, qui in humorum massam abrepti illam totam corrumpunt & hinc graviffimos universo systemati nervofo inducunt spasmos sub eadem interdum sub qua uterina paffio fuam tragædiam ludere folet forma fe manifestantes. Sunt & alii adhuc affectus qui itidem nonnunquam fatis accurate nostri referunt genium, sed hosce apposuisse sufficiat ex quibus fatis liquet quam difficile aliquando in morbo noftro fit medentis judicium & quanta sæpe opus sit cura & solicitudine ut fymptomata hysterica ab aliis quos non raro æmulantur. morbis rite dignofcantur.

#### S. XIV.

Multa equidem adhuc fupereffent de morbo nostro dicenda, & pluribus forte voluminibus conferibendis ampliffima fuppeteret materies fi quis fexcentas illas ærumnas & innumeras istas calamitates quarum auctorem effe uterum perquam feite ait Democritus in epistola ad Hippocratem depingere & curiofius deferibere atque omnia quæ de iisdem commemoranda forent exhaurire vellet, attamen cum meus tantummodo fuit feopus ut brevem ac concinnam mali hysterici traderem theoriam & curationem potiora atque præcipua quæ circa hune morbum notanda mihi videbantur hisce pagellis indicasse fufficiat.

IN

I S.

## Alenters : Illandi O et R taral Vienter Vienter GENEROSO ET DOCTISSIMO PETRO, SAMUELI DE CHAUFEPIÉ. MEDICINÆ DOCTORANDO DIGNISSIMO. SUMMOS IN GALENICA ARTE HONORES GRATULATUR DUBIAMQUE IN POSTERUM PRÆSEN-TIAM DEPLORABUNDUS AMICISSIME ACCINIT **CHRISTIANUS PHILIPPUS** WERNE, OSNABRUGENSIS MED. DDUS ET OPPONENS.

Quæ, FORTUNA! tuam rapit inconstantia mentem? Ut, quæ nunc longum mea sunt, malefida repente Diripias? ast non argentum, aut æra, vel aurum; Sed corpus separans, ut Barbara, surripis omne Dimidium nostri... Sed num succenseo digno Jure Tibi?... Ignoscas, rogo te! furor abripit omnem

D 3

Me-

Mentem: Munifica es, pro scommate gratia danda ; Laurigerum Nostro dum Phæbum jungis Oresti. Et suffers bominem Musarum Numine plenum Substituisque Deum . . . tamen at funt gaudia vana! Ludit adhuc fors, instar apis, dum mella reponit Spicula dans auget fundendo mella dolores. Nam primum, quo non superest mibi Charior alter Sæva rapit Nisum; Dein Phæbum Numine clarum Pæonio; fic infigit duo vulnera cordi. Nescio, quodne magis cruciet : sed nonne secundum Gaudia magna parit? Dum Tantus in arte medendi CHAUFEPIE' evadit Nofter, Natusque fidelis Dum redit in Patriam, spes exspectata! colendam: Ergo lætabor, non id reputavero vulnus, Quod Te Doctorem videam discedere; namque Invidiffe scelus foret Ægrotisque TIBIque O! mibi dilectos inter PARS PRIMA sodales! Aft alius superest dolor aut si malis bic idem : Tantus Amicus abit parvo junctiffimus ufu. Hoc angit, cruciat, torquet, mea Pectora findit, Pectora juncta fide Thesea. Tristia miscet Sic Fortuna jocis: Veniat jam Doctus Apollo. An super id lacrymas, super bæc num Gaudia fundam Dicat, nam certant alterno Gaudia luciu. Quis levet arte malum boc? Quid quæro? Nofter Amicus. Nonne manus gestas medicas? Es vulneris Author,

Vul-

Vulneris, eu mirum! es Medicus, primamque medelam Illustrisque Artis specimen das corpore nostro. Namque duo validi effectus cataplasmata Cordi Imponis nostro. Sunt: Disceptatio Doctam Qua decorasti Halam, dein Dissertatio præsens, Quæ simul est præservativum oblivia tollens Dulcis amicitiæ, bæc sunt Pharmaca grata Dolorum, Quos mibi Discessus Tuus adfert, FIDE SODALIS Præsentemque mibi Te sistent usque remotum, Atque meo cordi insigent bæc altius imo Illud amicitiæ Sanctum & Venerabile Nomen Chaufepié....

Rarum Tanti eft habuiffe Patroclum!

Dabam.

Lugduni in Batavis e Mufeo d. xxv. Juny MDCCLII. Palnovis, au mistavil er diksieus , princingue medelana ------Illefforisque Arries specimen das corpore reflere. en 18 austrigenen Namque div ralidi effittur ceteplasmata Cetdiner with the Imponis unford. - Saue: Discoptatio Dollam and and Qua decorafti Holere, defu Differtatio professone interestant Ques final est prastruationta solivia tellens Duicis amicitie, hee fant Pharmaca grate Delorum, in Quos widt Difceffus Linux adfert, FIDZ Sobalis! Friefantemque mibi Te fiftent usque sentataurs miller au Leque mes cordi infigent bise cleur imo Rind amichia Sandum & Fenerabile Nomen ..... Chanfopië. . . . Raram Tat i eff habaiffe Patrocium! Size accessor, not it reprised to have West favor eineren hiendbgul Deid gegend hiefer das Debanti anti e Africa e Africa d. xxv. Juny MDCCLII.