## Disputationum physiologicarum qua theses de visu ... / defendet ... C.G. Schultz.

### **Contributors**

Schultz, Karl Wilhelm. Eberhard, Johann Peter, 1727-1779. Universität Halle-Wittenberg.

### **Publication/Creation**

Halle: J.C. Hendel, 1754.

#### **Persistent URL**

https://wellcomecollection.org/works/ca5nnhxv

#### License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org DISPYTATIONYM PHYSIOLOGICARYM

# THESES DE VISV

HEREINE ENERGIES

PRAESIDE

VIRO EXCELLENTISSIMO, EXPERIENTISSIMO, DOCTISSIMO,

# IOANNE PETRO EBERHARDO,

MEDICINAE AC PHILOSOPHIAE DOCTORE,
HVIVSQVE PROFESSORE PVBLICO EXTRAORDINARIO,
ACADEMIAE IMPERIALIS NATVRAE CVRIOSORVM SODALI,

D. XIII. IVL. CIDIOCCLIV.
IN AVDITORIO MAIORI

H. I-III. POMER.

PVBLICE DEFENDET

AVCTOR RESPONSVRVS
CAROLVS GVILIELMVS SCHVLTZ,

MEDICINAE CANDIDATVS.

# 

HALAE MAGDEBURGICAE,
PRELO IO. CHRISTIANI HENDELII, ACAD. TYPOGR.

TOTAL TABLE PERMIT A LES INDEED HOMESTER BY THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF CMIE CKTOOT AND LES IOSAPME PETERO LEFERINGO. SHOTOCKE TABLE DESCRIPTION WAS GROVED GISLAND CONTROL OF THE PARTY OF THE PORT OF THE PARTY OF 中心的状态以及其下的位置是100mm的 电影中部40mm 1,1260,08-1,03802 一个一个 THE TABLE OF THE THE PARTY OF T AND THE RESERVE AND THE PARTY OF THE PARTY O (1) Pacific 10 1894 "有一个"的"大学"的"大学"的"大学"的"大学"。 MALL PARCE ETAIL DESCRIPTION OF THE PARCE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH LANDAL SECTION OF THE PARTY OF 是一种企业的企业。 1000年, LIOUST SECURITION OF THE PROPERTY OF THE COLL.



S. a. I. dignet south

acultas res extra nos existentes sentiendi di-

S. II.

Sensus vel statum animae, vel corporis repraesentat. Si prius dicitur sensus internus, si posterius externus.

S. III.

Cum obiecta admodum inter se diuersa sint, patet diuersa quoque requiri organa sensoria, mediantibus quibus sensus absoluuntur.

S. IV.

Sic gustus organon est lingua, olfuctus nares, auditus aures, visus oculi, tactus papillulae nerueae cutis.

§. V.

Ad sensus externos, quinque referentur, nempe gu-

Coroll. Nonnullis placuit nouum seu sextum addere sensum nempe venereum; a) aliis, vt sxlv10 sensum caloris & frigoris; aliis sensum famis & sitis. Sed cum sensus tactus ab omnibus pro vniuersali declaretur, commode omnes hi sensui tactus adnumerari possunt.

a) vid. scaligeri exerc. 286. t. 3. qui affirmat, quod titillantissima voluptas venerea sextus quidam sit sensus.

6. VI.

Sensus externi statum corporis repraesentant §. II. Hinc semper aliquid actuale: & quilibet sensus instructus sit oportet suo organo peculiari. Patet hinc non dari fallaciam sensuum.

BAYMGARTENII Metaphysica S. 545-546.

VIL.

Cum ad sensus organa requirantur, §. III. patet, positis organis in corpore viuo & sano sensus dari.

Coroll.

# 4 Disputationum physiologicarum secunda

Coroll. Hinc brutis organis sensoriis praeditis, sensus minime denegare possumus.

S. VIII.

Cum ad sensus organa requirantur §. III; pater, deficientibus organis sensus non dari.

Coroll. Hinc entibus in regno vegetabili & minerali existentibus sensus adscribere, ve nonnullis placuit, abfurdum est.

S. IX.

Si sentimus obiecta, quaedam in organa sensoria agunt. Actio vero in corpus cum motu est coniuncta (p. princ. Physica). Hinc vel corpora extra nos in organa sensoria agentia moueri debent, vel ipsa organa sensoria.

Schol. Vtriusque exemplum praebet actio luminis in retinam, & actio manus in clauum aliquem infixum.

S. X.

Obiecta quae in nos agere debent, corpora sunt §. IX. hinc vt extra nos existant necesse est.

Coroll. Hinc semper corpora adesse debent, si sensatio in nobis producitur. Absentibus vero corporibus, nulla datur actio in corpus; hinc nullus motus, qui tamen adsensus producendos requiritur. Hinc nullus sensus.

6. XI.

Hactenus de sensibus in genere: nunc sensum omniam externorum nobilissimum, quem Visum salutare solemus, paulo accuratius delineare nobis placet. Definio itaque Visum per sensum externum §. V. quo res visibiles extra nos existentes, mediante lumine per oculos sentiuntur. §. I.

S. XII.

Cum oculi visus sint organon §. IV. pater, si actionem, qua absoluitur visus rite intelligere cupiamus, oculorum structuram praemittendam esse. S. XIII.

Partes oculos constituentes sunt vel externae, vel internae. §. XIV.

Ad partes externas pertinent:

a) Osea oculi theca, ex concursu variorum ossium composita. a)

b) Supercilia & palpebrarum cilia, quae in fine frontis

& palpebrarum confpiciuntur.

c) Palpebrae oculos claudentes, quarum in singulo oculo duae reperiuntur, vna inferior, altera superior appellatur.

d) Oculorum canthi, qui ex concursu palpebrarum

oriuntur.

E) Musculi oculos mouentes, quorum IV recti. e. gr. Superbus, humilis, indignabundus, bibitorius, & II. obliqui, amatorii dicti, dantur.

f) Glandulae conglomeratae, quae oculos humectant

& lacrymas fundunt.

g) Tarfus & Sphineter palpebrae.

a) ALBINVS de ossibus corporis humani §. 97. Celeberr. HEI-STERI Compend. Anatomic. §. 89-90. p. 29.

6. XV.

Ad internas vel proprias pertinet Bulbus siue oculus ipse, qui est organon corporis visibilia repraesentans, & ex tunicis sex, humoribus duobus, lente vna, vasisque variis constans.

§. XVI.

Tunicae oculum constituentes sunt sex, quarum prima dicitur albuginea, adnata, siue coniunctiua, a periosteo orbitae oculi, vel vt alii malunt, ab interna palpebrarum tunica orta, & album oculi constituens, anteriori parte haerens, oculum orbitae & palpebris iungit, vasisque copiosis est repleta.

vid. Perillustr. de HALLER Comment. in Boerhaauii Praelect. T.IV. p. 197. A. 2 6. XVII. S. XVII.

Secunda est Cornea, quae est tunica externa anterior pellucida, magis eleuata, figura sphaerica, scleroticae pars, & oculi partem anteriorem cum sclerotica iungens.

S. XVIII.

Tertia est Sclerotica, quae est tunica externa posterior, magis opaca, crassa, valde sirma, a dura matre orta, totum oculum ambiens, a cornea ad neruum opticum extensa, maioris sphaerae segmentum, quam cornea, cum qua oculi partem posteriorem connectit, eiusque siguram pariter ac in situ suo singulas partes conservat.

V. XIX.

Quarta est Choroidea, quae est tunica interna posterior tenuis, mollis a continuatione piae matris orta, neruum opticum inuoluens & subtilissimis vasculis sanguiseris instructa, scleroticae ope cellulosae fabricae contigua, adeoque eandem cum ipsa figuram, superficiem vero concavam positam habens, suaque nigredine oculum opacans, humores oculi amplectens & diuersis ex lamellis constans.

Ruysch. Epist. Anat. XIII. Tab. XVI. ei. Thes. anat. II. Tab. L. Fig. 6.

6. XX.

Quinta est Vuea, quae est tunica interna anterior a choroidea per ligamentum ciliare distincta, ex variis vasis sanguiseris composita, multifariam colorata, conuexa, corneae substrata, figuram annuli vel zonae habens, intus aspera & nigra, foris laeuis, radios luminis ad visionem necessarios in interiorem oculi concamerationem intromittens, supersuos vero arcens.

S. XXI.

Pars Vueae annularis, pupillae foramen cingens,

per corneam transparens, coloris diuerfi, Iris dicitur.

S. XXII.

Foramen rotundum tunicae vueae instar circuli nigricantis in oculo conspicuum, & motu mox constrictorio, mox dilatatorio aditum radiis in oculi interiora concedens, dicitur *Pupilla*.

S. XXIII.

Cum pupillae foramen dilatari & constringi possit §. XXII, aliquid adesse debet, quod huius motus rationem sufficientem in se continet. Id praestant sibrae musculares, in vuea existentes, longitudinales & circulares dictae. Si priores abbreuiantur, pupilla dilatarur, si posteriores contrahuntur, pupilla constringitur.

Schol. Anatomicorum controuersiam de praesentia sibrarum orbicularium hic nostram non facimus. Adesse asserunt winslovivs, Illustr. Heistervs, & duas saltem sibras ruyschivs. In brutis certe adsunt. In homine adesse negant morgagnys & Perillustr. de HALLER.

S. XXIV.

Sexta est Retina, quae est tunica intima, choroideae contigua, tenerrima, mucosa, neruosa, in fundo oculi sita, alba, cum portione sibrillarum interiori nerui optici fortiter connexa, imo pulpae nerueae pars, & visus primatia sedes.

S. XXV.

Humores oculum constituentes, observantur duo pellucidi §. XV. quorum primus aqueus, sine albugineus salutatur, qui non modo anterius oculi spatium inter corneam & vueam replet, sed & posterius intra vueam & lentem crystallinam, instar aquae sluidus.

S. XXVI.

Alter humor dicitur Vitreus, in posteriori oculi cauitate situs, eamque occupans, posteriore sui parte retinae tunicae vbique contiguus, eamque expandens, vitro suso diaphano similis, ex vasculis subtilissimis lymphaticis humore aqueo pellucido repletis, & cellulosa pellucida sabrica constans, mollioris consistentiae, pellicula tenui pellucida vestitus.

vid. MORGAGN. Aduers. VI. p. 106. Illustr. Büchnert fundam. Physiologiae Hoffmannianae p. 195. §. 9.

S. XXVII.

Lens crystallina est corpus solidum ex tubulis lymphaticis & lamellis pellucidis, sibi inuicem incumbentibus compositum, pellucido liquore in vasis lymphaticis & in spatio inter lamellas repletum, lenticularis sigurae, inaequaliter conuexum, pellicula tenui arachnoidea dicta cinctum.

S. XXVIII.

Nerui oculum constituentes e cerebro oriuntur, &

funt horum tria paria.

2) Par IIdum opticum dictum, bulbum oculi inter eiusdem axin & nasum ingreditur, & retinam oculi efformat, paucosque ramulos dat glandulae innominatae, aliisque vicinis partibus.

b) Par IIItium oculorum motorium dictum, prope orbitam in sex ramificationes distribuitur. vid. HEISTER.

Comp. Anatom. p. 162. §. 299.

c) Par Patheticum per musculum oculi trochlearem sese explicat.

S. XXIX.

Vasa sanguisera oculum perreptantia, oriuntur ex arteriis Carotidibus internis & externis, quae in vitimis canali-

canaliculis lympham pro oculorum nutritione tenuissimam ad vehunt, superfluus vero sanguis per venas ad sinus durae matris & venas iugulares reuehitur.

S. XXX.

Explicatis oculorum tunicis & humoribus, nihil restat, quam vt modum quo visus sit, paulo accuratius explicemus. Pauca quaedam ex Mathesi & Physica nobis erunt praemittenda.

§. XXXI.

Ad visum Lux requiritur.

§. XXXII.

Lux est id, quod corpora circumiecta visibilia efficit.
Perillustr. L. B. de wolff Elem. Matthes. Tom. III. p. 5. s. 4.

§. XXXIII.

Radius est lumena puncto radiante per medium non resistens protensum. ei. Tom. III. p. 5. §. 6.

§. XXXIV.

Reflexio luminis est propagatio in partes anteriores corporis opaci, in quod incidit, ob eius resistentiam.

ei. Tom. III. p. 8. §. 38.

§. XXXV.

Refractio luminis est deviatio in linea per quam propagari debebat, ob diversam medii densitatem.

ei. Tom. III. p. 8. §. 39.

. XXXVI.

Si per exiguum foramen lumen in cameram obscuram intromittitur, lucida linea recta comparebit. Hinc radios luminis per lineas rectas determinare licet. Hinc nullum obiecti punctum videbitur, nisi quod pupillae in directum iacet.

ei. Tom. III. p. 9. 5. 45-47.

6. XXXVII.

Quodliber obiecti punctum videtur omnibus in locis, ad quae ex eo linea recta duci potest.

Perillustr. L. B. de Wolff Elem. Mathef. Tom. III. p. 10. 9. 58.

6. XXXVIII.

Quocunque in loco radii ex omnibus cuiusuis obiecti punctis fluentes, in totidem alia puncta, postquam reflexione aut refractione coacti fuerint, iterum conueniunt; eo in loco imaginem istius obiecti, super quouis corpore albo, in quod inciderint, depingent.

vid. Celeb. NEWTONI Optice Ax. VII. p. 9. edit. Genev.

S. XXXIX.

Quo maioris sphaerae segmentum est lens pellucida, eo remotior est a superficie locus imaginis, quo minoris, eo propior. Quo propius obiectum est lenti, eo remotior imaginis locus a lente, quo remotius eo propior.

S. XL.

Radii conuergentes lente vitrea excepti, eo citius post lentem coëunt & locum imaginis habent propiorem lenti, quo magis fuere conuergentes, eo remotiorem vero quo minus.

S. XLI.

Radii luminis ex obiecti punctis fluentes, secundum legem refractionis in superficie corneae exteriore ad perpendiculum refringuntur. Hanc directionem seruant per humorem aqueum, vsque dum crystallinam lentem contingant. Si ex aqueo in crystallinum transeunt, denuo franguntur ad perpendiculum, magisque conuergentes redduntur, dein radii in soco quasi vniti, obiecti imaginem in tunica retina depingunt §. XXXVIII. Has imagi-

nes sentit anima, per neruum opticum in cerebrum motu continuato, & sic sensatio Visus efficitur.

S. XLII.

Cum figura corneae in variis subiectis varia sit (per exper.): cum obiecta quoque visibilia varia saepe ab oculo gaudeant distantia, locus quoque imaginis variabit. §. XXXIX. XL. Hic vero in retina esse debet, si distincta fieri debeat sensatio (§. ant.): hinc distantia lentis a retina variare debet. Moueri itaque debet vel retina, vel lens crystallina. Iam cum retina moueri nequeat, vtpote subtilissima ac plane mucosa membrana §. XXIV, necesse est, vt lens moueatur.

XLIII.

Motus lentis duplici modo obtinetur 1) Incumbunt nempe ductus ciliares, lentem ambeuntes, vitreo humori, quem contractione sua premunt. Hic in peripheria compressus in medio eleuatur, & sic lentem a retina deducit. Qua actione cessante, redit vitreus humor ad pristinam siguram, & lens sic propius ad retinam reuertitur. mnes musculi recti oculum mouentes, si simul agant, comprimunt oculi bulbum, breuiorem reddunt, & sic lentem propius ad retinam ad ducunt. Obliqui vero musculi simul agentes, & oculum superne & inferne comprimentes, eundem longiorem reddere, hinc distantium lentis a retina augere videntur.

S. XLIV.

Cum obiectorum remotorum imago, propius ablit a lente §. XXXIX, oportet, vt lens sub distincta eorundem visione, ope ductuum ciliarium & musculorum (§. antec.) propius ad retinam accedat. Quodsi fieri nequeat, obiecha quoque distincte videri non poterunt, nisi vel propius B 2

ad

ad oculum accesserint, vel imago eorundem ope vitri concaui longius a lente remoueatur.

S. XLV.

Cum porro propinquorum obiectorum imago recedat a lente longius (§. XXXIX.), recedere haec debet a retina, si imago retinam attingere debeat. Quodsi sieri nequeat, vel magis remouenda sunt obiecta ab oculo, vel ope vitri conuexi propius ad lentem reducendus locus imaginis.

S. XLVI.

Qui remota distincte vident, non vero propinqua presbytae dicuntur, qui propinqua recte distinguunt non vero remota, myopes audiunt.

S. XLVII.

Patet ergo: 1) In presbytis vel nimis planam esse corneae superficiem, h. e. eam esse maioris spherae segmentum (§. XL.), vel 2) lentem nimis propinquam esse retinae minusque mobilem (§. XLV.).

6. XLVIII.

Myopes contra vel 1) nimis convexam habere corneam, seu eam esse minoris sphaerae segmentum: (§. XXXIX.) vel 2) lentem nimis esse a retina remotam (§. XLIV.).

S. XLIX.

Et haec sunt primaria visus sundamenta, e quibus reliqua phaenomena deduci facile possunt, quae vero hic demonstrare instituti ratio vetat. Plura vide in notis Excell. PRAESIDIS ad Boerbaauii Physiologiam edit. vernaculae p. 830. seqq. Haec iam carptim strictimque disputasse sufficiat.

# PRAENOBILISSIMO DOCTISSIMOQUE CANDIDATO RESPONDENTI

S. P. D.

## PRAESES.

Reddo TIBI, quam mibi perlegendam tradidifti dissertationem, plane TVAM, cuius elaboratio demonstrat vtique non mediocriter TE effe versatum, non in Medicina modo, sed & in Mathesi & Physica. Sunt baec sane duo veluti artis salutaris fulcra, quae non vt rerum barum ignari cavillantur, ad inanes speculationes deducunt, sed solidae mechanismi corporis cognitioni, viam veluti sternunt. & ad intima deducunt naturae penetralia. Habeo itaque quod TIBI gratuler de doctrina quam TIBI acquisiuisti solida, quae spem nobis dat, vtilissimum TE aliquando futurum patriae TVAE, totique orbi litterato. Et boc eo certius auguror, quo certius noui, diligentissimum TE fuisse in acquirenda cognitione artis salutaris penitiore. Interfuisti praelectionibus Medicis, Illustris & Celeberrimi BÜCHNERI noftri, Excellentissimorum BÖHMERI & STRVMPFFII, nec non meis Mathematicis, Physicis, Phyfiologicis, Formulari Medico, & prinatissimis Medicis, eo ardore enque diligentia, vt fausta ac praeclara quaeuis de TE semper expectarent boni omnes. Perge sic amicissime SCHVITZI! in incoepto tramite, & praemia diligentiae certe assequeris. Vale. Dab. in Reg. Frid. d. XII. Iul. MDCCLIV.

Inclyta figna dabas certae praenuncia laudis,
Ingenioque vales DVLCIS AMICE graui.
Gaudentis magnam penitus spem Patris adimples,
Spes patriae constans, arte peramplus eris.
Iam vigeas slorens, sint praemia digna laboris,
Sitque salus viuax, sit rata sama TIBI.

His paucis Amico suo dilectissimo, Respondenti ornatissimo specimen eruditionis egregium gratulatur

Opponens

### CHRIST. GOTTL. LIEBERKÜHN,

Potsdamiensis, M.C. Societat. Teutonic. lenensis Sodalis.

Consequentem cernit Honos, AMICE, TE Mineruam; mox properat decoris Praemiis ornare Tvos labores.

Inuida turba
Dentibus frendet, minuens honores
Frustra. Ouans ergo TIBI, iam PARENTI
Filium grator, senii leuamen,

Et decus ingens.

### IOANNES BAVMANN,

Megapolitanus Opponens.

