Dissertatio practico-medica inauguralis, de nephritide ... / Eruditorum examini submitti Aegidius Sieben.

Contributors

Sieben, Aegidius. Lulofs, Johannes, 1711-1768.

Publication/Creation

Lugduni Batavorum : Apud Samuelem Luchtmans, et filios, et Eliam Luzac, juniorem, 1755.

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/gybq4u66

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org

DISSERTATIO PRACTICO-MEDICA INAUGURALIS,

DE

NEPHRITIDE.

QUAM

ANNUENTE DEO TER OPT. MAX.

Ex Auctoritate Magnifici Rectoris,

D. JOHANNIS LULOFS:

A. L. M. JUR. UTR. ET PHILOS. DOCTORIS, ASTRONOM.

MATHES. ET PHILOSOPHIÆ IN ACADEMIA LUGDU
NO-BATAVA PROFESSORIS ORDINARII, FLU
VIORUM HOLLANDIÆ AC WESTFRISIÆ

INSPECTORIS GENERALIS.

NEC NON

Amplissimi Senatus Academici Confensu, & Nobilissimæ Facultatis Medicæ Decreto,

PRO GRADU DOCTORATUS,

Summisque in MEDICINA Honoribus & Privilegiis rite ac legitime confequendis,

Eruditorum Examini submittit ,

ÆGIDIUS SIEBEN, HARDEROVICO GELRUS.

Ad diem 29. Septembris MDCCLV. H. L. Q. S.

Apud SAMUELEM LUCHTMANS, ET FILIOS,
ET
ELIAM LUZAC, JUNIOREM.
MDCCLV.

DISSERTATIO PRÁCTICO-MEDICA IN A U G U R A L 1 S,

D E

NEPHRITIDE

RUAM

BARREDIT WES AFE OF E. MAKE IN.

D. JOH ANNIE ELUCY OF LULOF OF SAME OF

B North Land Doctor Long.
PRO GRADU DOCTORATUS.

Sommisque in Mandrers a Honorièus & Privilegus institutes deputes de la consideration de la consid

Erditone Lannick Jahnatel

ACCIDIUS SIEDEN, HARDENOVICO GELEUE,

Ad whose ag. Supership Muccey, H. L. O. S.

Apped SEAMDEREM LUCHTMANS, ET PILIOS,

Apped SEL'I A M L U Z A C. JURIOREM.

AD COLV.

FRATRI CARISSIMO,

BARTHOLOMAEO SIEBEN,

J. U. D.

ET IN ILLUSTRI AMSTELAEDAMENSIUM

ATHENAEO ANTECESSORI

SACRUM

FRATRI CARISSIMO,


BARTHOLOMAEO SIEBEN,

J. U. D.

ET IN ILLUSTRI AMSTELAEDAMENSIUM

ATHENAEO ANTECESSORI

SACRUM



DISSERTATIO PRACTICO-MEDICA INAUGURALIS,

sugnifices legi mosts B 1 d bestitus appellation

NEPHRITIDE.

g. I.



nter multos & varios, qui corpori humano & proxime massae sanguineae accidunt, morbos, nulli profecto sunt atrociores, quam qui a Practicis inflammatorii nuncupantur. Hi uti pernici admodum impetu universam concutiunt oeconomiam animalem; ita & maximum vitae periculum haud raro minitantur. Natura in iis a-

cerrimum veluti conflictum sustinet, in quo eo cadit citius, quo majori hostem suum virtute expugnare nititur. Hinc, spectato Medici officio, eo plus quoque in mora inest periculi, quippe quod diei, ne dicam horae quandoque, jactura insuperabile reddi solet; mutata prorsus rerum scena, exitu sensim acerbiori luctuosa. Non opportunum in praesens videtur, hanc sunestam Phlegmones indolem in genere latius persequi. Visum suit, perspecta ejus considerationis necessitate, exempli loco ex morbis instammatoriis afferre & delineare unum, Nephritidem nempe, his in terris haud infrequentem. Prius vero quam telam exordiar; rogo

2 3 DISSERTATIO PRACTICO-MEDICA

L. B. ut specimen hoc Inaugurale obsequii potius, quam eruditionis testimonium, humanissime, excipere velit.

g. 11.

Nephritis, proprium morbi nostri nomen, ex Graeca voce νεφρός, Latinis Renem fignificante, & communi particula ins coaluit. Haec ex origine relata ejus fignificatio quam late pateat, nemo non fponte perspicit. Nihil enim aliud, quam renalem innuit affectum, cujus vero sub titulo, utpote perquam generali, cuncta & certe diversissima Renum vitia describi posse videntur. Neque quendam, in Veterum monumentis vel parum verfatum, fugit, multiplices legi morbos, Nephritidis appellatione donatos, nulla stricte habita inflammationis ratione. Alii quidem cum hac facpe numero incidere folent; quemadmodum Lithiafis, qua a calculo, renibus infixo, obstructio nonnunquam Phlegmonica conflatur. Atque haec tam crebro forfan tamque certo vifa & animadversa fuit, ut prae ceteris jure singulari Nephritis suerit appellata. Alii vero affectus commemorati longius a nostro dislident; totaque abhorrent natura fua, exceptis quibusdam fymptomatibus, quandam testantibus affinitatem; qualia funt lumborum dolores, urinae suppressio & difficultas &c. Quin & recentior aetas in his sua plus justo usa suit libertate, notione Nephritidis diverso sensui subjecta. Hic vero, jam probe distinctus definitusque, exhibet nobis veram Renum inflammationem, acuta cum febri & gravissima doloris punctorii sensatione ad sedem lumborum internam emergentem.

g. III.

Definitio Nephritidis (§. 11.) primam atque formalem ejus idaeam stricte complectitur. Haec jam ut plenius evolvatur, oportet considerare;

1°. Organi affecti naturam;

20. Inflammationis rationem suis petere ex causis;

3º. Harum dispicere effectus, sive symptomata;

40. Ex his deducere morbi Diagnosin & Prognosin;

5°. Rationalem curationis viam monstrare.

Ex his caput, seu momentum primum materiem offert, quam

and the second of the second

certe haud caperent folam pagellae hae, si totam vel parum curate ex dignitate sua pertractare oporteret. Verumtamen nec silentio prorsus illa praetermitti potest, quippe qua, ceu fundamento, sana morbi nostri doctrina nititur sere universa. Quare tantummodo, quantum hujus intellectui serviat, expositio ejus nobis ineunda videtur, brevitatem ubique studiose secuturis.

tilrara politioni quam egrapicVIpo. Plana fino en carrier

with a security of the

Organa ergo, quae paucis speculari ad rem interest, Renes funt, qui inter imi ventris viscera non ultimum tenent locum. Hi licet parvo ex volumine constent; at fabrica tamen sua & praeprimis usu adeo excellunt, iis ut nec animalium genera, nobis longe inferiora, careant Numero funt naturali duo, & quilibet, eminentioris spinae distinctus interventu, suum occupat latus, sinister sinistrum & dexter dextrum. Sedes ejus praecipua, in molli lumborum valle constituta, a binis inferioribus dorsi vertebris ad illorum tertiam vel fere quartam pertinet. Altior quandoque & demissior, nec non in latera a medio spinae majori vel minori intervallo est remota, sic ut vix certis circumscribi posse limitibus videatur. nec est, cur quis naturae inconstantiam in his temere redarguat, quippe quae, fibi fola norma & lex optima, nihil nobis, quam quod praeclarissimum, observandi studium relinquit. Quod si porro eo, quem inter se obtinent, situ Renes respiciantur, e regione quidem consistere apparent. Verum haud aequa intercedit altitudinis ratio, utpote qua finister plerumque dextrum exfuperare folet. Inaequalitatem hanc proxime eleganti partium vicinarum positu judicare oportet. Ambo nempe Renes a posteriori simulque superiori exteriorique regione costas adjacet infimas spurias, proximamque lateralem & imam Diaphragmatis carnem. Inde, proposito nobis homine erecto, supra musculos Psoas, Quadratos lumborum & Transversales abdominis perpendiculari utcunque ductu descendunt, extremitatibus fuis parum ad se vergentibus. A parte dein dextra summitati Renis concavum imminet Hepar, laterique ejus extremo accumbit crassorum intestinorum principium, tenuibus anterius instratis. Ut jam praegrande illud viscus amplitudinem suam per utrumque extendat Hypochondrium; mole tamen & craffitie maxima infidet dextrum .

trum, eoque etiam altius necessario dependet. Unde & qui es subjacet inhaeretque Ren ille, depressus quodammodo deorsum magis concedat, oportet. Sinister vero, cujus verticem tangit Lien, & quandoque ad ejus medium sere usque sese demittit, hujus ob dimensionem descensumque minorem opportunum invenit locum, quo surgere liberius & socio suo superior collocari potuit. Haec praecipua situs utriusque Renis diversitas, partium memoratarum positioni quam egregie respondeat, satis cognoscitur. Plura, quæ ex observationibus rarioribus, in hominum animaliumque corporibus captis, his addi possent, ita comparata sunt, ut magis ad Historiae Anatomicae amplitudinem, quam ad objecti nostri tractationem, pertineant.

-Hope No contribution and o S. . V.

Exposita Renum sede (J. IV.); horum memorabiles facilesque cum partibus circumjectis nexus proxime examen nostrum spectant. Plerique fibrofa quadam perficiuntur textura, quae, undique diffusa, vicinis sese immergit. Ita e lumbis primum, vel proprius, ex recensitorum musculorum superficie, quibus Renes a tergo funt appositi, simplex, multa, dilatabilis, ac tenuis producitur cellulofa, qua mox ipforum fubstantiae accrescit. Ea uti a posteriori, ita ab anteriori facie tota illis diversimode sese jungit. illigatque expansio Peritonaei. Haec scilicet, facto a contiguo pariete Diaphragmatis costarumque ultimarum excursu notabili, lumborum petendorum caufa, supra Renes, hac in via sitos, traiicitur, obtegit hos fimulque a cavitate abdominis fecludit. Unde, adscita quadam involucri forma, Fasciæ Renalis, vel & membranae externae, nomine Anatomicis vulgo venire folet. Laxior ejus folito rariorque habitus, quem eo transitu induit, pinguedinis accumulationi mirifice favet. Atque haec non folum in animalibus faginatis, fed hominibus obaefis, copiosiffime semper congelta, adeo mole increscit, hac ut circumfusi & veluti sepulti Renes opprimantur ac suffocentur. Hinc quæ & quot gravia illis, caeterum faniffimis, plerumque inoriantur mala, ex urinae indole hujusque necessaria secretione liberrima, jam plus minusve impedita, abunde apparet. Feliciora ideo iis reputanda funt macilentiora, & ficcioris temperiei corpora, quæ, pondere illo inerti non

non gravata, vel parummodo ejus materiei, vel quandoque fluidum saltem tenueque oleum Fascia sua alunt. Haec ut memorata jam specie varia Renes laxe convestit, integra ac mobilis; itaque hos facili fibrarum fuarum propagine, quaquaverfum immissa, partibus finitimis annectit. Neque alia, quam strictior quaedam denfiorque est cellulosa, qua illi cum Hepate, crassorum intestinorum initio, Colo & Liene cohaerescunt. Hisce porro accedunt Renes Succentureati dicti, vel Capsulae Atrabilariae, folliculi glandulosi quaedam species, in Renum verorum apice nitide confedentes, cui tam contextu fibrofo quam communi vinculo vasculoso & adiposi involucri accessu sunt firmiter affixi. Quod demum fupremam majorum vasorum conjunctionem attinet; haec cum minus firmandae Renum fedi, quam fabricæ constituendæ, inferviant; ad hujus potius expositionem revocanda videtur. Quod si iam pervestigato horum nexu, hujus ratio recte subducatur; liquet, quam apte haereant Renes ad praestantissimam motus respirationis, alterni & corporis in incessu vim excipiendam. Moderatus hujus vigor tantum iis praestat usum, ut, sine eo sensim elanguescentes, haud levia contrahere vitia soleant.

rationists de sidence de la VI. 2017 estados de retailenter

Exteriores Renum tractus contemplati, horum formam ante oculos sistere possumus. Viscera funt, si sana fuerint, mole parva, quorum longitudo raro quinque digitos transversos excedit, latitudo ejus dimidiam & crassities quartam fere partem adaequat. In figura illorum describenda mire luserunt Anatomicorum ingenia. quorum aliis imago Cordis, Testium, Semilunae, aliisque foliorum Afari, Phafeoli, pluriumque rerum arridet. Aligua guidem similitudo omnium, nulla tamen perfecta obtinet, quae nec ipsis Renibus constat. Hi constantiori naturae more externo ambitu convexo maximoque, latera spectante, lineam describunt quodammodo ellipticam, quae, ad utrumque ducta extremum, circularis magis. a parte interna inaequaliter statim decrescit, ita ut in medio praeprimis introrfum flexa finus quandam speciem efficiat. Hinc quae nascitur facies, fabam utcunque aemulatur, quae dorso recurvo & superficie utrumque tumidula ac applanata, ab anteriori est excifa, qua, veluti ex umbilico, pedunculus exit, leguminis intus A 3 pa--1650

parieti defigendus. Hac Renum forma, curatius paulo circumspecta; manifesto circa fines apparet magnitudinis discrimen, quorum quippe superior, seu caput, crassius extuberat, & inferior fub finu, longius paulo eductus, corpore leniter extenuari folet. Eminentiae reliquae atque foveae, quae hinc inde conspiciuntur, nil nisi partium adjectarum pressionem arguunt, cui, ut alia viscera. ita etiam Renes fe pulchre accommodant. Horum caeterum fubstantia, veterum Parenchyma, compacta, densa fatis, unita in adultis, aequabilis, globra & splendida in fatu interrupta, minores in portiones nitide divifa, molliorque effe advertitur. Proprius ei color obscure in rubedinem vergit, vel etiam ad carneum accedit, magis minusve dilutum. Tota demum si fuerit continua & aequata, una obducitur fingulari membrana, interna vocata, ut ab externa adipofa discernatur. Simplex illa tenuis, ut ut firma, pellucida, laevissima, strictissimeque circumtexta est, ut nihil pinguedinis admittat & aegre detrahi possit. Hoc opere ejus originem sequendo detegimus, quod a membrana externa, five communi vaforum emulgentium, proficifcatur, ita nempe, ut haec ad ingressum suum exuant demittantque illam, circa Renes explicandam. Tali modo artificiofissima horum textura sapienter & ordinata & munita est, ut muneri suo insigni tuto vacare queat. Asteriores Beauty resting contemplies, horses fermant and

eloge telephone if the ville of the state of the state of the

Ut jam substantia Renalis, superficietenus modo adumbrata, (S. vi.) penitius introspiciatur; ejus vasa pervestigare oportet. Haec venerabilis antiquitas singulari appellavit nomine Emulgentia, quod acre serum ex sanguine veluti eliciant, vel emulgeant. Inter ea primo merito loco commemorandae sunt Arteriae, quae inconstanti ut plurimum numero, una, duabus, vel pluribus radicibus ex Aortae trunco prognasci solent. Dextra quidem ex latere ejus proxime oriunda, Venae sociae anterioris comitatu leniter mox descendit, ita ut angulum sere rectum exhibeat. Eadem specie sinistra ex propiori sibi parte ipsius provenit, dextra frequentius inserior & brevior sere semper, utpote quae ortu suo, ob situm Aortae sinisteriorem ad spinam minori a Rene suo intervallo dissidet. Ambae nunc Renales, sic editae, directo medium versas

cur-

cursu, priusquam viscera introeant sua, in varios se spargunt ramos, tres, quatuor, plures paucioresve, quibus ceu anchoris jactis, illis statum immeant. Nemo curiosior paulo naturae speculator has conspectari arterias potest, quin harum respectu Renum magnitudinem praesignem & animadvertat & valde admiretur. Utriusque vel plurium, si adsunt, lumina si simul capiuntur, nihil certe, vel parum, Aortae capacitate sua cedunt. Inde sacile erit assequi, non mediocrem iis advehi sanguinis copiam, &

ad futurum fecretionis usum impendi.

Venae Emulgentes, Anatomice spectatae, facile principes sunt, quas Cava inferior, sub Hepate elapsa, toto, quo ad spinam decurrit, spatio usque ad Iliacarum Dichotomiam vario lusu progignit. Dextra si prodeat sola, gemina alias, vel trina, ex laterali canalis illius parte educitur atque una cum arteria subdita ad Renem suum commeat. Ipsa, a principio mox deorsum inclinata brevi illum attingit, atque ramosa intrat. Altior vero sinistra, eminentior, longiorque, ob Renis, quem petit, sedem disjunctam magis elatioremque, prope originem seam oblique paulo transcendit aortam, & divisa demum, ut prior, corpus illius ingreditur. Venae hae, ut toto systemate suo, ita & hic majorem arteriis nactae sunt Diametrum, quam subtriplam circiter calculus demonstrat.

Enarratis cum vasis Arteriosis Venosisque ad Renes quoque deveniunt Nervi, subtiles quidem, & exigui, at memoratu tamen valde digni. Duplici nascuntur ex stirpe, nempe a pari intercostali & vago, quae numerosa sobole visceribus abdominalibus prospiciunt. Illi conspicuis aliquot ramis non ad externum solum Renum ambitum, sed horum quoque pertinent substantiam, adeo ut intimam cum intestinis, ventriculo, Hepate, Liene aliisque consensionem, in multis morbis quam molestissimam, nobis pariant.

Arteriae hae, Venae & propagines Nerveae, cellulosa nitide convinctae, accedente pelvi & molli pingui, omnibus intersuso,

Renum finus incolunt, totosque explent.

g. VIII.

Vafa Renalia, ab ortu considerata (§. vII.), ulteriori suo decursu, distributione, fine ac functione cursim prosequi, ordo jubet.

jubet. Haec pervestigaturis universa Renum substantia subtilisfima sese nobis praebet cognoscenda. Hanc quidem incisio duplicem esse ostendit, Corticalem scilicet & Papillarem. Illa, a situ suo sic nuncupata, alteram ceu cortice amplectens, extima, proprio Renibus imbuta colore, mollis & lenta, ad vifum homogenea, vix fibrofa, continua fibi & in aetate hominis provecta, digitum craffa apparet. Haec, interior, ceu medullaris, a papillarum, in quas abit, forma nomen consecuta, subalbicans, solidior & compactior, interrupta, priori quasi ubique agglutinata & interferta, latiori circa medium plaga extrema versus est attenuata. Papillae istae, vel carunculae papillares, a similitudine, quam cum mammariis gerunt, ita nominatae, pyramidalis quodammodo figurae, a latiori basi, Corticalem tenente substantiam, in obtusum mucronem deficiunt. Aliae ex iis aliis grandiores amplioresque longius protuberant, dum aliae breviores & magis coactae fedent. Vario ut plurimum numero, fex, feptem vel quandoque octo quolibet ex Rene prodeunt, cujus vero diffectione duplo evadunt plures; ut a quibusdam inconsiderate referentur. Omnes vero & singulae eo dispositae sunt modo, ut vertice suo ad sinum renalem conversae in pelvim incidant. Hisce solis sensibus edo-Etis, tantum abest, ut vera & intima pateat fabrica, ut contra sit abditissima. Ad hanc vero eruendam plurimum juvit. 1°. Sectio, more Eustachiano fere inimitabili instituta, qua constat arterias & venas Renes introgressas, statim quaquaversum diffundi. ita ut mediae, rectius versus ambitum ductae & reflexae, ibi introrfum ferpant, laterales vero, continuo recurvatae ad extremitatum formam incedant. Primo hoc itinere canales illos se eximie promittere atque pro magnitudine sua ramos similiter insignes, fed minus crebros, at progreffu fuo fenfim decrefcentes, minores quoque & copiosiores dispergere. Haec vasorum renalium facies ut ut Renum quandam speciem perbelle exprimat; horum tamen structurae adhuc nobis saltem dat lineamenta. Hisce persiciendis incredibiliter profuit. 2º. Praeclara injectionis ars, in qua excolenda recentior praeprimis aetas quam felicissime versata fuit. Ejus auxilio a principibus Anatomicis detectum & ad oculum fere demonstratum fuit, quantum viscera nostra in sinu suo interiori recondant artificium. Videlicet repletis dextre Renibus, cernere est (a) horum corticalem substantiam maximam partem ex mul-

tis minutissimorum, mirifice sibi implicitorum, & sibrosa concrescentium textura, vasculorum myriadibus esse compositam; (b) observatam ante divisionem & distributionem eo pergere ordine, ut vaforum majorum ferie continua fefe invicem propagantes, successive numero, exilitate, angustia atque tenuitate ad incredibilem ufque fubtilitatem crefcant; (c) illas omnino universas a cursu suo rectilineo spatiolis minimis omni fere puncto deflecti, ita tamen, ut longe plurimi a Renum amplitudine, quam reptatu serpentino eleganti perambulant, ultimo substantiam papillarem versus pertendant; (d) arterias venasque pares ramificationum leges viasque sequentes easdem, perpetuo sese quousque sensibus consectari datur, concomitari, constituto inter utrasque commercio frequentissimo liberrimoque, ut facillimo in se aditu pateant; (e) substantiam papillarem non attexi simpliciter corticali, sed ultimis huic continuari canaliculis, nomine fistularum Bellinianarum vulgo notis, numerofissimis, exilissimis, cellulosa strictissime nexis & radiorum instar, ex latiori Renum ambitu recta dimanantium ex proximo fingulas versus papillas convergendo sensim ad harum circumferentiam patulis demum ofculis exeuntibus.

S. IX. an analysis of the recorder of

Perquifita haec in univerfum Renum structura quam eximie Oeconomiae suae conformata sit, facile liquet. Hujus quidem multiplex administratio ad unum tamen potissimumque secretionis urinae usum respicit. Hujus causa multus, ex communi sonte vitali largiter haustus, ab arteriis emulgentibus affertur sanguis, qui viribus cordis, arteriarum ipfarum, respirationis & motus animalis appulfus per renalem substantiam vividissime agitur. Hoc trajectu 1°. pars ejus longe maxima, crassior, blandior, levior & inertior, ab organis repudiata fecretoriis, in pristinum circulum ad vitae universalis emolumentum revertitur. Atque huic solito redditur muneri venarum fanguiferarum, quae primum ab arteriis ejusdem nominis prognatae, innumerabiles & perexiles, fensim inter fe confluentes, ambas demum conficiunt renales, venae cavae infinuatas. Quam expedita atque aperta fit haec via, experimenta injectoria faepius iterata luculente testantur. Nobilior 2º. portio aquofior excrementitiis magis onusta particulis iisdem provecta cau-

causis motricibus, vasorum angustiis superatis, ad ultimos usque corticalis fubstantiae terminos pervenit. Ipsa hojus mirabili valde fabrica sapientissimae naturae auspicio & instituto, non facile explicabili, fecreta ad papillarum dein fedem promovetur, qua mox fiftulas Bellinianas, ceu ductus excretorios; fecretoriis immediate continuatos ingressa, horum demum patulis ex osculis, libere circa illas hiantibus, erumpit. Notandos hic omnium instar meatus, quo praecipua Renum functio abfolvitur, haud difficili rurfus negotio adacto fluido colorato nobis commonstratur. Hoc nempe una & perpetua canalium ferie, nulla conglomeratione glandulofa intermixta, permanans fat prompte ex tubulis illis ultimis urinariis dilutius paulo exstillare solet. Quin imo sola horum pressione lotium conspicuis prolici posse guttulis, ut roris adinstar provemat, dudum fuit exploratum. Vifcera nostra 3º. ex humorum fuorum massa lympham nobis depromunt laudabilem, quae a nutritionis opere superstes & superstua, propriis recepta valis ad Chyli receptaculum defertur. Non spernendam ejus esse copiam numerofae comprobant venae lymphaticae, quae arteriofae originis ex interioribus emergentes, Renum fuperficiem perreptant & tandem in trunculos quosdam majores congregatae ad glandulas lumbares, ut & vicinum ductum Thoracicum procedunt. Mirandum certe, perspecta hujus actionis indole, Naturam eandem fabricam tam variis potuisse aptare usibus, ut nullis deficiat. Ad hanc multiplicem humorum dispensationem accedit 4°. functio universalis, cutaneae similis, quae Transpiratio dicitur. Ut viscera omnia, ita & Renes propriam circa fe habent atmosphaeram, pulfis ad ambitum fluidis fubtilioribus, quae halitus specie ex omni ejus puncto evehuntur. Hæc vaporosa emanatio ex arteriolis sit minimis, quae a majoribus internis profectae, continua progerminatione ad exteriora migrant. Ex his aliquae, saepe numero longius extensae, ad ipsam adeunt fasciam adiposam, hancque Renibus leviter conjungunt. Nec minus & hic naturalis viget reforptio, non contemnenda liquidi vitalis restauratrix, bibulis mandata venis, quae innumeris principiis extus natae, ad intus fe recipiant, Emulgentibus committendae, quarum inde systema omnibus numeris absolutum redditur.

rementaris marcis confus partionis iisdom provedla

eo feafan ofque dinimuncuex ut. el imo pros famous engulting

- Ex Renibus, munere defunctis suo, urina continente, qua depluit, vi in vesicam confluit. Canales, quibus excipitur devehiturque notissimi, ab officio suo Ureteres vulgo vocantur. Hi ob aptissimum cum iis nexum, consensum mutuum & morbi nostri ex iplis proventum, in prima hac Anatomica Differtationis parte haud omittendi esse videntur. Originem trahunt suam ex pelvi. quae, quasi cifterna quaedam, tota membranacea, fatis ampla, inaequabilis, dilatabilis multo, retro vafa emulgentia fita, inferius extra sinum renalem prominet. Una & continua ibi ex ramis seu tubulis quibusdam producitur singularibus, tenuis quoque & membranofae indolis, figuraeque irregularis, qui basi papillarum per orbem circumpofiti, finguli adeoque harum numero respondentes, mox inter se varia specie coëunt, expansique cavitatem pelvis efformant. Haec jam angustata cito, ad infundibuli instar. in ureteres abit, qui fortes, pennam circiter anserinam crassi, ab adfrecta non male veteribus nervosi dicti, longique a Renum altitudine flexuoso cursu per lumbos ad vesicam contendunt, in quam demum obliquo inter membranas decursu a regione posteriori non longe a collo, egrediuntur. Huc ita & descensu naturali & motu quodam systolico & diastolico ureterum atque agitatione partium vicinarum deducta urina aptissimum reperit locum, quo congesta sensim morari possit, usque dum opportunum excretionis tempus eveniat. accendents, allien smo ye Ronum fedges non parum violentis

corporas conculatios de villet Xu Dedormalines gravitationi eft expolica, quibus parties homogram amputus hoc versus retraftiur,

Haec, jam summatim descripta, organa sunt, quae haud exiguo certe cum sanitatis & vitae periculo Nephritis invadit. Ea sic quidem esse nata, ut hac occupari facile possint, nemini, qui, gnarus sabricae illorum, inslammationis doctrinam simul leviter attigit, arduum erit perspicere. Haec tota ab obstructione pendet sanguinea, transitum intercludente, cum valido & febrili humorum, a tergo incessentium, impetu conjuncta. Utraque haec conditio, proh dolor! aeque in gemina nostra, quam in alia quaecunque corporis humani viscera incidit. Etenim 1°. illa ex canalibus constructa conoideis vel arteriosis, quorum in progressu sectiones

eo sensim usque diminuuntur, ut ultimo prae summa angustia. omnem visus aciem quam longissime effugiant. Neminem latet hanc illorum figuram, pulchellam caeterum efficacissimamque, atque parvitatem, inter plura rationem praebere mechanicam praecipuam, ex qua, quotquot funt, morbi inflammatorii folent derivari. Vafa illa 2º. a primo introitu fuo ad exitum ufque flexuofum maxime & anfractuofum pergunt iter, quod fane mireris. fluida nostra naturalia semper eluctari posse. Eo uti horum impetus repetitis in curlibus multum retunditur; ita & velocitas, directio & aequabilitas fluminis valde mutatur, auctis omni puncto resistentiis, a quibus demum obstructionis discrimen redundat. Ipsa haec vasculosa fabrica 3º. adeo stricto & subtili nexu concrevit. ut densitatem & duritiem substantiae renalis reddat haud mediocrem, quae novam afferat circulationi moram, necesse est. Ea Renum textura 4°. pro sua, qua gaudet sensilitate spasmodicas quoque sustinet affectiones, quae quam variis humorum motum perturbare possint modis, inter Medicos palam constat. Certe observatae dudum mutationes, quae in secretione & colore urinae ex Hystericis, Hypochondriacis, Colicis, Podagricis & Arthriticis affectibus oriuntur, nullum in his dubium nobis relinquunt. Neque 5º. filentio praetermitti debet infigne adipis pondus, quod. Renibus saepe numero superfusum, pressione sua non parvam illis vim inferre solet. Quicunque 6º. sanguinis, huc advecti, molem, celeritatemque secum animo reputat; ille sponte assequitur, nihil impedire, quo minus & hic, ingruentibus causis, Phlegmone accendatur. Quin imo 7º. Renum sedes non parum violentis corporis concuffibus & viscerum abdominalium gravitationi est exposita, quibus partim humorum impetus huc versus retrahitur. partim ordinarius illorum cursus distinetur sufflaminaturque. Materies urinae 80., quae ex omnium coctionum officinis perpetuo & ubertim affluit, acrimonia & crassitie particularum, quibus in sano. fed maxime morbofo statu ex metastasi scatet, multa crebro invehit mala, ex quibus etiam Nephritis confequi potest.

figurium .IIX . I morre. Urca wa hacera

Ut vero effectu ipso spectabilem Nephritidis ortum intueamur; ad causarum hujus enumerationem perlustrationemque exactam

deveniendum est. Hae, quam multae sint & diversae, tam forma, quam vi sua, praxis medica luculenter nos edocet. Facilis in harum disquisitione ordo tenetur, si ad memoratam (s. xi.) duplicem conditionem, obstructionem scilicet Phlogisticam, & hujus comitem individuum, motum febrilem concitatissimum, animum advertamus. Hinc statim primaria nascitur causarum dichotomia, quae proximam complectitur, in inflammationis historia valde momentofam. Priores vel ad vitia arteriarum fanguiferarum, vel massae sanguineae, vel utriusque, referri solent. Illae sola, quam patiuntur, cavi sui angustatione sunt notandae, quae (a) vel ex virtutis contractricis vitalis excessu, vel (b) prava canalium illorum indole, vel (c) violentia quadam externa existit. Inter complures, quae triplici hac classe contentae, remotiori titulo describuntur, causas & quidem primas, a nobis animi Pathemata numerantur. Haec veluti tyrannidem in rempublicam corporis humani exercent. Ea, qua hoc pollet, facultas motrix, non aliunde quam ex fonte nervoso promanat. Quare, quam primum hujus liquidi enormuntici in fibras influxus augetur, harum actio fystolica actutum intenditur. Verum quid quaeso systema eius mobiliffimum vehementius percellt, majoresque ciere fluctus potest, quam affectibus agitata mens? Hinc, qui se late ubique diffundunt, motus spastici arterias praeprimis ad tantas redigunt confrictiones, ut frustra saere obstructiones inflammatorias arcere coneris. Atque hae eo effectu in cuncta cadere possunt viscera. & Renes quoque opprimere; quemadmodum observationes practicae ab omni fere tempore perhibent. Quae autem eo nomine & omine finistro, maxime notanda Pathemata, funt, quae calidiora vel vehementiora appellantur; ut ira, terror &c. Haec, si quae alia, hominem nervosnm quam gravissime afficiunt, ut fluida nostra instar torrentis ferantur & valde inaestuent. Quapropter haud mirandum, si, motis tanto fervore turbis, Nephritis oriatur.

S. XIII.

In numero causarum primae classis (§. x11.) magna quoque stimulorum vis, ex multiplicis naturae acrimonia ingenita, nobis ponenda venit. Haec in se spectata, licet proprie ad morbosam sanguinis diathesin pertineat; at actu tamen suo in solidorum affe-B 2

ctionem transit. Ejus enim labes eatenus modo Phlegmonen creat. quatenus fenfiliffimas arteriolarum tunicas, vel extus, vel intus. pungendo, rodendo, & lacessendo earum contractionem naturalem pervertit, convulfivam reddit ac turbulentam, circulationis campum angustat, sicque, quibus inhaeret, liquidis, impetuose actis, & allectis viam praecludit. Ea, quae hic praeprimis tragaediam agunt, acria funt 1°. ingefta quaelibet, fale volatili mordaci alcalino gravida, quae antiscorbuticorum catalogo vulgo inscribuntur; 2º. Aromata Indica calidiora & ex his confectae conditurae, perniciales gulae deliciae & irritamenta, quibus secunda mensa egregie ad aegrotationem instrui solet; 3°. potulenta ex iisdem cum spiritibus & vinis generofioribus parata & immoderate hausta, neque non cerevifiarum fervidiorum genera, quae, praeter Nephritidem, tot nobis conciunt mala, ut vere & recte dicatur: Non facit ad longam crapula multa diem. 4°. Nativa & composita balsama quam plurima, Therebinthinata, Sulphurea, Juniperina & olea ex his destillata acerrima, quae Antinephriticorum nomine vulgo superbiunt; 5°. Diuretica illa potentissima & ferme caustica insecta. Afelli, Formicae, Lumbrici terrestres, Coccionellae, Cantharides & Pharmaca ex his varia fed exitiofa arte effecta; quae, fponte fua velocissime Renes petentia, horum substantiam pervadendo vasculosam non solum deterunt, lancinant & convellunt; sed magnam etiam humorum copiam fecum abripiunt, ficque non una ratione inflammationem apportant; 6°. Mercurialia Æri juncta. hujus tincturae cum spiritibus alcalinis, vapores arsenicales & alia venena, quae spasmo universali inducto terribilique, Renes facile incendere possunt; 7°. Aphrodisiaca, nimia irritatione semen prolectantia, a quibus uti partium genitalium aestus & turgescentia. ita & totius systematis uropoietici valida commotio tensioque saepissime excitatur. Ex quibus sponte elucescit, quantum & huic velificetur immodicus Veneris ufus, cujus voluptatibus caeterum foede corpora liquescunt.

J. XIV.

Altera causarum inflammationis nostrae classis multifaria, quae fabricae arteriosae innascuntur, vitia recipit. Haec ordinario duplicis statuuntur generis, alia quae in parte ejus membranacea. & alia,

alia, quae in vafculofa verfantur. Illa quae & qualia fint, Anatome practica nobis luculentissime ostendit. Videlicet constat ex hac, molles tenerasque arteriarum membranas praeter naturam faepe emungi, ficcescere, rigescere, stringi, crispari, perrodi, exasperari, crassescere, ossescere & a sana natura sua millenis forsan aliis modis degenerare. Pars vasculosa, pro ea, quam toties flupemus, subtilitate, tenuitate, & mirifica ramorum diffusione multum quoque periclitatur humorum stagnationibus, congestionibus, obstructionibus, tumoribusque, quibus introrsum verfis arteriarum primarium cavum per gradus coarctatur, ita ut demum quandoque aboleatur totum: quod si nunc constructionem Renum, urinofae materiae, continuo & copiose appellentis, secretionem, calculofarum concretionum rationem & colluviei morbosae per illos transfluxum, criticamque evacuationem, naturae folemnem, attendamus, facile ad credendum inducimur, recensita mala in Nephritidem posse evadere.

gisque augeleit, ut lapilli fo. V. X. anagaitedinem capint, ille

programm non folum, quem celidet, canaless obcernt, fed ponde-- Quae in tertia classe expendendae funt Nephritidis causae violentiae externae specie sese nobis objiciunt. Hae vel omnes, vel pleraeque, magis minusve graves funestique sunt casus & affectus. qui extus vel intus nati, Renibus finistre incidunt. Inter eos primo habentur vulnera, quae vel lumbis folum excipiuntur, vel altius ad illos usque penetrant. Utroque ex infortunio Nephritidem effe metuendam, planissime liquet. Sive enim viscera illa ipsa sint fauciata, vel partes finitimae laefae; inflammatio vera ijs proxime supervenit, vel hujus effectu ab externis ingruit; facto scilicet tumore, abscessu, puris cumulatioris elapsu, confluxu similibusque. Idem porro instat periculum, si interius in locis Renum vicinis Phlegmone obtingit, haecque benigna refolutione expediri nequit, vel intestina flatu funt distenta, vel humores effusi circumcirca colliguntur, acres fiunt corroduntque. Quidne praeterea pertimelcendum a lumborum percustu, ictu, lapsu & hujusmodi laesionibus pluribus? Contusio, quae hic evenit, partium formam & fabricam organicam funditus faepe evertit, ita ut valis disruptis & contritis, fluida effundantur, haereant, corrumpantur intermorianturque fere omnia. Quin ingens, quae his subnasci solet, ettam

inflammatio, nostrum rursus afferre morbum possit, haud dubitatur. Verum alia adhuc violentiae externae obtinet ratio. Renes licet cavo abdominis fint exclusi, hujus tamen visceribus substernuntur (. Iv. & v). Illi ergo, homine supino jacente, eorum sustinet molem, qua continuo urgeantur, musculosae carni duriori apprimantur, comprimanturque, est necesse. Hinc, arctatis denuo vasis, humores liberiori suo transitu prohibentur, in majores incurrunt angustias & crassior praeprimis densiorque sanguis, vivide impulsus, ad obstructionis veluti necessitatem compellitur. Quapropter fomno nimio & diuturnioribus morbis haud infrequenter intercedit Nephritis, aegrotantibus longo tempore lecto fuo detentis. Ne alia plura meminerimus mala, quae eadem ex stirpe trahuntur; ut praecipue nominanda est calculosa saburra, qua referti Renes miseram inflammationis sortem subeunt. Ea quam primum fefe internis vaforum parietibus affigit, pofito quafi rudimento, ceu femine, fensim accrescit, eoque jam, cavo illorum diminuto, flumini vitali obviam oblistit. Prout deinde ipsa magis magisque augescit, ut lapilli formam & magnitudinem capiat, ille proprium non folum, quem obfidet, canalem obturat, fed pondere etiam suo & duritie, tumoris instar, vicinos circumcirca coangustat, horumque aditum includit, ex quo nova formidolosaque obstructio progignitur. Hujus demum causa non modo ex tali violentia, verum quoque ex resistentia externa advenit. Haec. quae nobis praecipue est annotanda, quandoque ex ureteribus surgit. Hi vel tumore, membranis suis innato, vel ingesta materie crassa, fordida & terrestri, urinis permista, vel calculo, ex Renibus delapfo, vel grumo fanguinis adeo obstipantur, ut nihil amplius lotii transmittere queant. Interea, dum hoc jugiter ex papillis destillat, (f. viii. ix. x.) supra obicem collectum brevi adscendit fupernam ureteris partem cum pelvi explet, distendit immaniter & impressione insuperabili in finum renalem & vasa huic inplantata secretionis suae officinam destruit. Tam multiplices, quam potentes, atque ancipites his interfunt concurruntque Nephritidis causae, ut certe cuilibet sese sponte ante oculos exponant. ribus plurbus? Concesto, once his evenir, partitum termism

beiten der gemeine fane .1 VX . Derette, itt der velle illerette

Nephritidem, ut aliam utcunque inflammationem, ex vitiato etiam

etiam latice sanguineo manare, sub generali causarum divissone (f. xII.) innuimus. Ille quo noceat modo, si acrimonia laborat, vel ex corruptione propria vel particularum hostilium peregrinarumque admistione, visum fuit (S. XIII). Jam idem rursus incufandus, non ita quidem blanditiei, quam tenuitatis justae defectu. aut craffitudine nimia, denfitate, tenacitate, lentore vel, fi mavis, viscositate. Haec sive aestu cæli generetur immodico, sive justo majori actionum corporisnostri affiduitate, ut vigiliis, laboribusque nimiis, five Chyli craffi & viscosi excesso, five pravo rerum adftringentium spirituosarumque abusu, sive intemperie qualicunque; canaliculi arteriofi, fanguini tali vehendo inepti, dum fortius excitantur, in obstructionis discrimen conjiciuntur. Atque hoc præfens habetur, si motus circulatorii fervor accedat spissumque liquidum a tergo propellere ulterius infiftat. Quin imo idem ille impetus fanguinis, caeterum laudabilis, curfum adeo accelerare potest, ille ut ex vasorum suorum finibus in alienos projectus impactusque subtilioribus consistat. Quae hinc inducitur singularis inflammationis species ab errore loci appellare consuevit. Hanc, aeque ac alteram, Nephritidi esse adscribendam, facillime cognoscimus, si ejus specialiores causas, huc pertinentes, attente parum speculemur. In his merito ponitur cursus violentior, cui universa humorum velocitas & excretionum cutanearum proventus femper responder. Sed cum festino pedum motu lumbi valde quatiantur, & corpore translato mobilia abdominis viscera, mox furfum, mox deorfum, ruant; manifestum est, iis Renes non leviter simul feriri, contrudi & liquida sua densiora & accelerata fortius vicissim transadigere. Haec, si acrius provoluta, si ductus uriniferi laxius pateant, hos permeant & foras saepe proripiunt mictu cruento, vel circa strictiora eorum principia retenta & coa-Eta Nephritidem procreant. Non minus reprobanda esse violentiora corporis exercitia, labores graviores, faltationes, luctas, ponderum elevationes & similia roboris virilis & heroici pericula, quilibet lucide videt. Intensiori enim, qui in iis editur, nixu totum veluti genus musculosum insurgit & intenditur, spiritus pulmonibus coërcetur, his ita distentis & inflatis sanguis venosus in itinere suo ex dextro in finistrum cor accumulatur retardaturque. Eodem tempore contracto Diaphragmate, subditae partes depelluntur, colliduntur, constipanturque, compressis rursum ab omni re-XVIII

regione Renibus, inter prela veluti politis, valisque fanguine tomentibus. Quid inde? hic cum prompte circulum fuum remetiri nequeat, gradum tunc sistit, vel faltem lentius serpit, pressionis fuscipit molestiam ab incumbentibus & in extremum necessario adducitur (f. xv). Vix opus est pluribus, proposita lustranti. ad perspiciendam vim illam detrimentosam, qua Renes equitatione citatiori afficiuntur. Quantusne hoc ex frequentiori corporis fuccussu viscerum omnium projectus? quam gravis horum dum deorfum feruntur, cum illis collifus atque percuffio? neque his parum fimul aortae descendentis sanguinem praecipitari, inferiora versus rapi, Renes inundare, impetere & ex errore loci inflammare, nemini obscurum esse potest. Verum cuncta haec mala eo magis esse extimescenda, quo plus humoribus abundat homo, res ipfa loquitur. Sola profecto Plethora, causis enarratis existentibus, ita est comparata, ut in Nephritidem abeat. Quapropter non mirandum, hanc, suppressis evacuationibus naturalibus menstruorum, imo & morbosis Haemorrhoidalibus, ad Renes versis. contingere, quemadmodum observationes practicae, fide dignisfimae, luculenter comprobant.

S. XVII.

Altera conditio, quae veluti essentiam obstructionis phlogisticae ingreditur, in motu febrili posita esse deprehenditur (§. xu). Tota ab hoc manat vis illa intensa, cum qua liquida, libere adhuc circumeuntia, in canales infarctos irruunt. Ea si curatius paulo inquiratur, neutiquam videtur simplicem adeo, quam quidem statuunt, mechanicam circuli imminuti rationem, sed potius stimulum prorsus singularem sequi. Hic, qualiscunque etiam suerit, externus vel internus, naturalis vel praeternaturalis, ad virtutem motricem solidorum nostrorum proritandam valeat, oportet. Agitur ergo unice de systematis nervei assectione violentiori, quam, quae praecedunt, vel conjunctae sunt inslammationi, causae facile producere possunt. Harum jam nomine merito designantur omnes, quae exposito modo Nephritidem pariunt, cujus ergo tam obstructionis, quam febris acutissimae, ratio vera dilucet.

istidam Great, un diffici co lilly x c. 200 C horum, doi ex co-

-Postquam Nephritidis ortum dedita investigavimus opera; noftri erit, continuo tractationis nexu exitiofos ejus effectus persectari (f. m). Hi cum numerosi sint & natura multum discrepent. ea commode serie exponuntur, qua ex composito inflammationis statu, nimirum obstructione rubra, & impetu febrili profluunt. Hic primum, in universum spectatus, vehementer saevit excitatque aegro aestum intolerabilem, sudorem, sitim, vigilias, inquietudines, deliria & quae haec ordinarie comitantur symptomata quam plurima. Ipfe vero ea, qua proxime in morbi fedem grasfatur, violentia materiem impactam percutit, intrudit altius, immotam compingit, denfat & canales arteriofos, illa obfessos, nec liberandos, fortiter atterit, infringit, perurit, distendit, extenuatque. Unde statim dolor oritur vere inflammatorius, ingens, fervidus, tensivus, pungens, profundus atque in lumbis ea parte fixus, qua Renes jacent (s. iv). Inde si horum dexter fuerit inflammatus, ille supra ad Hepar, septum transversum & infimas hujus lateris costas, si sinister, ad Lienem & infra versus spinae extremum excurrit. Eadem actione febris fatali, qui simul summo cruciatu increscit tumor substantiam vasculosam magis magisque occupat, opprimit, coarctat & fic obstructionis plagam fecum in omnem ambitum extendit. Effectus hi proximi tempestatis febrilis novum fymptomatum agmen conflant, quod per totam fere machinam animalem misere erumpit. Videlicet cum nervosi generis nexu tam eximia Renibus constituta sit cum visceribus abdominalibus confensio (s. vii.); cuncta ex hac, illis laborantibus, vehementiffimas trahere turbas folent. Hae dirae funt illae convulsiones, dolorificorum tumorum comites, quae omnia pervagantur. Ventriculus, iis suo impeditus officio, totus mox subvertitur, testibus inappetentia, horrore, nausea, ructibus continuis & vomitu terrifico, qui ad bilis ejectionem usque aegrum miferrime divexat, neque ullis remediis facile compesci potest. Fistula intestinalis similiter agitata, pessime habet, doloribus urgetur vagis intensissimis colicis Iliacisque, anxietate, inflatione abdominis, tenfione & alvi fluxu molestissimo stipatis. Quin & spasmorum vis inferiora incessit & canales uriniferos, vesicam, organa genitalia & inguina quam gravissime afficit. Quid? quod ea adeo longe interterdum serpat, ut dissiti corripiantur testes & horum, qui ex eodem cum Rene inslammato latere pendet, dexter vel sinister, non
solum indoleat, sed etiam sursum retrahatur. Praeterea cum gravis tumor inslammatorius in partes subjectas musculosas recumbat; hae non levem ex pressione noxam capiunt. Hinc sieri haud
raro solet, ut unum alterumve crus propemodum Paralysin nanciscatur, quam & stupor & immobilitas satis portendere videntur.

J. XIX.

Quod ad symptomata attinet Nephritidis, quae sola ex obstructione inflammatoria proficiscuntur; haec non minus gravia func & ferocia, quam modo exposita (s. xviii.). Ea quidem morbi pars non adeo, ut prior, actu suo furere apparet, cum inertissimal ejus materies, immobilis plane, in arteriarum angustiis desideat. Verumtamen eo ipfo illa omnes corporis functiones & praecipue Renum mirifice turbat, hoc est, urinae secretionem remoratur intercipitque. Hinc dum 1º. particulae acres urinosae ea, qua debent, copia, via illa excludi atque expurgari nequeunt; ipfae multum in sanguine remanent, replent hunc, inficiunt & teterrime corrumpunt. Unde memorata non folum fymptomata ingravescunt, sed novorum sit accessus, quorum natura ex Cacochymiae praesentis genio percipitur. Ea 2º. obtinet in motu humorum nostrorum lex, ut hi, opposita in una parte resistentia, in aliam abundantius sese conjiciant. Quicunque nunc ex Renibus fuerit obstructus; sanguis ab hoc repressus, in alterum, ex adverso proxime fitum, facile involat novamque calamitatem importare valet (f. xvi.). Eadem ex causa ille deorsum pulsus in vasa spermatica proxima & libera rapitur, quae redundationis effectu inguina & testes quam gravissime afflictant. Cum 3º. pro majori minorive obstructionis magnitudine, vel plura vel pauciora vascula secretoria vitiata sint vel destructa; ea, quae adhuc redditur, urina in copia, colore, odore, confistentiaque vel substantia quam plurimum differt. In principio, flagrante maxime spasmo, mingi solet pauca, tenuis, aquae adinstar insipida & ferme tota inodora. Ea quae deinde, morbo paulo provectiori, mittitur, colorem fundit flammeum, ruberrimum, pertinacem & acrimonia fua ad molestissimam stimulat micturitionem. In Nephritide calculosa.

urinosam vehit materiem & continuo, at inani, mingendi conatu, aegrum dies noctesque fatigat. Quandoquidem tandem, silente prorsus Renum actione, egeritur nulla & nata Ischuria vehementissimorum symptomatum agmen claudit.

alcojus momenti errorem in rerum fon nonnatoralium ufit admit-

Pervestigatis rite intellectisque Nephritidis causis atque effectibus; tota ejus facies indolesque ab omni parte fefe nobis repraefentat. Ergo & vera ipsius jam habetur Diagnoseos theoria, quae corpori aegro praesenti recte applicata, artem fallere nequit. Ut vero uno quasi intuitu scitu necessaria pateant signa; praecipua ex fymptomatibus commemoratis (§. xvIII, xIX.) conferre paucisque complecti, operae pretium erit. Quod si quis genuina affectus est Nephritide, praegressa una alterave causarum (s. xII. ad xvii.); ille cum febri acutissima perpetitur ardorem, pulsationem & dolorem lumborum acerrimum, levari nescium atque quacunque decubitus & fitus mutatione, nec non organorum respiratoriorum, & cum his conjuncta viscerum abdominalium agitatio. ne violentiori gravescentem. Idem simul, sed mitior paulo & variabili fensu percurrit dorsum, abdomen, femora, inguina & teftem unum alterumve, Reni morboso proximum. Naturalis porro urinae fecretio multum perimitur, fluitque faltem fub ingressu morbi pauca, clara, pellucida, cruda, tenuissima, deinde saturatissime rubra, sed parca semper, iterato laboriose & anxie evacuanda, atque interdum plane nulla. Interveniunt his anxietates praecordiorum, ructus, anorexia, imo horror ciborum, vomendi conatus affidui & vomitiones creberrimae etiam a blandissimis haustis, tormina ventris, Colicae & Iliacae passiones, ac Diarrhaeae. In hoc miserando naturae statu demum torpida jacent, immobilia, & stupore oppressa, crura ambo, vel illud, quod loco affecto respondet. Cuncta haec phaenomena attente observata, caufarum fimul habita ratione, tam certo nobis Nephritidis praefentiam declarant, hanc ut facili negotio a morbis affinibus, Calculo Renum, Colica inflammatoria, passione Iliaca, Lumbagine Rheumatica, dolore Ischiatico & Nephritico hysterico internoscere possimus. Ut praecipuas, quae differentiam illorum specificam constituunt, notas breviter recenseamus; Renes calculum gerere

592 224

testantur dolor hebes & gravativus, regione lumborum circumscriptus, allato stimulo potissimum motu corporis majori acerbior, prinaque arenulis & lapillis faepius onusta, aegro caeterum fat commode valente. Verum fedulo huic cavendum eft, ne quem alicujus momenti errorem in rerum fex nonnaturalium ufu admittat, quippe quo brevi obstructio in Nephritidem inflammatoriam convertitur. Ab hac discernitur Colica dolore a spina remotiori. per abdomen anterius magis diffuso, post assumpta oppido increscente, nausea terribili, vomitu fere continuo, alvi pertinacisfima faepe obstipatione, excretioneque libera urinae haud stranguriofae, fed turbidae, crassae & valde coloratae. His ipsis sese adhuc manifestius distinguit passio Iliaca, utpote quae altiorem tubi intestinalis partem in medio magis ventre collocatam prehendit, ideoque a Renum sede longius abest. Lumbaginis Rheumaticae & mali Coxarii vel Ischiatici dignotio haud difficulter a locotum conditione, tactu & aspectu petitur, misso symptomatum leniorum discrimine satis insigni. Quod Nephritidem hystericam tandem attinet, haec tum accessu suo, quam cursu & exitu, adeo longe a nostra recedit, ut a tyrone in praxi medica confundi nequeat.

J. XXI.

Tradita hactenus Nephritidis hiftoria fola, quae adhuc huic adjicienda restat, prognosi generali integre absolvitur. In hac nobis ambiguum veluti certamen naturae cum morbo ejusque exitum fecundum vel finistrum, ante oculos proponimus. De hoc in viscerum nostrorum inflammationibus ut plurimum esse metuendum, ex eminentissimis, quae gerunt, vitae muniis, in univerfum constat. Hac ex ratione nec Renum phlegmonem periculo vacare, arguendum erit. Verum hoc, dum accidit, metiendum est 1°. causae allatae violentia & hac nata inflammatione majori vel minori (§. xII. ad xVI.); 2°. fymptomatum vehementia, ex actionum plurium pauciorumve vitalium & naturalium perturbatione potissimumque ex urinae vel praepedita valde, vel inhibita prorfus, evacuatione aestimanda (J. xvIII. xIX.); 3º. illorum pertinacia & rebelli contra vim remediorum genio; 4º. aegri aetate provectiori, infirmitate, & temperatura calidiori ficciorique: 5°. fre5°. frequentiori morbi ex calculo recursu; 6°. medicamentorum magis minusve convenienti administratione.

C. XXII.

Anceps ille Nephritidis exitus, qualis futurus fit, fanftus vel funestus, distinctius percipietur, si triplicem communem inslammationis decurfum in fanitatem, alium morbum & mortem expendamus. Primus Naturam nobis fiftit victricem, malo debellato vel virtute propria fola, vel arte auxiliatrice accedente. Haec, qua morbus cedit, via Resolutionis dicitur, qua materies obstructionis superata vel humorum consortio restituitur, vel operosiori foluta modo, morbofae adhuc indolis, foras amandatur. Prioris eventus spes nobis elucescit ex naturali corporis aegri conditione a diathefi phlogiftica acriori aliena. Ea fe in folidis prodit mollitie, flexilitate ab moderatiori in actionem nifu atque in fluidis lenitate, gravitate justa, tenuitate mobilitateque. Hic Oecomiae nostrae status non finit exardescere nimium febrem inflammatoriam, fed hanc ita fustinet, ut impactum modo rite aggrediatur, atque submoveatur. Eo nunc faciliori hoc opere excludit, quo minus fortiter adactum compactumque pauciora obfidet vafa obfequiosioraque. Hinc plerumque perfecta ante septimum ab ingressu morbi diem vel in mitiori ante decimum quartum ex observatione practicorum confequi crisis solet. Haec ea ratione producitur, ut proxima Phlegmones causa materialis attenuata, fusa & cocta ex vasis renalibus successive prematur & excusta per fistulas Bellinianas continuas (f. vIII. 1x.) agatur & cum urina educatur. Haec, quae tunc vere critica est, redditur multa, crassa, rusta, & fedimento gravi, spisso & albido obsessa. Auspicatus ejus fluxus pergit tam diu, donec omne inflammatum prorfus discussum exhaustumque fuerit. Eo tempore simul acria, quæ exorta erant, symptomata paulatim levantur, abeunt cessantque demum omnia, fanitate integra redeunte. Uti nunc in aliis morbis inflammatoriis, ita etiam in nostro natura semper actuosa, salutaribus evacuationibus fibi faepe mederi optime novit. Inter has merito laudatur haemorrhoidalis, quam Melancholicis, Nephriticisque bonam effe Magnus Hippocrates nobis annotavit. Recentior Medicorum schola huic jure consentit, perspecta clarius excretionis illius lius indole, qua multum fanguinis spissi, venosi, plus minus atri ex systemate circulatorio vitali expurgari solet. Hoc sic libere & largiter sluente, massa humorum statim minuitur & ea liberatur parte, qua Nephritis opprimi & gravari maxime posset. Verum praeterea cum eo successive mutetur circulationis impetus & ad inferiora adducatur; Renes minus infarciuntur, urgentur & a mole sua expeditius vindicantur. Non dubium est, quin opportuna uteri Haemorrhagia eosdem saluberrimos effectus edere queat.

g. XXIII.

Exposita paucis benigna Resolutionis forma (§. xxII.); haec quam egregie faluti respondeat aegri & gloriae artis, sponte liquet. Nulla certe hac utrique optabilior, nullaque praeclarior unquam accidere potest. Gravissima eo mitius feruntur mala; quo minus funt longingua & diuturna. Nephritis ex natura inflammationis suae ad brevem adeo felicemque semper perduci finem nequit. Pertinacior quandoque, violentioribus nata ex causis, grandiorque mutata prorsus facie in suppurationem convertitur. Scilicet cum febris (§ xvII), memorato modo partem inflammatam amoliri nequit, faevior vim fuam ad fabricam ejus folvendam intendit. Vasa infarcta tunc magis magisque distenta & extenuata. crescente tumore, demum rumpuntur, ita ut inter laceros ejus fines protrusa materies liquidis permista naturalibus, mollita, subacta, calore & motu vitali in pus coquatur. Actio haec, ut effectus testatur, intensa admodum, & fere hostilis, non nisi extremam fequitur necessitatem. Haec licet, occulta in fe, fensus fugiat; ex certa tamen fymptomatum, quae Nephritis profert, comparatione cognoscitur. Ea omnia, vel quidem quae sunt praecipua (6. xx), a principio ejus non folum vehementius infurgunt, fed insistunt pertinacius, nullis vel levanda vel abigenda remediis. Neque ulla, instante ordinario definitae criseos tempore (s. xxII). eoque elapso, sperandae vel factae resolutions indicia in urina vel alia mutatione sensibili apparent. Cruda, quae adest, inflammatio irrefolubilis manet maximisque urit cruciatibus aegrum, donec veram subeat suppurationem. Haec simul atque jam exoritur; morbus prior acutissimus in mitiorem quidem, at plerumque etiam lentiorem degenerat. Imminuta multum febri, aestus remittit & dodolorem punctorium mollior excipit pulsatio. Distentissimi ante canales & modo disrupti, renituntur minus integris vividioresque oscillationes admittunt. Multae & vagae iis intercedunt horripulationes, quibus, ceu frigidula quadam aura, homo perfunditur. Tumor, qui persistit, durior adhuc pro magnitudine sua vel mole, gravitatis sensationem excitat cum stupore conjunctam (§. xviii). Interea ille dum sensim sensimque suppurat, mollescit & in verum abit abscessum. Hic cum altius haereat, a visu remotus, non nisi pulsu, servore loci prae aliis notabili & molesta distractione vel tensione, sese manisestat. Quodsi ille vicinis insidet lumbis, extra Renes, Nephritici quidem diuturnos dolores, sed mictus difficultatem non patiuntur.

J. XXIV.

Postquam ita Nephritis ad plenam perducta fuerit suppurationem; novum protinus abscessus tollendi negotium incidit. Hoc magis minusve arduum, citius tardiusve decurrere, ipfamque etiam vitam saepe prorsus absumere solet. Renes in omni sede fua, tam externa quam interna, majori minorive ambitu inflammari ac suppurari possunt. Si quis eorum vomicam modo ceperit parvam, nec nimis a tubulis excretoriis disjunctam ac feclufam, ille facili ab hac opera liberatur. Ea tunc, bene matura, pressa ac tempestive rupta, brevi suboriente dolore acriori & horrore, pus effundit, per meatus uriniferos continuo deferendo. Repurgata dein, deterfa ac mundata, nova excrescente substantia & coalescente, paucos intra dies esse desinit. Verum contingere etiam potest, ut acrior, quae praecesserit, inflammatio abscessium complet, priori grandiorem multo eminentioremque. Hic dum formato bene exitu se per inferiora exonerat, urina admodum crassa, inaequabilis, fetida atque putrida mittitur. Pus, quod huic admistum est, copiosum, blandum alias & sanum, veram olet corruptionem. Haec ex longiori stagnatione eius calore febrili & materiae urinosae affluxu nasci debuisse facile cognoscitur. Nondum tamen eo manante, omnis elabitur fanationis spes, nisi vires naturae simul diffluant, & viscus ex purulentia nimia tabefcat. Haec vero in certam instituitur perniciem, si latius serpat. nec memoratum sibi aperire egressum possit. Eo casu funesto vomica

mica clausa extenso sensim cavo liquaminis purulenti forma totam fere Renum compagem consundit. Hi sic in saccos convertuntur duros & crassos, quos saepe in cadaveribus repertos suisse, Observatores practici perhibent. Ex iis, quae communi sato trahi solet labes putrida, totam paulatim evertit crasin humorum (s. xix), & inducta tabe lentam parit mortem. Non minus tragicus est Nephritidis exitus, si facta exteriora versus vomicae ruptura, materia purulenta proxima lumborum regio inundetur. Haec ejus decubitu pressa, accedente rosione perpetua, sinuosis excavato ulceribus, quae quandoque medios esforant musculos & integumenta tandemque extus hiant. Innumera fere sunt, quae inde sinunt, mala, cum quibus hominem miserum ad vitae sinem usque luctari oportet.

J. XXV.

In grege morborum, quos vera invehit Nephritis, annumerari etiam folet Scirrhus. Hic in universum stricte examinatus, ex obstructionis concipitur tenacitate, nec Naturae nec Artis beneficio ac potestate superabili. Prava haec ejus indoles a materia dependet, quae vel fixa per se & nimis spissa, vel inflammationis vi coacta & indurata exterminari nequit. Ea fic pessimo sidere nata. motu febrili fensim torpente, tumorem conficit durum, indolentem, ponderosum, ac prorsus irresolubilem. Talem revera adesse, status Nephritidis praegressae ac praesentis clare docet. Haec nempe, nulla evacuatione critica foluta, nec puris fluxione devicta, gravissimorum symptomatum non longe a principio cessatione quali inducias facere videtur. Sed non fallunt post effectus. quos Scirrhus creat occultus atque deplorandi aegri miferrime perfentiunt. Hi continuo conqueruntur de inerti quodam pondere. ex lumbis pendente, ceu corpore quodam plumbeo. Ad hoc accedit infenfilitas immobilitasque cruris affecti lateris cum vacillatione pedis & claudicatione. Tumor Scirrhofus major minorve, mufculis nervisque, ad has partes tendentibus, incumbit (f. Iv), & pressione sua spirituum influxum impediendo paralysin excitat (1. XVIII). Licet mala haec acerbiffima fint; non poffunt tamen. quin plura adhuc & exitiosiora concieant. Rene uno vel altero obstructo; ejus functio vel tota, vel ex parte, deficit, ideoque

requisita urinae copia non secernitur. Hinc, quae ab hac non satis purgatur, massa sanguinea, horribilem suscipit acrimoniam, qua incensa sebri putrida tota machina torrescit (s. xix). Vel si Scirrhus renalis in se spectetur, dum nobile occupat viscus, liberum humorum cursum sussaninat atque incurabilem Hydropem inducit. Quod tandem his adjiciendum, ille & ansam praebet generationi calculi, posito veluti semine impacto quocunque, quod, urina alluente, particulas ex hac crassas alliciat secumque uniat.

turede ach lelicem refolutionem proved auras Torahac special cul-

dura hie ecit cara Varme Jettione, l'evacuatione amnium faitherel-In contemplatione Nephritidis nihil superest quam ut de mortifero ejus in Gangraenam transitu agatur. Hujus cognitio non adeo ad curationis, quam praefagii medici ufum pertinet. Phaenomena, quae eam comitantur, ita funt comparata, ut urgentis periculi ignaris errorem facile objicere possint. Nephritis instar omnium morborum inflammatoriorum dira femper & vehementia admodum concitat symptomata. Haec omnem prorsus modum excedunt. quando Gangraena imminet. Dolor, Febris, Æstus, Anxietas, Vomitus, Vigiliae & plura increscunt successive & ad summum vehementiae gradum faepe pergunt. Nullum vel Medicina fagafissime administrata his praestat levamentum, causa mali pertinacissime reluctante. Jactatum tot procellis corpus ac dirutum ultimo concidat oportet. Proxime quidem Ren inflammatus in cadaverosum quasi statum devenit. Infarcta ejus vasa, subito disrupta ac destructa, omni nexu & actuositate vitali exuuntur. Materies infixa cum his liquidisque effusis in fetidissimam transit putrilaginem, quae vivas, quas attingit, partes, alias post alias funerat. Hinc oppido desaeviisse creditur Nephritis, extincto omni sensu, aegrum prius excruciante. Sub fallaci hac requie vires omni momento occidunt, humorum circuitus minuitur, frigidus erumpit fudor, torofitas vel turgescentia corporis abit, expallescit facies & motus convultivi instantis mortis agunt praeludia. Interea, quae subinde redditur, urina tabo Gangraenoso scatet. Tota turbidislima, livida vel prorsus nigra, intolerabilem spirat fetorem multasque continet fibrillas, carunculas fuscas & ramenta crassa, fponte subsidentia. Interdum nulla prorsus excernitur, secretione omni

omni abolita & vitio ex uno organo in alterum traducto, ita ut ex utroque deperdito Ischuria necessario consequatur.

in a merchine accompanion of the State of th


Ad finem assumtae tractationis pervenientibus paucis modo Nephritidis curationem complecti visum fuit. Hanc diverso hujus statui accommodandam esse, sana Therapia docet. Quare in primo medicinam eo dirigere oportet, ut inflammatio quantocyus tollatur & ad felicem resolutionem provehatur. Tota huc spectat cura generalis antiphlogistica, quae omne fert punctum. Incipiendum hic erit cum Venae sectione, evacuatione omnium saluberrima & medela faepe praesentissima. Detracto enim sanguine venofo, imminuitur statim circumeuntium fluidorum moles & reliquis major quasi campus paratur, per quem liberius diffundiqueant : Arteriofa praecipue, maxime coacta & impedita, fecedunt tunc facilius ex fystemate suo in continuum venosum, magis apertum. Unde viribus ejus motricibus modificatis levatisque. cordi ab una parte maxime refistentia adimitur, & ab altera minor affluxus humorum redditur, ad quem tota ejus actio egregie attemperatur. Hinc necessario impetus febrilis mitescere, inflammatum minus urgeri & impactum mollitiem fuam mobilitatemque folet servare, qua in fluorem pristinum expeditius deduci possit. In hoc negotio, quo ars naturam antecellit, femper ante oculos verfari debet aegri praesentis conditio. Haec si juvenilis aetatis, temperiei calidae, fanguineae, indolisque Plethoricae fit, morbo multum faeviente, venam iterato aperiri indicat. Ea, quae medicamentorum nomine usurpantur, sunt diluentia omnia, aquosa, blanda & leniter incidentia. Haec nobis praebent herbae sic dictae emollientes, lactescentes, saponaceae & radices similes mucilagineae, subnitrosae, aperientesque. Eidem fini inserviunt farinosa mitissima, suboleosa, quae benigna Ceres abunde largitur. Haecpro usu interno forma decoctionis, infusionis, emulsionis & Inlapii convenientissime exhibentur. Talia nunc vehiculo aquoso excepta mitioribus falibus neutris imbuta & affatim hausta massam, humorum mitificant, diluunt, resolvunt, tenacitatem phlogisticam attenuant, fibras tensas relaxant, dolorem demulcent & motus inflammatorios compescunt. Non minus his conferent Ep-Histor the

themata fluida, Cataplasmata, Balneaque ex laudatis composita & lumbis calide admovenda. Haec tam calore suo, quam aquositate mobili, facile resorbenda ad interiora apte penetrant, humectant, leniunt, fovent & effectus praestant, Pharmacis assumptis eximie congruentes. Neque parum se commendant virtute sua cucurbitulae parti affectae vel vicinis appositae. Hae, ablata pressione Atmosphaerae, efficient, ut vasa extrema praecipue arteriosa, fluidis minus obsistant influentibus, quae, ea opportunitate copiofius advecta, tanquam ad novum motus centrum feruntur. Hine illa, continuo ad organum cutaneum revocata, ex lege naturae a visceribus uropoieticis rursum avertuntur, ita ut his noxiam adeo impressionem facere nequeant. Haec & similia, Revellentia dicta, licet non proxime, nec directe in causam morbi agant; non leve tamen, nec spernendum praebent auxilium. Interea, his omnibus ita dispositis, sedulo curari debet, ut alvus crebro ducatur. In hunc finem adhibert possunt lenia quaevis Eccoprotica atque praeprimis Enemata illa laudatissima, quae ex herbis emollientibus conficiun-Haec eo magis prodesse solent; quo citius levant intestina fubmoventque materiam, Nephriticis faepenumero valde exitialem (§, xv.). Ipfa quoque relaxationis specie, quam illis inducit, detrahit liquida inferiora versus & blando fotu subjectos Renes reficit. Proposita medendi methodus nisi omnia, praecipua tamen, curationis momenta comprehendit & absolvit. Haec si curate medicus exsequatur, Nephritidem vullo modo resolubilem, felicissime expellere poterit. Cavendum autem est, ne perversum vitae regimen speratum frustretur successum & remoretur. Oportet, quod in universum notandum, illud ita instituatur, ut proxime ad medicaminum laudatorum vim accedat. Necesse ergo erit, ut aeger frigidiusculo, puro & bene temperato aëre semper utatur. Cibus ejus atque potus sit simplex, facile solubilis, tenuis, ex supra memoratis vegetabilibus commode parandus. Ejusmodi vi-Etus, corpori valde amicus, vires levissime sustentat & in urinam transit multam, benignam & vere medicatam. Praeterea nihil magis expedit, quam omnem turbulentam' animi agitationem & jactationem corporis quam studiosissime sugere. Haec uti sola morbum progenerat ((. x11.); ita & eundem mirifice exacerbare valet. Systema utrumque arteriosum & nervosum satis graviter laborant, adeo ut majorem concussionem sine summo periculo to-

30 DISSERT. PRACTICO-MEDICA INAUGUR. &c.

lerare nequeant. Ut vero aegrotus ad quietem recte componatur, opus habet lecto in tranquilliori domus parte molliter strato & moderate calido. Decubitus prae aliis in latera convenit, utpote placidissimus & partibus affectis maxime accommodus (s. xv.). Quod si remediis his selectissimis malum non auscultat, periculosiores suos ad exitus tendit. Ea, quae in his tenenda, curationis ratio, generales modo sequitur indicationes, ex Therapia rationali cognitas & ad scopum praesentem facile applicandas.

FINIS.



ERRATA.

Pag. 4. lin.	29.	obaelis	lege	obelis.
5	100 137	fuccentureati	2000	fuccenturiati.
- 6	9.	globra	000000	glabra.
		fatu	-	fetu.
7.	3.	statum	S CONTRACT	statim.

and 11

A N-

ANNEXA.

gorbofa rects maicatit.

Crima corporis festiveini fava, in virili mangalus

Calor vitalis non semper circulationis velocitatem aequat.

II.

louis manat.

Plethora systematis venosi absque redundatione arteriosi obtinet.

tution , quans his IV. HILLS . Ja

Graviores obstructiones ex natura sua non absolute inflammationes inferunt.

IV.

Calculi materies prima, nec in Renibus, nec in Vesica urinaria generatur.

V.

Praesagia, quae ex sola urinae inspectione in morbis petuntur, vehementer fallunt.

VI.

ANDUEXA

Urina corporis feminini sana, in virili quandoque morbosa recte judicatur.

Culor vitalis non for L. V. culationis velocitatens

Omnis urina ex Renibus, ut secretionis fontibus, solis manat.

Pletbora Oftemaris vol Ist Negue redundations ar-

Vesicatoriorum usus in aliis morbis inflammatoriis tutior, quam in Nephritide, esse solet.



Calculi materies prima, nee in Renibus, nee in Ve-

Praesagia, quue ex sola arinae inspectione in mor-

JV