Disputatio inauguralis, de animalibus hieme sopitis / Eruditorum examini subjicit Henricus Reeve.

#### Contributors

Reeve, Henry, 1780-1814. University of Edinburgh.

#### **Publication/Creation**

Edinburgi : Excudebant C. Stewart et socii, Academiae typographi, 1803.

#### **Persistent URL**

https://wellcomecollection.org/works/g6jfarp6


#### License and attribution


This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org





## DISPUTATIO

#### INAUGURALIS,

#### DE

ANIMALIBUS HIEME SOPITIS.

#### QUAM,

ANNUENTE SUMMO NUMINE, Ex Auctoritate Reverendi admodum Viri,

### D. GEORGII BAIRD, SS. T.P.

ACADEMIAE EDINBURGENAE PRAEFEGTI;

NECNON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI Consensu; Et NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE Decreto;

## Pro Gradu Doctoris,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIS RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS;

## Eruditorum examini subjicit HENRICUS REEVE, ANGLO-BRITANNUS. SOCIET. REG. MFD. EDIN. SOC. EXTR. NUPER PRÆSES ANNUUS. NECNON SOCIET. NAT.STUD. PRÆSES ANNUUS, ET SOC. SPECUL. EDIN.


" Sic fine vitâ Vivere, quàm suave est, sic sine morte mori."

SOCIUS.

Ad Diem 24 Junii, horâ locoque folitis.

EDINBURGI : EXCUDEBANT C. STEWART ET SOGII, ACADEMIÆ TYPOGRAPHI.

1803.



### HENRICUS REEVE

### PHILIPPO MEADOWS MARTINEAU

#### S. D.

HÆC paucula ad Naturæ cognitionem spectantia, ab alumno, Tibi, Vir amiciffime, jamdudum devin-Etiffimo, profecta, éxiguum sanè munus, sed ex animo dicatum, accipe. Quantam voluptatem accepi, et quanto fructu quatuor annos tecum felices degi, ego imprimis existimare poffum. Nam mihi omnia quae utilia ex peritiâ tuâ in arte medicâ et exemplo, quae jucunda ex humanitate et moribus, homini accidere possunt, ex te et tuis familiaribus accidebant. Quid multa? Te dulcesque amicos meminisse juvabit semper guorum opinionem anni venientes certè gratiorem reddent, spero adiment nunquam. De amicitià nostrà nolim levia quaelibet effutire liceat modò apponere pulchrum illud Romani Rhetoris : " Neque enim est fanctius facris iifdem qu'am ftudiis initiari. "----Vale.

> ACAD. EDIN. VIH. ID. JUNII.

Digitized by the Internet Archive in 2019 with funding from Wellcome Library

https://archive.org/details/b30795072

## SUMMARIUM RERUM.

20M

.

Tulquis mus signed to desired at see wine	Page.
PRODEMIUM	I.
Signa in Animantibus hieme fopitis .	7.
De circuitu fanguinis	II.
De respiratione	13.
De calore animali	16.
De concoctione alimentorum .	20.
De corporis macie	22.
De irritabilitate fattar an essere .	24.
Quædam generalia ad animantia quæ hiem	ie
conduntur spectantia	26.
De corporum fabricâ	34.
De adipis usu .	33.
De naturâ foporis	37.
Conclusio	42.

"Sic enim res fe habet, ut omnia quæ alantur et crefcant, contineant in se vim caloris; fine quâ neque ali possent, neque crescere. Nam omne quod est calidum et igneum, cietur et agitur motu suo. Quod autem alitur et crescit motu quodam utitur certo et æquabili: qui quamdiu remanet in nobis, tam diu sensus et vita remanet; refrigerato autem et extincto calore, occidimus ipsi et exstinguimur."

CICERO DE NATURA DEORUM. LIB. II.

resultant ar for for for the

12.

### DISPUTATIO

INAUGURALIS,

DE

ANIMALIBUS HIEME SOPITIS.

## PROEMIUM.

COGITANTI mihi fæpenumerd venit in mentem perdifficilis fand et perobfcura quæssio, de Calore animali. Et profecto cuivis animo versanti, quot sunt animalium genera, per quot casus, et quot in variis telluris regionibus, uniformem ferd temperiem suftinent, indagatione certo, ne vel intra hujusce Academiæ pomoerium indignum videatur : 'Quænam sint signa in animalibus · hieme sopitis, et quâ ratione sint explicanda.'

Dum

2

Dum miranda ista in corpore humano vel prorfùs latent, vel faltem non planè deprehenduntur; dum actio frigoris, caloris ratio animalis, natura fomni, et alia plurima non fatis funt cognita, forfan in brutis animantibus perfcrutando, ad caufas earum penetrare liceat.

Nam five de incremento quæritur fcientiæ, vel de principio, quod aiunt, vitali, nulla ars cum experimentis et obfervationibus ad animalia pertinentibus, conferri poteft; quæ funt quafi fontes, quibus de corporibus vivis certiores nos facti fumus, et facturi : five de ratione functionum differimus, et de viribus et effectibus remediorum, vel de morborum caufis ; aut hæc arseft, aut nulla omninò videtur, per quam ea affequi poffimus.

Quid animi oblectationem, quid illam utilitatem memorem, quæ quam latisfimè patet, ex cognitione rerum, et historià naturali, ortam? Nec intereà mihi litem quis intenderit, quasi in alienam

alienam meffem, falcem improbus immittam; cùm in toto non minus artis quàm fcientiæ ambitu, mira ita est feries et continuatio, ' alterius fic altera poscit opem,' ut medicina à physicâ nunquam rité sit dissocianda. Quæ philosophorum esse propria videntur, eadem quisque ad se transferre debet, artique sue accommodare. In hoc enim, medicinæ parentis Hippocratis vestisia sequitur atque auctoritatem :  $\Delta \tilde{e}$  de  $\mu \epsilon \tau d \gamma \epsilon u$  $\tau n \sigma \sigma \rho in r eis in <math>\tau \rho u \kappa n$ ,  $\kappa a \tau \tau n r in \tau \rho u \kappa n$  eis  $\sigma \sigma \phi in r.---$ (Hipp.)

Et fi in alterius magistri verba jurare liceat, en quod magnus olim Bacon et perspexit et prædixit : 'Interea, nemo exspectet magnum pro-' greffum in scientiis (præsertim in parte earum ' operativâ) nisi philosophia naturalis ad scientias ' particulares producta fuerit, et scientiæ parti-' culares rursus ad naturalem philosophiam re-' ductæ.'--(Nov, Org. 80.)

3

Quæ

Quæ quidem sludia quamvis non medicum effingere valeant, aptiorem tamen medicinæ reddunt.

Inter ea quæ creat natura et tuetur, stellarum motus ac temporum varietates, animalia, fruges, et reliqua quæ terra parit, homines ad naturæ leges indagandas permovent. Homo autem ipfe præ cæteris, fummo fibi jure, totam animi vim et intentionem vindicat, quippe natura ejus nec fatis cognita, et est cognitione digniffima. Licèt verò operam curamque haud mediocrem impenderit omnium ferè fæculorum industria, medicinæ tamen dolenda eft fortuna, quòd ad stabilitatem scientiæ nondum accreverit. Sed quid attinet de rebus tam apertis plurima requirere? Scriptores medici fine philosophorum disciplina, nec cujusve figni speciem rectè cernere, neque eam explicare potuerunt : nec judicare quæ vera, quæ falfa fint, neque videre confequentia, nec ambigua distinguere. Imaginatione et conjecturis supplere solebant, quod veræ scientiæ deeffet,

deeffet, et non duce et aufpice naturâ fequuntur, fed naturæ imitatores, '*fervum pecus*' imitantur. In noftrâ ætate, aliquantùm gloriari licet, quòd jam inter omnes conftet, obfervationem fine ratione parùm medicinæ prodeffe, rationem verò vel opiniones fine obfervatione plurimùm obeffe, prodeffe nunquam. Elucent tandem experientiâ et inductione naturæ operationes ; his vifis, fugit error, evanefcunt medicorum placita. Nam hæ funt hujufmodi, ut nullo politæ mentis ftudio, nullâ eruditæ cogitationis vi, certò poffint extundi, fponte vero fuâ videtur quæque è nebulâ quâdam erumpere, et intereffe turbæ indagantium :

" Cunctifque repente " Improvifa loqui, coràm, quam quæritis, adfum." Virg. Æneid. I.

Hæc funt de quibus mihi in animo erat, pauca qualiacunque difputare, quæfituro de animalibus quæ hieme conduntur ; non ut aliquid novi adjicerem,

adjicerem, fed ut ea quæ in re difperfa atque late diffufa funt, ratione et diftributione fub uno adfpectu ponerentur. Cùm autem multæ res omiflæ forfan et nequaquam fatis adhuc collectæ et fint explicatæ; fit, tantum obfecro, laus propter incæpti novitatem, et detur venia macularum, nobis præfertim tramitem difficilem atque inexploratum ingredientibus; nam decantatum illud veteris poëtæ hic apponere libet :

" Juvat integros accedere fontes, " Atque haurire, juvatque novos decerpere flores." *Lucretius*.

PARS

17

### PARS Ima.

De signis in animantibus hieme sopitis.

OMNIA animantia in fex classes à cel. Linnzo funt divifa; horum quædam ita à naturâ comparata funt, glires præfertim et amphibia, ut hieme fopita fe condant. Mihi forfan objecerit, aliquis, quòd aves nunquam occultentur, nec per totum hiemis decurfum fomno opprefiæ requiescant, sed in vicina semper abeant. Jam de hâc re, cùm fingularis fit et fubobfcura, copiofiùs inter philosophos quàm accurate disceptatum est; et qui de Hirundinibus dixerunt, tanta funt in varietate et dissensione, ut opinionum commenta molestum sit dinumerare. Restat itaque non tam aliorum refellere sententias, quam proferre meam, fi quidem mea vocanda fit, quam

-READ

quam nuper literis accepi à \* viro cùm ingenio tum scientiæ naturalis studio præclaro, et quam plurimis exemplis confirmatam ipfe expertus fum. Hirundines igitur crediderim plerumque migrare; quia migratio his lex est naturæ; fed quæ longo itineri minùs aptæ, vel quæ forfan extremâ ætate ex ovo excluíæ, partim folummodò veniente hieme in loca tepidiora abeunt, partim conduntur torpentque; ergo aliis provifum pabulum, aliis pro cibo fomnus. Linnæus equidem hirundines non defcribit migratorias, fed contra, inquit : ' hirundo rustica habitat in Euro-· pæ domibus intra tectum : unaque cum urbica ' autumno demergitur vereque emergit :' in epistolis autem ad familiares, minimè pro certo fumere videtur, quod tam dubium est. Plurimi fide digni tradunt, hirundines brumali tempore fæpe è cavis arborum, è fluviorum ripis vel è fiffuris murorum, quafi mortuas extrahi, tepore conclavium

\* Jacobus Edwardus Smith, Soc. Linnæan. Præf. &c. &c.

conclavium revivifcentes. Nec inauditum eft, has aves fub aquâ conglobatas, à lacu retibus pifcatoriis effe protractas.§ Testimoniis fidem denegare, quia res est explanatu difficilis, quid aliud est quàm cæcorum more ambulare, et quando folis lumine uti possimus, tenebras tamen ac caliginem quærere?

Ex animalibus, quae nobifcum degunt, glis (mus avellanarius Linn. Syft ) erinaceus, vefpertilio et amphibia cognitu funt digniffima; in aliis regionibus, ursus, marmota, ferpens, lacerta et testudo, muscae etiam, omniaque ferè infecta, frigore accedente talem contrahunt inertiam, quæ morti proxima videtur, et torpida fiunt et immobilia. Quo abeant Pifces torpeantne unquam hy-

berno

§ Klein, de Hybernaculis hirundinum. Prodromus Hift. Avium. Vide etiam Phil. Tranf. Barrington's Mifcellanies. White's Nat. Hift. of Selborne. Barton's Fragments of the Nat. Hift. of Pennfylvania. Darwin's Zoonomia, &c.

B

berno tempore, non inter historiæ naturalis fcriptores convenit; verifimile tamen videtur, quofdam in cavis condi et per hiemem aliquando torpere; et in statu torpido, in America, haud raro inveniffe, civis quidam nuper me certiorem fecit. Acipenfer etiam frigore torpidus aliquando inventus, (ut nuper audivi), atque in ista regione, quæ nomen habet Hudson's Bay, pifces glacie inclusi nonnunquam inveniuntur, et quod mirabile vires vitamque calore recuperant. Animalium quæ gelu torpescunt, frigore accedente, alia præparant cibos, qui ufibus inferviunt ante soporem, vel vere novo, quando expergefacta famem fentiant, alia nullos. Erinaceos, vespertiliones, marmotas, glires, atque amphibia, frigus pigriora reddit, in cuniculis coercit, ad latebras impellit, foporemque invitat. Quædam in luto condi dicuntur, et convolvi in formam pilæ, ne quid à frigore patiantur. †

His

+ Præfertim Dipus Canadenfis (Shreg. Genus). Vide Vol. IV. Linnæan Transactions.

His fopitis neque motus voluntarius eft, neque fenfus externus ; omnium virium eft hebetudo ; motus cordis et arteriarum tardiores et debiliores fiunt : refpiratio lentior, et in quibufdam vix ac ne vix quidem perfecta : calor minuitur, et cunctæ fecretiones : et foliti appetitus et propenfiones non percipiuntur. Carent tunc cibi cupiditate, carent actu et indole, carent viribus et tantùm non vitâ; jacent; dormiunt : nec fubitò frangitur, fed redeunte calore, fopor diuturnitate extinguitur.

Quæ cùm ita fint, argumenta et pericula quibus confirmari debent, jam funt recenfenda.

1 mo. Motus cordis et arteriarum, tardiores et debiliores.

Haller atque Spallanzani benè notant, neque pulfus arteriarum, nec curfus fluidorum, in animalibus hieme foporatis, omnino effe fufpenfos, fed

fed ita languidos et obscuros, ut parùm percipiantur. Aquatilia torpida, quorum incerta facies inter vitam et mortem, Spallanzani fæpe denudavit; in minoribus et in remotis arteriarum ramis, motum fanguinis nullum effe invenit ; in truncis autem magnis, prope cor, fanguinem movere, quamvis motus multò lentior evadit.\* In mure criceto, (Hamfter) communis pulsuum frequentia est, in æstate, plus quàm centies in horæ minuto, fub hiberno autem fomno, ad quindecim descendit. + Vespertilio, cujus cor ad contractionem, centies in horæ minuto cietur, dum manet exercitatio et æstas, sexaginta tantum pulsationibus gaudet, quando gelu torpefcit, quod à Dom. Cornifb notatum eft. 1 In gliribus fopitis, et in erinaceis, nondum observationibus fatis com-

\* Spallanzani, Tracis on Animals and Vegetables, p. 269.

+ Buffon's Nat. Hift. tranflated by Smellie, Vol. VII. p. 194.

‡ Miscellanies by Daines Barrington, Elq.

comprobatum est, actionem cordis minui; sed quo niam respiratio est lentior (cujus posteà locus erit dicendi) haud difficile est credere, motum sanguinis retardari : atque hoc eò magis affirmare ausim, quòd pleraque ad somnum spectantia, non solum in brutis animantibus sed in hominibus, idem sudere videantur.

١

## 2do. Respiratio lentior et aliquando ferè nulla.

Quæ de fanguinis motu jam dicta, de refpiratione ferè eadem funt dicenda. Functiones pulmonis et cordis ita connectuntur, ut his minutis, eæ plerumque minuantur. Multis certè obfervationibus opus eft, priùsquam in hac re verum attingere poffimus. Sed à paucis recenfitis, et cognitis rerum partibus, eventum anticipare mente et cogitatione fas videtur, et concludere, refpirationem retardari vel fufpendi. Refpiratio teftudinis, quæ apud Londinum multos per annos vixit familiaris, femper lentior erat, hieme appro-

appropinquante, quod amicus, vir fide digniffimus, ipfe vidit et mihi tradidit. Animalium hieme dormientium, tanta est multitudo fæpe in unum locum congregata, ut latebris obturatis, neque oxygenium, hic nec aliunde quin in parcâ quantitate comparare possint. Et prætereà vivunt ab aëre exclusa, uti periculo compertus est Blumenbach. Ranam arboream quodam mane, deprehendit hic auctor, congelatæ aquæ planè immersam, et glacie ut infecta fuccino inclusam ; hâc sensim folutâ, rana tota restituta fuit, et vegeta diu posthac supervixit.\*

Periculum hoc memorabile repetitum mihi idem oftendit. Docent etiam experimenta haud de industria inftituta, quæ mihi amicè tradidit Dr Monro, ranas per longum tempus glacie, quod fæpe hieme accidit, inclufas manere incolumes.

Ita

\* Specimen Phyfiolog. Comparat. in Comment. Societ. Gottingen. Vol. VIII. p. 83.

Ita de lacertis lacuftribus narrat Du Fay; \* ftellio etiam in glacie inventus eft, et quamvis per plurimos menfes in illa manferat, vitam tamen virefque calore cautè admoto recuperavit.† Cæterùm Du Tertre refert, fe à quodam fide digno accepiffe, quòd ipfi in *Ruffico* quodam pago aqua, gelu concreta, oblata effet, in quâ fuit hirundo; quæ teporata recuperavit fenfum motumque, atque in hypocaufto circumvolavit. ||

Experimenta quædam in ranis bufonibufque inflitutis, mihi oftenderunt, fpiritum lentiorem fieri, et pulfus fimul arteriarum tardiores, quando calor animalium minuatur, his aquæ frigidæ gradatim expofitis. Pulfuum frequentia fuit in bufone fano in aëre 49°, circiter triginta in horæ minuto :

\* In Mem. de l' Acad. des Scien. de Paris, ann. 1729. p. 144.

+ La Cepede on Oviparous Quadrupeds, p. 38.

|| Klein, Hift. Avium Prodromus, p. 199.

minuto: in aquâ ad 35° frigefactâ duodecim tantum in eodem temporis spatio, et infra 30° motus cordis ceffabat omnino, redibat autem animale loco calidiori remoto. Motus organorum pulmonalium gradatim lentiores fuerunt in bufonibus ranifque frigori expositis; et quum thermometrum in gulà et ventriculo pofitum 32° tantùm indicavit, motus non observari potuerunt. In temperie infra 40°, hebetudo quædam sensuum, motusque voluntarii debiliores facilè conspiciendi, stupor demum et quasi sopor, fed actio musculorum haud penitus extincta, forfan motus vel convultiones dolore excitati funt, non tamen ut crediderim foporem unquam effe gravem vel ingratum animalibus sponte nascentem, id quod opinatur Prof. Barton. (Nat. Hift. of Pennfylvania, p. 13.)

## 3tio. Calor minuitur, et cunclae secretiones.

Animalium calor fortè variat fecundum calorem aëris vel aquæ in quo ipfa torpida vivunt, femper

femper autem gradus quofdam (licet paucos) calent, fupra elementum quod habitant. In erinaceo, æstatis tempore, dum aër effet 78°, calorem fanguinis thermometro Fahrenheitiano 97° exploratum notavit Jenner, vir ille magnus, propter Vaccinæ historiam nunquam non venerandus. Hieme autem, aëre vix ad 44° tepente, calor erinacei torpidi internus fuit tantum 48<sup>±</sup>. Quando atmosphæræ temperies ad 26°, calor animalis ad 30° redactus fuit, ita ut quatuor gradibus medium circumdans temperie vix superabat. \*

In regionibus auftralibus Ruffiæ, illuftr. Pallas obfervavit, tunc calorem fanguinis erinaceorum, artificiali frigore fopitoru n, defcendiffe ufque ad 38°, dum aëris externi temperies erat ad minimum 50°. Imo etiam in æftate (inquit ille) quando vigent et movent, vix 33° gradibu- at-C mofphærâ

\* Obfervations on certain parts of the Animal Economy, by J. Hunter, p. 112.

atmosphærâ calidiores effe folent glires atque erinacei; omnesque illius mutationes calore suo fequuntur. \* In mure citillo, fummus fanguinis calor per æstatem constans effe folet  $103^{\circ}$ ; fed quando infusî aquâ ex cuniculis proturbatos indeque torpidulos examinavit *Pallas*, sæpe non ultra  $84^{\frac{1}{2}\circ}$ ; immo apud nonnullos, vix ad  $80^{\circ}$ ascendisse mercurium vidit. Hisse animalibus in cellâ glaciali detentis et sopitis, gradum caloris circiter 56° perstitisse, vir ille celeber. expertus est. †

De vespertilionibus, qui hieme obrigescunt, idem valet; in quodam torpido, die subfrigidâ Decembris, internum calorem 36° notavit Dom. Cornish; § docent etiam experimenta quædam à Pallas instituta. Calor in mure criceto variabilis

- + Ibid. p. 559.
- § Barrington's Mifcellanies.

<sup>\*</sup> Nov. Comment. Petrop. Vol. XIV. p. 577.

abilis, ut in omnibus murini generis, qui hieme conduntur. In vividiffimis, fanguis interdum calet, ufque ad 103°: aliàs vix ad 99°; et in iis loco frigido detentis vel è cuniculis expulsis, tantùm ad 91°. \*

Secretiones à circuitu fanguinis pendere, non eft qui dubitat, cum quo minuto, tum hæ planè minuuntur : et hanc opinionem plurima confirmant. Haudquaquam igitur negandum eft, calorem fanguinis animalium ab externo frigore minui, fed non eo gradu, utì exiftimavit Buffon Neque femper autem, neque ubique profectò gentium idem calor animalibus fopitis eft proprius. Cuique claffi, cuique fpeciei, cuique denique varietati funt caloris gradus magnâ ex parte fui.

410.

\* Pallas, de Glirium Ordine, p. 86.

4to. Concoctio alimentorum, in animalibus hieme Sopitis, minuitur vel definit omnino.

Ex obfervationibus Pallas, Sauffure, et aliorum illustrium naturæ studioforum, facilè erit colligere, concoctionem parvam esse vel nullam. Docent idem et meliùs adhuc et certiùs experimenta quædam à clar. Joanne Hunter instituta. Marmotæ, et mures citilli, atque alia hujus generis, quæ per totam hiemem torpent, et sine alimento vivunt, intestina vacua, et contracta habent.

Urfi in regionibus borealibus, ineunte frigore in latebris fe condunt, et per fex hebdomadas veterno premuntur, nec aliquid guftant, nec in fpecu ulla funt argumenta cibi. Senfus ingratus ad ventriculum referens cum edendi cupiditate tandem oritur, et quali nullo modo refiftendum

dum fit, expergisci et idoneo cibo pacare cogit. §

Cibus ex animalibus derivatus, in lacertarum ventriculis, ineunte hieme, intrusus, post plures fomni menfes, neque folutus nec ullo modo mutatus erat. † Erinaceo cujus calor internus 30° fuit, nec cibi appetitus nec vis concoquendi aderat; quando autem corporis temperies ad 90°. aucta fuit, statim edendi cupiditas rediit et concoquere animal valuit. Porrò, experimenta oftenderunt alimenta in ventriculo Ranæ nullam mutationem fubire, dum temperies ad 30° aut 40°. Et Spallanzani plurimis periculis monftravit, quo minor in anguibus calor fuerit, eo ferè pejus et tardius animal cibum concoquere. Testudo cicur quæ in æstate semper fuit vorax, in autumno pinguior parciffimè comedit, et perftante torpore, nihil.\*

5ta.

\* White's Nat. Hift. of Selbourne.

<sup>§</sup> Pennant's Arctic Zoology, Vol. I. p. 59.

<sup>+</sup> Hunter's Obfer. on the Animal Economy, p. 196.

## 5to. Adeps confumitur totumque corpus marcescit.

Crediderunt quidam neque profectò parvi nominis auctores, animantia fopore hiemali pinguefcere. Ariftoteles et Theophraftus ita de urfis fcripferunt; et hinc forfan Plinius hiftoriam accepit, quam verbis fic tradidit : ' Tum gravi fomno premuntur (fcil urfi) ut ne vulneribus quidem excitari queant; tunc mirum in modum veterno pinguefcunt.' \*

### Martial etiam de glire cecinit :

" Tota mihi dormitur hiems, et pinguior illo " Tempore fum, quo me nil nifi fomnus alit."

Verum enimvero multum abest, ut hæc et hujusmodi commenta ursorum vel glirium naturam bene explicent. Nam ursi ante in specus se

\* Plinii Hift. Nat. Lib. viii. p. 202.

fe condunt, pingues funt frugibus autumni; adipe confumpto per foporem, exeunt macilenti, in *Louifianam* defcendunt et rurfus pinguefcunt frugibus mitioris cæli § Certiffimis etiam et fimpliciffimis experimentis conftat, omnes corporis partes, et præfertim adipem, mutationem fubire gravem et fingularem, et diffipari. Murium totæ fpecies quae hieme torpefcunt, primo vere ex cuniculis debiles et macilenti prodeunt, quamvis autumno pinguiffimi fuerant, totaque adipofo cortice corpora quafi incruftata. +

Illust. Monro erinaceum per tres menses hiemales fervavit; et animal gustabat nil, manente sopore, uncias autem ponderis duas amittebat. \* Et prætereà comperit Dom. Corniss, glires et vespertiliones quinque vel septem grana ponderis, diebus bis septennis, dormientes amittere.

+ Pallas de Glirium Ordine passim. Saussure, Voyages dans les Alpes.

\* Smellie Phil. Nat. Hift. Vol. II.

<sup>§</sup> Pennant, Arctic Zoology, Vol. I. p. 59.

tere. Sunt qui credunt, de amphibiis § nullas corporis partes diffipari longo torpore ; fed nondum de his bene constat, et hucusque experimentis accuratis caremus.

# 6to. Denique, sensum omnium est hebetudo, et diminutio irritabilitatis.

Omnia animantia hieme fopita ita frigore torpefcunt, ut mortuorum inftar, flaccida, claufis palpebris jaceant, et vix dolore ad leves motus excitari queant. Cùm pectus erinacei fuorit in ifum ad gradum caloris explorandum, neque voce neque motu ulla doloris figna dodit. † Inteffina muris criceti nullis ftimulis ad contractionem commoveri poterant, neque electricitas expergefacere animal

f Obfervations on a Tortoife, by G. Ent. in Phil. Tranf. Vol. XVII. p. 533.

‡ Pallas Experiments, detailed in Vol. III. Coxe' Travels in Poland.

animal femper valebat. \* Experimenta à Regiâ Societate Medicâ Edinen. inftituta, oftenderunt, mufculos cuniculorum congelatos, multò minus irritabiles gelu fieri, admotis ftimulis chemicis.

Quin irritabilitas omnium partium minuatur nemo fignis ritè propenfis, dubitare poteft. Irritabilitas à refpiratione et circuitu fanguinis pendet omnino, his igitur functionibus minutis, tarda et minor fit irritabilitatis copia. Plurimis fignis docemur irritabilitatem apud nos in fomno minui, et fas videtur concludere hoc in fopore animalium plufculùm accidere.

\* Buffon's Nat. Hift. Vol. VII. p. 194:

D

PARS

## PARS IIda.

HACTENUS expositis, quae animalibus torpentibus accidunt, jam animadvertamus, quæ nobis harum videtur explicatio.

## GENERALIA QUÆDAM.

Quando animalia hieme fopita, oculis et ratione contemplemur, non poffumus non admirari, quàm exquifita et peculiaris iis eft natura, ut quafi fine vitâ vivant, et fic fine morte moriantur. Dum vita adeft, actionem, fenfum, motumque quærimus, hæc autem jacent fine motu, et vivunt fine fenfu. Incolumitas quâ fruuntur, provido fummo rerum opifici tribuenda eft, qui artificiofo

artificiofo opere et divino corpora ista ita finxit et fabricatus eft; quæ viribus quibufdam infitis, mirandis adhuc potiùs quàm ritè explanandis, obstant, quominùs frigus et inedia mortem inducant, donec calore aliifque rebus admotis redeunt ad vitam, et ad munera fiunt idonea. Animalia verò quotquot hieme conduntur, non omnia cibum vel aërem omninò recufant; hinc dividi poffunt in duas classes; aliis vita est soporofa, aliis vita interrupta. In illis actio cordis et pulmonis et ventriculi manet, in his functiones vitales restant omnino; ad hanc amphibia et infecta, ad illam mammalia pertinent. Quoniam in iifdem regionibus animalia quædam femestrem quasi vitam excedere negantur, aliaque per totum annum vigent, et hieme non obdormiscunt; et quoniam vitales functiones per plurimos menfes non folum minutas fed fuspensas videamus, cerebri nimirum nervorum actionem, et fanguinis circuitum et respirationem,-in his diverfis diversa expectanda est structura. Et ita fe res habent, præfertim in amphibiis. Si phyfiologicam

logicam inftituamus comparationem calidi fanguinis animantia inter et frigidi, obviam imprimis differentiam notaremus in corporum temperie, et in organis huic fubfervientibus. Dum hæc vix duos trefve gradus calent fupra elementum quod habitant, illa fimul infigni caloris gradu gaudent, neque profectò calor ut in frigidis animantibus varius, fed plerumque ferè idem eft. Cùm calor animalium in pulmone gignatur, quod per tot tantaque recentiorum inventa conftat, organa refpirationis divería in diveríis animalibus quærere liceat.

Amphibiis et pifcibus cor fimplex eft, et arteria pulmonalis ab aorta derivata. Teftudini quidem duo funt cordis ventriculi, fed inter dextrum et finistrum est communicatio per foramen ovale ut in fœtu ; hinc fanguis in aortam transit fine itinere per pulmonem, et fanguinis circuitus durat per longum tempus fine respiratione ; hinc (ut aiunt) arbitrario utuntur pulmope. Memorabile etiam, arteriofum amphibiorum

rum fanguinem vix ac ne vix quidem à venofo differre, et pro portione corporis longè parciore fanguinis quantitate hæc fcatent. \* Pulmones funt in amphibiis vegrandes, refpiratio inæqualis et rara, et longè diutiùs quàm animantia calidi fanguinis cùm refpiratione tùm cibo carere poffunt, et in aëre vitiato indemnia remanere. Aliæ præterea funt differentiæ; quod in amphibiis, cerebrum exiguum, nervi infignes et craffi cernantur, fed in mammaliis, graciliores nervi majori cerebro juncti funt; hinc in illis functiones generis nervofi languent, frigore hebetantur facilè, et has hebetes reliquarum fequitur functionum torpor.

\* Blumenbach, Spec. Phyf. Comparat. p. 92.

Ita de ranis, Haller Oper. Minor. Vol. I. p. 183.

" Arteriofi et venofi fanguinis nulla in ranis diverfitas adparet." Ita inquit Spallanzani de lacerta lacuftri " De Fenomeni della circolazione ' p. 193. " Il fangue arteriofo in nulla differifce dal venofo fia nel colore, fia pella denfità."

torpor. Hæc vero haud fecus ac alia, in hiematione amphibiorum explicandâ, fuis difficultatibus non carent ; et profectò, ad animantia calidioris fanguinis non referri poffunt. Hìc fateri oportet in explicatione noftrâ, *c hiatum effe maximè deflendum!* Multa defunt priùs de gliribus, de erinaceis, &c. quàm plenam habeamus notitiam, neque de his alia reddenda eft ratio, quàm dicere, *c hæc lex Naturæ, hoc confilium.* Condunt itaque fe, torpent, et revivifcunt, inftinctu quodam divino. Inftinctu fcilicet ifto, qui rectè definitur verbis auctoris folertis et ingeniofi.<sup>†</sup>

Quæ cùm ita fint, opiniones quàm vanæ quibus caufam proximam foporis philotheori proferre

+ Brown's Observations on Zoonomia, p. 265.

" If, by the term inftinct, be meant a predifposition to certain actions, when certain fensations exist, the admittion of it is to far from being ridiculous, that, without it, the phenomena of animation cannot possibly be explained."

putant ! quàm inania quoque commenta ea quæ effutiunt, de excitabilitate exhauftâ, de vi fenforii imminutâ, et de vitâ propriâ. Qui contendunt torporem induci ftimulis remotis, rem certè aliter dicunt : Quid vero explicant ? Nil fanè. His igitur fomniis relictis, quoties naturæ opera latè circumfpicimus, potiùs admirari juvat, quanto confilio, quanto artificio, quàm aptâ partium compofitione, quàmque mutuâ omnium utilitate, omnia conflituta funt. Certi enim flores certam exigunt terram : certa infecta alimentum ex certis capiunt floribus : certis temporibus flores ipfi nafcuntur, fructum edunt, et moriuntur : certifque animalibus certi funt mores, et certa partium flructura.

Sunt qui cenfent, foporem hiemalem non effe animalibus inna um, fed folà à confuetudine oriri, quæ fortuitò à frigore et defectu cibi nafcitur. Ita opinatur Fabricius, atque etiam putat, hæc animantia apud nos fopita, olim fub mitiore cælo hieme non condi. Confitendum ut éft, hanc fententiam

32

fententiam fpeciofam experimenta quædam reddant. *Pallas* notavit arctomydem et citillos, quos familiares aluit, domi pinguefactos, contra frigoris vim robustiores reddi; et experimenti gratiâ, in loco frigidisfimo, expositos, nec quidquam de familiaritate parùmque de calore amiffisfe, nec torpidos fuisfe. \*

Compertus est etiam Dom. Gough, vir apprimè fagax, glires domi educatos, per æstatem pinguissimos fieri, et ita à pabulo mutatos et domesticâ vità, ut neque gelu torpescant nec brumæ tempore cibum recusent. Quinetiam erinaceus, ursus, vipera, et musca vulgaris, per totum annum alacres et vegeti manent, fimodò adfint calor et cibus ; et horum beneficio soporem fallere possunt. Ex his periclitationibus constat, foporem hiemalem haud ad vitam animantium essen necessarium; fed credo potius hunc abesse, illa

\* Pallas, de Glirium Ordine, p. 136.

illâ vi, quam apud omnia inflituit Natura, et quâ ad varios cafus et rerum difcrimina fefe accomodare poffunt. Avibus quarum cibus ex frugibus derivatus, fenfim et pedetentim concoĉtio ita mutata eft, ut carne fatis alantur et bene fe habeant. J. Hunter accipitrem, et Spallanzani aquilam gradatim affuefecit folo pane vivere : et Linnæus narrat, avem quandam Stockbolmiæ, vinum bibiffe ; fed non ex his exemplis mutatur avium natura ; nec animalia naturaliter fopita mutantur, quia aliquando hieme non torpent. Opinio igitur hæc, quamvis ab auctoribus gravibus prolata fit, non, ut mihi videtur, pro vera habenda eft.

Nunc de refpiratione quærendum eft : et memorare juvat, quòd ea hactenus exposita, opinionem de caloris animalium in pulmonibus ortu haud parùm confirment. Refpiratio combustioni fimilis est; hydrogenium carbonatum lentè confumpturum suppeditat plerumque chylus, quod E opinatur

opinatur prælector ille folertiffimus, J. Allen. † Animalia vero hieme fopita cibum capiunt nullum, calorem tamen evolvunt; hic forfan ab adipe derivatur, qui materiam comburendam fanguini venofo præbet. Hoc verifimile reddunt fequentia. Omnia animantia quæ hieme conduntur, omnes habent partes corporis adipe incrustatas : habent etiam plurima omenta, \* et glandulas quafdam fingulares. Apud erinaceos et plurimos de glirium ordine notavit Pallas, in autumno adipem multum colligi, omentum ampliffimum, atque alia omenta minora adipe referta. Thymus largior; necnon duo corpora glandulofa thymo fimillima fub gulâ, alia duo fub mufculis pectoralibus, et ad axillas et ad collum extensa : atquæ hæc hieme magis florida, videnda in omnibus quæ torpent animantibus. §

Et

- + Lectures on the Animal Economy.
- \* Haller Physiol. Vol. VI.

§ Pallas Nov. Comment. Petrop. Vol. XIV. et De Glirium Ordine, paffim.

Et quod animadverti debeat, animalibus ejufdem generis, quæ hieme non conduntur, thymus ferè nullus eft, omenta anguftiffima, et nulli adipes collecti. Adeps colligitur in vermibus et in omnibus infectis præter apem, quæ fola in autumno non pinguefcit, fed temperiem fervat per hiemem, mel confumendo. Nervi diaphragmatis et octavi paris, peculiares et majores quàm foliti obfervantur in animalibus hieme fopitis, præfertim in vefpertilione; fed de ftructurâ anatomica ignorantia adhuc multum fit dolenda. \*

Jam nobis occafio offert pauca dicendi de ufu adipis. Adeps ad corporis formam et pulchritudinem exiftimatur conferre, motumque faciliorem reddere, fed hi ufus non nifi lanio et naturæ ftudiofo, percipi et comprehendi poffunt. Alios igitur ufus haud dubiè habet præter viles iftos mechanicos. Nos probabilia multa habemus, quæ

\* Vide Philosophical Magazine, Vol. XIV. p. 88.

quæ conjecturâ augurare facilè, affirmare vix poffumus.

An animantia hieme fopita adipis ufum, et omenti et thymi glandulæ explicare poffint ? An conjicere liceat, adipem in corporibus vivis hydrogenii carbonati fontem et quafi penum effe ? Annon reforbeatur continuè, et citiùs in morbis quibufdam, ubi calor plurimùm auctus ? An in morbis infantum, in febribus, in diabete et in phthifi &c. adeps materiam comburendam fanguini præbeat, quo calor fit major et macies fingularis ?

An fanguis in fœtu ante partum, et in animalibus torpentibus mutationem quandam chemicam fubeat in thymo aliifque glandulis?

Harum rerum caufa non prompta est; ab argumentis, à fignis, et à periculis accuratis adhuc petenda : nostræ conjecturæ non præcludere sed præcedere experimenta proferuntur. His tantúm adjicere

adjicere liceat, quod inter omnes fatis conftat ; adeps colligitur ufu multi cibi et ubi refpiratio lenta : hinc corporis quiete et multo fomno ; hinc in pifcibus et amphibiis, in quibus tarda eft refpiratio et hydrogenii carbonati parva confumptio. Cel. Mafcagni narrat, fe in vafibus lymphaticis virorum fubitâ morte abfumptorum oleum jam fecretum, femper confpexifle.

Unde vero foporis caufa? lectorem quærentem audire videor. Certè ab ipfà animalium conftitutione. Series eventuum et mutationum in hoc utì in omni naturali opere, ita longa eft et obfcura, ut totam feriem enarrare vires deficiciant. Unam igitur alteramve harum mutationum verbis exponere conabimur.

In omnia animantia, calor tantum habet imperium, ut mobilitatis et fenfus fons et caufa videatur; quòd auctus has vires augeat, minutus, minuat, non modo ad torporem, fed aliquando ufque ad mortem. Non eft dubitandum, quin frigus

frigus foporem animalium inducens, genus nervofum primò afficiat; hanc vim frigoris fedativam plurima exempla pulcherrimè illuftrant. † Plantæ ferè omnes tempestate hiemali, umbratili otio, et obscurâ vitâ funt contentæ, viridem ammittunt colorem, succi motus cessat, folia decidunt, arescunt trunci ramique: denique non aliter quàm animalia sopita restant.

In his, in animalibus torpidis, et in ovis excludendis, idem facit calor; nempe ut actiones in partibus augefcant, novæque explicentur : ut humores diftribuantur quoquoverfum, et ut varia deinceps munera perficiantur. Quod calor his, humor infectis quibufdam efficit. Multa enim et pulchra experimenta oftenderunt, infecta quædam

+ Vide Narrative by Sir J. Banks and Dr Solander, in Captain Cook's Voyage. Vid. etiam

" Observations médicinales sur les principaux effets du " froid et du chaud sur le sommet des hautes montagnes. " Par les Cits. Parat et Martin." Recueil de la Societé de Lyons.

dam parvula, humore ablato, immobilia duro cortice, et quafi mortua fieri : facit autem humor, ut revivifcant et ad vitam redeant, quamvis plurimos per annos, fine mobilitate et fine fenfu manfiffent. §

Porrò, inter caufas quæ torporem inducunt vel quæ inductum protrahunt, aër in quo oxygenium in parcâ quantitate adeit, debet enumerari. Hanc enimvero opinionem adhuc probabiliorem reddunt pericula, quæ fecerunt viri magni et nobiles, *Lavoifier* et Seguin. Comperti enim hi auctores, fomnum citò obrepere in aëre vitiato, minus oxygenii continente ; et nemo tam infcius et ignarus, qui non intelligat, aërem fumo carbonis vel magno cætu vitiatum, fomniculofos et hebetes facere homines. M. Allemand hanc fententiam confirmat experimento fingulari.

§ Præfertim Vorticella rotatoria. Vide Fontana on Poifons. Spallanzani Tracts on Animals and Vegetables, p. 322. Baker on the Microfcope. Lewenhoeck. Needham.

40

lari. Murem cricetum hieme fopitum eduxit, atque aëri frigido liberè objecit. Animal statim experrectum, minimè torpebat. Idem sub terrâ demersum et undique occlusum, paucos intra dies in soporem incidebat, iterùmque aëri externo æquè frigido objectum reviviscebat statim: hinc vero proximum videtur, soporem hujus animalis non solùm frigori sed mutationi aëris esse tribuendum. \*

Poftremò, filentio non est prætereundum, quod credibile videtur, homines atque omnia animantia, mæabili istâ facultate frui, quâ torpida et femianima tutò manere possint. Fertur oves in *Icelandiâ* sub nive transigere hiemem. Fertur etiam oves, quæ septentrionales *Scotiæ* regiones incolunt, per sex hebdomadas, nive obrutas, (sopitas forfan) et exinde venire incolumes. Nec defunt exempla hominum, qui vel frigore, vel mærore, vel sine manifestâ causâ, non modo totos

\* Buffon's Nat. Hift. of the Hamster, Vol. VII. F. 194.

totos dies fed menfes etiam fomno vix interrupto tranfegerunt. \*

Quinetiam in catalepfi, in febribus provectis, atque in afphyxiâ, ubi fenfuum ftupor, ubi nec motus nec calor fubeft, et ne multis, ubi omnia veniffe fummam horam teftantur atque adeffe mortem, nonnunquam vel deplorati præter fpem F revaluerunt

\* Vide in Nov. Act. Acad. Nat. Curiof. Vol. III. Cafum fingularem Chrift. Kratzerin quæ per novem menfes fine edendi et bibendi cupiditate obruta fomno manebat.

Vide exempla quædam memorabilia in Plott's Hift. of Staffordshire, Chap. viii. sect. 26.

Et de quodam fene narrat J. Hemmings, cui mos fuit, fex hebdomadas fomno, fex etiam vigilià ferè omnino confumere alternis vicibus. Diff. Phyf. Inaug. " De Somno."

Vide historiam Elizabeth Woodcock, quæ per dies octo nive obruta manebat. Kalend. Februar. A.D. 1799.

Vide Somis' "Narrative of three women faved who were buried 37 days under the fnow, in a stable at Bergemoletto in Italy."

42

revaluerunt. Nemo itaque temerè desperet ægrorum faluti, nec desistat conando eos morti eripere.

# CONCLUSIO.

Contemplationibus hifce, fæpe me inter dulces amicos multúm delectabar, quibus differtatiunculam meam ad finem perduco. Signa præcipua et miranda in animalibus hieme fopitis ufque adeo conatus fum adumbrare. Multa forfan omiffa, alia nec fatis accurate exposita funt. Hactenùs enim quasi in porticibus templi Naturæ deambulare licet. Piget respicere sex millium annorum feriem, cujus exigua fanè pars hominibus enituit, qui in facraria interiora penetrare conati funt. Piget me etiam collectos tantùm aliorum labores, et in hac disputatione tam pauca propria et nova experimenta expofuiffe. Occafio, non mens defuit. Spero tamen me posthac,

pofthac, cùm plus otii fuppetit et tempora magis idonea, ad hanc rem præclaram, cognitione digniffimam, utpote ad leges quibus vita movetur illustrandas accomodatam, majore studio meipfum collaturum effe.



EX TYPOGRAPHEO ACADEMICO.

