A text-book of practical therapeutics with especial reference to the application of remedial measures to disease and their employment upon a rational basis / by Hobart Amory Hare.

Contributors

Hare, H. A. 1862-1931.

Publication/Creation

Shanghai : China Medical Missionary Association, 1911.

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/chdawrjn

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.

wellcome collection

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
https://wellcomecollection.org

Mr. Linstead, ~~Mr. Smith, F.D., Lit. Section, Dr. Landman, Miss Block.~~

Please note that a copy of the Chinese edition of "Hare's Practical Therapeutics" has reached us. For the time being it is in Mr. Linstead's office and is available for reference if required.

Upon Mr. Linstead's return from his holidays he will deal with a few points connected with publication and after this the book will be sent to the library in the Literary Section.

M.O.R.

2 September, 1911.

J.B.

29694

Digitized by the Internet Archive
in 2019 with funding from
Wellcome Library

https://archive.org/details/b31346649

A

Abdominal transfusion, 522
Absolute acetic acid, 156
  alcohol, 121
Absorption of drugs, 6
Abstracts, 4
Acacia, 425
  mucilage of, 425
  syrup of, 425
Acaciæ gummi, 425
A. C. E. mixture, 39
Aceta, 4
Acetanilide, 304
Acetanilidum, 304
Acetate of iron, solution of, 195
  of lead, 169
  of morphine, 64
  of potassium, 364
  of sodium, 435
  of zinc, 180
Acetic acid, 156
Acetophenetidin (phenacetin), 307
Acetum, 4
  ipecacuanhæ, 330
  opii, 60
  sanguinariæ, 398
  scillæ, 362
Acid, acetic, 156
  arsenous, 201
  benzoic, 299
  boric, 465
  camphoric, 28
  carbolic, 271, 489
  chromic, 422
  citric, 155
  gallic, 160
  hydrochloric, 197
  hydrochloride of quinine, 260
  hydrocyanic, 153
  infusion of cinchona, 264
    of roses, 164
  nitric, 486A
  nitrohydrochloric, 198, 486B
  phosphoric, 239
  picric, 266
  pyrogallic, 423
  salicylic, 288
  sulphuric, 196
  tannic, 159
  tartrate of potassium, 365
  tartaric, 155
  valerianic, 22
Acidum aceticum, 156
    dilutum, 156
    glaciale, 156
  arseniosum, 201, 208
  benzoicum, 299
  boricum, 465
  camphoricum, 28
  carbolicum, 271, 489
    liquefactum, 274
  chromicum, 422
  citricum, 155
  gallicum, 160
  hydrobromicum dilutum, 486G
  hydrochloricum, 197
    dilutum, 197
  hydrocyanicum, 153
    dilutum, 154
  nitricum, 486A
    dilutum, 486B
    fumans, 486B
  nitrohydrochloricum, 198, 486B
    dilutum, 198, 486B
  phosphoricum concentratum, 239
    dilutum, 239
  salicylicum, 288
  sulphuricum, 196
    aromaticum, 197
    dilutum, 197
  tannicum, 159
  tartaricum, 155
  valerianicum, 22
Aconite, 148
  liniment, 150
  poisoning by, 152
Action of drugs, duration of, 7
Acupuncture, 487
Adeps benzoatus, 300
  benzoinatus, 300
  lanæ, 429
    hydrosus, 429
Adjuvant elixir, 426
Administering drugs, modes of, 2
Adonidin, 139
Adonis vernalis, 139
Adrenalin, 246
  chloride, 247
Æther, 37
  purificatus, 37
Æthylis bromidum, 51
  chloridum, 53
  iodidum, 392
  salicylas, 295

Agaric, 483
Agaricin, 483
Albolene, 486G
Alcohol, 118
  absolutum, 121
  administration of 122
  contraindications to, 123
  dilutum, 121
  ethylicum, 118
Alcoholism, acute, 123
    differentiation of, from apoplexy, 126
    from opium-poisoning, 125
  chronic, 123
    from paretic dementia, 124
Aldehyde, formic, 458
Alkaloids, 4
Allis ether inhaler, 40
Allium, 394
  -juice, 394
  syrup, 394
Allspice, 319
Almond bread, 557
  milk, 559
Almonds, 315
  bitter, 315
  sweet, 315
Aloe, 344
  purificata, 346
Aloes, 344
  compound decoction of, 347
  contraindications to, 347
Aloin, 344
Aloinum, 344
Alpha-eucaine, 94
Alteratives, 199
Alum, 166
Alumen, 166
  exsiccatum, 167
Alypin, 477
Amber, 419
Ammonia, 117
  liniment, 118
  -water, 118
    stronger, 118
Ammoniac, 397
Ammoniacum, 397
Ammoniated liniment of camphor, 27
  glycyrrhizin, 427
  mercury, 214
  tincture of ergot, 409
    of guaiac, 243
Ammoniated tincture of opium, 60
    of valerian, 22
Ammonii acetas, 369
  benzoas, 369
  bromidum, 106
  carbonas, 404
  chloridum, 391
  iodidum, 231
  valeras, 23
Ammonio-ferric alum, 188
Ammonium, 368
Amygdala amara, 315
  dulcis, 315
Amyl nitrite, 109
Amylis nitris, 109
Amylum, 433
Anæsthesia by infiltration, 91
  scopolamine-morphine, 486D
Anæsthetics, 35
Antacids, 435
Anthelmintics, 443
Anthrarobin, 417
Antidiphtheritic serum, 253
Antifebrin, 304
Antigonococcic serum, 255
Antimeningitis serum, 255
Antimonial powder, 144
Antimonii oxidum, 141
  et potassii tartras, 141
Antimonium nigrum purificatum, 141
  sulphuratum, 141
  tartaratum, 141
Antimony, 141
  compound pill of, 144
  ointment of, 144
  wine of, 144
Antiperiodics 257
Antipest serum, 486
Antipyretics, 271
Antipyrina, 300
Antipyrine, 300
Antiseptics 487
Antispasmodics, 21
Antistreptococcus serum, 254
Antitetanic serum, 254
Antitoxin, 253
  for diphtheria, 253
  for gonorrhœa, 255
  for meningitis, 255
  for tetanus, 254
Apiol, 406
Apocynum, 382
Apomorphinæ hydrochloridum, 331

Apomorphine, 330
Aqua ammoniæ, 118
fortior, 118
amygdalæ amaræ, 316
camphoræ, 27
chloroformi, 50
cinnamomi, 317
creosoti, 278
hamamelidis, 486E
hydrogenii dioxidi, 460, 491
menthæ piperitæ, 282
pimentæ, 319
rosæ, 163
Aquæ, 4
Arbutin, 374
Argenti nitras, 181, 182
fusus, 183
mitigatus, 183
Argyria, 184
Aristol, 235
Arnica, 148
Aromatic chalk powder, 441
mixture of iron, 188
powder, 317
spirit of ammonia, 118
sulphuric acid, 197
syrup of cascara, 334
of rhubarb, 344
tincture of rhubarb, 344
Arsenate of iron, 188
of sodium, 208
Arseni iodidum, 208
trioxidum, 201, 208
Arsenic, 201
trioxide, 201, 208
Arsenous acid, 201, 208
Arsenum, 201
Artificial milk, 559
Asafetida, 23
Asafœtida, 23
Aspidium, 446
filix-mas, 446
Aspirin, 298
Astringents, 159
Atoxyl, 209
Atropina, 81
Atropinæ sulphas, 87
Atropine, 81
Auri et sodii chloridum, 223
Azedarach, 443

B

Balsam of copaiba, 380
Barley-water, 556
Basham's mixture, 88
Bath, Brand, 495
cold, 495
Russian, 518
Bath stretcher, 502
Turkish, 516
Beechwood creosote, 275
Beef essence, 556
peptonized, 550
-tea, 555
Beer, 122
Belladonna, 81
leaves, 81
liniment, 86
ointment, 86
plaster, 87
poisoning by, 87
root, 81
suppositories, 87
Belladonnæ, folia, 81
radix, 81
Benzoate of ammonium, 369
Benzoated lard, 300
Benzoic acid, 299
Benzoin, 299
Benzoinated lard, 300
Benzoinum, 299
Benzonaphthol, 463
Benzosulphanidum (saccharin), 431
Berberine, 313
Beta-eucaine, 94
-naphthol, 462
-naphthol-bismuth, 462
Bicarbonate of potassium, 364
of sodium, 435
Bichloride of mercury, 214
as an antiseptic, 458
Billorth's A. C. E. mixture, 39
Biniodide of mercury, 216
Binoxide of manganese, 196
Bismuth, 172
and ammonium citrate, 172
carbonate, 172
citrate, 172
salicylate, 175
subcarbonate, 172
subgallate, 175
subnitrate, 172
subsalicylate, 175

Bismuthi et ammonii citras, 172
carbonas, 172
citras, 172
salicylas, 175
subcarbonas, 172
subgallas, 175
subnitras, 172, 173
subsalicylas, 175
Bisulphate of quinine, 260
Bitartrate of potassium, 365
Bitter almonds, 315
wine of iron, 195
Black ginger, 320
mustard, 415
oxide of manganese, 196
pepper, 322
wash, 219
Blaud's pill, 189
Blistering collodion, 415, 433
Blisters, 506
Blood-root, 398
Blue mass, 217
ointment, 220
pill, 217
Boneset, 326
Borate of sodium, 464
Borated lint, 467
Borax, 464
Boric acid, 465
Bran-bread, 558
Brand bath, 495
Brandy, 121
Bread, almond, for diabetics, 557
bran, for diabetics, 558
Brometone, 478
Bromide of ammonium, 106
of calcium, 107
of ethyl, 51
of gold, 108
of iron, 189
of lithium, 108
of nickel, 108
of potassium, 102
of sodium, 108
of strontium, 108
Bromine, 423
Bromoform, 402
Bromoformum, 402
Bromum, 423
Broom, 138
Brown mixture, 426
Brucine, 97
Bryonia, 360
Bryony, 360
Buchu, 372
folia, 372
Burgundy pitch, 416
Buttermilk and starch, 549
Butyl chloral hydras, 75

C

Cacodylate of sodium, 248
Cactus grandiflorus, 480
fluidextract of, 480
tincture of, 480
Caffea, 134
Caffeina, 134
citrata, 137
effervescens, 137
Caffeinæ citras, 137
effervescens, 137
Caffeine, 134
Cajuput oil, 325
Calabar bean, 101
Calabarine, 101
Calamine, 179
Calcii bromidum, 437
carbonas præcipitatus, 437
chloridum, 437, 438
hydras, 339
hypophosphis, 437
phosphas, 437, 439
præcipitatus, 437, 439
Calcis hydras, 339
Calcium, 437
bromide, 437
chloride, 437, 438
hydroxide, 440
hypophosphite, 437
phosphate, 437
lactate, 439
lactophosphate, 438
oxide, 440
sulphate, 437
Calomel, 217
ointment, 219
Calumba, 313
Calumbæ radix, 313
Calumbic acid, 313
Calumbine, 313
Calx, 440
chlorinata, 457
sulphurata, 339
Camphor, 25
cerate, 27
compound tincture of, 27

Camrphor liniment, 27
monobromate, 27
spirit of, 27
-water, 27
Camphora, 25
monobromata, 27
Camphorated, oil, 25
tincture of opium, 27
Camphoric acid, 28
Canada pitch, 417
plaster, 417
turpentine, 377
Cannabis indica, 79
Cantharidal cerate, 415
collodion, 415
Cantharis, 413, 509
vesicatoria, 415
Capsici fructus, 322
Capsicine, 322
Capsicum, 322
fruit, 322
plaster, 324
Carbo ligni, 453
Carbolic acid, 271, 489
as an antiseptic, 489
ointment, 274
poisoning by, 274
Carbon, 453
Carbonate of ammonium, 404
of bismuth, 172
of calcium, 441
of creosote, 278
of guaiacol, 280
of iron, 189
of lead, 170
of lithium, 368
of magnesium, 337
of potassium, 364
of zinc, 176
Cardamom, 319
seed, 319
Cardamomi semina, 319
Cardamomum, 319
Cardiac sedatives, 141
stimulants, 117
Carron oil, 427, 441
Caryophyllum, 317
Caryophyllus, 317
Cascara sagrada, 333
Cassia fistula, 333
Cassiæ pulpa, 333
Castile soap, 431
Castor oil, 339
Cataphoresis, 534
Cataplasma carbonis, 453
kaolini, 434
Cataplasms, 4
Catechu, 161
Cathartics, 333
Caustic potash, 421
soda, 436
Cayenne pepper, 322
Cerates, 4
Ceratum camphoræ, 27
Ceratum cantharidis, 415
plumbi subacetatis, 172
resinæ, 417
compositum, 417
Cerii oxalas, 175
Cerium oxalate, 175
Chalk, 441
mixture, 437
Chamber inhaler, 527
Charcoal, 453
poultice, 453
Charta sinapis, 416
Chartæ, 4
Chenopdium, 443
oil of, 444
Chimaphila. 374
Chirata, 314
Chireta, 314
Chloral, 69
hydras, 69
hydrated, 69
poisoning by 73
chronic, 72
Chloralformamide (chloralformamidum), 74
Chloralose, 75
Chloralum hydratum, 69
Chlorate of potassium, 366
troches of, 368
Chloretone, 68
Chloride of adrenalin, 247
of ammonium, 391
of calcium, 438
of ethyl, 53
of gold and sodium, 223
of iron, 187
of mercury, corrosive, 214, 422, 458, 488
mild, 217, 342, 363
of methyl, 471
of methylene, 471
of sodium, 435

Chloride of zinc, 421
Chlorinated lime, 457
Chlorine gas, 458
Chlorodyne, 484
Chloroform, 42
contraindications to, 50
inhaler, Esmarch's, 47
Krohne and Seseman's modifications of Lawrie's, 48
Lawrie's, 49
liniment, 50
spirit of, 50
-water, 50
Chloroformum, 42
Chromic acid, 422
Chromii trioxidi, 422
Chromium trioxide, 422
Chrysarobin, 418
ointment, 418
Chrysarobinum, 418
Chrysophanic acid, 342
Cimicifuga, 33
rhizoma, 33
Cinchona, 257
rubra, 257
rubræ cortex, 257
Cinchonidinæ sulphas, 263
Cinchonidine, 263
sulphate, 263
Cinchoninæ sulphas, 263
Cinchonine, 263
sulphat, 263
Cinnamomi cortex, 316
Cinnamomum saigonicum, 316
zeylanicum, 316
Cinnamon, 316
-water, 317
Citrate of bismuth, 172
and ammonium, 172
of caffeine, 137
of iron, 190
and ammonium, 190
and quinine, 190
and strychnine, 190
of lithium, 368
of magnesium, 351
of potassium, 364, 391
of sodium, 369
Citrated caffeine, 137
Citric acid, 155
Citrine ointment, 221
Clarified honey, 321
Classification of drugs, 13
Climates, 539
Cloves, 317
Clyster, 3
Coca, 89
Cocæ folia, 89
Cocaina, 89
Cocainæ hydrochloridum, 89
Cocaine, 89
habit, 93
hydrochloride, 93
Cod-liver oil, 237
Codeina, 65
Codeinæ phosphas, 66
Codeinæ sulphas, 66
Codeine, 65
phosphate, 66
sulphate, 66
Coffee, 134
Colchiceine, 241
Colchici cormus, 239
Colchicina, 241
Colchicine, 241
Colchicum, 239
corm, 239
Cold bath, 500
in fevers, 496
as a remedy, 492
pack, 519
Collodion, 432
cantharidal, 415
flexible, 433
styptic, 433
Collodium, 432
cantharidatum, 415, 433
flexile, 433
stypticum, 160, 433
vesicans, 415
Colocynth, 354
Colocynthidis pulpa, 354
Colocynthis, 354
Columba, 313
Columbo, 313
Combination of drugs for joint effect, 8
Compound cathartic pill, 355
cerate of resin, 417
decoction of aloes, 347
effervescing powder, 353
elixir of kola, 479
extract of colocynth, 354
fluidextract of sarsaparilla, 242
infusion of gentian, 312

Compound infusion of senna, 349
laxative pill, 347
mixture of liquorice, 426
of senna, 349
pill of antimony, 144
calomel, 219
of colocynth, 355
of galbanum, 24
of rhubarb, 343
of scammony, 356
of soap, 60
of squill, 362
powder of acetanilide, 306
of almonds, 316
of catechu, 162
of chalk, 441
of cinnamon, 317
of elaterin, 359
of ipecac, 329
of jalap, 354
of kino, 163
of liquorice, 426
of morphine, 64
of opium, 60
of rhubarb, 343
of scammony, 356
solution of cresol, 464
of iodine, 227
sodium phosphate, 353
spirit of ether, 31
of juniper, 376
suppositories of lead, 170
syrup of sarsaparilla, 242
of squill, 362
tincture of benzoin, 300
of camphor, 27
of cardamom, 320
of chloroform and morphine, 50
of cinchona, 264
of gambir, 162
of gentian, 312
of rhubarb, 344
of senna, 349
Condurango, 485
Confectio piperis, 322
rosæ, 164
gallicæ, 164
sennæ, 348
sulphuris, 339
Confections, 4
Conii folia, 115
Coniine, 116
Conium, 115
Contraindications for drugs, 10
Convallamarin, 137
Convallaria, 137
Cool sponging, 496
Co-ordinated movements for treating locomotor ataxia and myelitis, 504
Copaiba, 380
Copper, 180
Cornutine, 407
Corrosive mercuric chloride, 214
sublimate, 214
Cosmoline, 431
Cotarnine, 412
hydrochloride, 412
Counterirritants, 413
Counterirritation, 506
Coxe's hive syrup, 144
Cream of tartar, 365
Creolin, 463, 491
as an antiseptic 491
Creosotal, 278
Creosote, 275
carbonate, 278
inhaler, Yeo's, 276
mixture, 278
ointment, 278
water, 278
Creosotum, 275
Creta præparata, 441
Croton chloral, 75
oil, 359
liniment, 360
Croup kettle, 528
Cubeba, 486F
fructus, 486F
Cubebic acid, 486F
Cubebin, 486F
Cubebs, 486F
Cumulative action of drugs, 8
Cupping, 509
Cupri sulphas, 180
Cuprum, 180
Cups, dry, 509
wet, 509
Curds and whey, 452
Cusso, 444
Cyanide of potassium, 480

D

Dandelion, 243
Datura stramonium, 88

Daturine, 88
Decoction of azedarach, 443
of chimaphila, 375
of euphorbia pilulifera, 395
Decoctions, 4
Decoctum aloes compositum, 347
granati corticis, 449
hæmatoxyli, 163
Demulcents, 425
Denison's resistance inhaler, 526
Deodorized opium, 59
Dermatol, 175
Deshler's salve, 417
Diaphoretics, 361
Diastase, 454
Diet for child one year old, 554
seven years old, 553
six to twelve months old, 554
two years old, 554
importance of, in disease, 13
lists, 553
Digestants, 451
Digested gruel, 560
Digitalis, 126
contraindications to, 132
folia, 126, 131
poisoning by, 132
Dilute acetic acid, 156
alcohol, 121
hydrobromic acid, 483G
hydrochloric acid, 197
hydrocyanic acid, 154
nitrate of silver, 183
nitric acid, 486B
nitrohydrochloric acid, 198, 486B
phosphoric acid, 239
solution of subacetate of lead, 172
sulphuric acid, 197
Dionin, 403
Diphtheria antitoxin, 253
Disease, food in, 13
Disinfectants 457
Disinfection, 510
Distilled extract of hamamelis, 486E
Diuretics, 361
Diuretin, 382
Dobell's solution, 465
Donovan's solution, 208
Dormiol, 474
Dosage, 6
Dosage, hypodermic, 2
by the rectum, 2
rules of, 6
Young's rule of, 6
Dover's powder, 60
Dried alum, 167
sulphate of iron, 195
thyroid gland, 245
Drip-sheet, 495
Drop method of giving ether, 39
Drugs, absorption of 6
classification of, 13
combination of, for joint effect, 8
duration of action, 7
indications and contraindications for, 10
modes of administering, 2
strength and reliability of, 8
Dry cups, 509
heat, 521
Duboisine, 474
sulphate, 474
Duration of action of drugs, 7

E

Effervescent citrate of lithium, 368
citrated caffeine, 137
citrate of magnesium, 352
phosphate of sodium, 353
sulphate of magnesium, 351
of sodium, 352
Elaterin, 359
Elaterinum, 359
Elaterium, 358
Elixir adjuvans. 426
kolæ composita, 479
phosphori, 200
proprietatis, 200
terpini hydratis cum heroina, 401
Elixirs, 4
Emetics, 327
Emetine, 327
Emmenagogues, 405
Emplastra, 4
Emplastrum arnicæ, 148
belladonnæ, 86
cantharidis, 415
capsici, 325
ferri, 195
hydrargyri, 221
menthol, 284

Emplastrum opii, 60
picis, 417
burgundicæ, 417
canadensis, 417
cantharidatum, 417
plumbi, 172
iodidi, 171
saponis, 432
Emulsion of asafœtida, 24
of almonds, 316
of chloroform, 50
of sweet almonds, 316
of turpentine, 379
Emulsions, 5
Emulsum amygdalæ, 316
asafœtidæ, 24
chloroformi, 50
olei terebinthinæ, 379
Enema, 3
nutrient, 3
peptonized, 551
Enteroclysis, 512
Epispastics, 506
Ergot, 407
aseptic, 408
Ergota, 407
Ergotin, 407, 410
Ergotinum, 410
Erigeron, 376
Escharotics, 421
Eserine, 101
Esmarch's chloroform inhaler, 47
Ether, 37
contraindications to, 40
inhaler, Allis, 40
Ethyl alcohol, 118
bromide, 51
chloride, 53
inhaler, 53
iodide, 392
salicylate, 295
Ethylate of sodium, 486F
Eucaine hydrochloride, 94
Eucalyptol, 266
Eucalyptus, 265
Eudoxine, 483
Euformol, 458
Euonymi cortex, 334
Euonymus, 334
Eupatorium, 326
Euphorbia pilulifera, 394
Euphthalmin, 476
Europhen, 236
Evans' pocket inhaler, 532
Exalgine, 309
Exercises for treating locomotor ataxia and myelitis, 504
Expectorants, 391
Exsiccated ferrous sulphate, 195
sodium phosphate, 353
Extract of mammary gland, 252
Extracts, 5
Extractum aconiti, 151
aloes, 347
barbadensis, 347
belladonnæ alcoholicum, 87
foliorum, 86
liquidum, 86
viride, 87
cannabis indicæ, 81
cascaræ sagradæ, 334
liquidum, 334
cimicifugæ, 34
liquidum, 34
cinchonæ, 264
liquidum, 264
cocæ liquidum, 93
colchici, 241
cormi, 241
colocynthidis, 355
compositum, 354
conii, 116
digitalis, 131
ergotæ, 409
liquidum, 409
euonymi, 334
siccum, 334
filicis liquidum, 447
gentianæ, 312
glycyrrhizæ, 426
liquidosi, 426
purum, 426
hæmatoxyli, 163
hamamelidis liquidum, 486E
hydrastis liquidum, 412
hyoscyami, 67
ipecacuanhæ liquidum, 329
jaborandi liquidum, 389
jalapæ, 354
leptandræ, 336
mammary gland, 252
nucis vomicæ, 99
liquidum, 99
opii, 59
liquidum, 60
pareiræ liquidum, 374

Extractum physostigmatis, 101
pilocarpi liquidum, 389
podophylli, 358
quassiæ, 311
rhamni purshianæ, 333
rhei, 343
sarcæ liquidum, 242
stramonii, 88
strophanthi, 134
taraxaci, 243
liquidum, 244
uva ursi, 374

F

Feeding the sick, 547
Fel bovinum purificatum, 455
bovis, 455
purificatum, 455
Ferri et ammonii citras, 190
sulphas, 187, 188
tartras, 190
arsenas, 188
bromidum, 189
carbonas saccharatus, 187, 189
chloridum, 187
citras, 190
hydroxidum, 191
iodidum saccharatum, 191
lactas, 195
oxalas, 193
phosphas, 193
solubilis, 193
et potassii tartas, 190
et quininæ citras, 190
solubilis, 193
reductum, 187, 194
et strychninæ citras, 190
subsulphas, 187
sulphas, 187
exsiccatus, 195
granulatus, 195
valeras, 195
Ferric chloride, 187
valerate, 23, 195
Ferrous bromide, 189
carbonate, saccharated, 189
lactate, 195
oxalate, 193
sulphate, 195
Ferrum, 187
Ferrum reductnm, 187, 193
tartaratum, 190
Fevers, cold in, 496
Filix-mas, 446
Flaxseed, 427
meal, 427
oil, 427
tea, 427
Flexible collodion, 433
Fluidextract of azedarach, 443
of cactus grandiflorus, 480
of condurango, 485
of euphorbia pilulifera, 395
of hæmatoxylon, 163
of rhus aromatica, 165
of solanum carolinense, 478
of piscidia erythrina, 475
Fluidextracts, 5
Fluidextractum aconiti, 151
apocyni, 382
belladonnæ radicis, 86
buchu, 373
calumbæ, 313
cannabis indicæ, 81
capsici, 325
chimaphilæ, 375
chiratæ, 314
cimicifugæ, 34
cinchonæ, 264
cocæ, 93
colchici seminis, 241
conii, 116
convallariæ, 137
cubebæ, 486G
cusso, 444
digitalis, 131
ergotæ, 409
eupatorii, 326
gelsemii, 114
gentianæ, 312
geranii, 165
glycyrrhizæ, 426
granati, 449
grindeliæ, 393
hamamelidis foliorum, 486E
hydrastis, 412
hyoscyami, 67
ipecacuanhæ, 329
kolæ, 479
leptandræ, 337
lobeliæ, 113
lupulini, 32
nucis vomicæ, 99
pareiræ, 374
pilocarpi, 389
podophylli, 358

Fluidextractum pruni virginianæ, 315
quassiæ, 315
rhamni purshianæ, 334
rhei, 343
rhois glabræ, 165
rosæ, 164
sabinæ, 405
sanguinariæ, 398
sarsaparillæ, 242
compositum, 242
scillæ, 361
senegæ, 399
sennæ, 348
serpentariæ, 325
spigeliæ, 443
et senn , 443
stillingiæ, 336
stramonii, 88
taraxaci, 244
uva ursi, 374
valerianæ, 22
veratri, 147
zingiberis, 320
Flying blister, 508
Food in disease, 13
materials, 547
Foods for the sick, 547
Formaldehyde, 458
generator, Novy's, 511
solution, 458
Formaldehydum, 458
Formic aldehyde, 458
Formidine, 468
Fowler's solution, 208
Frazier-Lentz hot-air apparatus, 520
Fumigation, 510
lamp for mercurial, 212

G

Galla, 161
Gallic acid, 160
ointment, 161
Gambir, 161
Garlic, 394
Gaultheria, 295
Gavage, 515
method of employing, 515
Gelsemii radix, 113
Gelsemine, 114
Gelsemium, 113
poisoning by, 114
General therapeutic considerations, 1
Generator, Novy's formaldehyde, 511
Gentian, 311
Gentiana, 311
Gentianæ radix, 311
Geranium, 164
Germicides, 457
Germs, mode of destroying, 457
Gin, 121
Ginger, 320
Glacial acetic acid, 156
Glandula thyroides sicca, 245
Glandulæ suprarenales siccæ, 247
Glauber's salt, 352
Glonoin, 111
Glusidum, 431
Glutol, 459
Glycerin, 429
Glycerins, 5
Glycerinum, 429
acidi borici, 430, 467
carbolici, 430
tannici, 160, 430
aluminis, 430
amyli, 430
boracis, 430
pepsini, 430, 451
plumbi subacetatis, 172, 430
tragacanthæ, 430
Glycerita, 5
Glycerites, 5
Glyceritum acidi tannici, 160
amyli, 430
borogIycerini, 467
hydrastis, 412
phenolis, 274
Glycyrrhiza, 425
Glycyrrhizæ radix, 425
Glycyrrhizinum ammoniatum, 427
Gold, bromide of, 108
Golden seal, 410
Goodell's pill of the three valerianates, 23
Goulard's extract, 171
Graduated medicine glasses, 6
Granati cortex, 448
Granatum, 448
Granulated opium, 59
ferrous sulphate, 195
Gray oil, 219
powder, 220
Green extract of belladonna, 87
soap, 431
Grindelia, 393

Gruel, digested, 560
Guaiac, 242
resin, 242
Guaiaci resina, 242
Guaiacol, 279
carbonate, 279
Guaiacolis carbonas, 280
Guaiacum, 242
Gum acacia, 425
arabic, 425

H

Haematoxyli lignum, 163
Hæmatoxylin, 163
Hæmatoxylon, 163
Hamamelidis cortex, 486E
folia, 486E
Hamamelis, 486E
Heat, 515
dry, 521
Heavy magnesia, 337
Heroin, 65
hydrochloride, 65
Hexamethylenamine (urotropin, uritone), 371
Hoffmann's anodyne, 31
Holocaine, 475
hydrochloride, 475
Homatropinæ hydrobromidum, 88
Homatropine, 88
Home modification of Turkish bath, 519
Honey, 321
of borax, 465
clarified, 321
of rose, 164
of squill, 362
Hope's camphor mixture, 482
Hops, 32
Hot-air apparatus, Frazier-Lentz, 520
Kelley's, 520
pack, 519
springs, 538
Humulus, 32
lupulus, 32
Hydrargyri chloridum corrosivum, 214, 488
mite, 217
iodidum flavum, 222
rubrum, 216
oleas, 221
oxidum flavum, 221
Hydrargyri rubrum, 222
perchloridum, 214, 488
subchloridum, 217
subsulphas flavus, 223
Hydrargyrum, 210
ammoniatum, 214
cum creta, 220
Hydrastina, 412
Hydrastine, 412
Hydrastininæ hydrochloridum, 412
Hydrastinine hydrochloride, 412
Hydrastis, 410
rhizoma, 410
Hydrobromic acid 486G
Hydrobromide of homatropine, 88
of hyoscine, 68
of hyoscyamine, 67
of pelletierine, 448
Hydrochloric acid, 197
Hydrochloride of apomorphine, 331, 391
of cocaine, 93
of cotarnine, 412
of eucaine, 94
of heroin, 65
of holocaine, 475
of hydrastinine, 412
of methylthionine (methylene-blue), 267
of morphine, 64
of pelletierine, 448
of phenocoll, 309
of pilocarpine, 389
of quinine, 260
acid, 260
of scopolamine, 486D
of strychnine, 99
Hydrocyanic acid, 153
Hydrogen peroxide, 460, 491
as an antiseptic, 491
Hydroxide of iron, 193
of potassium, 421
of sodium, 436
Hyoscinæ hydrobromidum, 67
Hyoscine, 67
hydrobromide, 67
Hyoscyami folia, 66
Hyoscyaminæ hydrobromidum, 67
sulphas, 67
Hyoscyamine, 66
hydrobromide, 67
sulphate, 67
Hyoscyamus, 66

Hyoscyamus leaves, 66
Hypnal, 473
Hypnotics, 55
Hypodermic injection of apomorphine, 331
of cocaine, 91
of ergot, 409
of morphine, 65
medication, 2
Hypodermoclysis 522
apparatus for, and method of performing, 522
Hypophosphite of calcium, 239, 439
Hyposulphite of sodium, 436

I

Ice-bag, 493
Ice-jacket, 493
Ice-rub, 497
Ichthyol, 244
Idiosyncrasy, 9
Incompatibility, 10
Indian hemp, 79
Indications for drugs, 10
Infiltration anæsthesia, 91
Infusion of juniper, 376
of matricaria, 332
of valerian, 22
Infusions, 5
Infusum buchu, 373
calumbæ, 314
caryophylii, 318
chiratæ, 314
cinchonæ, 264
acidum, 264
digitalis, 131
ergotæ, 409
gentianæ compositum, 312
lupuli, 32
pruni virginianæ, 315
quassiæ, 311
rhei, 344
rosæ acidum, 164
scoparii, 139
senegæ, 399
sennæ, 349
compositum, 349
serpentariæ, 326
uvæ ursi, 374
Inhalations, 523
Inhalations, exercises to be used in, 523
Inhaler, Allis ether, 40.
Inhaler, chamber, 527
Denison's resistance, 526
Esmarch's chloroform, 47
ethyl chloride, 53
Evans' pocket, 532
menthol, 529
Yeo's creosote, 276
Injectio ergotæ hypodermica, 409
morphinæ hypodermica, 65
Inspissated ox-gall, 455
Intravenous injection, 534
Iodalbin, 250
Iodide of ammonium, 231
of arsenic, 208
of ethyl, 392
of iron, 191
of lead, 171
of potassium, 228
of sodium, 231
of strontium, 231
of thymol, 235
Iodine, 223
contraindications to, 227
ointment, 227
poisoning by, 227
Iodoform, 231, 490
as an antiseptic, 490
ointment, 234
poisoning by, 234
Iodoformum, 231, 490
Iodol, 234
Iodolum, 234
Iodum, 223
Ipecac, 327
Ipecacuanha, 327
Ipecacuanhæ radix, 327
Ipecacuanhic acid, 327
Iron, 187
and ammonium sulphate, 188
aromatic mixture of, 188
arsenate of, 188
bromide of, 189
carbonate of, 189
chloride of, 187
citrates of, 190
by hydrogen, 187, 193
iodide of, 191
lactate of, 195
oxalate of, 193
phosphates of 193
plaster, 195
reduced, 187, 193
sulphate of, 187

Iron, tartrates of, 190
valerate of, 23, 195
Izal, 469

J

Jaborandi folia, 385
Jalap, 353
Jalapa, 353
Jasmine, yellow, 113
Jequirity, 419
Jervine, 145
Joint effects of drugs, 8
Juniper, 375
Juniperus, 375
Junket, 560

K

Kamala, 449
Kaolin, 434
cataplasm of, 434
Kaolinum, 434
Kataphoresis, 534
Kelley's hot-air apparatus, 520
Kino, 162
Kola, 478
Koumyss, 552
Kousso, 444
Kreolin, 463, 491
Krohne and Seseman's modification of Lawrie's chloroform inhaler, 48

L

Lactate of calcium, 439
of iron, 195
of strontium, 371
Lactone tablets, 549
Lactophenin, 309
Lactophosphate of calcium, 438
Lactose, 363
Lady Webster dinner pills, 346
Lamellæ atropine, 87
physostigminæ, 102
Lanolin, 429
Lard benzoated, 300
Laudanum, 59
Laughing gas, 35
Lavage, 535
Lawrie's chloroform inhaler, 47
Lead, 167
acetate, 169
carbonate, 170
iodide, 171
nitrate, 172
Lead oxide, 172
plaster, 172
-water and laudanum, 171
Lecithin, 251
Leeches, 536
Leeching, 536
Lemon-juice, 156
Leptandra, 336
Leptandrin, 337
Leptandrine, 337
Levulose, 427
Light magnesia, 337
Lime, 440
chlorinated, 457
sulphurated, 339
-water, 440
Lingual traction, 41, 534
Lini farina, 427
semina, 427
Liniments, 5
Linimentum aconiti, 150
ammoniæ, 118
belladonnæ, 86
calcis, 427, 441
camphoræ, 27
ammoniatum, 27
chloroformi, 50
crotonis, 360
hydrargyri, 220
plumbi subacetatis, 172
potassii iodidi cum sapone, 230
saponis, 432
mollis, 432
sinapis, 416
Linimentum terebinthinæ, 380
aceticum, 380
Linseed, 427
oil, 427
Linum, 427
Lipanin, 252
Liquefied phenol, 274
Liquid petrolatum, 431
Liquor acidi arsenosi, 208
chromici, 423
ammoniæ, 118
fortis, 118
ammonii acetatis, 390
arseni et hydrargyri iodidi, 208
arsenicalis, 208
atropinæ sulphatis, 87
bismuthi et ammonii citratis, 173
calcis, 339, 440

Liquor calcis chlorinatæ, 458
calumbæ concentratus, 314
chiratæ concentratus, 314
cresolis compositus, 464
epispasticus, 415
ferri acetatis, 195
et ammonii acetatis, 187, 188
chloridi, 190
perchloridi, 190
fortis, 190
persulphatis, 191
subsulphatis, 191
formaldehydi, 458, 490
hamamelidis, 486F
hydrargyri nitratis, 221
acidus, 221
perchloridi, 460
hydrogenii peroxidi, 460, 491
iodi compositus, 227
fortis, 227
magnesii carbonatis, 337
citratis, 351
morphinæ acetas, 65
hydrochloridi, 64
tartratis, 64
pancreatitis, 453
pepsini, 451
plumbi subacetatis, 171
dilutus, 172
fortis, 171
potassæ, 364
potassii arsenitis, 208
hydroxidi, 364
quassiæ concentratus, 311
rhei concentratus, 344
sarsæ compositus concentratus, 242
Liquor sennæ concentratus, 349
sodii arsenatis, 208
ethylatis, 486F
hydroxidi, 437
phosphatis compositus, 353
strychninæ hydrochloridi, 99
thyroidei, 246
trinitrini, 112
zinci chloridi, 422
Liquorice, 425
root, 425
Litharge, 172
Lithii benzoas, 368
bromidum, 108, 368
carbonas, 368
Lithii citras, 368
effervescens, 368
salicylas, 368
Lithium, 368
bromide, 108
Lobelia, 112
Logwood, 163
Lotio hydrargyri flava, 223
nigra, 216
Lugol's solution, 227
Lunar caustic, 181
Lung expansion, arrangement of bottles for promoting, 526
Lupulin, 32
Lupuline, 32
Lupulinic acid, 32
Lupulinum, 32
Lupulus, 32
Lysol, 463

M

Magnesia, 337
levis, 337
ponderosa, 337
Magnesii carbonas, 337
ponderosus, 337
levis, 337
citras, 351
effervescens, 352
sulphas, 350
effervescens, 351
Male fern, 446
Mammary gland, 252
Mandrake, 356
Mangani dioxidum præcipitatum, 196
Manna, 333
Marsden paste, 206
Massa copaibæ, 382
hydrargyri, 217
Matricaria, 332
May apple, 356
Medication by cataphoresis, 534
hypodermic injection, 2
inhalation, 2
inunction, 2
mouth, 2
rectum, 2
Medicine glasses, graduated, 6
Mel, 321
boracis, 465
depuratum, 321
rosæ, 164, 322

Mentha piperita, 281
Menthol, 282
inhaler, 283
Mercurial fumigator, 212
ointment, 220
oleate, 221
pills, 217, 342
plaster, 221
Mercurol, 249
Mercury, 210
bichloride, 214, 422, 458, 488
biniodide, 216
with chalk, 220
ointment, 220
protiodide, 222
salicylate, 222
Methyl blue, 467
chloride, 471
Methylene-blue (methylthionine hydrochloride), 267
chloride, 471
Methylthionine hydrochloride (methylene-blue), 267
Mild mercurous chloride, 217, 343, 363
Milk, almond, 559
artificial, 559
butter-,and starch, 549
peptonized, 550
-sugar, 363
Mineral springs, 538
Mistura ammoniaci, 397
amygdala, 316
creosoti, 278
cretæ, 437
ferri aromatica, 188
glycyrrhizæ compcsita, 426
guaiaci, 243
olei ricini, 341
rhei et sodæ, 344
sennæ composita, 349
spiritus vini gallici, 122
Mitigated caustic, 183
Modes of administering drugs, 2
Monobromated camphor, 27
Morphina, 64
Morphinæ, acetas, 64
hydrochloridum, 64
sulphas, 64
tartras, 64
Morphine, 64
Morrhuol, 237
Moschus, 21
Mouth, administration of drugs by the, 2
Mucilage of acacia, 425
Mucilago acaciæ, 425
Mulled wine, 559
Muriate of ammonium, 391
of morphine, 64
Musk, 21
Mustard, 332, 415
papers, 416
plaster, 508
Myristica, 318

N

Naphthalene, 462
Naphthalenum, 462
Naphthalin, 462
Naphthol, 462
Nargol, 481
Nebulizer, Robertson's, 532
Nervous sedatives, 101
stimulants, 97
Nickel, bromide of, 108
Nitrate of lead, 172
of pilocarpine, 390
of potassium, 111
of silver, 181
of strychnine, 99
Nitric acid, 422, 486A
Nitrite of amyl, 109
of potassium, 365
of sodium, 112
Nitrogen monoxide, 35
Nitroglycerin, 111
Nitrohydrochloric acid, 198, 486B
Nitrous oxide, 35
administration of, 36
contraindications to, 36
Normal saline solution, 542
Nosophen, 236
Novaspirin, 298
Novocaine, 476
Novy's formaldehyde generator, 510
Nut-gall, 161
Nutmeg, 318
Nutrient enema, 551
Nux vomica, 97

O

Oatmeal-water, 557
Oil of amber, 419
phosphorated, 199
of rue, 405
of tar, 395

Ointment of aconitine, 50
of ammoniated mercury, 214
Ointment of antimony, 144
of atropine, 87
of belladonna, 86
of boric acid 4C6
of calomel, 219
of cantharides, 415
of capsicum, 325
of carbolic acid, 274
of chrysarobin, 418
of conium, 116
of creosote, 278
of gallic acid, 161
of galls, 161
with opium, 161
of hamamelis, 486F
of iodide of lead, 171
of potassium, 230
of iodine, 227
of iodoform, 234
of lead acetate, 170
carbonate, 171
iodide, 171
of mercury, 220
of nitrate of mercury, 221
of oleate of mercury, 221
of oxide of zinc, 176
of phenol, 274
of red iodide of mercury, 216
oxide of mercury, 222
of resin, 417
of rose-water, 164
of salicylic acid, 293
of stramonium, 88
of sulphur, 338
of tannic acid, 160
of tar, 396
of tartrate of antimony, 144
of turpentine, 380
of veratrine, 148
of yellow oxide of mercury, 222
Ointments, 6
Oleatum hydrargyri, 221
veratrinæ, 148
Oleoresina aspidii, 447
capsici, 325
cubebæ, 486G
lupulini, 32
piperis, 322
zingiberis, 321
Oleum amygdalæ, 316
amaræ, 316
Oleum amygdalæ expressum, 316
cajuputi, 325
caryophilli, 318
chenopodii, 444
cinereum, 219
cinnamomi, 317
copaibæ, 380, 381
crotonis, 359
cubebæ, 486G
erigerontis, 376
eucalypti, 265, 266
gaultheriæ, 295
jecoris aselli, 237
juniperi, 375
lini, 427
menthæ piperitæ, 282
morrhuæ, 237
myristicæ, 319
phosphoratum, 199
picis liquidæ, 395
pimentæ, 319
ricini, 339
sabinæ, 405
santali, 376
sinapis volatile, 415
succini, 419
tanaceti, 406
terebinthinæ, 377
rectificatum, 377
tiglii, 359
valerianæ, 22
Opii pulvis, 59
Opium, 55
deodoratum, 59
granulatum, 59
poisoning, acute, differentiation of, from acute alcoholism, 125
Orphol, 462
Ovarian extract, 250
Ox-gall, 455
Oxalate of cerium, 175
of iron, 193
Oxide of antimony, 141
of calcium, 440
of lead, 172
of zinc, 176
Oxygen, 461
Oxymel, 321
scillæ, 362
Oxytocics, 407
Oysters, peptonized, 551

P

Pack, hot, 519
Pancreas, 452
Pancreatin, 452
Pancreatinum, 452
Papain, 453
Papoid, 453
Parafinum molle, 431
Paraldehyde, 77
Paraldehydum, 77
Paregoric, 27, 59
Pareira, 373
Pareiræ radix, 373
Pelletierine, 448
  hydrobromide, 448
  hydrochloride, 448
  sulphate, 448
  tannate, 448
Pelletierinæ tannas, 448
Pepo, 447
Pepper, 322
Peppermint, 281
  -water, 282
Pepsin, 451
  cordial, 451
Pepsinum, 451
Peptonized beef, 550
    enemata, 551
  milk, 550
  oysters, 551
Permanganate of potassium, 405, 459
Peroxide of hydrogen, 460, 491
Persulphate of iron, 195
Petrolatum, 431
  album, 431
  liquidum, 431
Phenacetin (acetphenetidin), 307
Phenacetinum (acetphenetidinum,) 307
Phenazone, 300
Phenazonum, 300
Phenic acid, 271
Phenocoll, 309
Phenol, 271
  as an antiseptic, 489
  glycerite of, 274
  liquefied, 274
  ointment of, 274
Phenolis, glyceritum, 274
  unguentum, 274
Phenolphthalein, 347
Phenolsulphonate (sulphocarbolate) of sodium, 482
  of zinc, 482
Phenylis salicylas (salol), 296
Phlebotomy, 544
Phosphate of calcium, 239, 439
  of codeine, 65
  of iron, 193
  of sodium, 352
  of strontium, 371
Phosphorated oil, 199
Phophoric acid, 239
Phosphorus, 199
Physostigma, 101
Physostigmatis semina, 101
Physostigminæ salicylas, 102
  sulphas, 102
Physostigmine, 101
Picric acid, 266
Pill of three valerianates, 23
Pills, 5
Pilocarpinæ hydrochloridum, 389
  nitras, 390
Pilocarpine, 389
Pilocarpus, 385
Pilula colocynthidis composita, 355
    et hyoscyami, 356
  galbani composita, 24
  hydrargyri, 217
    subchloridi composita, 219
  ipecacuanhæ cum scilla, 330
  plumbi cum opio, 170
  saponis composita, 60
  scammonii composita, 356
Pilulæ aloes, 346
    et ferri, 346
    et mastiches, 346
    et myrrhæ, 346
  antimonii compositæ, 144
  asafœtidæ, 24
  catharticæ compositæ, 355
    vegetabiles, 355
    carbonatis, 189
    iodidi, 191
  laxativæ compositæ, 347
  opii, 59
  phosphori, 199
    composita, 343
    compositæ, 343
  scillæ composita, 362
Pimenta, 319
Pinkroot, 443
Piper, 322

Piper nigrum, 322
Piperazina, 370
Piperazine, 370
Piperina, 322
Piperine, 322
Pipsissewa, 374
Piscidia erythrina, 475
Pitch, 395
Pix, 395
  burgundica, 416
  canadensis, 417
  liquida, 395
Plaster of arnica, 148
Plaster of belladonna, 86
  of Canada pitch, 417
  of cantharides, 415
  of capsicum, 325
  of iodide of lead, 171
  of iron, 195
  of lead, 172
  of menthol, 284
  of mercury, 221
  of opium, 60
  of soap, 432
Plasters, 4
Plumbi acetas, 169
  carbonas, 170
  iodidum, 171
  nitras, 172
  oxidum, 172
Plumbum, 167
Podophyllin, 356
Podophyllum, 356
Pomegranate, 448
Port wine, 122
Porter, 122
Potassa caustica, 421
  cum calce, 421, 440
Potassii acetas, 364
  bicarbonas, 364
  bitartras, 365
  bromidum, 102
  carbonas, 364
  chloras, 366
  citras, 364
  cyanidum, 480
  hydroxidum, 421
  iodidum, 228
  nitras, 111, 365
  permanganas, 459
  et sodii tartras, 353
  silicas, 486
  tartras acidus, 365
Potassium acetate, 364
  bicarbonate, 364
  bitartrate, 365
  bromide, 102
  carbonate, 364
  chlorate, 366
  citrate, 364, 391
  cyanide, 480
  hydroxide, 421
  iodide, 228
  nitrate, 365
  nitrite, 111
  permanganate, 459
  silicate, 486
Poultice of charcoal, 453
  of kaolin, 434
Precipitated carbonate of calcium, 437
    of zinc, 179
  phosphate of calcium, 437
  sulphur, 337
Prepared chalk, 441
Protargol, 185
Protiodide of mercury, 222
Protoxide of nitrogen, 35
Pruni virginianæ cortex, 314
Prunus virginiana, 314
Prussic acid, 153
Pulvis acetanilidi compositus, 306
  amygdalæ compositus, 316
  antimonialis, 144
  aromaticus, 317
  catechu compositus, 162
  cinnamomi compositus, 317
  cretæ aromaticus, 441
    compositus, 441
    cum opio, 441
  effervescens compositus, 353
  elaterini compositus, 359
  glycyrrhizæ compositus, 349, 426
  ipecacuanhæ compositus, 60, 390
    et opii, 60, 390
  jalapæ compositus, 354
  kino compositus, 163
  morphinæ compositus, 64
  opii compositus, 60
  rhei compositus, 343
  scammonii compositus, 356
  sodæ tartaratæ effervescens, 353
Pumpkin-seed, 447
Punk, 483
Pure extract of glycyrrhiza, 426

Purgatives, 333
Purging cassia, 333
Purified aloes, 346
chloroform, 42
ox-gall, 455
sulphide of antimony, 141
Pyrogallic acid, 423
Pyrogallol, 423
Pyrophosphate of iron, 194

Q

Quassia, 311
infusion of, 311
Quassiæ lignum, 311
Quercus, 163
Quicksilver, 210
Quinidina, 263
Quinidinæ sulphas, 264
Quinidine, 263
sulphate, 264
Quinina, 257
Quininæ bisulphas, 260
hydrochloridum, 260
acidum, 260
salicylas, 260
sulphas, 260
valeras, 23, 260
Quinine, 257
acid hydrochloride of, 260
bisulphate, 260
hydrochloride, 260
salicylate, 260
sulphate, 260
tannate, 260
valerate, 260

R

Rectal medication, 2, 551
Rectified spirit, 121
Red cinchona, 257
mercuric iodide, 216
oxide, 222
precipitate, 222
ointment, 222
rose, 163
wine, 121
Reduced iron, 187, 193
Reliability and strength of drugs, 8
Remedial measures other than drugs, 487
Remedy, cold as a, 492
Resin, 417
cerate, 417
compound, 417
Resin of guaiac, 242
ointment, 417
Resina, 417
jalapæ, 354
podophylli, 358
scammonii, 356
Resistance inhaler, Denison's, 526
Resorcinol, 285
Rest cure, 536
Restorative beef-essence, 556
Rhamnus purshiana, 333
Rhei radix, 342
Rheum, 342
Rhigolene, 472
Rhubarb, 342
Rhus aromatica, 165
glabra, 165
Rice-water, 557
Robertson's nebulizer, 532
Rochelle salt, 353
Rosa gallica, 163
gallicæ petala, 163
Rose-water, 164
Rosin, 417
Rubefacients, 506
Rue, 405
Rules for dosage, 6
Rum, 121
Russian bath, 518
Ruta graveolena, 405

S

Sabina, 405
Saccharated carbonate of iron, 189
iodide of iron, 191
Saccharin (benzo-sulphanidum), 431
Saccharum, 486
lactis, 363
purificatum, 486
Sal ethyl, 295
Salicin, 296
Salicinum, 296
Salicylate of bismuth, 175
of ethyl, 295
of lithium, 368
of mercuy, 222
of phenyl (salol), 296
of physostigmine, 102
of sodium, 295
of strontium, 371
Salicylic acid, 288
contraindications to, poisoning by, 293

Salicylic ointment, 293
untoward effects, 294
Saline solution, normal, 542
Salol (phenyl salicylate), 296
Salophen, 298
Salophenum, 298
Salt, 435
Saltpetre, 365
Salts, 350
Sandal-wood oil, 376
Sanguinaria, 398
Santonin, 444
poisoning by, 446
Santoninate of sodium, 446
Santoninum, 444
Sapo, 431
durus, 431
mollis, 431
Sarsæ radix, 242
Sarsaparilla, 242
Savine, 405
Scammonia radix, 356
Scammoniæ resinæ, 356
Scammonium, 356
Scammony, 356
Schleich's anæsthetic fluid, 91
Scilla, 361
Scoparii cacumina, 138
Scoparin, 138
Scoparius, 138
Scopolamine, 486D
hydrochloride, 486D
morphine anæsthesia, 486D
Sedatives, cardiac, 141
nervous, 101
Seidlitz powder, 353
Senega, 399
Senegæ radix, 399
Senna, 348
Alexandrina, 348
confection of, 348
Indica, 348
Serpentaria, 325
Serpentariæ rhizoma, 325
Serum antidiphtheritic, 253
antigonococcic, 255
antimeningitis, 255
antistreptococcus, 254
antitetanicum, 254
Sherry, 122
Sick, feeding the, 547
Silicate of potassium, 486
of sodium, 486
Silver nitrate, 181
Sinapis alba, 415
albæ semina, 415
nigra, 415
nigræ semina, 415
Soap, 431
castile, 431
green, 431
liniment, 432
plaster, 432
Socotrine aloes, 344
Soda caustica, 436
tartarata, 363
Sodii acetas, 435
arsenas, 208
bicarbonas, 435
boras, 464
bromidum, 108
cacodylas, 248
chloridum, 435
citras, 369
ethalas, 486F
hydroxidum, 436
hyposulphis (thiosulphas), 436
iodidum, 231
nitris, 112
phenolsulphonas, 482
phosphas, 352
effervescens, 353
exsiccatus, 353
et potassii tartras, 353
salicylas, 295
santoninas, 446
silicas, 486
sulphas, 352
effervescens, 352
sulphocarbolas, 482
thiosulphas (hyposulphis), 436
Sodio-theobromine-salicylate, 382
Sodium, 435
acetate, 435
arsenate, 208
bicarbonate, 435
borate, 464
bromide, 108
cacodylate, 248
chloride, 435
citrate, 369
ethylate, 486F
hydroxide, 436
hyposulphite (thiosulphate), 436
iodide, 231
nitrite, 112

Sodium phenolsulphonate, 482
phosphate, 352
effervescing, 353
exsiccated, 353
salicylate, 295
santoninate, 446
silicate, 486
sulphate, 352
sulphocarbolate, 482
thiosulphate (hyposulphite), 436
Soft petrolatum, 431
soap, 431
Solanum Carolinense, 478
Soluble glass, 486
phosphate of iron, 193
Solution of acetate of ammonium, 390
of ammonia, 118, 416
of arsenate of sodium, 208
of arsenic and mercuric iodide, 208
of arsenite of potassium, 208
of arsenous acid, 208
of chloride of iron, 190
of zinc, 422
of chlorinated lime, 457
of chromic acid, 423
of bismuth and ammonium, 173
of formaldehyde, 458
of hydrochloride of morphine, 64
of strychnine, 99
of hydrogen dioxide, 460
of iodide of arsenic and mercury, 208
of iodine, 227
of iron and ammonium acetate, 188
of lime, 440
of nitrate of mercury, 221
normal saline, 542
of pancreas, 453
of pepsin, 451
of perchloride of iron, 190
of mercury, 216
of potassa, 364
of potassium hydroxide, 364
of sodium ethylate, 486F
hydroxide, 437
of subacetate of lead, 171
of sulphate of atropine, 87
of iron, 191, 422
Solution of tartrate of morphine, 64
Somnal, 474
Sozoiodol, 237
Spanish fly, 382, 405, 413
Spice poultice, 508
Spigelia, 443
Spinal anæsthesia, mode of introducing the needle in, 92
Spirit of Mindererus, 390
of nitrous ether, 29
of turpentine, 377, 416
Spiritus ætheris, 40
compositus, 31
nitroci, 29
ammoniæ, 118
aromaticus, 118
fœtidus, 118
cajuputi, 325
camphoræ, 27
chloroformi, 50
cinnamomi, 317
frumenti, 121
gaultheriæ, 296
glycerylis nitratis, 112
juniperi, 376
compositus, 121, 376
menthæ piperitæ, 282
myristicæ, 319
phosphori, 200
rectificatus, 121
vini gallici, 121
Sponging, cool, 496
Springs, mineral, 538
Squill, 361, 395
Starch, 433
glycerite of, 430
poultice, 433
-water, 433
Steam vaporizer, 530
Stillingia, 335
Stimulants, cardiac, 117
nervous, 79
Stovaine, 476
Stramonii folia, 88
Stramonium, 88
Strength, relative, of drugs, 8
Stretcher, bath, 502
Stronger water of ammonia, 118
Strontii bromidum, 108
iodidum, 231, 371
salicylas, 371
Strontium, 371
bromide, 371

Strontium iodide, 371
salicylate, 371
Strophanthi semina, 131
Strophanthin, 134
Strophanthinum, 134
Strophanthus, 133
Strychninæ nitras, 99
sulphas, 99
Strychnine, 97
hydrochloride, 99
nitrate, 99
Strychnine sulphate, 99
Styptic collodion, 433
Subcarbonate of bismuth, 172
Subgallate of bismuth, 175
Sublimed sulphur, 337
Subnitrate of bismuth, 172
Subsalicylate of bismuth, 175
Subsulphate of iron, 187
Succinum, 419
Succus belladonnæ, 86
conii, 116
hyoscyami, 67
limonis, 156
scoparii, 139
Sugar, 486
-cane, 486
of lead, 169
of milk, 363
Sulphate of aluminum and potassium, 166
of atropine, 87
of calcium, 437
of cinchonidine, 263
of cinchonine, 263
of codeine, 66
of copper, 180
of duboisine, 474
of hyoscyamine, 67
of iron, 187
and ammonium, 187, 188
of magnesium, 350
of morphine, 64
of physostigmine, 102
of quinidine, 264
of quinine, 260
of sodium, 352
of strychnine, 99
of zinc, 175
Sulphocarbolate (phenolsulphonate) of sodium, 482
of zinc, 482
Sulphonal (sulphonmethane), 76
Sulphonalum, 76
Sulphonethylmethanum (trional), 77
Sulphonmethanum (sulphonal), 76
Sulphur, 337
lotum, 337
ointment, 338
præcipitatum, 337
sublimatum, 337
Sulphurated lime, 339
Sulphuric acid, 196
ether, 37
Suppositoria acidi tannici, 160
asafœtidæ, 24
belladonnæ, 87
glycerini, 429
iodoformi, 234
morphinæ, 65
plumbi composita, 170
Suppositories, 5
Suppositorium acidi carbolici, 274
Suprarenal gland, 247
Suspension, 541
Sweet almonds, 315
spirit of nitre, 29
Syrupus acaciæ, 425
acidi citrici, 156
allii, 394
amygdalæ, 316
calcii lactophosphatis, 439
cascaræ aromaticus, 334
chloral, 72
codeinæ, 66
iodidi, 191
phosphatis, 193
cum quinina et strychnina, 193
quininæ et strychninæ phosphatum, 193
hypophosphitum, 439
compositus, 439
ipecacuanhæ, 329
limonis, 156
picis liquidæ, 396
pruni Virginianæ, 315
rhei, 344
aromaticus, 344
rosæ, 164
sarsaparillæ compositus, 242
scillæ, 362
compositus, 144, 362
senegæ, 399
sennæ, 349
zingiberis, 321

T

Tabellæ trinitrini, 112
Tablets, 5
  of nitroglycerin, 112
Taka-diastase, 454
Tamarinds, 334
Tamarindus, 334
Tanacetum, 406
Tannate of pelletierine, 448
  of quinine, 260
Tannic acid, 159
Tansy, 406
Tar, 395
  oil of, 395
  ointment, 396
Taraxaci radix, 243
Taraxacum, 243
Tartar emetic, 141
Tartaric acid, 155
Tartrate of antimony and potassium, 141
  iron and potassium, 190
  of morphine, 64
  of potassium and sodium, 353
Tea, beef, 555
  flaxseed, 427
Terebene, 399
Terebenum, 399
Terebinthina, 377, 416
Terpine hydrate, 400
Terpini hydras, 400
Terpinol, 401
Thapsia, 420
Theobromine sodiosalicylate, 382
Therapeutical considerations, general, 1
Thiocol, 402
Thiol, 248
Thiolum liquidum, 248
  siccum, 248
Thiosinamine, 250
Thiosulphate of sodium, 436
Thymol, 284
  iodide, 235
Thymus glands, 248
Thyroid gland, 245
Thyroideum siccum, 245
Tinctura aconiti, 151
  aloes, 347
    et myrrhæ, 347
  arnicæ, 148
  asafœtidæ, 24
Tinctura belladonnæ, 86
  foliorum, 86
  benzoini, 300
    composita, 300
  bryoniæ, 360
  buchu, 373
  calumbæ, 314
  camphoræ composita, 27, 59
  cannabis indicæ, 81
  cantharidis, 414
  capsici, 324
  cardamomi, 320
    composita, 320
  catechu, 162
  chiratæ, 314
  chloroformi et morphinæ composita, 50, 64
  cimicifugæ, 34
  cinchonæ, 264
    composita, 264
  colchici seminis, 241
  conii, 116
  convallariæ, 137
  cubebæ, 486G
  digitalis, 131
  ergotæ ammoniata, 409
  ferri chloridi, 189
    perchloridi, 189
  gallæ, 161
  gambir composita, 162
  gelsemii, 114
  gentianæ composita, 312
  guaiaci, 243
    ammoniata, 243
  hamamelidis, 486F
  humuli, 32
  hydrastis, 412
  hyoscyami, 67
  iodi, 227
  ipecacuanhæ et opii, 60
  jaborandi, 389
  jalapæ, 354
  kino, 163
  lobeliæ, 113
    ætherea, 113
  lupuli, 32
  moschi, 21
  nucis vomicæ, 99
  opii, 59
    ammoniata, 60
    camphorata, 27, 59
    deodorati, 60
  physostigmatis, 101

Tinctura podophylii, 358
pruni virginianæ, 315
quassiæ, 311
rhei, 344
aromatica, 344
rhei composita, 344
sanguinariæ, 398
scillæ, 361
senegæ, 399
sennæ composita, 349
serpentariæ, 326
stramonii, 88
strophanthi, 134
valerianæ, 22
ammoniata, 22
veratri, 147
zingiberis, 321
Tincture of apocynum, 382
of cactus grandiflorus, 480
of muriate of iron, 189
Tinctures, 5
Toast, watered, 559
Tongue, Laborde's rhythmic traction of, in accidents by ether, 41
Touchwood, 483
Transfusion, 542
abdominal, 542
apparatus, 545
Trikresol, 468
Trinitrin, 111
Trional (sulphonethylmethane), 77
Trioxide of arsenic, 208
Triturates, 5
Trituratio elaterini, 359
Troches, 5
Trochisci acidi tannici, 159
cretæ, 442
cubebæ, 486G
ferri reducti, 195
gambir, 162
glycyrrhizæ et opii, 426
guaiaci resinæ, 243
ipecacuanhæ, 329
menthæ piperitæ, 282
morphinæ et ipecacuanhæ, 65
potassii chloratis, 368
santonini, 445
zingiberis, 321
Trochiscus acidi benzoici, 300
carbolici, 274
tannici, 159
morphinæ et ipecacuanhæ, 65
sulphuris, 339
Turkish bath, 516
Turpentine, 377
liniment, 380
ointment, 380
stupe, 509

U

Unguents, 6
Unguentum acidi borici, 466
carbolici, 274
gallici, 161
salicylici, 293
tannici, 160
aconitinæ, 150
antimonii tartarati, 144
aquæ rosæ, 164
atropinæ, 87
belladonnæ, 86
cantharidis, 415
capsici, 325
cetacei, 300
chrysarobini, 418
conii, 116
creosoti, 278
gallæ, 161
cum opii, 161
glycerini plumbi subacetatis, 431
hamamelidis, 486F
hydrargyri, 220
ammoniati, 214
iodidi rubri, 216
nitratis, 221
dilutum, 221
oleatis, 221
oxidi flavi, 222
rubri, 222
subchloridi, 219
iodi, 227
iodoformi, 234
phenolis, 274
picis liquidæ, 396
plumbi acetatis, 170
iodidi, 171
potassii iodidi, 230
resinæ, 417
stramonii, 88
sulphuris, 337
veratrinæ, 148
zinci oxidi, 176
Unna's dressing, 178
Uritone, 371
Urotropin (hexamethylenamine), 371
Uva ursi, 374

Uvæ ursi folia, 374

V

Valerate of ammonium, 23
of iron, 23
of quinine, 23
of zinc, 23
Valerian, 21
Valeriana, 21
Valerianæ rhizoma, 21
Valerianic acid, 22
Vapor chlori, 458
conii, 116
Vaporizer, steam, 530
Vaseline, 431
Vegetable cathartic pills, 355
Venesection, 544
Veratri viridis rhizoma, 145
Veratrina, 147
Veratrine ointment, 148
Veratrum, 145
Veronal, 472
Vienna paste, 421, 440
Vinegar of ipecac, 330
of opium, 60
of sanguinaria, 398
of squill, 362
Vinegars, 4
Vinum album, 121
antimoniale, 144
antimonii, 144
colchici, 241
seminis, 241
ergotæ, 409
amarum, 195
ipecacuanhæ, 329
opii, 60
picis, 396
portense, 122
rubrum, 121
xericum, 122
Volatile oil of mustard, 415

W

Warming plaster, 415
Wash, black, 219
yellow, 223
Washed sulphur, 337
Water of ammonia, 118, 416
stronger, 118
barley-, 557
of chloroform, 50
oatmeal-, 557
Water, rice-, 557
Watered toast, 559
Waters, 4
Wet cups, 509
pack, 519
Whey, wine-, 557
Whisky, 121
White ginger, 320
lead, 172
mustard, 415
oak, 163
petrolatum, 431
precipitate, 214
ointment, 214
wine, 121
Wild cherry, 314
Wine, 121
of antimony, 144
of citrate of iron, 195
of colchicum, 241
of colchicum-seed, 241
of ergot, 409
of ipecac, 329
of iron, 195
bitter, 195
mulled, 559
of opium, 60
port, 122
red, 121
of tar, 396
whey, 557
white, 121
Wintergreen, 295
Witch-hazel, 486
Wormseed, American, 443
Levant, 444

X

Xeroform, 469

Y

Yellow gentian, 311
jasmine, 113
mercurous iodide, 222
mercuric oxide, 221
Yellow sulphate of mercury, 223
wash, 223
Yeo's creosote inhaler, 276
Young's rule for dosage, 6

Z

Zinci acetas, 180
Zinci carbonas, 179

Zinci præcipitatus, 179
chloridum, 421
oxidum, 176
phenolsulphonas, 482
sulphas, 175
sulphocarbolas, 482
valeras, 23
Zingiber, 320

顫癱 PARALYSIS AGITANS　哥拉　七二　印度麻　七九
金雀花　一三九
癰 CARBUNCLE　硫　一九九　烿醇　二七三
齈患（傷風）CORYZA　草烏頭　一五〇　銨鈇菓礬　一四三
樟腦　二六　腎上棚　二四七　安替派林　三〇二
鈇砒弱礬消水　二〇四　氯　二二六　甘油　四二九
鴉片　五八　薄荷冰　二八三　鈇氯塩　二三〇
土國浴法　五一八
附錄　初顯時、勤服草烏頭之小分劑、有效、且宜浸足於熱芥水內、並服熱檸檬水、夜晚服鴉片表散、有效、服鈇氯塩、或能抵禦、常患之者、如服砒藥數月、乃能豫防、吸薄荷冰之氣、或鼽氯酒之氣俱效。
齈久患（延纏傷風）CORYZA, CHRONIC　蒜　三九四
鈇砒弱礬消水　二〇四

錄氯弱塩抹膏　二一九
黃氯　二三三
錄黑洗藥　二一六
鉛醋下礬消水　一七一
鐵氯糖漿　一九一
埃多　二三五
輭　皺　四三一
唎瑣辛　二八六
鉦碳强礬澱　一七九
鉦　秀　一七八

附錄　初患時、以鉦秀散或抹膏、敷之均可、如未敷之先、以錄黑洗藥洗之、功效尤顯、濕癩症以鉍加泐下礬散、或鉦碳强礬、敷之大效、魚石滿抹膏、係有用之品、濕癩久症柳酸抹膏乃效、乾癩久症松滿抹膏有效、如虛弱血虧之孩童患之、服鐵氯糖漿、有效、患此症者、無論乾濕新久、俱宜留意於飲食。

齦症 GUMS, DISEASES OF
兒　茶　一六二
枯白礬　一六七
氯　二二五
洋蘇冰　二八四

癪症 HYSTERIA

鎖氯塩　一〇七
樟腦氯弱塩　二八
鐵甘松礬　一九五
甘　松　二二
酵母花　三二
亥歐辛　六八
鉄氯塩　一〇七

二十二至二十七畫

癭症 BRONCHOCELE

氯　二二四
錄氯强塩抹膏　二一六
鉄氯塩　二三〇
度鮑司印　四七四

十九畫

瞽 AMBLYOPIA　馬前子酒　九八　乍波蘭的　三八七

附錄　如此患係癡症所致、宜服鎒藥類、或鎒氣塩、如目不中式、宜帶合宜之鏡、如婦女因經閉所致、宜服調經藥類、如因煙酒所致、以馬前子酒日增其分劑服之、有效、但宜禁止酒煙。

二十畫

癤流血 HEMORRHAGE, CAPILLARY　衣必格　三一八

鈉硫强磬　三五二

二十一畫

癌 BONE DISEASE　氯　二一四

癌症 CHOLERA　樟腦　二五　硫强酸　一九六

撒婁　二九七　皮下灌塩水法五二二

附錄　未顯險兆時、如以香硫强酸、與樟腦兼服、大效、撒婁乃爲服藥之上品、以樟腦七十五厘、加紅葡酒服之、能解轉筋、以熱塩消水射於肛內、有效、灌於皮下尤妙、以炭匿酸製成消水、射於肛內、有效。

癩症 ECZEMA　烳醇　二七二　柳酸　二九二

洋斑蝥　四一四　魚石澁　二四四　鋅鎒氯塩　二一四

物瀉出、且能令腸生鹼液、如係盟瀉、鉍藥與烨醇大效、樟腦、哥羅芳、香硫强礬等藥、俱效、如係泗瀉、必先用萆麻油、後用鉍藥類、多有時服萆麻油後、不必用他藥、如係釀瀉、先服萆麻油、後服烨醇、柳酸、洋蘇冰、衲他連、木炭、怪阿寇碳强洽等藥、有效、如係暑瀉、初瀉時、宜服大黃香糖漿、以衣必格一厘之四分之一至四分之二、日服三次、有效、將莫非服或射於皮下大效、服衲他連、皇强酸等藥、有效。

槲病 (盪槲長大) GLANDS, DISEASED　烨醇　二七三

魚石湍　二四四　氯　二二四　黃氯　二三三

魚肝油　二三八　鉄氯塩　二三〇　鉄抹膏　二二〇

外惹內效之法　五〇七

癩症 GOUT　柳酸　二八九　安替派林　三〇二

撒卡林　四三一　哥枝禁　二三九　龍膽草　三一二

怪阿克　二四三　鉄氯塩　二二九

癗 LICHEN　烨醇　二七二　洋斑蝥　四一四

砒　二〇三

蟯虫 WORMS, THREAD　柳酸　二九一　瓜沙　三一一

附錄　宜先將肛內、用溫水洗淨、後以瓜沙或柳酸之消水、射於肛內、有效。

火棉酒　四三二
硫　一九九

轉筋 CRAMPS
顛茄　八四

瀉腹 DIARRHŒA
煉鎉碳强礬　四四一
硫强礬　一九六
砒　二〇四
烑醇　二七二
炭匿酸　一五九
灘鎉碳强礬　四三七
鉍　一七三
顛茄　八四
衲透　四六二
加林啤根　三一三
樟腦　二五
木炭　四五四
哥羅芳　五〇
高銅硫强礬　一八一
兒茶　一六一
洋桂　三一六
風呂草　一六四
怪阿寇碳强洽　二八〇
麥奴　四〇九
赤蘇木　一六三
銶白土　二二〇
銶氯强塩　二一五
佳奴　一六二
肉蔻　三一八
衲他連　四六二
白柴油　三二五
鴉片　五九
胚梅　四五二
丁香油　三一八
萆麻油　三四〇
撒婁　二九七
鉛醋礬　一六九
鋏氯强礬　三六七
鈉硫强礬　三五二
薑　三二〇
鉦蓼　一七六
鉦硫强礬　一七六

附錄　宜留意於病者之飲食、如於腹上用芥末貼膏、有效、當初瀉時、以萆麻油、鴉片酒、鈉氯碳强礬兼服、能將腸內釀壞之

銨鈸菓鬱　一四三
銀氰强鬱　一八二
鋰氫塩　一〇八
哥拉　七二
鎦氰塩　一〇八
樟腦氫弱塩　二八
鈸氫塩　一〇三
鈸氰弱鬱　一一一
鈉硼烘鬱　四六四
錯氫塩　一〇七
甘油氰弱鬱　一一一

附錄　宜愼飲食、如飲食過度、或食難化之物、症必易犯、服鈸氫塩、日增分劑、最妙、服鈉氫塩、較鈸氫塩少有惹胃之力、服樟腦氫弱塩、或氫氫酸亦效、惟氫氫酸惹力較大、而易阻胃經、如係癆瘵所致、服錄類藥、或鈸氫塩有效、如係蟯虫所致、以瓜沙消水、射於肛內有效、有時甘油氰弱鬱、醫小瘡有效、如孩童患此症、以涉拉蓉流膏十五量滴、日服三次、後則漸增其分劑、有效。

十八畫

瞼炎 BLEPHARITIS　四六三
幾阿林　四六三
煤藍色　四六七
瞼邊瘡 STYES
瘡 BOILS
黃錄强鬱抹膏　二二二
排醇　二七三
銀氰强鬱　一八四
錯氫塩　一三八
錯硫粉　三三九
樟腦　二六

嬰吐瀉症 CHOLERA, INFANTUM

附錄　以萆麻油與樟腦鴉片酒兼服、能瀉腸內不正之液、且有平育道之功、亦宜用洗腸之法、所必須留意者、乃其飲食、如有肛急之患、以黃氣與洋橄欖油相合、或以鴉片酒十量滴、加橡水一量兩、射於肛內俱效、如以香糊藥敷於腹上乃宜、倘嘔吐不止、服砒藥類之微分劑、或伯蘭地數滴有效。

瞭疱炎 KEROTITIS, PHLYCTENULAR　幾阿林　四六三

錄氯弱塩　二一八

膽石疳 (肝石疳) COLIC, HEPATIC　鴉片　五六　哥羅芳　五〇

瘴 ABSCESS　烳醇　二七三　氫氯强洽消水　四六〇

附錄　瘴初起時、如服草烏頭、或綠藜蘆之足分劑、或服錫硫粉、或敷顛茄抹膏、或敷氯酒、或貼以蘸鉛醋礬消水之饅首、或以烳醇五至十量滴射於患處、均有抵之之能、倘不能抵、宜敷糊藥、使速生膿、及已生膿、宜以刀割開、敷滅穢之藥、如係瘰癧、宜服魚肝油與硫下礬類及鐵與貴林等藥。

瘡 CHANCROID　柳酸　二九三　阿司炭尼利　三〇六

鉍安息礬　一七四

癇症 EPILEPSY　阿大那典　一三九　阿司炭尼利　三〇五

錏氣塩　一〇七　安替派林　三〇二　烓氰弱礬　一一〇

燙傷 BURNS AND SCALDS　烿醇　二七二　硼强酸　四六五
柳酸　二九三　匹克酸　二六六　洋斑蝥　四一四
澱鎉碳强礬　四三八　哥利吞　六八　魚石湍　二四四
灰擦藥　四四一　膠透　四五九　鴉片　五八
鉦秀　一七六　鉛碳强礬　一七〇　玫瑰水抹膏　一六四

附錄　最妙者、乃灰勻藥、如以二十分加烿醇一分、其效尤妙、如甚作疼痛、以莫非一厘之四分之一、阿刀便一厘之百五十分之一相合、射於皮下、或以鈉氫碳强礬消水敷之、俱有止痛之效、匹克酸爲敷藥之上品。

十七畫

膿皰痤 ACNE PUSTULOSA　鎉硫粉　三三九
膿菌毒症 SEPTICÆMIA　皮下灌塩水法　五二三
嬰骨軟 RICKETS　魚肝油　二三八　鎉硫下礬糖漿　四三九
硫　一九九　鈉硫强礬　三五二　澱鎉硫强礬　四三九
嬰睟膿炎 OPHTHALMIA NEONATORUM　蘇作多　二三七

附錄　初生嬰孩、以銀脭礬一分、加水四百分之消水、敷於目內、可免此患、如已有此患、敷之亦能醫治。

附錄　最要者、不可居於室內、宜於清雅之處、設立帳房居之、飲食宜多、更宜用有力之食物。

頭痛 HEADACHE　芬阿錫吞　三〇八　阿司炭尼利　三〇五
顛茄　八五　布哥拉　七五　加非印　一三六
印度麻　七九　樟腦　二五　辣椒　三二四
洋升麻　三三　薄荷冰　二八三　氯　二二六
萆麻油　三四〇　鋏氯塩　一〇四　外惹內效之法　五〇八
黑白芥　四一五

附錄　如係目衣受惹所致、印度麻、黃茉莉、士的年、芬阿錫吞等藥、有效、如係腦部受惹所致、以加非印鈉氯塩安替派林兼服、有效、如兼嘔吐、寇拉、士的年、馬前子、鈉氫碳强礬、鎂碳强礬、鎂檸礬消水等藥、有效。

頭癬 TINEA CAPITIS　灰消水　四四〇　錏銶氯塩　二一四
糖尿症 DIABETES MELLITUS　加泐酸　一六〇　安替派林　三〇二
砒　二〇三　甘油　四二九　寇苐印　六六
撒卡林　四三一　埃多　二三五　灰消水　四四〇
鴉片　五八　鋰碳强礬　三六九　胚梅　四五二
皮下灌塩水法　五二三

附錄　如兼大便乾結、未服貴林之先、五六句鐘、宜每刻鐘服錄氯弱鹽一厘之六分之一至四分之一、至二厘爲止、或服獨脚蓮柄一厘十分之一至八分之一、亦可、如餐後立即發冷、宜服鉦硫强礬、或衣必格爲吐藥、貴林不但能醫此症、且能豫防、砒藥類有補血之能、故患此症後宜服之。

瘴血虧症 MALARIAL ANÆMIA　砒　一一〇二

芬阿錫吞　三〇八

骱間系痛 NEURALGIA, INTERCOSTAL　氯　一一一五

骱肌痛 (胸痛) PLEURODYNIA　氯　一一二五

癉症 JAUNDICE　金印草　四一〇　乍波蘭的　三八七

撒婁　二九七　鈉硫强礬　三五二

附錄　如此症係傷風所致、每句鐘、宜服錄氯弱鹽一厘六分之一、至三次爲度、有醫者謂服黃氯可見大效。

癆症 (癆) TUBERCULOSIS　砒　二〇四　烳醇　二七三

甘油　四三〇　幾阿蘇　二七八　幾阿蘇碳强洽二七九

錯乳硫强礬糖漿四三九　氯　二二四　丁香油　三一八

洋桂油　三一七　怪阿寇碳强洽二八〇　氯　四六一

吸氣練法　五二三　錯硫下礬　四三九　魚肝油　二三七

十六畫

積血 CONGESTION
洋苦瓜汁 三五九
積液 EFFUSIONS
海葱 二六一
遺精 EMISSIONS
亥歐辛 六八
附錄 臨寢時服鉄氯鹽、或鈉氯鹽二十至四十厘有效、服哥拉二十厘、或亥歐辛一厘之百分之一、或樟腦氯弱鹽五厘、亦可、如病者虛弱、兼服士的年砒藥類之足分劑、乃宜、如於臨寢用熱水沐浴、有效、有時以布蘸冷水、搓其陽裏與會陰有效。
遺尿 INCONTINENCE OF URINE
鬧羊花 六七
爐氣弱浮酒 二九
瘴症 MALARIAL FEVER
安替派林 三〇二
乍波蘭的 三八六
毛地黃 一三〇
洋斑蝥 四一四
鎂硫强鬱 三五〇
鐳鈉氯鹽 二二三
鉄氯鹽 一〇四
顛茄 八五
鉄氯鹽 一〇四
香葛 一六五
貴林 二五八
郁加列油 二六五
火吸罐法 五〇九
洋苦瓜汁 三五九
樟腦氯弱鹽 二八
冷法 四九四
洋斑蝥 四一四
鉄檸鬱 三六四
山道年 四四四
砒 二〇二
電引藥法 五二四

時用熱法、或火吸罐法、有效、醫痹症之藥、或能醫此症、多有醫者、因用他法無效、即用扯系法醫之。

蝎蜂螫傷 STINGS AND BITES　錏沎消水　一一八　氫氯强洽消水　四六〇
衣必格　三二九　醇酒　一二〇
附錄　如以銢氯强塩一分、置於輭火棉酒千分內、敷於螫處、有效、以緋醇一分、加水五十至百分之消水、敷之亦效。
髮錢癬 TINEA TONSURANS　氯　二二五　鈉硼烘礬　四六五
白柴油　三二五
髮內乾腥過盛 SEBORRHŒA CAPITIS　唎瑣辛　二八七
瘡(瘍) ULCERS, SORES　加泐酸　一六〇　炭匿酸　一五九
鎉弱劵　四四〇　澱鎉碳强礬　四三八　鉍安息礬　一七四
氫氯强洽消水　四六〇　哥念　一一六　猶柔分　二三六
高銅硫强礬　一八一　鋏錳上礬　四五九　鉦劵　一七八
醋酸　一五六　枯白礬　一六七　樟腦　二六
木炭　四五三
憂鬱 MELANCHOLIA　硫　一九九　枯牌棚　二四五

附錄　宜以氯酒敷患處、如其生膿、宜立割放。

盡棚癧炎 SCROFULOSIS	鎉氯塩	四三八	鎉硫下礬 四三九
氯	二二四	高銅硫强礬 一八一	鐵氯糖漿 一九一
猶柔分	二三六		

附錄　服魚肝油最妙、敷魚石澁抹膏、大效、宜食有力之食物、並宜運動身體。

膚疽 CANCER, CUTANEOUS	鉄沘	四二一	高銶氰强礬消水 二二一
砒	二〇五		
瘢瘤 KELOID	魚石澁	二四四	賽歐司民 二五〇
聤患 OTORRHŒA	幾阿林	四六三	鉍加泐下礬 一七五
瘙癍 PRURIGO	洋斑蝥	四一四	
慾迷 SATYRIASIS	鉄氯塩	一〇四	
骶大系痛 SCIATICA	柳酸	二八九	阿司炭尼利 三〇五
硫	三三八	鴉片 五七	魚肝油 二三八
鉄氯塩	二二九	針刺法 四八七	

附錄　最要者、乃安臥不動、有時以哥羅芳、或莫非、射於腿後骶系延行處、有效、有時以伊打、或銳哥凌噴於痛處、有效、亦有

錄氯弱塩　二一八　甘油氰弱礬　一一一　鴉片　五八

丁香油　三一八　獨脚蓮　三五七

槍藥轟砂入皮 POWDER STAINS,　氫氨强洽　四六〇

瘟熱症 TYPHUS FEVER　酒　一二〇

對磨癜 INTERTRIGO　樟腦　二六　鉦蓼　一七六

鎂碳强礬　三三七　鉦碳强礬澱　一七九　鎗碳强礬澱　四三七

瘊患 WARTS　鋏砒弱礬消水　二〇五　高錄氰强礬消水　二三一

瘈瘲（抽搐）CONVULSIONS　蒜　三九四　烓氰弱礬　一一〇

哥拉　七二　鋏氯塩　一〇四　枯牌棚　二四五

藜蘆　一四六

附錄　如因中士的年毒而致、甫發時、吸哥羅芳、或能抵之、忌用伊打、因其惹力過大、效過甚緩故也、如此患因他故而致、兼大便乾燥、以巴豆油一量滴、洋橄欖油一至二量滴、相合、置於舌上、有速見大便之效、用引注血法、亦效、如婦人分娩時、值有此患、必速用法使嬰孩出胎、方可、

十五畫

盡棚炎 BUBO　烑醇　二七三

附錄　甫患時、宜服草烏頭酒、以銀氰強蓉消水、敷於陽竅、或能抵之、以氯酒敷於陽竅、亦效、若將鎂硫強蓉消水、或怪阿寇抹膏、敷之有止痛之功、倘若腫甚、以刀刺破陽竅、使液流出、有止痛之功、宜令病者躺臥、但必墊高其盆骨、方爲有益。

鼻朝 EPISTAXIS　四〇八

麥奴　四〇八

高鐵硫強蓉消水　一九一

附錄　服草烏頭、或藜蘆、或效、如以熱水浸足、用冰塊冰鼻、有效、以糝（即麪粉）與白蓉末各半、或以炭匿酸末、吸於鼻內、有效、有醫者云、用衣必格至入惡心有效、倘用以上諸法、均不見效、將鼻孔前後用棉塞住、能止血流。

醋酸　一五六

腎上棚　二四六

哥大林印　四一二

鼻臭 OZÆNA　四一一

鼻泗炎 RHINITIS

金印草　四一一

魚石澔　二四四

幾阿林　四六三

嘔吐之頭痛 SICK HEADACHE

鈉氫碳強蓉　四三五

嘔吐（惡心）VOMITING

酒　一二〇

哥利吞　六八

鎂檸蓉　三五二

醋酸　一五六

蒜　三九四

衣必格　三一七

阿司炭尼利　三〇六

以利準油　三七六

鋅鉢氯塩　二一四

鈸錳上蓉　四五九

鎂碳強蓉　三三七

氫鹽酸　一五三

鉍　一七三

灰消水　四四〇

鉠氣塩　二二九　針刺法　四八七　熱法　五一五

哥羅芳擦藥　五〇

附錄　服阿司炭尼利二至四厘、有效、以芬阿錫吞與撒婁各五厘、兼服、有效、如於寢前用熱水浸足、後服鴉片表散、每效、以熱糊藥糊背、亦效、如用熱法、不見功效、以冰袋覆腰、或以伊打置於噴霧具內噴之、或效。

路浦司症 LUPUS　猶柔分　二三六　魚石湍　二四四

氣　二二五　高錄弱强礬消水　二二一

痵症（腦部受激）NERVOUSNESS　樟腦　二五　酵母花　三二一

麝香　二一　甘松　二二　鉠氣塩　一〇三

熆氰弱浮酒　三一

腭垂鬆輭 UVULA, RELAXED　辣椒　三二四　氣　二二六

十四畫

厭食 ANOREXIA　龍膽草　三一二　錄氣弱塩　二一八

瓜沙　三一一

精腺冠炎（陽腺炎）EPIDIDYMITIS　怪阿寇　二八〇

銀氰强礬　一八三　蛭吸血法　五三六　外惹內效之法　五〇七

腺炎 ADENITIS

附錄　宜服補藥類、如係孩童、宜服鐵氯糖漿、患處宜用敷藥、以魚石澁抹膏、或氯抹膏、或氯酒、每早晚敷之、顯紅則止、如顯生膿之狀、宜用糊藥、及已生膿、可以刀放之、勿待自破。

腽腺炎 ACNE　硫　一九九　魚石澁　二四四

硫　三三八

附錄　病者如兼瘰症、宜服魚肝油、以砒藥類之中分劑、服一二月亦可、割皰之後、宜敷烊醇、如皰之四圍顯硬、宜以唎瑣辛十至二十厘、加脂一兩敷之、如兼大便乾結、宜先服鎂硫强礬、後服洋鼠李。

睛簾炎 IRITIS　顛茄（阿刀便）八五　外惹內效之法五〇六

滑膜炎 SYNOVITIS　烊醇　二七三　外惹內效之法五〇六

氯　二二五

暑瀉症 DIARRHŒA, SUMMER　衲他連　四六二　獨脚蓮　三五七

大黃　三四三

痲瘋 LEPRA　砒　二〇二

腰痺 LUMBAGO　柳酸　二八九　樟腦氯弱塩　二八

辣椒　三二四　魚肝油　二三八　松節油　三七八

撒婁　二九六
鈉氫碳强鬱　四三五
痺久症 RHEUMATISM, CHRONIC
氯　二二五
樟腦擦藥　二六
鉄氯塩　二二九
腹統膜炎 PERITONITIS, ACUTE
附錄　有時敷韋拉抵印抹膏大效、用乾熱法、或俄土二國浴法、亦有大效。
鎂硫强鬱　三五〇
放盂血法　五四五
腹統膜久炎 PERITONITIS, CHRONIC
暈倒 FAINTING　酒　一二〇
暈船 SEA-SICKNESS　炭氧弱鬱　一一〇
鉄氯塩　一〇五
鉄醋鬱　三六五
柳精　二九六
砒　二〇四
洋升麻　三三
硫　三三八
鴉片　五八
外惹內效之法五〇六
寇拉　四七九
鉄氯塩　二二九
銻柳鬱　三七二
安替派林　三〇二
哥枝禁　二三九
魚肝油　二三八
錄氯弱塩　二一三
藜蘆　一四六
外惹內效之法五〇六
鋅沘香酒　一一七
哥拉阿米　七五

火棉酒　四三三　黑白芥　四一五　乾熱氣　五二一
樟腦擦藥　二六
節痺 JOINTS, RHEUMATIC　柳酸　二九一　辣椒　三一四
琥珀油　四一九　韋拉抵抹膏　一四八
嗓瘰 LARYNGEAL PHTHISIS　黃氣　二三三　埃多　二三五
嗓抽 (哮吼) LARYNGISMUS STRIDULUS　草烏頭　一五〇
炔氰弱鬱　一一〇　顛茄　八五　黃茉莉　一一四
熱法　五一六
嗓新炎 LARYNGITIS, ACUTE　鉄氣塩　一〇四　安息香雜酒　二九九
附錄　初覺時、宜服鉄氣弱塩之小分劑數次、後服鉄硫强鬱一劑、且宜浸足於熱水內、並飲潤藥類、宜服草烏頭、以退其熱、服鉄氣塩之足分劑、有效。
痺新熱症 RHEUMATISM, ACUTE ARTICULAR　芬阿錫吞　三〇八
阿司炭尼利　三〇五　柳酸　二八九　安息香酸　二九九
鉑氣塩　一〇七　阿匹林　二九八　辣椒　三一四
怪阿克　二四二　魚石澒　二四四　冬綠油　二九六

睟疱炎 PHLYCTENULAR OPHTHALMIA　幾阿林　四六三

錄氯弱塩　二一八

楊梅濕瘊 (瘡濕瘊) CONDYLOMATA　錄氯弱塩　二一八

楊梅遺毒瞭炎 (瘡遺毒瞭炎) KERATITIS, INTERSTITIAL　阿色透　二三六

代漚尼　四〇三

附錄　服醫瘡症之藥、方爲合宜、如睛簾顯發炎之狀、宜以阿刀便敷於目內。

楊梅 (瘡) SYPHILIS　猶柔分　二三六　錄氯强塩　二一五

錄柳礬　二二二　錄白土　二二〇　錄氯弱塩　二二二

錄氯弱塩　二一七　黃氣　二三四　埃多　二三五

魚肝油　二三八　錄抹膏　二二〇　鋏氯塩　二三〇

電引藥法　五三四　阿托益　二一〇

附錄　近有德國醫士、特爲此症、新製一類砒藥、(即俗稱六百零六之藥)射於皮下、多有醫者用之、謂有神效、但只射一次而已、有時射後仍宜用錄類或氯類藥、方能痊癒、未用之先必須酌病者宜用否、因有目力虛弱者、一用此類砒藥、竟致其目大受損傷。

節腫 JOINTS, ENLARGED　松節油擦藥　三八〇　銨鋏菓抹膏　一四三

節炎 JOINTS, INFLAMED　柳酸　二九一　醇酒　一二〇

附錄　宜以硼强酸十厘、如水一量兩洗之、如顯成久炎之勢、可以白礬晶敷於瞼眸、或以甘油炭匿酸、或鉦硫强礬消水敷之均可、如有膿液、可以銀氰强礬二至五厘、水一量兩、製成消水洗之、用後必以鈉氯塩消水洗之方可、如其畏光、宜帶墨鏡。

眸久炎　CONJUNCTIVITIS, CHRONIC　高銅硫强礬　一八一

附錄　以鉦醋礬一至二厘、或鉦硫强礬一至三厘、加水一量兩、洗之、以炭匿酸十厘、與甘油一量兩、合而敷之、均效、如曲光部有恙、宜帶合宜之鏡。

眸瘢炎　CONJUNCTIVITIS, GRANULAR　銀氰强礬　一八四

黃錄强秀抹膏　二三二　腎上栟　二四七

附錄　初顯時、宜以阿刀便四厘水一量兩之消水、滴於目內、後以硼强酸十厘、加水一量兩、洗之、如有膿液、可將錄氯强塩一分水八千分之消水洗之、或以銀氰强礬、或銀腥礬、製成消水、洗之亦可、如用銀氰强礬消水、用後必以鈉氯塩消水洗之乃宜、如用具壓滅眸上之瘢常效、若係久症、銅硫强礬晶、或甘油炭匿酸、俱可用爲敷藥、

眸膿炎　CONJUNCTIVITIS, PURULENT　蘇作多　二三七

銀腥礬　一八五

附錄　宜將淡銀丹敷於眸上、或以銀氰强礬十厘、加水一量兩、製成消水、先將膿洗出、後敷於瞼眸、再以鈉氯塩消水洗之以解藥力、有醫者於初生之嬰孩、以銀氰强礬二厘、加水一量兩、製成消水、滴數滴於目內、以防此患。

眸癧炎　CONJUNCTIVITIS, STRUMOUS　魚肝油　二三八

錄氯弱塩　二一八

硫　一九九　薄荷冰　二八三　魚肝油　二三八
鋏氣塩　一〇四　撒婁　二九六　鋏氣塩　二二九
撒婁分　二九八　貴林　二五九　黑白芥　四一五
冷法　四九三　外惹內效之法　五〇八　電引藥法　五三四

附錄　以鋏氣塩與加非印兼服、常有大效、故宜先用、切勿常用莫非、因其令人成癮也。

腦力猝衰 SHOCK　酒　一二〇　顛茄　八五
毛地黃　一三〇　腎上棚　二四七　馬前子　九九
皮下灌塩水法　五二三

附錄　有此患者、熱度常係過減、故宜用煖身之法煖之。

腦中尿毒 URÆMIA　洋苦瓜汁　三五八　乍波蘭的　三八七
皮下灌塩水法　五二三

附錄　鋏氣塩有免瘈瘲之力、加非印有激腎經之功、如血壓過大、服甘油氰弱礬、能增小便、如心顯停止之狀、以士的年與毛地黃兼服、能激心經、倘病甚危險、用放盂血法有效。

睟炎 CONJUNCTIVITIS, SIMPLE　寇卡印　九〇　腎上棚　二四七
鉦礬　一七六　鉦醋强礬　一八〇　鉦硫强礬　一七六
錄氯弱塩　二一八　蛭吸血法　五三六

顛茄　八五
怪阿窓碳强洽　六〇
洋蘇冰　二八四
腦力脫失 COLLAPSE
伊打雜浮酒　三一
腦房疝 (腦房痕) HYDROCEPHALUS
腦衣炎 MENINGITIS, ACUTE
冰袋　四九四
腦衣久炎 MENINGITIS, CHRONIC
腦系痛 NEURALGIA
草烏頭　一五〇
布哥拉　七五
哥利吞　六九
洋升麻　三三
烏羅透品　三七一
砒　一九九
冷水沐浴　五〇一
顛茄　八五
鴉片　五八
蛭吸血法　五三六
柳酸　二八九
顛茄　八四
樟腦　二五
哥拉阿米　七四
怪阿窓　二八〇
錄氣弱塩　二一八
松節油　三七八
冷水揸身　五〇一
毛地黃　一三〇
鉄氣塩　二一九
錄氣弱塩　二一三
放盂血法　五四五
砒　一九九
阿司炭尼利　三〇五
安替派林　三〇二
印度麻　七九
氣　二一五
厄司阿金　三〇九

銀氰强礬　一八二　松湍　三九五　金印草　四一〇

附錄　孩童患此症、而不速見瘉者、錏氯塩爲合宜之品。

腸失功用 INTESTINAL ATONY　豆蔻　三一九　加林啤根　三一三

獨脚蓮　三五七　錏氯塩　三九二

腸泗炎 INTESTINAL CATARRH　錏氯塩　三九二　鎂硫强礬　三五〇

鋏氯强礬　三六七

附錄　如服錏氯塩無效、試服鈲氯塩、或效、用撒婁亦效。

腸瘍 INTESTINAL ULCERATION　銀氰强礬　一八二　松節油　三七八

腸流血 (便血) INTESTINAL HEMORRAGE　松節油　三七八

附錄　服鎘氯塩、有效、如肛胴流血、以腎上橢精氯塩一分、加水千分、製成消水、每量錢、加塩消水半量磅、射於肛內、或以白礬八十厘、或高銅硫强礬四十厘、或高鐵硫强礬消水四量錢、或此礬八十厘、或鈲氯强礬八十厘、俱加水八量兩、製成消水、射之、或以炭匿酸少許、製成消水射之俱效、如小腸流血、以鉛醋礬、或樟腦、製丸服之、或服香硫强礬、俱可、如流血不甚、以松節油、置於藥壳內、服之爲宜。

腸自褪 INTUSSUSCEPTION　洗腸之法　五一四

腸收窄 STRICTURE OF BOWEL　硫　三三八

腸熱症 TYPHOID FEVER　酒　一二〇　阿魏　一二四

腎上腺　二四六
松節油　三七八
哥大林印　四一二
麥奴　四〇八
鉄氯塩　一〇五
卵腺膏　二五〇
沙芬　四〇五
香葛　一六五
附錄　每日服哈瑪米利消水一量錢、有效、如係瘀內積血所致、在腰際用火吸罐法、有效、如瘀微流血不止、服以利準油三至五量滴、最爲妙劑。

經暫閉（受風經閉）MENSTRUATION, SUPPRESSION OF　一五〇
土國浴法　五一八
草烏頭　一五〇

腸首段泗炎 CATARRH, DUODENAL
腸胃氣脹 FLATULENCE
阿魏　二三
撒婁　二九七
辣椒　三二三
松節油　三七八
哥羅芳　四九
鉄錳上磬　四五九
胡椒　三二二
鉄氯弱塩　二一八

腸胃炎 GASTRO-ENTERITIS
附錄　如胃好惹物、宜用吐劑、並服蓖麻油、或鎂硫强蘗之瀉藥、由腸內瀉出不正之物、以莫非射於皮下、止其疼痛、腹上宜糊芥末糊藥、飲食宜用化腥梅之牛乳牛肉湯等。

腸胃泗炎 GASTRO-INTESTINAI CATARRH
鉄鉄菓磬　一四三

經閉 AMENORRHŒA　薑　三二〇　阿羅　三四六

芫荽油　四〇六　甘鐵碳强礬　一八九　洋斑蝥　四一三

洋升麻　三三　鉄錳上礬　四五九　沙芬　四〇五

高錳弱秦澱　一九六

附錄　如兼大便乾結、阿羅之效、較大於鎂硫强礬、如因虛弱之故、洋斑蝥有效、如以鉄錳上礬、於行經前半月、日服三次有效、高錳弱秦尤妙、如將芫荽油三至十量滴、置於藥壳內、於行經前七日、日服三次乃宜、如因傷風之故、蘭草煮藥有效、於行經前數日、用熱水沐浴有效、如加芥末於水內、其效尤大。

經痛 DYSMENORRHŒA　顛茄　八五　烓氰弱礬　一一〇

樟腦　二五　鴉片　五六　印度麻　八〇

黃茉莉　一一四　鉄氮塩　一〇五　熱水坐浴　五一六

附錄　如兼系痛、服安替派林、或阿司炭尼利、有效、如痯覺痙痛、服黃茉莉、或顛茄、或鴉片等藥、並將顛茄製成陰彈、塞至痯頸、有效、以印度麻與黃茉莉兼服、有效、如兼悸症、以樟腦與阿司炭尼利兼服、有效、服鉄氮塩亦效、如兼大便乾結、服鎂硫强礬、或阿羅乃宜、如兼血虧、服鐵藥與士的年、補之乃宜、患經痛者、如用熱水坐浴、用後覆松節油熱袱、並服鴉片表散、有效。

經絕 MENOPAUSE　樟腦　二六　印度麻　七九

卵腺膏　二五〇

經旺與痢 MENORRHAGIA AND METRORRHAGIA　印度麻　八〇

痘症 SMALLPOX　烯醇　二七三　安替派林　三〇一
鴉片　五八　火棉酒　四三二　銀氰强礬　一八三
痺症 SPRUE　山道年　四四五
啼嗽 WHOOPING-COUGH　安替派林　三〇二　烓氰弱礬　一一〇
顛茄　八五　銀氰强礬　一八四　鏽鈉氯塩　二二三
樟腦氯弱塩　二八　哥拉　七二　幾阿蘇　二七八
黃茉莉　一一四　鬧羊花　六七　貴林　二五九
鉦羹　一七六　唎瑣辛　二八五　吸氣練法　五二七
蛔虫 WORMS, LUMBRICOIDES　柳酸　二九一　阿西大　四四三
藜藿　四四四　卡瑪拉　四四九　山道年　四四四
士拜枝喇　四四三
痙症 (抽搐) SPASMS　顛茄　八四　加拉巴豆　一〇一
鋏氯塩　一〇四　烓氰弱礬　一一〇

十三畫

錄氯弱塩　二一七　衣必格　三二八　貴林　二六〇

鉛醋礬　一七〇　鎂硫强礬　三五〇　洗腸之法　五一三

冷水射肛　四九四

附錄　以鴉片、鎂硫强礬、香硫强礬兼用、乃爲妙劑、衣必格之效、亦不稍遜、如係阿米巴所致、貴林消水最宜。

痛症 ERYSIPELAS　硼强酸　四五六　銀氰强礬　一八三

氯　二二五　魚石澁　二四四　乍波蘭的　三八八

敵鍊稑盟　二五五　鐵氯强塩酒　一八九　鎂硫强礬　三五〇

附錄　鐵氯酒爲最妙之服藥、每句鐘宜服十量滴、以魚石澁與蠟抹膏等分、製成抹膏、敷之有效、但未敷之先、必將患處洗淨、復以錄氯强塩消水洗之方可、如將鎂硫强礬、製成濃消水、敷之亦效、若將敵鍊稑盟射於皮下、亦效、

發暈 GIDDINESS　魚肝油　二三八　麥奴　四〇九

喑啞 HOARSENESS　氯　二二六

痒症 (瘥) INFLUENZA　芬阿錫吞　三〇九　樟腦氯弱塩　二八

柳精　二九六

附錄　初顯時、以草烏頭酒、熗氰弱礬雜酒、鈲檸礬、兼用有效、若安替派林、芬阿錫吞、阿司炭尼利等藥、只可用其小分劑、止痛而已、如咳嗽甚重、可用鈲氮藥類、或莫非、或寇苐印等、勤服印度麻、以止其咳、有效、如有腦力脫失之勢、士的年較毛地黃尤妙。

哈瑪米利　四八六戊
鉄氣强鬱　三六六
喉門微棚炎 TONSILLITIS, FOLLICULAR　二七九
怪阿寇
瘁症 ASTHMA　八四
顛茄　一一一
甘油氰弱鬱　三七七
檀香油　二二九
鉄氯塩
附錄　初顯時服草烏頭有效、如因泗膜有恙所致、服砒藥類數月最妙、如以紙蘸砒消水、乾時燃而吸之亦可、未寢之先半句鐘、服鈉氯塩三十厘有效、若因氣腔有恙所致、服鉄氯塩有效、倘因胃恙所致、此塩不但無益、反致有損。
跌打等傷 BRUISES　五八
鴉片
痢症（肛炎）DYSENTERY　四六三
幾阿林

氣氯强洽　四六〇
草烏頭　一五〇
膠草　三九三
黃茉莉　一一四
鉄砒弱鬱消水二〇三
鉄氰强鬱　三六五
醇酒　一二〇
哥拜巴　三八一
麥奴　四〇九

氣　二二六
鉄白鬱　一六六
炭氰弱鬱　一一〇
加非印　一三六
路卑利　一一二
鉦羹　一七六
腎上棚　二四七
鉛醋下鬱消水一七一
銀氰强鬱　一八二
錄氯强塩　二一五

喉炎 PHARYNGITIS　三六七
鉠氯强礬　四六〇
氫氦强洽　五〇八
土國浴法

蘇作多　二三七
安替派林　三〇三
撒婁　二九七

高鐵硫强礬消水　一九四
畢澄茄　四八六庚
銀氰强礬　一八三

喉門棚炎 TONSILLTIS　一五〇
草烏頭　二一六
銶氯强塩　三六七
鉠氯强礬

柳酸　二八九
鐵氯强塩酒　一八九
辣椒　三二四
阿匹林　二九八

高鐵硫强礬消水　一九四
銶氯强塩　二一五
怪阿克　二四三
耨阿匹林　二九九

附錄　初患時、宜服鎌硫强礬、後宜勤服草烏頭酒之微分劑。

喉痛嗓炎 SORE THROAT　二〇四
砒　一八一
高銅硫强礬　一六二
佳奴　二六〇
貴林

烑醇　二七二
顛茄　八五
辣椒　三二四
衣必格　三二九
陽葛　一六五

草烏頭　一五〇
鉠白礬　一六六
兒茶　一六二
撒婁　二九七
白槲樹　一六三

附錄　服鈉氯塩、每效、飲食以牛乳爲宜。

腎久抽炎 NEPHRITIS, INTERSTITIAL　銶氯强塩　二一五

甘油氰弱礬　一一一

腎總漏炎 PYELITIS　布球　三七二　洋斑蝥　四一三

哥拜巴　三八一　烏伐　三七四　沛利拉　三七三

杜松油　三七五

㿗流血 HEMORRHAGE, UTERINE　洋桂油　三一六

哈瑪米利　四八六戊　乳腺膏　二五二

㿗泗炎 UTERINE CATARRH　金印草　四一〇　蘇作多　二三七

㿗漸失縮力 UTERINE INERTIA　麥奴　四〇八

衣必格　三二八　貴林　二五九

㿗不復原 SUBINVOLUTION OF UTERUS　印度麻　八〇

洋升麻　三三　麥奴　四〇八　乳腺膏　二五二

附錄　如因㿗頸破裂之故、以氰强酸、或銀氰强礬、敷患處、有效、如㿗內存留胎膜、或㿗內發炎、以致泗膜過長、用刮匙刮其

十二畫

腎石疳 COLIC, RENAL　鴉片　五六　哥羅芳　五〇

顛茄　八四

腎新炎 NEPHRITIS, ACUTE　印度麻　八〇　乍波蘭的　三八七

胡麻子　四二七　鉄氫菓礬　三六五　鐵錏醋礬消水　一八八

附錄　如病者血壓過大、心神不安、宜服草烏頭、如不見效、可以鴉片與鈲氮塩、謹慎兼服、以毛地黃海葱兼服亦可、如患溺血、以加泐酸與麥奴兼服、有效、服鎂硫强礬半兩、或銶氯弱塩一劑、將腸中毒物瀉出、甚爲有益、用乾熱法、或土國浴法、使人生汗、可令血內之毒、多由皮膚而祛、如兼血虧、宜服鐵藥類、因其不但能治血虧、並醫溺胎、如小便短少、用火吸罐法、或蛭吸血法、吸出腰際之血、俱可、切勿用起皰藥、若炎勢已過、服杜松浮酒、或加非印、俱效、至於飲食、只以牛乳爲宜。

腎久炎 NEPHRITIS, CHRONIC　印度麻　八〇　洋斑蝥　四一三

辣椒　三二三　毛地黃　一三〇　銶氯弱塩　二二二

鐵錏醋礬消水　一八八　杜松油　三七五　松節油　三七八

鉄氯塩　二三〇　鉄氫菓礬　三六五　海葱　三六一

銶乳礬　三七一　甘油氰弱礬　一一一　鐵氯强塩酒　一八九

熱濕布裹法　五一九　土國之浴法　五一七

蛇齧毒 SNAKE POISONING　酒　一二〇　錏沎消水　一一七
鋏錳上礬　四五九
淋漓刺痛 STRANGURY　鴉片　五八
宿醉晨吐 VOMITING, MORNING OF DRUNKARDS　砒　二〇四
衣必格　三二八
痓 TETANUS　哥拉　七二　烓氰弱礬　一一〇
加拉巴豆　一〇一　鎂硫強礬　三五一　熱濕布裹法　五一九
附錄　人當受傷時、卽宜用敵痓盟、及痓狀已顯、雖用之亦無效。
產後痭 POST-PARTUM HEMORRHAGE　麥奴　四〇八
附錄　醫士宜搓病者腹壁、使㿉縮緊、並令服麥奴流膏一量錢、或以空針射純麥奴於皮下、倘血流仍不停止、宜用滅穉法、將手上之穉滅盡、順入㿉內、使㿉縮小、以止流血、以腎上㿉精氯塩消水、敷於㿉內、有效。
產後熱症 PUERPERAL FEVER　藜蘆　一四八　敵鍊穉盟　二五四
附錄　如以錄氯強塩一分水二千分之消水、射於㿉內、有效、若以硼強酸或幾阿林二分水百分之消水、射於㿉內、可免膿炎、如射後仍甚作燒、宜用刮匙刮出㿉內存留之胎膜、用皮下灌塩水法亦妙、倘㿉頸裂而生膿、宜以銀氰強礬四十至六十厘、水一量兩之消水、敷於患處、有效、如此症不速痊癒、宜多用有力之食物。

痔症 HEMORRHOIDS

阿羅　三四五　加泐酸　一六〇
黃氣　二三三　胡麻子油　四二七　白槲樹　一六三
鉠氯强礬　三六八　硫　三三八　冷水射肛　四九四
哈瑪米利　四八六戊　洋澤漆　三三五

附錄　以加泐酸二十厘、鴉片膏一厘、顛茄葉膏二厘、揸古律脂酌用、相合、製成肛彈十枚、每晚射一枚於肛內、大效、若以寇卡印十二厘、鴉片膏三十厘、黃氣一錢、輭煤油蠟一兩、相合、製成抹膏、敷於肛內、亦效、如以腎上橢精氯塩一分、加水千分、製成消水、以布蘸之、覆於患處、有效、有醫者云、以氰强酸之濃者、用玻璃箸蘸點一二處、有醫治之功。

偏頭痛 MIGRAINE

柳酸　二八九　芬阿錫吞　三〇八
烓氰弱礬　一〇九　布哥拉　七五　黃茉莉　一一四
鉠氯塩　一〇四　藍烁替連　二六八　薄荷冰　二八三

附錄　以印度麻膏一厘之四分之一至四分之二、與黃茉莉十至二十量滴兼服、每二句鐘如劑服之、有效。

盜汗 NIGHT-SWEATS

醋酸　一五六　樟腦酸　二八
顛茄　八四　鉠白礬　一六六　加泐酸　一六〇
猶袱毛　四五八　袱毛消水　四五八　乍波蘭的　三八八
硫强酸　一九六　鉦羹　一七六

祇毛顛　四六九
挨拉木　四六九
火棉酒　四三二
臭汗 BROMIDROSIS
鈉硼烘砻　四六五
十二畫
莖舉硬痛 CHORDEE
樟腦　二五
熱法　五一六
陽痿 IMPOTENCE
硫　一九九
陽腺衣痓 HYDROCELE
陽莖強直 PRIAPISM
皰（曬瘢）FRECKLES AND CHLOASMA
錳鋅上砻　四五九
醇酒　一二〇
氫氯強洽　四六〇
柳酸　二九二
祇毛消水　四五八
顛茄　八五
印度麻　八〇
印度麻　七九
洋斑蝥　四一四
氯　二二五
酵母花　三二
硼強酸　四六七
膠透　四五九
哥利吞　六八
顛茄　八四
草烏頭　一五〇
洋斑蝥　四一四
鎳鈉氯塩　二二三

酒狂 DELIRIUM TREMENS 阿甫莫非 三三一 樟腦氣弱塩 二八
哥拉 七二 甘松 二二
草泗炎 HAY FEVER 砒 二〇四 腎上棚 二四七
唎瑣辛 二八五 替耳品沎 四〇〇
附錄 近有醫者、使人遊行時、帶蔽土之鏡、每有大效
衰瘦 MARASMUS 銶白土 二二〇 魚肝油 二三八
陰虱 PEDICULUS PUBIS 丁香油 三一八
骨節瘰症 TUBERCULAR DISEASES OF JOINTS 黃氣 二三三
帶虫 WORMS, TAPE 非利瑪 四四六 石榴根皮 四四八
哥蘇 四四四 松節油 三七八 卡瑪拉 四四九
倭瓜子 四四七
附錄 服藥之先、宜禁飲食十二至二十四句鐘、按此患常用之藥、乃非利瑪、但服前半至一句鐘、宜服鎂硫强礬一劑、以瀉腹內所存之食物、服後半句鐘、仍服鎂硫强礬一劑、令虫速於瀉下、及見大便、始可用飯、但便下之虫、必細查其有頭否、如無頭過數日宜再如法用藥、
破傷 WOUNDS 柳酸 二九三 阿司炭尼利 三〇六

氣脘泗膜炎 CATARRH OF AIR PASSAGES
阿甫莫非　三三一
郁加列油　二六五
氣促 DYSPNEA
附錄　鐾碳强鬱、有激呼吸心經之能、服之有效、如氣脘有恙、服砒藥數月、有效。
氣脘痰盛 BRONCHORRHEA
凍瘃 CHILBLAIN
氣　二二五
附錄　以氣抹膏加脂等分、和勻、敷患處、大效、
凍傷 FROST-BITE
附錄　如此患甚重、可吸疲氣弱鬱、於臨寢時、服鈹氮塩、或哥拉、或鴉片之微分劑、有防之之效。
胴炎 COLITIS
釘胼 CORNS
哮聲 (哮吼) CROUP, SPASMODIC
高鈺硫强鬱　二一三
砒　二〇二
樟腦　二六
馬前子　九九
加泌酸　一六〇
辣椒　三二四
魚石澁　二四四
魚石澁　二四四
幾阿林　四六三
柳酸　二九〇
薄荷冰　二八四
吸氣練法　五二七
鈹白鬱　一六六
黃氣　二三三
馬前子　九九
鈹白鬱　一六六
鈹砒弱鬱消水二〇五
炭氣弱鬱　一一〇
熱濕布裹法　五一六

檀香油　三七七　松　澁　三九五　松節油　三七八
巴豆油　三六〇　鉄檸礬　三六四　硫　三三八
海　葱　三六一　吸氣練法　五二七　熱　法　五二一
阿　魏　二四　樟　腦　二六

附錄　初起時、服草烏頭、或兼服熖氰弱礬、有效、服鴉片表散亦可、以足浸於熱水盆內、並服熱檸檬水、有效、吸熱水氣、或松節油氣、有效、吸松柄之氣亦可、有時服衣必格、或阿甫莫非爲吐劑、有效、如係成人、以巴豆油與洋橄欖油等分、敷胸有效、或敷氣酒亦可、如以芥末製成貼藥、糊胸有效、以布蘸松節油、覆胸亦效、如係嬰孩、以琥珀油與洋橄欖油等分搓其胸背、有效、或用樟腦油搓之亦效、如症至中程、孩童服錏碳强礬大效、或與錏氯塩兼服亦可、按錏氯塩有激氣脘泗膜之力、而鉄氯塩激力尤大、如服錏氯塩無效、可用此塩、但痰盛者忌服、阿魏辛伊加亦有激效、如痰粘滯難吐、服鉄檸礬與衣必格有效、如生痰過盛、顛茄、寇茀印、加泐酸等藥、有效、如有乾嗽、鉄藍洽有效。

氣脘久炎 BRONCHITIS, CHRONIC

加泐酸　一六〇　阿摩特　三九七　安息香　二九九
哥拜巴　三八一　幾阿蘇　二七六　錏氯塩　三九二
膠　草　三九三　怪阿寇　二七九　氯　四六一
松　澁　三九五　鉄氯塩　二三〇　郁加列油　二六五
巴根地柄　四一七　替利賓　三九九　辛伊加　三九九
替耳品沘　四〇〇

胱新炎 CYSTITIS,ACUTE　布球　三七二　硼强酸　四六七
鴉片　五八　烏伐　三七四　哥拜巴　三八一
幾阿林　四六三　胡麻子　四二七　沛利拉　三七四

附錄　初患時、宜服鎂硫强礬、如至生膿、宜以撒婁日服三次、服印度麻、其止痛之能、較鴉片爲大、用熱水坐浴、有效、如兼用溫水、或加鴉片、或以鴉片加橈水、射於肛內、能減胱急之患、若以鴉片、顛茄、黃氣、合製肛彈、用之亦效、如顯作燒、以草烏頭之足分劑、與燄氰弱酒、並鈲檸礬、兼服有效、如係傷風所致、或單服顛茄、或兼服草烏頭俱可、如係婦女、以幾阿林一至二分、加水百分、洗胱有效。

胱久炎 CYSTITIS, CHRONIC　杜松　三七五　膠草　三九三
洋斑蝥　四一三　檀香油　三七七　安息香酸　二九九

附錄　服阿布田三至五厘、或烏伐流膏半至一量錢、有效、如尿過含鹼、服錏安息礬、或烏羅透品、或硼强酸、能使含有酸性、如含酸過度、服錏沎消水、或鈲檸消水、能使變爲鹼性、以幾阿林一至二分、加水百分、射於胱內有效、或以鉥氣强塩一分、加水萬分、射之亦可、以鴉片一厘之四分之一至四分之二、製成肛彈、用之有效、如尿內含膿、以銀氰强礬一厘、加水四量兩、射於胱內、有效、但宜漸增藥力。

胱底棚遺液 PROSTATORRHOEA　洋斑蝥　四一四
氣脘炎 BRONCHITIS　銨鋏菓礬　一四三　阿甫莫非　三三一
氣　二二五　衣必格　三二七　胡麻子　四二七

重瘀癍 PURPURA HÆMORRHAGICA 松節油 三七八
疥 SCABIES 硫 三三八
紅熱症 SCARLET FEVER 鉄錳上礬 四五九 安替派林 三〇一
附錄 初患時、如顯癍痧、以鈉氯塩與哥拉兼服、有效、如隱而不出、令其人生汗、則能表發、如患喉炎、以鉄氯强礬、製成消水、用棉蘸敷有效、如皮膚作癢、以洋橄欖油、或他油類一量兩加烯醇一厘、以手搓之、有止癢之功、有醫者謂每句鐘服鈉柳礬二厘、大效、如腎有失功用之顯狀、宜服激腎藥、若症甫見愈、服鐵與士的年等補藥、方爲合宜。
歪頸 TORTICOLLIS 顛茄 八四 熱衹 五一六
黃茉莉 一一四
疿症 DIPHTHERIA
附錄 初顯時、以敵疿盟二至五千度、射於二髆骨間之皮內、最爲妙品、將鉄氯弱塩、用升法使之成氣、吸之或顯大效、氧氣强洽、爲最能祛假皮之敷藥、以噴霧具噴之、或以棉蘸敷、均可、敷鐵氯强塩酒亦可、忌服鉄氯强礬、因其有損於腎也、如必用之、宜製成消水、以棉蘸敷。

十畫

胱惹 BLADDER, IRRITATION OF 洋斑蝥 四一三 派怕拉辛 三七〇
布球 三七二

疝腫 DROPSY 三七五
愛冬葉 三五八
洋苦瓜汁 三七六
杜松冲藥 三六三
乳糖 三六五
鉄氣菓鬱
附錄 早餐之先、以鎂硫强鬱一劑、加水至僅能消化、服之有效、飲食中惟牛乳最宜、如係腎久症所致、服鉄氣菓鬱與荷蘭酒、有效、如因心經有症、而兼腎經被累所致、宜每日以毛地黃酒五至十五量滴、與洋斑蝥酒一量滴、兼服有效、加非印、阿大那、堪阿大麻等藥、亦效、若係肝變硬所致、服鉄氣塩有效、患此症者、如腹內疝多、宜用空針放之。
突眼癭症 EXOPHTHALMIC GOITRE 一三八
金雀花 二五二
指筋鞘炎 FELON (PARONYCHIA) 一八三
銀氰强鬱 鉛醋下鬱消水一七一
疿 PSORIASIS 二〇二
鉀鉄氣塩 二一四
阿大那典 一三九
哥羅新 三五四
鉄氣弱塩 二一八
乍波蘭的 三八六
海葱 三六一
加非印 一三四
哥拜巴 三八一
渣笠 三五四
鎂硫强鬱 三五〇
金雀花 一三九
顛茄 八五
烳醇 二七二
洋斑蝥 四一四
唎瑣辛 二八六
砒 二〇二
松澔 三九六

附錄　以安替派林與寇卡印、製成肛彈射於肛內、不但能止血、且能止痛、射炭匿酸肛彈亦效、如流血過度、服麥奴或效、

食帶（不消化）DYSPEPSIA　龍膽草　三一二　馬兜鈴　三二五

外惹內效之法　五〇八　阿魏　二三　幾阿蘇　二七八

鏽鈉氯塩　二二三　倍辛　四五一　撒婁　二九七

印度龍膽草　三一四　紅黃錄强蓼　二二二　獨脚蓮　三五七

砒　二〇四　瓜沙　三一一

附錄　如胃內酸液過多、且作疼痛、鋁氯塩有效、如因胃弱而致此患、砒藥類爲妙、若兼瀉腹尤效、如因胃釀而致此患、安息衲透有效、用鉍柳下礬亦可、倘此二藥不能醫治、宜用洗胃之法、如腸內食滯、服氰强酸與苦補藥有效、有此患者無論因何而致、飲食之間、宜多留意。

胎尿 ALBUMINURIA　辣椒　三二四　加泐酸　一六〇

鋍乳礬　三七二

疳症 DIPHTHERIA　烳醇　二七二　鈉硼烘礬　四六五

錄氯强塩　二一五　錄氯弱塩　二一四　灰消水　四四〇

敵疳盟　二五四　鋏錳上礬　四五九　高鐵硫强礬消水　一九三

氫氯强洽　四六〇　鐵氯强塩酒　一八九

馬前子　九九　氯　二二五　檀香油　三七七
非菔　四二五　顛茄　八五
附錄　以印度麻與他嗽藥兼用大效、如係乾嗽、顛茄莫非哥羅芳寇茅印赫囉印代漏尼黃栗莉鬧羊花等藥有效、咳嗽過甚、檀香油有效。

咳血 HÆMOPTYSIS
鉄白礬　一六六　加泌酸　一六〇　炭匿酸　一五九
阿司炭尼利　三〇六　衣必格　三一八
鴉片　五八　高鐵硫强礬消水一九一
附錄　哥拉鉄氪塩、能平腦部、服哈瑪米利、有效、以衣必格之微分劑、勤服大效、服甘油有弱礬一厘之百分之一至五十分之一、有效、如以莫非射於皮內、不但止咳、且平腦部。

流血 HEMORRHAGE
鉄白礬　一六六　醋酸　一五六　炭匿酸　一九五
引注血法　五四二　腎上栢腺　二四六　高鐵硫强礬消水一九一
皮下灌塩水法五二二
附錄　先以紗布蘸滅菌消水、或以滅菌散撒於布上、覆患處、後以布條纏之、較用斂藥爲妙、如以筋膠敷患處、且射於皮內、有助血凝結之能、如大脉流血、用縛法乃宜。

流血痔症 HEMORRHOIDS, BLEEDING
麥奴　四〇八　安替派林　三〇二　炭匿酸　一九五

胃系被惹 GASTRIC IRRITATION　烨醇　二七二
胃瘍 GASTRIC ULCER　砒　二〇四　鉍　一七四
哥利吞　六八　鬧羊花　六七　唎瑣辛　二八八
銀氰强礬　一八二
附錄　如嘔吐不止、腎上橢精氯塩、有止之之效、砒藥亦效、如甚作痛、以鉍氰下礬、鈉氫碳强礬、兼服、有平胃之能、如作痛過甚、可加莫非寇第印少許、如兼大便乾結、宜服鎂硫强礬、或鈉硫强礬、吐血者、服松節油最妙、鬧羊花與銀氰强礬、於餐前半至一句鐘、服之有效、如病者休息禁食最妙、但禁食必用射肛育法、方可。
胃新炎 GASTRITIS, ACUTE　鉍　一七四　胡麻子　四二七
附錄　如胃內有不正之物、宜用吐藥、或用胃抽器抽之、宜飲滋潤之物、如非菡水與卵青並油類、有免炎佈散之能、如甚作痛、宜服鴉片酒、惟鴉片樟腦酒忌服。
胃久炎 GASTRITIS, CHRONIC　洗胃之法　五三五
脉囊（血囊）ANEURYSM　藜蘆　一四六　鉄氯塩　二三〇
脉變壞 ATHEROMA　鉄氯塩　二三〇
咳嗽 COUGH　印度麻　七九　哥羅芳　四八
黃茉莉　一一四　赫囉印　六五　鬧羊花　六七

鉄氰弱鬱　一一一　甘油氰弱鬱　一一一
附錄　以砒與鐵藥兼服、最妙、有時以魚肝油與硫强鬱類兼服、其效較服砒鐵尤大、阿司炭尼利亦效。
胃弱　GASTRIC ATONY　辣椒　三一三　加林啤根　三一三
附錄　服砒藥類常效。
胃疽　GASTRIC CANCER　氫氯酸　一九七
胃泗新炎　GASTRIC CATARRH, ACUTE　柳酸　二九一
木炭　四五三　龍膽草　三一二　阿甫莫非　三三一
附錄　最要者、乃留意於飲食、如以絨帶、繫於腰間、或能免此患、如孩童有此患、鎔氯塩有效、每二句鐘以鉍氯下鬱三厘、鈰草鬱一厘、兼服有效、以牛乳多加灰消水飲之、或以雜沸散一劑、均爲四分、每刻鐘服一分、均效。
胃泗久炎　GASTRIC CATARRH, CHRONIC　蒜　三九四
氫氯酸　一九七　鬧羊花　六七　外惹內效之法　五〇八
附錄　此症用洗胃之法最妙、最宜留意於飲食、必食酥酪與易化之湯類、方爲合宜、以銀氰强鬱一厘之六分之一、與鬧羊花膏一厘、製之成丸、每餐前半句鐘服之有效、如兼大便乾燥宜服羊鼠李。
胃鬆大　GASTRIC DILATATION　柳酸　二九一　加拉巴豆　一〇一
洗胃之法　五三五　氫氯酸　一九七

處、均可免成此瘡、如食有力之食物、並服鐵藥類、或能醫治。
虱 PEDICULI　白柴油　三二五
昏譫 DELIRIUM　巴豆油　三五九
長牙 TEETHING　鉄氯塩　一〇四
易犯尿酸 URIC-ACID DIATHESIS　鉄醋礬　三六五
派怕拉辛　三七〇
附錄　病者如能至醫病之泉處、日飲其水、常效、多服白灰消水亦效。
耵聹變硬 CERUMEN, IMPACTED　甘油　四二九
九畫
胃存酸液 ACIDITY, GASTRIC　木炭　四五三　鈰草礬　一七五
鎂碳强礬　三三七　鈉氫碳强礬　四三五　鉄氯塩　三七一
鋅沘香酒　一一八
附錄　鋅藥類、乃最有力之解酸品、但有惹胃之力、故胃已受惹者忌用、鎂碳强礬能解腸內酸液、用之最爲妙品。
胃系痛 GASTRALGIA　鉍　一七四　氫藍酸　一五三
印度麻　七九　哥利吞　六八　薄荷冰　二八三

腺、以免血積於其內、如仍生乳、宜用抽乳具抽出、倘顯生膿、宜速割放。

乳頭裂 NIPPLES, FISSURED　寇卡印　九〇　魚石湍　二四四

炎症 INFLAMMATION　顛茄　八四　草烏頭　一五〇

印度麻　七九　銨鉄菓礬　一四三　鴉片　五八

黑白芥　四一五　藜蘆　一四六　松節油　三七七

泗膜諸病 MUCOUS MEMBRANE, DISEASES OF　砒　二〇二

附錄　如氣脘之泗膜受惹、服非涵漿、或胡麻子製之成漿、服之、有平之之能。

花顛 NYMPHOMANIA　鉄氣塩　一〇四

花柳瘡（癀與癯瘡） VENEREAL SORES　柳酸　二九三

肥胖 OBESITY　枯牌棚　二四五　鉄錳上礬　四五九

附錄　或云飲食中多用醋、有效、但於人有損、故不宜用、以冷水沐浴、有效、宜節飲食、而多食菓品、不宜多用生脂之食物、如肥胖過甚、艱於行履、宜只食去皮之牛乳、倩人揉揑其身、並宜服鎂硫强礬。

臥瘡 BED-SORES　阿羅　三四六　鹹貼膏　四三二

銀氰强礬　一八四

附錄　以白礬、樟腦浮酒、與卵青和勻、敷於紅處、或每日將所壓之處、洗而揉揑之、後敷甘油、或以伯蘭地、加鈉氯塩搓其壓

栝樓　三六一　洋苦瓜汁　三五八　鉄氯塩　二二九

附錄　以洋苦瓜汁與渣笠兼服、有效、服鈉柳礬、亦效、以氯酒敷胸、有效、若以洋斑蝥貼膏、貼腋下二寸處、亦效、倘用以上諸法、不能祛液、宜用吸具吸出、如吸液之後、肺不復舒、宜用法使之舒展。見五二六篇

肺統膜炎（胸統膜炎）PLEURITIS OR PLEURISY

鉄氯弱塩　二一三　藜蘆　一四五　乍波蘭的　三八七
黃茉莉　一一四　放盂血法　五四四　鉄氯塩　二二九
冷法　四九三　外惹內效之法　五〇六

肺葉炎 PNEUMONIA, LOBAR

貴林　二五九

肺炎 PNEUMONIA

酒　一二〇　草烏頭　一五〇
顛茄　八五　安替派林　三〇一　硫　一九九
氯　四六一　毛地黃　一三〇　黃茉莉　一一四
藜蘆　一四六　馬前子　九八　鉄氯塩　二三〇
冷法　四九三　放盂血法　五四五　外惹內效之法　五〇六

乳腺炎 MASTITIS

顛茄　八四

附錄　宜服草烏頭、或藜蘆、以平絡部、並宜服鎂硫强礬之中分劑、以顛茄藥、敷服兼用、有效、但用後宜用布條裹胸、壓緊乳

附錄　以鉛醋下礬消水、與鴉片酒相合、敷患處、有效、以傷處浸於極熱之水內、乃係最妙之法、但水之熱幾至燙人之度、則無效、如傷處久不復原、用乾熱法、有效。

身錢癬 TINEA CIRCINATA　氯　二二五　松節油　三八〇

鈉硼烘礬　四六五

疳 COLIC　阿魏　二四　哥拉　七二

黑白芥　四一五　鬧羊花　六七　瑪替開拉　三三二

附錄　成人患此症、服伊打雜浮酒、有效、孩童患之、以哥拉之小分劑、與鈑氯塩兼服、有效、孩童生牙時患之、瑪替開拉、有免之之能、用薄荷醫之亦可。

八畫

肺氣腫症 EMPHYSEMA OF LUNGS　加拉巴豆　一〇一

魚肝油　二三八　鈥氯塩　二三〇　熆氯塩　一九三

龍骨草　三九四　空氣醫法　五三九

肺變硬癆症 FIBROID PHTHISIS　氯　二二四

肺疔 GANGRENE OF LUNG　烑醇　二七二

肺統膜積液 PLEURITIC EFFUSION　鎂硫强礬　三五〇

附錄　未用斂藥之先、宜服萆麻油與鴉片酒、使腸內釀壞之物瀉出、後每二句鐘服衣必格三厘、常效、如疼痛大作、可服莫非與阿刀便、且將芥末貼膏覆於腹上。

足腫而痛或生汗 FEET, SWOLLEN, TENDER, OR SWEATING　砒　二〇五

附錄　年邁之足腫而痛者、服砒弱酸一厘之六十分之一、至四十分之一、有效、且宜休息、不可行路、如足生汗過度、每日以襪蘸鈉硼烘礬濃消水、曬乾穿之、有效、以柳酸、鈉硼烘礬等分、置於水與甘油等分內、和勻敷之、乃爲止汗最妙之法、

狂癲 MANIA, ACUTE　牌棚　二四五　亥歐辛　六八

素弗拿　七六

附錄　如病者不能安睡、以鈲氮塩之大分劑、與印度麻兼服、有效、如其腎經無恙、可服哥拉、或索弗拿、使之安睡、有時必用莫非、亥歐辛、度鮑司印等藥、方能見效。

延纏痺症 RHEUMATISM, SUBACUTE　鉄醋礬　三六五

撒婁分　二九八　鉄氮塩　二二九

附錄　用乾熱法、或土俄二浴法、大有功效。

扭傷 SPRAINS　樟腦　二六　辣椒　三二四

鹹貼膏　四三二　魚石湍　二四四　鴉片　五八

松節油　三八〇　冷法　四九二　鉛醋下礬消水　一七一

熱法　五一五　蛭吸血法　五三六　鈉砂强礬　四八六

呃逆 HICCOUGH　琥珀油　四一九　伊打雜浮酒　三一
顛茄　八三　樟腦　二六　哥拉　七二
麝香　二一

附錄　吸烘氰弱礬少許、每效、有時以辣椒酒二至十滴、多加水服之有效、夫用藥醫此症、必先知致此症之故、如因腸胃存有惹物、宜用瀉或吐藥祛之、後可用平腦藥類、甘松酒、哥羅芳浮酒、樟腦浮酒、伊打雜浮酒、服之、每能平胃與腦部、如人患腸熱而兼有此症、以麝香十厘、射於肛內、乃爲上品、倘不得用麝香、可服琥珀油五至十量滴、如因食滯所致、服馬前子酒與氫氰酸、有效、如病至險程、以鈉氮塩與鴉片酒、射於肛內、或效。

呃噎 SNEEZING　氯　二二六
系幹作痛 NERVE, HYPERSENSATIVE　安替泒林　三〇二
卵腺系痛 NEURALGIA, OVARIAN　錏氯塩　三九二
禿頭 ALOPECIA　乍波蘭的　三八八

附錄　以齊瑣便半至一錢、加羊毛脂一兩、研勻敷之、亦可以錄氯强塩二厘、醇酒一量錢、松節油七量錢、和勻敷之、如將欲脫之髮提出、以羊斑蝥消水敷患處、有效、倘用之過多、髮根必生微皰。

似癨症 CHOLERA MORBUS　撒婁　二九七　衣必格　三二八
樟腦　二五

附錄　如尿含酸晶、服安息香酸、或鈲醋礬、有效、宜多飲以水。

尿血 HÆMATURIA　加泐酸　一六〇　松節油　三七八

香葛　一六五　鈉硫下礬　四三六　哈瑪米利　四八六戊

附錄　每句鐘宜服樟腦丸一次、每次一丸、按每丸含樟腦三厘、服四至六丸爲止、服麥奴印度麻亦效、以腎上橢精氯塩一分、加水五千分、製成消水、射於胱內、有效、如尿血至甚、可將白礬二至三厘、加水一量兩射之、但射後血必成衃、易於生膿、故未至甚者忌用、以莫非阿刀便相合、射於皮下、有效、如於腰際用火杯乾法有效。

尿多含鹼 URINE, ALKALINITY OF　烏羅透品　三七一

尿多含酸 URINE, ACIDITY OF　鋏沎消水　三六四

尿過多（小便頻數）DIABETES INSIPIDUS　麥奴　四〇九

鴉片　五八　加泐酸　一六〇

肛門裂 FISSURE, RECTAL　黃氯　二三三　阿羅　三四六

顛茄　八四

附錄　臨睡時、宜服硫與香散、使大便變成溏瀉、如不能服硫、可服萆麻油、如於大便之先五分鐘、以黃氯二至五厘、製成肛彈射之、有止痛之效、如將烘醇一滴、敷於裂處、或能醫治。

肛脫 PROLAPSUS RECTI　白槲樹冲藥　一六三

附錄　服士的年每效、以炭匿酸五至十厘、加水一量兩、化勻、洗之亦效。

吐血 HÆMATEMESIS　高鐵硫强礬消水 一九三
附錄　服腎上棚精、有效、服炭匿酸二十至六十厘、有效、但不可與鐵藥並用、服鐵氯酒、或松節油、有效、食碎冰亦效、如緩吐不止、麥奴、衣必格、哈瑪米利、銀氰强礬等藥、皆效。

七畫

肝癉 HEPATIC ABSCESS　錏氯塩 三九二
附錄　如癉係痢症所致、必速醫痢症、方爲合宜、如己生膿、宜用空針將膿吸出、可以貴林與鐵藥兼服、且宜留意於飲食。
肝變硬 HEPATIC CIRRHOSIS　錏氯塩 三九二　鈉硫强礬 三五二
鋏氯塩 二三〇
附錄　初患時、服皇强酸有效、鈉硫强礬、爲最要之品、有醫者謂黃氯大有醫此症之能。
肝失功用 HEPATIC TORPOR　渣笠 三五四
洋杜仲 三三四　錏氯塩 三九二　印度龍膽草 三一四
鋏醋礬 三六五　皇强酸 四八六丙
肝新炎 HEPATITIS, ACUTE　藜蘆 一四六
肝久炎 HEPATITIS, CHRONIC　錏氯塩 三九二
尿沙（沙淋）GRAVEL　鎂硫强礬 三五〇

血過多 PLETHORA 三五四
血中毒 TOXÆMIA 三四〇
血多白朕症 LEUCOCYTHÆMIA
氯 四六一
肌跳症 CHOREA 三三三
洋升麻 一八二
銀氰强鬱 一八二
肌痺 (肌痛) MYALGIA, 二九六
撒婁 二九六
阿司炭尼利 三〇五
附錄 如因傷風所致、以鹽氣塩二十厘、與甘草流膏一量兩兼服、或以洋升麻流膏二十至六十量滴、單服、俱效、外敷氯酒、或用擦藥、俱效、用揉搦法大效、如有患痺之根、服鉄氯塩、或柳鬱類有效。
耳痛 EARACHE
附錄 宜服牽心之劑、並宜覆熱水袋於患處、且宜灌熱塩消水於耳內、必須極熱、方見大效、可以顛茄酒鴉片酒相合、滴數滴於耳內、如耳竅顯有凸狀、宜以刀割放其膿、
渣笠 三五四
蕁麻油 三四〇
砒 二〇二
甘油氰弱鬱 二一一
樟腦氯弱塩 二八
丁香油 三一八
巴根地楠 四一七
引注血法 五四二
砒 二〇二
哥拉 七二
低鐵氯塩 一八九
鴉片 五八
白芥 四一五
黑

用目過度 EYE STRAIN　芬阿錫吞　三〇八

附錄　宜帶合宜之鏡、如兼有頭痛、黃茉莉有效。

石症 CALCULI　顛茄　八四

甲邊入肉 INGROWING TOE NAIL　烳醇　二七二

鋏白礬　一六六　鋏沎消水　三六四

六畫

血虧 ANÆMIA　撒婁　二九七　銶氯强塩　二一五

氯　四六一　魚肝油　二三八　銅砒弱礬　一八一

鎉乳硫强礬糖漿　四三九　鐵　一八七

附錄　如此症係久瀉所致、宜服低鐵砒强礬、如係惡瘴所致、宜服砒類藥、兼服鐵藥亦可、如係腸不消化所致、衲逶有效、如係腸胃虛弱所致、苦補藥與鐵藥有效、如係癰症所致、服銶藥類最妙、如係勾虫所致、服洋蘇冰有效、如兼患肌跳、以鐵氮塩製成糖漿、服之最妙、如兼有癧症、服鐵氯糖漿有效、如婦人因生育過多而致、宜服鐵硫强礬與魚肝油、服鐵藥與貴林亦可。

血虧惡症 ANÆMIA, PERNICIOUS　氯　四六一

撒婁　二九七　砒弱酸　二〇二

附錄　鴉片雖有令人安睡之能、如不因疼痛之故、忌用、莫非亦然、因疼痛而失寐者、以莫非哥拉之小分劑、兼用有效、但不必常用鴉片類、若用黑披那布哥拉藥類、亦能止痛、若單用哥拉、不能止痛、如病者顱腦血虧、用冷水沐浴爲宜、苦因悸所致、用熱水沐浴乃宜。

孕婦大便乾結 CONSTIPATION OF PREGNANCY　辛那　三四八

附錄　如以辛那與羊鼠李兼服、有效。

孕吐 VOMITING OF PREGNANCY

砒	二〇四	草烏頭	一五〇
鈰草礬	一七五	寇卡印	九三	氯	二二六
衣必格	三二七	薄荷冰	二八二	鋏氣塩	一〇六

附錄　服草烏頭、能平腦部、如以鈹氣塩製成沸藥、（見百五篇）服之有效、製成消水、射入肛內、亦可、近多有服氯酒而見大效者。

生涎過多（涎盛）PTYALISM　顛茄　八四

生汗不止（汗旺盜汗）SWEATING　加泐酸　一六〇

硫强酸	一九六	炭匿酸	一五九	澱鍉碳强礬	四三八
硫	一九九	鉦　蓼	一七六	乍波蘭的	三八八
袱毛消水	四五八	鉛貼膏	一七二		

用蒙藥而嘔吐 VOMITING AFTER AN ANÆSTHETIC　阿司炭尼利　三〇五

附錄　如係乾皮症、服砒類藥爲宜、並宜洗以銶黑洗藥、後敷硫抹膏、或他類抹膏、如係濕皮症、敷鉦莠或鉍加泐礬等藥爲宜、寄生皮症、齊瑣便爲上品、其人若顯癧狀魚肝油爲妙藥、如兼作癢、氫藍酸有效、若係久症、魚石澁有效、按皮症以熱泉水沐浴最宜。

失和動之胃痛 GASTRALGIA OF ATAXIA　阿司炭尼利　三〇五

失和動症（眷腦後杜硬）LOCOMOTOR ATAXIA　鉠氯塩　二二九

芬阿錫吞　三〇八　安替派林　三〇二　銀氰强礬　一八二

哥拉阿米　七四　厄司阿金　三〇九

失寐（失眠）INSOMNIA　鴉片　五七　甘松　二二

索弗拿　七六　台歐那　七七　鉠氯塩　一〇四

哥拉瑣　七五　哥拉阿米　七四　單被蘸冷水裹法　四九六

冷水袋　四九四　入冷水法　四九四　熱濕布裹法　五九

哥拉　七一　哥拉吞　六九　布哥拉　七五

多莫拉　四七四　度鮑司印　四七四　亥歐辛　六八

黑披那　四七三　莫非　五七　怕拉第亥　七八

思寐那　四七五　倍羅拏　四七三

皮癢 PRURITUS

氫藍酸　一五四
銨白礬　一六六
銶氯弱塩　二十八
鉦羹抹膏　一七七
附錄　如敷寇卡印消水、暫時顯效、用土國浴法、亦效。

皮裂 CHAPPING

鉍氰下礬　一七四
錄附　冬令時以甘油玫瑰水等分、和勻、數日搓手一次、可免此患。

皮症 SKIN DISEASES

低鐵砒强礬　一八八
鉍加泐下礬　一七五
砒　二〇三
鉦碳强礬　一七九

烿醇　二七二
銀氰强礬　一八四
鎉氯塩　四三八
鈉硫下礬　四三六
硼强酸抹膏　四六六
魚石澔　二四四
銶氯强塩　二一六
高銶氰强抹膏　二二一
齊瑣便　四一八

柳酸　二九〇
砒　二〇三
鈉硼烘礬　四六五
鉛醋下礬消水　一七一
玫瑰消水抹膏　一六四
銅硫强礬　一八一
魚肝油　二三八
黃銶强羹抹膏　二二二
鉦羹抹膏　一七八

白槲樹　一六三
熟法　五一六
鉦氯塩　四二一
鉦硫强礬　一七六
附錄　症初顯時、如於臨寢用熱水沐浴一至二句鐘、有效、且宜忌惹尿脬泗膜之食物、如以鋉氯强塩一分、加水二萬至四萬分、射入尿脬、有效、以鋉錳上礬一分、加水六千分、射入尿脬亦可、如覺小便辣痛、溺時以大盌盛熱水、浸陽莖於其內、溺之、其痛必減。
白濁久症　GONORRHŒA, CHRONIC
檀香油　三七七
烏伐　三七四
松節油　三七八
鉦醋礬　一八〇
洋斑蝥　四一四
以利準油　三七六
鋉氯强塩　二一六
附錄　宜以銀氰强礬一分、加水千分、或銀腥礬一分、加水三千至五百分、或鋉錳上礬一分、加水二千至五百分、每日灌漑溺脬、如溺脬收窄、宜先用撐具、後用以上之灌漑藥。
白帶　LEUCORRHŒA
炭匿酸　一五九
白槲樹　一六三
坐浴熱法　五一六
鐵鉦硫强礬　一八八
鋉白礬　一六六
赤蘇木　一六三
顛茄　八四
金印草　四一一
銀氰强礬　一八四
附錄　如以洋斑蝥火棉酒、敷於腰之兩側、生皰有效、倘白帶味臭、可以鋉錳上礬半錢、加水一量磅、射入陰道。

中鉛毒　一六九
解法俱見本藥篇
牙癬 CARIES, DENTAL　中伊打毒　四一　中藜蘆毒　一四七
牙痛 TOOTHACHE　錯乳硫強鬱糖漿　四三九
丁香油　三一八　哥利吞　六九　幾阿蘇　二七八
牙穢物 SORDES　薄荷油　二八一
欠氣（疢） ASPHYXIA　甘油　四三〇
附錄　宜射鹽沁於腿盂、以激心經、並呼吸司所、以鉗提舌、每分鐘十五次、乃爲妙法。　氯　四六一　引呼吸法　五三三
日曬皰 SUNBURN　鉛碳強鬱　一七〇
五畫
白濁新症 GONORRHŒA, ACUTE　撒婁　二九七　郁加烈油　二六五
玫瑰水　一六四　草烏頭　一五〇　安息香酸　二九九
銀氰強鬱　一八四　印度麻　八〇　哥拜巴　三八一
金印草　四一一　洋桂油　三一七　鉛醋鬱　一七〇

勿一次導盡、如以生皰藥敷於前心、常效、若病者健壯、初患時、可以蛭置於前心吸之、並可服藜蘆之足分劑。

中耳炎 OTORRHŒA　鉠錳上礬 四五九　幾阿林消水 四六一

中耳眩暈 VERTIGO, AURAL　乍波蘭的 三八八

中漆毒 VARNISH POISONING　膠草 三九三　錏氯塩 三九二

鈉硫下礬 四三六　鉛醋下礬消水 一七一

中鉛疳 COLIC, LEAD　鉠白礬 一六六

中貴林毒 CINCHONISM　鉠氯塩 一〇二

中醋酸毒 一五七　中烑醇毒 二七五　中草烏頭毒 一五二

中阿司炭尼利毒 三〇七　中酒毒 一二五　中酒癮 一二三

中安替泒林毒 三〇四　中銀氰强礬毒 一八五　中砒毒 二〇九

中顛茄毒 八七　中哥羅芳毒 五一　中寇卡印毒 九四

中黃氯毒 二三四　中哥枝禁毒 二四二　中毛地黃毒 一三三

中銨鉠菓礬毒 一四五　中哥拉毒 七三　中氯毒 二二八

中黃茉莉毒 一一五　中銅硫强礬毒 一八一　中硗毒 二〇〇

中哥念毒 一一六　中鴉片毒 六二　中馬前子毒 一〇〇

心將停止 HEART FAILURE 醇酒 一二〇 腎上棚 二四七
烘氰弱礬 一一〇 錏沎消水 一一七 錏沎 一一七
大花仙人掌 四八〇 毛地黃 一三〇
附錄 詳見心統膜炎
心胴過長 HEART, HYPERTROPHY 藜蘆 一四六 草烏頭 一五一
附錄 詳見心症
心變爲脂 HEART, FATTY 洋升麻 三三
附錄 詳見心症
心內衣炎 ENDOCARDITIS 冷法 四九三 銶氯弱塩 二一三
附錄 初患時、如病者健壯、每句鐘可服草烏頭酒六量滴、或服藜蘆酒、以代此酒之用、如患生瘍之心內衣炎、可射敵鍊穟盟、且宜服鐵氯塩酒、如在前心敷起皰藥、可免夾雜病。
心統膜炎（心外衣炎）PERICARDITIS 冷法 四九三
草烏頭 一五〇 洋苦瓜汁 三五八 銶氯弱塩 二一四
鴉片 五八 銶氯塩 二二九
附錄 如心顯欲停之狀、宜服伯蘭地、毛地黃、加非印等藥、如統膜滲出之質甚多、至成最險之狀、宜用導液法、漸漸導出、切

金雀花　一三八　康畀箭毒　一三三　阿大那典　一三九
腎上棚　二四七　酒　一二〇　錏沎　一一七
烓氰弱礬　一一〇　樟腦　二六　洋升麻　三三
洋鈐蘭　一三八　大花仙人掌　四八〇　寇拉　四七九

附錄　患此症者、如顯心跳、服草烏頭、或藜蘆、每有大效、服顛茄亦效、其心跳如因食滯之故、宜服助消化藥類、若因血虧而致、宜服鐵藥類、如患心膈過長、服草烏頭、或藜蘆、每有大效、用顛茄貼膏亦效、心撞不勻者、宜服顛茄、心經虛弱者、宜服鐵砒苦補藥類、血壓過大者、宜服甘油氰弱礬、心變爲脂者、宜服氯塩類以抵之、不能安睡者、可服鴉片、用安息療法、有時大效、馬前子有激心之能、可因症酌用、無論何類心症、如用草烏頭、服後宜常躺臥。

心跳 PALPITATION, CARDIAC

顛茄　八三　樟腦　二六
毛地黃　一三〇　金雀花　一三八　草烏頭　一五一

附錄　詳見心症

心虛弱 HEART WEAKNESS

阿大那典　一三九　康畀箭毒　一三三
大花仙人掌　四八〇　寇拉　四七九

附錄　詳見心症

心鬆大 HEART, DILATATION

毛地黃　一三〇

附錄　每二句鐘如服衣必格三厘、有效、有時服銀氰强礬丸、或以此礬製成消水、射於肛內、後以黃氣作成肛彈塞之、有效、如育道泗膜久炎、每四句鐘服錏氯塩五厘、大效、如患盟瀉久症、服鉍錏檸礬有效、無論患何類久瀉、總宜加意於飲食。

小產 ABORTION

附錄　如顯小產之狀、宜服鴉片或莫非、以平其痯、如孕婦曾患瘧症、病根未去、宜服貴林、若無此病根忌服、小產之婦、如兼大便乾結、宜服洋鼠李或甘草雜散、若無效可服大黃或萆麻油、切勿服大有惹力之瀉劑、胎膜下後、如顯作燒、可射幾阿林消水於痯內、如以氯酒敷於痯內、不但能止流血、且能滅穢、小產以後、如以麥奴貴林之小分劑、服十至十五日有效、但宜躺臥、不可操勞。

四畫

心痛急症 ANGINA PECTORIS

甘油氰弱礬　一一一
伊打雜浮酒　三一
烓氰弱礬　一一〇
鋏氰弱礬　一一一

附錄　如病者全身絡脘鬆輭、服伯蘭地、較服烓氰弱礬類爲尤妙、有時服安替派林二十厘有效、果使病者無關心之事、且服砒藥、數月顯效、服大花仙人掌或效、如其人心經虛弱、宜服毛地黃、有悸症而將患此症者、以伊打一量錢、加冰水服之、有抵之之能、如經用烓氰弱礬無效者、可以莫非一厘之四分之一至二分之一、射於皮內、能止其痛、如此症因過食而致、宜用胃抽器抽之、每餐後如服硫一厘之百分之一、能免復犯此症、患過此症者、必留意飲食、講求衛生、並服補藥、方能見效。

心症 HEART DISEASE

加非印　一三五
毛地黃　一三〇

洋苦瓜汁　三五八
大腦病 CEREBRAL DISEASE　渣笠　三五四
大腦積液 CEREBRAL EFFUSION　硫　一九九　巴豆油　三五九
大便乾結 CONSTIPATION　阿羅　三四五　蔡蘆　一四六
甘油　四二九　洋鼠李　三三三　洋苦瓜汁　三五九
路卑利　一一三　馬前子　九九　甘露　三三三
硫　三三八　大黃　三四三　草麻油　三四〇
加拉巴豆　一〇一　梧樓　三六〇　奄弭羅　三三五
洋澤漆　三三五
附錄　此症服洋鼠李最妙、宜食粗麵菓品等合宜之食物、且宜多運動身體、倘常服大黃草麻油、錄氣弱鹽、或常射水於肛內、不但無益、反致有損、如兼有痔症、硫爲上品、若嬰孩患此症、可以硬鹼製成筆形之錠、蘸水塞入肛內、每效、如兼患骨轉症、服鈉硫强攣有效。
大皰症 PEMPHIGUS　砒　二〇三
久瀉症 DIARRHŒA, CHRONIC　砒　二〇四　松澔　三九五
加勃酸　一六〇　獨脚蓮　三五七　氰强酸　四八六乙

病症目錄

以前目錄、不過爲考查某藥某法、有何功效、醫何病症而設、以後目錄、乃爲考查某患某症、宜投何藥、並用何法而設、故於疾病之緊要者、列藥之外、附錄治法、醫家臨症、庶不致窘於無法耳。

三畫

口白瘍 STOMATITIS　氰强酸　四八六甲　鉄氯强礬　三六六

烑醇　二七二　柳酸　二八九　寇卡印　九〇

鈉硼烘礬　四六五　蘇作多　二三七　洋蘇冰　二八四

附錄　如病者不能安睡、宜以鉄氮塩或鈉氮塩之中分劑、日服三次、並可敷玫瑰蜜、如瘍不收口、可敷以銀丹、倘兼肝失功用、宜服皇强酸、以輒氯强洽噴或敷之亦可、若兼大便乾結、宜服大黃或鎂硫强礬、孩童宜服熆氰弱浮酒、且未食乳之先、宜將乳頭洗淨。

口出臭氣 FETID BREATH　樟腦酒　二六　銢氯弱塩　二一八

口頰疔 CANCRUM ORIS　砒弱酸　三〇四　鈉硼烘礬　四六五

大腦積血 (顱腦積血)CEREBRAL CONGESTION　黑白芥　四一五

蘭草流膏　三二六
二十二畫
鑄銀丹　一八三
二十三畫
鹼　四三一
二十四畫
鹼擦藥　印鹼擦藥　二七
鹼雜丸　即鹼雜丸　六〇
鹼貼膏　四三一
鹼擦藥　四三一
鹽消水　五四二
鑽雜丸　六〇

十九畫
顛茄根　八一
顛茄汁　八六
顛茄葉酒　八六
藜蘆酒　一四七
鏻氮鹽　一〇八
氫　四六一
藥製　四
醫熱之冷法　四九六
二十畫
蘇作多　二二七
二十一畫
鐵　一八七
鐵草礬　一九三
鐵乳礬　一九五
鐵粉　一九三
鐵貼膏　一九五
鐵氯强鹽　一八七
鐵苦葡酒　一九五
麝香　二一
顛茄葉　八一
顛茄流膏　八六
顛茄擦藥　八六
藜蘆流膏　一四七
鏻鈉氯鹽　二二三
鯨頭油抹膏　三〇〇
藥之分劑　六
醫大小腸不通之法　五一四
懸法　五四一
鐵鋅檸礬　一九〇
鐵氨菓礬　一九〇
鐵硫强礬　二〇三 一九五
鐵粉餅　一九五
鐵香調水　一八八
鐵氯强鹽消水　一九〇
鐵氯鹽丸　一九一
麝香酒　二一
麵團　五五五
鐵鋅菓礬　一九〇
鐵甘松礬　二三 一九五
鐵硫强礬　一九三四
鐵貴林檸礬　一九〇
鐵醋礬消水　一九五
鐵氯强鹽酒　一八九
鐵氯糖漿　一九一
麝香散　二一
顛茄葉膏　八六
顛茄貼膏　八六
顛茄肛彈　八七
藜霍　四四三
鏻强酸　四二二
藥味遲速　六
藥力無定　八
騰氣氫强酸　四八六乙
鐵鋅硫强礬　一八八
鐵鋅醋礬消水　一八八
鐵硫强礬糖漿　一九三四
鐵士的年檸礬　一九〇
鐵硫貴林糖漿　一九三
鐵檸礬葡酒　一九五
鐵檸礬　一九〇
蘭草　三二六
顛茄根流膏　八六
顛茄抹膏　八六
藜蘆　一四五
藜霍油　四四四
鏻强酸消水　四二三
藥效存時　七
藥之分類　十三

蔣阿匹林　二九八
十七畫
薄荷　二八一
薄荷餅　二八二
龍膽草膏　三一二
龍骨草　三九四
鎂檸礬　三五一
薑　三二〇
薑酒　三二一
賽阿寇　四〇二
橈　四三三
十八畫
鎘　四三七
鎘硫下礬　二三九 四三九
鎘泥　三三九
鎘硫粉　三三九
鎘氮鹽　一〇七
氫氟酸　一九七
雜瀉丸　三五五
氯氣　四五八
積效之虞　八
薄荷油　二八二
薄荷冰　二八二
龍膽草流膏　三一二
龍骨草流膏　三九五
鎂硫強礬　三五〇
薑脂橢　三二一
薑藥餅　三二一
賽魚膠　二四八
檀香油　三七六
鎘乳礬　四三九
鎘硫下礬糖漿　四三九
鎘弱養　即石灰　四四〇
鎘氯粉　四五七
鎘氯鹽　四三八
氫藍酸　一五三
雜沸散　三五三
麩糎　四五四
積久銀毒　一八五
薄荷浮酒　二八二
薄荷冰貼膏　二八四
龍膽草雜酒　三一二
龍骨草煮藥　三九五
鎂檸礬消水　三五一
薑流膏　三二〇
賽葡阿　四二〇
鮮牌橢　二四六
濕羊毛脂　四二九
鎘硫強礬　二三九 四三九
鎘硫下礬雜糖漿　四三九
鎘碳強礬調水　四三七
鎘氯粉消水　四五七
鎘碳強礬餅　四四二
氫氪酸　四八六庚
鎳氪鹽　一〇八
盥手之法　四九一
薄荷消水　二八二
龍膽草　三一一
龍膽草雜沖藥　三一二
鎂碳強礬　三三七
鎂碳強礬消水　三三七
薑糖漿　三二一
賽歐司民　二五〇
鮮顛茄膏　八七
凝乳　五六〇
鎘乳硫強礬　四二八
鎘碳強礬　四四一
鎘碳強礬雜散　四四一
鎘硫粉糖消水　三三九
鎘乳硫強礬糖漿　四二九
氫氯強洽　四六〇 四九一
藍煤替連　二六七

樟腦　二五
樟腦酒　二七
樟腦醋　二八
鬧羊花酒　六七
敵痙盟　二五四
膠透　四五九
撒叟　二九六
醇酒　一一八
敷法　二
盤布架　五二七

十六畫

鋅沘　一一七
鋅沘浮酒　一一八
鋅氯塩　二三一
鋅醋礬　三六九
獨脚蓮酒　三五八
鋅甘松礬　二三
檸酸　一五五
輭繖　四三一
糖　四八六
樟腦水　二七
樟腦雜酒　二七
鬧羊花　六六
鬧羊花汁　六七
敵鍊稣盟　二五四
膠草　三九三
撒叟分　二九八
蔗酒　一二一
練腿之法　五〇五
麩麵包　五五八
樟腦氯弱塩　二七
樟腦擦藥　二七
鬧羊花膏　六七
敵痒盟　二五三
敵鼠疫盟　四八六
膠草流膏　三九三
醋酸　一五六
穀烝酒　一二一
熱濕布生汗法　五一九
養育孩童食物表　五五三
樟腦蠟抹膏　二七
樟腦鋅沘擦藥　二七
鬧羊花流膏　六七
敵白濁點稣盟　二五五
敵顛衣炎盟　二五五
撒卡林　四三一
醋蜜　三二一
熱法　五一五
價廉之乾熱具　五二〇
鋅沘擦藥　一一八
鋅沘香浮酒　一一八
鋅氯塩　三九一
鋅碳强礬　四〇四
獨脚蓮　三五六
獨脚蓮柄　三五八
檸酸糖漿　一五六
輭繖擦藥　四三二
澱硫　三三七
鋅沘消水　一一八
鋅沘臭浮酒　一一八
鋅錄氯塩　二一四
鋅安息礬　三六九
獨脚蓮膏　三五八
濃醇酒　一二一
檸檬汁　一五六
輭火棉酒　四三三
澱鐠碳强礬　四三七
鋅沘强消水　一一八
鋅氯塩　一〇六
鋅錄氯塩抹膏　二一四
鋅醋礬消水　三九〇
獨脚蓮流膏　三五八
濃硫强酸　二三九
檸檬糖漿　一五六
糖鐵氯塩　一九三
澱鐠硫强礬　四三七

辣菜貼膏　一四八
蒲　二四三
蒜糖漿　三九四
氮　四二三
熏　法　二
幔　帳　五二一

十五畫

銶　二一〇
銶氯强塩　二一六
銶氯强塩　二二四 四二二 四五八 四八八
銶油礬　二二一
銶白土　二二〇
銶　三七一
銶氮塩　一〇八
鋰檸礬　三六八
氯　二二三
氯　酒　二二七
鴉片雜散　六〇
鴉片酒　五九
鴉片醋　六〇

辣菜花酒　一四八
蒲　膏　二四三
蜜　三二一
輔香酒　四二六
製香糊藥之法　五〇八

銶氯弱塩　二一七 三四二 三六三
銶氯弱塩　二二二
銶黃洗藥　二二三
銶柳礬　二二一
銶丸塊　三一七 三四二
銶硫礬　三七一
銶氯塩　二三一
鋰柳礬　三六八
氯抹膏　二二七
鴉　片　五五
鴉片膏　五九
鴉片葡酒　六〇
鴉片丸　五九

赫囉印　六五
蒲流膏　二四四
蜜玫瑰　三二二
輕瀉雜丸　三四七
製芥末糊藥之法五〇八

銶氯弱塩雜丸　二一九
銶氯强塩抹膏　二一六
銶黑洗藥　二一六
銶核礬　二四九
銶擦藥　二二〇
銶柳礬　三七一
鋰　三六八
鋰氮礬　一〇八
氯强消水　二二七
鴉片散　五九
鴉片流膏　六〇
鴉片錏泚酒　六〇
鴉片擦藥　六〇

赫囉印氯塩　六五
蒜　三九四
槐花青三三三
熏幾阿蘇之具　二七六
製松節油熱袱之法　五〇九

銶氯弱塩抹膏　二一九
銶氯强礬消水　二一六
銶油抹膏　二二一
銶抹膏　三二〇
銶貼膏　二二一
銶乳礬　三七一
鋰碳强礬　三六八
鋰安息礬　三六八
氯雜消水　二二七
鴉片表散　六〇
鴉片貼膏　六〇
鴉片樟腦酒　五九
鴉片砂藥　五九

路卑利 一一二 三九一
煉蜜 三三一
煖貼膏 四一五
滿油 三九五
電引藥法 五三四

十四畫

鈒白礬 一六六
鈒沘 四二一
鈒醋礬 三六四
鈒氰强礬 三六五
鈒氯塩 一〇二
鈒藍洽 四八〇
酵母花酒 三二一
銨 一四一
銨鈒菓礬 一四一 三九一
銅 一八〇
銀脭礬 一八五
熆柳礬 二九五
辣椒 三二二 四一六
辣椒酒 三二一四
路卑利酒 一一三
煉牛膽 四五五
煤油蠟 四三一
禁用之狀 十
鈒檸礬 三六四 三九一
鈒沘消水 三六四
鈒錳上礬 四〇五 四五九
鈒碳强礬 三六四
鈒氯塩 二二八
鈒鍋潰藥 四四〇
酵母花精 三二一
銨散 一四四
銨鈒菓葡酒 一四四
銅礬塊 一八一
銀核礬 四八一
熆氯塩 三九二
辣椒流膏 三二五
辣椒散 三二四
路卑利流膏 一一三
煉松節油 三七一
塩消水 五四二
溜筒熏具 五二
鈒鈉菓礬 三五三
鈒沘銷弱莠 四二一
鈒氰弱礬 一一〇
鈒氯强礬 三六六
鈒氯塩抹膏 二三〇
酵母花 三二一
酵母花精冲藥 三二一
銨硫粉 一四一
銨鈒菓雜丸 一四四
銅砒弱礬 一八〇
銀氰强礬 一八一
熆氯塩 五一
辣椒抹膏 三二五
辣椒脂柄 三二五
路卑利伊打酒 一一三
煉鍋碳强礬 四四一
鈰草礬 一七五
滅穢之法 五一〇
鈒氰菓礬 三六五
鈒砒弱礬消水 二〇八
鈒砂强礬 四八六
鈒氯强礬餅 三六八
鈒氯塩鹼擦藥 二三〇
酵母花精脂柄 三二一
酵母花精脂柄流膏 三二一
銨弱莠 一四一
銨鈒菓抹膏 一四四
鈒低鐵藍洽 一八一
熆氰弱浮酒 二九 三九〇 三六三
熆氯塩 五三
辣椒貼膏 三二五
辣菜根 一四八

堪阿大脂楠　三七七
猶柔分　二三六
猶袱毛　四五八
腎上㯶　二四六
氰强酸　四二三　四八六中
强葡酒　一二二
菓　酸　一五五
堪杜然勾　四八五
猶肯氯塩　九四
柄抹膏　四一七
腎上㯶精　二四七
菴弭羅　三三四
靭銀丹　一八三
酥　酪　五五二
胚　梅　四五二
猶他民印　四七六
柄蠟抹膏　四一七
腎上㯶精氯塩　二四七
牌㯶消水　二四六
植瀉丸　三五五
蛭吸血法　五三六
胚梅消水　四五三
猶達森　四八三
柄蠟雜抹膏　四一七
氰氯下洽　三五
賀氏樟腦調藥　四八二
搜阿羅　三四四
單被裹法　四九五
備病者飲食之法　五四七

十三畫

鉍　一七二
鉍　莠　一七三
鉍雜餅　一七三
鉦氯塩　四二一
鉦甘松礬　二三
鉛　一六七
鉛醋礬　一六九
鉛醋下礬消水　一七二
鉛氯塩　一七一
愛冬流膏　三七五
硼强酸　四六五
鉍檸礬　一七二
鉍安息礬　一七四
鉍碳强礬　一七二
鉦硫强礬　一七五
鉦烊硫礬　四八二
鉛貼膏　一七二
鉛醋抹膏　一七〇
鉛醋下礬擦藥　一七二
鉛氯塩貼膏　一七一
愛冬冲藥　三七五
硼絨布　四六七
鉍錏檸礬　一七二
鉍柳下礬　一七五
鉦　莠　一七六
鉦醋强礬　一八〇
鉦碳强礬澱　一七九
鉛碳强礬　一七〇
鉛醋雜肛彈　一七〇
鉛醋下礬甘油　一七二
鉛氯塩抹膏　一七一
齊瑣便　一四八
硼强酸甘油　四六七
鉍錏檸礬消水　一七三
鉍加泐下礬　一七五
鉦莠抹膏　一七六
鉦氯塩消水　四二二
鉛弱莠　一七二
鉛氰强礬　一七二
鉛醋鴉片丸　一七〇
鉛醋下礬蠟膏　一七二
愛冬葉　三七四
齊瑣便抹膏　四一八
硼强酸抹膏　四六七

十二畫

鈉　四三五
鈉沈　四三六
鈉氯鹽　二三一
鈉氪鹽　一〇八
鈉氙鹽　四三五
鈉溴攀　三六九
鈉山道年　四四六
幾阿蘇水　二七八
幾阿林　四六三 四九一
貴林　二五七
貴尼甸　二六三
貴林甘松攀　二三 二五〇
無食子　一六一
無臭鴉片　五九
烯醇餅　二七四
黑根　三三六
黑芥　四一五
渣笠　三五三
渣笠酒　三五四
鈉醋攀　四三五
鈉硫强攀　三五二
鈉氟弱攀　一一二
鈉砒强攀　二零八
鈉硫下攀　四三六
鈉柳攀　二九五
鈉硼烘攀　四六四
幾阿蘇調水　四七八
幾阿蘇碳强洽　二七八
貴林氯鹽　二六〇
貴尼甸硫强攀　二六四
替利賓　三九九
無食子酒　一六一
無臭鴉片酒　五九
烯醇肛彈　二七四
黑根膏　三三七
黑披那　四七三
渣笠柄　三五四
堪阿大麻　三八二
鈉沈消水　四三七
鈉硫强攀　三五二
鈉伊替攀　四三六
鈉砒霜攀　二四八
鈉烯硫攀　四八二
鈉煙强攀　四八六己
鈉硼烘攀蜜藥　四六五
幾蘇雜消水　四六四
蕁麻油　三三九
貴林雙氯鹽　二六〇
貴林硫强攀　二六〇
替品那　四〇一
無食子抹膏　一六一
烯醇　二七一 四六三 四八九
烯醇甘油　二七四
黑根精　三三七
琥珀　四一九
渣笠膏　三五四
堪阿大精　四一七
鈉氯碳强攀　四三五
鈉硫强攀雜消水　三五三
鈉伊替消水　四三六
鈉砒攀消水　二〇八
鈉砂强攀　四八六
鈉煙强攀消水　四八六己
幾阿蘇　二七五
幾阿蘇抹膏　二七八
蕁麻油調水　三四一
貴林炭匿攀　二六〇
貴林雙硫强攀　二六〇
替耳品沈　四〇〇
無食子鴉片抹膏　一六一
烯醇抹膏　二七四
烯他林　三四七
黑根流膏　三三七
琥珀油　四一九
渣笠雜散　三五四
堪阿大桶貼膏　四一七

十一畫

麥奴　四〇七
麥奴印　四一〇
黃茉莉　一一三
黃氯　二三一　四九〇
莫非　六四
莫非菓礬　六四
莫非雜散　六四
淡醋酸　一五六
淡皇强酸　一九八　四八六乙
淡醇酒　一二一
硫　一九九
硫油　一九九
畢澄茄酒　四八六庚
畢澄茄酸　四八六己
硫餅　三三九
康畀箭毒　一三三　三六三
魚石諸　二四四
莎拉耨　四七八
假乳　五五九
麥奴膏　四〇九
麥奴射藥　四〇九
黃茉莉酒　一一四
黃氯抹膏　二三四
莫非肛彈　六五
莫非菓礬消水　六四
莫非硫强礬　六四
淡硫强酸　二三九
淡氰强酸　四八六乙
淡銀丹　一八三
硫丸　一九九
畢澄茄　四八六己
畢澄茄散　四八六庚
硫　三三七
硫强酸　一九六　四二二
康畀箭毒精　一三四
魚肝油　二三七
荷蘭酒　一二一
乾熱氣　五二一
麥奴流膏　四〇九
麥奴葡酒　四〇九
黃茉莉流膏　一一四
黃銶强酸　二二一
莫非醋礬　六四
莫非氯塩　六四
莫非射皮藥　六五
淡硫强酸　一九七
淡氫氮酸　四八六庚
淡鉛醋下礬消水　一七二
硫浮酒　二〇〇
畢澄茄油　四八六庚
畢澄茄餅　四八六庚
硫抹膏　三三七
陽葛　一六五
康畀箭毒膏　一三四
袱毛顛　四六八
腥氯塩　二五〇
麥奴冲藥　四〇九
麥奴鋁沱酒　四〇九
黃氯肛彈　二三四
黃銶强礬抹膏　二二二
莫非醋礬消水　六五
莫非氯塩消水　六四
莫非衣必格餅　六四
淡氫氯强酸　一九七
淡氫藍酸　一五四
淡高銶氰强抹膏　二二一
硫甘香酒　二〇〇
畢澄茄流膏　四八六庚
畢澄茄脂柄　四八六庚
硫糖菓　三三九
陽葛流膏　一六五
康畀箭毒酒　一三四
袱毛消水　四五八
粒鐵硫强礬　一九五

哥拜巴　三八〇
哥拉　六九
寇卡　八九
寇第印　六五
烏伐　三七四
高鐵沈　一九三
高錳硫强礬　二二三
高嶺土　四三四
海葱　三六一　三九五
海葱酒　三六一
馬兜鈴　三二五
馬前子　九七
倍辛　四五一
倍羅拏　四七二
草烏頭　一四八
栝樓　三六〇
索弗拿　七六
淨硫　二三七
射皮內法　二
針刺法　四八七
哥拜巴油　三八一
哥拉糖漿　七二
寇卡印　八九
寇第印糖漿　六六
烏伐膏　三七四
高錳弱泰濕　一九六
高銅硫强礬　一八〇
高嶺土糊藥　四三四
海葱醋　三六二
海葱糖漿　三六二
馬兜鈴酒　三二六
馬前子酒　九九
倍辛香酒　四五一
烻藍色　四六七
草烏頭酒　一五一
栝樓酒　三六〇
唎瑣辛　二八五
胸欄　二四八
射肛內法　三
浸潤痲法　九一
哥拜巴塊　三八二
哥拉呑　六八
寇卡流膏　九三
寇第印硫强礬　六五
烏伐流膏　三七四
高鐵硫强礬　一八七
高錳氫强抹膏　二二一
純阿羅　三四六
海葱醋蜜　三六二
海葱雜糖漿　三六二
馬兜鈴流膏　三二五
馬前子膏　九九
倍辛廿油　四五一
烻氯藍　四七一
草烏頭流膏　一五一
埃　多　二三四
破特酒　一二二
戕氯弱礬　一〇九
射盬之法　五三四
病者之飲食　十三
哥拉瑣　七五
哥拉阿米　七四
寇卡印氯藍　九三
寇第印硫强礬　六五
烏伐冲藥　三七四
高鐵硫强礬消水　一九一　四二三
高錳氫强礬消水　二二一
純鈹硫弱洽　一四一
海葱流膏　三六一
海葱雜丸　三六二
馬兜鈴冲藥　三二六
馬前子流膏　九九
倍辛消水　四五一
烻替連氯藍　四七一
烏羅遶品　四七一
挨拉木　四六九
倭瓜子　四四七
侯阿刀便氮藍　八八
射肛育物　五五一
帶身邊之吸具　五二九

英枯牌棚　二四五
哈瑪米利酒　四八六己
哈瑪米利抹膏　四八六己
柳　精　二九六
香　葛　一六五
香　散　三二〇
挪代肯　四七六
紅葡酒　一二一
思寐那　四七四
洗胃之法　五三五
食物射肛　三

十畫

哥羅芳　四二
哥羅芳酒　五〇
哥羅新膏　三五五
哥枝禁印　二四一
哥枝禁子酒　二四一
哥　念　一一五
哥念酒　一一六
哥　蘇　四四四

枯鐵硫强礬　一九五
哈瑪米利消水　四八六己
韋拉抵印　一四七
柳　酸　二八八
香葛流膏　一六五
香　酒　五五九
流悱醇　二七四
紅鐵强礬　二二二
皇强酸　一九八　四八六乙
洗腸之法　五一二
孩童大麥湯　五五六

哥羅芳水　五〇
哥羅芳莫非雜酒　五〇
哥羅新雜膏　三五四
哥枝禁膏　二四一
哥枝禁葡酒　二四一
哥念印　一一六
哥念膏　一一六
哥蘇流膏　四四四

枯鈉硫强礬　三五三
哈瑪米利流膏　四八六戊
韋拉抵印抹膏　一四八
柳酸抹膏　二九三
香硫强礬　一九七
香糊藥　五〇八
流煤油蠟　四三一
紅鐵强礬抹膏　二二二
度鮑司印　四七四
俄國浴法　五一八

哥羅芳勻藥　五〇
哥羅新　三五四
哥羅新雜丸　三五五
哥枝禁根膏　二四一
哥枝禁子葡酒　二四一
哥念汁　一一六
哥念流膏　一一六
哥大林印　四一二

哈瑪米利　四八六戊
哈瑪米利烝流膏　四八六戊
韋拉抵印油礬　一四八
香鎊碳强礬散　四四一
香鎊碳强礬鴉片散　四四一
挪色分　二三六
厘厘酒　一二一
相思子　四一九
度鮑司印硫强礬　四七四
泉水醫病法　五三八

哥羅芳擦藥　五〇
哥羅新鬧羊花丸　三五六
哥枝禁　二三九
哥枝禁子流膏　二四一
哥羅顛　四八四
哥念氣　一一六
哥念抹膏　一一六
哥大林印氯塩　四一二

洋桂水　三一七
洋鼠李　三三三
洋升麻　三三三
洋苦瓜汁　三五八
洋鈴蘭　一三七
洋茯苓　二四二
洋茯苓雜糖漿　二四二
洋斑蝥蠟膏　四一五
洋郁李　三一四
洋郁李酒　三一五
洋杏仁　三一五
洋杏仁湯　五五九
炭匿酸　一五九
炭匿酸餅　一五九
胡麻子油　四二七
胡椒精　三三二
砒　二〇一
砒弱氣鹽　二〇八
派門他　三一九
枯牌棚　二四五
洋杜仲三三四
洋鼠李膏　三三四
洋升麻酒　三四
洋苦瓜汁精　三五九
洋鈴蘭精　一三七
洋茯苓流膏　二四二
洋斑蝥　三八二 四〇五 四一三
洋斑蝥貼膏　四一五
洋郁李流膏　三一五
洋蘇冰　二八四 四四九
洋杏仁油　三一六
苦辛　四四四
炭匿酸抹膏　一六〇
炭阿西呑　四〇六
胡麻子散　四二七
胡椒糖菓　三三二
砒弱酸　二〇八 四二一
祂透　四六二
派門他油　三一九
枯腎上棚　二四七
洋杜仲膏　三三四
洋鼠李流膏　三三四
洋升麻膏　三四
洋苦瓜汁精雜散　三五九
洋鈴蘭酒　一三七
洋茯苓雜流膏　二四二
洋斑蝥酒　四一四
洋斑蝥抹膏　四一五
洋郁李糖漿　三一五
洋澤漆　三三五
洋杏仁勻藥　三一六
苦洋杏仁油　三一六
炭匿酸廿油　一六〇
炭阿西呑油　四〇六
胡　椒　三三二
風呂草　一六四
砒弱酸消水　二〇八
祂他連　四六二
派門他水　三一九
枯白礬　一六七
洋杜仲乾膏　三三四
洋鼠李香糖漿　三三四
洋升麻流膏　三四
洋苦瓜汁精乳糖散　三五九
洋鈴蘭流膏　一三七
洋茯苓濃雜消水　二四二
洋斑蝥火棉酒　四一五
洋斑蝥消水　四一五
洋郁李冲藥　三一五
洋澤漆流膏　三三六
洋杏仁粉包　五五七
苦洋杏仁消水　三一六
炭匿酸肛彈　一六〇
胡麻子　四二七
胡椒脂褊　三三二
風呂草流膏　一六五
砒鋅氣鹽消水　二〇八
祂透鉍礬　四六二
派怕拉辛　三七〇
枯鍇硫强礬　四三七

玫瑰水　一六三
玫瑰蜜　一六四
非菏　四二五
披路加便氣塩　三八九
芥　三二二
怪阿克桷　二四二
怪阿克酒　二四三
郁加列　二六五
怕拉第亥　七七
兒　茶　一六一
兒茶酒　一六三
沸鎂檸礬　三五二
沸鈉硫强礬　三五三
乳　糖　三六三
乳油渣　五四九
直　分　一四五
宜用之狀　十
呼氣之具　五二六

九畫

洋桂　三一六
玫瑰糖漿　一六四
非利瑪　四四六
非菏漿　四二五
披路加便氣强礬　三九〇
芥　紙　四一六
怪阿克調水　二四三
怪阿寇　二七九
郁加列托　二六六
佳　奴　一六二
兒茶散　一六二
兒茶雜酒　一六三
沸鎂硫强礬　三五一
沸鈉流强礬　三五二
乳寇吞　三〇九
來　蘇　四六三
畀兒酒　一二二
和動練法　五〇四
呼吸氣具　五二六
洋桂油　三一七
玫瑰水抹膏　一六四
非利瑪流膏　四四七
非菏糖漿　四二五
芥擦藥　四一六
芥　油　四一六
怪阿克桷餅　二四三
怪阿寇抹膏　二七九
郁加列油　二六六
佳奴酒　一六三
兒茶餅　一六二
芬阿西吞　三〇七
沸鋰檸礬　三六八
芸　香　四〇五
乳腺膏　二五二
芫荽油　四〇六
服　法　二
放蛋血法　五四四
油麥麵湯　五五七
洋桂香散　三一七
玫瑰酸冲藥　一六四
非利瑪脂桷　四四七
披路加便　三八九
芥末糊藥　五〇八
怪阿克　二四二
怪阿克鋅沈酒　二四三
怪阿寇碳强洽　二八〇
怕怕印　四五三
佳奴雜散　一六三
兒茶雜散　一六二
芬歐蔻氣塩　三〇九
沸加非印檸礬　一三七
芸香油　四〇五
乳汁酒　五五七
易化鐵硫强礬　一九三
服藥之癖忌　九
空氣醫病法　五三九
使鋅氣弱塩變氣機　二一二
洋桂浮酒　三一七

辛那雜酒　三四九
辛那濃消水　三四九
佛茄兒葉　八八
佛茄兒酒　八八
赤蘇膏　一六三
沛斯阿　四七五
杜　松　三七五
沙　芬　四〇五
低鐵氮塩　百八九
卵黃素　二五一
利沛年　二五二
冷水蟠　四九三
吸出血法　五〇九

八畫

金印草　四一〇
金印草印　四一二
金雀花汁　一三九
松節油勻藥　三七九
松䓛油　三九五
松　䓛　四一七
辛那冲藥　三四九
豆　蔻　三一九
佛茄兒膏　八八
佛茄兒印　八八
沛利拉　三七三
沛斯阿膏　四七五
杜松油　三七六
沙芬油　四〇五
低鐵砒强礬　百八八
卵腺膏　二五〇
似寇印　四七六
冷水揸身　四九六
吸氣練法　五二三

金印草流膏　四一二
金印草酒　四一二
松節油　三七七　四一六
松節油熱袱　五〇九
松䓛抹膏　三九六
玫瑰花　一六三
辛那雜冲藥　三四九
豆蔻酒　三二〇
佛茄兒流膏　八八
赤蘇木　一六三
沛利拉流膏　三七四
沛斯阿流膏　四七五
杜松浮酒　三七六
沙芬流膏　四〇五
伯蘭地　一二一
何婁肯　四七五
冷　法　四九二
冷濕布生汗法　五一九

金印草甘油　四一二
金雀花　一三八　三六三
松節油抹膏　三八〇
松節油醋擦藥　三八〇
松䓛葡酒　三九六
玫瑰流膏　一六四
辛那雜調水　三四九
豆蔻雜酒　三二〇
佛茄兒抹膏　八八
赤蘇煮水　一六三
沛利拉冲藥　三七四
杜松冲藥　三七六
杜松雜浮酒　三七六
低鐵硫强礬　一八七
伯蘭地雜酒　一二一
何婁肯氯塩　四七五
冷水沐浴　四九五
沐浴抬板　五〇二

金印草印氯塩　四一二
金雀花冲藥　一三九
松節油擦油　三八〇
松　䓛　三九五
松䓛糖漿　三九六
玫瑰糖菓　一六四

伊賽　四六九
冰袋　四九三
肉精　五五六
防禦法　四八七

七畫

阿羅　三四四
阿羅丸　三四六
阿羅酒　三四七
阿刀便　八一
阿刀便鱗片　八七
阿魏　二三
阿魏酒　二四
阿摩特　三九七
阿波冷　四八六辛
阿利品　四七七
辛寇那膏　二六四
辛寇那酒　二六四
辛寇年　二六三
辛伊加酒　三九九
辛那　四四八
冰醋酸　一五六
肉蔻　三一八
肉湯　五五五
安息療法　五三六
阿羅精　三四四
阿羅鐵丸　三四六
阿羅膏　三四七
阿刀便抹膏　八七
阿大那　一三九
阿魏丸　三四
阿虞雜丸　二四
阿摩特調水　三九七
阿西大　四四三
阿托益　二〇九
辛寇那流膏　二六四
辛寇那雜酒　二六四
辛寇年硫强礬　二六三
辛伊加流膏　三九九
辛那流膏　三四八
冰衣　四九三
肉蔻油　三一九
米湯　五五七
阿羅沒藥丸　三四六
阿羅乳脂丸　三四六
阿司炭尼利　三〇四
阿刀便硫强礬　八七
阿大那典　一三九
阿魏勻藥　二四
阿甫莫非　三三〇
阿匹林　二九八
阿色透　二三五
阿拉色熏具　四〇
辛寇那冲藥　二六四
辛寇泥甸　二六三
辛伊加　三九九
辛伊加冲藥　三九九
辛那糖菓　三四八
冰塊搽身　四九七
肉蔻酒　三一九
成人大麥湯　五五七
阿羅沒藥酒　三四七
阿羅雜煮水　三四七
阿司炭尼利雜散　三〇六
阿刀便硫强礬消水　八七
阿大那冲藥　一四〇
阿魏肛彈　二四
阿甫莫非氣盪　三三一　三九一
阿布田　三七四
阿噯利辛　四八三
辛寇那　二五七
辛寇那酸冲藥　二六四
辛寇泥甸硫强礬　二六三
辛伊加糖漿　三九九
辛伊加濃消水　三九九
辛那糖漿　三四九

瓜沙酒　三一一
冬綠油　二九五
布球酒　三七三
乍波蘭的　三六三 三八五
代漚尼　四〇三
卡瑪拉　四四九
台歐那　七七
皮下灌鹽水法　五二二

六畫

衣必格　三二七 三九一
衣必格醋　三三〇
衣必格餅　三二九
亥歐賽民　六七
安息香　三九九
安息香酒　三百
血　根　三九八
印度麻　七九
印度龍膽草　三一四
印度龍膽草酒　三一四
灰消水　四四〇
瓜沙冲藥　三一一
布球　三七二
布哥拉七五
乍波蘭的酒　三八九
代猶嘯黍　三八三
去沫蜜　三二一
用藥之法　二
用飲食管之法　五一五
衣必格流膏　三二九
衣必格糖漿　三二九
衣必格葡酒　三二九
亥歐賽民氮盬　六七
安息香酸　二九九
安息香雜酒　三百
血根醋　三九八
印度麻酒　八一
印度龍膽草膏　三一四
印度龍膽草冲藥　三一四
伊　打　三七
冬綠　三九五
布球流膏　三七三
布羅吞　四七八
乍波蘭的流膏　三八九
司寇坡拉印　四八六丁
左糖　四二七
用藥得輔效　八
用洋斑蝥之法　五〇九
衣也格雜散　三二九
衣必格鴉片酒　六〇
亥歐辛　六七
亥歐賽民硫强礬　六七
安息香酸餅　三百
安替派林　三百
血根酒　三九八
印度麻膏　八一
印度龍膽草流膏　三一四
灰色油　二一九
伊打酒　四〇
冬綠浮酒　二九六
布球冲藥　三七三
布羅方　四〇二
乍波蘭葉散　三八九
司寇坡拉印紙盬　四八六丁
以利準油　三七六
外惹內效之法　五〇六
衣必格海葱丸　三三〇
衣必格鴉片散　三九〇
亥歐辛氮盬　六八
安他莫便　四一七
安息香豬脂　三百
安息衲透　四六三
血根流膏　三九八
印度麻流膏　八一
印度龍膽草濃消水　三一四
灰擦藥　四二七 四四一
伊打雜浮酒　三一

引呼吸法　五三三
化腥粉蠟湯　五五一

五畫

甘草　四二五
甘草膏　四二六
甘油　四二九
甘油肛彈　四二九
甘油橈　四三〇
甘油氫弱礬　百一一
甘松　二一一
甘松酒　二二一
甘露　三三三
白柴油　三二五
白芥　四一五
加林啤酒　三一四
加拉巴豆膏　百〇一
加沥酚　百六〇
石榴印　四四八
石榴印氯鹽　四四八
瓜沙　四一一
化腥梅粥　五六〇
水浸烤麵包　五五九
甘草流膏　四二六
甘草雜散　四二六
甘油倍辛　四三〇
甘油卡喇坎　四三〇
甘油硼強酸　四三〇
甘油氫弱礬輪　百一二
甘松油　二二一
甘松冲藥　二二一
甘洋杏仁散　三一六
白柴浮酒　三二五
白樹樹　百六三
加林啤流膏　三一三
加拉巴豆酒　百〇一
加非印　百三四
石榴印炭匿礬　四四八
石榴根皮流膏　四四九
瓜沙膏　三一一
化腥梅牛乳　五五〇
厄司馬克氏熏具　四七
甘草純膏　四二六
甘草鉍沈　四二七
甘油炭匿酸　四三〇
甘油鈉硼烘礬　四三〇
甘油非醇　四三〇
甘油氫弱礬消水　百一二
甘松酸　二二一
甘松鉍沈酒　二二一
甘洋杏仁勻藥　三一六
白葡酒　百二一
加林啤根　三一三
加林啤冲藥　三一四
加沥烘酸　四二三
加非印梅礬　百三七
石榴印硫強礬　四四八
石榴根皮煮水　四四九
瓜沙流膏　三一一
化腥糙牛肉　五五〇
甘草雜調藥　四二六
甘草鴉片餅　四二六
甘油鈰鈸硫強礬　四三〇
甘油鉛醋礬抹膏　四三一
甘油鉛醋礬　四三〇
甘油氫弱礬浮酒　百一二
甘松流膏　二二一
甘鐵碳強礬　百八九
甘洋杏仁糖漿　三一六
白煤油蠟　四三一
加林啤濃消水　三一四
加拉巴豆　百〇一
加酒顛茄膏　八七
石榴根皮　四四八
石榴印氪鹽　四四八
石灰　四四〇
瓜沙濃消水　三一一

藥味醫法目錄

二畫

丁　香　三一七

三畫

大　黃　三四二
大黃膏　三四四
大黃酒　三四四
大黃流膏　三四三
士金無年　三五六
士的年氣塩　九九
士拜枝喇　四四三
山道年　四四四

四畫

厄司連　百〇一
厄米汀　三二九
毛地黃酒　百三一
巴豆油　三五九
巴阿羅　三四四
木　炭　四五三
火吸罐法　五〇九

丁香油　三一八
大黃冲藥　三四四
大黃香酒　三四四
大黃雜散　三四三
大花仙人掌　四八〇
士金無年桶　三五六
士的年氣礬　九九
士拜枝喇流膏　四四三
三幾蘇　四六八

厄司連柳礬　百〇二
厄司阿金　三〇九
毛地黃葉　百三一
巴豆油擦藥　三六〇
巴阿羅膏　三四七
木炭糊藥　四五三
不吸血法　五〇九

丁香冲藥　三一八
大黃濃消水　三四四
大黃雜酒　三四四
大黃雜丸　三四三
大花仙人掌酒　四八〇
士金無年雜丸　三五六
士的年硫强礬　九九
士拜枝喇辛那流膏　四四三
土國之浴法　五一六

厄司連鱗片　百〇二
毛地黃　百二六　三六三
毛地黃冲藥　百三一
巴根地桶　四一六
火棉酒　四三二
升　硫　三三七
不符之藥　十

入冷水法　四九四
大黃香糖漿　三四四
大黃糖漿　三四四
大黃鈉氫碳調水　三四四
大花仙人掌流膏　四八〇
士金無年雜散　三五六
士的年氣塩消水　九九
山道年藥餅　四四五

厄司連硫强礬　百〇二
毛地黃膏　百三一
毛地黃流膏　百三一
巴根地桶貼膏　四一七
火棉止血藥　百六〇
匹克酸　二六六
引注血法　五四二

凝乳（JUNKET）此乳之製法、以牛乳一量磅、(500.0)置於瓶內、加胃凝梅少許、（藥行中有胃凝梅之藥輪可隨意購用）以熱水溫之、至如人身之熱度爲止、置於冷處、俟其凝結、食時加香料、或肉蔻、或凡匿拉少許、如病者胃甚虛弱、此乳不易消化、可飲其餘而未凝之乳汁、如欲食尤有育力之乳、製時可以雞卵一枚、攪勻、加於乳內、則育力自增矣。

化脛梅粥（DIGESTED GRUEL）此粥之製法、以油麥或大麥或小麥或藕粉、熬之成粥、（約半量磅）置於盤內、加冷牛乳半量磅、(250.0)再加化脛梅輪一枚、置於溫水內二十分鐘之久、再置於冰上、而後用之。

洋杏仁湯（ALMOND MILK）此湯之製法、以洋杏仁一或二兩、(30.0-60.0) 去皮、置於臼內、搗爛、隨搗隨加滾水一量磅、(500.0) 傾於鍋內、置於火上、沸之、越一刻鐘、以布過淋、再加滾水少許、使足一量磅 (500.0) 之數、不能飲牛乳之嬰孩、飲此大有養育之功、加白糖飲之亦可。

假乳（ARTIFICIAL MILK）此亦爲患糖尿症者所備、製法、以大瓶盛水一量磅、(500.0) 加乳皮半至一量兩半、(15.0-45.0) 搖勻、過十二至二十四句鐘、乳皮之脂、必浮於水面、以小勺輕輕撇出、置於盃內、加水少許、及卵青一枚、以箸或勺攪之、攪畢、其形似乳、再加鹽與撒卡林少許、嘗之味亦似乳、但其中所含者、脂類甚多、乳糖較少、初次製者、或未盡美善、數次後自合宜矣。

香酒（MULLED WINE）此酒之製法、以丁香、洋桂皮、肉蔻、與肉蔻花、各少許、加水數量兩、置於火上沸之、貯於瓶內、飲厘厘酒、或他類葡酒時、內加所備之香料、其多寡隨人意 再加白糖少許、如用苦酒必多加白糖方可 仍置於火上、使之滾沸、方可飲之。

水浸烤麵包（WATERED TOAST）此包之製法、以麵包切成薄片、置於火上、烤至棕色、勻抹乳脂、再撒塩少許、或欲撒胡椒末亦可、浸以滾水、使硬殼變輭、而後食之。

爲將杏仁之甜質取出、後將搗爛之杏仁、置於器皿內、加乳脂三兩、(90.0)雞卵二枚、攪勻、再加卵黃三枚、與塩少許、攪動片時、又以卵靑三枚攪而加之、置於鐵模內、以微火烤熟食之。

麩麵包 (BRAN BREAD) 此亦爲患糖尿症者所備、製法、以麥麩二升、置於滾水內煮之、一刻鐘、將麩傾出、過羅、如此二次、再於羅內加冷水滌之、至過羅之水無色爲止、不然、麩內必含糖質、恐與病者有損、過畢、以布包之、用力壓出麩內所含之水、薄攤於器皿內、上覆以鍋、置於極微之火上、終夜必乾、(不用此法恐難磨成細麵)以磨磨之、過極細之羅、過時必以刷催逼、不能過者、再磨再過、如此雖不能盡成細粉、亦所餘無幾矣、後用麩麵三或四兩、(90.0-120.0)雞卵三枚、乳脂一兩半或二兩、(45.0-60.0)牛乳半量磅、(250.0)先將雞卵攪勻、與乳少許、置於盌內調和、以所餘之乳與乳脂相合、另置一盌內溫之、後將二盌合而爲一、以麩麵加於其內、再加肉蔻或薑少許、攪令均勻、置於敷油之小鐵模內、烤於旺火上半句鐘之久、熟時麵包應厚四寸、三餐俱可食之、或與肉、或與牛乳餅、或與酥、同食亦可、但天氣潮濕之時、此麵包易攝水氣、須常置於火傍、烤至極乾、則不至發霉矣。

微火煮之、耗至一量磅之三分之二 (333.0) 爲止、後過以羅、方可飲之。

成人大麥湯 (Barley-Water for Adults.) 此湯之製法、以洋大麥一磅之四分之一、(125.0) 加水二量磅、(1000.0) 以微火煮之、耗至一量磅 (500.0) 爲止、過羅、加牛乳二量磅、(1000.0) 加伯蘭地與灰消水各六量兩、(180.0) 再加白糖少許、若加肉蔻檸檬皮亦可、此水大有養育之能、若凉飲之、其味美而異常。

油麥麵湯 (OATMEAL-WATER) 此湯之製法、以油麥麵一大勺、加水一量磅 (500.0) 熬之、至一量磅之三分之二 (333.0) 爲止、傾出過淋、飲時宜加卵青一二枚、以增養育之功。

米湯 (RICE-WATER) 此湯之製法、以大米二兩、(60.0) 加水四量磅、(2000.0) 煮至一句鐘爲止、方可飲之。

乳汁酒 (WINE-WHEY) 此酒之製法、以最佳之牛乳一量磅、(500.0) 置於火上煮之、至將沸時、加犀厘酒四量兩、(120.0) 不宜搖動、暑一見滾、立即撤下、俟凝酥沉澱之後、傾出其汁而飲之。

洋杏仁粉包 (ALMOND BREAD) 此粉包特爲患糖尿症者所備、製法、以洋甜杏仁四兩、(120.0) 浸以滾水、去皮、置於瓷臼內、搗爛、以布袋盛之、置於滾水內、過一刻鐘、加醋少許、

又法、以無脂無骨之牛肉二磅、(1000.0) 斸碎、置於瓶內、加冷水六量兩、(180.0) 置於熱水盆內、燉於火上、越四句鐘、方可用之。

肉精 (BEEF ESSENCE) 此肉之製法、以無脂之牛肉一磅、(500.0) 斸碎、置於瓶內、加雨水八量兩、(240.0) 再加氫氯酸五六滴、鹽五十至六十厘、(3.3-4.0) 搖勻、置於涼處、越三句鐘、傾於馬尾羅內、以勺畧軋之、當肉汁未出盡之時、宜漸加水二量兩、(60.0) 如此所得之汁色紅、味似肉湯、病者最宜涼飲、每次可飲八量兩、(240.0) 如欲熱飲、不可置於火上、只可置於有蓋之器具內、以熱水溫之方可、若病者忌食酸類、可以烝水代雨水製之。

又法、以嫩而無脂之牛肉一磅、(500.0) 斸碎、加鹽少許、置於有蓋之瓷器內、將蓋縫糊嚴、置於火上、以鍋覆之、越三四句鐘取出、以粗羅過之、每次用二三小勺、(8.0-12.0) 足矣。

又法、以無脂之牛肉一磅、(500.0) 斸碎、置於有蓋之器具內、加冷水半量磅、(250.0) 煨於微火之傍、必至四五句鐘之後、始移至火上、令其緩緩滾沸、再越二句鐘、除去淤沫、乃可用之。

孩童大麥湯 (BARLEY-WATER) 此湯之製法、以洋大麥二大勺、加水一量磅、(500.0) 以

第一餐、早七句鐘、以美蘭所製之食物一大勺、加熱水二量兩、(60.0)熱牛乳六量兩、(180.0)化而食之、或以麵團一或二小勺、(4.0-8.0)置於盌內、加熱水少許、隨加隨攪、使之勻和、再緩緩加牛乳六量兩、(180.0)隨加隨攪、調勻食之亦可。

第二餐、十句半鐘、以牛乳八量兩、(240.0)加灰消水二量兩、(60.0)飲之。

第三餐、午後二句鐘、與第二餐同。

第四餐、五句半鐘、與第一餐同。

第五餐、十句半鐘、與第二餐同。

麵團（The Preparation of Flour-Ball）此團之製法、將最高麥粉一斤、用布包緊、置於滾水內、自晨至晚、煮至一日、取出晾於案上、次晨剝去外層之濕麵、銼成細末、用一或二小勺、(4.0-8.0)置於盌內、加涼鮮之牛乳半量兩、(16.0)研之成醬、再加熱牛肉八量兩、(240.0)必須漸次加之、隨加隨攪方可。

肉湯（BEEF TEA）此湯之製法、以去脂之牛肉一磅、(500.0)臠碎、置於瓷器內、加溫水一量磅、(500.0)越一句鐘、傾於布上包緊、用力壓出所有之汁與水、置於鍋內、煨於微火上、頻頻攪動、一沸立即撤下、再加塩與胡椒末、調和飲之、但飲時必以勺攪勻方可。

二正歲之孩童 Diet for a Child Two Years Old. 所宜食者如左。

第一餐、早七句半鐘、食微煮之卵黃一枚、並麵包一薄片。（但麵包必用隔一日者）

第二餐、十一句鐘、飲牛乳一盃、食抹乳脂之麵包一薄片。

第三餐、午後一句半鐘、宜飲肉湯、將牛羊肉或烤過、或鱗碎去筋、食之、或食洋芋、（俗名山藥）豆或大米飯、或飲牛乳、俱可。（所用之多寡亦酌此孩之食量定之）

第四餐、六句鐘、與第二餐同。

所飲之水如前。

一正歲之孩童 Diet for a Child One Year Old. （一日宜用五餐） 所宜食者如左。

第一餐、早七句鐘、以牛乳八量兩、(240.0) 加煮熟麵團、（做法見下）二小勺、(8.0) 食之。

第二餐、十句半鐘、以牛乳八量兩、(240.0) 加灰消水二量兩、(60.0) 調勻飲之。

第三餐、午後二句鐘、以牛乳八量兩、(240.0) 加攪勻之卵黃一枚、調勻飲之。

第四餐、五句半鐘、與第一餐同。

第五餐、十一句鐘、與第二餐同。

半至一正歲之孩童 Diet for a Child from Six to Twelve Months Old. 所宜食者如左。

搖勻、再加酵 (Yeast) 半量兩、(16.0) 如力大者可少加之 將瓶口塞嚴、用繩結堅、因釀時氣力甚大必紲結其塞方免崩出之虞置於九十九至百度之熱水內、越八至十句鐘之久、提出置於冷處或冰上、用時必緩拔其塞、否則瓶內之乳、難免突然噴出、最妙之法、莫過於取三變酒之合頁管、可隨意用之、無論成人孩童、患重症後、當甫瘉之時、飲此大有養育之功、如味不甚酸、雖四五歲之孩童、亦易飲之。

養育孩童之食物表 (DIET LIST FOR CHILDREN)

此係養育孩童之醫院所定者、七正歲之孩童、患腸胃泗膜炎症、Diet in Gastrointestinal Catarrh for a Child of Seven Years. 所宜食者如左。

第一餐、早七句半鐘、宜飲牛乳、所飲之多寡宜酌本人之食量定之 每一玻璃盃牛乳、加灰消水四小勺、(16.0) 調勻飲之、並食微煮之卵黃二枚、將麵包切成薄片、烤焦食之、或食陳麵包亦可。

第二餐、十二句鐘、宜將羊排骨取出所有之脂、煎而食之、或烤牛羊肉一片食之亦可、隔二三日、可飲牛肉湯、食陳麵包、或以麵包如前烤焦、食之亦可。

第三餐、晚七句鐘、宜飲加灰消水之牛乳、並食陳麵包、或將麵包如前食之。

所飲之水、必須過淋或沸之方可、凡糕類之食物、宜少用之。

(150.0) 鸞而碎之、置於盌內、加鸞碎之腙腺一兩半、(45.0) 溫水三量兩、(90.0) 搖勻至成稠漿爲止、但此製只敷一次之用、如不用腙腺、以藥行所售之化腥梅輪代之亦可、猶有四類育物、製法如下、一將腙腺(150.0-200.0)置於臼內、加溫水搗研之、此水之熱、必至百度、乃爲合宜、後以布淋之、置於瓶內、加鸞碎無脂之牛肉、(400.0-500.0)並卵黃一枚、俟二句鐘之久、方可用之、此製足敷一日之用、但必須兩次射之、且射時其熱度必等於身體之熱度、方爲合宜、二以肉湯一量磅、(500.0)置於瓶內、加無脂之牛肉絲八兩、(240.0)再加倍辛一錢、(4.0)淡氫氯酸半量錢、(2.0)置於熱至九十九度之煖處、頻頻搖動、越四句鐘之久、方可用之、但熱度不可太過、恐化功停止也、三將牛乳二量兩、(60.0)濃肉湯二量兩、(60.0)卵黃一枚、腙腺消水一量錢、(4.0)共貯於瓶內、置於熱至百度之煖處、越一句鐘之久、方可用之、若病者過於虛弱、可加伯蘭地半至一量兩、(16.0-32.0)而後射之、四將雞卵一枚攪和、與牛乳六量兩(180.0)共置於瓶內、後加凝結之濃肉湯二三小勺、(8.0-12.0)再加腙鞣少許、每五六句鐘射一次、若病者虛弱、每次射時、可加伯蘭地半量兩。(16.0)

酥酪 (KOUMYSS) 此酪之製法、以牛乳一量磅、(500.0)置於酒瓶內、加白糖二小勺、(8.0)

湯、共置於大口瓶內、再加脛膏二十厘、(1.3)鈉氫碳强礬十五厘、(1.0)搖勻、置於溫煖之處、其熱以百零十至十五度爲合宜、每半句鐘搖瓶一次、至三句鐘之久、復傾於鍋內、置於火上、此次火宜烈速令滾沸、後用卵青清之、清之之法先將鍋撤下置於冷處數分鐘將卵青稍攪之加於其內以勻攪合復置火上湯一見沸其中所有之碎肉必與卵青粘合卽將鍋撤下越片時卵青與碎肉必皆沉澱或將湯傾出或以布過淋俱可再加塩與胡椒末其多寡宜隨病者之意用之、如病者胃經不甚虛弱、不可用卵青清之、卽其中少有碎肉、因受脛梅之化力、亦易被陳也。

化腥梅蠔湯 (PEPTONIZED OYSTERS)

此湯之製法、以無壳之蠔半茶盃、臠而碎之、置於盆內、加以去壳時所得之水、但壳內之水、多寡不等、多則可取其半、寡則宜盡用之、再加脛梅五厘、(0.35)鈉氫碳强礬二十厘、(1.3)將盆置於溫水內、此水之熱、以百度爲合宜、越十至二十分鐘、再將盆置於烈火上、一沸卽速撤下、不但免其過火、且能止脛梅之化力、再加塩與胡椒末用之。

射肛育物 (PEPTONIZED ENEMATA)

此育物之製法、與製化腥梅牛乳同、但未加脛梅之先、將雞卵一枚攪勻、加於瓶內、後以製化腥梅牛乳之法製之、如外加穀烝酒、或葡酒半至一量兩、(15.0-30.0)育力更增矣、但用時必須溫之方可、然專用育類射於肛內、則肛易被其惹、若專用一類之育物、被惹尤甚、故另有製育物之法如下、將無脂之牛肉五兩、

因其中之油並未提出也、但必用鮮牛乳、且於其中不可加滅稚之藥、（如祛毛等類泰西舊乳者多於其內加滅稚藥以防變壞）以乳酸素輪中含有乳酸稚也。

化腥梅牛乳（PEPTONIZED MILK）此乳之製法、用一盛二量磅之潔淨玻璃瓶、以腥梅十二厘、(0.72)和鈉氫碳強磬四十八厘、(3.18)置於其內、再加冷水八量兩、(240.0)搖勻、再加涼鮮牛乳一量磅、(500.0)以勻調勻、將瓶置於熱水盆內、水之熱度、以手能忍受爲合宜、如欲牛乳盡化、宜溫至二十分鐘之久、但尋常五分鐘足矣、如時過久、必致乳多成梅化能滲腥、其味變苦、當化功中程之時、宜將瓶提出熱水、置於冰塊上、以止腥梅消化、且乳不致變壞、如冰不便、宜將盆移於火上沸之、此亦止腥梅消化之一法也、但水一沸、速即撤下、塞住瓶口、置於冷處、方爲合法、（藥行中所常售者已製成藥輪每輪能抵此乳一量磅可隨意購之無煩自製）胃經虛弱者、如不能消化食物、飲此乳可免食滯之虞、如只欲助病者消化之功、備乳之法與上同、但不宜將乳瓶置於熱水盆內、只置於冰塊上、用時畧溫飲之可矣。

化腥梅牛肉（PEPTONIZED BEEF）此肉之製法、以無脂之牛肉四兩、(120.0)斸而碎之、置於鍋內、加水半量磅、(250.0)煨於火上、（此火不宜過烈）以大勺攪合之、煮至數分鐘、將湯傾於盆內、所餘之碎肉、用大勺搗研成醢、卽以此醢加冷水半量磅、(250.0)與傾出之肉

之、或加灰消水少許、俱可免凝結之患、如胃甚虛弱、不能消化牛乳、可加脆梅、俟數分鐘飲之、（詳見下文）如用肉湯、宜先以芹菜、或蘿蔔、或他類有味之菜、加於肉湯鍋內煮之、令菜味入於湯內方可。

乳油渣（BUTTERMILK）此渣之製法、以米粉二大勺、漸加新牛乳渣二量磅、（1000.0）宜隨加隨和、以免成塊、後置於火上、（火不宜猛烈）燉至十五至二十分鐘、即見滾沸、及時撤下、加白糖一至二兩、（30.0-60.0）灌入瓶內、嚴密封之、置於冰塊上、此乳即分二層、上層爲乳水、下層爲凝成小塊之酥醒、服時必先搖動其瓶、令乳水與酥醒合勻方妙、按此乳之油、既已提盡、育身之力較小、故用米粉加白糖以增其力、且以米粉作之、則乳不致結而成塊、孩童體重、每三磅服此乳三至六量兩、（90.0-180.0）如孩童育道有恙、大便含酥、宜於前一二日服牛乳汁或米湯、後漸服此乳方可、成人亦可服之、以其味甚厚、不必多服、頗能育身、且易於消化、但此乳新而佳者、不能常得、故宜用法備之、即以乳酸素輪壓碎、置於瓶內、加鮮牛乳二量磅、（1000.0）搖撼之、蓋嚴、置於熱至七十或八十度之居室內、居室愈暖、則成功愈速、越十二至三十四句鐘、此乳即成、後再將瓶置於冰箱內、此時即分二層、如欲服之、必搖令均勻方可、如此備法、則育身之功、較乳油渣甚大、

加胃化腥梅、與氣氳酸、以助其消化之功、以糖糓氣碳二類、能增人之精神力量、且能保全身胴、故亦宜用之、然以此二類相較、糖糓其最要者也、每有醫者、專用腥類養育病者謬矣、如將白米大麥小麥油麥等煮爛、用布淋之、以食病者、較專用腥類爲妙、如恐消化不易、宜加脫梅以助之、健壯之人、每日宜食糖糓類四百格（瓦）（400.0）、氣碳類百五十格、（150.0）、腥類百五十格、（150.0）、凡人所食之物、大約俱含此三類、但多寡不等耳、至於人之身內、本多含水、故又宜多飲水以助之、豫備飲食、最要者有數類、列表如左、

一　必須易消化之物。

二　不可過於淡薄、因病者虛弱、少食之不足育身、多食之難免勞力也。

三　必須易咽之物。

四　必須色味兼美、尤宜精緻。

如病者日飲牛乳、日久難免生厭、宜設法改其本味、或加加非、或加白糖、或加茶、若加鹽少許亦可、若將爲嬰孩所備之食物、（西國多將易化之物配合專備嬰孩所食）加於乳內、則能增其育力、倘牛乳入胃、凝結甚速、不易消化、或以大麥湯、（製法詳見於後）或以油麥麵湯、或以白米湯、一半加

第二十四章　論備病者飲食之法

人之所食者、可分三類、一腥類、多由動物而得、其中所含之氮質、最爲緊要、凡無脂之肉、皆係此類、惟卵青爲最純、由麥所得之穀膠（俗名麵筋）亦係此類、豆類亦有含腥者、名爲植腥、人食此類、有成身腑、並補腑之功、腦力肌力及身內熱度、皆得其輔助、二糖纇類、內含碳氣氫三質、其中之氣二氫、適足成水、最合宜者、即纇、澆膠、蔗糖、葡糖、乳糖等、人食此類、散於週身、即分化成水、與碳氫强洽、能增人之身力與熱度、但不似腥類、入人身腑甚易、必俟變成脂類、方能入之、有保身腑之功、人當用力或寒冷之時、若不用此類食物以補助之、其肌力並熱度、必由身腑而來、難免有耗腑之虞、三氣碳類、此類亦含氫質、但所含無幾、不足與氣盡化爲水、最常用者、即脂與乳脂等、人食此類、亦有助力與熱之功、其所異於糖纇者、因成脂甚易、此脂存於身內、當用力或寒冷之時、即變成熱與力、身內之腑、所以能保全也、故糖纇與氣碳、在多用力之人、必須多用、否則少用之、此三類食物、醫者於病人不可專用其一、而俟其見效、必察病勢相濟互用乃爲合宜、如患熱症者、身內之腑、消耗必多、宜多用腥類以育之、即肉湯、雞卵、筋膠等流質之物、蓋患此類症者、胃液缺少、消化之功用必不足、故宜多食流質之物、且於其中、宜

血流至該處、以至停積、若用此法、減其全身之血壓、則該處所積之血、因而散佈週身矣、患中瘋者、昔常以此法醫之、近有醫者、查明此非妙法。

第一百零七圖 第一百零八圖



此二圖係引注之具、皮下灌鹽水、亦可用之。

第一百零九圖



此二圖係二類空針、短者射皮用之、長者插盂用之。

者、方可用之、如健壯者患肺炎[1]、胸膜炎[2]、腦衣炎[3]、腹膜炎[4]等症、若放盂血、則血壓必減、而積血處之血、則自減矣、積血之患、始而緣於該處之血脈、較全身之血脈鬆輭、故順盂割一小口、切不宜稍著盂之下面、以小剪剪之亦可、若割口之血凝結不流、宜用已滅穉之布、將其凝結者、謹慎擦祛、及放血已足、解去布捲、以滅穉之布、覆於割口、另用一布捲裹之、此係醫病之妙法、惟血壓過大

1 Pneumonia
2 Pleurisy
3 Meningitis
4 Peritonitis

挿入、但此管必先蘸於塩消水內、以免盇血凝結之虞、後以末結之綫、結於挿管之處、管之入端、必須畧大、方不至退出、管之外端、連以四寸長之庫秋管、以量滴筒滿灌消水於庫秋管內、逼盡管內之空氣、後開引注具之管、使消水流出少許、不使空氣稍留其中、再以引注具之管、與入盇之管相連、撤去犬齒鑷、上提引注具、約高病者之臂二尺、令消水緩緩入於盇內、每二量磅 (1000.0) 消水、必需時半句鐘、消水甫入盇內、脉即見爲有力、呼吸亦漸復原、病者如有作燒之勢、亦常能減少、但自二分至三十分鐘之間、必覺寒顫過甚、或脉力速猛、及至過三刻鐘、面必發紅、生汗不止、或呼吸甚促、小便頻數、更有由肛出水者、然皆無妨、越數句鐘、自見實效、至於或痊瘉、或見大效、皆在於病原之輕重何如耳、如流血過多、與血中毒、卽膿菌毒與腎炎腦中毒 並糖尿症而致昏迷者、宜用此法醫之、亦可以醫癆瘵之患、此法能醫以上諸症者、除流血過多外、乃在速祛身內之毒也、但糖尿與腎炎久症、其效不久、惟流血或產後熱症、以此法醫之、則永不再犯矣、腎炎腦中毒、或產婦之癆瘵症、倘血壓過大、宜先放血、後用引注法可也。

放盇血法 (VENESECTION)

此法以布捲緊裹病者之臂、不宜過緊恐脉脘被壓而流血受阻也 令盇內血滿、鼓起易見、先以刀割盇上之皮、割口約半寸許、後割盇鞘、及見盇之藍色、再以刀刃向上、

鈉氯塩	Ammonii chloridi.	5.0
烝水	Aquæ destillatæ	1000.0 —M.

又方

錯氯塩	Calcii chloridi	0-25
鉀氯塩	Potassii chloridi	0.1
鈉氯塩	Sodii chloridi	9.0
烝水	Aquæ destillatæ (Sterilized)	1000.0 —M.

此方必先以法滅稚、用時置於火上、熱至百零一度、傾於引注具內、（見一百零七圖及一百零八圖）將病者之肘節前處、用滅稚之法、滅盡其稚、以布捲緊裹其臂、使盂顯露、以刀割開盂上之皮、用鉗上提盂鞘、緩緩剖之、令盂不連於鞘者約長半寸、用小而輭之犬齒鑷、夾住割口以上之盂、以免其血上行、用絲縛綫結住割口以下之盂、另用一絲縛綫、穿過盂下、不可結之、如此則鑷與綫中間之盂、血必滿足而鼓起、以小剪剪一微口、將小玻璃管

卸之亦然、卸後宜令躺卧半至一句鐘之久、方可移動、前數年常以此法醫脊腦後柱實症、近日鮮有用之者。

引注血法 (TRANSFUSION) 此法之用意、乃因人流血過度、醫者割他人之盂、以小管引血、灌入病者血脈內、亦有先去血內之絲腥、然後灌入者、此二法近少用之、因此血一入彼身、血內之紅朕、即已盡死、故病者腎經之功、非極其加增、不能祛此死朕也、且引注之後、血於脈內、每易凝結、非但無益、反有漂圍塞絡之損、並人身之血、彼此不同、用他人之血、引注病者身內、多不相宜也、曾有引注牛乳者、然亦不得謂爲妙法、蓋用後尿內含胎、亦必有漂圍塞絡之患、故不宜用、近日醫者、每用鹽消水射於臂或腿盂內、不但能醫流血過多之患、即血中毒症、亦能醫之、若射於皮內、較射於盂內尤妥、但其效遲緩、若病勢垂危、血運無力、必射於盂內、方能救之、如兼有痰腫之患、亦宜射於盂內、製鹽消水之法不一、有醫者用烝水百分、鈉氯鹽一分之十分之七、製成、即每二量磅(1000.0)烝水、加鈉氯鹽一錢半、(6.0)有二良方如左。

鈉硫强鬱 Rp-Sodii sulphas. 10.0

1 Hemorrhage
2 Toxæmia

第一百零六圖



此圖表明居山如何使肺經舒展、其實綫乃未居高山之胸膛、其虛綫乃已居高山之胸膛、

九 身體無力運動者。

十 年邁或嬰孩而患此症者。

十一 兼有尿胎之患者。

或云此症兼有瀉腹或食滯之患、不宜居之、然有此二症、每有居之而見效者、如兼有盜汗之患、居於高山大效、患此症而已成肺巢者、如巢不甚大、亦可居之、有人雖無肺癆症、而身體過於虛弱、時值冬令、如居溫暖之處、數月大有裨益、如值嚴冬之際、在寒冷之處、易犯瘵痺二症、若於溫暖之處、居之數月、可免此患。

懸法 (SUSPENSION) 此法乃以一滑車、懸於屋頂、中貫一繩、一端繫皮帶三條、一帶用以托首、一帶套於右腋、一帶套於左腋、令所托之分量、相差無幾、且首上所用之皮帶、必使合宜、勿令病者覺痛、於是執繩之一端、上提病者之身、離椅約高二寸、初用時、三日懸一次、每次半分鐘足矣、數次後、可日日懸之、且每次可懸十分鐘、但懸時切宜緩緩、

高山、得乾燥潔淨之空氣而見大效者、亦有居平原、得潮潤溫暖之空氣而見效者、故患此症、宜居何處、醫者每不能預定、惟試有益於病者、擇而居之、如多吐痰之癆症、居於高山有效、因空氣乾燥也、若兼有心經虛弱者、不宜居之、如氣腔發乾、浮海有效、或居空氣潮潤溫暖之處亦可、若有吐血之患、欲居高山、宜緩緩登之、或隔一日、或隔數日、始再上升、必須二或三十日、至其巔頂方可、如求速至、恐空氣淡薄、肺經未曾習慣、吐血反增也、如肺經缺舒展之功用、居高山有效、患肺癆症有不宜居高山者如左。

一 氣腔多受損傷者、
二 兼有氣腫之患者。
三 心經虛弱者。
四 屢作燒熱者。
五 驚懼不安或失寐者。
六 如係婦女、欲居高山、必須謹愼、此類婦女、不服水土者、較男子尤多。
七 肺經大受虧損、或症至晚程者。
八 患肺炎癆症者。

被阻、或積血、兼有易犯癲或痺症、其故大約因常好美食、身體虛胖所致、飲此水大效、熱道之人、肝經濕腦等被阻、或屢犯大便乾燥、致有育道發炎者、用此水有效、緣此類水多有含鈉硫强礬者、故有瀉效、空腹服之、瀉效尤顯、如於清晨服之、能瀉腹中之水、並腸內不正之液、且能散肝經之積血、每日宜飲一至四量磅 (500.0-2000.0) 不等、必酌病用之、第三類之水、其效多緣熱力、所含之礬鹽類多寡不等、能醫久皮並痺癲癩等症、水之熱自九十三至百五十度不等、病者如用此水、宜按熱篇用熱水法用之、否難見效、癲症、或重癩症、以此水浴之大效、用法、患癩症者、用熱至九十度之水、日浴一次、每次二十分鐘、浴畢他人以粗布拭乾、後以鋉抹膏搓其右股之內面、第二次搓其左股之內面、如此循環搓之每效、但用抹膏之多寡、必酌病用之、不可過一錢、(4.0) 第四類之水、原含硫鐵二質、亦有輕瀉之功、育道泗膜炎、或氣腦泗膜炎、以此醫之、每效、亦有用之以醫陰陽尿徑泗膜炎者、但無甚功效耳。

空氣醫病法 (CLIMATE)

此法常以之醫肺癆、氣腫、瘧症、或氣腦久炎等症、有效、最要者、宜擇少有陰雨之地、使病者居之、且宜多居房外爲是、但所擇之處、宜與室家相近、病者方不至有遠行之苦、更宜察該處之飲食房屋、果與病者有益否、患肺癆者、有居

十二句鐘、侍病者念誦書籍或報紙。
午後一句鐘、用午餐、宜食牛肉少許、或煎或烤俱可、其他無非肉湯及易消化之物。
三句鐘、用電氣。
四句半鐘、與午前十一句鐘同。
六句半鐘、用晚餐、宜食柔輭之物、且宜少食之、或食牛乳酥、或食克搭、（此乃牛乳與雞卵所作者）俱可。
九句半鐘、飲牛乳一盃、隨卽寢睡。
每日如此、病者必無煩厭之心、如用以上之食物、不能消化、必須少減、以此法醫病、足能保養其力、專於呼吸運血消化食物、雖身體虛弱、以不分心他事、則消化之力、有非他人所能測者、然必須如法盡行、否則難於見效。

泉水醫病之法 （MINERAL SPRINGS）

中華醫病之泉甚繁、因道路不通、鮮有知之者、故難指出所在、其醫病之故有四、一因水最純、二含鹼鬱類、三水出時含有熱力、四含硫鐵二類質、第一類之純水、能醫易犯尿酸者、因此類病、飲食過度、且少運動、致腎無祛渣之力也、或謂此水、有醫朘石之能、然實無此效、但能預防此患、以人多飲此水、因而多有小便故耳、第二類之水、內含鈉鐙鈣鎂等原質之鬱、故有利小便輕瀉之功、肝經

令病者躺卧二十至四十日之久、旁有小室、爲侍病者之居所、病者除見醫生與侍病者之外、俱當廻避、以免應對費其腦力、若病勢甚重、卽一飲一食、亦必侍病者哺之、切不可因躺卧煩悶、起坐片時、如欲觀書閱報、侍病者當代爲念誦、亦不可過一句鐘之久、一切梳洗之事、亦必侍病者代爲辦理、然身體必須活動、其法有二、一揉摸其全身、令血連行、二用隔路緩電、令全身之肌縮緊、此二法目用一次、半至一句鐘足矣、今將每日所宜用者、詳陳如左。

早七句半鐘、宜飲牛乳一盃、至於或冷或熱或加臙梅、則酌病而用之。

八句鐘、侍病者宜以溫水揸其全身、揸後用冷水揸之亦可、如是則皮與絡部、俱收被激之效、但揸時宜以絨被裹其身、惟留所揸之一處、揸畢再用粗布拭乾、隨搓其皮、使之發紅、以被覆之、另揸他處、至搓徧全身而後已。

八句半鐘、用早餐、所食之物、以雞卵或煮或沃或炒俱可、若食麵包、必切片烤焦、或食羊排骨、或食雞肉少許、亦可。

十句鐘、用揉摸之法。

十一句鐘、可飲牛乳一盃、或與伯蘭地同飲、或伯蘭地與雞卵同飲俱可。

蛭吸血法（LEECHING）

美國所用之蛭、有二類、皆出自歐洲、至於中華之蛭、今尚未詳、無論何處發炎、或積血、以蛭吸出患處之血、必效、吸時蛭自口中流出一種特別之液、能令血不凝結、常有齧破之後、而血流不止者、即係此液之力耳、患腦衣炎[1]者、以蛭置於左右顳與項等處、吸之有效、扭傷[2]而紅腫者、亦效、患陽腺炎[3]者、將蛭置於會陰處、（切不可置於陽莖）吸之、患睫炎[4]、或他類眼症、置於顳或耳後、（切不可置於眼上）吸之俱效、此法之妙處、不僅在吸血、且有外惹內效之益也、用法、未用此法之先、將該處洗淨、以蛭置於小玻璃盂內、合於患處、以免逸出、如其不吸、以乳加糖或血少許、敷於該處、引之亦可、如吸血已足、仍吸不止、可以鈉氯鹽撒於其身、則必立止、每一蛭能吸血約一量錢（40）吸畢、宜洗淨該處、以止血流、如終不止、宜以絨布蘸止血之藥覆之、用布捲纏裹、其血必止、吸處所留之瘢痕、雖不甚大、究不可用於面上也。

安息療法（REST CURE）

每有病者、形似沉重、及詳查各經、皆無確症、其故大概由於過勞耳、如壯婦扶持病者、因日久用力過度、或致成積症、血虧、消瘦、腰痛、卵腺痛、腦系痛、月經不調等患、男子或因勞心過甚、以致精力疲乏、形容枯槁、凡此諸病、用此法俱效、蓋此類病者、腦力既已耗盡、醫者宜設法休息其腦、不使稍用其力、宜備一寬闊之室、

1 Meningitis
2 Sprain
3 Orchitis
4 Conjunctivitis

法、但所用之電、切不可使人痛苦。

洗胃之法（LAVAGE）此法用之醫胃鬆大[1]或久炎症[2]常效、亦有以醫胃疽者、但功效稍遜、如於未食之先、用此法則有洗出泗液之功、必須溫水方可、所用之具、以庫秋管爲佳、其長短宜至四尺半或五尺、以尺半由口入胃、孩童用之、宜長至二尺半、入胃之長短、酌其身而用之、用法、以庫秋管、埃腭彎入膣內、由此緩緩入胃、管上不必敷油、宜令病者下咽、則嗓內之液、已足潤管之用、如欲作嘔、則用棉蘸寇卡印消水、點於嗓內、經用三四次、自無此狀矣、管至胃中、將小漏扈安於管之上端、直提過頂、以溫水灌之、至胃滿足爲止、（見一百零三圖）後將一桶、置於其前、下垂漏扈、成虹吸流水之勢、流出所洗之污穢、（見一百零四圖）所用之庫秋管、如不合宜、亦不能有益於病者、故當酌宜而用之、且管孔不可過小、恐胃內之實質、不易流出也、如只引出流質、實質仍存、再食時、則新舊之食相雜、必致復有釀壞之患、而病勢仍作矣、夫庫秋管入胃之端、旁必有竅、其竅之大小、宜適於用、然此管係尋常洗胃之具、如胃內有不易洗出之物、必用胃抽器方可、胃抽器易傷胃內之泗膜、孩童用之尤險、且其價甚昂、攜帶亦不甚易、每有醫者、以未經用過之新導溺管、洗孩童之胃、但用時必以繩繫管之上端、方免下吞之虞。

1 Gastric dilatation
2 Chronic gastritis

第一百零四圖

此表水胃使端、垂出水。法
圖明滿、後管下引其之

第一百零五圖



此表耳炎以置耳或、後血。法
圖明新、症蛭於前耳吸之

第一百零三圖

此圖表明用洗胃管之法

舌根提起、而空氣易於入肺矣、若病者閉口甚緊、則空氣尤易進入。猶有一法、以鑷起病者之舌、每分鐘十至十四次、以此法救人、已數見效、觀第一百零二圖、可曉然此法之大意矣。

射盬之法 (INTRAVENOUS INJECTION.)

此法不可輕用、可用之藥亦不多、必含酸鹼之中性、或畧有鹼性者方可、否則必致血結成凅、患惡瘧[1]症者、必射貴林於盬內、方能有救、詳見貴林篇但宜射於腿盬內、若射於臂盬內、恐藥力至心甚速、心經有被阻之虞、用此法之礙難不一、詳陳如下、一病者之盬、或因血少、形不外現、致醫者不易尋覓、二射藥於盬內、空針易有貫過盬腔之失、三用後每有盬炎之患、四用後或盬內血結成凅、致有漂團塞絡之患。

電引藥法 (KATAPHORESIS)

此係直流電法、將電之正極、黏於所宜用之藥內、置於患處、以電之副極、置於患處之傍、令藥力由電之正極、過患處之膕、至於副極、乃爲妙法、腦[2]系痛者、以哥羅芳與醇酒各半、如法用之、必效、或只用哥羅芳亦可、患楊梅[3]骨阜者、如不能服藥、以鋰氣塩五厘、(0.3)加水百量滴、(6.6)如法醫之、有效、患瘴[4]症者、若不能服藥、以此法用貴林醫之、有效、如所患之症、必須用鉄氣塩或寇卡印醫之者、亦可用此

1 Pernicious malaria
2 Neuralgia
3 Syphilitic nodules
4 Malaria

置於噴霧具內噴之。s.—Use in nebulizer.

引呼吸法 (Artificial Respiration)

此法之用、凡因欠氣而斃者、（如溺水煤熏之類）皆可醫之、但此法不一、惟謝氏、奚氏二法最妙、謝氏之法、令人伏卧、偏側其首、（醫士在其人之股傍、或在身上作乘馬之式、）以雙手按其浮肷、手之後掌、直向其腋之後綫、（見謝氏之圖）用力夾擠、將胸內之空氣擠出、如氣脘有水或泗液、亦必擠出、放手則胸壁必自復原、空氣因之入肺、如此不已、每分鐘約十四次、俾呼吸之遲速、與常人等、奚氏之法、令人仰卧、（醫者雙膝跪其首前、）以兩手執其兩腕、貼地上提、至臂與肩平、則胸膛自然展開、（見九十七圖）越片時俾兩手向上、肘節挨地、則胸膛尤爲開展、（見九十八圖）以上二法、皆有自然吸氣之功也、後提起雙臂、令二肘節相挨、夾擠其胸、（見九十九圖）再後下按二肘、壓於胸前、夾擠之力尤大、（見一百圖）以上二法、皆有自然呼氣之功也、此法宜用至一句鐘之久、且每分鐘、必用十六至二十次、俾其呼吸之遲速、與無病人等、雖已氣絕而無望者、仍宜如法醫之、曾有人氣絕已至一句鐘、此法尚能救之、但必須病者之喉、通呼吸之路、否則醫者宜以手指托其兩頷角、使面上仰、至頸與卧板成半直角形爲止、（見一百零一圖）如是則會厭與

一百零一圖



此表扶者頭呼易通之
圖明病之使吸於達法

第一百零二圖



此表以提令厭槩使氣入內
圖明鑷舌會離口空易肺

第九十九圖



此圖係奚氏第三代引呼氣之式

第一百圖



此圖係奚氏第四代引呼氣之式

第九十七圖



此圖係奚氏第一代引吸氣之式。

第九十八圖



此圖係奚氏第二代引吸氣之式

第九十五圖



此係小噴霧具

第九十六圖



此圖表明謝氏引呼吸之式

第九十三圖



此圖乃帶於身傍之具其具有三口由第三口吸氣以指蓋第二口氣由第一口而入呼氣時以指蓋第一口氣由第二口而出



第九十四圖 此圖係大噴霧具與壓氣筒、具上之諸瓶、可同時用之、擇其一二瓶用之亦可、

腔久炎症、必用激力尤大之藥、方能見效、良方如左。

郁加列油	℞-Olei eucalypti	一量錢 (4.0)
松澁油	Olei picis liquidi	二量錢 (8.0)
阿波冷	Alboleni liquid	一量兩 (30.0) —M.

薄荷冰 ℞-Menthol 二十英厘 (1.3)
樟腦 Camphorae 十英厘 (0.6)
阿波冷 Alboleni liquid 一量兩 (30.0) —M.
置於噴霧具內、日噴數次。
S.—Place in the nebulizer and inhale the vapor several times a day.

若外加哥利吞二至五厘、(0.12-0.3)甚妙、以哥利吞有痲效、且有平泗膜之功、(詳見薄荷油篇)新鼻噻甚重者、良方如左。

沙沙法油 ℞-Olei sassafras 三量滴 (0.2)
檀香油 Olei santali 五量滴 (0.3)
阿波冷 Alboleni (liquid) 一量兩 (30.0) —M.
置於噴霧具內噴之。 S.—Use in vaporizer.

此方內之檀香油無幾、僅有平泗膜之力、如欲其有激力、必加至三十量滴、(2.0)若[2]氣

1 Acute coryza
2 Chronic bronchitis

第九十一圖

此圖係作水氣之具

第九十二圖



此圖乃一類吸具、用鈕片穿以微孔、具前置以海絨、滴藥於其上吸之。

寸半、將薄荷冰置於其內、以有孔之塞、墊以沙布、塞其兩端、口接其塞孔而吸之、新傷風[1]者、吸之有效、若第九十三圖、亦係隨身之吸具、其大端置海絨一塊、滴藥於其上、以小端挨近唇邊、吸之有效、夫噴霧具不一、惟噴之較細者最佳、此等具之用、在乎壓空氣之力、具之大者、另有壓氣筒、如第九十四圖、小者如第九十五圖、如以油類之藥、置於噴霧具內、其效尤妙、鼻嚏[2]或氣脘[3]新炎、良方如左。

1 Acute colds
2 Coryza
3 Bronchitis

以此藥一至二量錢、(4.0-8.0) 置於吸具內、沸而吸之、每日四或五次、

S.—Place 1 to 2 drachms in the water in the boiler, inhaling the steam from a freshly made watery mixture several times a day.

但其藥已涼、不可再用、必換新者方可、若於寒冷之時吸之、必俟三四句鐘方可出室。若氣腔泗膜炎、按九十二或八十八圖之吸具醫之、有效、良方如左。

哥羅芳	R-Chloroformi	半量兩 (16.0)
幾阿蘇	Creosoti	半量兩 (16.0)
薄荷冰	Menthol	十英厘 (0.6)

每三句鐘滴十滴於具內吸之。

S.—10 drops on the inhaler every three hours.

或用方中之一藥、吸之亦可、若痰過粘不易吐出者、以伊替氣塩滴十滴於吸具內、吸之有效、每有人將小吸具帶於身邊、隨時吸之者、常用者、以一玻璃管、口徑四分、長二

第九十圖



此圖乃醫哮吼之氣具

氣、不但有平氣腔泗膜止嗽之能、並有助藥之效、用時宜備一有氣管之具、（見九十與九十一圖）或以水壺置於酒燈上沸之亦可、吸氣時、病者之口、宜與氣管相近方效、氣腔炎[1]與肺癆[2]症、如兼有乾嗽者、良方如左。

松葉油	R-Ol. pini syivestris	一量兩 (30.0)
郁加列油	Ol. eucalypti	一量兩 (30.0)
幾阿蘇	Creosoti	半量兩 (15.0) —M.

以此藥一至三錢、(4.0-12.0) 置於吸具內、沸而吸之、每日二或三次、

S.—Place 1 to 3 drachms in the water in the boiler and inhale the steam three or four times a day.

如病者咳嗽過甚、宜加哥羅芳浮酒半兩、(15.0) 新嗓炎[3]之良方如左。

安息香雜酒	R-Tinct. benzoin. comp.	一量兩 (30.0)
薄荷冰	Menthol.	十英厘 (0.6)
哥羅芳浮酒	Spt. chloroform.	半量兩 (15.0) —M.

1 Bronchitis
2 Tuberculosis
3 Acute laryngitis

之每效、又有一吸氣之具、（見八十八圖）此具之內、有阻氣之合頁、用之呼吸、非多用胸肌之力不可、故於肺經有益、更有數類藥、人若吸其所散之氣、大有助肺經並全身之功、吸法有三、一以氣易散之藥、置於室內、令病者吸之、或用熱與熱潮氣、將藥氣散布、吸之亦可、二以海絨蘸氣易散之藥、置於吸具內、令病者所吸之氣、由海絨經過、三用一能壓空氣之大噴霧具、以氣不易散之藥、置於其內噴之、藥氣散滿於病者室中、吸之有效、但所吸之藥、因病酌用、鋅氯鹽氣之用法、詳見鋅氯鹽篇、哮吼[1]之患、如以薄荷冰數粒、置於勺內、以燈火煨之、使氣散於病者室中、吸之有效、啼嗽[2]或氣腔炎[3]之晚程、如以布蘸幾阿蘇、或松節油、或替利本、或郁加列托、掛於病者室內、令藥氣散佈、吸之有效、

第八十九圖



此圖係一盤布架以布摺疊撒藥於布上

若有盤布架、以蘸藥之布、廻摺架上（尤妙、見八十九圖）亦有時於以上藥中、只用一藥之五至二十量滴、（0.3-1.3）滴於滾水內、散其氣於病者室中、或用鐵管引入幔帳內、其法尤妙、（見七十七圖）如以薄荷冰二至五厘、（0.12-0.3）置於滾水內亦可、夫藥必滴於滾水中者、以滾水之

1 Spasmodic croup
2 Whooping-cough
3 Bronchitis

第八十七圖



此圖乃使人舒肺之呼氣具

鐘、再將B瓶之水、呼入A瓶、每日如此、則必見效、此法之妙處、乃在吸氣滿足後、呼之必須用力、不至一呼而盡、故肺經大獲舒展之功、肺經生長不足、並肺炎而復原遲緩者、或胸統膜發炎、而有粘連之患者、此法俱效、若胸統膜積膿、或積液、甫放之後、不宜用之、必俟數日、容肺於其膿液所壓之缺處、自行復原、倘數日後仍不復原、用此法助

第八十八圖



此圖乃阻吸氣之具、此具有一方箱、內置蘸藥之食水絮、並安以合頁門、用時開其AB二端之蓋、以B端啣於口內吸之、氣由A端入方箱、因氣由合頁門而入、故必用力吸之方可、呼氣時自C端而出、C端有一螺螄蓋、能使所呼之氣多寡合宜。

見八十七圖A瓶先貯以水、練者吸氣滿足之後、口啣短玻璃管、順管呼氣、則令A瓶之水、流入B瓶、越數句

如練此法、自無以上之弊、所以此症無由而生也、練法、病者宜背墻直立、以兩髆緊貼墻面、緩緩吸氣、至滿足爲止、心中暗數一二三、數畢、緩緩呼出、初練之時、卽宜如此、每日宜早晚二次、每次四五呼吸足矣、越七八日、每次宜漸增呼吸之數、吸氣時、切宜緩抬兩臂、隨抬隨吸、抬至平肩爲止、呼氣時、切宜緩落兩臂、隨落隨呼、落至挨身爲止、越數日宜抬臂過頂、（見八十圖）抬臂旣高、則吸氣尤易。

又有二練法　一　吸氣滿足時、用肺經之鼓力、閉口呼出、二　空頭仰卧於牀上、以輭枕墊於腰下、緩緩呼吸、以上之練法、不但於肺未長足者有效、卽患肺炎、肺統膜炎、胸統膜積膿等症之後、吸氣不能滿足者、果如上練之至數月、吸氣之能力、必較從前迥異、且練此法、不但令病者思食、更能增血內之紅朕紅腥、並全身之力、猶有數類練法、雖似與肺無關、實大有助呼吸之功、練式見第八十一至八十六圖、人果能按圖練之、不但能增呼吸肌之力、並能使人挺身直立、大收舒肺之功、每因病者不練此法、以致聳肩弓背、肺經不舒、甚有壯年殞命者。

另有數類助呼吸之具、雖無甚大用、然能助人呼吸之興、一　法、以A B二瓶、置於案上、以二曲玻璃長管、中以庫秋管兩端連之、插於二瓶內、再以二曲玻璃短管、插於瓶內、

第八十一圖

第八十二圖

第八十三圖

第八十四圖

第八十五圖

第八十六圖

癆、而其端已伏、如用此法、每能防之、蓋因人之肺尖、少得空氣、又於所得之空氣、不盡呼出、致使新舊之氣、弗能循環更換、故癆症多由此處而起、

曾有以此法醫腦中尿毒[1]者、不但使血內之毒、由腎而祛、並於未祛之先、能增血內之盟、而毒力減少也、（因令毒散佈於加倍之血內故其力減一半）膿菌毒[2]、並糖尿昏迷[3]之患、亦可用此法醫之、惟疡腫者忌用、如因燙傷甚重、致腦力猝衰、用之有效、或因燙傷致血中毒者、亦可用此法醫之、割症後如腦力猝衰者、用之有效、或因燙傷致血中毒者、亦可用此法。

吸氣練法（INHALATIONS.）

此法醫病、乃爲最妙者、然醫生多輕視之、論此法可分二類、一只吸空氣、二以藥氣散於空氣中吸之、西國大醫院內、專有吸氣之具、但此具價昂、置備不易、有醫者、使人練吸氣之法、雖無此具、亦屢見大效、有數類病症、不用此法醫之、而終難見效者、設人在應生長時、肺未長足、或因所作之工、與肺有損、如按此法練之、俱效、初起之肺癆[5]症、此法每能醫之、若肺經虛弱者、雖未成

第九十七圖　練身圖



第八十八圖



1 Uræmia
2 Septicæmia
3 Diabetic coma
4 Shock
5 Tuberculosis of lungs

第七十八圖

此圖表明皮下射鹽消水之法

第七十七圖



此圖表明腦炎症二用單被相連罩於牀上熏之法。

價廉者、亦可用之。

皮下灌鹽水法（HYPODERMOCLYSIS）

製此水之法詳見引注法篇

此法之用意、特爲增血內之鹽、如患癘症[1]或流血過度[2]、用之大效、他如血或濕內有毒、此法能滌除之、且有洗滌腎經之功、如因割腹後、致患嘔吐、或胃生瘍而嘔吐者、身體不能得水之養育、形容枯槁、宜用此法、以增身內之水、用法、以滅稜鹽水、置於玻璃筒內、筒底一口、一端套以庫秋管、一端安以大空針、刺入皮下之連胸灌之、則入絡部必速、一刻鐘每有利小便之功、但必先將該處、及所用之具、滅盡其稜、然用此法、人每疑灌水過多、而不必疑也、夫人皆知將鹽水灌於盂內、雖四倍於血、亦不增血壓之力、但灌於連胸、每刻鐘所用之水數、不可不酌人身之輕重以定之、大約每磅用水一量錢（4.0）足矣、假如人身重百五十磅、每刻鐘宜用水百五十量錢、（60.0）倘多用之、恐腎經之功不及、全身之胸有積水之患、水力之大小、俱係玻璃管之高下、若流水緩則力小、宜將筒提高、速則力大、宜落下、常用之法、必高於病者二或三尺、乃爲合宜、水一射入連胸、必有作癘之勢、然而無妨、射畢即消、如輕輕摩挲之、則消腫尤速、流血過度者、用水射之、每有神效、癘症至腦力脫失之時、此法甚妙、用後雖皮色變紫、然復原甚速、脈力漸增、亦不至如從前之氣促矣、

1 Cholera
2 Hemorrhage

方可、心痓腫、致腎經積血者、雖經醫者試用此法、然不得謂之無險、故不宜用、各類肺炎、俱忌用之、惟氣脘泗膜輕炎者、用之有效、若以潮熱氣醫之、亦效、用法、以竹四竿、立於牀之四隅、用二單被、以綫連之、罩於竿上、有如幔帳、令病者卧於其內、將單被罩嚴、用滅穉具盛水、以火熱之、如滅穉具不便、用磚架水帝下燃酒燈、亦可以鐵管、將熱氣引入、病者多吸此氣、必有潤泗膜之功、（見七十七圖）近有醫者、用乾熱氣、以醫節[2]炎筋炎肌炎等患、每效、但此法必先備器具、最妙者（如七十五圖）用一雙層銅筒、一端有口、口上繫以石絨布、內置一板、裹以石絨、安寒暑表於筒上、以驗熱度高下、將病者之腿、由石絨布伸入筒內、置於板上、腿下墊以麻布、以免受熱太過、後以酒燈、置於筒下、燃著、將筒口之石絨布、裹於腿根、以繩縛之、筒內之熱、能至二或三百度、雖用如此之熱、亦不致有被燙之險、因腿生汗甚多、並血運甚速故也、且不但病腿生汗、即全身亦必因之而生汗、宜日用一次、每次一句鐘足矣、或隔日一次亦可、但必須謹愼、勿使皮膚稍著銅筒、致受損傷、如因痺症或受傷、以致骨節[3]久炎、此法大效、若因癎症則少效、曾有易犯之癎症、以致骨節久炎者、用此法醫之、用後其癎立即發作、較常尤甚、蓋因尿酸積於骨節、一經此法、則散布週身也、此法最妙之具、價值甚昂、購置匪易、如第七十六圖、乃係

1 Bronchitis
2 Inflammation of joints and muscles
3 Chronic inflammation of joints

嚴、俾生汗之司所、受激、於濕被之冷力、越片時熱度必增、冷被變熱、而汗自生矣、癔類熱症、如含而未出、此法大有發表之功、孩童肌跳重症若能抵冷水之力、以此法醫之最妙、無論土國俄國、或冷熱濕被之法、用畢、除癔類症外、均宜用冷淋具、或入冷水池

第七十五圖



此圖係乾熱氣具

第七十六圖

此係價廉之乾熱氣具

1 Severe chorea

一具、將人並椅、以被圍緊、越片時、燈之熱度、必能令人生汗、但用時必須謹愼、恐酒燈失火、燃著所圍之被、致受燒傷、最妙之法、置燈於被外、用一鐵筒、以此端之口、合於燈上、彼端貫入被底、熱氣進滿、亦能令人生汗、如將鐵筒以布裹之、不令熱氣四散、尤妙、若此法不便、可以磚或石數塊、用火燒之、置於椅下亦可、若病者虛弱無力、不能端坐、以酒燈置於牀旁亦可、見七十二圖 患腦力脫失者、此法亦妙。

熱濕布生汗法（"Hot Pack"） 此法先以庫秋布鋪於牀上、以乾絨被複之、再以一絨被、蘸於滾水內、擰乾、見七十三圖 複之、急令病者赤身卧於其上、速以所複之濕絨被、嚴裹其身、旁置熱水袋、以乾絨被及庫秋布、挨次裹之、不令熱氣外散、但頭上宜置以冰水袋、以免顱腦積血之虞、見七十四圖 腎炎[1]、肌抽搐[2]或失寐[3]與痙[4]等症、用此法俱效、用時、每刻鐘必使病者口啣寒暑表試之、如熱至百零一度、即宜揭去所裹之被、用布拭乾方妥、用此法時、病者在濕被內、大約一句鐘、方可揭開、如未生汗、宜飲冷水一盃以助之、若係成人、宜於冷水內、加伯蘭地少許、孩童則加溢氣弱浮酒少許、倘仍不見汗、但覺熱度漸增、宜立時止而不用。

冷濕布生汗法（"Cold Pack"） 此法以單被蘸冷水擰乾、赤身裹之、再用一或二絨被裹

1 Nephritis
2 Muscle spasm
3 Insomnia
4 Tetanus

第七十三圖

此係絨被蘸滾水內以木擰乾之法

第七十四圖



此以被滾裹者身以被之法
係絨蘸水病之後乾蓋之

用此法最妙、如因易犯之痺症或癲症、以致腦系痛[1]者、用此法亦大有效、初傷風時、[2]致鼻有膿涕、或他處泗膜發炎、如用此法每能醫之、即傷風數日亦效、惟肺經積血、或發炎、或氣脘久炎、兼氣腫、或心鬆大而弱、俱不宜用、新喉炎[3]症、自覺喉中若無泗膜、或因傷風致患經閉[4]、此法有效、易患傷風者、其故有二、一因泗膜過弱、微一受惹、即患傷風、宜服砒弱酸之小分劑、即一厘之百分之一至五十分之一、(0.0006-0.0012)日服三次、至一二月爲止、大效、二因皮或泗膜內之竅鬆大而無力、其中之血、緣受冷之故、積於臟腑、致患傷風、如每二三日、用此法一次、其竅必如常有力、則無以上之患矣。

俄國之浴法(Russian Bath)此法與土國不同、土國所用者、乃係乾熱、此係濕熱、濕熱不及乾熱生汗之速、病者易於受損、即止汗之法、亦遜於土國、惟病者不能身往浴堂、在家中用此法最宜耳、用法、解衣坐於椅上、椅底置一水桶、將人並椅、用被裹嚴、後以鐵或石燒熱、置於桶內、令熱氣上騰、使病者生汗、凡土國浴法所能醫治之病、此法亦能醫之、但少有用之者、如患癌類熱症、含而未出、此法有助發表之功、夫通都大邑、皆有藻堂、固可隨時沐浴、若鄉里之間、藻堂不便、宜自備浴室、以爲浴身之用、其所備之浴具、形狀與錄篇內第四十九圖同、茲將用法詳陳如左、病者解衣坐於椅上、下置酒燈

1 Neuralgia depending upon rheumatic or gouty taint
2 Acute colds
3 Acute pharyngitis
4 Suppression of menstruation from cold

至此室、先有搓身之人、將其全身搓徧、後用淋具浴之、由熱而溫、由溫而冷、及用冷水時、不過一淋而已、如不用冷淋具、則宜跳入冷水池中、一入卽出、不可濡滯、出時有人用布拭乾其全身、入一偃息室、其室之熱度、與尋常居室同、在此室內、寢睡一句鐘、方可旋歸、按此沐浴之理、先入數熱室、無非令人生汗、後用冷水、無非令人止汗、若不用冷水沐浴、恐受風寒、致有臟腑積血之患、倘病者不能抵禦其冷、則不必用土國之浴法矣、腎炎[1]症、以此法浴之、最爲合宜、蓋此法能激發汗腺、以祛血內之毒也、誠能勤用此法、汗腺之功必加增、血毒之祛必加倍、不但補腎經之缺、且免瘓癱之虞、此法之宜勤與否、必先視其病勢、如腎經多失功用、二日一次、少失功用、六七日一次足矣、初用此法時、不宜卽入最熱之室、恐其不能受此熱力也、或僅入第一室、卽入淋浴室、迨經歷數次、漸能忍受其熱、方可遞入末室、且必與醫者同入、方保無虞、不但患此類病者、必須如此謹愼、卽患心症者、亦當若是、如浴時不能生汗、此乃凶兆、恐其中暑、或中尿毒、或顱腦積血也、醫者當切記之、久痺[2]症、以此法浴之亦效、若新痺症、不宜常用此法、因身內之熱度過高、且心經多有帶累之患也、久痺症無甚作燒之勢、且心經不甚虛弱者、若用此法於其過長之骨節、與受損之肌肉、皆有大效、人若勞碌[3]過度、全身發板、

1 Nephritis
2 Chronic rheumatism
3 Muscular stiffness following prolonged physical effort

於熱水內、必見速效、白濁症[1]、臨寢時坐熱水中浴之、可免莖舉硬痛之患、否則必須服藥、或在痛時吸烘氰弱礬有效、嗓口抽症[2]、以絨布數層、蘸熱水覆於頸上、以油布裹之、不令失散其熱、必見大效、各類目痛、如以絮浸於熱水內覆之、每效、但必屢換方可、用此法者、不當倣用糊藥之法、只一二句鐘足矣、有醫者、用吊水袋滴熱水於瞼上、但袋上之流水管、距目不宜過遠、其效與上同、如因㾓頸與㾓頂抽搐、致患經痛[3]、坐熱水中浴之、或用熱水射入陰道、俱效、如因㾓積血[4]致患白帶、或㾓墜、此法亦效、歪頸患[5]、有時將熱袱覆於骹髃顳肌之上、有效、有醫者云、如某處發炎、以布浸熱水覆之、其痛可減、若已生膿、反增其痛矣、如人皮膚或腎經失其功用、可用乾熱或濕熱之法、其法見下助此二經、以祛血中之廢料、此二熱法、係俄國與土國之浴法也。

土國之浴法（Turkish Bath）此法有一浴所、中分數室、至少者二室多則不過五室其熱遞增、第一室熱至百度、末室至百五十度、此數室皆有熱而無水、但令人生汗而已、其法先入第一室、俟身生汗、再入第二室、依次至極熱之末室爲止、每入一室、必停片時、入第一室時、如不生汗、宜飲冷水以助之、仍不生汗、即當出室、或因受熱無力而氣短、亦當出室、如無此二弊、遞至極熱之末室、方可入淋浴室、此室上懸淋具、具內之水、有熱溫涼之別、一

1 Gonorrhœa
2 Spasmodic croup
3 Dysmenorrhœa
4 Uterine congestion and leucorrhœa
5 Torticollis

鐘、再如法射之、但不可終日不輟也、按理論之、初次最易見效、但因初用時、多不合法、故每至二三次始效、無膽識之醫者、每不敢用水過多、且每次射時、必俟水盡流出、方敢再射、如此不但無益、反增其患、多射水於腸內、與呼吸絡二部、無甚關涉、但所射之水、熱度過高、難免有損耳、割症後病者身體衰弱、宜用水數兩、射於肛內、不但免其口渴、且免尿閉之患。

用飲食管之法 (GAVAGE) 此法有養育之功、如人因患病不能飲食、或因瘋癲不肯飲食、宜用此法、每以未經用過之輭導尿管、置於鼻或口內、透入膿中、管上口安以小漏巵、將牛乳或湯類、灌入胃經、庶免病者饑餓而死。見第七十一圖

熱法 (HEAT) 此法醫病與冷法同、但冷熱二法、當以病者自擇爲是、踝節扭[1]患最妙之法、以熱水浸足數句鐘之久、水之熱度、至僅能忍受爲止、如此不但減其疼痛、且能令患處速於復原、用法、將足浸於熱水盆內、俟能忍受、漸加滾水、因水之熱度愈高、則效愈顯、浸畢、用絨布蘸鉛醋礬消水與鴉片酒裹之、或以魚石澹抹膏搓患處、越數句鐘再如法浸之、如此數次必效、紋肌及無紋肌、如有抽搐之患、以熱法醫之乃妙、腰痺[2]症或他處之肌發板、先以紙數層覆患處、以烙鐵往復熨之每效、莖舉[3]硬痛、若將陽莖浸

1 Sprained ankle
2 Lumbago
3 Chordee

第七十二圖

此圖表明病者不能坐起潮氣之法。用熱熏之

第七十一圖

此表由孔飲管法
圖明鼻用食之

堅厚者、否則恐成扁形、膿與泗液不易流出耳、所用之水、仍宜用鹽消水、（因淨水有惹力故用此水）加炭匿酸或硼强酸少許、因此二藥、俱係有益而無毒、用水之多寡、宜以洗淨泗液與膿爲度。

醫大小腸不通之法　此法乃以入水管、緩緩射水、驗其有效否、如無效必延外科剖腹醫之、腸褪與腸塞二患、用此法有效、若過十二句鐘無效、必延外科醫之、若腸扭結者少效、用法與醫痢症同、但不用出水管耳、腸褪之患、常在關門扇、或曲胴、故水易至患處、初射時宜將吊水袋縣起數寸、使水滴滴而入、待腸內水滿、再將袋提高、但不可過三尺、水之熱百零一至三度、最爲合宜、若不及此度、病者身內之熱必減、過則必增、孩童腸褪之患、其水袋之高、不宜過二尺、無論成人與孩童、初用時若提高水袋、必惹腸肌發板、將所射之水逼出、非但無益、而病勢反增矣、醫此等症、各類擠水筒、俱不宜用、因射時不能定力之大小也、近有醫者、用擠水筒以醫此類症、竟致腸裂、立時殞命者、有三人焉、蓋吊水袋之力緩且平、擠水筒之力促且激、故用擠水筒不如用吊水袋之相宜也、醫此類症、必須用水甚多、若腸不能存、大概因初射時、水力過猛、若先滴滴而入、後則使水力漸增、越三刻鐘、倘不見效、宜令水流出、或以他法醫之、或過二三句

非 菡 Gum. acaciæ 三十分

鴉片酒 Tincturæ opii 二 分

此醫曾云、用此法洗腸、足可射水過闌門扇、然射健壯者之肛內、必用極大之力、方能過之、其人必致受傷、但既係病者、闌門扇必虛弱無力、令水過之、亦不必甚用力也、方中所以用炭匿酸者、因其最爲有益耳、誠以此酸一分、加水百分、熱至九十八度、將腸內之染穢、置於其內、過一句鐘、穢必被阻而不長、若用此酸半分、加水百分、越六句鐘亦大顯其阻穢之效、有著名醫者、亦謂炭匿酸之消水、有敵腸內穢毒之能、其效不一、一能縮腸內鬆輭之血脘、二能阻穢之生長、三能免穢毒被唻、四能使腸液有酸效、五能激腦系部、六能免身熱過減、並免尿閉、及腦力脫失等患、若射水於胴內、以醫痢症、雖非近今之法、而近來醫生多有用此法者、若用塩消水、（與人血內所含之塩同）不但使藥力達於患處、且一過發炎之泗膜、必有平之之效、如此不特腸內之泗液或膿被祛、即腸內之穢毒、因所射之水甚多、力亦必微矣、醫成人之痢症、必用出入二水管、入水管與吊水袋相連、用時必深入於肛內方可、出水管只入肛門而已、其大小與入水管相同、必用

1 Dysentery

水、當漫過所便溺者、且便具不宜留於屋內、便畢、當即傾之、切不可傾於近井之處、恐有未滅之穢、散布水中、亦不可傾於地上、恐晒乾爲風所飄散也、必埋於土中爲最妙、患染症之甚者、如以錄氯强塩一分、加水萬分、或以烯醇一分、加洋橄欖油百分、化之、以擦其身、或效、紅熱症如用此類藥擦之、頗有去癢之效。

洗腸之法 (ENTEROCLYSIS) 此法近數年來、用之醫病、甚有功效、但其用不一、一洗出胴內之汚液、二以藥置於水內、洗時令藥潤於腸之泗膜、三若病者冷甚、宜以熱水射於胴內、以增身內之熱度、四如病者作燒過甚、宜以冷水射於胴內、以減身內之熱度、五似癨症用此法甚妙、用法、以炭匿酸一至五錢、(4.0-20.0) 與鴉片葡酒一量兩半、(45.0) 加水四量磅、(1920.0) 調勻射於肛內、有醫者用烯醇、或錄氯强塩、或柳酸、加水射之、然俱不甚妙、因烯醇與錄氯强塩、毒力過大、柳酸不易消化、故用之少效、有名醫之良方如左。

洋苦菊花冲藥 ℞-Infusi anthemis floræ 二千分

炭匿酸 Acidi tannici 十分

動之、但室內不宜置有水之盆、恐藥氣爲水所攝也、室內每千立方尺、必用祛毛消水五量兩、(150.0) 置熏具於室外、其管必由門隙穿過、(見第七十圖) 熏至十句鐘之久、方可啓戶、如屋透氣、過二三句鐘、再熏一二次乃可、若以此消水一分、置於大器皿內、以鉄錳上礬半分加之、(如用消水三十二量兩可加此礬十六兩) 加時不必用火、藥自沸而成氣、熏之亦可、又有一法、將所能移之物移於院中晒之、後以滾水與帚刷之、並刷室內木板、此水用畢、宜隨即煮之、以滅其穢、後以鉄氣强鹽一分水五百分、或千分之消水刷之、不宜擦乾、因此消水、存之愈久、滅穢之力愈大也、再灑以祛毛消水、越二十四句鐘、方保無虞、但莫妙於將祛毛消水、用大噴霧具、由外噴於內室、無論何症、病室宜常通空氣、病瘉後宜洞開窗牖十數日方妙、醫者查明、最妙滅穢之藥、祛毛消水爲上品、其次卽鉄氣强鹽一分水二百五十或五百分之消水、然能力最大者、惟錯氣粉、但改變布色、故少有用之者、此粉價值甚廉、然行中所售、多係失氣而無效者、故購時宜查明之、如以此粉一碗、和於一盆滾水內、以刷地板、頗有滅穢之功、若置於中廁、大有滅穢敗臭之效、鉄氣强鹽消水、如遇胨質、其力必至受阻、故宜以他藥置於其內、以免受阻之虞、(見防穢法) 患染症者、大小便具中、當常存鉄氣强鹽一分水五百分之消水、庶具內之穢、不至散布、所用之消

第六十九圖



此圖表明肺痿初期用火吸罐之法。

第七十圖



此圖表明熏洗毛消水之式。

滅穉之法（DISINFECTION）

此法有三、一用火燒病者之衣被等物、絶穉生長之處、二以熱度過常之水氣、熏被染之物、或用滾水煮之、三用滅穉藥類滅之、此三法惟第二最妙、然於居室甚爲不便、醫者常將受染之衣被等物、置於滾水內煮之、至二句鐘之久、常有以受染之物、由病室移至他室、俟暇煮之、如此不但令存留之屋受毒、即所經過之室、亦大受其傳染、其害良非淺也、若以滾水一筒、或錄氣强鹽消水一筒、（此消水較滾水尤妙即藥一分水千分所成）在病室內將衣被等物、浸於其內、後移至鍋旁、以滾水煮之、至二句鐘方可、更宜將鍋覆嚴、以增熱度、且免毒氣四散、煮時宜屢加水、恐有鍋乾衣灼之虞、此時屋內不宜作食物、並不宜存食物、恐受毒染、食之有害、如不能用煮法、必將受染之物、浸於錄氣强鹽一分水五百分之消水內、或浸於烳醇一分水二十分之消水內、亦可、但以消水浸之、不及以滾水煮之耳、患染病者、或痊瘉或死亡、室內之病毒、當設法除之、不使散布、此爲緊要之理、最妙之法、莫過煮褓毛消水、放其氣於室內、此氣與氣氣迥異、不能改變布色、未放氣之先、室內所有透氣之隙、當用紙糊嚴、被褥地毯等物、宜懸掛繩上、令藥氣易於熏入、若有書籍、宜散開篇頁、置於案上、藥氣則易入其中矣、四壁宜以水噴之、因水能攝藥氣以滅毒也、如地板有痰、宜以水潤之、倘其乾硬、宜以器具活

製松節油熱袱之法（Turpentine Stupe.）詳見松節油篇、其用法乃以熱袱敷患處、爲時不宜過長、恐其生皰也、與貼辣椒貼膏同、故宜酌量用之、如用此類藥、致皮過於受傷、可以純蠟膏、或軟煤蠟、或洋橄欖油敷傷處、每百分中加烳醇一分尤妙、因烳醇不但有減殺之力、兼有痲效耳。

用洋斑蝥之法 Cantharis 此藥所生之小皰、不必放皰內之水、待皰破時、以食水絮覆之、如生大皰、先以滅殺之針刺破、以放其水、後以食水絮覆之、如此不但新皮速生、且有保護患處之益、用此藥敷於患處、必至八句鐘、方能生皰、病者必至痛苦難忍、越五六句鐘、祛之另敷糊藥、則其痛減少、而功效無異。

火吸罐法 （CUPPING）

此法取其外惹內效之益、用法有二、一不吸出病者之血、乃以一玻璃罐、底有小孔、孔內有合貢塞、用時將罐合於患處、以抽氣筒、抽出罐內空氣、後以合貢塞閉住、待其自落爲止、如肺腎二經積血、用數罐合於患處、吸之有效、惟胸統膜與腹統膜之新炎、忌用此法、恐統膜被傷也、二吸出病者之血、用法與上同、但必先將患處之皮、割破數處、使血隨吸而出、不但有外惹內效之功、亦有放血之效、虛弱者忌用、緣其血衰故也。

1 Congestion of lungs or kidneys

法用氨酒亦可、患此症者、最宜躺卧、如患處作燒過甚、宜以冷水袋覆之、兼用托囊帶、或合口貼膏托之、庶免其墜痛、倘全身作燒、服草烏頭酒有效、如欲止某處之疼痛、不宜先用生炮藥、只用芥末、薄荷冰、薄荷油、辣椒、松節油、香糊等類、令皮發紅而已、成人腹痛、常以芥末覆之、嬰孩但以香糊覆之、有效如因食滯或因顱腦積血、與血虧、或腦系痛等、致患頭痛[1]、以此類藥敷之、俱效、腦系痛[2]、以薄荷冰、或薄荷油、敷之有效、如痛處與目相近、必謹愼用之、勿令所敷之藥入目也。

製芥末糊藥之法、以芥末與麥粉相合、用熱水或熱醋調之即成、成人用之、必芥末麥粉各半、乃爲合宜、若孩童只可用芥末一分、麥粉三分、用法、先以厚紙鋪於案上、後以粗布複於紙上、將此糊藥攤勻、上覆細布、（恐藥力惹皮也）將紙之四圍折回、如鏡框然、（用厚紙取其有挺力）覆時不致攤軟覆於患處。

製香糊藥之法（Spice Poultice）此以派門他丁香、洋桂、肉寇等末、各一分、胡椒末半分、攪勻、置於布袋內、使之平勻、以綫縫之、後以酒或醋潤此袋之一面、覆於患處、若皮膚薄者、宜少用胡椒丁香、以免皮膚受惹、覆此香糊、可留數句鐘或數日之久、視其病勢、再爲揭去、醫孩童之胃[3]泗膜炎、或食滯[4]症、此爲妙法。

1 Headache 3 Gastric catarrh
2 Nouralgia 4 Dyspepsia

蛩貼膏、製如銀圓之大小、貼於痛處、或貼於脊骨之旁、大效、腹統膜炎、宜貼於痛處、顱腦炎、宜貼於頸上、猶有若許之纏延炎症、即久白濁、骨節過長、瀼棚炎等症、用此法亦效、雖有作燒之患、仍可用之、（按常理論之作燒不宜用此法）若骨節炎、宜以起皰藥敷於瘭處之旁、膝節炎、如節左右之皮、未見紅色、亦可敷之、白濁久炎、宜以洋斑蛩火棉酒、敷於陽莖之下、或會陰處、有效、無論何等久炎、如用洋斑蛩無效者、宜以鐵燒紅（燒紅而止不宜太過）燙潰之、有效、或用鈉淞鈸淞砒弱酸類之潰藥亦可、但用此類藥後、該處之胴、受潰必甚、故惹力日久不失、有醫者、將銨鈸菓馨抹膏、敷於某處、以致成瘍、其效與潰藥同、若某處發炎後、有滲出之質、敷洋斑蛩、令其生皰、有效、即如胸統膜發炎、所滲出之質、久不退去、宜以洋斑蛩敷腋下二三寸處、乃係最妙之法、或以皰內之水、誤爲滲出之質、謬矣、蓋生皰只激發滲出之質、使之退去也、若胸膜內有滲出之質、乃係血絲腥之類、敷洋斑蛩必無大效、如骨節久炎、兼有滲出之質、敷洋斑蛩有效、然其效究不及氨酒、因氨兼有改症之能也、但敷氨酒、宜至皮變黑、方能見效、凡此類久症、宜以氨抹膏、日搓患處、有效、如皮膚變紅、宜停數日、以免過於受惹也、頸上之瀼棚脹大、未生膿時、亦可以氨抹膏搓之、精腺冠炎[2]最妙之醫法、乃以銀氨强馨濃消水刷其陽囊、以皮變黑爲止、或如

1 Enlarged cervical glands
2 Epididymitis

第六十八圖



此圖乃表明人體之背面敷生胞藥處、耳痛、或頭暈敷處如O、腦衣炎、或顱腦底積液敷處如M、咳血敷處如H、胸統膜炎敷處如PL、骾間系痛敷處如I、腎炎、或脊痛敷處如KS、骨節痺敷處如R、

第六十七圖



此圖表明人體之正面敷生砲藥處、心統膜炎敷處如A、闌尾炎敷處如P、槩炎敷處如L、嘔吐、或胃炎敷處如V、胸統膜炎敷處如PL、骨節痺敷處如R。

練之、後再練升降樓梯、最妙者、乃造一五六級之小梯、結構堅固、兩旁有欄、不致有跌落之虞、練時必專用其腿力、方能見效、盖練此法者、每多用其手力攀欄、以拽其身體、亦有畏其腿屈伸之難、用兩臂之挺力而上者。又法、使病者坐於圈椅上、起坐練之、但起坐時、不准假手之力、凡練此法、最緊要者、不宜過勞、以致有損、每日練二三次、每次一刻鐘足矣、且練時一聞所命、宜即從之、如臂有失和動之患、宜會通以上之法練之。

外惹內效之法 (COUNTER-IRRITATION)

此法乃用有惹力之藥、敷於皮上、以免發炎、或積血、或疼痛、或祛炎後滲出之質、此類藥分三種、即潰藥、起皰藥、紅皮藥、是也、無論某處發炎、不宜敷於該處、宜敷於四圍、或輕點於紅處之四圍、令起微皰、或敷於腦系相連之處亦可、如目發炎、以起皰藥敷於耳後有效、蓋因此處腦系與目之腦系相連也、按覺系受傷之時、痛處常在系末、故腹內系痛、或髀間系痛、常因脊梁有病而致、宜以此類藥敷於脊骨之旁、痛系所出之處、脾癇初起時、其痛乃在膝或踝節、必以此類藥敷於髀上、方能見效、用此法以醫炎症如下、如肺統膜炎[1]、肺炎[2]、眼簾炎[3]、因痺或受傷所致、滑膜炎[4]、顱腦炎[5]、腹統膜[6]之新久炎等症、用之皆效、若肺炎、或肺統膜炎初起時、以洋斑

1 Pleurisy
2 Pneumonia
3 Iritis
4 Synovitis
5 Cerebritis
6 Acute or chronic peritonitis

病者久卧、其肌久不經用、以致功用漸失、練行動時、或有旁腦司所並旁腦系、代作其不作之功、其故雖難細解、然用此法、每能見效、最緊要者、宜加意緩緩練之、否難見效。

第六十六圖



此圖係練和動格具

練腿之法　病者仰卧牀上、舒其雙腿、使人手對病者之足、約高二尺、伸其一指、令病者抬足觸其指、如此練三四次、則縮腿使足及股、繼縮之使膝及腹、再緩伸其腿、仍觸人指、二腿互相遞練、既畢、將腿緩緩放於原處。

又法、乃木板所製之練具、此具上有十二格、以爲置足之處、（如第六十六圖）病者卧時、二足置此具之二格內、有人令其抬足移於某格、宜立從之、設右足在第一格、令其移至第四格、左足在第七格、令其移至第六格、不宜違令、此具之楞、宜釘以布、以免足踵受傷。

又法、令病者閉目而立、初練時、必有顛仆之患、練至數月、或能立穩、後則開目以一腿站立、如能立穩、仍閉目練之、或以黑油在地板上、刷一黑道、約寬一尺、使病者履之、不可令其足偏於左右、如其病重必須有人扶之、若赤足履之尤妥、但不宜使踵先着地板、且不宜使其足橫行、此二者乃失和動者恒有之弊、俟能履此道、再刷一窄道、

第六十五圖



此圖表明浴後抬出之式

六 患腸熱症者、每三句鐘、宜入冷水一次、水之度數、宜在七十或五六十度。

七 用冷水沐浴時、如因器具不便、可以他器代之、不可因而輒止。

八 不可用庫秋蟠覆於腹上、因其令人皮色變紫、不能增病者之精神。

九 用冷水之大意、無非使病者抵拒其冷、以增其生命司所之力。

和動之練法 (CO-ORDINATED MOVEMENTS FOR TREATING LOCOMOTOR ATAXIA AND MYELITIS.)

此法之大旨、乃令失和動者、練習行動之法、果能如法練之、必見大效、按人失和動之力、其故有二、一因脊腦中有病、二因

四 如病者不喜冷水、寧可多搓其身、令早出水、切勿加以熱水。

五 沐浴之時、不可不搓病者之身、免其過於受冷。

第六十三圖



此圖亦表明用沐浴抬板之法

第六十四圖



此圖表明沐浴時以抬板置於盆底之式

第六十一圖



此圖表明沐浴抬板之式

第六十二圖



此圖表明用沐浴抬板之法

搓之、方能使熱血至於皮膚之血管內、以免臟腑積血之虞、近之著名醫者、用冷水醫病、所宜切記者有九、臚列於左。

一 用冷水非爲減熱、乃爲增病者之精神。

二 用冷水時、不宜使病者皮色變紫、或牙齒戰觸。

三 切勿因病者不喜冷水沐浴、聽其遲延出水、如牙齒戰觸、則不必禁之。

片時、倘不復原、則用熱水袋覆其足心、並飲穀烝酒少許、則無此狀矣、無論用何類冷水之法、用時宜以冷水袋覆於頭上、以免顱腦積血之患、且以浴盆置於牀傍、俾病者少受煩擾、如無抬板、必須數人謹愼抬之、方可、最要者、不令病人稍費氣力、抬板有數類、以最便者言之、卽木板一塊、中作數孔、大小與浴盆之底同、一端以活板作枕、可免頭入水內、用時以庫秋布、鋪於牀上、以此板置於布上、後移病者於板上、使之入盆、盆內之水、宜僅沒其身、若水過多、必致身體浮蕩、最爲不安、浴畢、將板之上端、搭於盆邊、下端墊以橫木、使水下流、用布輕輕拭乾、越數分鐘、抬至鋪庫秋布之牀上、暑熱時、只覆一單被、冷時可多覆一絨毯、但不可過嚴、且不可於覆濕單被時覆之、否則反增其熱度也、腸熱症如已越十五日、不可以冷水浴之、蓋其力甚弱、不能抵水之冷也、如在初患時用之、不但有祛病之益、且能保其身力不失也、如兼有腸流血、或心經虛弱、或腎經發炎等患、不宜用之、或言兼患肺炎者、仍可用之、然肺炎若非肺經血停之故、仍不可用、按患腸熱症者、初三四日、雖用冷水沐浴、熱度必難減少、他類熱症則不然、醫者宜切記之、無論此類症、熱度如何、宜每日用右手執海絨、蘸冷水揸其全身、以左手搓之、此不特潔其皮膚、且增其精神、中暍者、可以冰塊揸其身、或以冰水沐浴、但必多

此圖表明患腸熱症者、病至七日後、以冷水揸身至八十五次、熱度減少之狀、圖中之直虛綫、乃揸時所減之熱度、直實綫乃揸後所增之熱度、橫虛綫乃每日早晚之熱度、可知用冷水減熱之法、不但獲效於一時、而其所保護者甚大也、如揸時熱不見減、乃係水之冷力不足、或搓法不合宜之故、揸後熱不見增、乃係抵冷之力不足、宜加熱水少許而搓之、越數日專用冷水、則能抵禦矣。

畧高、俾水易於下流、水之度數、宜酌病勢用之、此法蓋因單被噴濕、水氣易散、而熱度必減耳、用時亦必搓其全身、令血入於皮膚之血脬內、可免血停臟腑之虞、以上之法、如不能減熱至百零一度、則宜用入冷水法醫之、其法如病者之熱至百零二度、或百零二度有半、常以七十度之冷水一盆、將病者放於其內、每三句鐘一次、每次十五或二十分鐘之久、宜以寒暑表噙於口內、或深塞於肛內、如其熱減至百零一度、即宜出水、不必拘定時刻、否則恐熱度過減、無力抵冷、有腦力脫失之虞、但在水內時、必有人搓之、方可、如未入水時、以牛乳半盃、穀酒半至一量兩、(16.0-32.0) 合服、能助其抵冷之力、當初入水時、病者自謂寒冷難忍、及至出水、面變藍色、此狀雖似甚險、究屬無妨、越


97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

圖十六第


TEMPERATURE (FAHR.)
DATE
RESP.
PULSE
DAY OF DISEASE
URINE
BOWELS
February
ON ADMISSION
SPONGE
ENEMA WILL BE ASAFOETIDA (EFFECT)
ASAFOETIDA ENEMA

必速、且增生命司所之力、如先用溫水、後緩加冷水、則失其激絡腦二部之力、而少有功效矣、病者用冷水沐浴、與健壯者用之、其理同、皆爲激其生命司所耳、如甚虛弱、宜先用溫涼之水、後日加冷水、至能忍受爲止、揸冷水法、病者年邁或虛弱、如用此法、水之度數、宜酌病勢用之、九十至七十度不等、如能抵七十度之冷、卽宜用七十度之水、若抵冷之力微小、必用尤溫之水、方可、用時宜以一手持海絨揸之、一手隨其揸處搓之、若係青年、或不甚虛弱之人、水之度數、亦宜酌病勢用之、七十至三十二度不等、倘身熱不見減少、則以冰塊揸之、但必隨搓其皮膚方可揸時以庫秋布鋪於牀上、複以絨被、使病者解衣而卧、則牀上之被褥、不至濡濕、但必多搓其脊背、方可、蓋背肌與皮膚最厚、每多存熱、血則多停於此、故宜多搓、且搓腰時、腎亦大得其補助、如病者有抵冷水之力、用後皮必發紅、血運更顯有力、腦力尤爲靈便、如以約二斤之冰塊、揸病者之身、務須謹愼、而退熱之效最準、腸熱症[1]越七日者、用之必效、倘其無效、必用者不得其法耳、最要者乃以一手持冰塊揸之、一手隨其揸而搓之、則血方能往復運行、且能抵冰之冷力、有醫者用冷水揸病者之身、而不見效、則用小牀一張、鋪以庫秋布、再複以單被、使病者解衣而卧、以單被覆之、以水置於噴壺內、以澆其身、但必使小牀一端

1 Typhoid fever

週身之血、則均勻運行、若過於虛弱、可使立於溫水盆內、以免足冷之患、用畢、宜躺卧片時、失寐之患、此法亦能醫之、若因顱腦內血運不週而致、或過用腦力、至當寢睡時、腦仍不能休息、此法每效、亦有時此法能激人之全身、使已失功用之經復原、但宜日用一次、如醫失寢之患、則臨睡時用之、他病則用於清晨爲最妙、見第五十九圖。

醫熱之冷法 (Cold in Fevers) 凡各類熱症、用溫凉水、或冷水、或極冷水、醫者俱宜因病酌用、有病者心神不安、不能寢睡、然其熱不見甚重、若以溫凉之水、或以水與酒各半、或以穀烝酒加塩少許、搓其全身、則腦部可安、熱度亦減、必能穩睡矣、或有但搓其四肢而見效者、然必兼脊背搓之、方見大效、用法、以溫水浸海絨、畧擠而擦之、則身上之水、散而爲氣、熱度必減、如溫水無效、宜用冷水、近數十年、泰西各類重熱症、常以冷水醫之、用之者、已見實效、故謂較用他法尤妙、昔之用冷水、以浴熱症者、以爲減病者之熱度、近知其減熱乃小效耳、其大效乃因其能激司絡腦所、則使血運行於週身、不但無血積臟腑之患、並增其育身之功、且激其皮膚腎經、使之多祛身內之毒、若常如此、則熱度可減、亦不易生卧瘡、或他皮患、按用冷水退熱、必宜速搓、且須搓其週身、使臟腑熱血、多至皮膚之血脈內、其熱大爲減少、所用之水、必使絡腦二部被激、則血運行

1 Insomnia

當出水、倘仍在盆內、必較前尤冷、此乃因時過長也、若於覺煖時出水、激厲之效、必終日存於身內、夫以上之理、試晰言之、人一入水、身之熱度大減、勻熱司所未增其作熱之力、皮膚之血管縮小、血則被催至於臟腑、故其人甚覺寒冷、越片時心經受冷所激、其力增長、臟腑所存之血、被催運行全身、並勻熱司所、亦受激而增其作熱之力、故此時身體覺煖、精神頓增、若爲時過久、其生命司所、過於受激、必致激變爲阻、身內各經之功用、大受擾亂矣、虛弱者、用冷水沐浴、入水時其狀與健壯者同、但其心與勻熱司所之力、不足抵水之冷、血仍存於臟腑、其人終無覺煖之時、必有傷風、或臟腑積血之患、與健壯者在冷水中、爲時過久之狀無異、若加鹽於其內、使如海水之鹹、其激發精神之功較大、如以海水沐浴、其效尤妙、嬰孩每日宜用溫水沐浴、但爲時不可過久、數分鐘足矣、否則精神必致耗失、或謂人因用力而多生汗者、不宜浴以冷水、此論謬矣、角力者角畢、全身生汗、或用冷水沐浴、或投入冷水內、但其時不可過三十秒鐘、此等沐浴、乃免週身發板之患、腦力衰弱者、以單被蘸於水內、擰乾、裹身、並覆其頭、乃爲妙法、但宜自搓其前身、倩人搓其後背、則血速回至皮、而身體覺煖矣、初用時、惟數分鐘、且於冷水內、少加溫水、每日漸減、至不加溫水、亦能忍受爲止、其益乃在絡部被激、而

第九十五圖

此圖表明單蘸水身冷被裹之法。

第五十七圖



此圖表明肺葉炎、胸統膜炎、或心統膜炎等症、用庫秋蟠之法。

第五十八圖



此圖表明顱腦衣炎、或顱腦積血、用庫秋蟠之法、頭痛亦可用之。

顱腦[1]衣炎、或顱腦[2]受傷、以冰袋覆其頭上大效、失寐[3]之患若以冷水袋覆於頭上、以熱水袋覆於足心、則常能安睡、若因過用腦力之故、其效尤顯、顱腦血虧[4]而失寐[5]者、臨睡時入冷水中、拭乾再寢、每效、蓋其身一入冷水、週身之血、運行速而有力、則顱腦之血、不至甚虧矣、亦有用熱水沐浴者、其效尤妙、然此類之病、非因顱腦血虧、乃因腦部被惹也、（見熱法篇）如欲以冷水覆頭、宜以庫秋管、製成蟠形而戴之、用二水桶、一貯以冷水、置於凳上、空者置於地下、使此管一端、入冷水桶中、一端入空桶中、用時吸水入管、則成虹吸流水之勢、水若流盡、則將二桶交換、水則又流入彼桶、如此循環不已、病者即得其效矣、遺精[6]之患、有醫者以冷水澆會陰、或陽囊、並腰處、亦有醫者、當病者臨睡時、以冷水一杯、浸陽囊數分鐘、亦效、患痢[7]症者、如將冷水或冰水二至四量磅、（1000.0-2000.0）緩緩射於肛內、大效、痔[8]症無論用何法、如兼射冷水於肛內、則有輔效、以冷水沐浴、係增力之法、然用之者、必先視其能有益否、虛弱之人、無論用何沐浴之法、如用之過動、且爲時過長、腦力易致耗竭、但此多因每早用溫水沐浴之故、若健壯之人、用冷水沐浴、始則全身發顫、似不能忍受、水一至腹、則吸冷氣、身生寒粟、越片時自覺暑煖、寒粟盡消、皮有紅色、脉大而速、呼吸之氣充滿、如此週身多得血之養育、自覺有力、此時即

1 Men ngitis
2 Injuries of the brain
3 Insomnia
4 Cerebral anæmia
5 Insomnia
6 Emissions
7 Dysentery
8 Hemorrhoids

木、可以細鹽撒於冰塊上冰之、越片時則有痲效、此法不可輕視、以其能速凍該處之腑也、如欲其尤速、可以伊打置於噴霧具內噴之、亦可以伊替氯鹽代之、其效相等、用此類藥、必遠離燈火、緣其氣易燃故也、腦系痛[1]症、如其系與皮膚相近、以冷法冷之、有效、眶上系痛[2]此法最爲合宜、但必至該處之皮白而變硬方止、如一次無效、可日日用之、至半月或二十日、庶可見效、髖大系痛、亦有以此法醫之者、有醫者於輕割症、用凍法使之痲木、然不爲妙、因病者受凍之痛、不減於受割之痛也、若用灸具時、先凍其灸處、乃爲止痛之妙法、肺炎[3]或肺統膜炎[4]等症、如用冰袋或冰衣或冷水蟠、俱效、但病者虛弱、以上各法、俱忌用之、冰袋之製法、乃以碎冰與鋸末相合、鋸末之多寡、以盡陳冰化之水爲宜、裝以布袋、使之平勻、用綫縫之、不令其攢聚一處、裹於胸前、但此法難免沾濡被褥之虞、有著名醫者、另用一法、醫肺炎[5]症、以布蘸於冷水內擰之、裹於胸前、每五分鐘換一次、雖病者不喜此法、越數句鐘、自覺大效、疼痛氣促、漸次減少、脉亦平穩、身熱每減一度、病勢不至如從前之甚也、初用時、即病者戚友、亦俱以此法爲不佳、至功效顯著、則樂用之矣、人用此法、鮮有不見效者、心內衣炎[6]或心外衣炎[7]等症、以庫秋冰袋覆前心、頗效、不但能免心跳、亦有平心祛炎之功、腸熱症[8]用冷水袋覆前心、亦效、

1 Neuralgia
2 Supraorbital neuralgia
3 Pneumonia
4 Pleurisy
5 Pneumonia
6 Endocarditis
7 Pericarditis
8 Typhoid fever

再後用錄氣強鹽一分水千分之消水、浸手於其內、至一分鐘方可、如割時必須以手摸未經滅穢之物、宜先以布浸於錄氣消水內、裹於手上、不然、摸後必再用消水洗之、最妙之法、乃著庫秋手套、雖手有毒穢、亦與病者無妨、有醫者先用以上之法盥手、後以熱水加鈸錳上磐所製之濃消水、浸手於其內、再浸手於草酸消水內、以祛其色、再後以烝水洗之、以祛草酸、始行割治、但用此法、仍不免手皮破裂、故、不如著庫秋手套之爲妙也。

冷法 (COLD AS A REMEDY.)

其法如用之合宜、必有功效、其用可分二類、一用於全身、用於一處者、其效有二、一如某處之血脈有積血之患、以冰塊或冷水冷之、頗效、二如腦系疼痛、以氣易散之藥、置於噴霧具內、噴於痛處、冷時自不覺痛、冷過其痛或自此而止矣、燙傷或筋扭之患、泰西之人、常將傷處浸於冷水內、亦有時用熱水浸之、或乾熱氣煖之、其效與冷水同、詳見熱法篇、總之或冷或熱、當在病者自擇其宜、用此冷熱二法、爲使血脈縮小、無所滲出、且使所積之血流通、故腦系不受其擠力、跳痛之患則止矣、踝節扭患、如以布蘸冰水裹之、或以冰袋覆之、乃爲妙法、一處之炎患、冷之之法不一、最便者乃以豬或羊之胱、或庫秋袋盛碎冰、覆於患處、如欲某處、暫時痲

1 Sprained ankle

此藥只有益於生膿之傷、若敷於無膿者、不爲妙劑、生膿愈多、藥效愈顯、然必敷至生膿處方可、如藥與膿相合而成痂、痂下仍生膿、藥力難達、則無效矣、且痂阻膿之外流、與病者甚爲有險、割症時宜將無稜之黃氣、置於大口瓶內、覆紗布一層、屢時隔紗布撒於傷處。

幾阿林（Creolin） 此藥頗有滅稜之能、且無惹力、在有力之免稜藥中、毒力爲最小。故醫家多用之敷於皮上、潤性如油、與烯醇迥異、水不能化、然與水調勻、色白而不透光、故用之滅割具之稜、不爲妙法、蓋置割具於其內、視而不見也、割症者、以藥五分、加水百分、用以潔手、則無裂皮與阻捫覺之患、用之以洗傷處、或冲膿痰、或用於分娩時、皆有大效、常用者即藥二分水千分、至藥五分水百分。

氫氣强洽 Aqua Hydrogenii Dioxidi, U. S. Hydrogenii Peroxidi Liquor, B. P. 此藥之用、乃敷於生膿之瘡、或射於膿腔之內、藥遇膿自沸、至膿盡受氫之改變爲止、如有不易透氣之膿痰、則不易用、蓋因氣無從散出耳。

盥手之法（Preparation of Hands） 醫者與助割症者、用熱水與鹼、由手至肘、以刷刷之、至三分鐘之久、以木杖與刷、剔淨指甲之汚穢、再用鹼水洗之、後用醇酒洗之、至一分鐘、

十分、以免割者手沾消水、而覺系被阻也、此藥之氣易散、如以紗布蘸之、置於過空氣處、越數句鐘、力則散盡、而無免穢之功、只爲無穢之布而已、有醫者常按此理、而獲割口收斂之速效、因免穢藥類、多有惹力、割處難於收口、若以紗布浸此消水、覆於割處、越數句鐘、身之熱度、必使藥力散盡、割處大獲滅穢之功、穢既無從而入、割口亦不受穢藥之惹、故收口最速、倘用之過多、不但有中毒之險、且醫者之手受惹、難免皮裂之患、如手裂皮、割症時手上之毒穢、不易滅盡、恐病者受毒也、且用力量更大之消水、其手必覺痲木、以致捫覺受阻而不靈。

褓毛消水 Liquor Formaldehydi, U. S. 此消水大有滅癘毒之功、但甚有惹力、令人疼痛、故不常用、如以此消水一分、似盬塩消水二千分、以冲大疾、或洗爛肉皆可、其大用滅病室中傳染之毒耳。

黃氣 Iodoformum, 此藥常爲免穢之用、但無滅穢之能、然其免穢之力、不在能滅穢、乃在生穢處、藥質改變、而成穢胜蜮之敵物、如此則生膿不至太過矣、穢類能生長於此藥之內、若以有毒穢者、用之以敷割處、必致有損、然有法滅之、先以此藥置於錄氣强塩一分水千分之消水內洗之、後以甫烝之水、將藥中錄氣强塩洗出、則穢類滅盡矣、

水二千分矣。

以此消水洗患處、有用藥一分、水五百分、或千分二千分四千分不等、俱因其病而制其宜耳、若患處甚深或甚大、僅用藥一分水萬分、其力已足、常有割腹者、用藥一分水萬分冲之、以至中毒、平常割症之用、乃藥一分水二千分、在割症前一日、洗割處之皮膚、其法先以輭巾與熱水洗之、薙淨該處之毫毛、再洗之、又以醇酒或伊打洗之、後以此藥一分、水千分之消水洗之、再以此藥一分水二千分之消水、以布蘸而覆之、纏以布條、以備割治、割症時所用之消水、若宜用力量甚大者、必隨用力量小者、冲洗割處、以免陳藥中毒之虞、割後所用之覆類、宜先煮於滾水內、晒乾、再以此藥一分水五百分之消水蘸之、後再以此藥一分水四千分之消水洗之。

炭酸 Phenol, U. S. Acidum Carbolicum, B. P. 此藥胎質不能阻其力、與錄氯强塩均屬有毒之藥、常用者、乃藥一分水二十至四十分之消水、雖水十五分能化藥一分、然不能立時化之、如欲以藥一分水二十分、使之立成消水、必以熱水方可、若不用熱水、必極力搖動、否則此藥必沉於盆底、用時難免受其潰力、故宜防之、且此消水有滅穢之能、常用以浸割具、在未割之前半句鐘、即以所用之割具、浸於其內、割時再加滾水等分、則成藥一分水四

常用者如左。

鉾氣强鹽 Hydrargyri chloridum corrosivum, U. S. Hydrargyri perchloridum, B. P. 此鹽一分、加水五萬分、滅穢之力仍存、倘水內有胎質、則鹽必與胎相合、變成鉾胎蠀、即無滅穢之力矣、如以此鹽與烝水製成消水、日久體質必變、滅穢之力亦減、若加鈉氣鹽或淡酸類少許、則體質即不能變矣、故此消水宜用現製者、如欲存之、必加鈉氣鹽等分方可、有醫者云、宜加鈉氣鹽十倍、方免改變體質、割症時必用棉蘸此消水擦之、擦時消水不能不與血盟並他類之胎質相合如割大症、需時甚久、恐滅穢之力減少、故醫者宜謹愼防之、方免此患、防法有二、一多用消水、使胎質不能阻其力、二用較此藥多五倍之菓酸、亦可免胎質之阻力、良方如左。

鉾氣强鹽	Hydrargyri chloridi corros, U. S. Hydrargyri perchloridi, B. P.	十五英厘 (1.0)
菓酸	Acidi tartarici	一英錢 (4.0)
烝水	Aquæ destillatæ	二量磅 (1000.0) —M.

此方有鉾氣强鹽一分水千分、用時常有再加水一倍者、是此藥一分、

第三十三章　論醫病法

針刺法（ACUPUNCTURE）

此法乃以針刺身、爲止痛消腫祛痧之用、如腰痺[1]與髖大系痛、其效最顯、醫腰痺之法、先以二針煮於滾水內數分鐘、以滅其穢、即將二針立刺入腰肌、約深八至十二分、俟數分鐘、則謹愼起出、以防針折之虞、按此法刺之、每有立效者、若痛在腰之兩旁、此法尤妙、醫髖大系痛、功效雖不如醫腰痺之準、然仍宜用之、其所用之針、滅穢尤須謹愼、宜刺至髖大系、即透入系鞘亦可、曾有名醫謂用此法射哥羅芳莫非等藥、其效尤妙、有時以針刺於髖大系出盆微下之處、其效最顯、又有醫者云、若以針刺無病之腿、與病腿相對之處、最效、惟於新痺症、與患熱症之腰痛、毫無功效、患痧瘴者、如其腿甚瘴、以針刺之、可放其痧、但越片時、針眼即塞、故不如以刀割之、但在未割之前、必先以滅穢之消水、洗淨該處、割後用滅穢之絮覆之方可。

防穢法（ANTISEPTICS）

此法所用之藥、與滅瘴毒藥不同、不必有滅穢之能、只能阻穢生長、或敵穢毒力、或免毒被染、或保護身膈、滅穢藥類、其功效亦與此同、故此二類藥常並論之、排醇、與鋅氣强鹽等、專有滅穢之力、若黃氣只能敵穢所生之毒、並無滅穢之力、近數十年來、多有醫者用心考查此等藥類、新製甚多、然鮮有上品、故罕用之、所

1 Lumbago
2 Sciatica

至半量兩、(4.0-16.0) 在英揀藥册者、分劑、十五至六十量滴、(1.0-4.0) 服時多加水送下、有著名醫者謂、如人過用目力、以致頭痛[1]、用此藥醫之、每有大效。

阿波冷 (ALBOLENE) 此藥係一類之脂、由羊毛脂而得、其質如水、無色、無味、空氣或酸類、俱不能改其體質、如口鼻洞膜發炎、以此藥與他藥相合、詳見五百三十一二面之方內 置於噴霧具內噴之、有效。

1 Headache

療效　白濁之晚程[1]、如病者顯久病之狀、此藥有效、醫家有於初患白濁、以此藥抵之者、然非妙法、因傷風而鼻泗膜腫痕[2]者、如泗膜顯多生液、以此藥之散、作鼻煙嗅之有效、若泗膜生液未多、忌用、氣管久炎[3]或纏延[4]之氣管炎、此藥之脂楠、乃爲妙品、喑啞[5]者、如以此藥之散、製成紙捲、吸之有效。

藥製與分劑

畢澄茄散　(Pulvis Cubebæ)　十至六十厘　(0.6-4.0)

畢澄茄流膏　Fluidextractum Cubebæ, U. S.　十至三十量滴　(0.6-2.0)

畢澄茄酒　Tinctura Cubebæ, B. P.　半至一量錢　(2.0-4.0)

畢澄茄脂楠　Oleoresina Cubebæ, U. S.　二至二十量滴　(0.12-1.3)　置於藥殼內、或製成勻藥、日服三次。

畢澄茄餅　Trochisci Cubebæ, U. S.　此餅乃爲醫嗓炎久症之用。

畢澄茄油　Oleum Cubebæ,　五至二十量滴　(0.3-1.3)

氫氰酸　(ACIDUM HYDROBROMICUM)　此酸大有惹力、但服之較他類氰藥、少顯腦腺發炎、而其體功效無異、醫家所常用者、乃淡氫氰酸、Acidum Hydrobromicum Dilutum, 分劑、一量錢、

1 Gonorrhœa
2 Cold in the head
3 Chronic bronchitis
4 Subacute bronchitis
5 Hoarseness

此膏似水、服用最妙。

哈瑪米利消水 Liquor Hamamelidis, B. P.

哈瑪米利酒 Tinctura Hamamelidis, B. P.

哈瑪米利抹膏 Unguentum Hamamelidis, B. P.

鈉熅强礬 (SODII ETHYLAS) 此藥色白、其質細粉、置於水內、則分成醇酒與鈉洝、純酒能化之、但不改其體質、入藥者乃爲除毛痣並祛色痣之用、用法、以剪剪去其毛、化此藥於純酒內、用玻璃箸蘸敷、越片時該處必致成痂、至半月將痂揭去、則毛根即盡絕矣、如毛根未絕、嗣皮復原後、可再如法敷之、如於未敷之前、以寇卡印五分、加水百分、製成消水、射於患處、則能止痛、如以此藥敷於痣上、脫去之後、或遺小瘢、英揀藥册中有鈉熅强礬消水。 Liquor Sodii Ethylatis, B. P.

畢澄茄 CUBEBA, U. S. CUBEBÆ FRUCTUS, B. P. 此藥乃一類樹所結之果、未熟者方入藥用、產於加拉巴島、色黑、形如小豆、乾則抽縮不圓、嘗之味香、內含一油一酸並一精、油名畢澄茄油、酸名畢澄茄酸、精名畢澄茄精、惟油之氣易散、按此藥之力易失、藥行中如欲收存不可製成藥散、必臨用現製方可、人服過分劑、則有道尿徑有發炎之患。

鐘、約有三十秒作痛、射後越半句鐘、其痛不似以先頻作、無痛時亦能安睡、倘一次不能大減、勿再與莫非同射、宜專以此藥、如數射之、用此法者云、不但分娩時、弗覺疼痛、且無意外之虞、然不可確信、大約此法較用他迷蒙藥、尤爲阽險。

哈瑪米利 HAMAMELIDIS CORTEX, HAMAMELIDIS FOLIA,

此藥係一類之草、產於美國、因所含無緊要之精、故無體功效、然其醫症之能力、亦不爲小。

療效 如因泗膜常炎、或因受風、以致嗓鬆而痛者、以此藥之烝流膏二十至六十量滴、(1.3-4.0) 加水一量兩、(30.0) 合勻、置於噴霧具內噴之、婦人分娩之後、如猶微流血不止、服此藥每效、吐血或咳血者、服之有效、溺血症、他藥皆不能止者、此藥每能止之、腿患新瘍者、如以布蘸此藥之流膏、敷瘍四圍發紅之皮、則必速於復原、但用藥時、宜將腿墊起、不令血停於患處、方能見效、胱流血症、以此藥之烝流膏、射於胱內、有效、痔症無論流血與否、敷服俱效。

藥製與分劑

哈瑪米利流膏 Fluidextractum Hamamelidis Foliorum, U. S. 五至二十量滴 (0.3-1.3)
Extractum Hamamelidis Liquidum, B. P.

哈瑪米利烝流膏 Aqua Hamamelidis, U. S. 三十至六十量滴 (2.0-4.0)

1 Relaxed sore throat
2 Uterine oozing
3 Hæmatemesis
4 Hæmoptysis
5 Hæmaturia
6 Leg ulcers
7 Bleeding from the bladder
8 Hemorrhoids

人聰敏、宜備半量兩、(15.0)示以用法、聽其自用、若庸愚者、宜僅備一日所用、多加以水、不但免藥力散失、且免受毒力、按此藥有染衣之能、故醫者宜示人慎用、尤宜示人者、去瓶塞時、宜距面畧遠、恐瓶內之氣噴出、以致面目受損。

毒力　人服毒分劑、則顯腸胃甚炎、嘔瀉帶血、腦力脫失等患、甚殞命也、或因藥力穿透育道、或因育道發炎、或因腸內收窄、或因胃經液腺大受損傷等故。

解毒法　宜服鎂硫強鬱、灰消水、鹹消水等淡鹼類、與油類以解之、亦宜服鴉片、以平育道、如用煖身之法、或可免腦力脫失之患。

司寇坡拉印 (SCOPOLAMINA)

此乃司寇坡拉之鹽、本藥之體功效、與顛茄鬧羊花甚同、此鹽之體功效、與亥歐辛印相似、所常用者、乃司寇坡拉氫鹽、Scopolamine Hydrobromidum, U. S.　曾有外科醫者、以此藥一厘之百分之一、(0.006)與莫非一厘之十二分之一、(0.005)相合、於割症之先、一至三句鐘、勻開射二至四次、以代伊打或哥羅芳之用、然不甚穩妥、故醫家少有用之者、亦有人射一或二次、使病者過迷蒙之初程、再用伊打或哥羅芳熏之、如此則易奏迷蒙之效、曾有人以此藥一厘之百五十分之一、(0.00043)與莫非一厘之六分之一、(0.01)相合、射於產婦身內、以減分娩之痛、如四五分

療效 如因食滯而致頭痛嘔吐者、或腸胃[2]失功以致食滯者、或小便[3]含錯草鬱而兼顯瘧[4]患者、均以此藥爲上品、因其於肓道液腺、不但有補之之功、且有激之之力也、殘瀉者、服之亦效、按此藥大有激膽之能、如以足分劑、連服數日、或能令人大瀉膽液、故肝[5]變硬之初程、以及肝[6]失功用之新或久症、服之有效、[7]熱道之肝炎久症、乃爲最妙之品、但此症宜以足分劑、連日服之、至顯瀉膽、或肓道發炎、方可停止、健壯者肝炎新症、宜服平藥類、此藥有激力、故不宜服、服此藥時、另有助其奏效之法、其法以此藥加於水內、或沐浴全身、或專浴其足、俱可、印度著名之醫者、備沐浴水法、先以氰强酸二分、氫氯酸三分相合、越二十分鐘、加烝水五分、搖動之使成消水、加於水內用之、如欲沐浴全身、先以水五桶、傾於浴盆內、(宜用木盆)加此藥之消水四量磅、(2000.0)再加滾水、使浴盆之水熱至九十八度、始行沐浴、浴至二十分鐘、即宜停止、以布拭乾、卧於牀上、以被覆之、如專浴其足、以九十八度之熱水、十四量磅(7000.0)加此藥之消水六量兩、(180.0)浸足於其內、並以海絨浸浴其股、至三十分鐘、宜止而拭乾、因嗜酒而肝失功用者、用此浴法有效、如沐浴時皮膚受惹、宜少加此酸、以免惹患。

服法 成人每餐後可服三至五量滴、(0.2-0.3)宜多用水送下、且宜用玻璃管服之、如其

1 Biliousness
2 Indigestion
3 Oxaluria
4 Lienteric diarrhœa
5 Hepatic cirrhosis
6 Hepatic torpor
7 Chronic hepatitis of hot climates

爲妙法、孩童暑熱綠瀉[1]症因此藥有斂力、並激腸腺之功、服之每效、孩童之殘瀉[2]症、無論所便者、或爲水、或似漿、俱有惡臭、以此藥與倍辛兼服、有效。

藥製與分劑

淡氫强酸 Acidum Nitricum Dilutum, 三至十五量滴、(0.2-1.0) 必多用水送下、且宜用玻璃管服之、以免牙齒受損。

騰氣氫强酸 Acidum Nitricum Fumans, B. P. 此乃大有力者。

毒力 服毒分劑、腎大受惹、育道發炎、以致便溺帶血、口腔與腹、大作疼痛、遂至殞命、即其人未立殞命、亦難保生存、恐致腸內收窄、或胃經液腺受傷也、以此酸滴於體膈、或衣服上、必致染成黃色。

解毒法 宜服淡鹼類以解之。

皇强酸

ACIDUM NITRO-HYDROCHLORICUM, U. S. 此藥乃氫强酸二分、氫氯酸八分、相合而成、係紅色流質、製時必俟所發之氣騰過、方宜貯於玻璃瓶內、以玻璃塞塞之、置於暗處、宜臨用現製、不可存貯多日、以致藥力散失、揀藥冊內有淡皇强酸、色淡黃、其性質與本酸不同、故不常用。

1 Green diarrhœa
2 Lienteric diarrhæa

氰強酸

ACIDUM NITRICUM

此酸在入藥之金酸類中、乃爲最有力者、其質如水、存貯日久、色變淡黃、故宜貯於黑玻璃瓶內、以玻璃塞塞而存之。

體功效　如以此酸之濃者、敷於胭上、大有潰力、若多加以水、敷於泗膜、則顯惹斂二力、服微分劑、腸胃生液之腺、則被其激。

療效　此藥有敷服二用、其外敷之用、[1]癯初瘡、或[2]瘨瘡、敷之有效、但必先於患處之四圍、敷以油或抹膏、方免無恙之胭、受其潰力、[3]瘊或[4]疥、或[5]殰瘍等患、敷之亦效、但未用之先、宜備鹹水、至潰力已足、則敷而解之、以免受潰過甚、有著名醫者、[6]醫痔症、以此酸之濃者、點一或二處、該處不覺甚痛、即結成瘢、其瘢漸漸縮小、則痔亦必隨之而小、但不可滿敷患處、以致受損、此醫亦云、[7]流血痔症、如以此藥半至一量錢、(2.0-4.0) 加水一量磅、(480.0) 敷於患處、則血流即止、不但此也、患處且獲收斂之功、腹內之墜痛、亦遂不覺、其內服之用、有補斂二功、[8]小便含鎉草礬者、如皇強酸不便、可用此酸代之、究不及皇強酸之妙、如[9]口內生小瘍、可以此藥三量滴、(0.2) 約加水一二量兩、(30.0-60.0) 用玻璃管服之、有效、[10]胃不消化者、如於餐後每覺食物由胃反口、食畢以此藥數滴、加水服之、每效、[11]腸不消化者、如於餐後數句鐘、覺腹內不安、且有疼痛、以此藥與苦補藥兼服、乃

1 Chancres
2 Chancroids
3 Warts
4 Gangrene
5 Phagedenic ulcers
6 Hemorrhoids
7 Bleeding hemorrhoids
8 Oxaluria
9 Stomatitis
10 Gastric indigestion
11 Intestinal dyspepsia

敵鼠疫盟 (ANTIPEST SERUM) 此盟乃近之醫者、爲敵鼠疫[1]而備、製法與敵痨盟迥異、先備肉湯若許、將患鼠疫者之血取出少許、置於湯內、以微火熱至一定之度數、如此兩月、血內之稑、則必滋生、再熱之、至稑盡死爲度、以空針射於皮內、必有敵此疫之能、但必及早用之、如人已患此症、不特無益、反致有損、但射後五至七日、如遇鼠疫之染毒、較常人尤易患之、及至十日、少有患之者、有醫者謂射此盟後、患之者只有四分之一、且較未射者、減輕十倍、亦有醫者謂射此盟十日之後、未見有患此疫者。

雜藥類

鈦砂強礬 (POTASSII SILICAS)

鈉砂強礬 (SODII SILICAS) 此二藥係無色之流質、又名流玻璃 可代石膏之用、骨折[2]筋扭[3]等傷、以此藥刷於布條上裹之、越片時藥則變硬、有輔助傷處之功。

糖 SACCHARUM, U. S. SACCHARUM PURIFICATUM, B. P. 此糖係蔗糖煉成、白者乃入藥用、蘆粟或蘿蔔、亦含此糖、有免腐之能、而無免釀之力、如加於鐵藥類中、可免鐵變成莠類、按此糖係氫碳之類、有育身之功、多服者、易生脂膶、故肥胖過度者不宜服、若腸胃食釀、或患糖尿症者、亦不宜服。

1 Plague
2 Fractures
3 Sprains

醇酒 Alcoholis 半量兩 (16.0)

薄荷油 Olei menthæ piperitæ 十二量滴 (0.8)

辣椒油樹 Oleoresinæ capsici 一量滴 (0.05) —M.

成人每二或三句鐘、服五至十五量滴、(0.3-1.0) 如多服之、恐有意外之虞。 S.—5 to 15 minims for an adult, in water, every two hours for three doses. More than this quantity is dangerous.

補藥類

堪杜然勾 (CONDURANGO)

此藥乃一類樹皮、產於叩倫比亞、西歷一千八百七十三年、始入藥用、爲醫胃疽之品、然實無醫胃疽之能、其所以用之者、因此類症多兼泗膜發炎、此藥有解炎之功、減少其痛苦、故人多用之於此症耳、常服者乃此藥之流膏分劑、一至二量錢、(4.0-8.0) 亦有服此藥之葡酒者、分劑、半至一量兩、(15.0-30.0) 又有以藥一分加水八分煎之者、分劑、半量兩、(15.0) 日服三次、因患此症者、胃經所生之酸液較少、故有時加氫氯酸少許。

敵症盟類

† Gastric cancer

汗之患、每數句鐘服五厘、(0.3)其體功效人尚未知、但以其能感汗腺之系、故用之以醫此症、英德二國之醫者、用此藥大見功效、余嘗用此藥以醫癆症之盜汗、但未見效、有時服此藥者、有惡心瀉腹之患、分劑一至五厘、(0.06-0.3)置於藥壺內、每五句鐘服一次。

哥羅顛 (CHLORODYNE) 此乃最著名之方、盟瀉或痢[2]症服之有效、人配此方時、所用之藥味、各有不同、最常用之方如左。

莫非氯塩	R-Morphinæ hydrochloridi	八英厘 (0.5)
烝水	Aquæ destillatæ	半量錢 (2.0)

見火莫非氯塩即化、撤下俟涼、加

Heat together, and as soon as the morphine is dissolved and the liquid cooled, add

淡氰氯酸	Acidi hydrochlorici diluti	半量錢 (2.0)
哥羅芳	Chloroformi	一量錢半 (6.0)
印度麻酒	Tincturæ cannabis indicæ	一量錢 (4.0)
淡藍酸	Acidi hydrocyanici diluti	十二量滴 (0.8)

1 Serous diarrhœa
2 Colic

成氰强酸、故今多用氰强酸製之、然醫盲瀉或似[2]癘之瀉症、究不如氰弱酸爲妙、其良方如左。

氰弱酸	B-Acidi nitrosi	一量錢 (4.0)
樟腦消水	Aquæ camphoræ	八量兩 (240.0)
後加	et adde	
鴉片酒	Tincturæ opii	四十量滴 (2.6) —M.

每三至四句鐘服二量兩。(60.0) S.—Two ounces in water every three or four hours.

猶達森 (EUDOXINE)

此藥以挪色分與鉍、用化法而得、其色淺棕、其質細粉、嘗覺無味、每百分內含氮幾六十分、入藥用者、因其有滅腸內之穉、與免腸內食物釀壞之能、孩童之瀉[3]症、服此藥半至五厘、(0.03-0.3) 成人五至二十厘、(0.3-1.3) 有效、其醫此症之能、與鉍鬱類相等、但斂力較小、而改症之能、與滅穉之力較大、因其滅穉之力較大、故患腸泗膜新炎或久炎而兼瀉症者、服之有效。

阿嘎哪辛 (AGARICIN)

此藥出於美國南方、以朽木製成酒膏、多有醫者、以此藥醫盜[4]

1 Serous diarrhœa
2 Choleraic diarrhœa
3 Diarrhœa of children
4 Night-sweats

療效 白濁症[1]以此藥一分之四分之一至一分、加水百分、製成消水、射於尿脘內、有效、如係久症、必用藥五分、方能見效、按此藥有滅白濁點穉之能、其力能深入泗膜之內、如力不過大、病者不覺甚痛、用後所流之白濁頓減、睟炎[2]諸症、目科家常以此藥五分、加水百分、製成消水醫之、如白濁睟炎[3]與嬰睟膿炎[4]等症、以此消水洗之有效、惟睟癰炎不能醫之、以其力不足也、陰道白濁炎[5]、此藥有效、膿瘡[6]、或燙傷[7]、以此藥五至十分、加硬煤油蠟或羊毛脂百分、製成抹膏、敷之有效。

鉦烨硫礬

ZINCI PHENOLSULPHONAS, U. S.
ZINCI SULPHOCARBOLAS, B. P.

鈉烨硫礬

SODII PHENOLSULPHONAS, U. S.
SODII SULPHOCARBOLAS, B. P.

此二礬結晶無色、畧有激力、且有滅穉之能、故有製之成散、以爲敷瘡口[8]之用者、亦有製成消水爲洗瘡之用者、惟醫暑瀉症[9]乃常用之藥耳、無論成人孩童、大便惡臭或患腸熱[10]者、服之可滅腸內之穉、然非有醫此症之功、但能止瀉並免惡臭耳、以上之用、惟鉦烨硫礬、最爲合宜、分劑、二至三厘、(0.12-0-2) 成丸服之、日服三或四次、如人因中內身之毒[11]、大便乾燥而腸脹[12][13]者、與洋鼠李兼服、有時獲效、按此二藥祛身時、大約仍爲本藥、其體質不甚改變也。

賀氏樟腦調藥

(HOPE'S CAMPHOR MIXTURE)

此藥原以氰弱酸製成、因此酸見水即變

1 Gonorrhœa
2 Conjunctivitis
3 Gonorrhœa ophthalmia
4 Ophthalmia neonatorum
5 Gonorrhœal vaginitis
6 Suppurating ulcers
7 Burns
8 Sores
9 Diarrhœa
10 Typhoid fever
11 Auto-intoxication
12 Constipation
13 Flatulence

鉀藍治 ℞ Potassii cyanidi 一二英厘 (0.12)
莫非硫强鬱 Morphinæ sulphatis 一英厘 (0.06)
洋郁李糖漿 Syrupi pruni virginianæ q. s. ad 一一量兩 (90.0) —M.
日服三至五次、每服一小勺。(4.0) S.—Teaspoonful three to five times a day.

又方

鉀藍治 ℞ Potassii cyanidi 一二英厘 (0.12)
鍾氯塩 Ammonii chloridi 一二英錢 (8.0)
辛寇那甘香酒 Elixiris calisayæ q. s. ad 一二量兩 (90.0) —M.
日服三至四次、每服一小勺。 S.—Teaspoonful three or four times a day.

斂藥類

銀核鬱 (NARGOL)

此藥乃以銀與核素酸、用化法合成、無臭、與黃氣迥異、每百分內含銀十分、水易化之、其潰力較他類銀鬱爲大、置於胎類中、則不沉澱、如製成消水、置於火上沸之、則不改其體質。

大花仙人掌 (CACTUS GRANDIFLORUS)

此藥產於墨西哥西印度等處、有激心之能、他類仙人掌、雖亦有此能、而其力較小。

體功效 服此藥者、血壓加增、惟心之跳動、不見遲緩、或有時畧速、近有醫者查明、知其非大有感絡部之能也。

療效 心跳[1]與心虛[2]等患、服此藥或略有效。

藥製與分劑

大花仙人掌酒 Tinctura Cacti Grandiflori 一二至八量滴、(0.12-0.5)

常用者。

大花仙人掌流膏 (Fluidextracti Cacti Grandiflori) 一二至四量滴、(0.12-0.25)

阻心藥類

鈽藍洽 POTASSII CYANIDUM, U. S.

此藥最毒、色白、形成細粉、或凝成不透光之塊、嗅之有藍酸之味、嘗之覺辣、且有鹼味、水二分能化藥一分、其用與藍酸同、分劑一厘之十分之一、(0.006)患氣腔炎[3]或肺癆[4]等症而咳嗽不止者、良方如左。

1 Cardiac palpitation
2 Cardiac weakness
3 Bronchitis
4 Phthisis

體功效　與加非印寇卡印同。

療效　此藥有激身心與腎之能、故身體與心經虛弱[1]者、服之有效、有醫者謂暈船[2]之患、服之有效、又有醫者謂有解醒之功、但無確據、頭痛而兼惡心[3]者、服之每效、宿欠縮力[4]、服此藥之流膏、三十至百二十量滴、(2.0-8.0)有激之之能、藥行中每以此藥配製數種、謂大有增身之力、然不足爲憑、即能增力、亦只暫而不常也。

藥製與分劑

寇拉流膏 (Fluidextractum Kolæ)　十至三十量滴、(0.6-2.0)

寇拉甘香雜酒 (Elixir Kolæ Compositæ)　二量錢 (8.0) 內有寇拉寇卡草阿拉拏等藥、虛弱之人、如與砒兼服大效、良方如左。

鉄砒弱鬱消水 ℞ Liquoris potassii arsenitis, U. S. Liquoris arsenicalis, B. P.　十五量滴 (1.0)

寇拉甘香雜酒 Elixiris kolæ compositæ.　四量兩 (120.0) —M.

每餐後服二量錢。(8.0)

S.—Dessertspoonful after meals.

1 Feeble heart
2 Sea-sickness
3 Sick headache
4 Uterine inertia

阻動系藥類

布羅吞 (BROMETONE) 此藥乃以布羅方與酸醛、加鹼潰藥製成、色白、結晶、成細長三稜之形、嘗之覺之味似樟腦、必熱至三百三十二度、方能融化、醇酒伊打本辛、俱能化之、冷水略能化之、熱水較冷水所化稍多、每百分內含氮七十七分、其體功效與氮塩類甚似、故可代氮塩之用、所擅長之處、用二至十厘 (0.12-0.6) 之小分劑、即可與氮塩類之大分劑、功效相等、如服足分劑、或有發暈、不思飲食、心靈遲鈍等患、但一顯即過、而無遺患、服法、置於藥壳內最妙。

莎拉藤 (SOLANUM CAROLINENSE) 此藥係一類草、產於美國南方、有醫者查其體功效、謂有阻顱腦之能、而有激脊腦之力、入藥者乃爲醫癲症之用、孩童之癲症、服之最妙、余曾用之於此症、其犯症每較前爲稀、且其陣抽之勢亦較輕、但宜用此藥之流膏、初用之分劑、十五至六十量滴 (1.0-4.0) 日服三次、後宜加至二量錢。(8.0

激心藥類

寇拉 (KOLA) 此藥係非洲一類樹子、內含加非印、與揸古律印、及一類植酸、最要者乃在所含之加非印、亦有止瀉之功、其功或在所含之植酸也。

1 Epilepsy

卡印不同也、如用爲痲目之藥、可以藥一至四分、加似盬塩消水百分、乃爲合宜、其一分藥之消水、乃爲射睟之用、其四分藥之消水、乃爲滴目之用、如以藥一分之十分之七、加水百分、亦可爲浸潤痲法之用、若以藥一厘、(0.06) 加塩消水十五量滴、(1.0) 射於脊腦衣內、必使人下體痲木、但未射之先、宜置於火上沸之、以滅其痙、詳見寇卡印篇 如此射法、或謂其少有乖效、但有醫者用之、曾屢有生汗不止、頭痛嘔吐、或亦有失便遺溺者、究之射痲藥於脊腦中、不如用伊打哥羅芳之穩妥也。

阿利品 (ALYPIN) 此藥乃由化法而得、色白、結晶、水與醇酒、俱易化之、以試紙試之、不改其色、如以其消水置於火上沸之、必過五分鐘、方改其體質、其痲效與寇卡印相等、其惹目之力、小於猶肯、無縮緊血腔之能、如用之於目內、宜以藥二分加水百分、若用之於他處、宜以藥十分加水九十分、且宜用新製者、有醫者謂用此消水於目內、無散瞳之力、且不失便視之功、因其無縮緊血腔之能、故適於用、然亦有時不適於用、如割鼻內泗膜積血之症、必使血腔縮小、方無流血過多之患、故此藥不如寇卡印之妙、但用寇卡印藥力一過、其積血之患、亦與此藥相等、此消水可作浸潤痲法之用、與腎上腺精兼用亦可。

漸失、故宜用新製者、其大用、乃於割目時、可代寇卡印之用、如以藥一分、加水百分、製成消水、滴於目內、越十五秒至一分鐘、痳效即顯、其效能存五至十五分鐘之久、且瞳不散大、睟膚不乾、目球之輭硬如常、脉脘亦不至先則縮小、後則積血、其功實與寇卡印不同、然醫者多用寇卡印爲痳目之藥、若睟炎、睛簾炎等、究不及此藥尤妙也。

猶他民印 (EUPHTHALMIN) 此藥爲化合之蝛、乃係流質、體功效與阿刀便甚似、但初滴於目內、因藥力激動面系鼓膜之支、或致涎腺生液畧多、如以此藥二至十分、加水百分、製成消水、滴於目內、五至二十分鐘、瞳則散大、至一句鐘、散大至極、越五至八句鐘則復原、有醫者謂、令瞳散大之故、乃因動目系末被癱也、惟目之和系不被癱。

挪代肯 (NOVOCAINE) 此藥乃化合而成、結晶、無色、水最易化之、所以入藥者、乃爲代寇卡印之用、其力與寇卡印同、而毒力較小、以此藥一分之四分之一、至二分、加水百分、製成消水、其效較他化合之痳藥爲小、用時如加腎上棚精、其效甚妙。

似寇印 (STOVOCAINE) 此藥乃以化法化合而成、放光、形如鱗片、水、醋、木酒、熆蓼、俱易化之、如以此消水、置於火上沸之、體質不變、與寇卡印不同、其毒力小於寇卡印一倍、如以消水敷於某處、則某處之血脘、即見鬆大、故用之敷於傷口、必致流血更多、亦與寇

酒相似、有安睡之功、分劑二十至四十量滴、(1.3-2.6)置於甘草水、或糖漿類內、服之最宜、或謂服後必睡至七八句鐘之久、余曾用之、每見功效、但至翌日、常顯睏倦之狀。

沛斯阿 (PISCIDIA ERYTHRINA) 此藥乃由一類之樹取出、產於西印度海島、有止痛之能、並有醉效、其效雖不及鴉片之大、而無鴉片之乖效、但其體功效、尚未查考盡致、醫家可再查之、有二醫者謂、此藥於動覺腦系、少有感力、其大能、乃激絡部、以增血壓、因月經不調而致窒頸窄頂抽搐、以及經痛者、此藥最妙、因此藥不感腦部、並能止痛、故因痛而失寐者、服之有安睡之效。

藥製與分劑

沛斯阿流膏 (Fluidextractum Piscidiæ) 半至二量錢 (2.0-8.0)

沛斯阿膏 (Extractum Piscidiæ) 二至十厘 (0.12-0.6)

激腦藥類

何婁肯 (HOLOCAINE) 此藥乃用化法化合而成、其合質與芬阿錫吞相似、冷水幾不能化、故常用者、乃此藥之氯塩、此塩色白、結晶成塊、水能化之、嘗之味苦、遇鹼類立改其體質、有痲效與滅痙之能、故外科用此消水時、不必更用滅痙之法也、但此力日久

1 Dysmenorrhœa
2 Insomnia

一次服訖。 S.—The entire amount to be taken in one dose.

度鮑司印 (DUBOISINE) 此藥係一類樹葉之鹼、產於奧司大利亞、其大用、能令癲[1]者安睡、但必與亥歐辛更迭服之方可、如以一厘八十分之一、至六十分之一、(0.0008-0.001)用空針射之亦可、經用此藥者、謂其能使小便減少、且胃經畧失其功用、嗓內泗膜甚乾、口內帶有鹼味、有服藥之癖忌者服之、致有涎盛汗旺之患、雖有如此乖效、亦不得不用、因無他藥勝於此者也、養癲院之醫者、謂用此藥時、癲者雖不覺惡心、常將所食者吐出、但多寡不等、癎[2]症、此藥亦效、顫攤[3]症、有醫者謂用此鹼之硫弗磬有效、按此磬有散瞳之能、其力與阿刀便同。

多莫拉 (DORMOL) 此藥乃以哥拉與烋洮製成、係無色之流質、有安睡之能、與哥拉相似、其力或遜於哥拉、嘗之畧似樟腦、微覺辣味、水能化之、尋常所售者、乃水與藥等分之消水、用者必加水四倍、方爲合宜、以前後所加之水合計之、是藥一分、水九分也、分劑半至一量錢、(2-04.0) 加糖漿服之。

思寐那 (SOMNAL) 此藥乃用化法製成、爲無色之流質、嘗之味辣而熱、與燃氣弱浮

1 Insanity
2 Epilepsy
3 Paralysis agitans

第三十二章 後續雜藥類

續者、續其後譯而未及印者也、蓋此書已翻印數章英文原本重出、歷閱至終、見其中增補若許、是以一一譯出、但不能從始按類加入、特將前數章所未及印者、姑續於此、嗣復印時、再行按類列入。

迷蒙藥類

烯氣塩 (METHYL CHLORIDE)

此藥係一類之氣、如用壓力、則易變成流質、惟此流質可入藥用、嚐之味似哥羅芳與伊打、貯於玻璃管內、其管之一端有螺帽、用時揭去其螺帽、以手握之、則藥必藉手之熱度、噴於皮上、復變成氣、但藥管必距病處十寸之遠、方爲合宜、夫藥既能藉手之熱度、噴於皮上、而變成氣、必能攝取皮之熱度、使皮變冷、而顯痲效、故割小症時、以此藥噴患處、越數秒鐘、則皮無血色、後則發白、硬如厚紙、乘此時割之、病者自不覺痛、但未用之先、宜以巾擦與伊打洗其病處、至洗盡本來之油、而後噴之、且不可過二至四分鐘之久、恐過受凍傷、以致腫變成疔、按此藥擅長之處、較伊打不易燃著、且速於收效。

烯替連氣塩 (METHYLENE CHLORIDE)

此藥之製法有數類、一以哥羅芳用化法而得、二

傷口、則胭內之液、必漸改藥之體質、復分爲氯、與袱毛柳酸三藥、以之敷傷、可代黃氯之用、其擅長之處、乃無惡臭與惹力、且大有滅穉之能、如以之製成抹膏、或與油類相合、或撒於布帶上、或與雲母石、鉦、莠、鉍、礬等、細粉相合、敷於傷口俱可、按此藥入胃不改其體質、故可用爲腸內滅穉之藥、服法、乃置於水或牛乳、或加非、或揸古律內、服之最妙、分劑、五至十厘、(0.3-0.6) 曾有醫者、以大分劑灌於獸類、竟不顯受毒之狀。

挨拉木 (XEROFORM) 此藥乃以鉍、氯、悱醇、製成之礬、體質最輕、形成細粉、所以入藥者、乃爲代黃氯之用、但其中無氯、故無黃氯之妙能、然亦無黃氯之臭味、畧有滅穉之功、因其爲體輕之散、能使傷口變乾、則穉更無從生長也。

伊賽 (IZAL) 此係似松澁之氫礙類、製成勻類之藥、色暗白、無毒力、有滅染毒之能、用法、以此藥一分、加水二百分、製成消水、可代錄氯强塩之用、今在北京協和醫院、以此藥一分水千分之消水、浸其呼吸具之紗布、以抵鼠疫之染毒、且以此消水、用大噴霧具噴患鼠疫者之室、以滅其染毒、他類染毒、用之亦可。

消水中之稜、不但此也、臨射之時、更用各類防稜之法防之、隔一或二日射一次、每次半至三量錢、(2.0-12.0) 如係大瘤、宜射於其中、小則射於四圍、但不宜過度、恐腸有潰爛之虞、按此藥實無療治惡瘵之能、即阻其生長、亦罕有之、惟能止痛、以免病者之苦楚耳、如瘤潰爛、宜用有力滅稜藥敷之、無論其瘤潰爛與否、射後必以紗布蘸此藥之消水、覆之方可、但此消水、大有染力、人不喜用他類安尼林染料、能力與此藥相等、故醫者謂煐黃色、其效亦同。

三二幾蘇 (TRIKRESOL) 此藥乃三類幾蘇合成、此三類幾蘇之性、與幾阿林、烽醇相似、故此藥亦與之相似、色白、乃係流質、臭之味似幾阿蘇、水百分、能化藥二分半、至成透光之消水、其消水之惹力與毒力、較烽醇或錄氯強、鹽消水爲小、且不似烽醇之消水阻人之覺系也。

療效 外科醫士常以此藥一分、加水百分、製成消水、以作滅稜之用、如眼科用之滅稜、加水五百至一千分、乃爲合宜。

袱毛顛 (FORMIDINE) 此藥乃以氯、袱毛、柳酸、用化法而得、其質細粉、其色紅黃、嘗之幾於無味、臭之畧有氯味、水、醇酒、淡酸類、俱不能化、鹼類消水、漸漸能化、如以此藥敷於

胱炎[1]症、如小便含鹼、服之有變酸之效、曬斑[2]之患、敷此消水、有祛之之能、鮮有皮膚受惹者。

硼絨布（Borated Lint）此布之製法、以硼强酸濃消水、置於火上沸之、蘸絨布於其內、晒之而成、或用鈉硼烘磬消水、如法蘸之亦可、割症後覆於傷處、乃係最妙之法。

硼强酸甘油 GLYCERINUM ACIDI BORICI, B. P. Glycerinum Boroglycerini, U. S.

此藥乃以硼强酸、與甘油、用火煉成硬片、用時必加甘油、使成流質、名甘油硼甘油、爲免腐之藥、如與非醇調和、敷及症、或各類睜[3]膿炎症、均可。

煤藍色 METHYL BLUE

此係安尼林中一類染藍之料、常與砒鏖合、倘其中含砒、敷之則有惹力、純者方入藥用、此藥有滅穉之能、然有醫者查明、阻穉生長之力無多、故外科用之、不爲甚妙、惟目科有必須滅穉之症、此藥可用、然目科用此滅穉之處、較他滅穉藥爲妙者鮮幾、惟於淚具患病時、必須滅穉者、此藥乃爲上品耳、瞼炎[4]、與瞼癩[5]睜瘡[6]炎[7]、或睜純炎[8]瞭瘍[9]等症、以此藥一分、加水千分、製成消水、滴於目內、或效、惡瘍之患、有醫者常以此藥射之、用法、以此藥一分、加水五百分、製成消水、後以熱石絨過濾、以滅

1 Cystitis
2 Freckles
3 Purulent conjunctivitis
4 Blepharitis
5 Eczema of the eyelids
6 Phlyctenular conjunctivitis
7 Conjunctivitis
8 Corneal ulcer
9 Malignant neoplasms

敷之亦效、常以此酸製成洗眼藥、單用之、或與寇卡印同用俱可、如欲存貯寇卡印消水、其中必加此酸、方免生霉變壞之虞、其良方如左。

寇卡印氫塩 ℞-Cocainæ hydrochloridi 四至八英厘 (0.25-0.50)

硼強酸 Acidi borici 十至二十英厘 (0.6-1.3)

烝水 Aquæ destillatæ 二量兩 (60.0) —M.

以數滴滴於眼內。 S.—To be used by dropping into the eye.

硼強酸抹膏 Unguentum Acidi Borici,

有免皮裂[1]之能、且有良方如左。

硼強酸 ℞-Acidi borici 一英錢 (4.0)

白蠟 Ceræ albæ 一英錢 (4.0)

硬煤油蠟 Petrolati, U. S. Paraffini duri, B. P. 二英錢 (8.0)

洋苦杏油 Olei amygdalæ expressi, 二量錢 (8.0) —M.

調勻、每早晚敷之。 S.—To be thoroughly mixed and applied night and morning.

1 Chapping

如病愈而無瘈瘲之患、則每日所服之分劑、不宜過十五至三十厘、(1.0-2.0) 恐病者服成慣性、反使藥力不顯、且易有惡心、瀉腹、消瘦、生癌等乖效、其癌或似紅熱症、或似癩症、或起皰、但癩與皰、率在骨節處、疳[1]症口白瘍、口瘍炎[2]口頰疥[3]等、如以此藥製成消水、漱之有效、肛門癢[4]、陰門癢[5]、臭汗[6]等患、亦頗有效、身錢癬[7]、或髮錢癬[8]等患、以此濃消水敷之有效、漱藥之良方如左。

鈉硼烘礬	Sodii boratis, U. S. Boracis, B. P.	一英錢 (4.0)
鈉氫碳强礬	Sodii bicarbonatis	一英錢 (4.0)
烯醇	Phenolis, U. S. Acidi carbolici, B. P.	三十英厘 (2.0)
甘油	Glycerini	一量兩 (30.0)
純水	Aquæ puræ	二量磅 (960-0) —M.

鈉硼烘礬蜜藥 Mel Boracis, B. P. 口瘍[10]症敷之有效。

硼强酸 ACIDUM BORICUM,

此藥之效、與鈉硼烘礬同、若製成消水、有醫瘰[11]症之功、燙[12]傷

1 Diphtheria
2 Aphthous stomatitis
3 Cancrum oris
4 Gangrenous stomatitis
5 Pruritus ani
6 Pruritus valvæ
7 Bromidrosis
8 Tinea circinata
9 Tinea tonsurans
10 Cancrum oris
11 Erysipelas
12 Burns

等、置於水內、則成透光似膠之消水、可爲割具滅稚之藥、但使割具滑而難執、爲不便耳、此藥有潤膚之功、如欲敷於泗膜、水百分、藥不宜過二分。

幾蘇雜消水 Liquor Cresolis Compositus, U. S. 此消水與來蘇同。

鈉硼烘謺 SODII BORAS, U. S. BORAX, B. P. 此謺有由化法而成者、然美國常由喀利佛捏那法大二省之湖邊採取、但必經煉法、方可用之、水十二分、能化藥一分、昔人常言此藥與硼酸消水、皆有滅稚之力、然實無此效、惟有免腐之功、服之無甚功效、只有使尿變鹼之能、然有醫者謂癲症用之大效、分劑八至十五厘 (0.5-1.0) 漸次增之、至肓道受惹爲止、其味不美、故宜加引藥類方可、良方如左。

鈉硼烘謺 R. Sodii boratis, U. S. Boracis, B. P.	半英兩	(16.0)
甘油 Glycerini	一量兩	(30.0)
甘草流膏 Fluidextractæ glycyrrhizæ U. S. Ext. glycyrrhiz. Liq. B. P.	二量兩	(60.0)
烝水 Aquæ destillatæ	六量兩	(180.0) —M.

每飯後服二量錢 (8.0) 以水送下。 S.—Dessertspoonful in water after each meal.

1 Epilepsy

孩童二至五厘、(0.12-0.3) 每二三句鐘服一次。

安息衲透 (Benzonaphthol) 此藥可代衲透之用、食滯釀症服之有效、分劑十厘、(0.6) 置於藥壳內、日服三次。

烽醇 PHENOL, U. S. ACIDUM CARBOLICUM, B. P. 詳見本篇。

幾阿林 (CREOLIN) 此藥由煤濘而得、乃係流質、形似糖漿、色如深棕、頗有免腐之能、且少毒力、置於水內、水則變白、藥不能融化、只成勻類、但水百分、只可加藥十二分、若或過之、餘則沉澱矣。

療效 產時或產後、導產者可以之潔手、或可以藥一分、加水百分冲陰道、爲滅穢最妙之藥、但不可以之浸割具、因此消水不透光、置割具於其內、視而不見也、婦人之脫炎[2]症、名醫常以此藥冲之、初用時、以藥一分、加水百分、冲至數次、或加藥至二分、則顯功效、耳[3]痔患以藥一分、加水五百分、射於耳內、鼻瘍[4]患以藥一分、加水百分敷之、鼻炎[5]而鼻涕過多、以致成痂者、以藥一分、加水千分冲之、痢[6]與胴炎[7]等症、以藥五分、加水千分、射於肛內、瞼邊炎[8]、瞭炎[9]、睛疱炎[10]等症、以藥一至二分、加水百分敷之、並皆有效。

來蘇 (LYSOL) 此藥亦由煤濘而得、色棕、透光、其質似油、味與幾阿蘇同、功用與幾阿林

1 Fermentative dyspepsia
2 Cyst tis
3 Otorrhœa
4 Nasal ulcers
5 Rhinitis
6 Dysentery
7 Colitis
8 Blepharitis
9 Keratitis
10 Phlyctenular ophthalmia

吸司所受碳强奏之激力、不能如常、則病者之呼吸必緩而微、而肺中所入迷蒙氣必少也、亦有醫者、以氨加入哥羅芳、不使空氣相雜、令病者吸之、此法之弊、亦與上同、又有醫者、以氨與迷蒙藥合貯於庫秋管內、令病者吸之、此法亦不宜用、蓋吸時則袋縮、呼時則袋鼓、呼吸只此袋中之氣、恐有意外之虞、以其空氣不純也。

納他連 NAPHTHALENUM, U. S. 此藥由煤濫而得、結晶透光、形成薄片、別具一種氣息、醇酒畧能化之、服後噫氣時、口內覺有燒庫秋之味、有免腐之功、[1]釀瀉臭瀉等症、服之非但敗臭、亦能醫症、[2]孩童之暑瀉、每二至四句鐘、可服一厘之六分之一、至四分之一、(0.01-0.015) 成人可服五至十厘、(0.3-0.6) 如過此分劑、有惹胃之患、或加白糖、或置於藥壳內、服之皆可、然此非常用之藥、每有服之而無效者、若灌於獸類、必患瞳症。

納透 BETANAPHTHOL, U. S. NAPHTHOL, B. P. 此藥乃由納他連用化法而得、敷之有免腐之功、服之可醫胃[3]釀腸胃脹等患、[4]盟瀉臭瀉等症、服之有效、分劑二至五厘、(0.12-0.3) 置於藥壳內、服之最妙。

納透鉍磬 (Betanaphthol-Bismuth, Orphol) 此藥係一類細粉、嘗覺無味、或言有納透免腐之力、亦有鉍磬平育道之能、[6]盟瀉釀瀉二症、常以此醫之、分劑成人五至十五厘、(0.3-1.0)

1 Fetid diarrhœa
2 Summer diarrhœa
3 Gastric fermentation
4 Flatulence
5 Diarrhœa of serous type
6 Serous and fermentative diarrhœa

時、以此消水潤之、則石膏必輭而易揭矣、若用爲漱口藥、每令人牙痛、蓋因牙有痲處、藥與痲相觸、變痲愈甚、以金補牙者亦然、或言病體缺氧者、服之有效、然此理不確、姑列分劑於下、一至四量錢、(4.0-16.0)

氧(OXYGEN)此乃氣質、內外科常用之、用法有二、一將氣擠入鐵桶內、令人吸之、二將氣加於烝水內、令人飲之、肺炎[1]之中、晚二程、因血缺氧之故、病勢甚險、年邁者氣腔炎[2]之晚程、肺癆[3]症而氣促、血虧[4]及血虧惡症[5]與血多白胰[6]等症、吸之皆效、受煤氣[7]而欠氧者、吸之頗效、如以此氣六十分、氮氣下洽四十分、相合吸之、有平腦系部之功、熏哥羅芳、或伊打等迷蒙藥時、如與氧並用、不但可免中毒、且使病者熏後少有嘔吐、生命司所亦少受阻、但此氣與迷蒙藥並用時、宜視病勢如何、不宜與迷蒙藥合勻吸之也、有醫者常將迷蒙藥置於瓶內、用一庫秋管、與氣袋相連、另用一庫秋管、置於瓶內、令病者啣之、如此、則吸時氧由迷蒙藥經過、肺中所得之氣、只爲氧與迷蒙氣矣、此法亦不爲妙、蓋人吸迷蒙藥之多寡、必與所吸之氧相等、是所得之迷蒙效雖多、而受氧之激力亦大也、常用此法者、謂如此用之、必多費時刻、方能奏效、亦有人謂所用之時刻雖多、究不能得其迷蒙之效、蓋因此二氣相合吸之、肺中之氧必多、血中之碳强養必少、呼

1 Pneumonia
2 Bronchitis
3 Phthisis
4 Anæmia
5 Pernicious anæmia
6 Leukæmia
7 Asphyxiated

氫氧強治 (HYDROGENII DIOXIDUM)

此藥乃氫氧二氣所成、其化公式即氫二氧二 係無色之流質、視之無味、嘗之畧苦、形似糖漿、水易化之、入藥者、乃以藥三分、水九十七分所成之消水、Aqua Hydrogenii Dioxidi, U. S. Liquor Hydrogenii Peroxidi, B. P. 此水一瓶、能發氧至十瓶之多、功效皆在此氧、使熱至五十九度、其重率必至 (1.006-1.012) 乃爲合宜、但熱之、晒之、或搖撼之、皆易失其功用、如氧一失、則與水無異、故必謹愼貯之方可、如欲試其功效存否、可以錳鋼上罄些、須置於試筒內、加消水一至二量錢、4.0-8.0 如其自沸之力大、藥力尚存、否則其力已失矣、

療效 此藥之大用、乃醫疹(1)症、以之敷患處、頗有祛之之功、且無毒力、與烯醇迥異、但敷時畧覺痲痛、後乃假皮漸脫、惟當以絮蘸而敷之、或用玻璃噴霧具噴之俱可、不可用金類之器具、蓋此藥一近金類、立變體質也、喉門(2)微栩(3)炎症、先敷此藥、使患處潔淨、後敷怪阿寇有效、患瘴者、無論其瘴或係瘰、或係膿菌毒、以此消水射於疢內俱效、但射時必有放氣之處、否則將膿菌逼至四圍、病者甚受其害、惡瘤(4)生膿、或各類之瘍(5)、敷之有效、如被槍藥(6)轟爆、黑砂陷入皮內、當時敷之、有祛黑色之功、或言蠆(7)傷敷之、其痛立止、揭合口貼膏時、如以此消水置於噴霧具內、隨揭隨噴、可免粘痛、如欲去石膏布捲

1 Diphtheria
2 Follicular tonsillitis
3 Abscess-cavities
4 Malignant growths
5 Ulcers
6 Powder-stains
7 Bee's sting

膠透 ("GLUTOL")

此藥乃以筋膠與袱毛製成、其質細粉、有免腐之功、撒於傷口[1]、能使發乾而成假皮、以免毒稚侵入、或言敷燙傷[2]頗效。

鈄錳上礬 POTASSII PERMANGANAS.

此藥色棕、結晶似針、遇潮濕則失氯、變其體質、有免腐敗臭之功、如投於汚穢之處、無甚功效、因藥中之氯與之相合、則成他類之物矣、若不多用、功效頃刻即盡、割症者、加此藥於水中、待其藥力化足、以之盥手、後蘸草酸消水、祛手上之藥色、再以烝水洗之、方可割治、此爲最妥免腐之法、瘍瘡[3]、或受傷處[4]、以此藥六十厘、(4.0) 加水一量磅、(480.0) 洗之、亦可以此藥二十厘、(1.3) 加水一量磅、(480.0) 以筆蘸而敷喉、或用爲漱口、皆可、痧[5]或紅熱[6]之喉炎症、鼻臭炎[7]、或中耳炎[8]等症、以此礬一厘、(0.06) 加烝水一量兩、(30.0) 浴之有效、經閉症[9]、有醫者以此藥三至五厘 (0.2-0.3) 醫之、然其效不似高錳弱劵之妙、且有惹胃之患、食滯[10]、腸胃氣脹[11]等症、服之有效、蓋此藥有發氯之性、故於腸胃內有免釀之功、血含尿酸[12]、並虛胖[13]等患、有醫者以此藥醫之、然其效無常、有二名醫云、蛇齧[14]者、毒未被陳之先、如以此藥敷之最妙、並以空針射傷處之四圍、其效尤顯、按此藥乃化學中敵鴉片[15]之妙品、中植物類或硫毒[16]者、此爲最有力之敵藥、但不宜與植物類藥同置臼內研之、恐有崩炸之虞。

1 Wounds
2 Burns
3 Ulcers
4 Wounds
5 Diphtheria
6 Scarlet fever
7 Fetid rhinitis
8 Otitis media
9 Amenorrhœa
10 Dyspepsia
11 Flatulence
12 Lithæmia
13 Obesity
14 Snake-venom
15 Opium poisoning
16 Phosphorus poisoning

錯氣粉消水 Liquor Calcis Chlorinatæ, B. P.

氣氣 Vapor Chlori, B. P.

錄氣強塩 HYDRARGYRI CHLORIDUM CORROSIVUM, U. S. HYDRARGYRI PERCHLORIDUM, B. P.

祇毛消水 LIQUOR FORMALDEHYDI, U. S. 此藥係一類之氣、頗有滅瘴毒、並滅穢之功、乃木酒與氨所成者、此消水每百分水內、含氣三十七分、似水而無色、別具一種氣息、於粘膜大有惹力、與酒或水皆可相合、如與水合、數日則祇毛與水相分、故色白似乳、必貯於瓶內、置於冷暗之處、方可、近數年來、有醫者常以氣一分、加水至百分、其免腐之力、足敷割症之用、且毒力較錄氣強塩消水爲小、如以割下之瘤置於其內、則能存之、以備查考、若係大瘤、則宜少加水、以增其免腐之力、或言以此氣一分、加於牛乳三萬二千分內、可存數日之久、人食之亦無損傷、有醫者以含氣三十七分之消水、用爲潰藥、以敷癆瘡有效、用此消水以滅瘴毒、其益有三、一用之無險、二不損布色、三價值甚廉、患臭汗[1]者、以此消水一分、加水四至六分洗之、有效、[2]虛汗者、浴其週身、亦效。

猶祇毛 (EUFORMOL) 此藥內有郁加列、冬綠油、薄荷冰、硼酸、祇毛等物、以藥一分、加水一至四分、可醫虛汗之患。

詳見本篇。

1 Bromidrosis
2 Excessive sweating

第三十一章 論滅癘毒藥類

鋂氯粉 CALX CHLORINATA,

此藥之製法、乃以熟石灰、(化學家名鈣泥)使氯氣串入、每百分中、能攝氯三十五分、甚有惹力、不可用爲服劑、藥行所售者氯多不足、因存貯日久、氯氣已失也、人面若挨近此藥、眼必大受其惹、如鼻之不覺其惹力、則知其力已失矣、按此藥之功用、厠中或溝中之癘毒、如每七日撒此粉數斤滅之、乃爲上品、患腸熱症者、所用之便具、於未便之前、可傾此消水於其內、使便中之穢滅絕、製消水法、以此粉一磅、(500.0) 加水十六量磅、(8000.0) 即成、論此粉爲最有力之敗臭藥、以之撒於死畜上、或人死因有事故、不能埋葬、若以布蘸此消水裹其屍、能免臭味、即傾於汚水內、亦能令其清潔可飲、但水每十立方尺、必加鋂氯粉二兩、(60.0) 方可、因氯有改色之力、故有色之布、不宜熏之、傷風而喑啞[1]者、過半月如不復原、以氫氯酸數滴、滴於鋂氯粉、或鈉氯塩上、使病者同空氣吸之、或謂其有效、有人以鋂氯粉置於盤中、放於屋內、爲滅癘毒之用、此法殊謬、但人多以此法爲可恃、不用他法、每有因之而受染者、此法雖能敗臭、究不甚妙、蓋此粉之味、只能解臭味、不能滅癘毒、雖多用之、亦能滅癘毒、然惹力甚大、人不能忍受也。

1 Aphonia

則煨至能成丸爲止。

大卡蓬梅 B-Taka-diastase 四十五英厘 (3.0)

胰梅 Pancreatini 四十五英厘 (3.0)

馬前子膏 Extracti nucis vomicæ 四英厘 (0.25) —M.

分置於二十藥壳內、每餐後服一壳。

Pone in capsulas No. XX. S.—One capsule with meals.

如胃經虛弱、可於此方內加辣椒少許。

煉牛膽 FEL BOVIS, U. S. 此係牛膽囊中取出之液、焙之使乾、每百分僅得十五分、如因不消油類食物、或生來膽液不足、以致食滯者、此藥能醫之、分劑五至十五厘、(0.3-1.0) 足分劑、每有輕瀉之功、曾有醫者如此用之、按服此藥時、胃液消化之功必減、胎與腥類之食物、消化尤難、蓋此藥能使胎與腥類、縮小而變硬、且大敗胃經之液、以致功用受阻、故用之者、必於食畢數句鐘、胃經消化之後、腸正消化之時服之、方於胃經之功用無阻也、醫者宜切記之、純牛膽液、分劑亦與此同、製法、以牛膽液置於火上、煨至三分之一、加醇酒一分合勻、至二十四句鐘、上下必分二類、上清而下稠、將清者傾出、餘

辣椒脂橢 B-Oleoresinæ capsici 十至二十量滴 (0.6-1.3)

胰 梅 Pancreatini 二十英厘 (1.3)

薑 散 Pulv. zingiberis 四十英厘 (2.6)

木炭散 Pulv. carbon. ligni 四十英厘 (2.6) —M.

置於二十殼內、每飯後服一至二殼。

Pone in capsulas, No. XX. S.—One or two, t. i. d. with meals.

如木炭不便、可將饅首切成薄片、以火烤之、至似木炭之狀、亦可代其用、如病者食滯過甚、且有嘔吐之患、若服木炭、則所吐者與大便、必無酸味、但大便色黑而已、成人釀[1]酸之瀉症、服以上之方有效、倘病者腸胃發炎、宜去辣椒脂橢、若以木炭塊或散、作濾水之用、乃最妙之法。

蹇梅 (DIASTASE)

此藥由酒酵取出、係一類助消化之品、胃經消化食物之時、亦有此物、功用與倍辛胰梅相似、穀芽中有此藥之功者、惟大卡蹇梅、乃日本化學家所製者也、服之能使糙類變成葡糖、如人不能消化糙類之食物、每餐後服此藥二至五厘、(0.12-0.3) 大效、並有良方如左。

1 Fermentative and acid diarrhœa

物、與病者不宜、不必用之、蓋恐胚經之功用反減、久之則功用盡失矣。

胚梅消水 Liquor Pancreatis, B. P. 分劑一至二量錢 (4.0-8.0)

怕怕印 (PAPAIN) 此乃一類菓汁、產於熱道、無論其遇酸液鹼液、俱不能阻其消化之功、與倍辛胚梅不同、但服之者、見效甚微、故少有用之者、分劑一至八厘、(0.06-0.5) 或言此樹之葉、孕婦服之、恐有小產之虞。

木炭 CARBO LIGNI 此炭之製法、乃以輭木置於火內、不使空氣侵入、燒之而成、入藥者、宜色黑而脆、且宜疎鬆、嘗覺俱無味、純者水不能化。

療效 以此藥散製作糊藥、敷於久瘡、或疔塊、有滅穢免臭之功、因其有吸水之能、使穢無從生長、並能使氣與他物改變體質也、然雖能滅穢、因其不潔、鮮有用之者、糊藥之製法、以木炭散半兩、(16.0) 碎饅首二兩、(60.0) 胡麻子散一兩半、(45.0) 滾水十量兩、(30.0) 先以碎饅首與胡麻子散加於水內、置於火上、至十分鐘、以木炭散一半、加於其內、後攤於布上、再撒所餘之炭、乘熱覆患處、有效、若作爲服劑、頗有醫胃酸[1]噫噎之功、胃弱[2]或胃泗炎之中程、因不知留意於飲食之故、以致多有噫噎之患、良方如左。

1 "Sour stomach"
2 Atonic or subacute gastric catarrh

乳凝結、病者服之、有養育之能、且有助人消化之功。

胰糜 PANCREATINUM, U. S. 此藥係胰經之糜、分爲四種、一胰化脢糜、二胰化脂糜、三胰化糖糜、四凝乳糜、若以糖二十五分、雜胰糜一分、其糖即爲水所能化、美揀藥册所定之力、即以此爲準、其取法、乃由猪之胰經而得、如不便、可將猪飼飽、過六句鐘、當胰經作功時、則殺之、將胰經取出、以刀鬱切之、秤準、加淡酒四倍、待至十二句鐘、傾清或隔渣、所傾之流質內、即含胰糜、分劑一至二量錢(4.0-8.0)更有至妙之法、將猪之胰經鬱切之、加純酒、待至二十四至四十八句鐘、將酒壓出、再加甘油十倍、泡至四十八句鐘、隔渣、即成胰糜甘油、以三十量滴(2.0)調於一盃牛乳內服之、頗有助消化之功、藥行所售者乃細粉、分劑二至二十厘(0.12-1.3)食時服之、或食畢即服俱可、若與鈉氫碳强鬱同服、其效尤妙、食物不化、以致瀉腹、並胃失功用、或因胰經生疽而失功用、以致糖尿症、或有他症而令胰經消瘦者、此藥皆效、有醫者云、因此藥惟於鹼液中成功、故只可備病者飲食之用、若用爲服劑、藥至胃中、胃液所含之酸、立變其體質、反有損消化之功、此論甚謬、蓋食時胃液未生、必過一至二刻鐘、酸液方爲此藥之敵、此一二刻時、藥已成功、如此服之、常見功效、按此藥備病者食物之用、頗有助胃消化之功、若此類食

1 Indigestion
2 Diabetes

第三十章　論助消化藥類

倍辛 PEPSINUM, 此藥乃係胃液消化之糜由猪胃而得純者得之最難故藥行常售者多係糜變滲腥少係倍辛且常攙涸液與粹腥等物如有糜變滲腥臭之必有臊味且置於過空氣處易攝水氣而發粘如以此藥與淡氯氫酸相合加食物於其內其消化之力與在胃中相等按美捧藥册此藥一分必有消化粹腥三千分之力方可。

療效 此藥固能醫食滯[1]之患然稱之者亦未免過甚如病因肝經所致此藥必無醫之之能蓋醫此等症究不如脆糜爲妙也此藥宜食時服之或食畢即服俱可脆糜亦然但此藥常與氯氫酸同服或見大效。

藥製與分劑

倍辛消水	(Liquor Pepsini)	二量錢 (8.0)
倍辛	Pepsinum,	五至十五厘 (0.3-1.0)
倍辛甘油	Glycerinum Pepsini, B. P.	一至二量錢 (4.0-8.0)
倍辛香酒	(Cordiale Pepsini)	一至二量錢 (4.0-8.0)

食畢即服如將倍辛甘油或倍辛香酒一量錢(4.0)調於一盂牛乳內置於冷處則其

1 Indigestion

留有服二十厘（1.3）而無乖效者、亦有婦人服五厘（0.3）大有癱患者、故用此劑者、分劑不宜過五厘（0.3）服後二句鐘、宜服瀉劑、常用此藥者、謂其效爲最準。

石榴根皮流膏 Fluidextractum Granati U. S. 二十至三十量滴 (1.3-2.0)

石榴根皮煮水 Decoctum Granati Corticis, B. P. 一至二量兩 (30.0-60.0)

洋蘇氷 THYMOL, 詳見本篇。

卡瑪拉 (KAMALA) 此藥乃一類樹角內所生之棚與毛、產於阿比辛亞印度由華與司大利亞等處、內含一精、名拉特林、此精不入藥用、如服一或二錢（4.0-8.0）大有瀉效、且有祛帶虫[1]之功、亦有用之祛蛔虫[2]者、宜與鬧羊花同服、以免痒患、服法、宜置於糖漿內、越八句鐘、如不見效、再如法服之、必效。

1 Tape-worm
2 Lumbricoides

石榴根皮 GRANATUM, U. S. GRANATI CORTEX, B. P. 此藥係石榴樹根之皮、內含一流堿、名石榴印、(Pelletierina) 水二十分、能化堿一分、此堿有鞣鹽四類、卽石榴印炭匿鞣、石榴印硫强鞣、石榴印氯鹽、石榴印氟鹽是也、按石榴印炭匿鞣之用、較多於他鞣、乃黃色細粉、嘗之味苦、水七百分、醇酒八十分、俱能化樂一分、服毒分劑者、動系之末被癱、其狀與中固拉拉毒相似、但知覺仍存、惟二股之動系、受毒最重、然二股未被癱之先、或有轉筋之患、亦或有惡心嘔吐者。

療效 有醫者以此藥爲祛蛔虫之劑、究之其大用、只祛帶虫[1]而已、或言野石榴根皮、較人種者、其效尤大、然必用足分劑方效、用法、以此皮二兩、(60.0) 加水二量磅、(960.0) 泡二十四句鐘、煎至一量磅、(480.0) 每句鐘服二量兩、(60.0) 至服完爲止、但此法使服之者、常覺不安、瀉腹甚重、且大有惡心嘔吐等患、服後如不瀉腹、恐虫脫藥之毒力、不能隨藥瀉下、必服蕳麻油、或他類瀉劑、方能見效、且用藥之先、必禁飲食十二句鐘方可、近之醫者、因人服此藥受苦太甚、故少有用之者。

藥製與分劑

石榴印炭匿鞣 Pelletierinæ Tannas, U. S. 三至五厘、(0.2-0.3) 此鞣爲此類藥中常用之品、

1 Tape-worm

非利瑪脂楠 Oleoresina Aspidii, U. S. 半至一量錢、(2.0-4.0) 置於藥壳內服之、或製成勻藥亦可、良方如左。

非利瑪脂楠	R. Oleoresinæ aspidii, U. S. Extracti filicis liquidi, B. P.	四十五量滴 (3.0)
凡匿拉酒	Tincturæ vanillæ	四十五量滴 (3.0)
非蒲散	Pulveris acaciæ	三十英厘 (2.0)
烝水	Aquæ destillatæ	一量兩 (30.0) —M.

禁食一日後一次服之、過二句鐘、服鎂硫强瀉一劑。

S.—Take entire amount after fasting, and follow in two hours by a full dose of sulphate of magnesium.

非利瑪流膏 Extactum Filicis Liquidum, B. P. 十五至六十量滴、(1.0-4.0) 日本有名醫二人、查明蕁麻油、有助本藥被喋之力、故二藥同服、易於中毒。

倭瓜子 PEPO, U. S. 此子有祛帶虫[1]之能、宜去皮空腹服之、且無危險、越二句鐘、可再服有力之瀉劑、如欲使人易服、與白糖共研細末可也、分劑二兩、(60.0)

松節油 OLEUM TEREBINTHINÆ, 詳見本篇。

1 Tape-worm

乖效 乖效於下節毒力中論之、但仍有服此藥而成遺溺之患者。

毒力 服過分劑者、則有肌肉微顫、筋抽、昏迷等患、亦有瘈瘲似癎者、凡所見之物、皆成黃色、蓋因藥將眼水染黃之故、或有所見之物、俱成綠色、過數日方能復原者、亦有漸次成盲者、小便先則色黃、後則紅紫、或似血色、此非因其中含血、乃爲藥色所染耳、中毒者、無腸胃發炎之患、因其在肓道中無惹力也。

納山道年 (Sodii Santoninas) 此藥易化而速嗆、故不宜用爲殺虫之劑、只可用之醫視系之症、蓋殺蛔虫之藥、必存於腸內、虫乃食之也、分劑日服二至八厘、(0.12-0.5)

非利瑪 ASPIDIUM, U. S. FILIX MAS, B. P. 此藥係一類草根、產於印度、爲殺帶虫之上品、其力惟遜於石榴印、未服之先、必禁飲食十二至二十四句鐘、使虫無食物之助、早晨服一劑、過半句鐘、再服一劑、後服鎂硫強鬱一劑、俟受毒之虫瀉下、再食食物、然當查所祛之虫有頭否、如無頭、必再如法用藥、否則虫仍生長、若服毒分劑、則腸胃受惹、以致瀉腹、如藥被嗆、先則腦部受阻、以至癱瘓、後則腦力脫失、遂即殞命、服此藥之脂楠、如過一量錢有半、(6.0)不爲無險。

藥製與分劑

1 Disease of the optic nerve
2 Tape-worm

成末、恐其易於被陳、以致中毒也、成人之分劑、一至二厘、(0.06-0.12) 置於藥壳內服之、隨即服錄氯弱塩一至二厘、(0.06-0.12) 過十二句鐘、再如法服之、必效、近有醫者云、以黃色之山道年醫痺症、大效、日服三至五厘、(0.2-0.3) 勻開服之。

藥製

山道年藥餅 Trochiscius Santonini, 每餅內有山道年一厘、(0.06) 分劑一二餅、另有良方如左。

山道年	℞-Santonini	五英厘 (0.3)
白糖散	Pulv. sacchari alb.	三英錢 (12.0)
非菡散	Pulv. acaciæ	八英厘 (0.5)

相合研勻、再加 Misce bene, et adde

非菡漿	℞-Mucilaginis acaciae.	十六量滴 (1.0)
水	Aquæ	酌用

作成十餅、孩童分劑、一或二餅。

Ft. in troches No. X. S.—One or two lozenges, as directed.

1 Sprue

蛔[1]虫之功、將此子研成細末、外加糖漿、孩童服之最宜、分劑、十至三十厘、(0.6-2.0)

藜蘆油 Oleum Chenopodii, U. S. 此油滴於糖上、或以非菡製成勻藥類、較此子最妙、五正歲之孩童、分劑十量滴、(0.6)如能服藥壳尤妙、宜空腹服之、但次晨必服瀉劑方可。

哥蘇 cusso 此藥乃一類草花、產於阿比辛亞、內含一氣易散之油、能殺帶[2]虫之功、用法、以此花半兩、(16.0)研成細末、加水一量磅、(480.0)製成冲藥、早晨空腹服之。

藥製與分劑

苦辛 (Kosin) 二十至四十厘、(1.3-2.6)宜置於藥壳內服之。

哥蘇流膏 (Fluidextractum Cusso) 半量兩、(16.0)或言孕婦服之、恐有小產之虞、但無確據。

山道年 SANTONINUM, 此藥乃由一種花蕾取出之精、產於小亞西亞西域等處、醇酒、哥羅芳、俱能化之、水不易化。

療效 此藥之大用、乃專殺蛔[3]虫、無殺帶虫之能、宜空腹服之、或言視系受病、若服中分劑、有增目力之功、遺溺之患、有時他藥所不能醫者、此藥能醫之、宜用其晶、不宜研之

1 Lumbricoides
2 Tape worm
3 Lumbricoides
4 Urinary incontinence

第二十九章 論殺虫藥類

土拜枝喇 SPIGELIA, U. S.

此藥乃一類草根、產於美國南方。

療效 此藥爲殺蛔[1]虫之妙劑、宜空腹服之、服後必服鎂硫强攀、或他速效之瀉劑、使中毒之虫、隨藥而下、如用緩效之瀉劑、恐虫已脫藥毒、而不能下矣、故必如法服之、方可見效。

藥製與分劑

土拜枝喇流膏 Fluidextractum Spigeliæ, U. S. 二—量錢 (8.0)

土拜枝喇辛那流膏 (Fluidextractum Spigeliæ et Sennæ.) 二—正歲之孩童、半至一量錢、(2.0-4.0) 成人一量兩、(30.0) 此膏之味不惡、故孩童易服。

阿西大 (AZEDARACH)

無毒惟皮有之

此藥係一類樹皮、產於叙利亞波斯印度等處、內有毒力、此樹之菓多服之者、其狀與中土拜枝喇、或顛茄等毒者相似、有殺[2]蛔虫之功、用法、以此皮二兩、(60.0) 加水二十四量兩、(720.0) 煎至十六量兩 (480.0) 孩童之分劑、半至一量兩、(16.0-30.0) 每二句鐘服一次、至見大便爲止。

藜藿 (CHENOPODIUM,)

此藥乃一類草子、產於美國、內含一油、名藜藿油、其氣易散、有殺

1 Lumbricoides
2 Lumbricoides

鈣碳强礬餅 (Trochisci Cretæ)

灰擦藥 Linimentum Calcis, U. S. 此以灰消水、與胡麻子油各半製成、乃爲敷燙傷[1]之用。

鈣碳强礬 俗名白土 (CRETA) 此藥係微物之壳積合年深而成、入藥用者、惟煉鈣碳强礬。

煉鈣碳强礬 CRETA PRÆPARATA, 此藥醫盟瀉[2]症有效、若兼服植類之歛藥、如佳奴、兒茶、或鴉片樟腦等酒、其效尤妙、良方如左。

佳奴酒	℞-Tincturæ kino	一量兩	(30.0)
兒茶雜酒	Tincturæ gambir compositi.	二量錢	(8.0)
鈣碳强礬調水	Misturæ cretæ	加至六量兩	(180.0) —M.

每三句鐘服二量錢、(8.0) 至瀉止爲度。

S.—A dessertspoonful every three hours until diarrhœa ceases.

藥製與分劑

鈣碳强礬雜散	Pulvis Cretæ Compositus, U S.	十至六十厘	(0.6-4.0)
香鈣碳强礬散	Pulvis Cretæ Aromaticus, B. P.	十至六十厘	(0.6-4.0)
香鈣碳强礬鴉片散	Pulvis Cretæ Aromaticus cum Opio, B. P.	十至六十厘	(0.6-4.0)

1 Burns
2 Serous diarrhœa

厘、(0.6-2.0) 此類礬之糖漿、分劑俱一至四量錢、(4.0-16.0) 日服三次、功效與硫迥異、醫者必切記之、因常有誤論此理者也、服錯硫礬類、則硫不入血、惟錯入之、服硫强酸、硫質亦不入血。

石灰 化學家名 CALX 此藥乃以白花石、或鈣碳强礬、或蠔殼、燒之而得、頗有鹼效、與酸斂二類不合。

療效 此藥具有潰力、患久瘍[1]者敷之、有激其收口之功、亦有祛毛痣[2]之能。

鈣鹽潰藥 Potassa cum Calce, 此製在潰藥中、爲最妙之品。

灰消水 Liquor Calcis, 此消水能免酥腥變硬、多激胃經生液、故有助胃消乳之功、亦有改酸之能、且畧有斂力、如嬰孩或乳婦服之、大概有助嬰孩長骨之功、糖尿[3]症、與慣犯尿酸及惡心嘔吐[4]者、服之俱效、嘔吐[5]者、若以乳與此消水各半小勺同服、雖服他藥無效者、服此亦每有效、分劑一量錢至二量兩、(4.0-60.0) 亦可敷於頭上、以醫癬[6]症、痧[7]症敷之、有祛假皮之功、但其效不似氫氯强洽之大、可置於噴霧具內噴之、或以棉蘸而敷之亦可、其製法、以白石灰一塊、似桃核大、置於四量磅 (2000.0) 淨水內、俟其沉澱、漿清、貯於瓶內、後再加水、至石灰力盡爲止。

1 Old ulcers
2 Hairy growths
3 Diabetes
4 Nausea
5 Vomiting
6 Tinea capitis
7 Diphtheria

日服三次、每服半量兩、(16.0)飯後一句鐘服之最妙。

S.—One to two tablespoonfuls three times a day.

此方服後、常覺乾渴、如胃經受惹、則宜減其分劑、如人有流血過甚之性、或兼患瘀癍、服此藥如惹胃經、則宜以鋰乳攀二十厘、(1.3)日服三次、如葯不被喊、宜以葯一分、加水三十分、製成消水、射於皮內、若此藥惹力過大、不宜用爲射劑、有醫者尠用此藥之小分劑、醫性易流血者、但服之不宜過四日、恐多服反增其患也、服法、先服十五至三十厘、(1.0-2.0)後每句鐘服五厘、(0.3)至五六次爲止、次日如法服之。

鋰硫下攀、與澱鋰硫强攀、Calcii Phosphas Præcipitatus, U. S. Calcii Phosphas, B. P. 每用之醫癆[1]與嬰骨輭[2]等症、常用者、乃鋰硫下攀糖漿、Syrupus Hypophosphitum, U. S. 或鋰硫下攀雜糖漿、Syrupus Hypophosphitum Compositum, U. S. 或鋰乳硫强攀糖漿、Syrupus Calcii Lactophosphatis 蓋骨與各類之腸內、原有鋰硫强攀、故缺此類攀者、服之大效、曾有人以此攀灌於獸類、不但能長骨之硾類、即骨之牲類亦能增長、骨折者、如長合甚遲、或肺癆[5]並癆等症、鋰硫下攀或效、肺癆症、初患時、此類攀有效、至中晚二程、則少有醫之之能、乳婦之牙癇[6]或血虧[7]等症、此類攀有效、鋰乳硫强攀較鋰硫下攀尤妙、因其易於被喊也、此二攀之分劑、俱十至三十

1 "Bleeders"
2 Scrofula
3 Rickets
4 Fractures
5 Phthisis
6 Dental caries
7 Anæmia

每三句鐘服一量錢、(8.0)病愈爲止。

S.—A dessertspoonful every three hours until diarrhœa ceases.

此調水無甚斂力、其大用乃爲攻酸之劑、並有護腸泗膜之功、按鈣碳强鬱、在攻酸藥類中、其力最遲、故用爲腸內攻酸之劑、乃爲上品、蓋於胃內不變其體質、至腸內始見功效也、手足妄汗[1]與瘍或[2]燙傷[3]、敷之俱效。

鈣氯塩 Calcii Chloridum 此藥之過分劑、有惹腸胃之力、甚至殞命、有醫者用之醫瀉痢癰症、或言能使癰之四圍、有被鈣包裹之功、如孩童之骨[5]不能合宜生長、服之有效、然最妙者、乃鈣乳硫强鬱、如癤[6]生膿過緩、以此塩製成消水、灑於糊藥上、有輔助生膿之功、服之者、可以此塩五厘、(0.3)加水一量錢、(4.0)製成消水用之、患癢[7]者、日服三次、每次二十厘、(1.3)或效、又有良方如左。

鈣氯塩	Ʀ-Calcii chloridi.	二英錢 (8.0)
陳花酒	Tincturæ aurantii flor.	六量錢 (24.0)
哥羅芳水	Aquæ chloroformi q. s. ad	六量兩 (180.0) —M.

1 Sweating of the hands and feet
2 Ulcers
3 Scalds
4 Scrofulous enlargement of glands
5 Deficient bone-formation
6 Boils
7 Itching

貯於玻璃瓶內、以玻璃塞塞之。

鈉洗消水 Liquor Sodii Hydroxidi, U. S.

鈣 (CALCIUM,) 此係金類元質、不入藥用、入者乃其數類鹽、即鈣氯鹽、Calcii Bromidum, U. S. 澱鈣碳强鬱、Calcii Carbonas Præcipitatus. 鈣氯鹽、Calcii Chloridum. 鈣硫下鬱、Calcii Hypophosphis. 澱鈣硫强鬱、Calcii Phosphas Præcipitatus, U. S. Calcii Phosphas. B. P. 枯鈣硫强鬱、Calcii Sulphas Exsiccatus, U. S. 凡此鬱鹽類、俱與酸類不可合用。

澱鈣碳强鬱 此藥有醫盟瀉之功、亦有收酸之能、孩童之對磨癜、皮裂等患、敷之有效、服分劑、十至三十厘、(0.6-2.0) 最妙者、惟鈣碳强鬱調水、Mistura Cretæ, 此製每量兩 (30.0) 內、有鈣碳强鬱三十厘、(2.0) 孩童之分劑一量錢、(4.0) 成人之分劑、一量兩、(30.0) 患盟瀉者、如以此水與他類飲藥同服、功效尤妙、甚良方如左。

佳奴酒	℞-Tincturæ kino	一量兩 (30.0)
兒茶雜酒	Tincturæ gambir comp.	二量錢 (8.0)
鈣碳强鬱調水	Mistura cretæ	六量兩 (180.0) —M.

1 Serous diarrhœa
2 Intertrigo

消化、且有助胃生化腥梅之功、分劑十至二十厘。(0.6-1.3)

鈉伊替礬 (SODII ETHYLAS.) 此藥色白、形如細粉、加水則成酒與鈉洗、加醇酒則化之、但不改其體質、能祛生毛[1]之痣類、用法、先將毛剃去、以此礬化於純酒內、用玻璃管蘸而敷之、越片時即成一痂、半月後揭去、則毛之根盡絕矣、倘有未盡、俟收口後再敷、宜於未敷之前、以寇卡印一厘、(0.06)加水二十量滴、(1.3)用空針射於痣之四圍、可免其痛、凡諸等痣類、皆可以此法醫之、但祛後或成小瘢。

鈉伊替消水 Liquor Sodii Ethylatis, B. P.

鈉硫下礬 SODII THIOSULPHAS, U. S. 此藥無色、過光、形如鱗片、置於過空氣處、則攝水氣、以試紙試之、畧有鹼效、水一分、能化藥一分、酒不能化。

療效 寄生之皮症[2]以此礬一錢、(4.0)加水或猪脂一量兩、(30.0)調和敷之、頗效、如以三十厘、(2.0)加水一量兩、(30.0)有醫漆咬或皮癢[3]之功、若因瘴症[4]溺血[5]者、每四句鐘服十至三十厘、(0.6-2.0)常效。

鈉洗 SODII HYDROXIDUM, U. S. 此藥之潰力、較小於鈦洗、潰力之大小、能隨人意用之、用法與鈦洗同、以脂或貼膏覆患處之四圍、再敷此藥、則無恙之皮、不致受其潰力也、此藥必

1 Hairy growths
2 Parasitic skin diseases
3 Rhus poisoning
4 Pruritus
5 Malarial hæmaturia

第二十八章 論改酸藥類

鈉 (SODIUM) 此係金類原質、於人身少有感能、入藥者乃其數類鬱塩。

鈉醋鬱 SODII ACETAS, U. S. 此鬱或可代鋉醋鬱之用、然用之者鮮。

鈉氫碳強鬱 SODII BICARBONAS, 此鬱常爲改酸[1]之用、如因胃釀[2]之故、以致嘔吐[3]而頭痛者、服之有效、如與鋉氫弱塩同服、能增鋉氫弱塩之功、凡鹼藥類、俱能激肝而免液變稠、非只此鬱也、節痺症、多有醫者以此鬱置於水內化開、以布蘸之、裹於骨節痛處、大效、患胃酸之良方如左。

鈉氫碳強鬱 R. Sodii bicarbonatis 三十英厘 (2.0)
菓酸 Acidi tartarici 五英厘 (0.3) —M.

此二藥各以半盃水化之、後合爲一盃、沸時即服。

S.—Dissolve each in half a tumbler of water, add one to another and swallow during effervescence.

鈉氫塩 SODII CHLORIDUM 此藥亦有育身之功、血與身胴所含之鹼、多緣此塩、且能助胃生液、胃內之乳酸、與此塩相合、即成爲鈉乳鬱、與氫氯酸、氫氯酸尤關緊要、不但助其

1 Gastric acidity
2 Gastric fermentation
3 Sick headache
4 Rheumatism

高嶺土 KAOLINUM.

此土乃由石變成者、癩症撒於惹處有效。

高嶺土糊藥 Cataplasma Kaolini, U. S.

t Eczema

流出、亦可敷之、使膿變稠、而後放之、如此其痛可漸次而減、以至痊瘉、但癤患未必盡然、敷後仍有甚痛者、則不宜再敷、當以刀放膿方可、痘症[1]、如以輭火棉酒敷於面上、可免成瘢之患、癲症[2]之節炎、如加氯酒等分敷之、痛先覺增、逾時必效。

藥製

輭火棉酒 Collodium Flexile, 此以火棉酒九十二分、堪阿大脂柄五分、萆麻油三分、相合而成、無縮力、亦不變硬、故較火棉酒尤妙。

止血火棉酒 Collodium Stypticum, U. S. 此酒內含炭匿酸、能止輕流血之患、然因其不潔、故用之者少。

洋斑蝥火棉酒 Collodium Cantharidis, U. S. 詳見洋斑蝥篇。

糘

AMYLUM, 糘類甚繁、由玉蜀黍而得者、方入藥用、對磨[3]癜患、製成藥散、敷之有效、其緊要之用、乃製成糘水與糊藥也、糘水之製法、以糘二大勺、(30.0) 加水一量磅、(480.0) 置於火上、煮之成漿、再加滾水、至成稀漿爲止、可作引藥之用、亦有平泗膜之功、肛[4]發炎或受惹時、以此水射於肛內、則有平之之能、糊藥之製法、以糘加水化之、置於火上、煮成稠漿爲止、如於每兩 (30.0) 內加硼酸三十厘、(2.0) 則有滅稑之功。

1 Smallpox
2 Gouty inflammations of the joints
3 Intertrigo
4 Rectal irritation

輭皺擦藥、Linimentum Saponis Mollis, 皺擦藥、Linimentum Saponis, 此藥常與他類同用、以擦肌板、或筋扭等患、良方如左。

草烏頭酒	℞ Tincturæ aconiti	二量錢 (8.0)
顛茄酒	Tincturæ belladonnæ	二量錢 (8.0)
鴉片酒	Tincturæ opii	二量錢 (8.0)
皺擦藥	Linimenti saponis q. s. ad	加至六量兩 (180.0) —M.

皺貼膏 Emplastrum Saponis, 此膏之大用、乃攤於布上、以貼臥瘡、如尚未成瘡、貼於壓處、可免此患、亦有用之以醫節扭者。

火棉酒 COLLODIUM, 此藥乃以火棉、置於醇酒與伊打內化成、爲過光之流質、膜之頗有伊打之味。

療效 此酒於浮傷或割傷、以刷刷之、可免空氣入於傷口、但有縮力、敷後皮必縐縮、至乾時而止、因病者多受疼痛、故醫者必加他藥、製成輭火棉酒用之、癤初起時、頂有膿皰、四圍發硬、如敷於硬處、切勿敷於皰上、或不至於生膿、如業已生膿、此法無益、若未

1 Bed-sores
2 Sprained joints
3 Small wounds
4 Abrasions
5 Boils

甘油鉛醋蠣抹膏 Unguentum Glycerini Plumbi Subacetatis. B. P.

撒卡林 BENZO-SULPHANIDUM, U. S. GLUSIDUM, E. P. 此藥色白、形如細粉、覺之無味、嘗之甚甘、較白糖甘二百二十倍、藥被祛時、不變體質、無體功效、糖尿[1]癎[2]等症、可代白糖之用、胃失功用者忌服、以其有阻胃之力也、分劑無定、其一厘 (0.06) 之甘味、與白糖一小勺 (4.0) 相等、常用之分劑乃半厘。(0.03)

煤油蠟 PETROLATUM, U. S. PARAFFINUM MOLLE, E. P. 此藥自煤油而得、存之日久、味終不壞、常用爲潤皮之藥、腸胃受[3]惹者、可以此藥平之、因不被陳、故多服亦無損傷、且無瀉效、製抹膏者、常以之爲主也。

流煤油蠟 PETROLATUM LIQUIDUM, U. S. PARAFFINUM LIQUIDUM, E. P. 此類藥常置於噴霧具內、以噴鼻嗓之惹患。

白煤油蠟 PETROLATUM ALBUM, U. S. 此油純而無色。

皀 SAPO, U. S. SAPO DURUS, E. P. 此藥乃鹼類與油類相合而成、常用者、係鈉沘與洋橄欖油所成、喀司替勒皀、乃最上之品、嬰孩大便結燥、可以此皀製成肛彈、蘸水塞於肛內、有通大便之功。

輭皀 SAPO MOLLIS, 此藥常用之以醫皮症、如癩[4]症等類。

1 Diabetes
2 Gout
3 Gastro-intestinal irritation
4 Eczema

乾且多漬牙穢者、如加水等分、漱口大效、肺癆[1]之晚程、而舌燥者、如依上法製之、再加檸檬汁少許、用之漱口有效、[2]窞頸積血之患、因此油有攝水之能、可以絮蘸而塞之、日換一次有效、皮受惹者、以此油十五分、加洋山芋糙一分、置於火上和勻、即凝成過光之膏、再加鉦蓊數分、敷之大有平之之功。

藥製

甘油烯醇 Glycerinum Acidi Carbolici, B. P.

甘油炭匿酸 Glycerinum Acidi Tannici, B. P.

甘油釷鈹硫强礬 Glycerinum Aluminis, B. P.

甘油硼强酸 Glycerinum Acidi Borici, B. P.

甘油鉛醋礬 Glycerinum Plumbi Subacetatis, B. P.

甘油卡喇坎 Glycerinum Tragecanthae, B. P.

甘油鈉硼烘礬 Glycerinum Boracis, B. P.

甘油倍辛 Glycerinum Pepsini, B. P.

甘油糙 Glycerinum Amyli, B. P.

1 Phthisis
2 Congestion of the uterine cervi

第二十七章 論潤皮藥類

濕羊毛脂 ADEPS LANÆ HYDROSUS.

此藥由羊毛而得、色白、較他類之脂不易成酸、雖日久亦無腥臊之味、以其甚粘、故鮮有用之者、如加軟煤油蠟三分之一、則不粘而易用矣、有醫者謂、此油能潤透皮內、若加以喇瑣辛、潤力尤大、但皮症專敷此脂、少有醫症之能、必合他藥同敷方效、若製成抹膏、與猪牛羊等脂無異、但有時惹皮、然不常見。

甘油 GLYCERINUM.

此藥由脂類用蒸法而得、易攝水氣、其能化之物極多、有敷之而皮受惹者、亦有敷之而生癒者、以其能攝皮內之水也。

體功效 如將此藥射於血脈內、則有瘓癱之勢、因其多攝血內之水也。

療效 有醫者云、患糖尿症者、服之尿則加增半倍、若以之代糖之用、不爲妙法、亦有醫者云、頗有功效、故糖尿或他類不可食糖之症、可試用之、如欲輕瀉、可服一至二量錢、(4.0-8.0) 以一至四量錢、(4.0-16.0) 射於肛內、亦有瀉效、加水少許亦可、但加水與否、不爲緊要、如用甘油肛彈、Suppositoria Glycerini, 必有瀉效、大便久燥、此彈最妙、然或有惹肛之患、按此藥有免腐之能、如加水四五倍、以噴霧具噴於鼻內、有醫新[3]膿症之功、如欲敷於皮上、宜加水等分方可、耵聹[4]變硬、以此油滴於耳內、能使之柔輭、腸[5]熱症以致口

1 Diabetes
2 Chronic constipation
3 Acute coryza
4 Impacted cerumen
5 Dry mouth of typhoid fever

可以此糖代之、因其於人身內被陳後、遇氧卽改其體質、故卽日服一至二兩、(30.0-60.0) 或亦不爲過度、且有育身之功、不受食育之孩童、或患肺癆[1]者、如胃經不能消化蔗糖、此糖爲宜。

1 Tuberculosis

甘草鍾洝 Glycyrrhizinum Ammoniatum, U. S. 五至十五厘 (0.3-1.0) 此乃以鍾洝消水、化甘草之甘精而成、故其味較他製之甘草尤甘。

胡麻子 LINUM. 此藥係一類草子、內含一油並一類之膠、其油名胡麻子油。

療效 泗膜受惹[1]者、此藥有潤之之功、故胱[2]新炎[3]氣膅炎[4]胃炎、腎炎[5]等症、服之有效、製法、以整胡麻子三錢、(12.0) 甘草膏三十厘、(2.0) 加滾水十量兩、(300.0) 煨於火傍、一至四句鐘之久、不宜使之滾沸、蓋水一滾沸、其油與子卽分、服之則難於下咽矣、此藥淡而無味、人多不喜服、若加檸檬汁、白糖、非蒻等少許、則易服矣、如病者咳嗽過甚、可加鴉片樟腦酒少許、則有平嗽之功、有醫者以此油二量兩、(60.0) 用爲瀉藥、或言以此劑醫痔[6]症、大效。

藥製

胡麻子散 Limi Contusum, B. P. 此散常製成糊藥用之。

灰擦藥 Linimentum Calcis, U. S. 此以胡麻子油與灰水各半、調和而成、爲敷燙傷[7]之用。

左糖 (LEVULOSE) 此係一類之糖、較蔗糖尤甘、純者內無葡糖、患糖尿[8]症者、忌食蔗糖、

1 Inflamed mucous membranes
2 Acute cystitis
3 Bronchitis
4 Gastritis
5 Nephritis
6 Hemorrhoids
7 Burns
8 Diabetes

藥製與分劑

甘草膏 Extractum Glycyrrhizæ, 五至百二十厘 (0.3-8.0)

甘草純膏 Extractum Glycyrrhizæ Purum, U. S. 五至百二十厘 (0.3-8.0)

甘草流膏 Fluidextractum Glycyrrhizæ, U. S. Extractum Glycyrrhizæ Liquidum, B. P. 一至二量錢 (4.0-8.0)

輔香酒 Elixir Adjuvans, U. S. 此酒內有甘草流膏。

甘草雜調藥 Mistura Glycyrrhizæ Compositus, U. S. 一至四量錢 (4.0-16.0) 內有鴉片樟腦酒十二分、銨葡酒六分、燄氣弱浮酒三分。

甘草雜散 Pulvis Glycyrrhizæ Compositus, 一至四錢、(4.0-16.0) 按美揀藥册、此散千分、內有辛那百八十分、甘草二百三十六分、淨硫八十分、小茴香油四分、白糖五百分、按英揀藥册、每十二分內有辛那二分、甘草二分、小茴香一分、升硫一分、白糖六分、其大用乃爲瀉劑、分娩後常用之、無論何症、如因躺卧日久、大便乾結、服此散乃爲妙劑。

甘草鴉片餅 Trochisci Glycyrrhizæ et Opii, U. S. 每餅內有鴉片一厘之二十分之一、(0.003) 甘草膏二厘、(0.12)

第二十六章 論潤藥類

非菏 ACACIA, U. S. ACACIÆ GUMMI, B. P. 此藥乃由一類樹汁曬乾而成、產於亞非利加洲之北、奧司大利亞等處、凝結成塊、大小不同、其色黃白、畧能透光、無體功效。

療效 喉胃腸泗膜受惹或發炎、以此藥含於口內、化而咽之、或置於水內、化而服之、俱有平泗膜之效、如陰陽尿徑之泗膜發炎、亦可用之、因其力微小、故常與他平藥同服、有醫者以此藥與胡麻子、並他類之藥兼用、醫孩童或成人之乾嗽[2]症、其法先將胡麻子浸於水內、煨於火傍、數句鐘之久、但不宜使至滾沸、後加此藥、與檸檬油少許、化勻服之、製藥者、使藥成丸、亦多用此菏

藥製

非菏漿 Mucilago Acaciæ, 此漿乃以非菏十兩五錢(340.0)灰消水十兩、(320.0)水三十二量兩(1000.0)製成。

非菏糖漿 Syrupus Acaciæ, 此糖漿乃以非菏六錢(25.0)糖漿二兩半(75.0)製成。

甘草 GLYCYRRHIZA, U. S. GLYCYRRHIZÆ RADIX, B. P. 此草產於歐羅巴亞西亞等處、入藥者、係此草之根、如製膏服之、有激口生涎之功、亦有輕瀉之效、且因其能改味、故常用爲藥引。

1 Inflamed or irritated mucous membrane
2 Dry cough

即染成深棕以色。

上、若患處較大、則以數粒、置於過空氣處、俟變成流質、以玻璃管蘸而敷之、但患處之四圍、宜敷以油、或覆以合口貼膏、則無恙之皮、不至受其潰力、曾有婦人、生楊梅之濕瘡甚重、以此酸潰之、竟至殞命、故用此藥不爲無險、如欲患處畧潰、可以此酸百厘、(6.6) 加水一量兩、(30.0) 敷之、則潰力不至過甚、若誤服此酸、宜用醫育道炎症之法醫之、卽服灰消水、非滴漿、並當用吐劑、或可救其生命。

鑽强酸消水 Liquor Acidi Chromici, B. P. 此水乃以酸一分、水三分製成。

溴 BROMUM, U. S.

此藥係深紅色之流質、別具一種氣息、有如氯味、宜貯於玻璃瓶內、以玻璃塞塞之、置於寒冷之處、若敷於皮上、潰力最大、甚至深入肌裏、傳染之疳症、可以玻璃管蘸而敷之、其患庶不至浸淫四散。

加溦烘酸 PYROGALLOL, U. S.

此藥乃以加溦酸、用火煨之而成、色白、形如細鱗、臭之無味、嘗之覺苦、併打、醇酒、皆易化之、水一分零十分之六、能化藥一分、見光卽變黑色、故宜貯於黑色瓶內、嚴密塞之。

療效 凡寄生之皮症、以此藥三十至百厘、(2.0-6.6) 加猪脂一兩、(30.0) 製成抹膏、敷之有效、如膏內多加此藥、則多有潰力、疳[1]症、以此藥醫之、可代膏瑣便之用、惜其敷於皮上、

1 Hospital gangrene
2 Parasitic skin diseases
3 Psoriasis

繞 散	Pulv. amyli	三英錢 (12.0)
寇卡印氯塩	Cocainæ hydrochlorat.	三十英厘 (2.0)
烝 水	Aquæ destillat.	加至二量錢 (8.0) —M.

調成糊藥、敷於患處。 S.—Apply as a paste.

鈣氯塩消水 Liquor Zinci Chloridi, 此消水乃爲滅癘毒之用。

錄氯強塩 HYDRARGYRI CHLORIDUM CORROSIVUM, U. S. 詳見本篇。
HYDRARGYRI PERCHLORIDUM, B. P.

高錄氯強磐消水 LIQUOR HYDRARGYRI NITRATIS, U. S. 詳見錄篇。
LIQUOR HYDRARGYRI NITRATIS ACIDUS, B. P.

硫強酸 ACIDIDUM SULPHURICUM, 詳見本篇。

氮強酸 ACIDUM NITRICUM, 詳見本篇。

鎵強酸 CHROMII TRIOXIDUM, U. S. 此藥色紅結晶、易攝水氣、嘗之有金酸之味、乃爲酸母、
ACIDUM CHROMICUM, B. P. 必加水而後成酸、宜貯於玻璃瓶內、以玻璃塞塞之、不可與鹽氯弱浮酒、醇酒、甘油、或他類之生質相合、恐有崩炸之險。

療效 此酸爲潰藥之用、能醫皮與泡膜生瘤症、如患處較小、可以此酸之一粒、敷於其

1 Groths on the skin or mucous membrane

第二十五章 論潰藥類

鈹沎 POTASSII HYDROXIDUM, U. S. POTASSA CAUSTICA, B. P. 此藥色白質硬、易攝水氣、頗有潰力、瘍[1]胬或瘊類、常用此藥醫之、膚疽[2]初起時、去痂敷之、越一二分鐘、再敷糊藥、至數日潰肉脫而疽愈矣、用法、先以油類抹於疽之四圍、以合口貼膏、按疽之大小、中剪一口、覆於患處、使其疽顯露、用鉗夾此藥之小塊擦之、庶不至潰無恙之皮、而患處立受其潰力、潰力已足、則敷醋、或他類弱酸藥以解之、但敷此藥甚覺疼痛、故常用鈹沎鎝弱莠 又名危恩漿 (Potassa cum Calce) 以代之、雖潰力較鈹沎爲小、功用與鈹沎同。

砒弱酸 ARSENI TRIOXIDUM, U. S. ACIDUM ARSENIOSUM, B. P. 詳見本篇。

鉦氯塩 ZINCI CHLORIDUM, 此塩色白、結晶似針、易攝水氣、齅之無味、嘗之辛辣、以試紙試之、則有酸效、亦有滅癉毒之能、昔之醫者、常以此藥一至二厘、(0.06-0.12) 加水一量兩、(30.0) 用爲洗目之藥、今用之者少、白濁[3]之中程、可如上製法、射於尿脘內、有效、膚疽初起之良方如左。

鉦氯塩 ℞ Zinci chloridi 一英錢 (4.0)

1 Exuberant ulcers
2 Cutaneous cancer
3 Gonorrhœa

者謂於腸胃毫無損傷、究之服者胃經如大有消化之功與味力、則必中毒、若消化之功與味力畧小、則不致中毒也。

賽蒲阿 (THAPSIA) 此藥乃由一類草根之皮所得之楠、產於歐洲東南各處、有生泡之力、常製成貼膏、貼於患處、亦常作爲敷藥、如敷之日久、則大顯惹力、倘仍敷不止、必致成瘡也。

加火棉酒二量兩、(60.0) 以刷敷之。 S.—Apply with a brush to the part affected.

琥珀 (SUCCINUM) 此藥乃由地中掘出之柄、產於布路司玻利非亞等國、入藥者、乃用烝法由此柄取出一類之油、名琥珀油、其氣易散、大有惹力。

療效 呃[1]逆不止者、此油乃爲上品、節[2]痺症、如用此油敷之有效、痙[3]、癪[4]、啼嗽[5]等症、曾有醫者用此藥大效、嬰孩之氣[6]腔炎、如兼有腦部受惹之狀、以此油一分加洋橄欖油三分、搓其胸背有效、成人之嗓[7]新炎症、如氣腔被累、先服鈉氯塩之足分劑、後以此油一分、加洋橄欖油三分、搓其頸與胸有效、此油之服分劑、二至六量滴、(0.12-0.36) 調勻服之。

相思子 (JEQUERITY) 此藥乃一類草子、敷於傷口、則有毒力、與蛇毒相似、不可用爲服劑、患睟[8]瘢久炎者、如以此子半錢、(2.0) 加百零四度之熱水一量兩、(30.0) 製成冲藥、以刷蘸之、敷於睟上、病狀即改、必另發新炎、而起白皮、此炎一過、每多痊癒、如所發之炎甚猛、可以布蘸極淡之錄氯强塩熱消水覆之、屢行更換方可、按此冲藥變壞甚速、宜用現製者、不然必加硼酸四至八厘、(0.25-0.5) 方能存數日之久、若射於盂內、則大顯阻心之力、如將此子整服、則少顯中毒之狀、然有醫者謂、服此子必致腸胃受惹、亦有醫

1 Persistent hiccough
2 Rheumatic joints
3 Asthma
4 Hysteria
5 Whooping-cough
6 Bronchitis of infants
7 Acute laryngitis
8 Chronic granular conjunctivitis

齊瑣便 CHRYSAROBINUM,

此藥係酸鹼中性之精、由一類木取出、色黃、形成細粉、嘗之無味、酸鹼二類消水、與伊打、俱能化之。

療效 疥[1]症、或寄生類[2]之皮症、服此藥一厘之八分之一、(0.008) 或效、然用齊瑣便抹膏敷之、乃爲常法、以此抹膏惹力甚大、故宜加安息香猪脂四五倍、調勻用之、雖如此減少其力、猶有敷後皮腫而發炎、以至皸脫者、如皮有傷口、忌敷、恐藥力被喊、則有嘔吐之患也、此藥有染皮之力、敷之者、皮色必染成深棕、故不宜敷於面上、倘皮色受染、以鉛氣粉製成淡消水洗之、可去其色、若衣爲其所染、則無法能去之矣、患疥者、宜先沐浴、使患處之皮變輭、後再敷藥、良方如左。

齊瑣便 ℞ Chrysarobini		一英錢 (4.0)
伊打 Ætheris		酌用
醇酒 Alcoholis	a a q. s. ut ft. sol.	酌用
火棉酒 Collodii		二量兩 (60.0) —M.

製此方時、以齊瑣便一英錢、(4.0) 加伊打醇酒等分、至齊瑣便化盡、再

1 Psoriasis
2 Parasitic diseases of skin

常作貼膏之用、肌痺[1]氣管[2]久炎等、貼之有效。

巴根地楠貼膏 Emplastrum Picis, B. P.

堪阿大楠（PIX CANADENSIS） 此楠由堪阿大松樹而得、與巴根地楠同。

堪阿大楠貼膏（Emplastrum Picis Canadensis）

松楠 RESINA 此藥乃係烝松節油時所遺者、製貼膏或蠟抹膏、常用之、患氣管[3]久炎者、如燃而吸之或效、凍瘃[4]或燙傷[5]之輕者、有醫者曾以楠蠟抹膏敷之有效、如敷楠蠟雜抹膏、則有激效。

松楠抹膏 Unguentum Resinæ, B. P. 其用與楠蠟抹膏同。

安他婁便（ANTHRAROBIN） 此藥色黃、形如細粉、遇潮氣改其體質、水與酸類不能化、醇酒、與淡鹼水類、俱能化之、如化於醇酒內、可存七日之久、取用甚便、所成之消水、先則色棕、繼則色綠、後則色似青蓮、體質與齊瑣便相似、醫皮症之能、亦與之相似、各類癬症、如以十至二十分、加醇酒、或淡鹼水百分、製成消水、洗之有效、疥[6]斑[7]癬[8]瘡等症、有著名醫者、以此藥醫之、有醫者謂、此藥少有惹皮之力、與染皮之能、故較齊瑣便尤妙、且其染衣之患、亦不爲甚、稍加浣濯、即痕漬無遺也。

1 Muscular rheumatism
2 Chronic bronchitis
3 Bronchitis
4 Chilblains
5 Scalds
6 Psoriasis
7 Pityriasis versicolor
8 Herpes

粉三分、調勻敷之、可免其皮受傷、如欲製成貼膏、以芥末麥粉合勻、用熱水或醋調和、攤於布上、以敷患處、受此藥之惹力、其傷痊癒最遲、雖已痊癒、患處仍有紅色、稍觸即痛、其紅色或有永不退者、如燙傷甚重、宜以灰消水、與洋橄欖油各半、調勻敷之、若灰消水不便、僅敷洋橄欖油亦可。

藥製

芥油 Oleum Sinapis Volatile, 此油大有惹力、並有起皰之能、嗜酒而胃失功用者、服一量滴之四分之一至二分之一 (0.015-0.03) 有效。

芥紙 Charta Sinapis. 此紙有外惹內效之功、其惹力頗大、故貼之者、宜先以潮濕之細麻布、墊二二層、再貼此紙、方免起皰之患。

芥擦藥 Linimentum Sinapis, B. P. 此藥乃以芥油、蓖麻油、樟腦、酒等製成。

辣椒 CAPSICUM, U. S. CAPSICI FRUCTUS, B. P. 詳見本篇

松節油 OLEUM TEREBINTHINÆ, 詳見本篇

鋁化消水 AQUA AMMONIÆ, 詳見本篇

巴根地楠 PIX BURGUNDICA, B. P. 此楠由挪威之松樹而得、入身之熱度、能使之融化、故

洋斑蝥蠟膏 Ceratum Cantharidis, U. S.

此膏攤於布上、以爲生皰之用。

洋斑蝥火棉酒 Collodium Cantharidatum, U. S. Collodium Vesicans, B. P.

此酒爲生皰之用、乃最潔淨、然其被血所喊、較他製甚易。

洋斑蝥消水 Liquor Epispasticus, B. P.

此水專爲外惹內效之用。

煖貼膏 Emplastrum Calefaciens, B. P.

此膏畧有外惹內效之力、如不欲生皰者可用之。

洋斑蝥貼膏 Emplastrum Cantharidis, B. P.

洋斑蝥抹膏 Unguentum Cantharidis, B. P.

此膏亦爲生皰之用、用時宜先以醯水洗其處、後用粗布擦乾、令皮發紅、再後以醋擦之使濕、隨即敷藥。

白芥 SINAPIS ALBA, U. S. SINAPIS ALBÆ SEMINA, B. P

黑芥 SINAPIS NIGRA, U. S. SINAPIS NIGRÆ SEMINA, B. P

此二藥內含一類大有惹力之油、名芥油、Oleum Sinapis Volatile. 功效多在此油。

療效 此藥有外惹內效之功、常以醫腸胃脹之痙症、或腹與胸之新炎[1][2]、肌痺[3]、節炎[4]、系痛[5]等症、亦可用之、頭痛[6]、或顱腦積血[7]、敷於項上有效、如敷於皮上、過數分鐘、其皮有如燙傷之狀、故皮薄者、必用芥末麥粉各半、調勻敷之方可、如孩童用之、宜以此藥一分、麥

1 Colic
2 Acute inflammations of the abdominal and thoracic viscera
3 Muscular rheumatism
4 Inflamed joints
5 Neuralgia
6 Headache
7 Cerebral congestion

胱受阻、則可服之、有悸症與年邁之婦人、或咳或嚏或笑時、有遺[1]尿之患、雖係久症、此藥常有功效、莖[2]舉硬痛、服此酒半量滴、(0.03) 每日二三次或效、有著名醫者云、若因貪色太過、以致陽[3]痿者、以此酒五至八量滴、(0.3-0.5) 與鐵氯酒之足分劑、並馬前子等藥同服、或不至絕嗣、但此係過分劑、用者最宜謹愼、蓋此藥不幾及毒分劑、無激陰陽之效也、白[4]濁久症、與胱[5]底棚遺液等症、服之有效、皮科醫士、謂服此酒、有醫痔[6]癩[7]癬[8]瘙[9]癢等症之功、但所用之分劑、必使胃與腎不受其惹方可、此藥外惹內效之力最大、敷於皮上、必致生皰、而有祛積[10]液之功、故不用之以醫輕炎症、必重炎症方宜用之、並不可用之過多、恐其被陳惹腎、致有淋漓刺痛之虞、腎積血、或腎炎者、不宜用此藥以生皰、蓋此類之病、易受藥惹而中毒也、曾有醫者云、有人本無腎炎之病、敷此藥致患腎新炎重症、且致腦中尿毒、又有醫者云、用此藥之酒半量滴、(0.03) 加水四十量滴、(2.6) 敷燙[11]傷有效。

藥製與分劑

洋斑蝥酒 Tinctura Cantharidis, 半至五量滴 (0.03-0.3) 此藥中可爲服劑者、只有此酒。

1 Incontinence of urine
2 Chordee
3 Impotence
4 Gleet
5 Prostatorrhœa
6 Psoriasis
7 Eczema
8 Lichen
9 Prurigo
10 Effusions
11 Burns

第二十四章　論外惹內效藥類

洋斑蝥 CANTHARIS

此藥乃一類之蟲、產於西班牙義大利西西利島、俄羅斯等處、以俄羅斯所產者爲上品。

體功效　以此藥敷於皮上、先有惹力、後則生皰、如用之過多、則生皰必大、或致藥味作燒、腦部受激、服中分劑者、胃經覺煖、陰陽尿具畧受其激、而受感最重者、乃在腎經、服毒分劑者、腰甚作痛、胱與尿腊灼痛、陽莖強直、甚至胱急、腎炎、溺血、小便先則短少、後則閉塞、尿腊口亦大作痛、最重者、陽莖陰道、或有生瘍之患、且口渴思飲、育道發炎、若服吐劑、令之吐出、其蟲之翼蓋仍見、（若服此藥末則不然）

療效　此藥有服敷二用、可服者惟洋斑蝥酒、有激窒之效、若病者虛弱、以致經閉[1]、此爲妙劑、有醫者云、脫膚腎炎之中程、服此藥之小分劑頗效、然此論未確、如用之、恐其病加增、若腎[2]經虛弱之晚程、以致失其功用乃效、或病者用力稍過、增其尿胎之患、如每日三次、服此藥酒半量滴、(0.03)有效、若因嗜酒以致腎[3]脫膚久炎、且多失功用、其效尤妙、雖不能使之痊癒、亦能利小便、而使病勢減輕、腎總漏炎[4]、胱久炎[5]等症、服之均效、有醫者云、婦孺之胱[6]惹患、服此藥一量滴、(0.06)每日三次有效、倘胱發炎、則不宜用、如因

1 Amenorrhœa
2 Advanced stages of nephritis
3 Chronic parenchymatous nephritis
4 Pyelitis
5 Chronic cystitis
6 Irritability of bladder

藥製與分劑

金印草流膏 Fluidextractum Hydrastis, U. S. Extractum Hydrastis Liquidum, B. P. 五至三十量滴 (0.3-2.0)

金印草酒 Tinctura Hydrastis, 三十至一百二十量滴 (2.0-8.0)

金印草甘油 Glyceritum Hydrastis, U. S. 專爲敷泗膜之用。

金印草印 Hydrastina, U. S. 一厘之四分之一至二分之一 (0.015-0.03)

金印草印氯塩 Hydrastinæ Hydrochloras, U. S. 半至一厘 (0.03-0.06)

哥大林印 (COTARNINE) 此藥乃由鴉片之糟名拏哥汀者、用化法而得、體功效、與金印草印相似、經旺、[2]赤癆、[3]鼻衄等症、服之有效、常用者、乃哥大林印氯塩、分劑半至四厘、(0.03-0.24) 製之成丸、或置於藥壳內、日服三次有效、或以一至二厘、(0.06-0.12) 用空針射之、亦可。

1 Menorrhagia
2 Metrorrhagia
3 Epistaxis

道鬆弱之白帶[1]、鼻泗膜[2]久炎等症、此爲妙劑、或言金印草酒、有醫瘴症之功、但無確據、白濁[3]之晚程、或服或射、均爲妙品、射法、以雜金印草印五厘、(0.3)加水一量兩(30.0)射之、有著名醫者、醫白濁新症之良方如左。

金印草印氯塩	R-Hydrastin. hydrochloridi	五英厘 (0.3)
銀脭磬	Protargol.	五英厘 (0.3)
甘油	Glycerin.	三十量滴 (2.0)
烝水	Aquæ destillat.	加至一量兩 (30.0) —M.

先以溫水射之、後射此藥、日射四至六次、必令存至五或十分鐘之久、方能見效。

S.—Precede with a hot-water injection and use four to six times daily, telling the patient to retain it five to ten minutes each time.

婦人之白濁、或白帶[5]等症、以此藥一錢、(4.0)加滾水八量兩、(240.0)洗之有效、或以金印草流膏、半至一量錢、(2.0-4.0)加水一量磅(480.0)洗之、其效亦同。

1 Leucorrhœa
2 Chronic nasal catarrh
3 Gonorrhœa
4 Vaginal gonorrhœa
5 Leucorrhœa

麥奴印 (Ergotinum) 二至五厘 (0.12-0.3)

麥奴之力無常、因其原力無常、故宜用經試者、如欲試之、可灌有胎之獸類、視其有打胎之力否、抑或灌無胎之獸類、視其有縮小血脘之力否、如有力者、獸類食之日久、則血脘縮小、微血脘即不能運血、無力者、雖久食之、與血脘亦無損傷。

毒力 新毒 中毒之輕者、漸次而顯、或甚覺饑餓、或有時嘔吐、重則有頭痛、昏譫、發冷、坐卧不安等患。

積毒 中積毒者原分二類、一患肌抽搐、或瞕症、一患疥症。

金印草

HYDRASTIS, U. S.
HYDRASTIS RHIZOMA, B. P.

此藥乃產於北亞美利加之北、入藥者乃其根、內含二蘇、一名金印草印、一名畀耳畀林、惟金印草印、令人瘈瘲之力較大。

體功效 試以此藥灌於獸類、先則脊腦瘈瘲、後則全身被癱、若藥中多含金印草印、瘈瘲之患必重、如將金印草印、射於獸頸盂內、血壓先則減少、後則大增、且顯毒力、人服足分劑、於生命司所少有感能。

療效 腸胃泗膜久炎[1]者、服之有效、如因嗜酒所致、其效尤妙、因其有補胃之能、故瘴症後服之最宜、無論何處之泗膜、若失功用而虛弱者、即泗膜[2]癀症之中程、痦泗膜炎[3]、陰

1 Chronic gastro-intestinal catarrh
2 Catarrhal jaundice
3 Uterine catarrh

他類之積血者、亦效、如與毛地黃同服尤妙、痢[2]症如多帶血亦效、[3]盪瀉症或效、頭暈者、如頭與頭皮作痛、以此藥之流膏二十量滴、(1.3)鋅氯塩五至十厘、(0.3-0.6)日服三次、常效、[4]痞泗膜之下有筋瘤之患、此瘤常有流血者嘗有醫者、以此藥醫之、蓋服此藥、痞必縮小、瘤則少得血之養育、流血之患、亦漸次而止、其連瘤之筋、必致腐爛、而瘤則脫落矣、但其效甚緩、且大有疼痛之患、若瘤之大者、忌服、[5]血流痔症、其[6]小便長數者、[7]此藥或能醫之、如與鈉氯塩同服、其效尤妙。

藥製與分劑

麥奴流膏	Fluidextractum Ergotæ, U. S. Extractum Ergotæ Liquidum, B. P.	半至一量錢	(2.0-4.0)
麥奴膏	Extractum Ergotæ,	五至三十厘	(0.3-2.0)

此藥可作射皮之用、惟純麥奴爲最妙、然純者未入揀藥册。

麥奴葡酒	(Vinum Ergotæ,)	四至八量錢	(16.0-30.0)
麥奴冲藥	Infusum Ergotæ, B. P.	一至二量兩	(30.0-60.0)
麥奴射藥	Injectio Ergotæ Hypodermica, B. P.	三至十量滴	(0.2-0.6)
麥奴鍾沁酒	Tinctura Ergotæ Ammoniata, B. P.	半至一量錢	(2.0-4.0)

1 Hypostatic congestion
2 Dysentery
3 Serous diarrhœa
4 Vertigo
5 Uterine fibroids
6 Bleeding hemorrhoids
7 Diabetes insipidus

且此藥有激各類無志肌之能。

療效 此藥常於分娩時用之、以免產後癇[1]之患、用法、胎頭將過會陰時、以麥奴之流膏半至一量錢 (2.0-4.0) 服之、切不宜早服、恐有意外之虞、然服之者少、蓋產後癇乃罕見之事也、若娩婦易犯此症、則宜服之、如已有流血之勢、則用此膏一至二量錢 (4.0-8.0) 或服麥奴葡酒一量兩 (30.0) 越一刻鐘即效、其效可存半句鐘之久、以常理而論、將分娩時、此藥不宜用、然有時亦可用之、如分娩之先、並無他患、惟宮[2]漸次失其縮力、服加非或寇拉、或他類激藥俱無效者、則服此流膏五至二十量滴 (0.3-1.3) 之小分劑有效、蓋小分劑使宮之縮力、不至癈瘓、只使其縮力如常也、陰道狹窄者忌用、宮口尚未及舒展者、亦忌用、產後重癇[3]以純麥奴、或麥奴印、射於身之一處、最爲妙法、售純麥奴者、乃以此藥貯於玻璃管內、每管只敷一次所用之分劑、用時宜以空針由管內吸出射之、若分娩後、宮內有血塊、或胎膜留於其內、此藥忌用、恐致宮口縮緊、血塊胎膜不下、以致受毒也、產後宮不復原[4]、服此藥之中分劑有效、有醫者云、肺腎二經流血之患、服之大效、然非妙法、試專以肺言之、夫肺脈脘本無司絡腦所之系、若用此藥、血必多歸於肺血脘、是反增其流血之患也、鼻衄[5]、經旺[6]、癇等症、有效、病卧日久、以致肺有積[7]血、或

1 Post-partum hemorrhage
2 Uterine inertia
3 Severe postpartum hemorrhage
4 Subinvolution of the uterus
5 Epistaxis
6 Menorrhagia
7 Metrorrhagia

第二十三章　論縮宮藥類

麥奴 ERGOTA

此藥係黑麥上之菌絲羅、內含數精、依化學家所論、乃爲一夾雜藥、然所論者亦不一、如用此藥之一精、其力不似本藥之大、惟麥奴印一精、與本藥之力畧同、以其內含數精也、或言此藥之力、惟在其癍、名可納印、亦有言可納印非癍者。

體功效　腦部　此藥於腦部少有感能。

絡部　如以中分劑射於靜內、血壓先則減少、後則畧增、其減少者、因藥力至心、以致心經被阻也、其畧增者、因激司絡腦所也、如射過分劑、血壓則減而不增、司絡腦所漸次被癱、至心癱則殞命矣、服中分劑者、有增血壓之效、緣其能激心肌、與血脂之肌、使之縮小也、心經不受其阻者、因藥力不能驟至於心也。

第十六圖



此圖表明麥奴激脊腦中司宮所如A亦激宮肌如B

宮　常言此藥有激宮肌絲之力、服之者其宮縮小、此言雖確、然有未盡、近有醫者查明、亦有激司宮所（此所在腰處之脊腦間）之能、產婦服足分劑、宮則縮小、內有癲癇之勢、胎即被逼而下、如服微分劑、或只增其縮力、而無癲癇之勢、

療效 有以此油爲打胎之劑者、然其險甚大、且功效無常、亦有服毒分劑而無效者、嘗有醫者、以之爲祛風劑、近少用之、如因虛弱以致經旺[1]或癇症[2]此油有效、曾有醫者、以之爲祛蛔蟲藥、然不如他藥之穩妥、其分劑三至六量滴、(0.2-0.4)置於藥壳內服之。

炭阿西吞 (TANACETUM.)

此係一類之草、入藥者、乃其葉與嫩梢、內含一氣易散之油、名炭阿西吞油、(Oleum Tanaceti)分劑一至三量滴、(0.06-0.2.)有調經之功、亦有祛風之效、服毒分劑者、先有似癇之瘈瘲、後則昏迷、以至殞命、蓋因呼吸被阻耳。

芫荽油 APIOL

此油由洋芫荽而得、形如樟腦、因其易化、故常售者、乃以油七十五分、加醇酒二十五分、成爲流質、其體功效、尚未確知、然有法醫二人、謂服過分劑者、則耳鳴、頭痛、且有酒醉之狀。

療效 或以服此藥之過分劑、與貴林同、故謂其能醫癆症、但此言不確、後有醫者查明、其正用乃醫經閉、用法、自行經之前七日服起、日服三次、每服二至八量滴、(0.12-0.5)因其味不美、宜置於藥壳內服之、或言此藥無打胎之力、然常有私服此藥、自打其胎者。

1 Menorrhagia
2 Metrorrhagia

第二十二章 論調經藥類

鈸錳上鬱 POTASSII PERMANGANAS, 詳見本篇。

洋斑蝥 CANTHARIS, 詳見本篇。

沙芬 SABINA, U. S.

此乃一類長春矮木之梢、產於歐亞美三洲之北方、內含一氣易散之油、名沙芬油、Oleum Sabinæ, U. S. 若以此油敷於皮上、其惹力較松節油爲大、服毒分劑者、先則惡心嘔吐、育道發炎、靈性無覺、後則尿閉、遂至殞命、孕婦中此藥之毒、將死時、則必小產、而多流血、故不可以此藥打胎、因其險甚大也。

療效 經閉[1]症、如每三四句鐘、服此油五至十量滴、(0.3-0.6) 頗有激宕與卵腺之能、使多蓄血、以助其經、經旺[2]之患、服之或效、服法置於藥壳內、或製成勻藥最妙。

沙芬流膏 Fluidextractum Sabanæ, U. S. 分劑五至十量滴、(0.3-0.6)

芸香 (RUTA)

此藥係一類之草、內含一氣易散之油、名芸香油。

體功效 此油敷於皮上、乃有惹力、以至起皰、服過分劑者、有育道發炎之患、藉肺腎與皮而祛、故服之者、由痰尿汗中、可覺其味、如服毒分劑、必致嘔吐、腹痛、並有似癇之瘈瘲、然因此藥而殞命者甚鮮。

1 Amenorrhœa
2 Menorrhagia

鏑碳強礬 AMMONII CARBONAS, 此礬成塊、色白、透光、鏑沘之味極大、嘗之味辣、以熱至七十七度之水四分、能漸化藥一分、如置於過空氣處、則鏑沘之氣、與碳強洽漸失、亦不透光、後則體質變輕、或成細粉、如置於滾水內、則鏑沘氣、與碳強洽相分、滾之既久、必盡飛散、氣脘災症服之有效、如在初起時、或嬰孩與幼童患之、其效尤妙、單用、或與鏑氯塩兼服俱可、此藥爲激呼吸絡二部速而有力者、故割孩童之症、用迷蒙藥、此部受阻時、醫者每以此藥激之、分劑二至十厘、(0.12-0.6) 加非菡糖漿、以水送下、良方如左、

鏑碳強礬	℞-Ammonii carbonatis	四十八厘 (3.2)
非菡糖漿	Syrupi acaciæ	二量兩 (30.0)
烝水	Aquæ destillatæ	加至三量兩 (90.0) —M.

三四歲之孩童、每二句鐘服一小勺。(4.0) 白水送下、

S.—A teaspoonful every two hours in water for a child of three or four.

1 Bronchitis

豆蔻雜酒 Tincturæ cardamomi composit. 加至二量兩 (60.0) —M.

日服三次、每次一小勺 (4.0) 白水送下、 S.—Teaspoonful t. i. d. in water.

配此方時、必按所列之次序加藥方可、此藥雖有醫症之功、然因服之者多顯乖效、故著書者未嘗用之。

代濕尼 (DIONIN) 此藥乃以莫非用化法而得、色白、結晶、形如砂粒、其味畧苦、水七分、酵酒二分、糖漿二十分、皆能化藥一分、伊打、哥羅芳、俱不能化、此藥有服敷二用、其內服之用、如患肺病而久嗽[1]且肺內作痛者、服一厘之四分之一、至四分之三、(0.015-0.045) 有效、患胃瘍[3]或胃疽[4]腸疽[5]甚覺痛苦、如服莫非而嘔吐者、可服此藥以止其痛、失眠[6]者、服倍羅拳、或索弗拿、如兼服此藥、能增其睡效、肛痛之患、以此藥一厘、(0.06) 製成肛彈、射之有效、其外敷之用、常醫目疾、有時瞭生瘍[7]瞭體炎[8]睛簾葡萄炎[9]睞[10]眼等症、以此藥一至五分、加水百分、製成消水、每日滴於睜袋內、二至三次、有效、但初滴時大顯惹力、自覺灼痛、且睜顯腫狀、越二十分鐘、睜腫即消、灼痛亦止、但無痲效、如與寇卡印同敷、必兼有痲效矣、如敷至數次、惹力漸減、若隔日敷之、惹力必輕。

1 Cough
2 Pain in chest
3 Gastric ulcer
4 Gastric cancer
5 Cancer of bowel
6 Insomnia
7 Ulcer of cornea
8 Parenchymatous ketatitis
9 Iridocyclitis
10 Glaucoma

厘 (0.5-1.3) 置於藥壳內、或製丸服之俱可、日服二三次、如服之過勤、恐有惹胃之患。

賽阿寇 (THIOCOL) 此藥乃由怪阿寇、用化法而得、色白、形如細粉、鼻之無味、嘗之先覺畧苦、後則變甜、水易化之。可代怪阿寇、與幾阿蘇之用、氣脘久炎[1]或肺癆[2]症、服之有止嗽之功、宜日服三次、每次十至三十厘 (0.6-2.0) 其所擅長者、乃在藥味甚微、易於被味、且無惹胃之患、如服此散、或置於藥壳內均可。

布羅方 BROMOFORMUM, U. S. 此藥乃係布羅方九十九分、純酒一分、係無色之流質、別具一種氣息、嘗之味甘、醇酒易化、水畧化之、必不酸無色者、方入藥用、且宜貯於深黃瓶內、置於暗處、有阻絡部之能、而阻心之力無幾。

療效 此藥雖有迷蒙之能、而醫者不作藥藥之用、只用之以醫啼嗽[3]服分劑、一至五量滴、(0.12-0.3) 日服三次、並有良方如左。

布羅方	℞-Bromoformi	十六量滴 (1.0)
醇酒	Alcoholis	二量錢 (8.0)
甘油	Glycerini	十二量錢 (45.0)

1 Chronic bronchitis
2 Tuberculosis
3 Whooping-cough

萵苣糖漿 Syrupi lactucarii 二兩 (60.0)
透路糖漿 Syrupi tolutani 二兩 (30.0) —M.

日服三或四次、每服一至四量錢、 (8.0-16.0)
S.—One to two dessertspoonfuls three or four times a day.

又方

替耳品沘 R-Terpini hydrat. 四十英厘 (2.6)
安息香酸 Acidi benzoici 四十英厘 (2.6)
寇第印 Codeinæ 五英厘 (0.3)

製成二十丸、日服三四次、每次一丸。
Fiant pilulæ No. XX. S.—One pill three or four times a day.

近數年來、售藥者、多以此藥、與赫囉印、製成香酒類、用爲祛痰之劑、乾嗽不止者、亦能醫之。

替品那 (TERPINOL) 此藥乃以替耳品沘、加金酸類置於火上、煎之而成、其質似油、臭之味似玉簪花、水幾不能化、伊打、醇酒、俱易化之、功用與替耳品沘同、分劑八至二十

與伊替氯塩、哥羅芳、各等分相合、滴數滴於海絨上、置於病者之鼻前、吸其氣亦效、陰陽尿徑之久炎、有醫者以之代檀香油、或哥拜巴之用。

服法 以此藥五至十滴、(0.3-0.6) 置於藥壳內、或滴於白糖上、每三句鐘服一次、但有惹胃腎之力、亦有時令人瀉腹。

替耳品沁 TERPINI HYDRAS, U. S. 此藥乃將松節油、醇酒、氰强酸相合、以化法製成、結晶、無色、嘗之畧覺有味、嗅之則無、冷水二百五十分、或滾水三十二分、或醇酒十分、或伊打百分、或哥羅芳二百分、俱能化藥一分。

療效 此藥有激喉嚨氣腔等泗膜生液之能、延纏之氣腔炎或久炎、有祛痰之效、草泗災症、必用足分劑方效、宜日服三次、每服十五至二十厘、(1.0-1.3) 置於藥壳內、或成丸服之、按此藥之用無多、但醫以上二症、乃歸上品、常用之分劑、二至三厘、(0.12-0.2) 並有良方如左。

替耳品沁 ℞-Terpini hydrat 七十五英厘 5.0,

伯蘭地 Spirit. vini gallici 二量兩 (60.0)

1 Genito-urinary inflammations
2 Subacute or chronic bronchitis
3 Hay fever

之故、乃因呼吸部被阻也。

辛伊加 SENEGA, U. S. SENEGÆ RADIX, B. P. 此藥乃一類草根、產於美國。

療效 延[1]纏之氣管炎或久炎、此藥有激氣管使痰易出之力、心腎二經有症、兼患痰腫、有醫者用之爲利小便之劑、究之此藥阻心之力過大、無論心經患何病症、皆不宜用、其正用乃醫氣管久炎、然必與他類祛痰藥兼服、方可。

藥製與分劑

辛伊加糖漿	Syrupus Senegæ, U. S.	一至二量錢 (4.0-8.0)
辛伊加流膏	Fluidextractum Senegæ, U. S.	十至二十量滴 (0.6-1.3)
辛伊加酒	Tinctura Senegæ, B. P	一至二量錢 (4.0-8.0)
辛伊加冲藥	Infusum Senegæ, B. P.	一至二量兩 (30.0-60.0)
辛伊加濃消水	Liquor Senegæ Concentratus, B. P.	半至一量錢 (2.0-4.0)

替利賓 TEREBENUM, 此藥乃以硫強酸與松節油相合、烝之而得、爲無色之流質、水不能調和、臭之其味若松、

療效 氣管新炎晚程或氣管久炎[2]、此藥能化氣管內之稠痰、或服或熏俱效、若以此藥、

1 Subacute and chronic bronchitis
2 Late stages of acute, or chronic bronchitis

血根 SANGUINARIA, U. S. 此藥係一類草根、最要者、乃其所含之質、名血根印、入藥以來、醫者習用之醫數類病症、但不爲上品、蓋其益不敵所損也。

療效 氣脘久炎、乃係此藥專醫之症、昔日醫者、習用之作吐藥、以醫瘧吼、因其惹力與阻力過大、故止而不用、有著名醫者、謂人患腸胃泗膜炎、而兼有癆症者、此藥有激肝之功。

藥製與分劑

血根流膏 Fluidextractum Sanguinariæ, U. S. 一至五量滴、(0.06-0.3) 爲祛痰之劑、十至三十量滴、(0.6-2.0) 爲嘔吐之劑、如作吐劑而不見效、不可聽其存於胃內、必須用他類吐藥吐之、或用胃抽器抽之方可、以其毒力過大也。

血根酒 Tinctura Sanguinariæ, U. S. 二十至三十量滴、(1.3-2.0) 爲祛痰之劑、一至三量錢、(4.0-12.0) 爲嘔吐之劑。

血根醋 Acetum Sanguinariæ, U. S. 十至三十量滴、(0.6-2.0) 爲祛痰之劑、二至四量錢、(8.0-16.0) 爲嘔吐之劑。

毒力 服毒分劑、初則嘔瀉、流涎、後有似痙之痿瘓、絡部大受其阻、其殞命也、非因以上

松濘 Picis liquidæ 六英錢 (24.0)
綠鹼 Saponis viridis 二英兩 (60.0)
猪脂 Adipis 二英兩 (60.0)
鋅碳酸鹽散 Pulveris cretæ 四英錢 (16.0) —M.

如皮易受惹、可多加猪脂、惟孩童之乾癩無效、乾癩之良方如左。

松濘 ℞-Picis liquidæ 半英錢 (2.0)
澱硫 Sulphuris præcipitati 半英錢 (2.0)
鉛羹抹膏 Unguenti zinci oxidi 一英兩 (30.0) —M.
早晚敷於患處。 S.—Apply night and morning.

松濘藥類、面上忌敷、因其有染皮之力也。

阿摩特 AMMONIACUM, B. P. 此藥乃一類樹膠、近少用之、氣腦[1]久炎、如不作燒服之有效、分劑十、至三十厘、(0.6-2.0) 成丸服之。

阿摩特調水 Mistura Ammoniaci, B. P. 氣腦久炎、服之有效、分劑半量兩。(16.0)

1 Chronic bronchitis

存貯瓶內、隔數句鐘搖動一次、七日後置於濾筒濾之、每服二一量兩。(60.0)

氣腔久炎、歐洲各國常以松澁消水醫之、其製法、乃以松澁一分、水四分、貯於瓶內、每數句鐘搖動之、俟至二十四句鐘、傾出過濾、每日勻服一至二一量磅、(500.0-1000.0) 初服則吐痰必多、後則漸少。

藥製與分劑

松澁糖漿 Syrupus Picis Liquidæ, U. S. 此乃以松澁消水、加白糖而成。

松澁葡酒 (Vinum Picis) 一至四量兩、(30.0-120.0) 功用與此藥之糖漿或消水同、其製法、乃以松澁一量磅、(500.0) 甘油、白葡酒、蜂蜜、各半量磅、(250.0) 淡醋酸一量兩、(30.0) 滾水六量磅、(3000.0) 貯於瓶內、以熱水燉之、不時搖動、其熱不使過一百六十度、約過數句鐘、提出其瓶、置於他處、二三日後、過濾數次、即成。

外用 疥[1]症、以松澁抹膏、Unguentum Picis Liquidæ, 敷患處、有效、並有良方如左。

澱硫 B-Sulphuris præcipitati 六英錢 (24.0)

1 Psoriasis

症、有醫者用之、謂有大效。

藥製與分劑

龍骨草流膏 (Fluidextractum Euphorbiæ Piluliferæ) 三十至六十量滴 (2.0-4.0)

龍骨草煮藥 (Decoctum Euphorbiæ) 二量兩 (60.0) 此煮藥之製法、試畧言之、以此草乾葉一撮、加水四量磅、(2000.0) 置於火上煮之、至三量磅 (1500.0) 爲止。

松澁 PIX LIQUIDA, 此藥乃以松樹、用乾烝法而得、色黑如油、水畧能化之、醇酒、油類、鋹洝消水、鈉洝消水、俱易化之、如將此藥烝之、可得澁油、Oleum Picis Liquidæ, U. S. 有醫者以此油、加淡油類、用噴霧具以噴氣脘炎症、或置此油於滾水內、以吸其氣亦可、然不爲妙劑、[2]延纏之氣脘炎或氣脘久炎、以此藥製成二厘 (0.12) 之丸、服之有效、[3]腸胃泗膜炎亦效、有名醫治[4]久瀉之良方如左。

℞-Liquoris calcis 灰消水 八量磅 (40000.0)

Picis liquidæ 松澁 一量磅 (500.0)

Pulv. pruni virginianæ 洋郁李皮散 一英兩 (30.0) —M.

1 Bronchitis
2 Subacute and chronic bronchitis
3 Gastro-intestinal catarrh
4 Chronic diarrhœa

蒜 (ALLIUM) 此藥內含一氣易散之油、能激胃泌膜、使多生液、故有助消化之功、傷風不止、[1]致氣脘常炎者、可以蒜搗爛、敷於胸前有效、如皮膚受惹、不易忍受、可攙麪一半、製成糊藥敷之、嬰孩之痙攣、[2]無論因大腦或脊腦之故、可以此糊藥敷於脊背、或足心有效、腸胃泌膜炎者、[3]糊於腹上有效、如內加數類香料、其效尤妙、孩童延纏之傷風、[4]可加於牛乳內、以火沸之、每數句鐘服少許有效、或以蒜油製成勻藥、服之亦可、此油之分劑、一至二量滴、(0.06-0.1) 孩童傷風新症、作燒時不宜服、因其激力過大也、有醫者以蒜汁二至五量滴、(0.1-0.3) 醫嘔[5]吐之患有效。

蒜糖漿 (Syrupus Allii) 孩童之分劑一量錢、(4.0) 成人之分劑四量錢、(16.0)

海葱 SCILLA, 詳見本篇。

龍骨草 (EUPHORBIA PILULIFERA) 此藥係一類之草、產於奧司大利亞、與西印度海島。

體功效 試使獸類食毒分劑、呼吸與絡部、大受其阻、以至殞命、於他部則少顯感能、服足分劑、有時胃經受惹。

療效 此草所以入藥者、乃爲醫療症之用、經用者、謂以此藥醫此症、功效如神、究之其功效最顯者、人尚未知係何類瘵症、亦未知此藥何以有此能也、氣脘久炎、與氣脹[6]等

1 Persistent cold
2 Convulsions of infants
3 Gastro-intestinal catarrh
4 Colds
5 Vomiting
6 Asthma
7 Chronic bronchitis
8 Emphysema

體功效　此藥之體功效、人未詳察、惟吸最大之分劑、則有迷蒙之效。

療效　氣[1]脘新炎、或久[2]炎症、常以此藥醫之、且因其中含有氯質、不但有醫症之效、亦有改症之能、如氣脘泗膜發炎、吸此藥則痰不致稠粘、而氣脘亦不致脹大、由是醫者、於痿[3]症、或因痿而氣[4]脹者、以爲大有醫之之功、亦有醫者謂、肺炎症、此藥有效、惟至晚程之時、最爲合宜、然此等功效、著書者實未見之也。

用法　以此藥十至二十量滴、(0.6-1.3) 置於布上吸之、或病者自執藥瓶、藉手之熱度、以散其氣、鼻之亦可。

膠草 GRINDELIA, U. S.

此草產於美國、內含一柄一蠟、並一氣易散之油。

體功效　無論人與禽獸、服中分劑、無甚功效、過分劑、先則覺系之末、與脊腦覺所被癱、後則動所與其系亦癱、以其能激顱臟腑系、故脉覺遲緩、能激司絡腦所、故血壓加增。

療效　痿[5]症服之神效、氣[6]脘炎之晚程亦效、用法、服膠草流膏 Fluidextractum Grindeliæ U. S. 二十至六十量滴、(1.3-4.0) 或以此草之葉浸於鋏氰强礬消水內、俟乾、製成煙捲、或置於盤內燃之、以吸其氣、俱效、胱[7]炎久症、服之有激胱之效、中[8]漆毒而皮炎者、如將此草之流膏、加水十倍、敷之有效。

1 Acute bronchitis
2 Chronic bronchitis
3 Asthma
4 Emphysema
5 Asthma
6 Bronchitis
7 Cystitis
8 Ivy poisoning

氣、惟此最爲妙法、氣腔[1]久炎、或臭肺[2]炎症、此法有效、昔有醫者、以此鹽醫瘴症、近少用之、亦有名醫以此鹽醫卵腺系[3]痛、又有以之醫肝[4]經久失功用、或肝[5]炎中程、[6]肝變硬、肝癰等症者、孩童腸[8]胃泗膜久炎、此爲妙劑、並有良方如左。

鹽氯鹽	R-Ammonii chloridi	四十八英厘 (3.2)
甘草流膏	Fluidextracti glycyrrhizæ, U. S. Extracti glycyrrhizæ liquidi, B. P.	一量兩 (30.0)
烝水	Aquæ destillatæ	三量兩 (90.0) —M.

三至四歲之孩童、日服三次、每飯後服一小勺。

S—Teaspoonful every two hours in water for a child of three or four years.

製丸服之亦可、必當多用水、或牛乳送下、方免惹胃之患、有醫者云、[9]胃內多存酸液、失功用而作痛者、於飯前半句鐘服十厘、(0.6)最妙、[10]中漆毒而皮炎者、以此鹽一兩、(30.0)加水二量磅、(1000.0)洗之有效。

燼氣塩 (AETHYLIS IODIDUM)

此藥乃無色之流質、火不能燃、其氣易散、畧有辣味、人多嫌其味不美、然不多嗅、則無惹力、其體質見光即改、故宜貯於黑色瓶內、置於暗處。

1 Chronic bronchitis
2 Fetid bronchitis
3 Ovarian neuralgia
4 Chronic torpor of the liver
5 Subacute hepatitis
6 Hepatic cirrhosis
7 Hepatic abscess
8 Intestinal catarrh
9 Hyperacidity of stomach
10 Varnish poisoning

第二十一章 論祛痰藥類

路卑利 LOBELIA, 詳見本篇

銨鈸菓礬 ANTIMONII ET POTASSII TARTRAS, U. S. ANTIMONIUM TARTARATUM, B P 詳見本篇

衣必格 IPECACUANHA, U. S. IPECACUANHÆ RADIX, B. P. 詳見本篇

鈸檸礬 POTASSII CITRAS, 詳見本篇

阿甫莫非氯塩 APOMORPHINÆ HYDROCHLORIDUM, 詳見阿甫莫非篇。

錏氯塩 AMMONII CHLORIDUM, 此塩之功用、與他錏類之塩礬迥異、絡部與呼吸部、不受其感、惟激泗膜生液之力甚大、其氣能醫氣[1]脘炎症、製此氣有數法、一 以此塩數厘、置於鐵勺內、以燈火烤之、其氣即生、可令病者吸之、二 用三玻璃瓶、一貯濃錏沘消水、一貯氫氯酸、一貯清水半瓶、以玻璃管、將二藥瓶、與清水瓶相連、令二瓶之氣入於清水內洗淨、則成錏氯塩氣、可令病者以玻璃管吸之、三 以大盤盛硫强酸四兩、(120.0) 以小盤盛濃錏沘消水二兩、(60.0 以鈉氯塩一錢、(4.0) 置於硫强酸之盤內、過一分鐘、則錏氯塩之氣、彌滿屋內、此氣一過、再加鈉氯塩、其氣仍生、可令病者吸之、如欲常用此

1 Bronchitis

披路加便氣強鬱 Pilocarpinæ Nitras, B. P. 一厘之八分之一、至二分之一、(0.008-0.03)不符之藥 阿刀便茴精、俱爲本藥之敵藥。

乖效 服此藥者、或有目視迷離、嘔吐、腦力脫失、涎腺與喉門棚腫、呃逆等患、如解嘔吐之患、莫非爲妙、有醫者云、常服此藥者、其髮則黑而粗。

燄氣弱浮酒 SPIRITIS ÆTHERIS NITROSI, 詳見本篇。

鋅醋鬱消水 LIQUOR AMMONII ACETATIS, 此消水有改酸之功、亦畧有發表之效、其力遜於燄氣弱浮酒、分劑、一至二量錢。(4.0-8.0)

衣必格鴉片散 PULVIS IPECACUANHÆ ET OPII, U. S. PULVIS IPECACUANHÆ COMPOSITUS, B. P. 此藥乃以鴉片一分、衣必格一分、乳糖八分製成、昔爲表藥類中之最要者、近多以乍波蘭的代之、分劑五至十五厘。(0.3-1.0)

乍波蘭的流膏 ℞- Fluidextracti pilocarpi, U. S. Extracti jaborandi liquidi, B. P. 一量錢 (4.0)

辣椒酒 Tincturæ capsici 一量兩 (30.0)

洋斑蝥酒 Tincturæ cantharidis 半量錢 (2.0)

蓖麻油 Olei ricini 一量錢 (4.0)

醇酒 Alcoholis 四量兩 (120.0) —M.

每早晚敷無髮處、以手搓之。

S.—Apply with friction in spots to the scalp, night and morning.

藥製與分劑

乍波蘭的葉散 (Pulvis Pilocarpi Foliæ) 四十厘 (2.6) 製成冲藥服之。

乍波蘭的流膏 Fluidextractum pilocarpi, U. S. Extractum jaborandi liquidum, B. P. 十至四十量滴 (0.6-2.6)

披路加便 Pilocarpina 常用者乃披路加便氳塩。 Pilocarpinæ Hydrochloridum, U. S. 射分劑、一厘之八分之一、至二分之一、(0.008-0.03) 服分劑、一厘之四分之一、至二分之一、(0.015-0.03) 因服之少有嘔吐之患、故較乍波蘭的尤妙。

乍波蘭的酒 Tinctura Jaborandi, B. P. 二至四量錢 (8.0-16.0)

阻力過大、恐其益不抵所損也、然用一厘之三十分之一、至二十分之一、(0.002-0.003)之小分劑、有激腎之功、虛弱者、夜間生汗不止、用阿刀便無效、可以此擬一厘之二十分之一、(0.003)於汗前二句鐘、或射或服常效、因能激虛弱汗腺、使之復原也、癆症初患時、有數著名醫者謂、每三句鐘射此擬一厘之六分之一、(0.01)至全身生汗爲止、後每四或六句鐘射一次、不但有醫症之能、並有防症之力、然射時必服酒或士的年、方免心經受阻之患、中耳久症而眩暈者、最妙之醫法、以此擬射於身之一處、每數日一次、必至口中多生涎沫、始能見效、射藥後、當令病者躺卧片時方可、頭禿者、敷此藥則有生髮之能、但不可過多、恐髮囊之際、致生膿皰也、良方如左。

乍波蘭的流膏 ℞ Fluidextracti pilocarpi, U. S.
Extracti jaborandi liquidi, B. P. 一量兩 (30.C)

洋斑蝥酒 Tincturae cantharidis 半量兩 (16.0)

皂擦藥 Linimenti saponis 二量兩半 (45.0) M.

每早晚敷無髮處、又有良方如左。

1 Profuse sweating
2 Erysipelas
3 Aural vertigo
4 Baldness

之能減其燒、因其大有阻力、故熱症不宜用、胸統膜[1]炎而有積液者、有醫者曾用此藥醫之、然不如用洋苦瓜汁或鎂硫强馨、加水少許服之、更不如用胸針放其所積之液、尤爲最妙之法、有二著名醫者云、以此藥之瘋、醫眼膜[2]之患、每日以一厘之十二分之一、至十分之一、(0.005-0.006)用空針射於皮內甚效、服此藥之流膏亦可、但難免惡心之患、且因病者不宜受發表之力、故必用小分劑、如以瘋滴於目內、有縮瞳之功、故各類眼球發脹之患有效、醫者每以代厄司連之用、如用之縮瞳、可以披路加便一至四厘、(0.06-0.25)加水一量兩、(30.0)每句鐘滴一或二滴於眼內、至見效爲止、過用目力而作痛者、以此瘋一厘之十分之一、(0.006)加水一量兩、(30.0)滴於目內、日用三次、每次數滴有效、製此藥時、宜加硼强酸四厘、(0.25)則免其生菌、[3]蔘酒之矇症、用此瘋之小分劑有效、腸泗膜發炎、致患癆症者、如每二日射此瘋一厘之六分之一、(0.01)過二十日爲止、常效、[5]腎炎致腦中毒者、此瘋乃爲妙劑、患腎[6]炎症者服之、其效不一、一令人生汗、則皮可代腎之功用、二尿毒多藉汗而祛、三因其有減血壓之力、故腎炎減輕、但宜謹慎用之、如心經虛弱、宜兼服酒與士的年、以免阻心之虞、多有醫者云、四旬以上者、若患腎炎、兼有心症、此藥忌用、腎球絡蟠久炎症、亦忌用、產瘓癎症、此藥爲常用之品、但其

1 Pleurisy
2 Opacities of the vitreous humor
3 Tobacco and alcoholic amblyopia
4 Jaundice
5 Uræmic poisoning
6 Bright's disease

第五十五圖



此圖表明用披路加便如何增血壓之力與用阿刀便如何增血壓之力

第一段係未射披路加便之先血壓之至數爲一百二十六

第二段係已射披路加便之後血壓之至數爲九十六

第三段仍射披路加便其至數減至七十

第四段係射阿刀便其至數增至一百四十五

效、若心經之疿腫、因其阻力過大、故不甚妙、嘗有服之立即殞命者、[2]瘴症將發冷時、服祛尿腥基。

眼　此藥於睛簾內能激動眼系之末、故有縮瞳之力。

液　服此藥者、或生汗一量磅、先則含酸、後則如常、再後含鹼、且能激胃、口、目、皮、腎、使多生液、亦能激乳腺使多生乳。

療效　腎經之疿腫、[1]服此藥或其癟有

1 Dropsy
2 Malarial fever

第二十章 論發表藥類

乍波蘭的 PILOCARPUS, U. S. JABORANDI FOLIA, B. P.

此乃一類樹葉、產於南亞美利加、內含二鹼、一名披路加便、體質柔軟、製而成鬱則結晶、一名伊搜披路加便。

體功效 健壯者服此藥之足分劑、面色發紅、後則生汗、不久全身淋漓不止、或口中涎液流溢於外、過二至五句鐘、其汗方止、且服此藥常令人惡心、有在汗時或汗後、嘔吐甚重者、亦有不易受其發表之力者、有著名醫者云、或有孩童服此藥至六十厘、(4.0) 其效始顯、亦有服過大之分劑、而無發表之效者。詳見服藥癖忌篇

腦部 人服中分劑、與此部少有感能。

絡部 人服足分劑、有阻此部之力、若以中分劑灌於禽獸、其脉必遲、血壓必減、見第五十五圖

若人服之、其脉不遲而反速、或每分鐘多至四五十次、但其力微小耳。

胃經 此藥有惹胃之力、亦有時令人惡心、或甚重之嘔吐。

身熱度 此藥有減身熱之能、服之者、先或少增其熱度、後則大爲減少、或因徵腊鬆大、而生汗過多之故。

腎經 此藥之大分劑、能令人生汗、而小便減少、小分劑、有激腎之功、故服之者、則多

大有利小便之能、不但在人如此、獸類亦然、歐美各國之醫者、亦多謂其有此能、但亦有用之而無效者、腎久炎症、服之亦少見效、因腎祛膚之功用已失大半、故此藥之功效不顯也、然服之亦無損傷、有醫者謂各類痰症、無論由腎由心而致、服之俱效、雖小便不見通利、仍可服之、惟腎新炎者忌用、以此類症宜用平腎之藥、不可用惹腎之劑也、此藥所含之揸古律印無多、故必用一或二錢 (4.0-8.0) 之大分劑、分置於數藥壳內、日服一次、或以熱水送下亦可、因其味不美、究不若置於藥壳內爲妙、按此藥著書者雖曾用之、而功效不顯、因爲醫家所重、故不得不論及之。

1 Dropsy

哥拜巴塊 Massa Copaibæ, U. S. 此藥乃鎂劈與該藥調和、製之成塊、服時拈之成丸、然此法不爲甚妙。

洋斑蝥 CANTHARIS

詳見本篇

堪阿大麻 APOCYNUM, U. S.

此藥產於美國、由堪阿大至弗羅耳達皆有之、入藥者乃此麻之根、常有以他類之麻、誤認爲此麻者、醫者宜多留意、如用此麻無效、宜另購一鋪者可也、服此藥之過分劑、則有嘔瀉、與胃道受惹之患、惟尋常之分劑、則少顯乖效、如因心經或腎經有病以致痰患者、服此藥之酒五至二十量滴、(0.3-1.3) 或流膏一至五量滴 (0.06-0.3) 有效、服後則小便必多、痰患即退矣、因其奏效甚速、與用套針祛痰相似、故醫者以植物套針名之、有醫者查其體功效、於心經有何關係、則見脉力遲緩、血壓加增、故知其力與毛地黃相似。

代猶嘯忝 (SODIO-THEOBROMINE SALICYLATE, OR DIURETIN)

此藥乃以鈉柳强鬱、與揸古律印、用化法製成、遇空氣即改其體質、因其內含揸古律印、故有利小便之能、按揸古律印係結晶之塊類、其味覺苦、其氣易散、體功效與加非印同、惟不易消化、必用化法使與鈉柳鬱相合、變成易化之鬱方可、西歷一千八百八十九年、有著名醫者、查明揸古律印、

1 Cardiac or renal dropsy

療效　此藥之大用、乃激陰陽尿徑之泌膜、[1]白濁之晚程、泌膜受阻、此藥有效、[2]尿腔久炎、[3]延纏之氣腔炎、服此藥有祛痰之效、[4]腎總漏炎、[5]胱炎、[6]肛炎等之中程、有效、如因腎久炎、以致痞腫[7]者、服之有激腎而利小便之功。

藥製與分劑

哥拜巴	B-Oleoresinæ copaibæ	一量錢	(4.0)
畢澄茄脂楠	Oleoresinæ cubebæ	二十量滴	(1.3)
鐵鍾檸檬	Ferri et ammonii citratis	二十英厘	(1.3) —M.

置於十藥壳內、日服三次、每餐後服一壳。
Pone in capsulas No. X. S.— One t. i. d. after meals.

哥拜巴　Copaibæ,　五至二十量滴、(0.3-1.3)　置於藥壳內、或製成勻藥、服之俱可。

哥拜巴油　Oleum Copaibæ,　十至二十量滴、(0.6-1.3)　置於藥壳內、日服二至四次、滴於白糖上服之亦可。

1 Gonorrhœa
2 Chronic urethritis
3 Subacute bronchitis
4 Pyelitis
5 Cystitis
6 Dysentery
7 Dropsy

水 Aquæ 十量兩 (300.0) —M.

S.—To be injected as an enema for the relief of tympanites and to aid in the removal of hardened feces. Stir thoroughly before using.

射時宜搖動其瓶、以免沉澱、有醫氣臟之效、且有利大便乾燥之功。

又有射肛藥類、乃以阿魏勻藥六量兩、(180.0) 加松節油一至二量錢、(4.0-8.0) 調勻射之。

松節油擦藥 Linimentum Terebinthinæ, 節扭[1]與節腫[2]之患、常以此藥擦之、有外惹內效之功、患錢癬[3]者、以此藥敷之、有效。

松節油抹膏 (Unguentum Terebinthinæ) 此膏有外惹內效之功、並有激力。

松節油醋擦藥 Linimentum Terebinthinæ Aceticum, B. P.

哥拜巴 COPAIBA, 此藥乃一類樹之脂楠、產於巴西、色淺黃、似油、別具一種氣息、內含一油類、名哥拜巴油、Oleum Copaibæ, 其用無甚緊要。

祛 此藥由腎而祛、服時如以氰强酸試溺之法試之、則有含脂之勢、或亦有生團癥者、然止而不服、其患即瘉。

1 Sprains
2 Enlarged joints
3 Ringworm

松節油勻藥 Emulsum Olei Terebinthinæ, U. S.

℞-Olei terebinthinæ 一量錢 (4.0)
Olei amygdal. expres. 半量兩 (16.0)
Tinctura opii 二量錢 (8.0)
Mucil. acaciæ 五量錢 (20.0)
Aquæ laurocerasi 半量兩 (16.0) —M.

每四句鐘宜服一量錢 (4.0) 腸熱症之氣臌者忌用。

S.—A teaspoonful every four hours for tympanites.

半至二量錢 (2.0-8.0) 又有良方如左。

射肛藥類良方如左。

松節油	℞-Olei terebinthinæ	一量兩 (30.0)
洋橄欖油	Olei olivæ	一量兩半 (45.0)
樟腦	Camphoræ	二十英厘 (1.3)
非菡漿	Mucil. acaciæ	半量兩 (16.0)

乾、當熱時敷之、至病者不能忍受、則即揭去、恐有生皰之患也、成人或孩童之氣腦炎[1]、以此油與洋橄欖油等分、或以此油一分、加洋橄欖油二分半、搓其胸前有效、低熱症[2]、服之可爲激力之藥、如病者有腸胃氣脹[3]或腸瘍[4]等患、其效尤妙、腸熱症[5]之氣臌、最妙之法、乃服此油、或熱襟敷於腹上、或用之製成射肛藥射之、俱效、腸熱症者、至第十四五日、其舌紅而乾、甚至破裂、且牙滿穢物、並有氣臌者、以此油製成勻藥、日服三次、每服五至十量滴、(0.3-0.6)有效、腸熱症至漸愈時、因腸集棚未愈、致常有反復、與瀉腹之患、此爲最妙之劑、便血[6]、溺血[7]、經旺[8]等患、此油常效、患帶虫[9](俗名寸白虫)者、如以此油半至一量兩、(15.0-30.0)與蕁麻油一量兩(30.0)兼服有效、然不爲無險、因其大有惹腎之力也、腎[10]久炎之晚程、有時須用利小便藥之大有力者、否則必致尿閉、服此油或效、若腎炎之初程、則不宜用、恐有尿閉之虞、正與腎久炎之晚程相反也、育道新炎、亦不宜用、腰[11]痺、或言服二量滴(0.12)有效、氣腦[12]久炎、以此油置於滾水內、吸之有效、白濁[13]久症、與瘀[14]斑重症、服之皆效、腸胃氣脹症、可以此油五量滴、(0.3)滴於白糖上服之、或製成勻藥類服之亦可。

藥製與分劑

1 Bronchitis
2 Exhausting fevers
3 Flatulence
4 Ulceration of the bowel
5 Typhoid fever
6 Intestinal hemorrhage
7 Hæmaturia
8 Menorrhagia
9 Tape-worm
10 Chronic Bright's disease
11 Lumbago
12 Bronchitis
13 Gleet
14 Purpura hæmorrhagica

療效　此藥有激泗膜復原之功、故醫者常用之以醫白濁[1]久症、[2]久炎症、有補其泗膜之效、氣胞炎症[3]、久不見愈、且痰凝結、不易吐出者、服之有效、有醫者云、氣胞泗膜炎之痙症、服之最妙、痒症後而嗽不止者、亦效、分劑五至二十量滴、(0.3-1.3)宜置於藥壳內服之、常用之分劑、乃五量滴、(0.3)或有惹胃之力、但較哥拜把畢澄茄之惹力爲小。

松節油　OLEUM TEREBINTHINÆ,　**堪阿大脂精**　TEREBINTHINA CANIDENSIS,　此油乃由松樹而得、入藥者係烝過二次、名煉松節油。Oleum Terebinthinæ Rectificatum, U. S.　別具一種氣息、清而無色、最易燃燒、故宜遠避燈火、如加於濃硷酸類之內、必致燃著、若敷於皮或泗膜上、則有惹力。

體功效　服此藥者、胃與皮膚覺煖、脉與呼吸畧速、過分劑、或有醉人之力、畧有增血壓之能、其脉亦速、服過大之分劑、先則覺系受阻、後則動系亦然、因其由肺腎而祛、故服之者尿內必含香味、毒分劑、令人有尿血、腎炎、瞳散、皮紫、育道發炎等患、有此藥癖忌者、無論服敷、或有癜癗皰瘡等患。

療效　如某處自內有發炎[6]之狀、以熱袱敷之、有外惹內效之功、製熱袱之法、以藥置於盂內、置盂於熱水內、蓋恐其近火燃著也、先以絨布蘸於熱水內擰乾、再蘸於藥內擰

1 Chronic Gonorrhœa
2 Chronic Cystitis
3 Bronchitis
4 Asthma
5 Excessive cough
6 Inflammation

杜松雜浮酒 Spiritus Juniperi Compositus, U. S. 一至四量錢、(4.0-16.0) 此以杜松大茴、小茴等藥之油、並醇酒、與水等製成。

荷蘭酒 (Gin) 詳見醇酒篇。

杜松冲藥 (Infusum Juniperi) 以杜松子一兩、(30.0) 加滾水一量磅、(480.0) 置於煖處、一句鐘之久、一日均服、若醫痞[1]腫症、宜加鈹醋鬱、或鈹氣菓鬱一兩、(30.0)

杜松浮酒 Spiritus Juniperi, 半至一量錢 (2.0-4.0)

杜松油 Oleum Juniperi, 半至三量滴 (0.03-0.2)

以利準油 OLEUM ERIGERONTIS, U. S. 此藥係黃色之油、其氣易散、由堪阿大一類草、烝之而得、嘗之似松節油、猖微流血症、服之最妙、鼻衄[3]、或他等輕流血之患亦效、白濁[4]之晚程、此藥可代哥拜把、或畢澄茄之用。

服法 滴於白糖上、或置於藥壳內、飯後服之最妙、分劑十至三十量滴。(0.6-2.0)

檀香油 OLEUM SANTALI 此油乃由印度一種樹而得、味辣、氣香、有用爲香料者、若服過分劑、陰陽尿徑甚受其惹。

1 Dropsy
2 Uterine oozing
3 Epistaxis
4 Gonorrhœa

服之有效、且有補胃之功、疥腫症、如胃失功用而厭食者、醫者常以此藥治之、亦畧有改症之效、故素有癆症[2]而患皮瘍者、或謂服之有效。

藥製與分劑

愛冬冲藥 (Decoctum Chimaphilæ,) 一至二量兩 (30.0-90.0)

愛冬流膏 Fluidextractum Chimaphilæ, U. S. 半至一量錢 (2.0-4.0)

杜松 JUNIPERUS, U. S. 此乃一類松子、產於歐美二洲、北方寒冷之地、內含一氣易散之油、名杜松油、Oleum Juniperi, U. S. Juniperi Oleum, B. P. 亦含一無定形之晶、名杜松精。

體功效 此藥有激胃補胃之功、如與酒同服、畧有發表之力、且頗有利小便之能、由腎而祛。

療效 陰陽尿徑之泗膜被阻、如腎[3]總漏炎、腎炎[4]、胱炎[5]等久症、服此藥有效、腎[6]經積血、如因絡部虛弱而致、非因腎新炎所起者、服之有效、腎新炎症方愈、而小便未利者、服之亦效、若仍有發炎之勢、則無益而有損、紅熱症之晚程、其可服與否、與上腎新炎症同、年邁者、腎經畧失功用、致覺腰痛、服之神效。

藥製與分劑

1 Dropsy
2 Ulcers of the skin due to struma
3 Chronic pyelitis
4 Chronic nephritis
5 Chronic catarrh of the bladder
6 Congestion of the kidneys

藥製與分劑

沛利拉冲藥 (Infusum Pareiræ,) 一量兩 (30.0)

沛利拉流膏 Fluidextractum Pareiræ, U. S. Extractum Pareiræ Liquidum, B. P. 一量錢 (4.0) 日服三次。

烏伐 UVA URSI, U. S. UVÆ URSI FOLIA, E. P. 此乃一類長春樹葉、產於歐美北方寒冷之地、內含一精、名阿布田。

療效 此藥於陰陽尿徑有改症之能、且畧有利小便之功、常以之醫腎[1]總漏炎、脬[2]炎、久白濁等症、此藥由腎而祛、服過分劑者、尿必變黑。

藥製與分劑

阿布田 (Arbutin) 三至五厘 (0.2-0.3)

烏伐膏 (Extractum Uvæ Ursi,) 二至四厘 (0.06-0.25)

烏伐流膏 Fluidextractum Uvæ Ursi, U. S. 二至四量錢 (8.0-16.0) 日服三次。

烏伐冲藥 Infusum Uvæ Ursi, B. P. 一至二量兩 (30.0-60.0)

愛冬葉 CHIMAPHILA, U. S. 此乃一類長春樹葉、產於亞美利加歐羅巴亞西亞等處。

療效 此藥能激腎經而利小便、並能使陰陽尿徑之泗膜復原、腎經虛弱而失功用者、

1 Pyelitis
2 Cystitis
3 Chronic gonorrhœa
4 Atonic renal conditions

毛地黃酒 Tinctura digitalis 三十量滴 (2.0)

布球冲藥 Infusi buchu 加至八量兩 (240.0) —M.

相合置於瓶內、日服三次、每服一量兩、(30.0) 未服之先、宜搖撼其瓶、以免藥力沉澱。 S.—Two tablespoonfuls three times a day. Shake the bottle before using.

若小便過酸、且渾而不清、多含雜質、致胱受惹而遺尿者、如以布球流膏、與熾氣弱浮酒各一量錢、(4.0) 鉄醋酸二十厘 (1.3) 同服、日服三次、大效、胱新炎症忌用。

藥製與分劑

布球流膏 Fluidextractum Buchu, U. S. 一量錢、(4.0) 日服三次、宜多以水送下、孩童十至三十量滴、(0.6-2.0)

布球冲藥、 Infusum Buchu, B. P. 一至四量兩、(30.0-120.0)

布球酒 Tinctura Buchu, B. P. 一至二量錢、(4.0-8.0)

沛利拉 PAREIRA, U. S. PAREIRÆ RADIX, B. P.

此乃一類草根、產於巴路巴西等處、能醫陰陽尿徑久炎症、卽腎總漏炎[1]胱炎[2]等類。

1 Pyelitis
2 Cystitis

氮塩醫之腎久炎[1]者、以銪乳鬱醫之常效、尿胎[2]者、此鬱不增其尿、只減其中所含之胎、故腎炎致腦中毒者、或腎新炎而大作燒者、俱不宜用、如因癲或痺等症、以致腎久炎者、此鬱甚效、但服時尿胎即止、不服則仍反復、是此鬱與該症無甚功效矣、乃有謂其效甚妙者、殊不可解也、分劑每日六十至一百厘、(4.0-6.6) 銪柳鬱、較鈉柳鬱易服、且其惹胃之力、較柳酸或他柳鬱爲小、故此鬱爲緊要之劑、痺[3]症、如服他類柳鬱而不受、服此柳鬱、未有不能受者、但宜置於藥壳內、服後必多飲水、或牛乳方可、分劑與鈉柳鬱同、且無毒力、雖服過分劑、亦無乖效、然銪若不純、微含鋇質、則有毒力矣。

布球 BUCHU, U. S. BUCHU FOLIA, B. P.

此藥乃一類草葉、產於亞非利加洲、內含一油、其氣易散、功效多在此油。

療效 此藥無增尿之功、而有激尿徑泗膜之力、故醫陰陽尿徑泗膜之久炎症、乃其大用、腎總漏炎[4]、胱炎[5]、胱惹[6]等久症、常以此藥醫之、良方如左。

銥檸鬱	B-Potassii citratis	四英錢 (16.0)
哥羅芳浮酒	Spt. chloroformi	三量錢 (12.0)

1 Chronic Bright's disease.
2 Albuminuria.
3 Rheumatism.
4 Pyelitis.
5 Cystitis.
6 Vesical irritation.

醫者云、此藥無效、亦有云服足分劑、或有微顫、虛幻陣抽等患。

烏羅透品 HEXAMETHYLENAMINA, U. S. (UROTROPIN) 此藥乃以錏沘、與袱毛地海、相合製成、結晶、無色、無味、以試紙試之、則有鹼效、七十二度熱水一分半、可化藥一分、小便含鹼過多、並多含硫[2]礬等類、與無形之尿礬[3]、且含膿[4]者、或小便含錏[5]晶而胱受惹者、服之俱效、腸[6]熱症、服之可滅尿中之稑、且有免食物釀壞之功、滅尿中之稑、其益有二、一免胱受累、二免染他人、分劑五至十厘、(0.3-0.6) 以水八量兩 (240.0) 化開、日服二或三次、有醫者謂、久服足分劑、每有尿血或尿閉之患、近之醫者謂、服此藥之大分劑、有由膽液而祛者、亦有由膽囊而祛者、故患腸熱症者服之、可免膽囊發炎之患、有醫者謂、人服此藥、越一句鐘、即運至顱腦脊腦之液中、故顱腦脊腦受傷者、服之可防瘴毒、分劑五至三十厘。(0.3-2.0)

銻 (STRONTIUM,) 此係金類原質、不入藥用、入藥者、乃其塩礬數類、即銻氯塩、Strontii Bromidum, U. S. 銻氯塩、Strontii Iodidum, U. S. 銻柳礬、Strontii Salicylas, U. S. 銻乳礬、銻硫礬等是也、銻氯塩之用、與鈇氯塩同、有醫者云、銻有育身之功、故此塩較鈇氯塩尤妙、其分劑三十至六十厘、(2.0-4.0) 胃存酸液、兼疼痛而失功用者、有著名醫者、曾以銻

1 Alkaline urine
2 Phosphates
3 Amorphous urates,
4 Purulent urine,
5 Ammoniacal crystals
6 Typhoid fever.
7 Gastric acidity.

純鋰安息蠟丸十八分、其利小便之功、乃在所含之安息香酸也、患胱炎[1]者、如小便多含硫蠟類、服之乃爲上品、因藥中含有安息香酸與鋰質、被祛時、安息香酸變成馬溺酸、鋰質變成氰強酸、病者小便中既大有酸力、則所含之硫蠟類自化、而功效大顯矣、肌痺[2]症、有時服此藥亦效、分劑十至三十厘、(0.6-2.0)置於水或藥壳內服之。

派怕拉辛 (PIPERAZINA) 此乃化學中新入藥者、其大用乃醫易犯之尿酸症、如置於過空氣處、則水氣與碳氨強洽俱被攝入、故宜貯於瓶內、嚴密塞之、方可、若製成消水、嘗之無味、以試紙試之、大有驗效、此藥化尿酸之能、較鋰碳強蠟、水不能化、此藥水易化之、服之者、其體質、有在身內被氧改變者、亦有祛身時而不變者、醫者以爲在人身內、與尿酸成一易化之新蠟、由腎而祛、故小便中多含尿腥基、而尿酸減少、此乃有功效之証據也。

療效 易犯尿酸[3]者、服之可免腎石胱石之患、如病者小便多含尿酸、致胱被惹、服之有效、胱被[4]者之患、有醫者以此藥一分、加水百分、射於胱內有效、其分劑日服十五厘、(1.0)服法、乃將以上之分劑、加水一量磅、(480.0)一日勻開服之最妙、因空氣能改其體質、故不宜以紙包之、亦不宜製丸服之、惟製成消水、即於一日內服訖方可、有著名

1 Catarrh of the bladder
2 Muscular rheumatism
3 Uric-acid diathesis
4 Irritation of the bladder

鋰檸礬之製法、以熱蒸水一量兩、(30.0)先加結晶之檸酸九十厘、(6.0)再加鋰碳强礬五十厘、(3.3)以火熱之、或滾水燉之、藥必自沸、至沸止爲度、有醫者謂糖尿症、如因癎症而致、以鋰碳强礬、或鋰檸礬十厘、(0.6)與鈉砒弱礬一厘之三十分之一(0.002)同服、日服三次、乃爲妙劑、但服鋰檸礬、偶有惹胃而嘔吐者。

鈉檸礬 SODII CITRAS, U. S. 此藥可代鉀檸礬之用、但其力較小、必食牛乳之嬰孩、如將牛乳一量兩、(30.0)加此藥一厘、(0.06)可免胃中結成硬塊、不易消化、且乳中不必多加水也、嬰孩用此藥、可防癆症、成人之胃瘍、胃炎、或腸熱等症、食牛乳不易消化、亦可加此藥於其內、分劑十至二十厘、(0.6-1.3)

鋅醋礬 AMMONII ACETAS) 此礬之入藥者、爲製鋅醋礬消水 Liquor Ammonii Acetatis, 之用、此消水有改酸之能、且畧有發表之力、但其力較熾氣弱礬雜浮酒爲小、分劑一至二量、錢、(4.0-8.0)

鋅安息礬 AMMONII BENZOAS, 此礬乃用化法而得、色白、結晶、形如鱗片、臭之無味、或畧有安息香酸之味、嘗之先似鎂硫强礬類、後則畧辣、水十分、或醇酒二十五分、能化藥一分、如置於過空氣處、鋅質漸失、必貯於瓶內、嚴密塞之方可、按此藥每百分內、宜含

1 Diabetes Mellitus
2 Bottle fedbabies.
3 Infantile scurvy
4 Gastric ulcer
5 Typhoid fever

肛被惹者、可以此消水與糘水各半射之、因糘水亦有平肛之功也、痔[1]症、亦可以此法醫之、若加鴉片酒數滴尤妙。

鉀氯强鬱餅 Trochisci Potassii Chloratis, 分劑一至六餅、每餅內有此鬱五厘、(0.3) 但宜噙於口內、以醫口泗膜炎症、如多用之、恐胃受惹、以其易於下咽也。

鋰 (Lithium) 此係金類原質、不入藥用、入藥者乃所製之鬱、此鬱分二類、第一類之功用、乃在本原質、第二類之功用、乃在成此鬱之酸。

第一類

鋰碳强鬱	Lithii Carbonas,	分劑二至十厘	(0.12-0.6)
鋰檸鬱	Lithii Citras,	分劑五至二十厘	(0.3-1.3)
沸鋰檸鬱	Lithii Citras Effervescens,	分劑一至四錢	(4.0-16.0)

第二類

鋰安息鬱	Lithii Benzoas, U. S.	分劑五至三十厘	(0.3-2.0)
鋰氯塩	Lithii Bromidum, U. S.	分劑十至四十厘	(0.6-2.5)
鋰柳鬱	Lithii Salicylas, U. S.	分劑十至三十厘	(0.6-2.0)

1 Hemorrhoids

此劑被祛、多由涎液、少由腎經、故患口白瘍者服之、口內之泗膜、常受其感、倘病者之胃或腎、有被惹之患、則不宜服、只以筆蘸其消水、敷之可也、有醫者以之醫痔症、但甚危險、蓋患痔症而殞命者、多因腎經發炎之故、如服此藥、非但無益、反增腎經之患、故醫此症、宜製成消水、用筆蘸敷、庶免意外之虞、喉微栩新炎、若製成漱藥漱之、有效、良方如左。

鉀氯强鬱	R-Potassii chloratis	一英錢 (4.0)
陽葛流膏	Fluidextracti rhois glabræ	半量兩 (16.0)
烝水	Aquæ destillatæ	加至三量兩 (90.0) —M.

置於瓶內、加水等分、每二句鐘漱喉一次、漱時必搖動其瓶、方免沉澱之虞。

S.—To be added to an equal quantity of water in a glass and used as a gargle every two hours, after stirring.

肛[2]泗膜新炎、兼有瀉泗液並肛急之患者、可以此鬱製成消水、每二十厘、(1.3) 加水一量兩、(30.0) 以四量兩 (120.0) 射於肛內、使存二十分鐘之久、射一二次、病者或可痊癒、

1 Acute follicular pharyngitis
2 Acute rectal catarrh
3 Mucous diarrhœa
4 Tenesmus

鉀氯強鬱 POTASSII CHLORAS, 此鬱與他鉀鬱迥異、其毒力惟小於鉀藍洽、如敷於泗膜、則有惹力、服過分劑、血則大受其毒、腎經且有發炎之患、與植鬱類、同置於臼內研之、則有崩炸之險。

體功效 嘗有醫者以此鬱醫疾氣之患、如人患肺炎重症、乃因其肺經積痰過多、所入之空氣過少也、以此鬱醫之者、以爲於身內能發氧氣、而補助肺經、然決無此理、若欲令此鬱發氧、必置於火上熱之方可、而身之熱度、決不足以至此、此鬱被祛時、體質不盡改變、服過分劑者、則有惡心、頭痛、腹痛、腰痛、氣促、皮紫、心失功用、全身無力等患、毒分劑、血變絳紫、似寇寇之色然。

療效 口白瘍或中鉀毒[1][2]而涎盛者、服此鬱、或用以漱口俱效、良方如左。

鉀氯強鬱 ℞-Potassii chlorat. 四十八英厘 (3.2)

沒藥酒 Tincturæ myrrhæ 三十量滴 (2.0)

黃辛寇那香酒 Elixir calisayæ 加至三量兩 (90.0) —M.

每五句鐘服一小匙、(4.0) 或用以漱口亦可。

S.—Teaspoonful every five hours, or use as a mouth wash.

1 Stomatitis
2 Mercurial salvation

易化之、昔常以此醫新痺症、今多以柳鬱代之、如醫痺症、每日宜服半至一兩、(15.0-30.0)延纏之痺症、以此鬱三十厘、(2.0)鈸氣塩十厘、(0.6)日服三次或效、肝失功用、如服此鬱、則多生膽液、且有利小便之功、易犯尿酸者、服之可去其酸、分劑二十厘至二兩、(1.3-60.0)服至二兩、則有瀉效、但不如他瀉劑之妙。

鈸氣輒菓鬱 POTASSII BITARTRAS, U. S. POTASSII TARTRAS ACIDUS, B. P. 此鬱色白、多係細粉、或謂其於腹內不改體質。

療效 鈸鬱之中、惟此鬱最利小便、腎久炎致成疿腫者、與荷蘭酒、或杜松子冲藥同服、有效、此鬱一兩、(30.0)杜松子冲藥一量磅、(480.0)足爲二十四句鐘之用、但宜均開服之、腎新炎者、宜專用此鬱、忌用杜松子冲藥、以其惹力過大也、按此藥有令人瀉水之功、分劑半兩、(15.0)但不常用、尿少而含鹼者、服三十厘、(2.0)尿即如常。

鈸痞強鬱 POTASSII NITRAS, 此鬱結晶似針、無色、嘗之大有塩味、服過分劑則中毒、且有胃道發炎之患、今不常用、多以鈸植鬱代之、以其少有毒力也、痺症、以此鬱二十分、燕水八十分、以無鬱紙蘸之、作成紙捲、燃而吸之、此乃妙法、或燃此紙於盤內、吸其烟亦可、如氣脘泗膜有被惹之患、可以此紙蘸以上之消水、後則再蘸安息香雜酒、乾時吸之、可免此患、倘多製此紙、必置於嚴密之玻璃瓶內、否則失其功用。

1 Rheumatism
2 Subacute rheumatism
3 Hepatic torpor
4 Uric acid diathesis
5 Chronic nephritis
6 Dropsy
7 Acute renal disease
8 Urine scant and alkaline
9 Asthma

(960.0) 化開、分數次服之、如尿中無胎、其效尤妙、若置此糖於牛乳內、使孩童食之、則尿較常必多。[c]

鉀碳強鹽 POTASSII CARBONAS, 此藥味惡、服之者少、常用者、乃以化法製成他藥也。

鉀氫碳強鹽 POTASSII BICARBONAS, 此藥之用、與鉀醋鉀檸等鹽同、其味較二鹽尤惡、故不常用、分劑五至四十厘、(0.3-2.6) 鉀檸消水、乃以此鹽一百二十厘、(8.0) 檸酸九十厘、(6.0) 水十量兩、(300.0) 製成。

鉀汽消水 LIQUOR POTASSII HYDROXIDI, U. S. LIQUOR POTASSÆ, B. P. 此消水內含鉀汽百分之五、清而無色、嘗之無味、嘗之則澁、以試紙試之、大有鹼效、常用之爲改酸藥、如病者之尿過酸、[1]服之有效、分劑五至三十量滴、(0.3-2.0) 多以水送下、[2]趾甲入肉、以此消水敷於甲上、使甲變輭、則易塞棉於其下、亦易以刀剔之。

鉀檸鹽 POTASSII CITRAS, 此鹽色白、結晶、形如砂粒、易攝水氣、以試紙試之、其色不變、鉀鹽中、惟此鹽味佳、水易化之、[3]氣脘新炎、與衣必格同服、乃爲上品、尿少而過酸者、服之有利、小便之功、若孩童因尿酸過多、以致遺尿者、服之有效、分劑二十厘、(1.3)

鉀醋鹽 POTASSII ACETAS, 此鹽色白、易攝水氣、以試紙試之、其色不變、嘗之畧有鹽味、水

1 Acidity of the urine
2 Ingrowing toe-nail
3 Bronchitis
4 Diuretic
5 Incontinence of urine

發炎、育道發炎等患、過十至二十句鐘、每致殞命。

金雀花 SCOPARIUS, U. S. SCOPARII CACUMINA, B. P. 詳見本篇

銇氯弱塩 HYDRARGYRI CHLORIDUM MITE, U. S. HYDRARGYRI SUBCHLORIDUM, B. P. 詳見本篇

爁氰弱浮酒 SPIRITUS ÆTHERIS, NITROSI. 詳見本篇

毛地黃 DIGITALIS, U. S. DIGITALIS FOLIA, B. P. 詳見本篇

乍波蘭的 PILOCARPUS, U. S. JABORANDI FOLIA, B. P. 詳見本篇

康畀箭毒 STROPHANTHUS, U. S. STROPHANTHI SEMINA, B. P. 詳見本篇

加非印 CAFFEINA 詳見本篇

乳糖 SACCHARUM LACTIS, 此糖乃用化法由牛乳而得、其味不及蔗糖之甘、如置於嬰孩所食之牛乳內、較白糖尤妙、因其不易變釀、且育道消化、較易於白糖也、乳糖散類、乃以此糖製成、蓋因其粒堅而且小、與他藥研成細末、日久不致成塊、人服銇氯弱塩、或獨脚蓮楠、因其分劑微小、常以此糖置於其內、襯大其分劑、可以盡服無遺也、近數年有醫者查明、此糖之足分劑、大有利小便之功、其感只行於腎內、無激阻他經之患、腎[1]經被阻、或由腎病而致痳[2]腫者、用此糖大效、分劑每日以二至四錢、(8.0-16.0) 加水二磅

1 Renal inactivity
2 Renal dropsy

海葱醋 Acetum Scillæ, 十至三十量滴 (0.6-2.0)

海葱雜糖漿 (Syrupus Scillæ Compositus,) 二十量滴 (1.3) 爲成人平肺之劑、一量錢 (4.0) 爲孩童嘔吐之劑、此漿內有海葱流膏、辛伊加流膏、銨鉄菓礬、煉鎂砂强礬、糖水、等類、一至五歲之孩童、氣脘發炎、如至中程時、良方如左。

衣必格葡酒 ℞-Vini ipecacuanhæ 一量錢 (4.0)

海葱酒 Tincturæ scillæ 二量錢 (8.0)

透路脂楠糖漿 Syrupi tolutani 五量錢 (20.0)

水 Aquæ 一量兩 (30.0) —M.

每三四句鐘服一量錢。 S.—Teaspoonful every three or four hours.

海葱糖漿 Syrupus Scillæ, 三十至六十量滴 (2.0-4.0)

海葱醋蜜 Oxymel Scillæ, B. P. 三十至六十量滴 (2.0-4.0)

海葱雜丸 Pilula Scillæ Composita, B. P. 五至十厘 (0.3-0.6)

毒力 服毒分劑者、先則嘔瀉、後則昏迷、兼有間癱之患、再後瘈瘲、或有尿血、尿閉、腎經

第十九章 論利小便藥類

海葱 SCILLA.

此藥乃一類植物、狀似葱頭、產於歐洲附近地中海之處、故名之曰海葱。

療效 如因心病、以致腎久炎、或腎經被阻者、此藥可作利小便之劑、如因心病以致痕[2]腫、與毛地黃同服、乃爲常用之劑、心統膜胸統膜或腹統膜有積液之患、此藥有效、醫痕腫之良方如左。

海葱散 R-Pulveris scillæ 十英厘 (0.6)

毛地黃葉散 Pulveris digitalis foliorum 二十英厘 (1.3) —M

製成十丸、日服三次、每次一丸。 Fiant pilulæ No. X. S.—One t. i. d. after meals.

氣腔發炎[5]多有醫者、以此藥醫之、然此法不可泥爲常理、因其有惹胃腎之力也、倘胃腎失其功用、則不宜服。

藥製與分劑

海葱流膏 Fluidextractum Scillæ, U. S. 一至五量滴 (0.06-0.3)

海葱酒 Tinctura Scillæ, 五至三十量滴 (0.3-2.0)

1 Chronic Bright's disease.
2 Dropsy
3 Effusions in the pericardium, pleura or abdomen
4 Dropsy
5 Bronchitis

量滴、(0.06)加洋橄欖油少許、置於舌上、或製成勻藥類、或成丸服之俱可、腸胃被煮者忌用、系幹[1]痛、或氣管[2]炎等症、加洋橄欖油等分、敷於患處、有外煮內效之功、倘藥被呑、必致有瀉腹之虞、服此藥過度者、則以醫育道發炎之藥治之。

巴豆油擦藥 Linimentum Crotonis, B. P. 筋扭、或肌痺等症、擦之有效。

栝樓 BRYONIA

此藥係一類之草、產於歐洲、入藥者乃其根。

體功效 服此藥之過分劑、則大見水瀉、育道受煮、服毒分劑、則有煮潤膜之力、亦有時腦衣顯發炎之狀、服中分劑、面貌或畧顯紅色、並有頭痛之患。

療效 此藥有激腸胃液腺之力、故腸胃畧失功用、以致食滯[3]者、服之有效、孩童大便乾[4]燥者、如因腸液缺少所致、此藥爲上品、孩童大便乾燥、色白而硬者、服之有效、但以栝樓酒爲合宜、分劑十至三十量滴、(0.6-2.0)有醫者云、痺症、胸統膜炎、此藥大有醫之之功、然用之者少、以其無醫此類症之確據也。

藥製與分劑

栝樓酒 Tinctura Bryoniae 一至二量錢、(4.0-8.0)爲輕瀉之劑、五至四十量滴、(0.3-2.6)爲醫食滯之劑、病重者酌增。

1 Sensitive nerve
2 Bronchitis
3 Dyspepsia
4 Constipation

血、或積液等、此藥有祛之之效、服過分劑之形狀、與肓道發炎者同、醫之亦同。

藥製與分劑

洋苦瓜汁 Elaterium, B. P. 一厘之六分之一、(0.01)成丸服之、久存者不宜用。

洋苦瓜汁精 Elaterinum, 一厘之二十分之一至十分之一、(0.003-0.006)服法、以洋苦瓜汁精四英厘、(0.25)加醇酒四量兩、(120.0)置於火上溫之至化開爲止、日服半小匙、(2.0)即爲足分劑。

洋苦瓜汁精乳糖散 Trituratio Elaterini, U, S. 半至一厘 (0.03-0.06) 此以洋苦瓜汁精一分、乳糖九分製成。

洋苦瓜汁精雜散 Pulvis Elaterini Compositus, B. P. 一至五厘 (0.06-0.3) 此以洋苦瓜汁精一分、乳糖三十分製成。

巴豆油 OLEUM TIGLII, U. S. OLEUM CROTONIS, B. P. 此藥乃由一類樹子取出之油、產於印度中國等處、其色淡黃、敷於皮上、有生皰之力、如以此油一量滴、(0.06)與洋橄欖油五量滴、(0.3)置於舌上、過一句鐘、大有瀉水之效、顱腦積血、如不省人事、服之最妙、因其分劑無多、功效甚速也、昏譫者亦可用之、顛狂者、兼有顱腦積血、及大便乾燥等患、此爲最妙之劑、分劑一

1 Cerebral effusion
2 Cerebral congestion
3 Delirium

吐、服此藥之小分劑有效、若因胃被惹或發炎所致忌用。

藥製與分劑

獨腳蓮膏 (Extractum Podophylli) 一至五厘 (0.06-0.3)

獨腳蓮流膏 Fluidextractum Podophylli, U. S. 二至二十量滴 (0.12-1.3)

獨腳蓮樹脂 Resina Podophylli, U. S. Podophylli Resina, B. P. 一厘之二十分之一、至十分之一、(0.003-0.006) 爲輕瀉之劑、一厘之十分之一、至二分之一、(0.006-0.03) 爲重瀉之劑、

獨腳蓮酒 Tinctura Podophylli, B. P. 五至十五量滴 (0.3-1.0)

洋苦瓜汁 ELATERIUM, B. P.

此藥乃洋苦瓜汁所沉澱者、形如鱗片、色灰而綠、嘗之味苦、雖爲常用之藥、但不入美揀藥册、入之者惟洋苦瓜汁精。

體功效 此藥甚有惹泗膜之力、製藥者之手、亦多被惹、服之大有瀉水之功、獸類則否、其故尚未能知。

療效 此藥爲最妙瀉水之劑、如不多服、則少有痓患、故心統膜、胸統膜發炎等症、有積液之患者、此爲祛液之妙劑、痞腫、腹腫等症、亦效、虛弱者不宜服、常人服此藥、瀉後如飲酒少許、可補其力、腎炎腦中毒兼有痞腫者、此藥能由大便祛毒、服之有效、顱腦積

1 Pericarditis and pleurisy
2 Effusions
3 Dropsy
4 Ascites
5 Uræmia
6 Cerebral congestion

療效　此藥於揀藥册中、爲最緩之瀉劑、小分劑、有輕瀉之效、足分劑、有重瀉之功、過分劑、或有育道發炎之患、且有感肝祛膽之能、大便淡黃者、服錄氣弱鹽最妙、色黑者、此藥最妙、胃不消化、腸脹並大便不通等症、良方如左。

獨脚蓮精	D-Podophyllin.	五英厘 (0.3)
洋杜仲精	Euonymin.	五英厘 (0.3)
利炭大精	Leptandrin.	五英厘 (0.3)
印度龍膽草膏	Ext. chiratæ	四十五英厘 (3.0)
幾阿蘇	Creosotæ	十量滴 (0.6) —M.

製作二十丸、酌病服之。 Fiant pilulæ No. XX.

一二月之嬰孩、若大便甚燥、以獨脚蓮精一厘、(0.06) 加醇酒一量錢、(4.0) 日服一或二次、每次以二量滴、(0.12) 加白糖服之有效、孩童暑瀉症、如所瀉者似水、並有霉氣之味、用他藥無效者、以此藥一厘之六十分之一、至五十分之一、(0.001-0.0012) 每數句鐘服一次、常效、成人之久瀉症、如上服之亦效、然必增其分劑方可、如因肝胃被阻、致患嘔

1 Indigestion
2 Intestinal flatulence with constipation
3 Hard stony stools
4 Summer diarrhœa
5 Chronic diarrhœa
6 Vomiting

B. P. 內有哥羅新、阿羅、士金無年、鈹硫强蓉、丁香油等藥、分劑五至十厘、(0.3-0.6) 二哥羅新鬧羊花丸、Pilula Colocynthidis et Hyoscyami, B. P 分劑五至十厘、(0.3-0.6)

士金無年 SCAMMONIUM, U. S. SCAMMONIE RADIX, B. P. 此乃一類蔓草、入藥者乃草根之泗楠、產於小亞西亞敘利亞等處、頗有瀉水之力、並祛膽之效。

療效 此藥大有惹力、服之常有痙患、胥道發炎者忌服、倘服過分劑而腸受惹者、宜以平胥道之藥醫之。

藥製與分劑

士金無年 Scammoniæ Rsdix, B. P. 二至五厘 (0.12-0.3) 常與哥羅新、或他類瀉劑同服。

士金無年樹 Resina Scammonii, U. S. Scammoniæ Resina, B. P. 三至八厘 (0.2-0.5)

士金無年雜丸 Pilula Scammonii Composita, B. P. 五厘 (0.3)

士金無年雜散 Pulvis Scammonii Compositus, B. P. 十至二十厘 (0.6-1.3)

獨脚蓮 PODOPHYLLUM, U. S. PODOPHYLLI RHIZOMA, B. P. 此乃一類之草、入藥者乃其根、內含一樹、產於美國堪阿大等處。

(500.0)士金無年桶、(140.0)豆蔻、(60.0)礬、(140.0)製成、重瀉之分劑、五至二十厘、(0.3-1.3)輕瀉之分劑、一至三厘、(0.06-0.2)哥羅新膏 Extractum Colocynthidis U. S. 分劑二至五厘、(0.12-0.3)與他瀉藥同服、其良方如左。

哥羅新膏 ℞-Extracti colocynth.	三十英厘 (2.0)
顛茄膏 Extracti belladonnæ	二英厘 (0.12)
馬前子膏 Extracti nucis vomicæ	二英厘 (0.12) —M.

製成十丸、每早服一丸。Fiant pilulæ No. X. S.—One each morning.

雜瀉丸 Pilulæ Catharticæ Compositæ, U. S. 每丸內有哥羅新雜膏一厘零三分之一、(0.08)渣笠楠一厘之三分之一、(0.02)鋅氯弱鹽一厘、(0.06)籐黃一厘之四分之一、(0.015)大便乾結久症、不可逐日服之、恐使其症加重也、美揀藥册有植瀉丸、Pilulæ Catharticæ Vegetabiles, U. S. 內有哥羅新雜膏、鬧羊花膏、渣笠楠、利炭大膏、獨脚蓮楠、薄荷油等藥、分劑一至二丸、英揀藥册之哥羅新丸有二、一哥羅新雜丸、Pilula Colocynthidis Composita,

療效 此藥常用爲瀉水之劑、痞症、血過多、或顱腦積血之患、服之有效、因其無味、故孩童易服、分劑乃一至二厘、(0.06-0.12) 與大黃糖漿半量兩 (15.0) 同服最妙、肝失功用、與鋉氣弱鹽同服最妙、若病者虛弱、不宜服足分劑、育道被惹者、忌用。

藥製與分劑

渣笠雜散 Pulvis Jalapæ Compositus, 十五至四十厘、(1.0-2.6) 此散內有渣笠散三十五分、鋉氣菓馨六十五分。

渣笠桶 Resina Jalapæ, 成人二至四厘、(0.12-0.25) 孩童一厘之四分之一至二分之一、(0.015-0.03)

渣笠酒 Tinctura Jalapæ, B. P. 半至一量錢 (2.0-4.0)

渣笠膏 Extractum Jalapæ, B. P. 五至十五厘 (0.3-1.0) 此乃瓜類、入藥者乃瓜瓤、內含一瓶一桶、均無藥力、惟

哥羅新 COLOCYNTHIS, U. S. COLOCYNTHIDIS PULPA, B. P.

本藥有瀉水之功、服之過多、必致育道發炎、再多則殞命。

療效 此藥不宜單用、常與他類瀉藥同服、痞腫久症、或某處之潤膜存液、(一名滲出) 服哥羅新雜膏、Extractum Colocynthidis Compositum, 有效、此膏乃以哥羅新、(100.0) 純阿羅、

1 Dropsy
2 Plethora
3 Cerebral congestion
4 Torpid liver
5 Chronic dropsy

次、因病酌用、最妙之法、乃以滾水化開。

藥製與分劑

沸鈉硫強鬱	Sodii Phosphas Effervescens,	二至四錢 (8.0-16.0)
枯鈉硫強鬱	Sodii Phosphas Exsiccatus, U. S.	半至一錢 (2.0-4.0)
鈉硫強鬱雜消水	Liquor Sodii Phosphatis Compositus,	二十至六十量滴 (1.3-4.0) 每量錢內、含此鬱一錢。

鉀鈉菓鬱 POTASSII ET SODII TARTRAS, U. S. SODA TARTARATA, B. P. 此鬱之味較鎂硫強鬱最佳、故人多喜服、然惹力較鎂硫強鬱尤大、分劑半兩。(15.0)

雜沸散 PULVIS EFFERVESCENS COMPOSITUS, U. S. PULVIS SODÆ TARTARATÆ EFFERVESCENS, B. P. 此藥乃以鉀鈉菓鬱一百二十厘、(8.0) 與鈉氫碳強鬱四十厘、(2.6) 用藍紙合爲一包、再以菓酸三十五厘、(2.3) 以白紙包之、服時將此二包之藥、各以半盃水化開、合於一盃內、乘沸服之、如欲重瀉、可服二劑、輕瀉則一劑足矣、惡心而兼大便乾結者、此爲妙劑、如一次不能服盡、可分爲四分、每刻鐘服一分、常有平胃瀉腹之效。

渣笠 JALAPA 此乃一類樹根、產於莫西革、內含二種、皆不單用、必合他藥用之方可。

水大有沸力、宜用新製者、嘔吐之頭痛服之有效、因其惹力過大、故育道發炎者忌用。

沸鎂檸鎂 (Magnesii Citras Effervescens) 一至二錢 (4.0-12.0) 宜貯於嚴密瓶內、用時加水、乘沸服之。

鈉硫強鎂 SODII SULPHAS 此鎂在瀉藥中爲最有惹力者、故以之醫人者少、而醫畜類者多、人服之分劑、半至一兩、(15.0-30.0) 育道發炎者忌用、服此藥者、必致水瀉、並有腹痛之患、喀婁巴水 (Carlsbad Water,) 昏亞地亞奴水 (Hunyadi Janos,) 昏亞地阿帕水 (Hunyadi Arpad,) 俱含此鎂、近有著名醫者云、[2]鼽腔或他類血腔流血之患、每句鐘服此鎂二厘、(0.12) 或射於盂內大效、若射於皮內無效。

沸鈉硫強鎂 Sodii Sulphas Effervescens, B. P. 分劑二至四錢、(8.0-16.0)

鈉硫強鎂 SODII PHOSPHAS, 此鎂本無硫之功效、曾有醫者、以此鎂代硫之用謬矣、食牛乳之嬰孩、大[3]便燥瀉無常者、每食時將此鎂二至四厘、(0.12-0.25) 加於乳內有效、[4]嬰骨軟症、服之可免大便乾燥之患、用此鎂之小分劑、則畧有瀉效、足分劑、則大有瀉效、或言[5]肝變硬與癢等症、服之最爲妙劑、成人之分劑、乃二十厘至二錢、(1.3-6.0) 日服一至三

1 Sick headache
2 Capillary hemorrhages
3 Diarrhœa and constipation
4 Rickets
5 Hepatic cirrhosis
5 Jaundice

鎂硫強鬱 B-Magnesii sulphatis 二英兩 (60.0)

甘油 Glycerini 一量兩 (30.0)

水 Aquæ 四量兩 (120.0) —M.

化開射之。S.—Use as enema.

近有醫者、以此鬱每二十五厘、(1.6) 加水百量滴、(6.6) 製成消水、射於腦潤衣開、以醫痙症、有效、用法、如病者身重百磅、可射七十五量滴、(5.0) 總之每二十磅、射十五量滴。(1.0)

藥製與分劑

鎂硫強鬱 Magnesii Sulphas 半至一兩 (16.0-30.0)

沸鎂硫強鬱 Magnesii Sulphas Effervescens, 四至八錢 (16.0-32.0)

鎂檸鬱 (MAGNESII CITRAS,) 此鬱之味較鎂硫強鬱稍佳、但其惹力較大。

藥製與分劑

鎂檸鬱消水 Liquor Magnesii Citratis, U. S. 六至十二兩 (180.0-360.0) 此消

1 Tetanus

鎂硫強礬 MAGNESII SULPHAS,

此藥色白、結微晶、嘗之有鹽味、水易化之、以試紙試之、其色不變、有瀉腹之能、其故有三、一有從腸血管取盟之功、二有激腸蠕動之功、三本藥之消水、不易被陳、能潤其腸、緣此三者、故服之必致瀉腹、以此藥七分、加水千分、服之能祛胸內之水、如欲多祛其水、則藥內少加水可也、胸統膜積液、或腎炎症、服此藥之膿消水、有瀉水之功、痧腫者、於早餐前、以一至二兩、(30.0-60.0) 加僅能化開之水、服之或效、若分爲小分劑、每刻鐘服一次尤妙、腸炎或腹統膜炎等症、如宜祛其血盟、此藥大效、或謂醫熟道之痢症、每二句鐘以一錢、(4.0) 與香硫強酸十至十五量滴、(0.6-1.0) 加水少許服之、較衣必格尤妙、此藥在腸內並無煮力、雖腹有炎症時、亦可服之、各國之泉水多有含瀉力者、緣其畧含鎂硫強礬、不易被陳、故可免大便乾結之患、年壯者、因患沙淋以致腎痛、尿中必含有錯蔆晶、若以此礬與鉄檸礬各半至一錢、(2.0-4.0) 日服三次有效、但必久服方可、如某處發炎、以此礬製成濃消水、用布蘸而敷之、大有止痛之能、且有痲效、如陽腺炎、腦系痛、痛症、新痺症、敷之俱效、足系炎症、如以布蘸此消水、裹其小腿亦效、此礬亦可爲射肛之用、其益有二、一瀉腹、二取腸內血管之盟、良方如左。

1 Pleuritic effusion
2 Dropsy
3 Enteritis
4 Perotinitis
5 Tropical dysentery
6 Gravel
7 Inflammation
8 Orchitis
9 Neuralgic nerves
10 Erysipelas
11 Acute inflammatory rheumatism

洋鼠李流膏 Fluidextracti rhamni purshianæ 一量兩 (30.0) —M.

相合調勻、每晚服一小勻、(4.0) 如其力不足、早晚各服一小勻可也。

S.—Teaspoonful at night, or night and morning.

若服此方有腸痙之患、宜每服加顛茄流膏、半至一量滴。(0.03-0.06)

辛那雜冲藥 Infusum Sennæ Compositum, U. S. 四量兩、(120.0) 內有辛那、甘露、小茴香、鎂硫強鬱等藥、有瀉瀉之功。

辛那糖漿 Syrupus Sennæ, 一至四量錢 (4.0-16.0)

甘草雜散 Pulvis Glycyrrhizæ Compositus, 二十至三十厘 (1.3-2.0) 內有辛那、甘草、小茴香油、淨硫等藥。

辛那冲藥 Infusum Sennæ, B. P. 一至二量兩 (30.0-60.0)

辛那雜調水 Mistura Sennæ Composita, B. P. 一至二量兩 (30.0-60.0)

辛那雜酒 Tinctura Sennæ Composita. B. P. 一至四量錢 (4.0-16.0)

辛那濃消水 Liquor Sennæ Concentratus, B. P. 一量錢 (4.0)

服辛那者、尿內含鹼、則色必紅、含酸則色必黃、未服之前、醫者當明示之、以免其驚懼。

辛那 SENNA, U. S. SENNA INDICA, B. P., SENNA ALEXANDRINA, B. P.

此藥乃一類樹葉、產於印度伊及等處、乃瀉藥類中大有力者。

體功效 服此藥者、必大有瀉效、單服之、每有腸痙之患、或謂此藥有感肝生膽液之功、然用爲膽瀉劑者少、亦有謂此藥能增腸蠕動而成瀉效者、乳婦不宜多服、以其由乳而祛、嬰孩食之、恐有瀉腹之患。

藥製與分劑 大便乾結、專服此藥有效、如與他藥兼服尤妙。

辛那流膏 Fluidextractum Sennæ, U. S. 一至二量錢、(4.0-8.0) 爲孩童之劑、四量錢、(16.0) 爲成人之劑。

辛那糖菓 Confectio Sennæ, 三十厘、(2.0) 爲孩童之劑、一至二錢、(4.0-8.0) 爲成人之劑、孩童服之最妙、但內含糖類、易令孩童之胃失其功用、不宜常服、孕婦之大便乾結、多有醫者以此藥爲妙劑、或以洋鼠李爲尤妙、若此二藥單用而無效者、良方如左。

辛那流膏 B-Fluidextracti sennæ 二量兩 (60.0)

1 Habitual constipation

一厘、(0.06)以上各藥、每服一至二丸。

阿羅膏	Extractum Aloes, U. S.	一至二厘、(0.06-0.12)
輕瀉雜丸	Pilulæ Laxativæ Compositæ, U. S.	此丸內有阿羅、顛茄膏、土的年、衣必格等藥。
阿羅酒	Tinctura Aloes,	一至二量錢、(4.0-8.0)
阿羅沒藥酒	Tinctura Aloes et Myrrhæ, U. S.	一至二量錢、(4.0-8.0)
阿羅雜煮水	Decoctum Aloes Compositum, B. P.	半至二量兩、(15.0-60.0)
巴阿羅膏	Extractum Aloes Barbadensis, B. P.	二至六厘 (0.12-0.36)

禁用之狀 體胖而大便乾結、或腸泗膜炎者、俱不宜服、肝炎或肝積血者、與肛炎或患熱症者、亦不宜服、孕婦服之、最宜謹愼、恐有小產之虞。

痱他林 (PHENOLPHTHALEIN)

此藥乃爲試酸鹼之用、近代醫者、多用之醫大便久燥之患、單用之、或合阿羅製丸用之俱可、如服尋常之分劑、即一至二厘、(0.06-0.12)能令病者大便如常、且腹無疼痛、亦不損其精神、久服亦然。

祛 此藥由大便而祛。

1 Chronic constipation

蒲膏 Extracti taraxici 酌用 —M.

製成六十丸、早晚各服二丸。

Ft. pil No. LX. S.—One pill, morning and evening.

如因血虧、或大便乾結、以致經閉症、此藥大有調經之效、新久之肛裂、或卧瘡、如敷阿羅甘油有效、製法、以阿羅酒八分、置於火上、令其滾沸、漸次加甘油三十分、即成此油。

藥製與分劑

阿羅 Aloe Barbadensis, B. P. Aloe Socotrina, B. P. 輕瀉一至五厘、(0.06-0.3)重瀉十厘、(0.6)常與顛茄、香藥等製丸服之。

純阿羅 Aloe Purificata, U. S. 此爲常用者。

阿羅丸 Pilulæ Aloes, U. S. Pilula Aloes Barbadensis, B. P. Pilula Aloes Socotrinæ, B. P. 每丸內有阿羅與鹼各一厘 (0.12)

阿羅沒藥丸 Pilulæ Aloes et Myrrhæ, U. S. Pilula Aloes et Myrrhæ, B. P. 每丸內有阿羅沒藥各一厘、(0.12)

阿羅乳脂丸 Pilulæ Aloes et Mastiches, U. S. ("Lady Webster dinner Pill") 每丸內有阿羅一厘、(0.12)

阿羅鐵丸 Pilulæ Aloes et Ferri, U. S. Pilula Aloes et Ferri, B. P. 每丸內有阿羅、與枯低鐵硫酸鎂各

1 Amenorrhœa
2 Old or recent fissure of the rectum
3 Bed-sores

第五十四圖



此圖表明阿羅大有感胴之力如A

二句鐘、瀉效方顯、其大感、乃行於胴肛等處、服十至二十厘 (0.6-1.3) 之大分劑、必有水瀉、服二或三厘 (0.12-0.2) 之中分劑、必有溏瀉。

療效 此藥欲用之爲瀉劑、以祛某處積血、如某處生瘍發炎等毫無功效、其正感、乃緩增腸蠕動之功、新久之大便乾結症、[1]此藥乃常用之品、然用之過久、其效反失、並減腸內生液之功、因其味苦、故能補胃、醫者常與鐵類同用、其效尤妙、蓋鐵類原有斂力、易令大便結燥、故二者並用、大有輔佐之功、服足分劑者、大有瀉效、瀉後有覺腹內脹墜者、亦有肛泗膜發炎者、如專服此藥、常有腸疳之患、故宜與免腸抽搐藥同服、患痔[2]者、如身體虛弱、與低鐵硫强礬兼服有效、良方如左。

低鐵硫强礬 B-Ferri sulphatis 二十英厘 (1.3)

阿羅膏 Extracti aloes 一英錢 (4.0)

1 Chronic and subacute constipation
2 Hemorrhoids

大黃糖漿 Syrupus Rhei 一量錢 (4.0) 爲孩童之劑、四量錢、(16.0) 爲成人之劑、然成人少用之。

大黃香糖漿 Syrupus Rhei Aromaticus, U. S. 一量錢 (4.0) 乃爲孩童而製者。

大黃酒 Tinctura Rhei, U. S. 半至二量錢 (2.0-8.0)

大黃香酒 Tinctura Rhei Aromatica, U. S. 半量錢 (2.0)

大黃雜酒 Tinctura Rhei Composita, B. P. 半至一量錢 (2.0-4.0)

大黃冲藥 Infusum Rhei, B. P. 一至二量兩 (30.0-60.0)

大黃鈉氫礦調水 Mistura Rhei et Sodæ, U. S. 一量錢 (4.0)

大黃濃消水 Liquor Rhei Concentratus, B. P. 一量錢 (4.0)

阿羅 ALOE, U. S. ALOE BARBADENSIS, B. P. ALOE SOCOTRINA, B. P. 此藥乃由一類草葉之汁、曝乾而成、產於巴貝豆搜叩他二海島、故有巴貝豆搜阿羅與搜阿羅之分、內含一精、名阿羅精、藥力即由於此精、如係純淨、體必結晶、然常售者乃藥散、其味極苦。

體功效 此藥敷於舌上、苦味常存、有醫者謂以此藥灌犬、其肝大受其激、而多生膽液、人則無此效、想該醫灌犬者、必過分劑、尋常之分劑、恐無此效、人不服過分劑、必越十

薄荷油 Olei menthæ piperitæ 一量滴 (0.06) —M.

製成二十丸、每飯後可服一或二丸。 Fiant pil No. XX. S.—After each meal take one or two pills

孩童大便[1]乾結、服他類瀉劑、易成瀉症、此藥有斂力、庶免此患、若孩童暑瀉[2]、先以此藥瀉出腸內釀壞之物、後施以斂藥、此乃常法、服此藥者、其尿若含酸、色必黃、尿若含鹼、色必紅。

藥製與分劑

大黃散 (Pulveris Rhei) 二十厘 (1.3)

大黃膏 Extractum Rhei, 五至十厘 (0.3-0.6) 成丸服之最妙。

大黃雜丸 Pilulæ Rhei Compositæ, U. S. Pilula Rhei Composita, B. P. 一至三丸、每丸內有大黃二厘、(0.12) 阿羅一厘半、(0.09) 乃爲成人而製者。

大黃雜散 Pulvis Rhei Compositus, 二十至四十厘 (1.3-2.6) 乃以大黃、鎂養、薑等藥製成。

大黃流膏 Fluidextractum Rhei, U. S. 十二十至三十量滴 (1.3-2.0)

1 Constipation
2 Summer diarrhœa

滴、(1.0-4.0) 置於輭藥壳內服之、但必服數壳、方能見效、未服之前、宜將藥壳蘸水、爲其易於下咽也。

鋊氣弱塩 HYDRARGYRI CHLORIDUM MIT, U. S. HYDRARGYRI SUBCHLORIDUM, B. P. 詳見鋊篇

鋊丸塊 MASSA HYDRARGYRI, U. S PILULA HYDRARGYRI, B. P 詳見鋊篇

大黃 RHEUM. U. S. RHEI RADIX, B. P. 此係一類植物、產於中華西藏美國等處、入藥者乃其根、內含數塩一酸、惟此酸可入藥用。

體功效 有醫者云、此藥感膽液之能無常、亦有醫者云、服後必增其膽液、究之此藥原有斂力、故無重瀉之能、然有令人思食、助消化、補育道等功、常服者、反致大便乾結。

療效 如欲輕瀉、兼激胃經、此爲妙劑、良方如左。

大黃散	G-Pulveris rhei	二十英厘	(1.3)
衣必格散	Pulveris ipecacuanhæ	二英厘半	(0.15)
鈉氫碳强鬱	Sodii bicarbonatis	一百英厘	(6.6)
馬前子膏	Extracti nucis vomicæ	二英厘	(0.12)

分劑、亦可見效、因服之者易患腸痙、故加鴉片酒或顛茄酒少許方可、如此二酒不便、可加丁香油一量滴、(0.06) 亦免此患。

蓖麻油調水 Mistura Olei Ricini, B. P. 一至二量兩 (30.0-60.0)

服法 此藥如係純淨、惡味畧輕、然過純則功效反減、服法甚多、無庸細述、只以常用者論之、如服時加洋苦杏仁油一或二滴、(0.06-0.12) 可解其味、若製成勻類用之、不但惡味不甚改變、且阻其瀉效、又法、先食薄荷糖一枚、服後再食一枚、可解其味、如以肉湯多加胡椒、或他類之味料、後將此油置於湯內、服之亦可、有著名醫者之良方如左。

℞-Olei ricini 蓖麻油 半量兩 (16.0)

Syrupi acaciæ 非洲糖漿 三量錢 (12.0)

Aquæ destillatæ 烝水 五量錢 (20.0)

Olei menthæ piperitæ 薄荷油 一量滴 (0.06) —M.

Sig. To be taken in one dose. 合勻一次服之。

更有服法、以此藥與甘油各半、加冬綠油少許服之、最善者、乃以此油十五至六十量

療效 此藥爲最和平之瀉劑、與鎂硫强鬱同、然鎂硫强鬱之效較速、且多祛血鹽、空腹服之、半至一句鐘、其效即顯、此藥必四至五句鐘、方能見效、入食爛菓、或腐肉、或他不潔之物、以致胃經不安、服之最爲妙劑、如致胃經甚覺發炎、服之亦可、若人誤吞杏核、櫻核、桃核等硬物、以致育道被惹、此藥有潤腸、與護泗膜之功、較鎂硫强鬱尤妙、孩童瀉症、常有泗液積於腸內、如先用斂藥、必致有損、宜先服此油、將積液瀉出、後服斂藥、方能有效、孕婦將產時、如先服此藥、瀉淨腸內之糞、亦與分娩有所輔助、人患熱症後常有大便乾燥者、服之有效、嬰孩或幼童大便乾燥者、常以此油醫之、論此藥不合人意之處、一因氣味不美、二因係油類、三因常用易患痔症、四因必日增其分劑、方能見效、如因食物惹育道致患瀉症、此藥瀉後有斂效故爲妙劑、如兼服鈉氫碳强鬱、瀉效尤大、近有醫者云、患偏系痛之頭痛、如日服小分劑常效、其效之所以然、人不得而知、或因此油有免血中毒之能耳。

藥製與分劑

蓖麻油 Olei Ricini 一至二量錢 (4.0-8.0) 爲孩童之劑、半至一量兩 (15.0-30.0) 爲成人之劑、以上雖係常用之分劑、然遇腸內積有惹力之物、欲令其瀉腹者、雖服尤小之

1 Diarrhœa
2 Parturition
3 Constipation
4 Irritative diarrhœa
5 Neuralgic headache
6 Toxæmia

藥製與分劑

硫 Sulphur 十至二十厘 (0.6-1.3) 爲改症之劑一至二錢、(4.0-8.0) 爲輕瀉之劑、夜晚服之、內加糖漿最妙。

硫糖果 Confectio Sulphuris, B. P. 十厘至二錢 (0.6-8.0)

硫餅 Trochiscus Sulphuris, B, P.

鍠硫粉 CALX SULPHURATA, 此藥有阻炎之功、亦有速於生膿之效、分劑一厘之十分之一、至二分之一、(0.006-0.03) 膿包痤[1]或他類皮生膿之患、此藥大效、生癤[2]不止者有效、如此藥不易得、可以刖皮烤焦、研成細末、日服一錢 (4.0) 亦效。

鍠硫粉糖消水 Liquor Calcis Saccharatus, B. P. 分劑十五至六十量滴、(1.0-4.0)

鍠泚 Calcii Hydras, B. P. 此乃石灰之末、

蓖麻油 OLEUM RICINI, 此藥乃由蓖麻子所出、內含一酸、名蓖麻酸。體功效 此藥令人瀉腹之故、人不盡知、或因其內所含之酸、或因油類原有瀉腹之力、如服洋橄欖油之大分劑、亦有輕瀉之效。

1 Acne pustulosa
2 Crops of boils.

於皮上、或泗膜上、有改症之效。

療效 此藥可用爲輕瀉劑、不可用爲重瀉劑、腸狹[1]患服之、可使腸內之糞柔輭易過患處大便乾結[2]、他瀉劑所不能醫者、此藥或可醫之、若兼有痔[3]症、服之尤妙、有醫者云、此藥能醫久痺[4]、或髖大系痛[5]等症、然未必盡效、氣腔炎[6]而痰盛者、日服三次、每服五至十厘、(0.3-0.6) 有祛痰之效、皮科用爲敷藥、較服尤妙、如將乾硫散敷於皮上少效、必以此散製成抹膏敷之、其效乃顯、但久用之、或有惹力、硫抹膏 Unguentum Sulphuris, 患疥[7]症者敷之、乃爲最妙之劑、夫疥蟲本分公母、公者寄於皮外、母者寄於皮內、公者易滅、母者難殺、病者必先沐浴其身、以鹼洗淨患處、用粗布擦乾、再敷此藥、方能滅盡、用畢之布、煮以滾水、免染他人、且用此法、宜在晚間、爲使此藥終夜存於患處、如此不過三次、則痊癒矣、幼婦行經時、常有腹腺炎[8]患、面顯黃色者、良方如左。

澱硫	℞-Sulphuris præcipitati	一英錢 (4.0)
濕羊毛脂	Adipis lanæ hydrosi	一英兩 (30.0) —M.

製成抹膏、日敷患處一或二次。S.—Apply once or twice daily.

1 Stricture of the bowel
2 Constipation
3 Hemorrhoids
4 Chronic rheumatism
5 Sciatica
6 Bronchitis
7 Scabies
8 Acne

黑根膏 Extractum Leptandræ, U. S. 一至八厘 (0.06-0.5)

黑根流膏 Fluidextractum Leptandræ, U. S. 五至四十量滴 (0.3-2.6)

黑根楠 (Leptandrin) 二至五厘 (0.12-0.3)

鎂碳強礬 MAGNESII CARBONAS, U. S. MAGNESIA PONDUROSA, B. P. MAGNESIA LEVIS, B. P. 此藥雖輕重不同、而其功效無別、輕者常作外敷之用、若作服劑、必須非常之多、方能有效、如對磨瘢皮症、或生汗過多者、敷之有效、重者常用爲改酸藥、昔日醫者謂其有瀉效、然實無瀉力、蓋因病者有胃酸之患、此藥與胃中之酸、化成一類之新礬、致有輕瀉之效也、若因胃存酸液、以致嘔吐[2]之頭痛者、服之有效、分劑五至六十厘 (0.3-4.0) 但不宜常服、恐積於腸內也。

鎂碳強礬消水 Liquor Magnesii Carbonatis, B. P. 分劑一至二量兩 (30.0-60.0)

硫 (SULPHUR.) 此質入藥者有三種、一升硫、Sulphur Sublimatum, 二淨硫、Sulphur Lotum, U. S. 三澱硫、Sulphur Præcipitatum, 此三類之硫、醫者多不能分清、升硫乃以硫用升法而得、淨硫乃將已升者以水洗之而得、(爲去淨所含之硫強酸也) 澱硫、乃以升過之硫、置於鍋內、加白灰氫氯酸與水等煮之、後用化法沉澱而得、三者之中、此爲最純。

體功效 此藥於身內、無甚顯效、服之者、能使大便成爲稀糜、且有非常之臭、若用之敷

1 Intertrigo
2 Sick headache

色不正之孩童、或因血虧、或因癆症、或不思飲食、或中耳有病、或身體無力者、此藥俱效、但宜久服。

洋澤漆流膏 Fluidextractum Stillingiæ, U. S. 十至六十量滴、(0.6-4.0) 製此藥時、宜用鮮根、乾者恐力不足也、

黑根 LEPTANDRA, U. S. 此藥係一類草根、產於美國。

體功效 有二醫者詳查此藥之體功效、謂服中分劑、必致肝液增多、過分劑、則腹瀉甚重。

療效 常用此藥之醫者、謂其於腸不消化症、大有醫之之能、或謂此類症乃因腸首段虛弱之故 良方如左、

藥製與分劑

印度龍膽草膏 E-Extracti chiratæ 二十英厘 (1.3)

Extracti leptandræ 二十英厘 (1.3) —M.

黑根膏

共成十丸、每餐後服一丸。Fiant pilulæ No. X. S.—One pill after each meal.

1 Intestinal indigestion

或臨睡時食此果、可免大便乾結之患。

洋澤漆 STILLINGIA, U. S. 此乃一類草根、產於美國。

體功效 此藥有速緩二效、其速效有使腸液頓增之力、緩效乃漸有改症之能、如服過分劑、有瀉膽液之力、心之跳動甚速、氣脘之泗膜生液亦多。

療效 此藥有增腸液之力、故大便乾燥者、服之有效、如肝失功用、且腸虛弱以致痔[2]症、此爲特藥、其良方如左。

洋澤漆流膏 Ex-Fluidextracti stillingiæ 五量錢 (20.0)

顛茄葉酒 Tincturæ belladonnæ foliorum 一量錢 (4.0)

馬前子酒 Tincturæ nucis vomicæ 一量錢 (4.0)

加拉巴豆酒 Tincturæ physostigmatis 一量錢 (4.0) —M.

每飯前以二十量滴、(1.3) 加水服之。

S.—20 drops in water t. i. d. before meals.

如兼大便乾燥、方內加阿羅少許亦可、重癢[3]症類、如與敵癢藥兼服、則可增其功效、面

1 Constipation
2 Hemorrhoids
3 Syphilis

藥製與分劑

洋鼠李流膏 Fluidextractum Rhamni Purshianæ U. S. Extractum Cascaræ Sagradæ Liquidum, B. P. 十至二十量滴、(0.6-1.3) 每晚服之、或早晚服之亦可、若用二十量滴 (1.3) 無效、宜用三十、(2.0) 若猶無效、與他瀉劑同服亦可、然分劑不可再增、恐有惹腸之患也、此藥味苦、人不喜服、如以流膏一分、加陳皮糖漿二分、庶能畧減其苦味。

洋鼠李香糖漿 Syrupus Cascaræ Aromaticus, B. P. 一至四量錢 (4.0-16.0)

洋鼠李膏 Extractum Rhamni Purshianæ, U. S. Extractum Cascaræ Sagradæ B. P. 二至八厘 (0.12-0.5)

洋杜仲 EUONYMUS, U. S. EUONYMI CORTEX, B. P. 此藥乃一類之草、產於美國、入藥者乃其根之皮、其效甚緩、不令人腹痛、有醫者謂、其效多行於肝經、故肝經畧失功用者、服之有效。

藥製與分劑

洋杜仲膏 Extractum Euonymi, U. S. 三至十厘 (0.2-0.6)

洋杜仲乾膏 Extractum Euonymi Siccum, B. P. 半至一厘 (0.03-0.06)

巷弭羅 TAMARINDUS, 此藥係一類樹果、產於東西印度伊及亞拉伯等處、入藥者乃其甕、常置於糖內用之、味苦而甜、瀉力無多、與他果品同、可入辛那糖果內、有人於飯後

1 Hepatic torpor

第十八章　論瀉藥類

甘露 MANNA, U. S.　此藥產於歐洲、係一類樹汁、曝乾而成者、其形與灰色非菏相類、味甜、亦有畧苦者。

療效　此藥爲輕瀉藥類中之最輕者、但服後或有腸胃發脹之虞、若食牛乳之嬰孩、大[1]便乾燥、可於每食牛乳時、加甜甘露一或二錢、(4.0-8.0)則免此患、無論孩童成人、欲使瀉腹、必與他類有力之瀉藥同服、此藥不過爲藥引而已、故常與大黃、辛那合用、辛那雜冲藥內、Infusum Sennæ Compositum, U. S. 亦有此藥、分劑一至四量兩、(30.0-120.0)

槐花壽 CASSIA FISTULA, U. S. CASSLE PULPA, B. P.　此藥乃係槐角、產於東西印度羣島、及中國廣西等處、入藥者乃角中之瓤、不宜單用、恐服之者有腸疒[2]之患、辛那糖菓內亦含此藥、輕瀉之分劑、半至一錢、(2.0-4.0)重瀉之分劑、半兩(15.0)

洋鼠李 RHAMNUS PURSHIANA, U. S. CASCARA SAGRADA, B. P.　此藥係一類矮樹、產於美國。

療效　此藥只可用之爲輕瀉劑、大便乾結而無他症者、服此藥之中分劑最妙、蓋用中分劑、不但無惹腸之患、且有補腸之功、不似他類瀉劑、令病者服後、大便猶易乾結也、故醫者每用之以醫大便久燥之患。

1 Constipation
2 Constipation

炎、並無他症、服無定體之阿甫莫非一厘之十五分之一、(0.004)竟至殞命。

芥 SINAPIS ALBA, U. S. SINAPIS, B. P. 此藥乃一類之菜、各洲皆有、入藥者乃此菜之子、研成細末、以此末一兩、(30.0)加溫水一杯、(180.0)服之有惹胃嘔吐之效、如分劑過大、則有胃炎之患、若以鈇硫强鬱三十厘、(2.0)加水二量兩、(60.0)服之亦有吐效、見鈇硫强鬱篇

瑪替開拉 MATRICARIA, U. S. 此藥係一類之草、入藥者乃帶花之梢、產於歐洲、其中分劑、有苦補藥之效、足分劑、有嘔吐殺蟲之功、曾有醫者、以此藥一至二兩、(30.0-60.0)加水一量磅、(480.0)製成沖藥服之、大分劑、有發表之功、微分劑、能醫孩童生牙之疳患。

過分劑、有阻此部之力。

呼吸部　服中分劑、與本部毫無關涉、毒分劑、乃令呼吸短而不勻。

嘔吐　此藥令人嘔吐之效、中某藥之毒者、如形狀不甚危險、亦可用爲吐藥、然宜謹愼、胃炎[1]與氣管泗膜炎[2]、無論中程、或日久不愈者、如用足分劑、所積之泗液、必能吐出、氣管新炎而乾嗽者、服小分劑、有平氣管泗膜之能、且有止嗽之效、酒狂者、或將成酒狂者、以一厘之三十分之一、(0.002)每三句鐘服一次、有平腦部之效、用如此小分劑者、爲免其嘔吐也。

用法　此藥川爲吐劑、宜以水化開、用空針射之、但當臨射時化開、早化者不宜用、其分劑、一厘之十分之一、(0.006)健壯者、或可用一厘之五分之一、(0.01)如用之祛痰、可服一厘之四十分之一至二十五分之一、(0.0015-0.003)此分劑爲免惡心之患也、孩童用之、多顯乖效、故不常用、所常用者、乃阿甫莫非氣鹽。

乖效　此藥少有乖效、然亦有用中分劑、而遍體被阻、腦力脫失者、曾有一婦人、氣管發

1 Catarrh of the stomach and air passages
2 Acute bronchitis
3 Delirium tremens

衣必格海葱丸 Pilula Ipecacuanhæ cum Scilla, B. P. 五至十厘 (0.3-0.6)

衣必格醋 Acetum Ipecacuanhæ, B. P. 五至三十量滴 (0.3-2.0) 爲祛痰之用。

阿甫莫非 (APOMORPHINA)

此藥乃以莫非與氫氯酸、置於嚴密鐵管內、燒之而成、色白、或淺灰、結微晶、遇空氣則成細粉、宜置於黑色瓶內、嚴密塞之、如以此藥製成消水、存之日久、最易改其體質、則不宜用、以其內含毒力也、醫者當切記之、按此藥之體質常有改變之時、如欲試之、可將此藥一分、加水百分搖之、越數分鐘、色如深綠、則不宜用、若所用之水含鋅少許、雖體質未改、亦顯綠色、故所用之水、務宜純淨、此藥原分二種、一結晶體、二無定體、所常用者乃結晶體、如服結晶者之過分劑、則有惹力、以致有抽搐痙狀、頭暈、覺系過度等患、若服無定體者之過分劑、則腦力脫失、身熱減少、遍體痲木、絡與呼吸二部、亦皆衰弱。

體功效 腦部 服中分劑、與本部毫無感能、大分劑、有激顱腦之力、毒分劑、必致脊腦被惹、令人抽搐。

絡部 服中分劑、乃使脉速而有力、血壓加增、因此藥有激速心系、並司絡腦所之能、

增重、然其瘧必漸癒、不越數日、嗓與咳嗽等患、俱見功效矣、或謂以衣必格散加水、調之成繞、以敷螫傷、可減其痛、且免紅腫。

藥製與分劑

衣必格糖漿 Syrupus Ipecacuanhæ, U. S. 半至一量錢 (2.0-4.0)

爲祛痰與孩童嘔吐之劑。

衣必格葡酒 Vinum Ipecacuanhæ, 半至一量錢 (2.0-4.0)

衣必格流膏 Fluidextractum Ipecacuanhæ, U. S.; Extractum Ipecacuanhæ Liquidum, B. P. 三十量滴 (2.0) 爲成人嘔吐之劑。

衣必格餅 Trochiscus Ipecacuanhæ, B. P. 每餅內有莫非一厘之三十六分之一、(0.002) 衣必格一厘之十二分之一、(0.005)

衣必格雜散 Pulvis Ipecacuanhæ et Opii, U. S. Pulvis Ipecacuanhæ Compositus, B. P. 五至十五厘 (0.3-1.0) 可爲尋常之劑、此散內有衣必格一分、鴉片一分、乳糖八分。

厄米汀 (Emetina) 一厘之十分之一、至六分之一、(0.005-0.01) 乃爲嘔吐之劑。

1 Stings of bees
2 Sore throat

效、若宿醉[1]而晨吐者、服之有效、然不若砒與氫氯酸爲妙、或言分娩時、宮[2]之縮力不足、每二三句鐘服衣必格葡酒十至十五量滴、(0.6-1.0) 其縮宮之效、與貴林同、新痢症、此乃最妙之品、大便過多且多帶血、似熱道之痢症者、空腹服無臭鴉片酒三十量滴、(2.0) 後服衣必格散三十厘、(2.0) 有效、蓋因鴉片酒有阻此藥嘔吐之力也、但宜躺卧、否則難以見效、越數句鐘、如見灰色之大便、乃痊癒之兆、其疼痛作燒便血等患、必皆減少、倘大便不見灰色、病勢必至加重、有著名醫者謂、患痢症者、雖身體甚弱、嘔吐昏譫、以上之方亦可用之、倘服後嘔吐、越二三句鐘、仍可依前再服、且於腹皮上用外惹內效之藥、然當兼服激藥類、免其過於被阻也、似癨症、有醫者云、每二句鐘服衣必格散三厘、(0.2) 有效、但須兼服無臭鴉片酒五量滴、(0.3) 以免嘔吐之患、咳血症、此藥之微分劑有效、無論何處鬱腔流血、此藥有止之之效、氣腔新炎症、能平氣腔泗膜、且能激之生液、若與鉄檸檬並服、其效尤妙、有著名醫者云、冬季[3]氣腔發炎[4]、兼有瘧症者、可將衣必格葡酒、以噴霧具噴於口內常效、但初用時宜用力小者、即此藥之葡酒、加水與醇酒各等分、且不宜用之過三或四分鐘之久、後漸加此藥之葡酒、以增其力、用時病者每數分鐘、宜以水漱口、以免其藥下咽、否則必有嘔吐之患、初次用之、嗓中或見

1 Morning vomiting of drunkards
2 Uterine inertia
3 Acute dysentery
4 Cholera morbus
5 Hæmoptysis
6 Capillary hemorrhage
7 Acute bronchitis
8 Winter bronchitis

第十七章　論吐藥類

衣必格　IPECACUANHA, U. S. IPECACUANHÆ RADIX, B. P.

此藥係一類小樹之根、產於巴西國、內含一鹼一酸、鹼名厄米汀、酸名衣必格酸。

體功效　此藥敷於泗膜、則有惹力、敷於皮上、久必起皰、服微分劑無效、大分劑、則有惡心、嘔吐、疲倦、氣脘生液、口涎過多等患、其嘔吐之故有二、一因有惹胃之力、二因有激延腦中嘔吐司所之能、且此藥並有阻脊腦之力、如不嘔吐而被陳者、亦有阻心之患、試將其鹼之毒分劑、令禽獸食之、必致呼吸停止、因而殞命。

祛　此藥由腎經、大便、泗膜、皮膚而祛。

療效　此藥嘔吐之效較速、嬰孩飲食過度、乃爲上品、中毒者服之、不爲妙劑、緣鈺硫强罌、或芥末等吐藥、較此藥尤速也、嬰孩氣脘炎[1]症、痰不能外吐而下咽者、以致胃經常失功用、若服衣必格糖漿二至三量錢、(8.0-12.0)可使其痰吐出、且有醫肺之功、如所服之分劑、不足使之嘔吐、則有瀉效、胃中之痰、即由大便而祛、胃經被阻、而嘔吐[2]不止者、每半句鐘服一厘之八分之一、至四分之一、(0.008-0.016)至六七次爲止、其惹力可使胃經復原、而止其嘔吐、如因胃經發炎、或被惹之故、此藥毫無功效、孕吐[3]者、如上服之、或

1 Bronchitis
2 Obstinate vomiting
3 Vomiting of pregnancy

馬兜鈴酒 Tinctura Serpentariæ, 三十至六十量滴 (2.0-4.0) 此藥亦入於辛寇那雜酒內。 Tinctura Cinchonæ Compositæ

馬兜鈴冲藥 Infusum Serpentariæ, B. P. 半至一量兩 (15.0-30.0)

蘭草 EUPATORIUM, U. S.

此乃一類之草、入藥者乃其葉、與帶花之梢、產於美國、世人常以此作激胃、或發表之用、人虛弱而厭食者、以此草製成冲藥、乘熱服之有效、因傷風而經閉者、服之亦效、按此藥之味甚惡、故有人製成冲藥、俟冷服之、作爲吐劑、但必至十六量兩 (480.0) 之多、方能奏效。

蘭草流膏 Fluidextractum Eupatorii, U. S. 分劑三十至六十量滴 (2.0-4.0)

1 Arrested menstruation

辣椒脂柵 Oleoresina Capsici, U. S. 一厘之四分之一、至四分之二、(0.015-0.025)

辣椒流膏 Fluidextractum Capsici, U. S. 一至三量滴 (0.06-0.2)

辣椒貼膏 Emplastrum Capsici, U. S.

辣椒抹膏 Unguentum Capsici, B. P.

白柴油 OLEUM CAJUPUTI, 此藥產於謀勒克羣島、係一類所含之精油、其氣易散、中分劑、有激泗膜之能、過分劑、有惹泗膜之力、其效與祛風藥同、並有殺寄生之功、髮錢癬[1]、以此藥敷之有效、但宜加謹愼、恐有惹皮之患、用之殺虱[2]亦可、盟瀉[3]症、服之有效、分劑十至二十量滴。(0.6-1.3)

白柴浮酒 Spirtus Cajuputi, B. P. 分劑三十至六十量滴 (2.0-4.0)

馬兜鈴 SERPENTARIA, U. S. SERPENTARIÆ RHIZOMA, B. P. 此乃一類之草、產於美國、入藥者係此草之根。

療效 因此藥味美而煖、故常用爲引藥、且有補藥之力、胃經虛弱、食物不化者、多以此藥醫之、或言此藥有激陰陽之力、然不甚確、如服過分劑、惹力甚大、必有吐瀉之患。

藥製與分劑

馬兜鈴流膏 Fluidextractum Serpentariæ, U. S. 十至四十量滴 (0.6-2.6)

1 Tinea tonsurans
2 Pediculi
3 Serous diarrhœa

症、有免尿胎[1]之功、腎新炎症忌用、如腎經被阻而無他患者、服辣椒酒五至二十量滴、(0.3-1.3)則有利小便之功、嗓痛[2]或喉門枷炎[3]等症、以此酒與甘油各半、用棉蘸之、敷患處有效、腭垂鬆軟[4]者、用以上之方加水、作爲漱藥有效、育道被阻時、服他藥而不被味者、如兼服此藥以激育道、可助其味藥之功、若敷於皮上、其處必紅、而有外惹內效之力、最妙之用法、乃將食水紙蘸辣椒酒、俟乾再蘸、如此數次、末後當潮潤時敷患處、用布捲裹之有效、痺[5]或腰痺[6]症、用此藥之貼膏有效、頭痛[7]如貼項上亦效、患凍瘃[8]者、如皮未破、以此酒敷之或效、有著名醫者、醫凍瘃之法如左、以辣椒一分、加煉酒二分、置於溫暖處數日、再以非菡加水、製成糖漿之形、與所備之辣椒酒各一分、合勻刷於薄紙上、俟乾再刷、至有光面爲止、用時蘸水敷患處、不但止癢、且有大效、於扭傷[9]或骨節痺[10]如法用之亦效。

藥製與分劑

辣椒散 (Pulvis Capsici) 一至二厘 (0.06-0.12) 加於飯內、或成丸服之。

辣椒酒 Tinctura Capsici, 五至十量滴 (0.3-0.6)

1 Albuminuria
2 Sore throat
3 Tonsillitis
4 Relaxed uvula
5 Rheumatism
6 Lumbago
7 Headache
8 Chilblains
9 Sprains
10 Rheumatic joints

經亦痛、若服過大之分劑、腎則發炎、尿脬淋漓刺痛、服中分劑者、或謂其有激絡部之能。

療效 胃弱症[1]、或因週身衰憊、或因食物不當、或因飲酒[2]過度、此藥爲上品、惟酒後嘔吐者忌服、緣其胃經已被酒惹、如再服此藥、是益增其惹力也、倘宿食不化、服之有效、飲酒未成重癮者、服此藥胃經必煖、或可爲戒酒之助、每四五句鐘、宜服辣椒酒三至五量滴、(0.2-0.3) 或以辣椒脂棉半至一厘、(0.03-0.06) 成丸服之均可、並有良方如左。

辣椒酒 ℞-Tincturæ capsici 九十量滴 (6.0)

無臭鴉片酒 Tincturæ opii deodorati 二量錢 (8.0)

熾氣弱浮酒 Spiriti ætheris nitrosi 四量錢 (15.0)

拉芬大雜酒 Tincturæ lavandulæ compositæ, q. s-ad 加至四量兩 (120.0) —M.

每四五句鐘服二量錢 (8.0) S.—Dessertspoonful every four or five hours.

年老或年壯者之腸胃氣痞[4]症、此藥非只有散氣之效、且有免腸內積氣之功、低熱[5]症、有腎[6]者用之爲激藥、然果否有效、不得而知、如病勢漸愈、不思飲食、服之有效、

1 Atony of the stomach
2 Alcoholism
3 Subacute alcoholism
4 Flatulent colic
5 Low fevers
6 Chronic nephritis

蜜玫瑰 Mel Rosæ, U. S. 此藥能解藥之惡味、且有激胃之功、如加於常服之藥內、則胃反受其阻、故不常用。

胡椒 PIPER, U. S. PIPER NIGRUM, B. P. 此乃一類樹所結之子、產於印度加拉巴玻羅暹羅等處、內含一精、名胡椒精。

療效 此藥可敷於皮上、作外惹內效之用、亦可爲祛風、或激育道之用、胱與尿腔之泌膜虛弱者、服之有效、然有白濁新症者忌服、服之必增其患、腸氣脹者、服之大效。

藥製與分劑

胡椒精	Piperina, U. S.	一至五厘 (0.06-0.3)
胡椒脂脯	Oleoresina Piperis, U. S.	一量滴之四分之一至二量滴 (0.015-0.1)

常以此藥加於輕瀉丸內用之、以免腸疳[1]之患。

胡椒糖菓	Confectio Piperis, B. P.	一至二錢 (4.0-8.0)

辣椒 CAPSICUM, U. S. CAI SUM FRUCTUS, B. P. 此藥乃一類草所結之角、產於亞非利加之熱道、與中亞美利加等處、入藥者形似羊角、其色甚紅、嘗之味辣、內含一紅色流質之精。

體功效 此藥敷於皮上、其處必紅、如敷於泗膜、則必起皰、久服過分劑者、胃炎作痛、肝

1 Intestinal flatulence

水送下方可。

薑酒 Tinctura Zingiberis, 二十至百二十量滴 (1.3-8.0)

薑糖漿 Syrupus Zingiberis, 三十至百二十量滴 (2.0-8.0)

薑脂精 Oleoresina Zingiberis, U. S, 半至一量滴 (0.03-0.06)

必多加水送下、或成丸服之方可。

薑藥餅 (Trochisci Zingiberis) 此餅乃爲激口內涎腺之用。

蜜 MEL, U. S. 此乃蜜蜂釀成之物、入藥者、原爲解藥之惡味、如蜂只由一類花採取、則此蜜即有該花之味、且服之者、或顯出該花之體功效、亦或有因之中毒者。

療效 咳嗽而嗓口發乾者、以蜜與水各半合勻、漱之有效、蓋能使泗膜生液甚多、而積血之患減少也。

藥製

醋蜜 Oxymel, B. P. 此乃以蜜八分、加醋酸與水各一分所成、爲漱嗓之用、但常有加有力之斂藥而用之者、若加祛痰藥類、以爲祛痰之用、亦可。

煉蜜 Mel Depuratum, 此乃以冷布過濾、加甘油少許而成、

1 Cough

豆蔻雜酒 Tinct. cardamomi comp. 加至六量兩 (180.0) —M.

每飯後、服二量錢、 (8.0) S.—Dessertspoonful after each meal.

此方酸與酒並用、與常理不合、然所用之酸甚少、故所成之伊打無多。

藥製與分劑

豆蔻酒 Tinctura Cardamomi, U. S. 一至二量錢 (4.0-8.0.)

豆蔻雜酒 Tinctura Cardamomi Composita 同上

香散 Pulvis Aromaticus. U. S. 此散內有豆蔻。

薑 ZINGIBER. 此藥乃一類草根、產於中華印度與乍美喀海島等處、帶皮者色黑。去皮者色白、內含一類精油、其氣易散、且有一種香桶、泰西常用之爲祛風補胃之藥、婦人行經、宮轉筋之患、常用此藥醫之、如因受風而經閉者、服之大效、亦常加於瀉劑內用之、因其原有醫瀉症、免腸痧之力、並有改味之能也。

藥製與分劑

薑流膏 Fluidextractum Zingiberis, U. S. 十至三十量滴 (0.6-2.0) 必多用

1 Menstrual cramps
2 Diarrhœa

藥製與分劑

肉蔻油 Oleum Myristicæ, 一至二量滴 (0.06-0.2)

肉蔻酒 Spiritus Myristicæ, B. P. 一至二量錢 (4.0-8.0)

毒力 服過分劑者、必致中毒、其形狀與中印度麻者同。

派門他 PIMENTA, 此藥係本樹所結之菓、產於西印度羣島、內含一類精油、其氣易散、係香料、有改味之功、加於香料貼膏內亦可、如加於瀉劑內、可免腸痒之患。

藥製與分劑

派門他油 Oleum Pimentæ, 一至五量滴 (0.06-0.3)

派門他水 Aqua Pimentæ, B. P. 一至二量兩 (30.0-60.0)

豆蔻 CARDAMOMUM, U. S. CARDAMOMI SEMINA, B. P. 此藥乃一類草子、有苦補藥之力、且有香味、胃與小腸虛弱[1]者、服之有效、如與金酸類、或龍膽草等苦補藥類並用、其效尤妙、腸虛弱並缺少腸液者、良方如左。

淡氰強酸 D. Acid. nitric. dil. 一量錢 (4.0)

1 Atony of stomach and small intestines

療效 丁香油有祛風之效、瀉腹者、或服瀉劑者、如服此油少許、可免腸痙之患、有改味之功、亦有外惹內效之能、並有痲效、與殺寄生之力、肺癆症。飯後以此油五量滴、(0.3)置於藥壳內服之、並以此油五量滴、(0.3)加滅稚之洋橄欖油二十五量滴、(1.6)日射腹皮一次、雖受疼痛、而其效最妙、因其有滅稚之能也、陰虱之患、以此油敷患處、有殺之之能、與他精油類同、牙痛者、以此油一量滴、(0.06)滴於棉上、塞入牙竅內、則有痲效、肌痺症、以此油製成擦藥類擦之、有外惹內效之功、嘔吐不止者、若以此油半至一量滴、(0.03-0.06)加水服之、或效。

藥制與分劑

丁香油 Oleum Caryophylli, 一至五量滴 (0.06-0.3)

丁香冲藥 Infusum Caryophylli, B. P. 一至二量兩 (30.0-60.0)

毒力 服毒分劑者、先則睏睡、後則育道甚炎、終則呼吸被癱而死。

肉蔻 MYRISTICA, 此藥係本樹所結之菓、產於東西印度羣島、有平腦系部之能、與安睡之效、亦有改味之功、瀉症若與他藥同服有效。內含一類精油、其氣易散、名肉蔻油、Oleum Myristicæ, 此菓之外皮、名肉蔻花。

1 Diarrhœa
2 Tuberculosis
3 Pediculus pubis
4 Toothache
5 Myalgia
6 Excessive vomiting
7 Serous diarrhœa

而不止者、服此油有效、此油大有免腐之力、以一至三量滴、(0.06-0.2) 加水一量兩、(30.0) 敷傷處有效、白濁[1]症、可射於尿胞內、初患時用之尤妙、洋桂酸、乃以化法由洋桂油而得、曾有醫者以之醫肺癆[2]症、用法、以此酸二量滴、(0.12) 射於皮內、病者雖覺疼痛、越片時即止、後有身倦、頭暈、顱腦積血等患、此患已過、可再射之、並遞加其分劑、至十五量滴 (1.0) 爲止、越三四十日、咳嗽減輕、身體增重、但射時多受疼痛、故用之者少。

藥製與分劑

洋桂油	Oleum Cinnamomi,	一至五量滴 (0.06-0.3)
洋桂水	Aquæ Cinnamomi,	一至二量兩 (30.0-60.0)
洋桂浮酒	Spiritus Cinnamomi,	五至三十量滴 (0.3-2.0)
洋桂香散	Pulvis Aromaticus, U. S. Pulvis Cinnamomi Compositus, B. P.	成人三十厘 (2.0) 孩童十厘 (0.6) 乃以洋桂 (35.0) 肉蔻 (15.0) 豆蔻 (15.0) 薑 (35.0) 等藥相合製成、在英揀藥册內無肉蔻、孩童成人之腸胃脹患、皆可服之。

丁香 CARYOPHYLLUS, U. S.
CARYOPHYLLUM, B. P. 此乃一類樹之花蕾、產於東西印度羣島、嘗覺俱有香味、初採者色黃、後則漸變爲深灰、內含一類之精油、其氣易散、名丁香油。

1 Gonorrhœa.
2 Tuberculosis.

藥製與分劑

甘洋杏仁勻藥 Emulsum Amygdalæ, U. S. Mistura Amygdalæ, B. P. 半至一量兩 (15.0-30.0)

甘洋杏仁糖漿 Syrupus Amygdalæ, U. S. 一二量錢至一量兩 (8.0-60.0)

甘洋杏仁散 Pulvis Amygdalæ Compositus, B. P. 一至二錢 (4.0-8.0)

洋杏仁油 Oleum Amygdalæ Expressum, U. S. Oleum Amygdalæ B. P. 一至四量錢 (4.0-16.0) 此油無論將甘或苦杏仁用壓力而得、實無毒力。

苦洋杏仁油 Oleum Amygdalæ Amaræ, U. S. 半量滴 (0.03) 此油乃用烝法而得、大有毒力。

苦洋杏仁消水 Aqua Amygdalæ Amaræ U. S. 三十至六十量滴 (2.0-4.0) 此消水乃以苦杏仁油製成。

洋桂 CINNAMOMUM SAIGONICUM, U. S. CINNAMOMUM ZEYLANCUM, U. S. CINNAMOMI CORTEX, B. P. 此藥乃一類樹之內皮、產於西倫島與中華等處、內含一類精油、其氣易散、並含炭匿酸、服毒分劑而殞命者、以其攤人之呼吸也。

療效 此藥之大用有三、一味香、二祛風、三激腸、瀉症、服之以激其腸有效、宮流血緩

1 Serous diarrhœa
2 Uterine hemorrhage

藥製與分劑

洋郁李冲藥 Infusum Pruni Virginianæ, U. S. 半至一量兩 (15.0-30.0)

洋郁李流膏 Fluidextractum Pruni Virginianæ, U. S. 半至一量錢 (2.0-4.0)

洋郁李糖漿 Syrupus Pruni Virginianæ, 半至一量錢 (2.0-4.0)

洋郁李酒 Tinctura Pruni Virginianæ, B. P. 半至一量錢 (2.0-4.0)

洋杏仁 AMYGDALA AMARA AMYGDALA DULCIS 此藥有甘苦二種、如以苦杏仁加水、即釀出氰藍酸少許、甘杏仁則不然、如以甘杏仁加水搗勻、其味甘美、可作引藥之用、患糖尿[1]者、可以甘杏仁數兩、去淨其中之油糖類、製成面包用之、因其內無氰也、（詳見備病者飲食章）腸胃受惹[2]或氣管[3]與喉[4]受惹者、以甘杏仁製成勻藥服之、有平泗膜之功、製法、以甘杏仁半兩、(16.0) 非滿三十厘、(2.0) 白糖二錢、(8.0) 相合搗爛、加烝水八量兩、(240.0) 調勻隔渣而成、苦杏仁內含一類之油、油內有氰藍酸百分之二至四不等、故大有毒力、如以一量滴 (0.06) 毒貓、可使之立死、曾有服十七量滴 (1.12) 而殞命者、按苦杏仁之功用、乃醫咳嗽症、但不常用、因其毒力甚大也、如製成勻藥、可作藥引之用、患白濁症者、用之最妙、因其兼能醫小便燒痛也、其製法與甘杏仁勻藥之製法同。

1 Diabetes mellitus
2 Irritation of stomach and intestines
3 Irritation of air-passages
4 Irritation of pharynx

加林啤酒 Tinctura Calumbæ, 半至二量錢 (2.0-8.0)

加林啤冲藥 Infusum Calumbæ, B. P. 半至一量兩 (16.0-30.0)

加林啤濃消水 Liquor Calumbæ Concentratus, B. P. 半至一量錢 (2.0-4.0)

印度龍膽草 CHIRATA, 此草產於印度、亦係苦補藥類、因無炭匿酸含於其中、故可與鐵類同用、頗有感肝之能、如因肝失功用、以致胃不消化、亦不思食、並大便乾燥者、此藥有效。

藥製與分劑

印度龍膽草散 (Pulvis Chiratæ,) 二十厘 (1.3)

印度龍膽草流膏 Fluidextractum Chiratæ 半至一量錢 (2.0-4.0)

印度龍膽草酒 Tinctura Chiratæ, B. P. 半至一量錢 (2.0-4.0)

印度龍膽草膏 (Extractum Chiratæ) 二至四厘 (0.12-0.25)

印度龍膽草冲藥 Infusum Chiratæ, B. P. 一量兩 (30.0)

印度龍膽草濃消水 Liquor Chiratæ Concentratus, B. P. 一量錢 (4.0)

洋郁李 PRUNUS VIRGINIANA, U. S. PRUNI VIRGINIANÆ CORTEX, B. P. 此樹產於美國、入藥者乃該樹之皮。

療效 泰西人常以此皮製成冲藥、爲補身之用、如製成糖漿、乃祛痰藥類之引藥也。

1 Torpid liver
2 Dyspepsia

加林啤根 CALUMBA, U. S. CALUMBÆ RADIX, B. P.

此藥乃一類樹根、嘗之味苦、嗅之畧香、內含二質、一名畀耳畀林、(Berberina) 一名加林啤印、(Calumbina) 此外又有加林啤酸。(Calumbic Acid)

療效 此藥乃補藥中之上品、無炭匿酸含於其中、故無斂力、可與鐵藥並用、熱症後腸胃失其功用、或暑瀉盟瀉等症後、而身體輭弱者、此藥有效、有著名醫者、治腸失功用之良方如左。

加林啤散 R. Pulveris calumbæ 半英兩 (16.0)

薑散 Pulveris zingiberis 半英兩 (16.0)

辛那葉 Sennæ foliori 一英錢 (4.0)

滾水 Aquæ bullientis 十六量兩 (480.0) —M.

製成冲藥、日服三次、每服二英兩。(60.0)

Fiat infusum. S.—A wineglassful t. i. d.

藥製與分劑

加林啤流膏 Fluidextractum Calumbæ, U. S. 十五至六十量滴 (1.0-4.0)

1 Gastro-intestinal atony

療效 各類苦補藥中、此爲上品、患熱症後而厭食者、[1]癲症、[2]及染瘴症[3]而精神久失者、胃[4]不消化者、服之俱效、孩童育道泗膜炎症、[5]與鈉氫碳强礬並服、大效。

藥製與分劑

龍膽草雜酒	Tinctura Gentianæ Composita,	一至二量錢 (4.0-8.0)
龍膽草流膏	Fluidextractum Gentianæ, U. S.	半至一量錢 (2.0-4.0)
龍膽草膏	Extractum Gentianæ,	一至八厘 (0.06-0.5)
龍膽草雜冲藥	Infusum Gentianæ Compositum, B. P.	一至二量兩 (30.0-60.0)

熱症後厭食者、良方如左。

淡皇强酸	℞-Acid. nitro-hydrochlor. dil.	一或二量錢 (4.0-8.0)
馬前子酒	Tinct. nucis vomicæ	一量錢 (4.0)
豆寇雜酒	Tinct. cardamomi comp.	二量兩 (60.0)
龍膽草雜酒	Tinct. gentianæ comp.	加至四量兩 (120.0) —M.

每飯後服一小勺、(4.0)以水送下。

S.—Teaspoonful in water after meals.

1 Anorexia
2 Gout
3 Malarial poisoning
4 Dyspepsia
5 Catarrh of the alimentary canal

第十六章　論激胃藥類

瓜沙 QUASSIA. 此藥乃係瓜沙樹之木、產於西印度羣島、有苦補藥之效、患癆熱症後而厭食[1]者、醫者常用此藥大效、或謂其能醫癆熱症、然不足爲憑、胃不消化、飯後有噫噎之患者、如因胃經[2]被阻服之有效、將此藥製成冲藥、射於肛內、有殺蟯蟲[3]之能、但先以吊水筒洗淨肛內、後以此藥一至二兩、(30.0-60.0) 加水十六兩、(500.0) 射之、存至十分鐘之久、如此數次、蟲必殺盡矣。

藥製與分劑

瓜沙酒	Tinctura Quassiæ,	半至一量錢 (2.0-4.0)
瓜沙流膏	Fluidextractum Quassiæ, U. S.	半量錢 (2.0)
瓜沙膏	Extractum Quassiæ, U. S.	一至三厘 (0.06-0.2)
瓜沙冲藥	Infusum Quassiæ, B. P.	半至二量兩 (16.0-60.0)

製法、乃以瓜沙一錢、(4.0) 加水十量兩、(300.0) 泡至一日、方可用之。

瓜沙濃消水 Liquor quassiæ concentratus, B. P. 一量錢 (4.0)

龍膽草 GENTIANA, U. S. GENTIANÆ RADIX, B. P. 此草產於歐洲、入藥者乃該草之根、嘗之味苦。

1 Anorexia
2 Dyspepsia
3 Oxyuris vermicularis

早晚服半量兩、(16.0)
S.—A tablespoonful morning and evening.

又方

厄司阿金 R-Exalgini 二十英厘 (2.0)
葡萄酒 Spirit. frumenti 半量兩 (16.0) —M.
化後加 Fiat solutio et adde

糖漿 R-Syrupi simplicis 一量兩 (30.0)
蒸水 Aquae destillatae 四量兩 (120.0) —M.

早晚服半量兩、(16.0)
S.—Tablespoonful night and morning.

延纏之痺[1]或痧[2]症之腰痛[3]、如日服此藥四厘、(0.25)撒婁五厘、(0.3)三或四次、有效。更有乳寇吞 ("Lactophenin") 與錫托芬 ("Citrophen") 二藥、其體質與此藥相同、分劑亦同、乃五至十厘、(0.3-0.6)宜日服三次。

芬歐蔻氣塩 (PHENOCOLL) 此藥之功用與體質、皆與芬阿西吞相似、分劑五至八厘、(0.3-0.5)日服二至五次。

厄司阿金 (EXALGINE)

此藥之效與阿司炭尼利相同、但無退熱之力、脊腦後柱硬之疼痛、此藥有效、初用之分劑、乃二至四厘、(0.12-0.25)久服者、一日不宜過十五厘、(1.0)早晚分服、有醫者云、作燒者不宜服、醫系痛[5]症之良方如左。

厄司阿金	R-Exalgini	三十英厘 (2.0)
甘陳酒	Tincturæ aurantii dulcis	二量錢 (8.0) —M.
化後加	Fiat solutio et adde	
陳糖漿	R-Syrupi aurantii	半量兩 (16.0)
薄荷水	Aquæ menthæpiperitæ	加至四量兩 (120.0) —M.

1 Subacute rheumatism
2 Influenza
3 Lumbago
4 Pain of locomotor ataxia
5 Neuralgia

服過分劑者、於血無甚關係、否則血色混黑、尿色深黃、如將此尿置於非令消水內、似有含糖之狀。

療效 此藥之大用有二、一退熱、一止痛、因醫者初用爲退熱、故先論其退熱之效、作燒者、如服三至八厘、(0.2-0.5) 越半句鐘、其效即顯、而能存至四至八句鐘之久、尋常之燒症、服之則無生汗過多之弊、但肺癆症、與腸熱症之晚程服之、或有汗生不止、或熱度過減者、故雖有退熱之效、不宜多用、以其易於致損也、患熱症者、以海絨蘸冷水擦其身最妙、其止痛之效、凡頭痛[2]、偏頭痛[3]、過用眼力之頭痛[4]、脊髓後柱硬症之痛[5]、併間系痛[6]、及痹[7]等症、此藥皆效、此等症、安替派林所不能醫者、此藥或可醫之、醫系痛[8]之良方如左。

芬阿錫苓 R. Acetphenetidini, U. S. Phenacetini, B. P. 十英厘 (0.6)

加非印檸檬 Caffeinæ citratæ 五英厘 (0.3)

錶氫溴 Strontii bromidi 二十英厘 (1.3) —M.

分作五包、每二句鐘服一或二包、至痛止爲度。

Pone in capsulas, No. V. S. One or two capsules every hour while the pain lasts.

1 Fever
2 Headache
3 Migraine
4 Eye-strain
5 Pains of tabes
6 Intercostal neuralgia
7 Rheumatism
8 Neuralgia

因分劑過大之故、亦有敷乾散而中毒者、然不多見。

毒力　服毒分劑者、唇藍而紫、先則額與頰生汗、後則遍滿全身、脉弱而緩、後必甚微、至此則呼吸短速、其解法、宜服顛茄、以增其血壓之力、服士的年、以激其呼吸之功、如其皮色甚紫、則宜用吸氧與煖身之法。

積毒　或謂久服足分劑、並無乖效、此言殊謬、蓋久服足分劑者、毒力存於肝腎脾等經、以致有積血之患、且其血紅朕愈久愈減。

芬阿錫吞 ACETPHENETIDINUM, U. S. PHENACETINUM, B. P.

此藥由煤澔用化法而得、結晶、形如鱗片而發光、臭嘗俱無味、水畧能化之、製藥者如不精心泡製、於腎經甚有惡力、且有他類之乖效、藥行以其價昂、每以阿司炭尼利、或安替派林充售、欲知其眞僞、可以氰弗酸加於藥內合勻、至變黃色、置於火上熱之、黃色不改者乃眞、若考驗其純否、可以哥拉五厘、(0.3)置於試物筒內、於火上熱之、僅至化開爲止、再以此藥一厘、(0.06)加於其內、如係純者、先有紫色、後變紅色、終變藍色、不然則不能有此三等改變。

體功效　此藥有平腦系部之效、其正感乃行於脊腦覺徑、且有減身熱度之力、無論健壯或作燒者、俱能減之、緣有阻身內生熱之力、且有佐祛熱之效也、如服之不久、並不

樟腦氣塩 Camphoræ monobromatæ 六英厘 (0.4) —M.

製成六丸、或分成六包、每半句鐘服其一、以冷水送下。

Fiant pilulæ vel chartulæ, No. VI

S.—Wash down with a little cold water.

此方不但止嘔、且有補心之能、癲症、以此藥散敷患處有效、破傷亦可敷之、或單用此藥、或與硼酸各等分合用、有免腐之功、肺患、以此藥製成消水洗之有效、咳血症、亦有用之者、但服此藥易於傷風、故患系痛者、冬令遠游、不宜服之。

藥製與分劑

阿司炭尼利 Acetanilidi 二至十厘、(0.12-0.6) 然常以十厘 (0.6) 爲過分劑、因此藥水不易化、故宜製之成丸、或置於藥壳內服之、其退熱之效、必至服後一句鐘方顯、各類系痛症、每服加樟腦氣塩半厘 (0.03) 其效尤妙。

阿司炭尼利雜散 Pulvis Acetanilidi Compositus, U. S 五厘、(0.3) 如病者腎經積血、忌服。

免腐 此藥有免腐之效、而無滅癘毒之功。

乖效 此藥如謹愼用之、少有乖效、有醫者查明、顯乖效者、三十八人中、殞命者三人、皆

1 Chancroids 2 Wounds 3 Epistaxis 4 Hæmoptysis

汗、而其退熱之功仍在也。

腎　每有醫者、謂服此藥者、尿中必多含酸質。

祛　此藥歸腎而祛、服後約二十四句鐘祛盡。

療效　此藥用爲退熱之劑、宜先查明病勢、倘身體甚弱、不爲妙劑、腸熱症、雖有退熱之效、然有時服後精神減少、或腦力脫失者、可知此藥之力、但能退熱、不能醫該症也、肺癆症、服之亦然、且生汗更甚、皮膚多有變紫者、[1]健壯者猝然作燒、此藥有效、且不致生汗過甚、故少有腦力脫失之虞、肺炎症、用之退熱、又爲妙劑、故近來用爲退熱者、歷年減少矣、[2]系痛症、此藥有止痛之效、[3]失和動之胃痛、[4]骶大系痛、[5]頭痛等症、常效、[6]癲症亦效、[7]痺症、不但退熱止痛、且有醫症之功、必用四至六厘 (0.25-0.36) 之大分劑、日服三次方可、[8]延纏之肌痺症、此藥大效、因用[9]蒙藥而嘔吐者、服之有效、用法、每半句鐘服一厘、(0.06) 至六厘 (0.36) 爲止、並有良方如左。

阿司炭尼利　R-Acetanilidi　六英厘 (0.4)

加非印檸礬　Caffeinae citrat.　三英厘 (0.2)

1 Sthenic fever
2 Neuralgia
3 Gastralgia of ataxia
4 Sciatica
5 Headache
6 Epilepsy
7 Rheumotism
8 Subacute muscular rheumatism
9 Vomiting after an anæsthetic

有漸次而顯者、所顯之時、乃一至三句鐘、最久不過三日、有醫者查明、服此藥而顯乖效者、百二十一人內殞命者六人、然究非因乖效、乃因有他病也、故服之者雖有險狀、亦不必過慮、但易致傷風、故冬令出游者不宜服。

毒力　中此藥之毒者、宜用阿刀便等激藥類、且用煖身之法、若皮甚變紫、宜用吸氣之法。

阿司炭尼利 ACETANILIDUM.

此藥乃以冰醋酸、與安呢林、相合製成、色白、結晶、形如砂粒、水畧能化之、醇酒伊打、最易化之、若敷於舌上、畧覺熱力。

體功效　腦部　此藥有平腦部之效、而多受其效者、乃脊腦之覺柱、與其覺系耳、服毒分劑者、全身痲木、失其激反應之功、且動覺二系亦俱被癱。

絡部　如未至毒分劑、於此部無甚關係。

呼吸部　中分劑、與此部無涉、毒分劑、呼吸必速而促、至呼吸司所被癱、則必殞命。

身熱度・服足分劑者、以常理論之、身之熱度必減、究不盡然、毒分劑、則熱度大爲減少、並有腦力脫失而寒顫者、如作燒者服之、因其有阻身內生熱之力、且有助其祛熱之功、故大有退熱之效也、夫熱之所以退者、非因發汗之故、曾有人用阿刀便、止其發

嗓喉炎[1]症、亦可以此法醫之、倘不先用寇卡印、必致重痛、若用此藥一或二分、加水百分、以代寇卡印噴之亦可、按此藥有止血之效、如以四分加水百分、製成消水、敷患處、或置於噴霧具內噴之有效、非因其有凝血之力、乃因其有縮小血脘之能也、如內加炭匿酸消水、二藥即相合而成澱、刷此藥於患處、其效尤妙、流血之痔症[2]、以此藥與寇卡印製成肛彈、用之有效、若不用寇卡印、射後必作痛片時。

分劑　此藥因水易化、故常以水送下、分劑二至二十厘、(0.12-1.3) 初用之分劑、三至五厘、(0.2-0.3) 最爲合宜。

不符之藥　此藥與鐵礬類、錄氯弱塩、錄氯强塩、俳醇、鈉柳礬、哥拉、衲透、炭匿酸、氯酒、俱不可合用、如以此藥加於燧氰弱酒內、初變藍色、後變深綠、故此二藥不宜合用、如欲試燧氰弱酒之力存否、可將此藥加於其內、倘不如上變色、則不宜用。

免腐　此藥之淡消水、有免腐阻釀之效、濃消水、有滅穢之功。

乖效　此藥最輕之乖效、手臉之皮色變紫、手生涼汗、足或至冰冷、亦有遍體生汗者、更有皮膚作癢、恍若蟻行者、然常顯之乖效、皮膚生癜、或起大皰也、婦人服之、其乖效較多於男子、若在中年者尤甚、四至十五厘 (0.25-1.0) 之中分劑、易顯乖效、有忽然而顯、亦

1 Laryngitis
2 Bleeding hemorrhoids

則可用此藥、惟肺癆症、此藥不爲妙劑、因其常令病者生汗過多、精神短少、有時似無退熱之效、亦有時其退熱效過大、病者至有腦力脫失之虞、中暍者、其退熱之效較少、故不宜用、總之無論何等熱症、此藥有暫時減燒之功、究無醫症之力、其止痛之效、雖不及鴉片所治之廣、然有數類重症、其效與鴉片同、且無鴉片之乖效、故較鴉片尤妙、系[1]痛症、如因痺癇二症所致、此藥爲上品、若因過用腦力、或因患他症而身弱所致、如與加非印及鉄氣塩同服、其效尤妙、患痺[2]症者、服之而見效者亦頗有之、非但有退燒止痛之效、且有醫症之功、然有時致生汗過度之患、曾有醫者、謂產婦服之、可免產痛之患、然此論未確、如產時疼痛過甚、服十五厘（1.0）或效、脊腦後柱硬症、若覺刺痛、且胃嘆兼有夾雜病、此藥爲上品、有醫者謂、糖尿[4]症服之大效、然其所以見效者、必因病者易犯癲症也、柳酸類亦能醫之、系[5]幹痛、射此藥於患處、則有痲效、其效可存數日之久、但射之之處、必作痛片時耳、癇[6]症有效、患啼嗽[7]症者服之、較用他藥尤有確效、分劑、五歲之孩童、每四句鐘服二厘、（0.12）如皮變紫色、則止而不服、然此藥僅能減其咳嗽之遍數、而病之輕重、與未服藥者無甚差別、瘧[8]症、此藥有退熱之效、無醫症之功、新鼻[9]嚏之患、如先將寇卡印消水、置於噴霧具內噴之、再以此藥四分、加水百分噴之、大效、

1 Neuralgia
2 Rheumatism
3 Locomotor ataxia
4 Diabetes mellitus
5 Hypersensitive nerve
6 Epilepsy
7 Whoopingcough
8 Malaria
9 Acute coryza

絡部　多有醫者、研究此藥、於禽獸之絡部、毫無關係、然人之絡部、如有虛弱之勢、醫者宜愼用之、有此藥之癖忌者、服之必致血壓之力減少、有暈仆之患、服毒分劑者、如不瘈瘲、則血壓之力亦減、如有瘈瘲、則血壓之力必增、醫者查明、服此藥而顯乖效者、每因分劑過大也。

呼吸部　服毒分劑而死者、因此部被攤之故、中分劑、於此部毫無關係、過分劑、則呼吸較常加速。

身熱度　人或獸如無他症、服中分劑、於身之熱度、無甚減少、如因作燒而服者、則熱度減少、緣其有阻司熱腦系之功、非因生汗之故、卽不生汗、熱度亦減耳。

腎　服此藥者、其尿較常爲少、且有護腑之功、故尿中少含氮渣。卽肌肉之渣

祛　此藥由腎而祛、且甚速。

療效　此藥之用有二、一退熱、二止痛、止痛之用爲最要、其退熱之效、必服足分劑數次方可、若小分劑雖勤服亦無效、倘用過分劑、必致熱度大減、或有腦力脫失之虞、低熱症忌用、肺炎[1]症、如甚作燒者、可用此藥、或以海絨蘸冷水擦其身尤妙、因冷水較此藥少有危險、而功效尤準、且腎力不廢、心經亦不受阻、紅熱[2]痘熱[3]二症、如不能用冷水者、

1 Pneumonia
2 Scarlet fever
3 Smallpox

安息香酒 Tinctura Benzoini, U. S. 三十至六十量滴 (2.0-4.0)

安息香雜酒 Tinctura Benzoini Composita, 一至二量錢 (4.0-8.0)

安息香酸餅 Trochiscus Acidi Benzoici, B. P.

鯨頭油抹膏 Unguentum Cetacei, B. P. 此膏乃以安息香鯨頭油等藥製成。

安息香猪脂 Adeps Benzoinatus, U. S. Adeps Benzoatus, B. P. 此猪脂不易敗味、製各種抹膏常用之。

安替派林 ANTIPYRINUM, U. S. PHENAZONUM, B. P. 此藥色白、其質細粉、由煤澁用化法而得、嘗之畧苦、覺之無味、水最易化之、醇酒、伊打、哥羅芳、亦能化之、服足分劑者、自覺耳鳴、頭脹、與服貴林同、身熱或減半度、但無異狀、服大分劑、或有惡心嘔吐之患、服過分劑、唇與指甲、畧變紫色、初覺寒冷、後則全身生汗、若原有作燒之症、汗出尤多。

體功效 試以此藥甚大之毒分劑、灌於禽獸、必致全身之肌鬆軟、激反應之功盡失、不能動轉、以至殞命、若僅灌毒分劑、有甚重痙攣二類之癥瘕、惟知覺尚存、其故因藥力行於大腦、而惹激反應之司所耳、蓋最大之毒分劑、則阻激反應、毒分劑、則增激反應也、然人服中分劑、因覺系與脊腦之覺所被阻、故激反應之能、亦大受其阻、如製成消水、射於皮內、或敷於泗膜、則甚顯痲效、且其效可存數日之久。

體質、故服他類柳礬、如顯惹胃之勢、可以此藥與撒婁或阿匹林、互相遞用、其惹力較阿匹林爲小、如醫痒[1]症、喉門[2]棚炎、腸[3]釀、系痛、[4]肌痺、[5]新痺、[6]等症、功用與撒婁阿匹林同、尋常之分劑、八至十五厘、(0.5-1.0) 成人之痺症、有能一日服至六十、或八十厘 (4.0-5-6) 者。

安息香 BENZOINUM

此藥乃樹之脂柄、產於俗門大拉玻羅加拉巴等處、內含一酸、名安息香酸、此酸有由他藥用升法而得者、但其惹力過大、不宜入藥。

體功效　如以安息香酸之濃消水、敷於泗膜、則有惹力、服過分劑者、畧覺胃內燒熱、有免腐滅稑之力、亦有服之而生團癜者、此酸由腎而祛、成爲馬尿酸。

療效　胱[7]久炎症、尿中如含鹼類、且內含硫礬者、服之有效、白[8]濁之晚程、安息香酸、與印度麻同服、有效、有著名醫者云、新[9]痺症、如日服二至三錢、(8.0-12.0) 乃爲特藥、其效與柳酸同、但宜用鈉安息香礬、因其易於消化耳、嗓[10]新炎而瘖啞者、以安息香雜酒半兩、(16.0) 置於滾水內、吸其氣大效、用時宜以布蒙頭、以免藥力散失也、但不可用噴霧具噴之、蓋因易塞其孔也、氣[11]脘久炎症、安息香酸有效、日服三次、每服十厘。(0.6)

藥製與分劑

安息香酸 Acidum Benzoicum, 十至四十厘 (0.6-2.6)

1 Influenza
2 Tonsillitis
3 Intestinal fermentation
4 Neuralgia
5 Muscular rheumatism
6 Acute articular rheumatism
7 Chronic cystitis
8 Gonorrhœa
9 Acute rheumatism
10 Acute laryngitis
11 Chronic bronchitis

撒婁分 (SALOPHENUM) 此藥色白、結晶、形如鱗片、水畧能化之所以入藥者因其較撒婁少有毒力、可代撒婁之用、於腸內被陳、與撒婁同、但含柳酸較少、每百分內含五十一分。

療效 此藥之用、與撒婁同、系痛症、[1]如與芬阿錫吞同服、乃爲妙劑、[2]延纏之痺症有效、分劑五至二十厘、(0.3-1.3) 日服三次。

阿匹林 (ASPIRIN) 此藥亦柳酸蠥類之一、色白、結晶似針、水百分、能化藥一分、鹼類之水、最易化之、所以入藥者、以其能代柳酸之用、在腸內消化、且在腸內被陳、故可用爲腸內之免腐藥、或謂此藥無惹胃之力、然服時不多用水送之服後必有胃痛之患、其味較他柳酸蠥類畧輕、人易服之、且服者少有耳鳴之患、[3]新痺症服之有效、分劑十至十五厘、(0.6-1.0) 日服三次、喉[4]門枌炎症初起時、以濕絮蘸此藥末敷之、每六句鐘一次、有效。

服法 可製之成丸、或置於藥壳內、或加非菡糖漿服之、但服時必先搖動其瓶。

耨阿匹林 NOVASPIRIN 此藥色白、形如細粉、嗅之無味、嘗之畧酸、水不能化、醇酒易化、每百分含柳酸六十二分、在入腸內能分成柳酸、茚他類之酸、人以爲在胃中不改其

1 Neuralgia
2 Subacute rheumatism
3 Rheumatism
4 Tonsillitis

效、喉[1]炎症、日服三次、每服五厘 (0.3) 有效、喉[2]炎久症、倘因血中含尿酸之故、如上服之、則有神效、腸[3]首段泗炎、或[4]癀泗炎等症、因其能免腸內食物作釀、故此藥爲上品、白[5]濁症、無論何程服之有效、因其由腎而祛、故尿時可滅尿脘之稚也、腸[6]不消化或腸內食物作釀等患、服之大效、若因食物於腸內變爲毒類、以致血[7]虧或血虧惡症、此藥有效、如因食物變毒而致瀉[8]症、亦爲妙品、因其有免腐之效、且不令大便乾燥、則毒不能存積、與服鴉片不同、似[9]癨症之良方如左。

撒婁	℞ Phenylis salicylatis, U. S. Salol, B. P.	一英錢 (4.0)
鉍氰下礬	Bismuthi subnitratis	二英錢 (8.0)
鎉碳强礬調藥	Misturæ cretæ	加至三量兩 (90.0) —M.

每二句鐘服二量錢、(8.0) 必先搖動其瓶。

S.—Two teaspoonfuls every two hours. Shake well

癨[10]症、近數年來、多以此藥爲上品、但宜置於藥壳內、或成丸服之分劑五至七厘、(0.3-0.5)

1 Sore throat
2 Chronic sore throat
3 Duodenal catarrh
4 Jaundice
5 Gonorrhœa
6 Intestinal indigestion
7 Mild or pernicious anæmia
8 Diarrhœa
9 Cholera morbus
10 Cholera

益、多有服過三十量滴、(2.0) 致胃失其功用者、有著名醫者云、痺[1]症以此油滴於絨布上、覆於骨節、再以油布裹之、不使藥力散失有效、又謂此效雖速、或有脫皸之患。

冬綠浮酒 Spiritus Gaultheriae, U. S. 分劑十至二十量滴、(0.6-1.3)

柳精 SALICINUM, 此精由柳皮用化法而得、結晶、嘗之覺苦、齅之無味、水二十八分、或醇酒三十分、俱能化藥一分、多有醫者醫痺[2]症、以代柳酸之用、且有以之醫瘅[3]症者、分劑每四句鐘、服五至四十厘、(0.3-2.6) 置於藥壳內、以水或牛乳送下、飯後服之尤妙。

撒婁 PHENYLIS SALICYLAS, U. S. SALOL, B. P. 此藥色白、結晶、形如砂粒、嘗之無味、齅之畧香、水不能化、醇酒能化、如以酒化後、傾於水內、則成勻藥之形、哥拜把、檀香油、松節油、亦能化之、醫白濁[4]症、每與以上三藥之一同用有效、此藥每百分內、含柳酸六十分、烯醇四十分、服之藥至小腸、一經胰腺之液、二藥必分、故服過分劑者、有中烯醇毒之形狀、如人日服五次、每次二十厘、(1.3) 即服烯醇四十厘、(2.6) 是爲過分劑也、有醫者查明、服足分劑者、有惹腎之患、故腎有新炎症者、忌服、然因服此藥而生患者卒鮮、痺[5]症若服柳酸、有惹胃之勢、則宜改服此藥、蓋因其於腸內被味、胃經毫不受惹、有醫者令人每句鐘服五厘、(0.3) 此係過分劑、若常服之、恐有傷腎之虞、若因傷風[6]而致肌痺[7]系痛[8]等症、此藥有

1 Rheumatism
2 Rheumatism
3 Influenza
4 Gonorrhœa
5 Rheumatism
6 "Cold"
7 Muscular rheumatism
8 Neuralgia

毒力　服毒分劑者、生汗不止、耳鳴且聾、目矇頭暈、熱度減少、大異尋常、脉微瞼垂、二目內對、後則全身被癱、便溺不覺、尿如青菓之色、先則呼吸畧速而有力、後則甚速而微、及至呼吸被癱、則殞命矣。

鈉柳鹺 SODII SALICYLAS. 此鹺易化、惹力較柳酸爲小、且其味不似柳酸之惡、體功效療效與分劑、俱與柳酸同。有醫者以此藥置於牛乳內、加胃凝梅少許、乳卽凝結成塊、藥則含於乳內、人服之胃不受惹、並免其惡味、有醫者常以鋰柳鹺代之、以其功效尤妙也。

燈柳鹺 (ETHYLIS SALICYLAS. 此藥乃無色之流質、其氣易散、嗅嘗俱有香味、功效與他柳鹺同、有醫者謂其少有乖效、分劑五至十量滴、(0.3-0.6) 置於藥壳內服之。

冬綠 (GAULTHERIA) 此藥係一類之草、產於美國、內含一油、名冬綠油、其氣易散、別具一種氣息、嘗之味香而熱、每百分中、含烯替柳鹺。Methyl Salicylas, 九十六分

體功效　因此油含烯替柳鹺甚多、故其體功效與柳酸同。

療效　此油之用有二、一改藥味、二醫痺症、可代柳鹺類之用、置於藥壳內、或滴於糖上、飯後服之、分劑十至百量滴、(0.6-6.6) 若服至六十滴、(4.0) 而不見效、雖再多服、恐亦無

1 Rheumatism

柳酸	R-Acidi salicylici	二十英厘	(1.3)
酵酒	Alcoholis	四十五量滴	(3.0)
安息香猪脂	Adipis benzoinati	二英兩	(60.0) —M.

藥散之良方如左。

柳酸	R-Acidi salicylici	十五英厘	(1.0)
糙散	Pulveris amyli	二英錢	(8.0) —M.

醫者欲驗病者之尿、若不得暇、可以此酸少許、置於尿內、免其體質改變、如驗尿含糖與否、則不可用、因此藥能使無糖之尿、形似有糖也。

乖效　服此藥者、或致頭痛耳鳴之患、故有中耳症、不宜輕服、恐使耳聾之患更重也、有服之皮膚生瘢、或皮膩腺炎者、亦有服之因眼視衣流血、以致目盲者、有醫者云、幼女服之、易有昏譫之勢、又有醫者云、常小產之孕婦忌用、服足分劑者、有時閉目則見異狀、其乖效難以盡述、然少有服之而殞命者。

凡癩症若日久不瘉、每兩內宜加此藥二十至三十厘、(1.3-2.0)

藥製與分劑　此藥之氣味、易令人惡心、且有惹胃之力、故常與他藥同服、良方如左。

柳　酸　℞ Acidi salicylici　二英錢　(8.0)

拉芬大雜酒　Tincturæ lavindulæ compositæ　六量兩　(180.0)

甘　油　Glycerini　二量兩　(60.0)　—M.

每四句鐘服半量兩。(16.0)　S.—A tablespoonful every four hours.

宜將此酸製之成丸、或置於藥壳內、以水或牛乳送下、否則必有惹胃之患、且宜飯後服之、服後如患耳鳴、可服鈉氯塩二十厘。(1.3)

柳酸抹膏　Unguentum Acidi Salicylici, B. P.　痼皮症、可以此膏敷之。

禁用之狀　腦衣炎、或腦衣積血、中耳炎、尿胎、腎經被阻等症、禁用。

免腐　此藥敷於傷口、有免腐之效、若傷處過大、不宜用之、恐藥被陳而中毒也、如燙傷[1]不甚大、以此藥一錢、(4.0)　加洋橄欖油八兩、(240.0)　敷之有效、瘰瘡[2]與癯瘡[3]類、有醫者以此酸製成抹膏、或研成藥散、敷之、抹膏之良方如左。

1 Burn
2 Soft chancres
3 Venereal sores

以火溫之、射入肛內、孩童減半用之。

S.—Warm and inject into the bowels. For a child reduce this one-half in all its parts.

足生臭汗[1]者、可以此藥撒之、並有良方如左。

柳酸	R.Acidi salicylici	半英兩 (16.0)
糙散	Pulveris amyli	半英兩 (16.0) —M.

撒於足上。S.—Apply to the feet.

手臉胞癬症[2]良方如左。

柳酸	R-Acidi salicylici	五至十英厘 (0.3-0.6)
糙散	Pulveris amyli	二英錢 (8.0)
鉛養散	Pulveris zinci oxidi	二英錢 (8.0)
軟煤油蠟	Petrolati, U. S. Paraffini molis, B. P.	半英兩 (16.0) —M.

敷於患處、S.—Apply locally.

1 Bromidrosis of the feet
2 Eczema

越數日、則釘胼脫落矣、但未敷之前、以熱水洗之方可、[1]鞍磨傷之良方如左。

柳酸	℞-Acidi salicylici	十英厘 (0.6)
安息香猪脂	Adipis benzoinati	一英兩 (30.0)

敷於患處。S.—Apply to sore part.

痺[2]症之骨節炎可以鈉柳鬻、或鈉氫碳强鬻、製成消水、以絨布蘸之、裹患處有效、或用柳酸抹膏敷之亦可、此法不但有益於患處、且有益於全身、蓋因此藥能陳入皮內也、胃鬆大、或胃洞炎[3]等症、病者如有嘔吐之患、所吐者[4]苴含[5]立方圓稚、此藥有敵該稚之效、成人腸內有蛔[6]虫者、每句鐘服此酸八厘、(0.5) 至四十厘 (2.6) 爲止、後服瀉劑、有效、醫蟯[7]虫之良方如左。

柳酸	℞-Acidi salicylici	三十英厘 (2.0)
鈉硼烘鬻	Sodii boratis	三十英厘 (2.0)
水	Aquæ	十六量兩 (480.0) —M.

1 Soreness from horseback riding
2 Inflamed rheumatic joints
3 Gastric dilatation
4 Gastric catarrh
5 Sarcinæ
6 Ascaris lumbricoides
7 Oxyuris vermicularis

十分、擦之有效、陰門或肛門作癢[1]之良方如左、

柳酸	R-Acidi salicylici	二英錢 (8.0)
蔻蔻脂	Olei theobromatis	五英錢 (20.0)
鯨頭油	Cetaceae	三英錢 (12.0)
肉蔻油	Olei myristicae	九十滴 (6.0) —M.

敷於患處。S.—Apply locally.

患釘胼[2]（俗名雞眼）者、以此藥一錢、(4.0) 加水一量兩、(30.0) 用絨布蘸敷、乃爲妙藥、又有良方如左、

柳酸	R-Acidi salicylici	三十英厘 (2.0)
印度麻膏	Extracti cannabis in dicae	五英厘 (0.3)
火棉酒	Collodii	半量兩 (15.0) —M.

以刷敷數層於患處。S.—Apply with a brush until a good coat is formed.

1 Pruritus of anus or vulva
2 Corns

療效　此藥之力、與貴林相類、醫者初用爲解瘧退熱之劑、未幾查明、此酸於瘧疾或退熱、並無大效、惟於痺[1]症甚效、且可止痛、但不能免此症之夾雜病、然服此藥、較不服者、少有夾雜病、蓋因其效甚速、則夾雜病無暇發作、（夾雜病乃心經與骨節帶累之患）非因其有免之之能也、且此藥於痺症、雖不能減作燒之熱度、而能減作燒之日期、患新痺症者、每四句鐘服藥十五至二十厘、(1.0-1.3) 至見功效爲止、若與鈉氫碳强礬十至十五厘、(0.6-1.0) 兼服、可免惹胃之患、而其效尤妙、更有服法、每晚七與九句鐘、服三十至四十厘、(2.0-2.6) 以牛乳送之、爲使病者在寢睡之時、藥力可行於週身、如病見瘉、不可止而不用、恐其病反復也、此藥於痺症雖有大效、然亦有服之頭痛生汗、而無效者、服此藥既無效、雖用他藥、亦難見效矣、有著名醫者查明、凡此類藥、俱有佐祛尿酸之能、其醫痺症之效亦緣於此、白濁之痺症少效、癘症無效、或有謂此藥於癲[2]症有效者、亦有謂爲無效者、其果否有效、尚無確據、延[3]纏痺症、服此藥而不見瘉者、可以鋏醋礬、或鋏檸礬代之、腰痺[4]骶[5]大系痛症、此藥大效、其醫系[6]痛之能、雖遜於芬阿錫吞、然常患痺症之偏[7]頭痛者、乃有神效、喉[8]門[9]棚炎症、曾有醫者以此爲特藥、如因痺癲等症而致、此藥尤有神效、但宜服小分劑、每句鐘用三厘、(0.2) 口[8]白瘍症、如至皰破之時、以此藥一分、加水二百五

1 Rheumatism
2 Gout
3 Subacute rheumatism
4 Lumbago
5 Sciatica
6 Neuralgia
7 Migraine
8 Tonsillitis
9 Stomatitis

胃瘍[1]症、近數年來、醫者常以此藥醫之、因其有止痛免腐凝血之能也、分劑二至四厘、(0.12-0.25) 置於藥壳內飯前服之。

柳酸 ACIDUM SALICYLICUM, 此藥昔由柳木用化法而得、近乃以排醇、鈉沘、碳氯强洽三者、用化法而得、色白、或成細粉、或結細晶、嘗之味甘而酸、色微紅者不宜用、因其不純也、水五百分、或醇酒四分、俱能化藥一分。

體功效 此藥之中分劑、畧有感腦部之力、並減激反應之能、且易使人有耳鳴之患、服毒分劑、有似癇之瘈瘲、因大腦被激也。

絡部 此藥畧有阻絡部之力、如病者虛弱、當愼用之。

呼吸部 尋常之分劑、與此部無甚感能、大分劑、畧有激此部司所之力、服毒分劑而殞命者、蓋因此部被癱也。

身熱度 此藥有退熱之效。

㖞 此藥於胃中變成鈉柳礬而被㖞。

祛 此藥由腎經大便及汗而祛、服後十至二十分鐘、以化法試其尿、則可見之、越三十六至四十六句鐘、則祛盡矣。

1 Gastric ulcer

面膚疽以防浸漶之患、良方如左。

喇瑣辛	R-Resorcinolis	七十五英厘 (5.0)
黃蠟與松香	Ceræ flavi et pulveris resinæ	一英錢半 (6.0)
洋橄欖油	Olei olivæ	酌加 —M.

敷患處之四圍。S.—Apply around diseased area.

髮內乾膩過盛者、良方如左。

喇瑣辛	R-Resorcinolis	一英錢 (4.0)
蓖麻油	Olei ricini	三十量滴 (2.0)
醇酒	Alcoholis	二量兩 (60.0)
月桂酒	Spiritii myrciæ	四量兩 (120.0) —M.

先以喀司替勒皂洗淨頭皮、擦之。

S.—Use as a lotion to the scalp, after washing with castile soap and water, once a day.

1 Epithelioma of the face
2 Seborrhœa capitis

之劑、但其力無多、故今少用之、其大用乃醫皮膚各症、癩[1]疥[2]等病之中程、或久症、良方如左、

唎瑣辛	℞-Resorcinolis	一英錢 (4.0)
鉦 羹	Zinci oxidi	一英錢 (4.0)
玫瑰消水抹膏	Unguenti aquæ rosæ	十英錢 (40.0) —M.

研勻置於火上熱之、至唎瑣辛融化爲止、以免皮膚受激、日敷二次。

S.—Apply twice a day to the part affected. After mixing the ointment heat it until the resorcinol crystals melt, to prevent any irritation of the skin.

癜癩[3]症作癢之良方如左、

唎瑣辛	℞-Resorcinolis	十五英厘 (1.0)
甘 油	Glycerini	十量滴 (0.6)
灰消水	Liquoris calcis	一量兩 (30.0) —M.

敷患處。 S.—Apply locally.

1 Eczema
2 Psoriasis
3 Erythematous eczema

洋蘇冰 R-Thymolis 十英厘 (0.6)
鈉硼烘馨 Sodii boratis 十五英厘 (1.0)
水 Aquae 二量兩 (60.0) —M.
以一量錢 (4.0) 加水半玻璃盃漱之。
S.—Place a teaspoonful of this in half a tumblerful of water and use as a gargle.

曾有醫者、以爲敷傷之用、然藥價過昂、故鮮有用之者、且暑熱時不便用之、因其味引蠅也、分劑半至二厘、(0.03-0.12) 宜置於藥壳內、以水或牛乳送下、可免惹胃之患、曾有腸熱症者、一日服三十厘、(2.0) 若服至百厘、(7.0) 必顯中毒之狀矣。

唎瑣辛 RESORCINOL, U. S.

體功效 此藥有惹泗膜之力、服毒分劑者、耳聾、頭暈、流涎、生汗、昏無知覺、且有似癎之瘈瘲、試將此藥射於犬皮內、其脉先緩後速、先緩者、乃因顱臟腑系之被激、後速者、乃緣此系被癱也。

療效 啼嗽症、以此藥二厘、(0.12) 加水百量滴、(6.6) 製成消水、每服十量滴、(0.6) 有效、置於噴霧具內、由口噴之、其效尤妙、草泗炎症、噴之常有神效、曾有醫者、以此藥爲退熱

1 Whooping-cough
2 Hay-fever

薄荷冰 Menthol. 二十英厘 (1.3)

樟腦 Camphor. 二十英厘 (1.3)

洋桂油 Ol. cinnamomi 二量滴 (0.1)

流煤蠟 Petrolati liquidi U. S. Paraffini liquidi, B. P. 一英兩 (30.0) —M.

每三句鐘噴一次、每次十分鐘

S.—Use in a vaporizer every three hours for a period of about ten minutes.

熏伊打時、以此藥五十分、加醇酒百分、置於吸具內吸之、可免伊打之惹力、哮吼症、噴之有效、英揀藥册內、有薄荷冰貼膏、Emplastrum Menthol, B. P. 乃爲外惹內效之用、並有痲藥之功。

洋蘇冰 THYMOL. 此藥由洋蘇油而得、色白、結晶、其形無定、水不能化、醇酒、伊打、油類、俱易化之、有免腐並滅瘴毒之能、如多用之、則有惹力、腸熱症、有以之爲免腐藥者、服此藥則腸內之傷不至過於潰爛、如殺鉤虫此藥爲上品、口洶炎、或齦炎症、如因用錄藥過多所致、良方如左。

1 Spasmodic croup
2 Typhoid fever
3 Uncinariasis
4 Stomatitis

胃痛[1]症、此藥有祛風之效、分劑一至二厘、(0.06-0.12) 製成藥丸、日服三次、胃泡膜新炎者忌用、此藥於皮膚或泡膜、皆有痲效、故製成筆形之錠、於系[2]痛或頭痛[3]抹之有效、若以此藥敷於嗓鼻之泡膜、其處之血脈、必至縮小、與敷寇卡印同、然藥效已過、血脈不至鬆大、則與敷寇卡印者不同、鼻噻新症、以此藥一厘、(0.06) 加烝水一量兩、(30.0) 置於噴霧具內噴之、或以三厘、(0.2) 加流煤蠟一兩、(30.0) 噴之大效、更有妙法、乃以一玻璃管、口徑四分、長二寸半、內貯此冰、兩端以有孔之塞、下墊紗布、塞其兩端、自一端吸之、有效、用時宜加謹愼、毋令藥晶吸入口或鼻內、因其器有潰力也、如鼻外有皮破之處、用此法過勤、恐成瘭患、無論或服或吸、如用之過多、必致顱腦積血、有頭痛之患、更有以化開之薄荷冰、置於大噴霧具內噴之者、(見第四十七圖) 其方如左。

第十五圖



此圖乃一類大噴霧具、以薄荷冰化開、置於其內、噴之最妙。

哥利吞 ℞-Chloreton. 二英厘 (0.12)

1 Gastralgia
2 Neuralgia
3 Headache
4 Acute coryza

將此油滴一滴於棉上、塞入牙孔、有效、按此藥之油、含薄荷冰多者、痲效必大、中國薄荷油所含之冰、較多於美國。

藥製與分劑

薄荷油	Oleum Menthæ Piperitæ, U. S. Menthæ piperitæ Oleum, B. P.	一至四量滴	(0.06-0.25)
薄荷浮酒	Spiritus Menthæ Piperitæ,	十至三十量滴	(0.6-2.0)
薄荷消水	Aqua Menthæ Piperitæ,	一至二量錢	(4.0-8.0)
薄荷餅	Trochisci Menthæ Piperitæ	可噙於口內用之。	

薄荷冰 MENTHOL, 此藥乃由薄荷油而得、無色、結晶形成三角、嘗之似薄荷油水畧能化、醇酒、伊打、油類、俱能化之、孕吐者服之常效、良方如左。

薄荷冰	℞-Mentholis	十五英厘	(1.0)
穀烝酒	Spiriti frumenti	六量錢	(24.0)
糖漿	Syrupi	一量兩	(30.0) —M.

每句鐘服一量錢。(4.0) S.—One teaspoonful every hour.

薄荷 MENTHA PIPERITA, U. S.

此藥係一類草、入美國藥册者、乃此草之乾葉、及生花之梢、嚼之嘗之、俱有香味、因其內含一類香油也、如以此油敷於皮上、不但有激力、且有痲痺效。

療效 此藥之用、常以醫腸胃氣脹[1]及嬰孩痙症[2]、有醫者以此藥之油、加於瀉藥內用之、以免痙患、因此藥之油、香味甚濃、如加於惡味藥內、必易服之、六月至一正歲之嬰孩、患重痙症、且腦部受其牽累者、良方如左。

哥拉 R. Chlorali hydrati, U. S. Chloral hydratis, B. P.	十六英厘	(1.0)
鉄氣塩 Potassii bromidi	三十二英厘	(2.0)
薄荷水 Aquæ menthæ piperitæ	二量兩	(60.0) —M.

每四句鐘以一小勺、(4.0) 加於熱水內服之。

S.—Teaspoonful in a little warm water every four hours.

患系痛[3]者、如用布一小方、滴此油數滴於其上、覆患處有效、切宜斟酌用之、恐有起皰之患、去布之後、如覆處甚作燒痛、可以煤臘或洋橄欖油敷之、其痛即止、患牙痛[4]者、若

1 Flatulence
2 Infantile colic
3 Neuralgia
4 Toothache

或腦部被阻之狀者、按此藥其力一過、熱度即回、亦有先冷而後燒者、其退熱之效、大約與煤澔之藥類同、其險亦同、究不及浴法之妙、系痛[1]症、無論痛處之深淺、以此藥敷之有效、或以二量滴、(0.12)加哥羅芳酒十量滴、(0.6)深射於患處亦可、如以布浸於藥內、敷於皮上、以布捲裹之、痛處即覺痲木、惟藥布不可久存於皮上、恐身之熱度被減、或受藥力之阻也、有著名醫者云、陽腺炎[2]症、以此藥十五量滴、(1.0)加甘油四十五量滴、(3.0)敷於陽囊、亦曰腎囊則有神效、或以此藥一量錢、(4.0)加羊毛脂四英錢、(16.0)製成抹膏、隔日敷一次亦可、因此藥別有一種惡味、人多不喜敷之。

怪阿寇碳強洽 GUAIACOLIS CARCONAS, U. S. 此藥色白、結晶、形如砂粒、每百分內、含怪阿寇九十一分半、碳氫強洽八分半、水不能化、醇酒四十八分、或哥羅芳一分半、能化藥一分、以試紙試之、不改其色、或曰此藥被味甚緩、祛之甚速、於胃中少有惹力、胃亦無味之之能、於腸中則變爲怪阿寇、亟碳氫強洽、故常用爲腸內免腐藥、瀉[3]腹症、若因腸內食物釀壞、此藥有效、腸熱症、亦常以此藥醫之、分劑二厘、(0.12)日服三次、痢[4]症服此藥有效、用法與怪阿寇同、但較怪阿寇少有惹胃之患、分劑二至十厘、(0.12-0.6)常用者乃五厘、(0.3)日服三次、或置於藥壳內、或製成丸、或研成散、服之俱可。

1 Neuralgia
2 Orchitis
3 Diarrhœa
4 Typhoid fever
5 Tuberculosis

而成、其質似油、其色杏黃、鏡之嘗之、無甚氣味、水及淡酒、甘油、俱不能化、醇酒、伊打、哥羅芳、魚肝油、洋橄欖油、俱可化之、或謂此藥多於腸內被陳惹胃之力、較幾阿蘇爲小、其用與幾阿蘇同、分劑亦同、常用爲祛痰藥、以醫肺癆症、或用爲腸內免腐藥、最妙之服法、乃置於藥壳內服之。

怪阿寇 GUAIACOL, U. S. 此藥乃由椎木幾阿蘇、用化法而得、售之者雖自言其純、然不純者亦多、水八十五分、能化藥一分、醇酒伊打、最易化之、如熱至八十三度半、則化流質、此流質乃人所常用者。

療效 肺癆症、歐洲多有醫者、以此藥代幾阿蘇之用、分劑五至二十量滴、(0.3-1.3) 置於藥壳內、若與魚肝油、或洋橄欖油同服、最妙、若加伯蘭地亦可、氣脘炎症之中程、或久症、以此藥五至十量滴、(0.3-0.6) 置於滾水內、每日吸其氣三或四次、有效、喉門[3]棚微核新炎症、可以此藥用刷敷患處、乃最妙之法、患熱症者、以此藥三十至四十量滴、(2.0-2.6) 敷於腹或胸或股上、片時卽有退熱之效、約二三句鐘、藥力已至極處、宜視病者熱度何如、可再如法敷之、如欲見大效、敷藥後以油布裹之、不使藥力散失方可、有著名醫者云、敷此藥後、有身熱減七度、不顯乖效者、亦有醫者云、敷此藥後、遂顯心弱、

1 Tuberculosis
2 Bronchitis
3 Acute follicular tonsillitis
4 Fever

置於吸具之海絨上吸之。
S.—To be placed on the sponge of an inhaler and inhaled.

啼嗽[1]症、如以白布浸此藥、掛於病室、或謂大效、孩童之腹[2]統癆、或肺[3]癆等症、以此藥置於加脫梅之魚肝油內、射肛有效、分劑五至十五量滴、(0.3-1.0) 食滯[4]症、如因食肉不化、或因食糖過多、以致腸胃氣脹、每飯後以半至二量滴、(0.03-0.12) 置於藥壳內服之大效、牙痛[5]者、以絮浸藥、塞入牙孔、有效、緣其有痲覺系之力也、按此藥無乖效、或畧有腹痛之患、然用大分劑、宜詳查其有中毒之勢否、倘其頭暈痛、心神恍惚、或尿色發黑、與中炸醇毒者相似、此皆中毒之兆、宜立減其分劑、或止而不服。

藥製與分劑

幾阿蘇水 Aqua Creosoti, U. S. 一至二量錢 (4.0-12.0)

幾阿蘇調水 Mistura Creosoti, B. P. 一至二量兩 (30.0-60.0)

幾阿蘇抹膏 Unguentum Creosoti, B. P.

毒力 此藥之毒力、與非醇同、解法亦同。

幾阿蘇碳強治 (CREOSOTI CARBONAS.)

此洽乃幾阿蘇九分、與碳氯強洽一分、相合

1 Whooping-cough
2 Peritoneal tuberculosis
3 Pulmonary tuberculosis
4 Indigestion
5 Toothache

日服三次、每次以半量兩、(16.0)加水二量兩、(60.0)服之。

S.—A tablespoonful in a wineglassful of water three times a day.

有時病者、每日可服此藥六十量滴、(4.0)然初服之分劑必小、後則日增、服此藥而見效者、多在增至大分劑之時、肺癆症之晚程、服之可止其乾嗽、亦有潤喉祛痰之效、嗽炎之中程、良方如左。

椎木幾阿蘇	R-Creosoti (beechwood)	一至二量滴 (0.06-0.12)
薄荷冰	Mentholis	四英厘 (0.25)
阿波冷	Alboleni	一量兩 (30.0)

置於噴霧具內、日噴嗓數次、又方

S.—To be used in an atomizer several times a day.

椎木幾阿蘇	R-Creosoti (beechwood)	十量滴 (0.6)
哥羅芳浮酒	Spiriti chloroformi	十量滴 (0.6)
煉酒	Spiriti vini rectificati	二十量滴 (1.3)

1 Advanced stage of phthisis
2 Subacute laryngitis

祛療效 此藥由腎而祛、亦畧有由肺而祛者、然不甚速、必越一日、方能祛淨。近數年來、多以此藥滴於海絨上、令病者吸之、以醫癆[1]症、或效、氣腦[2]久炎症、滴於

第二十五圖

此圖乃一類熏幾阿蘇之具、係以鉦片穿微孔所成、具前置海絨、將藥滴於海絨上、合於口鼻令病者吸之、

滾水中、吸之大效、且可減口中之惡味、用爲服劑亦可、初服之分劑、二至五量滴、(0.12-0.3)有服此藥而胃失功用者、若再服之、不但無益、必致有損、病者如作燒、嘔血、乃爲禁用此藥之狀、若所吐之痰內、多膿與泗液、可以此藥置於藥壺內服之、或加牛乳半盃亦可、並有良方如左。

椎木幾阿蘇 ℞-Creosoti (Beechwood) 三量錢 (12.0)

龍膽草雜酒 Tinct. gentian. comp. 一量兩 (30.0)

煉酒 Spiriti vini rectificati 八量兩 (240.0)

白葡酒 Vini xerici 二量磅 (960.0)

1 Pulmonary tuberculosis
2 Chronic bronchitis
3 Mucopurulent expectoration

腔內似痨症之狀、身內亦常有變脂之處、服過分劑者、每致喑啞、非因藥挨近聲筋之故、乃因被陳後、藥力行於睾內也、每有割症後、用絮蘸敷此藥、因被陳而中毒者、其中毒之先兆、尿溷而不清、或腦部被阻而不安、且腎被惹而腰痛者、既見此兆、宜速換他藥爲妙。

解毒法　化學中之解毒藥、乃鎂硫强謇、與鈉硫强謇等、緣此二藥與本藥相合、成一不消化之謇、且有瀉腹之功、亦可服熱非滿水、並當用煖身之法、且將毛地黃、士的年等、射於皮內、以激其絡與呼吸二部、並用莫非以止其痛、亦可用吐劑、若胃經之功用已失、用胃抽器抽之方可、此藥如染於手上、宜速浸於醇酒內、以解其毒、服過分劑者、若以酒解之、則少有效、緣無人能服純酒也。

幾阿蘇 CREOSOTUM, 此藥由椎木 Beech Wood 乾烝而得者、乃入藥用、色淺黃、與洋橄欖油相似、嘗之昧辣、別具一種氣息、大有免腐之力、每百分內、含怪阿寇六十分、幾蘇四十分、有時怪阿寇、亦可代此藥之用、（見怪阿寇篇）分劑一至二量滴、(0.06-0.12) 常用者、多由煤濡而得、但其效較小、以化學而論、此藥與炭醇無甚分別、然其效迥乎不同。

體功效　與炭醇同。

藥製與分劑

炭酸抹膏 Unguentum Phenolis, U. S.
Unguentum Acidi Carbolici, B. P.

炭酸甘油 Glyceritum Phenolis, U. S.
Glycerini Acidi Carbolici, B. P.

流炭酸 Phenol Liquefactum U. S. 一至二量滴 (0.06-0.12)
Acidum Carbolleum Liquefactum, B. P.

炭酸餅 Trocbiscus Acidi Carbolici, B. P.

炭酸肛彈 Suppositorium Acidi Carbolici, B. P

乖效 以此藥三分、加水百分、用布蘸之、裹於手指、或足趾上、該處之血脈、必受其阻、或有成疔之患、若裹於他處則不然、乃因血脈不盡受阻也。

毒力 此藥之性甚烈、乃爲最毒之藥、但少有知之者、服毒分劑者、或立時而死、或延至數句鐘而死、其立時而死者、乃因呼吸司所停止之故、延至數句鐘而死者、必大顯育道發炎之狀、以致嘔瀉甚重、腹痛如燒、且遍體生汗、面瘦容戚、呼吸短促、脉速而微、幾不能診、至腦力脫失而死、口內或無本藥之味、但令泌膜有縐摺之形、若服雜者、泌膜發黑、純者發白、且育道之泌膜、有一定之形狀、藥接泌膜之處、必成死塊、中有白點、點外圍紅、白點亦有變黑之時、如剖腹驗之、藥味仍存其內、腦、腎、肝、脾、俱積黑血、有時氣

℞-Mentholis
薄荷冰 五英厘 (0.3)
Phenolis, U. S.
Acidi carbolici, B. P.
炭酸醇 十英厘 (0.6)
Ungnent aquæ rosæ
玫瑰水抹膏 一英兩 (30.0) —M.
S.—Apply locally.
敷於患處。

有醫者云、痘[1]熟症生皰時、如每日以刷蘸此藥、遞次刷其一處、或以針蘸此藥、遞刺其皰、可免膿盛、並可減燒、亦可免其痘痕、盡棚過大症、未生膿之前、以此藥二分、加烝水九十八分、用五至十量滴、(0.3-0.6) 射於棚內、大效、花柳盡棚炎症、先以噴霧具噴伊打於患處、令其痲木、後以此藥八厘、(0.5) 加烝水一量兩、(30.0) 射十量滴、(0.6) 於棚內、此法最妙、滑膜[4]久炎症、每三日如法用一次、有效、癰[5][6]癤等症初起時、用此法醫之、可免生膿之患、近日少以此藥爲敷傷之用、惟常加洋橄欖油調和用之、若割開之瘰癧[7]膿腔、醫者常以此藥之純者、敷於割口、以助其速於收斂、前數年、醫者常以噴霧具噴此藥於傷口、近日查明、其益不敵其所損也、按此藥滅癘稚之能無多、若以一二分、加水百分、則稚與其斃、亦可滅其多半。

1 Smallpox
2 Enlarged glands
3 Bubo
4 Chronic synovitis
5 Boils
6 Carbuncles
7 Tubercular sinus

常用。

祛 此藥由腎而祛、服毒分劑者、腎經被惹最甚、每致尿閉、或尿色黑紫、然非因尿含血也。

療效 此藥不常用爲服劑、但有數症、服之大效、如胃系被惹、食則嘔[1]吐者、可服半至二量滴、(0.03-0.12)若腸失消化之功、食物釀壞、以致瀉[2]症、可服二至四量滴、(0.12-0.25)如與鉍氧下磠十至二十厘、(0.6-1.3)同服、其效尤妙、肺疽[3]、或肺癆[4]等症、如以此藥五至十五厘、(0.3-1.0)加水一量兩、(30.0)置於噴霧具內、由口細密噴之、庶能達於患處、且能止嗽[5]內作癢、亟能止嗽、近多用幾阿蘇代之、因其功效尤大也、痧[6]、嗓瘍[7]、口白瘍[8]等症、可以此藥一分、加水七十五至一百分、漱之、或用噴霧具噴之、有效、嗓炎症、亦可如法醫之、口白瘍症、如用木籤、蘸此藥之濃汁點之、有效、燙傷[9]、以此藥一量錢、(4.0)加洋橄欖油一量兩、(30.0)敷之最妙、按此藥本有痲效、故於趾甲入肉[10]、或指筋鞘炎[11]等、輕割症用之、可止其痛、癢[12]症作癢時、以此藥十厘、(0.6)加洋橄欖油四量錢、(16.0)敷之大效、皰癬[13]症、新炎已過時、以此藥十量滴、(0.6)加硬煤油蠟一兩、(30.0)敷之有效、癩症作癢、皮癢[14]或扁瘡[15]等症、良方如左。

1 Nervous vomiting
2 Diarrhœa
3 Gangrene of lung
4 Tuberculosis
5 Cough
6 Diphtheria
7 Ulcerated sore throat
8 Stomatitis
9 Burns
10 Ingrowing toe-nail
11 Felon
12 Itching of jaundice
13 Weeping eczema
14 Pruritus
15 Lichen planus

第十五章 論退熱藥類

炭酚 PHENOL. U.S. ACIDUM CARBOLICUM, B. P.

此藥由煤焦用蒸法而得、別具一種氣息、其色無常、純者清而淺黃、其體結晶、如以藥十二分、加水一分、則變爲流質、宜貯於深黃瓶內、嚴密塞之、並當藏於暗處、如透空氣、則變爲流質、水、酵酒、伊打、哥羅芳、甘油、與他油類、俱能化之、雜者濁而棕黑、本係流質。

體功效 此藥敷於皮上、初則色白而痛、後則痲木、覺系失其功用、如敷於泗膜、以上之狀尤顯、且有潰力、然因能凝胎、故潰力不能深入。

腦部 此藥敷於無恙之皮、該處之覺系必被攤、服毒分劑者、大腦司所、俱受其阻、以致昏迷、但少有痿癱之狀、若在獸類、則多有之、蓋因脊腦動系、與全身之肌、俱未受阻故也。

絡部 服毒分劑者、絡部被阻特甚、司絡腦所被攤、心於舒時停止、服中分劑、與本部毫無關係。

呼吸部 服大分劑者、呼吸較常粗而急、服毒分劑者、多因此部被攤、以致殞命。

身熱度 服中分劑、略有減熱度之能、無病者、與作燒者同、因其退熱之力不大、故不

洋桂油 Ol. Cinnamomi. 一量滴 (0.06)—M.

置於藥壳內、日服三壳。

S.—To be made in one capsule, three of which are to be taken each day.

如試人腎經之功用、合宜與否、以此藥一厘、(0.06) 加水十量滴、(0.6) 製成消水、射於肌肉之內、合宜者、越十五至三十分鐘、尿中宜有藍色、且宜至三十六句鐘祛淨、否則不得謂腎經之功用合宜也、胸統膜或腹統膜有積液之患者、如腎經無恙、亦可用此藥、以查其液被瞋否、用法以此藥一至三厘、(0.06-0.2) 製成消水、射於積液之中、後令病者服瀉劑、(瀉劑能激發各類之液速於被瞋) 如於尿中不見藍色、則知其必因濾脬四圍發脹、塞而不通、以致液不被瞋也。

乖效 服此藥者、常不甚顯乖效、即顯乖效、亦不過畧覺頭暈、惡心、或尿脬淋漓刺痛、如兼服肉蔻散、則少有此等乖效也。

療效 惡瘢[1]之患、有醫者曾以此藥製成消水射之、但未必定有功效、或謂疙疸[2][3]等類之惡瘢、以此藥半至二厘、(0.03-0.12) 加水少許化之、每日或隔日射一次、瘢必不長、繼則縮小、後則脫落、終則速於收斂、但不可以此爲驗案、只可於不可割之瘢用之、能止其痛、而免其臭、如其瘢可割、總以割治爲宜、瘴症間熱者、此藥滅穢之功、雖不及貴林、但有人不能服貴林、或服之而無效者、此藥有效、推而言之、此藥不但能醫此類瘴症、即各類瘴症、皆能醫之、然究不如醫此類症之功效爲大也、孩童之瘴症、其效尤妙、但必在寒戰之先七至十句鐘、服之方可、即病退之後、仍宜服之、至血中無瘴癃而止、不然恐病復發也、分劑、成人每四句鐘二至四厘、(0.12-0.25) 五歲之孩童、每五句鐘一至二厘、(0.06-0.12) 近有醫者、於偏頭痛、曾以此藥醫之、分劑一至二厘、(0.06-0.12) 日服四次、或云日服十五厘、(1.0) 亦不爲過多、用法以此藥與寇拉相和、置於藥殼內服之、白濁[5]之初程、有醫者謂以此藥醫之、能減其病期、且有良方如左。

烁藍替連	R-Methyl thioninæ hydrochlorid	二英厘 (0.12)
檀香油	Olei santali	三量滴 (0.2)
哥拜把	Oleoresinæ cubebæ	三量滴 (0.2)

1 Malignant growths
2 Sarcoma
3 Carcinoma
4 Malarial fever
5 Gonorrhœa

燕水 Aquæ destillatæ 一一量磅 (960.0) —M.

先將傷內之洗物取出、以紗布條、蘸此消水覆之、再將乾紮覆於其上、後以布條、輕輕裹之、紗布雖速於變乾、必越數日、方可以此消水溼而去之、如該處有皰、用針挑破、再如法用藥、此次之紗布、宜越七日再揭、甫敷藥時、畧有疼痛、片時即止、不但免生膿之患、且使速於收斂、不結癥痕、按此藥大有染黃之力、故腎者用時、宜著庫秋手套、如受傷甚重、兼有腎炎者、則宜謹愼敷之、以免中毒。

藍煐替連 METHYLTHIONINE HYDROCHLORIDUM, U. S. 此藥色綠、結晶、形如砂粒、亦有時係古銅色、大於砂粒、形成三稜者、醇酒能化、水易化之、若製消水、其色深藍、因英文之名、與煐藍色相似、故多有將此二藥誤認者、誠爲可惜、蓋此藥可爲服劑、煐藍色不可爲服劑也、如欲分別此二藥、可各製成消水、以鈉汞分置於其內、果係此藥、即變成青蓮之色、若係煐藍色、必變成紅紫之色、猶有分別之法、以此二藥之消水、各傾於試筒內、消水之面、與試筒四圍附着之處、色綠者即係此藥、色藍者乃係煐藍色、按此藥由腎而祛、故服者尿有藍色。

郁加列油 ℞-Olei eucalypti 一量錢 (4.0)

洋杏仁油 Olei amygdalæ expressi 一量錢 (4.0) —M.

分置十殼內、日服三次、每飯後服一殼。

Pone in capsulas No. X.
S—One t. i. d. after meals.

如因痺[1]或瘴症、以致頭痛者、此油大效、鼻[2]洒膜炎症、將郁加列托洗之、有效。

藥製與分劑

郁加列油 Oleum Eucalypti, 五量滴 (0.3)

郁加列托 Eucalyptol, U. S. 五厘 (0.3) 置於藥殼內服之。

匹克酸 (ACIDUM PICRICUM) 此藥結晶、不一其形、或如鱗片、或似針、其色淡黃、鼻之無味、昔者曾用之以醫瘧症、亦作染料之用、以其能使燙[3]傷收斂、故醫者常製成消水用之、良方如左。

匹克酸 ℞-Acidi picrici 七十五至百二十英厘 (5.0-8.0)

醇酒 Alcoholis 二量兩半 (75.0)

1 Rheumatic or malarial headache
2 Nasal catarrh
3 Burns

癔者、亦有鼻或齦流血不止者、如以鈉氯塩十厘、(0.6) 與麥奴之小分劑同服、可免耳鳴之患。

郁加列 EUCALYPTUS U. S.

此乃一類之樹、原產於奧司大利亞、入藥者、係此樹之葉、葉內所含者、名郁加列油、Oleum Eucalypti, 有免腐之效、油內所含者、名郁加列托、Eucalyptol, U. S. 形似樟腦、製法將郁加列油、與鉄沘同烝之而成、此油之用、與郁加列托同、油類、醇酒、伊打、皆能化之、水不能化。

體功效 敷此油於皮上、則有惹力、如服十至二十量滴、(0.6-1.3) 先有激力、後有平胃之效、如服之過多、胃則失其功用、且有瀉腹之患、所瀉者有油味、脉則畧速而有力、或致甚重之頭痛、服毒分劑者、血壓、熱度、身力、呼吸、一並減少、或腿之覺系失其功用、及呼吸停止、遂至殞命。

祛 此藥由皮腎腸肺而祛、中毒者、尿中或含香味。

療效 瘴熱症[1]、若貴林不便、或病者有服此藥之癖忌、可以郁加列油代之、氣膻炎[2]之晚程、因此油由肺而祛、故大有效、置於藥壳內、或成勻藥、服之皆可、白濁[3]之晚程、服之亦效、良方如左。

1 Malarial fever
2 Bronchitis
3 Gonorrhœa

貴尼甸硫强鬱 (Quinidinæ Sulphas)

三鬱之分劑、俱較貴林多一倍。

辛寇那冲藥 (Infusum Cinchonæ,) 一量兩 (20.0)

辛寇那酒 Tinctura Cinchonæ, 一至二量錢 (4.0-8.0)

辛寇那雜酒 Tinctura Cinchonæ Composita, 一至四量錢 (4.0-16.0)

此酒大有補力、因其內含辛寇那甚微無幾、故醫瘴症無效。

辛寇那流膏 Fluidextractum Cinchonæ, U. S. Extractum Cinchonæ Liquidum, B. P. 五至十五量滴 (0.3-1.0)

辛寇那膏 (Extractum Cinchonæ) 五至十厘 (3.0-0.6)

辛寇那酸冲藥 Infusum Cinchonæ Acidum, B. P. 一至二量兩 (30.0-60.0)

禁用之狀 胃炎、胱炎、腦衣炎、癇、腦炎、中耳炎等症、貴林忌用、因此藥每致積血、而惹患處也、有此藥之癖忌者、亦忌用。

乖效 如人無服藥之癖忌、鮮有中此藥之毒者、曾有一三十六歲婦人、一次服三百厘、(20.0) 而不殞命者、始則昏迷不醒、呼吸甚短、脉緩、耳聾、目矇、過半月、目始復原、有服貴林之小分劑、忽致腦力脫失、目暫失明者、或因中耳積血、致兩耳重聽者、且有全身發

貴林氯塩 R-Quininæ hydrochlor. 十五英厘 (1.0)
鈉氯塩 Sodii chloridi 十五英厘 (1.0)
烝水 Aquæ dest. 二量錢半 (10.0) —M.

用時宜加烝水一量兩 (30.0) 置於火上沸後隔滓、乘溫射之。

S.—This should be injected, after an ounce of distilled water has been added to it. The solution should be boiled and filtered, and used while warm.

貴林有阻心之力、故宜緩射、最妙之射處、乃小腿之盂。

辛寇泥甸 (Cinchonidina)

辛寇年 (Cinchonina)

貴尼甸 (Quinidina)

皆係辛寇那之鹼、俱有醫瘴症之功、然其力較貴林減半。

辛寇泥甸硫强鬱 Cinchonidinæ Sulphas,

此藥之苦味、較貴林畧輕、或云服之者、無耳鳴頭脹之患。

辛寇年硫强鬱 Cinchoninæ Sulphas, U, S.

甘油 Glycerini 三十量滴 (2.0)
烝水 Aquæ dest. 三十量滴 (2.0) —M

熱而用之。

S—Warm solution before using it, and do not add acid.

又方

貴林氯塩 R-Quininæ hydrochloridi 十五英厘 (1.0)
醇酒 Alcoholis 十五量滴 (1.0)
烝水 Aquæ dest. 九十量滴 (6.0) —M

再加氫氯酸數滴、使藥化盡、而後射之。

S.—Add a few drops of hydrochloric acid to complete solution before using.

如用貴林雙硫强蠔爲射藥、化開時、宜加菓酸五分之一、或加硫强酸亦可、否則恐射後逕腸之鹼液、使藥力沈澱而不被睐也、如以貴林硫强蠔用爲射藥、宜將此藥十厘、(0.6) 加水一量錢、(4.0) 後以硫强酸滴滴加之、至蠔化盡爲止、最妙之射處、乃臀大肌皮內、髁大凸、與髖凸之中、如射於腓處、則痛難忍受、重癆症、義大利有某著名醫者、將貴林射於盂內、其方如左。

(0.25-4.0) 服時如無他故、不宜化開、因其味甚苦也、如必須化開服之、宜多加酸類、以減其苦味、或置於藥壳內服之亦可、平常之服法、乃製成丸、外裹糖衣、然須謹愼、恐日久糖衣堅硬胃不能化、至化於腸內、則無功效矣、因其於鹼液中沉澱、而不被喫也、不能服丸藥之孩童、良方如左。

貴林氯塩	R-Quininæ hydrochlor.	十六英厘 (1.0)
甘草流膏	Fluidextracti glycyrrhizæ U. S. Extracti glycyrrhizæ liquidi, B. P.	一量錢 (4.0)
陳皮糖漿	Syrupi aurantii cort.	二量兩 (60.0) —M

三正歲之孩童、日服三次、每服一量錢。(4.0)

S.—A teaspoonful t. i. d. for a child of three years.

亦可將貴林炭匿磬、加於寇寇內、以免惡味、如以上之法、用之不便、可將貴林氯塩、製成肛彈用之、每彈內含貴林氯塩二至三厘 (0.12-0.2) 切宜謹愼、毋使肛內之泗膜被惹、如用以射皮、貴林氯塩最妙、良方如左。

貴林氯塩	R-Quininæ hydrochloridi	七英厘 (0.5)

近、或不至受其傳染曝炎[1]或鼻噻[2]等症、以此法噴之有效、痢症[3]如因阿咪吧所致、可以貴林一分、加水三千分、射於肛內神效。

藥製與分劑

貴林氯塩 Quininæ Hydrochloridum, 一至十厘 (0.06-0.6) 此乃貴林中最妙者、水十分能化藥一分。

貴林雙氯塩 Quininæ Hydrochloricum Acidum, B. P. 一至十厘 (0.06-0.6)

貴林雙硫强鬱 Quininæ Bisulphas. U S. 水八分能化藥一分、每厘 (0.06) 內含貴林一厘之三分之二、(0.04)

貴林甘松鬱 (Quininæ Valeras) 此藥最難消化、然爲人所常用者、每厘 (0.06) 內含貴林一厘之四分之三、(0.045)

貴林硫强鬱 Quininæ Sulphas, 此藥與貴林中苦味畧輕、每厘 (0.06)

貴林炭匿鬱 (Quininæ Tannas,) 內含貴林一厘之四分之一。(0.015) 如醫瘴症、可服四至六十厘、

以上諸鬱塩、俱可用爲補藥、分劑一至四厘、(0.06-0.25)

1 Sore throat
2 Colds
3 Amœbic dysentery

因其能滅血稚所生之敝也、如以貴林爲防瘴藥、宜日服三次、每服二至四厘、(0.12-0.25)蓋患此症者、尿內含血、若在寒戰服之、有時不但無益、反致有損、因其有惹腎之力、無凝血之能、腎經被惹、流血必多、故醫此症、只宜在寒戰之前、寒戰既止、則積血可免、腎不積血、自無尿血之患矣、瘴熱惡症[1]、亦宜服之、且當以六十至七十厘、(4.0-4.6)射於肛與皮內、亦有時可射於盂內、額痛之瘧症[2]、或瘴系痛症[3]、大有功效、平常之系痛亦效、瘟熱腸熱二症、若以之爲退熱劑、無甚功效、惟瘴症之熱能退之、熱症見瘳、服之或能退熱、緣其有補效也、按其補效、不盡因其味苦、亦緣其能增血紅輪也、補藥之分劑、一至二厘、(0.06-0.12)日服三次、猺弱難產者、服之可增猺力、近數年少用之、因更有他妙藥也、若孕婦服之、雖與孕無關、然易患小產者、或有小產之虞、如與鈹氣鹽或鴉片同服、則免此患、孩童肺葉炎症、可製成肛彈用之、每彈內含貴林二厘、(0.12)日用三次、有效、人遇耗腦[5]力或身力之事、如服貴林二至四厘、(0.12-0.25)其力不致耗竭、孩童之啼嗽[6]症、服之有效、分劑、一正歲者一厘半、(0.09)二正歲者三厘、(0.2)每增一歲、加藥一厘半、日服三次、由早六句鐘服起、後每隔八句鐘服一次、若以一至二厘、(0.06-0.12)加水一量兩、(30.0)置於噴霧具內、每二三句鐘、噴於未患啼嗽孩童之口內、雖與患此症者相

1 Pernicious malarial fever
2 Brow ague or malarial neuralgia
3 Neuralgia
4 Lobar pneumonia
5 Mental or physical strain
6 Whooping-cough

呼吸部　服貴林之小分劑、畧有激此部之能、毒分劑、則大有阻此部之力。

身熱度　健壯者、若服貴林、於其熱度無甚關係、惟患瘴熱症者、服之大有退熱之效、因其本有醫此症之能、非緣其有減身熱之力也。

喋　貴林惟在胃中被喋、不能被喋於小腸、因小腸含有鹼液也、故服之者宜用藥散、或以藥壳最妙、如用藥丸、必用新製者、否則胃不易喋。

祛　貴林多由腎而祛、亦有在肝經爲氣所變者、且祛之不見甚速、服後必待一刻鐘、於尿中用化法或可見之、過二十四句鐘、方能祛淨。

腳廢　貴林有阻腳廢之能。

育道　如以貴林一分、加水萬分、仍有苦味、有激胃之效、但服之過多、則胃反被阻、小分劑、則大便畧燥、大分劑、或致腹痛。

療效　貴林之入藥者、其大用有三、一解瘧、二退熱、三滋補、如患瘴[1]症者、血內有一類之稚、貴林有滅之之力、若於未服之前、服祛膽瀉劑、其效尤妙、服法、每句鐘、可服貴林之小分劑、或每日服足分劑一二次、但宜在寒戰之先、二句鐘服完、庶免其症復作、或寒戰將至、置於水內、加氣氳酸數滴、使之易化、服之或可免其寒戰、如已見汗亦可服之、

1 Malaria

第十四章 論解瘧藥類

辛寇那 CINCHONA, U. S., CINCHONA RUBRA, U. S. CINCHONA RUBRÆ CORTEX, B. P.

此係一類之樹、出於南亞美利加之皮路國、今印度、及印度羣島多種之、原有三十一種、含貴林最多者只有數種、入藥者、乃此樹之皮、分黃紅淺灰三色、內含數種之鹼、貴林爲最要、黃辛寇那皮、所含貴林尤多。

體功效　服貴林過多者、則耳鳴、頭暈、口鼻失職、亦或有目失其功用者、越片時、則耳聾頭痛、而耳鳴之患、尤難忍受。

腦部　服貴林者、大腦被激、如仍服不止、則有積血之患、服毒分劑者、積血尤甚、終則靈性俱失。

絡部　患熱症者、服貴林有平此部之效、試將貴林驟射於犬之頸盂內、雖用小分劑、藥力必立時至心、心即被癱、惟人服之、則有補效、血運畧速、血壓加增、全身皆得其補力、若服十五厘(1.0)之足分劑、血運之功、則受其阻。

血　用過分劑、凝血之能、越於尋常、中分劑則不然、貴林於紅白血朕、甚有關切、久服中分劑者、紅朕必增、膿腫將起時、如服貴林之足分劑、可免血白朕穿潰而阻生膿之患。

液一量兩、(30.0) 以此盟一量兩、(30.0) 射於脊腦潤衣間、不但能使之痊癒、且能免其遺患、不用此盟、雖或不至死亡、而耳聾目盲、或他類之遺患、亦所不免、患此症時、脊腦之液必濁、及射此盟之後、則變清、且增白朕食稚之力、並雙點稚亦被阻而不長、及病癒後、不可止而不用、宜日射一次、以防復發、如已有復發之勢、仍宜如前射之。

癤[1]症、或因受傷與割症後、致患膿毬症、皆此毬之所致、用此盟最妙、心內衣瘍炎症、用此盟或係妙法、有時患痔症、與紅熱等症、亦兼患膿毬症者、病者必有二類傳染、即本病傳染、與此毬傳染也、按人所論此盟之效、宜與敵痔盟相等、但多有不及敵痔盟之時、其故或因病者所受之毬、非盡係鍊毬、必兼受他類之毬、既兼受他類之毬、則用此盟時、只阻此一類之毬、與他類毬毫無阻力也、醫者宜詳察病者果受此毬之染否、方可用之、其用法與用敵淋盟同、分劑每十二句鐘、射二量錢半至五量錢、(10.0-20.0) 酌病用之、宜由著名藥行中購用。

敵白濁點毬盟 (ANTIGONOCOCCIC SERUM) 此盟乃由羊血製成、其大用係醫白濁[2]痺症、用法、以半至一錢半、(2.0-6.0) 每二至六日、射於皮內、或肌內、有效、惟射於腹皮內最妙、射後該處常顯激力、或發炎、或生團癥、並腠棚有腫脹之勢、全身亦常顯激力、身熱加增一或二度、且脈動署速、以上受激之狀、越一二日退盡、若用之醫白濁之尿腔炎、或精腺冠炎、功效不甚顯然、其故尚未知也。

敵腦衣炎盟 ANTIMENINGITIS SERUM) 此盟乃著名醫者、將腦衣炎雙點毬、射於馬盂內、係後取出其血而成、患腦衣炎[3]者、如及早射之、多能復原、用法、先以空針從脊腦取出腦

1 Erysipelas
2 Gonorrhœal rheumatism
3 Meningitis

力、若過一二日、豚鼠即死、則知毒力已足、再以此分劑之十倍、射於馬盂內、馬雖不易受此毒、因分劑過大、必患疫症、越十日則癒、再十倍其分劑射之、因其分劑尤大、馬又患此症、如此射法、至所射之分劑、較初用時多數百倍、馬仍無恙、其血中大有敵毒之質、於是放出其血、使盟與胨分開、貯而存之、患疫症者、射於身內、神效、售盟者、當先試其所製之力如何、可以豚鼠死亡分劑十倍之疫毒、射於身內、後射盟一量滴半、(0.1)如能救其不死、則每十五量滴(1.0)能救獸類一百、必有如此敵毒之力、方爲一度也、此盟之一度不以分量論乃以力量論　如醫者所用之盟、每十五量滴、(1.0)只含一度之力、射於人身、必用大分劑、方能見效、故製盟者、宜多射疫毒於馬身內、以激其血、多生敵毒之質、至每十五量滴、(1.0)能含百度之力乃佳。

用法　疫症初起時、射此盟三千度、則不至殞命、如病已至數日、必多射之、方能有效、若病勢甚重、亦有不能救之者、最妙之射處、乃二髆骨之中、病者且少受疼痛。

敵症盟(SERUM ANTITETANICUM)　此盟如用於受傷時、其效與敵疫盟相等、如病勢已顯、無效、因此症之毒穌、由傷口已入腦部、故不能救之。

敵鍊穌盟(SERUM ANTISTREPTOCOCCUM)　此穌入血、則血一被染、必患膿穌症、若產後熱症與

1 Diphtheria
2 Septicæmia
3 Puerperal fever

第十三章　論敵症盟類

各類之敵症盟、何以能醫病、其故人不盡知、所論者、不過醫家之臆度耳、謂人身各類之胜、與其宜用之育料、有連合之能、所以有此能者、因胜能發出數類之小囊、各囊有所應取之育料、不相紊亂、取足其所宜取者、胜則另發小囊、如必多用某類之囊、胜則多發之、倘胜被激、所發者過其所用、不能用者、即脫於血中、凡各種傳染症所生之毒素、乃一類之腥、與育料相似、故胜囊取之、胜即消滅、而病勢顯矣、如痘熱紅熱等症、不必人皆患之、其不患者、亦不受傳染、因其胜所發之囊、不取此類症之毒素耳、有數類症、人生只患一次者、其故因胜多發取此毒素之囊、脫於血中、後若再受此毒、囊雖取之、因其不與胜連、胜則不受其害、故無二次之患。

第五十一圖



此圖表明敵穌毒之質、如何由胜分出、與毒素相敵、

敵疫盟 SERUM ANTIDIPHTHERICUM, U. S.

先以疫毒一量滴半(0.1)射於豚鼠身內、以試其毒

力耗竭嬰骨軟突目等症、服之有效、惟腦力耗竭與嬰骨軟症、不但有助受育之功、且有平腦部之力也、按藥中能增血內白朕者、大概以此藥爲最、故服之或能增加白朕至三倍之多、惜其味不美、人多惡之、置於酒內、或製丸服之、俱可、分劑三至五厘、(0.2-0.3)每餐後服一次、但服此藥時、必多飲牛乳爲宜、蓋牛乳有養身之功也、如病者胃失功用、宜先醫胃經、後服此藥。

乳泉膏 (EXTRACT MAMMARY GLAND) 此乃以羊乳腺製成、近之醫者、多以之醫產後猶不復原或他類猶流血及血癇等症、有效、有醫者謂猶生筋瘤者、此藥雖不能驟治、然能阻其生長、分劑五厘、(0.3)日服三次、如流血甚多者、日服六次亦可、或謂服過分劑、則有心跳之患、然足分劑、或有助受育之功、按醫者所論、此藥醫猶軟筋瘤流血、不如醫猶硬筋瘤流血之功爲大也。

利沛年 (LIPANIN) 此藥乃以油酸六分、洋橄欖油百分製成、可代魚肝油之用、其擅長之處、乃在易成勻藥、不難消化、且無惡味也、初服之分劑一量錢、(4.0)後可增至四量錢、(16.0)凡各類耗腸之症服魚肝油有效者、服此藥亦每有效、如每日三次兼服鈉硫下磬錯硫下磬等十厘、(0.6)其效尤妙、若宜服改症藥類、兼服鉄氣塩亦可。

1 Rickets
2 Exophthalmic goitre
3 Subinvolution of the uterus
4 Uterine hemorrhage
5 Metrorrhagia
6 Uterine fibroids

射於患處、或距患處稍遠射之、射後藥與腦互感之效、如射瘰癧素然、但未射之先、宜查明病者、曾患骨癆肺癆瘰炎等症否、如果患之、雖痊癒日久、用此藥亦不甚穩妥、恐患處復發也、亦有病者曾患發炎而非瘰炎者、雖炎勢已過、而腦終未復原、若用此藥或射或服、藉藥腦互感之效、該處亦能復原也、按射此藥者、越數句鐘、其效即顯、服之者其效稍緩、亦有服之不顯功效者、射後感腦之力約存五句鐘之久、有醫者以此藥能使瘢痕變軟、能祛瘢腦、故有時用之以祛瞭瘢[1]之患、亦有醫者用之醫耳鼓變厚、或中骨不靈、以致耳聾[2]者、然雖有此效、而用之者少、其故尚未知之、近有醫者、以此藥與鈉砒霜礬、製成冷水能化之藥、以便製成消水之用、然此消水遇氣最易改其體質、如以二十量滴(1.3)此二十量滴內含此藥三厘(0.19)置於玻璃管內、嚴密封之、乃可久存不壞、即爲一次之用、最妙之射處、乃射於肌內、或謂如此射之、亦不覺痛、用此藥者、美國較少於德國、蓋多以其有危險也。

卵黃素(LECITHIN) 此藥由卵黃而得、色黃、成塊、爲人身內所含之物、腦中含砒多處、則含此物亦多、而血脉中亦畧含之、醇酒、伊打、哥羅芳、油類、俱能化之、腦部失其功用、或因肺癆症而腦部大受其阻、且身體甚顯虛弱者、服之有效、各類腦力虛弱之患、如腦

1 Corneal opacities 4 Nervous exhaustion
2 Deafness
3 Neurasthenia

卵腺膏 (OVARIAN EXTRACT) 此乃由羊取出、製之成膏、亦可製之成散、婦女經絕或因病割取卵腺之後、而腦部失其功用者、服之每效、且不顯乖效、故可久服、初服之分劑、每日二至四厘、(0.12-0.25) 後可漸增、至見功效爲止、倘毫無功效、即應止服、因其功效無常、故重視此藥者有之、輕視此藥者亦有之、最妙之服法、乃製成藥輪也。

腥氯塩 (IODALBIN) 此塩乃以腥與氯製成、近年始入藥用、其中所含之氯、較鉄氯塩所含者、約少一半有奇、然用此塩時、分劑僅等於鉄氯塩、其功效即與之同、蓋此塩所含之氯、一入腹中、必與腥相分、被陳於身內、鉄氯塩不能如此也、分劑五厘、(0.3) 酌病增減。

賽歐司民 (THIOSINAMINE) 此藥乃由一類草根之精油、或芥子之精油、加醇酒與鹽沝消水、以火熱之而得、結晶、形成三棱、溫水二分、能化藥一分、醇酒、伊打、俱能化之、此藥之消水、以藍試紙試之、色不變紅者乃佳、分劑、日服半至一厘、(0.03-0.06) 如分劑過大、恐有惹胃之患、若胃不受惹、則可增至三厘、(0.2) 路浦司[2]瘢瘤[3]用之有效、醫瘢瘤症、以此藥一分、加醇酒十分、製成消水、每三或四日、用空針射十至二十量滴、(0.6-1.3) 射時常覺甚痛、厥後患處每顯青腫、尿亦增多、或有兼惡心嘔吐者、醫路浦司症、以此消水

1 Menopause
2 Lupus
3 Keloid

皮內、既無惹力、又無乖效、肺癆症[1]兼有血虧[2]而虛弱[3]者、此藥有效、射分劑、乃一厘之四分之一、至四分之二、(0.015-0.03)服分劑、乃二至四厘、(0.12-0.25)有醫者謂服此藥者、不但口有蒜味、胃亦受惹、射皮內之良方如左。

鈉砒霜磬	℞-Sodii cacodylatis	百英厘 (6.6)
炭酚	Phenolis, U. S. Acidi carbolici, B. P.	一量滴 (0.05)
蒸水	Aquæ destillatæ	三量兩 (90.0) — M.

以此方置於火上沸之、後以滅稚之濾具過之、加滅稚蒸水三量兩、(90.0)射於皮內、分劑、十五至二十量滴、(1.0-1.3)按此藥在人身內、不易分開、故能服大分劑、但其病宜速受砒感者、此藥不爲妙劑、醫者宜切記之。

錄核磬 (MERCUROL) 此乃錄與核素製成之磬、水易化之、無凝胎之力、與惹力、有滅膿稚之功、或曰以滅白濁點稚、此藥爲最、故白濁與白濁睾炎[4][5]症、用之大效、如醫白濁症、以似盟塩消水百分、加藥半至一分、射於尿脬內、如病勢甚重、加藥二分亦可、製消水時、宜將藥撒於水面上、爲使其易於融化也。

1 Tuberculosis
2 Anæmia
3 Debility
4 Gonorrhœa
5 Gonorrhœal ophthalmia

於患處、用噴霧具噴之亦可。

胸腺 (GLANDULÆ THYMI) 此藥之大用、乃醫癭[1]症、且無乖效、與脾腺不同、亦有用之以代脾腺者、如人胸腺消瘦過早、服之有效、初宜服小分劑、每七日分服半兩、(16.0)後每七日服一兩。(30.0)

賽魚湍 THIOL 此藥乃由棕色之煤蠟、或由作煤氣時所餘之油類、用化法而得、可代魚石湍之用、價直較廉、且無其臭昧、分爲二種、一係流質、名流賽魚湍、色深棕、質似油、臭之與樺木油相似、以試紙試之、無改色之能、醇酒伊打、畧能化之、水易化之、製成消水、過光而不改其本色、如加甘油少許、則製消水較易、一係定質、名乾賽魚湍、放光、形如鱗片。

療效 此藥之體功效、雖與魚石湍相似、而其效未必相同、蓋魚石湍醫病之能、迥異尋常、無藥能及之也、路浦司[2]濕癬[3]癟及等症、此藥俱效、如醫濕癬症、先以減穌之消水洗淨患處、以乾賽魚湍製散敷之、或以乾賽魚湍一分、加水十分、製成消水、以布蘸敷亦可、骨節[5]有滲出之質、或謂以此藥祛之、其效與魚石湍相等、但用之者少、未可確信。

鈉砒霜礬 (SODII CACODYLAS) 此藥色白、形成細粉、水易化之、其用與砒同、如以此藥射於

1 Goitre
2 Lupus
3 Moist eczema
4 Syphilides
5 Exudates about joints

第五十圖



此圖表明腎上䘌精如何增血壓之力設有一犬其先血壓如常至箭鏃處射此藥一厘之一千六百分之一(0.00004)於盂內其血壓立增

嗓之割症、如敷此藥、可免流血之患、痿[1]傷風[2]、草[3]泗炎、睟[4]炎、睟[5]癥炎等症、必有泗膜積血之患、敷之大效、心[6]與絡部猝受阻時、士的年所不能激者、射此藥於盂內、常效、如吸[7]哥羅芳者絡部被阻以此法射之、庶可救其生命、割[8]症後如有腦力猝衰之勢、亦可射於盂內、射法以腎上䘌精消水、(此消水乃腎上䘌精一分加水十分而成)一至二量錢、(4.0-8.0)再加似盟塩消水一量磅、(480.0)用空針射於盂內、但不可過濃、恐射處之血受阻、穩得生機、致有成疥之患。

藥製與分劑

枯腎上䘌 Glandulæ Suprarenales Siccæ U. S. 三至十厘、(0.2-0.6)日服三或四次。

外用 以腎上䘌精氯塩 (Adrenalin Chloride) 一分、加似盟塩消水千至萬分、用絮蘸之、敷

1 Asthma
2 Coryza
3 Hay fever
4 Conjunctivitis
5 Trachoma
6 Sudden cardiac failure
7 Vascular relaxation in chloroformization
8 Surgical shock

鮮牌橢三至十五厘 (0.2-1.0) 初服一厘、(0.06. 後則日增一厘、(0.06) 服至六厘、(0.36) 宜停而不增、後當視其病勢、以增減之、但不可越十五厘。(1.0)

牌橢消水 Liquor Thyroidei, B. P. 五至十五量滴、(0.3-1.0)

乖效 服過分劑者、頭必甚痛、心經被阻、亦或有嘔吐之患、見此等乖效、宜止服數日、如欲再服、必先用微分劑、漸次加增方可、初服此橢者、宜用小分劑、並令病者躺卧、不食油膩、則少有乖效。

腎上橢 (GLANDULÆ SUPRARENALES) 此橢與其精、近數年來、醫者多用之、大顯功效、如敷此橢、能使細脉與鑑縮小、服之、全身之脉、亦受感而縮小、日本化學家他哈米尼者、先得其精、名腎上橢精、(Adrenalinum) 色白、結微晶、加氫氯酸數滴、水能化之。

體功效 將此橢之膏或精、敷於泗膜上、能令鑑腔縮小、血不能入、以致泗膜發白、至藥效已過、則鑑運血如常、不見鬆大、與敷寇卡印者不同、服此藥者、脉必遲緩、蓋因顱臟腑系被激也、且脉腔縮小、血壓加增、以致運血之功、畧受其阻、實因脉腔被激、非由司絡腦所被激也、與盂毫無關係。

療效 凡細脉[1]流血之患、以此藥敷傷處、乃爲上品、鼻[2]患、經[3]旺、癇[4]等症、其效甚妙、鼻耳喉

1 Hemorrhage
2 Epistaxis
3 Menorrhagia
4 Metrorrhagia

枯脾棚 GLANDULÆ THYROIDEÆ SICCÆ, U. S. THYROIDEUM SICCUM, B. P.

脾棚缺功、或胎生脾棚缺功者、近數年來、多用羊脾棚爲特藥、其效甚妙、蓋此等症、乃因脾棚消瘦也、最妙者、乃以枯脾棚研末用之、如枯者不便、服鮮棚數厘亦可、但其味不美、如畧煎或煮之、其不美之味雖減、而其力亦減矣、若人不能每日得此鮮棚、將鮮棚鬱碎、用甘油等分、置於其內泡之、越一日、置於布內、壓出其汁、此汁能存而不壞、可服三至十五量滴、(0.2-1.0) 病者甫瘉、切勿止而不服、宜日服微分劑、或每月中服足分劑數日最妙、恐其病復作也、肥胖過度者、服之而見大效者有之、毫不見效者亦有之、蓋因此棚不只消減脂膠、亦消減肌膠、故服時病者當多食肉類、與含氮之物、不然則身力必漸減少、但服此棚者、如多食葡糖、必有糖尿之患、故肥胖而兼有糖尿症者、忌服、新狂、憂鬱、產後狂、經絕狂等症、服之有效、如服至一月而不見效、卽可止而不服、惟突眼瘿症、不可服、近有醫者云、顯癇之兆者、如服足分劑、可免此患、蓋因此棚有利小便、並祛尿腥基之能也。

藥製與分劑

枯脾棚	Glandulæ Thyroideæ Siccæ, U. S.	一至五厘 (0.06-0.3)
英枯脾棚	Thyroideum Siccum, B. P.	三至十厘 (0.2-0.6)

1 Myxœdema
2 Cretinism
3 Obesity
4 Acute mania
5 Melancholia
6 Puerpera insanity
7 Climacteric insanity
8 Eclampsia

蒲流膏 Fluidextractum Taraxaci, U. S. Extractum Taraxaci Liquidum, B P. 半至二量錢 (2.0-8.0)

魚石澔 (ICHTHYOL)

此藥乃由一類變石之魚、用乾烝法而得、其色深棕、別具一種氣息、原分二種、一名錏魚石澔、一名鈉魚石澔、內含硫質百分之十、其功效多緣於此、體質似漿、但鈉魚石澔、較錏魚石澔尤濃、水能化之。

療效 近二十年來、新入藥用之品、未有過於此者、其大用乃醫節[1]痺新症、宜以此藥半兩、(16.0) 加猪脂、或羊毛脂一兩、(30.0) 製成抹膏用之、用法先以此膏敷患處、再攤於布上纏之、可減其痛、如以後骨節不靈、仍以此膏搓之有效、瘰[2]症、敷之亦爲最妙之品、宜先洗淨患處、以藥敷之、再攤於布上貼之、如面患此症、可將所貼之布、剪作數孔、以露其口眼鼻也、更有數症、因此膏過濃、其力甚大、宜以此藥一分、加猪脂、或羊毛脂四分、製膏用之、若腥腺炎、癰[4]症、路浦司[5]、瘢瘤[6]等之久皮症、以及凍傷[7]、凍瘃[8]、燙傷[9][10]等患、敷之俱效、瀝[11]棚過長、搓之有效、筋扭[12]新傷、如顯腫勢、搓之亦效、乳頭裂[13]症、敷之有效、但乳嬰時、務要洗淨、否則恐嬰不欲食之矣、若鼻臭[14]症、以此藥四十厘、(2.6) 化於一兩 (30.0) 流煤蠟內、敷於鼻孔中有效、[15]窖外膕炎症、而有滲出之質、存於盆內者、盆卽尻骨俗稱爲尻骨盆 以此藥製成陰彈、塞至窖頸、大效、服分劑一至十厘、(0.06-0.6) 成丸用之。

1 Acute articular rheumatism
2 Erysipelas
3 Acne
4 Eczema
5 Lupus
6 Keloid
7 Chronic skin disease
8 Frostbites
9 Chilblains
10 Burns
11 Lymphatic enlargement
12 Acute sprains
13 Fissure of the nipple
14 Fetid ozæna
15 Periuterine exudations

醇酒、伊打、哥羅芳、俱能化之、水不能化。

療效 癧症昔多以此藥醫之、近日用者少、痺[1]症、昔常以此藥醫之、近則多以他藥代之、喉門[2]新炎症、如以此藥三十厘、(2.0) 加卵青調勻服之、或可敵禦此症、使之就痊、有著名醫者云、常犯癇[3]症者、如日服此桶三次、每服五厘、(0.3) 漸增其分劑、至十厘 (0.6) 爲止、可免此患。

藥製與分劑

怪阿克酒	Tinctura Guaiaci, U. S.	五至六十量滴 (0.3-4.0)
怪阿克鍮沁酒	Tinctura Guaiaci Ammoniata,	十至六十量滴 (0.6-4.0)
怪阿克調水	Mistura Guaiaci, B. P.	一至二量兩 (30.0-60.0)
怪阿克桶餅	Trochiscus Guaiaci Resinæ, B. P.	每餅內含此藥三厘 (0.2)

蒲 TARAXACUM, U. S. TARAXACI RADIX, B. P. 此係一類之草、各處皆有之、因其味苦、故有補效、肝失功用者、古時常用其鮮根以醫之、乾者無效。

藥製與分劑

蒲膏	Extractum Taraxaci,	五至三十厘 (0.3-2.0)

1 Rheumatism
2 Acute tonsillitis
3 Gout

解毒法 服毒分劑者、無藥能解之、惟炭匿酸畧敵此毒、宜用吐藥與胃抽器、並用鴉片、以止其痛、服油類藥、以平其育道、如有腦力脫失之勢、宜用煖法以煖其身、服伯蘭地以激其心、且宜射阿刀便以激其絡部、或有幾希之望也。

洋茯苓 SARSAPARILLA, U. S. SARSÆ RADIX, B. P. 此藥產於中亞美利加、服之者似無體功效、惟畧有補力、如與他藥同服、有輔助之功、癧症、有時鈹氣鹽所不醫能者、若專用此藥、亦無功效、必二藥並用方可。

藥製與分劑

洋茯苓雜糖漿 Syrupus Sarsaparillæ Compositum, U. S. 一至四量錢 (4.0-16.0) 此藥以洋茯苓、並洋黃樟、甘草、冬綠、辛那等藥製成。

洋茯苓雜流膏 Fluidextractum Sarsaparillæ Compositum, U. S. 半至一量錢 (2.0-4.0) 此膏所用之藥品、與雜糖漿同。

洋茯苓流膏 Fluidextractum Sarsaparillæ, U. S. 半至四量錢 (2.0.16.0)

洋茯苓濃雜消水 Liquor Sarsæ Compositus Concentratus, B. P. 二至八量錢 (8.0-30.0)

怪阿克 GUAIACUM, U. S. GUAIACI LIGNUM, B. P. 此藥係一類之樹、產於西印度、內含一桶、名怪阿克桶、此桶

不同。

哥枝禁子葡酒 Vinum Colchici Seminis, U. S. 二十至四十量滴 (1.3-2.6)

病重者、可服六十量滴、(4.0)此乃最妙之品。

哥枝禁根膏 Extractum Colchici Cormi. U. S. 半至一厘 (0.03-0.12)

哥枝禁子流膏 Fluidextractum Colchici Seminis, U. S. 二至四量滴 (0.1-0.25)

哥枝禁子酒 Tinctura Colchici Seminis, U. S. 十五至六十量滴 (1.0-4.0)

哥枝禁子酒 Tinctura Colchici Seminum, B. P. 五至十五量滴 (0.3-1.0)

哥枝禁葡酒 Vinum Colchici. B. P. 十至三十量滴 (0.6-2.0)

哥枝禁膏 Extractum Colchici. B. P. 一厘之四分之一至一厘 (0.015-0.06)

哥枝禁印 Colchicina, U. S. 一厘之百分之一至五十分之一 (0.0006-0.0012)

成丸服之。

毒力 服毒分劑者、先則惡心、腹痛、重瀉、後則瀉泗液、肛急、漸次加重、口流涎沫、腦力脫失、以至殞命、但鮮有便血者、若服此藥之葡酒一量兩、(30.0)必致腹痛甚重、漸至殞命、絶無他望。

哥枝禁印雜膏 ℞-Extracti colocynthidis compositi 十至二十英厘 (0.6-1.3)
鬧羊花膏 Extracti hyoscyami 二英厘 (0.12) —M.
製成四丸、病將發時、可服一丸。Fiant pilulæ No. iv.
S.— One as soon as threatened by an attack.

如兼大便結燥、此方尤妙、見瀉效後、服哥枝禁根葡酒、三十至四十量滴、(2.0-2.6) 越十二句鐘、再服二十量滴、(1.3) 若久癇久痺二症、兼服鉄氯塩有效、其良方如左。

鉄氯塩 ℞-Potassii iodidi 半至一英錢 (2.0-4.0)
哥枝禁子葡酒 Vini colchici seminis 百二十量滴 (8.0)
白葡酒 Vini albæ 加至三量兩 (90.0) M.—
宜貯於瓶內、每飯後服半量兩、(16.0) 用時必先搖動之。
S.— Tablespoonful three times a day after meals. Shake well before using.

用此藥者、不宜令人瀉腹過甚、恐有危險、亦可用哥枝禁印日服三次、每服一厘之百分之一、至六十分之一、(0.0006-0.001) 以醫癇症有效、如與冬綠油同服尤妙。

藥製與分劑 此藥未經泡製者不宜服、其製成之酒與膏、在英美揀藥册中、所論之力

油加胆梅之足分劑、射於肛內者、以胆梅能助其消化之力也、亦有再加幾阿蘇五至十量滴、(0.3-0.6) 射之者、以幾阿蘇能使藥不變壞、且於被喘後可以祛痰也。

濃硫強酸 ACIDUM PHOSPHORICUM, U. S. ACIDUM PHOSPHORICUM CONCENTRATUM, B. P. 此酸少入藥用、分劑二至五量滴、(0.1-0.3) 常用者、乃淡硫强酸、Acidum Phosphoricum Dilutum, 分劑二十至六十量滴、(1.3-4.0) 此藥有補力之效、亦有激胃之能、體功效與硫不同、不能養育腦部、故不可代硫之用。

鋁硫強鎂 CALCII PHOSPHAS PRÆCIPITUS, U. S. CALCII PHOSPHAS B. P. 詳見鋁篇

鋁硫下鎂 CALCII HYPOPHOSPHIS, B. P. 詳見鋁篇

哥枝禁 COLCHICI CORMUS, 此藥係一類之花、內含一塊、名哥枝禁印、其子與根、皆入揀藥冊、但常用者乃其根。

體功效 此藥敷於皮上、則有惹力、服足分劑者、大便必多含膽液、亦有嘔瀉膽液者、過分劑、有惹育道之力、中分劑、於身熱度、及腦絡呼吸等部、無甚感能、惟毒分劑、則大顯阻力、中此毒而殞命者、乃先停呼吸、後停心經、因育道受惹、遂促之殞命矣。

療效 此藥之大用、乃醫癎[1]與久痺[2]等症、患新癎症者服之、必腹痛、或輕瀉、方能見效、此藥無防症之能、或有服之而病發反速者、醫新癎症、宜先服瀉劑、良方如左。

1 Gout
2 Chronic rheumatism

服此藥乃爲妙劑、癆[1]症、尚未成形、服之有效、因其有養育之能、並有改症之效、若已成形、服之無效、如仍服之、必有惡心、或瀉腹之患、緣其不能消化也、久痺[2]症、服之大效、如病在肌內、其效尤顯、癧[3]皮症而兼血薄[4]者、服之常效、盡棚[5]過長、如不生膿、或生膿遲緩者、有效、癧眸[6]炎症、服之大效、癢[7]症晚程、並嬰[8]骨軟症、服之亦效、衰瘦[9]症、此藥最妙、如嫌其味惡、不欲服之、以此藥擦身亦效、骶[10]大系痛、腰痺[11]系痛[12]等症、服之有效、如因血薄之故、其效尤妙、有醫者云、氣腫[13]症有效、若年邁者、顱腦胃經無恙、但時患頭暈[14]、可與貴林之小分劑同服、或效、如不見效、可服麥奴流膏、與鋏氣塩。詳見麥奴篇

服法 此油之味甚惡、如能設法服之、亦可減少其味、久之自不覺矣、孩童最易服之、凡服之者、宜先用小分劑、置於牛乳內、猛然吞下、可免其味觸鼻、惟在飯後二三句鐘最妙、蓋此藥必在小腸內、方能消化、此時胃中之食物、將送入小腸、藥可隨之而入也、服後再服脛梅少許、以助其消化之功、有先將鈉氯塩少許、置於口內而服之者、服後再食鈉氯塩少許、可助其消化之功、兼免惡味、陳皮糖漿、亦能減少其味、或置於藥殼內服之亦可、初服者、如心中作惡、恐不易再服、故先只在晚餐後服之、隔數日、每餐後亦可服之矣、藥行內有魚肝油勻藥數種、雖云其味不惡、然人仍不易服、近有醫者、用此

1 Phthisis
2 Chronic rheumatism
3 Strumous skin diseases
4 Anæmia
5 Enlargement of lymphatic glands
6 Strumous ophthalmia
7 Advanced syphilis
8 Rickets
9 Marasmus
10 Sciatica
11 Lumbago
12 Neuralgia
13 Emphysema
14 Giddiness

不符之藥　此藥於金類之蓼、亜鉛類之藥、不可合用。

蘇作多（SOZOIDOL）此藥乃用化法而得、如傷口不淨、以此藥五分、加水百分、製成消水洗之、不但能滅穢、且滅癘毒、口白瘍新症、[1]喉泗膜炎症、[2]可敷此消水、[3]白濁睾新炎症、[4]嬰孩瞎膿炎症、以此藥二分、加水三十分、製成消水、洗之有效、[5]頸泗炎、以此藥製散、撒於絮上、自陰道塞至患處、有效、至於他類泗膜炎、醫者雖未曾用此藥、不過因其入藥年少、未經查驗可用與否、按理而論、宜有功效。

魚肝油 OLEUM MORRHUÆ 此油乃由一類海魚而得、分白黃淺棕三色、白色爲人所常用者、但淺棕色者、功效尤大、此藥中最要之質、乃氮與氯、且有硫强硫强等酸、以出自挪危者爲上品。

體功效　此油有佐身熱之功、最易消化、服之者、腸內之脂加增、血紅胰亦增、其大效不盡在油、乃在所含之各質、故醫者用化法查明、按其質之多寡、化合成油、名曰莫胡拉、Morrhuol 以代此藥之用、亦效、其三至五厘（0.18-0.3）與此藥六十量滴（4.0）之力相等、惟養育之能、究不如此油之大、易患傷風者、用之有效。

療效　人之肺經、雖未受癆穢之毒、而氣腔泗膜、每易發炎、如此景況、即爲癆[6]症之先兆

1 Acute stomatitis
2 Laryngeal Catarrh
3 Acute purulent conjunctivitis
4 Ophthalmia neonatorum
5 Catarrh cervix uteri
6 Pre-tubercular stage of phthisis

哥羅芳、火棉酒、俱能化之、醇酒畧能化之、宜貯於深黃玻璃瓶內、可代黃氣之用、氣味不似黃氣之惡、或謂此藥較黃氣不易中毒、有時用之、較黃氣尤妙、亦有時其效不如黃氣之大、但視其病何如耳、以其敵桿稚點稚之力、不及黃氣之大、故敷於濕皮症類、其效不甚顯然、若乾皮症類、則有大效、遺癢毒之瞭炎、如以此藥散、每日撒之、大效。

挪色分（NOSOPHEN）此藥亦爲氣礬類、其色灰黃、無味、不易融化、惟鹼類能化之、功用與黃氣同、體質較黃氣輕四倍、用時宜將傷處之膿痂洗淨、敷於活膈之上方可、倘不洗淨、其效必少、但於未敷之前、若能用法滅盡藥中之稚爲尤善、因此藥熱至二百二十度、體質並無改變也。

猶柔分（EUROPHEN）此藥乃爲細粉、亦係氣礬類、色黃、醇酒、伊打、哥羅芳、油類、俱能化之、水不能化、可代黃氣之用、因其中氣質、散之甚緩、故敷於傷處、不易中毒、但無速效耳、其大用乃敷濕瘡、因其較黃氣輕五倍、而多有吸濕之能、使瘡變乾、稚則無從生長矣、癖皮炎[2]、腿瘍[3]、路浦司等症、有效、瘰癧[4]症則不如黃氣之妙。

用法 此藥可製成抹膏用之、每百分內、含此藥五至十分、服分劑一至三厘、(0.06-0.2)瘡[5]症服之有效。

1 Interstitial keratitis
2 Serofuloderm
3 Ulcer of the leg
4 Lupus
5 Syphilis

黃色之瓶內、功用與黃氣同、氣味不似黃氣之惡、嗓癆症、以此藥散置於吹藥筒內吹之、常效、因其無味、故病者亦不厭惡、有著名醫者謂、糖尿症、日服三次、每服二至六厘、(0.12-0.4) 有效、癰症之晚程、如上服之、亦效、浮傷之良方如左。

埃多 R-Iodoli	一分
伊打 Ætheris	十分
火棉 Pyroxylini	五分

此方名埃多火棉酒、敷於傷處。M. S.— Apply locally.

癩症或鼻下之火瘡、良方如左。

烳醇 R- Phenolis, U. S. Acidi Carbolici, B. P.	五量滴 (0.3)
玫瑰油 Olei rosæ	五量滴 (0.3)
埃多 Iodoli	二十五英厘 (1.6)
羊毛脂 Adep. Lanæ	半英兩 (16.0)

製成抹膏、敷於患處。M. S.— Apply locally.

阿色透

THYMOLIS IODIDUM, U. S.

此藥乃氯洋蘇冰之鬱、其色或似深棕、或紅黃無常、伊打、

1 Tubercular laryngitis
2 Diabetes mellitus
3 Tertiary syphilis
4 Eczema

於肛內、後再多用水射於腸內、有效。

內用 癆症之晚程、服之有效、分劑一至五厘、(0.06-0.3)

藥製與分劑

黃氣抹膏 Unguentum Iodoformi, 此膏宜用新製者。

黃氣肛彈 Suppositoria Iodoformi, B. P. 每彈內含黃氣三厘、(0.2)

乖效 此藥乖效之狀、於毒力中發明之、但中毒最輕者、其狀不甚顯然、故醫者用此藥時、務宜謹愼、有時遍體生癮、與紅熱症相似。

毒力 敷此藥顯中毒之狀畧輕者、則覺睏倦、惡心、鼻中常有異味、或頭痛、嘔吐、重者以上之患既過、則腦部被激、致有不寐、健忘、厭食、脉速等患、尤重者、則癡癋、瘋狂、昏迷、更迭而至、脉微而速、有時尿積、亦有尿中含血者、及其死也、心經與呼吸部、一時俱停、凡敷藥而中毒者、約在三日內、各狀必忽然而顯、年邁者、中毒最易。

解毒法 鈉輕碳强鬱、爲此藥之敵藥、亦可服葡萄酒、以激生命司所、並宜用利小便、與發表等藥。

埃多 IODOLUM, U. S.

此藥乃一類氣鹽、其色混黃、醇酒、伊打、油類、俱能化之、宜貯於深

1 Tertiary syphilis

癩[1]症作癢、良方如左。

黃氣	R-Iodoformi	四英厘 (0.25)
郁加列普油	Olei eucalypti	一量錢 (4.0)
軟煤蠟	Petrolati, U. S. Paraffini mollis. B. P.	一英兩 (30.0) M.

敷於患處。S.—Apply locally

此藥有滅瘰癧之能、骨節[2]或胸統膜[3]之瘰症、常以此醫之、用法、放膿時、宜防身外之穢、入於傷口、以溫硼强酸消水、或非醇消水、冲淨膿袋、後以滅穢之洋橄欖油九十分、與黃氣散十分、製成勻藥、以一至六量錢 (4.0-24.0) 射於其內、過半月、如瘡口無收斂之勢、宜再割開、刮其膿袋之內面、後仍用勻藥、或黃氣紗塞滿之、瘰癧[4]症、無論其生膿與否、以此勻藥射之有效、嗓瘰[5]症、如以最細之黃氣散、用吹藥筒、吹於嗓內有效、亦可用此藥二厘 (0.12) 加松節油半量兩 (16.0) 洋橄欖油半量兩 (16.0) 用噴霧具噴之有效、氣腔[6]泗膜[7]久炎症、用此方噴之、能使其咳嗽生痰、一並減少、肛裂[7]或痛痔[8]等症、以此藥五厘 (0.3) 製成肛彈、塞於肛內、越五分鐘、如見大便、其痛必減、割會陰後、用此肛彈、亦有止痛之能、嬰孩吐瀉症、多有肛急[9]之患、如以此藥五厘 (0.3) 加洋橄欖油一量兩 (30.0) 射

1 Eczema
2 Tubercular disease of joints
3 ,, ,, ,, pleura
4 Tubercular glands
5 Laryngeal phthisis
6 Chronic bronchial catarrh
7 Fissure of the anus
8 Painful hemorrhoids
9 Tenesmus of cholera infantum

體功效 此藥常爲敷傷之用、敷於週身、於絡與呼吸、無甚感能、服中分劑亦然、如敷於泗膜、則有痲效、並有改症之功、乃由涎與尿而祛。

療效 此藥之用、乃敷於傷處、近數年來、因其味惡、故用者較少、按此藥有免腐之力、而無滅穢之能、蓋穢在藥中、猶能生長也、惟其能將傷處變乾、致穢不易生長、且敷於傷處、本體改變、畧顯氣質、穢所生之毒、氣質可以敵之、醫癩瘡[1]之良方如左。

黃氣 ℞-Iodoformi 二十英厘 (1.3)
郁加列脅油 Olei eucalypti 半量兩 (16.0)
敷於瘡上。 S.—Apply locally.

又方

黃氣 ℞-Iodoformi 半英兩 (16.0)
樟腦 Camphoræ 七十五英厘 (5.0)
玫瑰油酒 Essentiæ rosæ 二量滴 (0.1) —M.
敷於瘡上。 S.—Apply locally.

1 Syphilitic sores

置於藥壳內、多用水送下亦可、其分劑乃五至六十厘、(0.3-4.0)日服三次、但視病勢如何耳、且宜於飯後一句鐘服之、則胃經少受其惹力。

乖效　服此藥者、每有瞼邊發炎、並鼻噻之患、服小分劑、較大分劑乖效尤顯、如仍服之、必漸次加重、見中氯毒篇亦有服之瞼腆腺炎、且有胃經不平、食物難化者、如與砒兼服、則腆腺不至發炎矣、又有服之而腿生癮、或瀉腹、或憂悶而倦怠者、倘服此藥非宜、可以錏氯塩、或鈉氯塩代之。

鈉氯塩　SODII IODIDUM,

此塩之功用、並分劑、與鈇氯塩同。

錏氯塩　AMMONII IODIDUM, U. S.

此塩之色先白、後則黃而棕、宜貯於深黃瓶內、用合宜之塞塞之、如其色過深、則不宜用、分劑二至五厘、(0.12-0.3)功用與鈇氯塩同、喉門[1]腦腫脹久症、以此藥三十厘、(2.0)化於一量兩(30.0)甘油內、每日以刷敷之、有效、製成之後、宜貯於瓶內、嚴密塞之、庶不致改其體質。

鉍氯塩　STRONTII IODIDUM, U. S.

此藥之功用、亦與鈇氯塩同、分劑五至十五厘、(0.3-1.0)

黃氯　IODOFORMUM,

此藥色黃、結晶似鱗、別具一種氣息、酔酒、伊打、哥羅芳、油類、俱能化之水不能化。

1 Enlarged tonsils
2 Syphilitic sores

症、服之或能祛痰、使之復原、如因癰症、致患血囊[1]、此藥大效、其痛腫跳等患、必能漸次減少、以至痊癒、若總脈有此類之血囊、其效尤顯、癖症[2]如病原在氣管之內、服之大效、若因胃不消化所致、此藥反增其病勢、氣管[3]久炎、與腸泗[4]久炎等症、用鋅氯鹽無效者、日服此藥三次、每次三至五厘、(0.2-0.3) 每效、總之小分劑有激生液之能、大分劑有阻生液之力、此外更有他用、肺氣腫[5]症、而氣管久炎者、用之常有神效、如氣管久炎、生痰過多者、因其有激生痰之力、故不宜用、腎久炎[6]症、若腎經之功用、猶能祛此藥、可用爲祛痰之劑、因其有利小便之能也、癭[7]症敷服皆爲妙品、傷風[8]初起時、服此藥十厘、(0.6) 或可遏其病勢、肝變[9]硬新症、緣此藥能阻連膈生厚、服之常效、脈變[10]壞症、與鈉氯鹽、毛地黃同服、有效、頸瀝棚[11]腫脹症、服之有效、肺炎[12]之晚程、服之可以祛痰、肺癆症、因其有廢膈之力、故不宜服、無論何症、如兼有癰症者、皆可服之。

藥製

鈥氯鹽抹膏 Unguentum Potassii Iodidi. 此膏宜用新製者。

鈥氯鹽皺擦藥 Linimentum Potassii Iodidi cum Sapone, B. P.

服法 因此藥之味不佳、故宜與洋茯苓雜糖漿同服、如此漿不便、可以甘草膏代之、或

1 Aneurism
2 Asthma
3 Chronic bronchitis
4 Chronic intestinal catarrh
5 Pulmonary emphysema
6 Chronic nephritis
7 Bronchocele
8 Acute coryza
9 Hepatic cirrhosis
10 Atheroma
11 Enlargement of cervical glands
12 Pneumonia

療效　此藥之大用有三、一醫癨症、此症無論何程、皆可用之、晚程尤妙、且患此類病者、雖常服足分劑、亦無乖效、有醫者謂此爲常理、無足怪者、但此類症、每有不能服此藥者、如是服大分劑而無乖效、不足定其曾患癨症、不能服大分劑、亦不足定其未患癨症也、有患遺[2]瘳遺[3]癩遺[4]痺等症、能常服大分劑者、有患癨症、服小分劑、而顯乖效者、醫癨症、當先服十厘、(0.6)日服三次、後漸增其分劑、有時病者每日能服一二百厘、(6.6-13.2)曾有每日服至四百厘(26.4)者、最妙之服法、以此藥一兩、(30.0)加水一量兩(30.0)化之、先服十量滴、(0.6)每日增一滴、(0.06)顯乖效後、減其分劑三分之一、乃爲常服之分劑、如與洋茯苓雜糖漿半量兩(15.0)同服、其效尤妙、此藥之效、較銶類藥畧緩、而癨症至晚程用之最妙、各類腦癨症、常以此藥醫之、如生命司所有癨瘤者、則宜用銶類藥、因其效尤速也、除此危症之外、只用此藥醫之、如因癨症、致[5]失和動者、此藥不能使之復原、只可免其增重而已、因腦胅已壞也、凡服此藥者、如兼用汽浴法、(見熱法篇)其效尤妙。二解毒、漸中[6]鉛[7]鉦[8]砒[9]銶等毒者、如服此藥、能令身內之毒、與此塩相合、成爲可化之礬、故能祛之。三敵痺、[10]節痺新症、服之少效、若節痺久症、輕重無常、與哥枝禁根酒兼服、甚妙、[11]骶大系痛、[12]腰痺、[13]痺系痛等症、服之或效、[14]胸統膜久炎、[15]心統膜炎、並[16]腦房痕等

1 Syphilis
2 Hereditary asthma
3 Hereditary gout
4 Hereditary rheumatism
5 Locomotor ataxia
6 Chronic lead poisoning
7 ,, zinc ,,
8 ,, arsenic ,,
9 ,, mercury ,,
10 Acute articular rheumatism
11 Sciatica
12 Lumbago
13 Rheumatic neuralgia
14 Chronic pleurisy
15 Pericarditis
16 Hydrocephalus

多、脉速而微、面白、尿閉、以至殞命、蓋因呼吸部受阻也、如所用之分劑、不致立時殞命、越數日後、仍不能免、因育道發炎、全身之胴俱變壞爲脂也。

解毒法　此藥之毒、糓能解之、但宜多服、且當用吐藥、或胃抽器、亦宜用煖身之法、如絡與呼吸受阻、宜用空針射酒、與毛地黃、士的年等藥、或效。

鉄氣塩 POTASSII IODIDUM, 此藥結方形之晶、色白、水最易化、以試紙試之、則成藍色、若置於潮濕之處、則易變成流質。

體功效　此藥之體功效與氣同、但惹力較小、服之日久、其中鉄質之阻力甚大、恐有他虞、不如服鈉氣塩爲妙。

絡部　此藥之力由於鉄質、强壯者、服小分劑、能增血壓、大分劑則減血壓、脉變壞症、血壓過大、大分劑有效。

味　此藥被味甚速、服後僅十三分鐘、於尿內用化法即畧見之、一日之內、可祛所服者、十分之八、其餘二分、則積於身內、如以此藥醫癰症、先宜勤服、並漸增其分劑、至顯乖效時、可常服此分劑之三分之二、日服二三次、則見大效、中鉛毒者、不可減其分劑、凡服此藥者、雖止而不服、必過四五日、尿內方不含氣質。

藥製與分劑

氯酒	Tinctura Iodi,	五至十量滴 (0.3-0.6)
氯雜消水	Liquor Iodi Compositus, U. S.	五至十量滴 (0.3-0.6)
氯强消水	Liquor Iodi Fortis, B. P.	此消水但用之爲敷藥。
氯抹膏	Unguentum Iodi,	此藥於濕棚大症、敷之有效、如皮膚薄嫩、加猪脂等分調勻、敷之最妙、惟宜用新製者。

禁用之狀　腎炎症不宜用、如不得已、可用微分劑、各類新炎症不宜用、瘡症生膿過多、亦不宜用。

乖效　久服此藥者、口生金味、清晨尤甚、牙齒與齦畧痛、涎液過多、清晨畧有惡心、且不思食、或有鼻涕、或胃不平、或腮腺炎等患、如仍服之、各患必俱加增、鼻涕尤甚、額與喉皆痛、腮腺炎或成膿皰、或有作燒者、亦有乖效只見於腦部者、如肌跳、系痛、精腺、乳腺、與週身之肌、俱形消瘦、後則血虧體憊、甚有目盲癱瘓者、有醫者云、孩童敷氯酒過多、或致腎經發炎、尿中含胎。

毒力　用過分劑者、必致腸胃發炎、膠胃與腹甚痛、且大有嘔瀉之患、口有金味、生涎過

內、仍使流出、此法最妙、但疼痛過甚、宜先用迷蒙藥熏之方可、有醫者以甘油與氯酒等分、合勻射之、亦能醫此症、亦有醫者、以氯酒射於發久[1]炎之潤膜穴內、射後或有乖效、更有醫者、射此酒以醫胸膜痨症、射後或有中毒之狀、初則痙瘛似癎、後則昏迷不醒、有著名醫者、用氯氣以醫下三類症、一肺[2]變硬症、生痰過多、且有重嗽者、如每日早晚以氯氣熏之、其嗽與痰皆可減輕、二六至十歲之幼童、患疹熱症後、或因受風、致患乾嗽[3]嗓啞[4]、呼吸胸內有聲者、熏此氣有效、三鼻與內眥作癢[5]呃噴[6]流淚[7]額痛[8]甚重者、如[9]以此氣熏之、或立見效、每有受風初生鼻噴者、自握氯酒瓶口[10]之、有效、孕吐者、用氯酒五至十量滴、(0.3-0.6) 與伯蘭地同服、有效、嗓痛兼腭垂鬆大者、良方如左。

氯酒	Tincturæ iodi	一量錢 (4.0)
鉀氯鹽	Potassii iodidi	一英錢 (4.0)
伯蘭地	Spiritûs vini gallici	一量兩 (30.0)
烝水	Aquæ destillatæ	加至四量兩 (120.0)

以二量錢、(8.0) 加水半玻璃盃、日漱三次。

M. S. Use two teaspoonfuls in half a glass of water as a gargle three times a day.

1 Chronic inflammation of serous cavities
2 Fibroid lung
3 Hollow cough
4 Hoarseness
5 Itching of the nose or innercanthus of eyes
6 Sneezing
7 Weeping of the eyes
8 Severe frontal headache
9 Acute coryza
10 Vomiting of pregnancy
11 Relaxed sore throat

氯 ℞-Iodi 五英錢 (20.0)
醇酒 Alcoholis 十量錢 (40.0)
伊打 Ætheris 十量錢 (40.0) —M.

若敷此酒一或二層、其效與敷尋常氯酒數層之效同、且乾之甚速、不致壞人衣服、胸[1]統膜炎症、可敷於患處、其益有二、一病初起時、統膜尚未積液、此藥有外惹內效之功、使病不至發作、二統膜既已積液、敷此藥有祛液之功、乾嗽[2]不止、可敷此酒於髃凹處、兼敷於氣腔有效、氣腔[3]久炎症、敷之可減其痰、久癆[4]症、敷之有效、滑膜[5]炎症、如敷至數日、而腫勢愈增、此乃佳兆、逾數日、腫消而痊瘉矣、肺癆[6]症、或因胸統膜有發炎之處、以致胸間每覺一處作痛、敷之有效、路浦司[7]症、如敷於患處之四圍、或可遏其病勢、若敷於患處、或亦能醫之、凍瘃[8]若以氯抹膏、與猪脂各半、研勻敷患處、最妙、常患胸[9]痛者、用氯抹膏擦之有效、胸肌作痛亦效、但[10]骿間系痛、則毫無功效、顛茄乃爲此類系痛之妙劑、髮[11]錢癬身[12]錢癬等、敷氯酒有效、[13]瘧症、如以此酒敷患處之四圍、庶可遏其病勢、若齦[14]離牙齒之患、可將氯一厘、(0.06) 化於一量兩 (30.0) 水內、敷患處有效、但敷後宜用水漱口、可免牙齒受傷、陽[15]腺衣痳症、先用套針與筒以放其痳、後將氯酒、用水節射於陽衣

1 Pleurisy
2 Harassing, irritating cough
3 Chronic bronchitis
4 Chronic rheumatism
5 Synovitis
6 Phthisis
7 Lupus
8 Chilblains
9 Pleurodynia
10 Intercostal neuralgia
11 Tinea tonsurans
12 Tinea circinata
13 Erysipelas
14 Retraction of the gums
15 Hydrocele

體功效　此藥有改症之效、其理人不得而知也、若敷於皮上、則染黃色、或古銅色、或黑色、皆在所用之多寡耳、如敷之過多、皮則生皰、敷於泗膜、大有惹力、有著名醫者謂、其有激全身養育之功。與激絡部之能。

㖞　此藥被㖞甚速。

祛　此藥由腎皮涎腺而祛、若乳婦用之、乳內必含此質、其所乳之嬰孩、或患腸胃炎症。

療效　如腺部失其功用、致生癆[1]癧[2]者、此藥有效、[3]盡柵之膕過長症、用之最妙、但盡柵生膿者忌用、蓋此藥易使之生膿也、血薄、盡柵大、與血多白胅等症、無效、肺癆急症忌用、[4]肺變硬癆症有效、[5]癭症大效、惟於突眼癭症有損、[6]久癬症、如以氯抹膏、加猪脂等分、敷之有效、或敷氯酒亦可、若兼有[7]血虧症、宜服低鐵氯塩糖漿大效、按氯亦爲外惹內效之藥、若以氯酒敷於皮上數層、至發黑色爲止、在脫皽時、若再敷之、其人必甚受痛、故醫者宜將鋏氯塩製成消水、敷於痛處、並以糈製成糊藥、敷於其上、可畧減其痛也、總之敷此藥、勿使人受痛爲妙、以痛無益於病、徒增其苦耳、近有醫者製有力之氯酒、其方如左。

1 Tuberculosis
2 Scrofulosis
3 Enlargement of lymph-glands
4 Fibroid phthisis
5 Goitre
6 Chronic bone disease
7 Anæmia

高鉚硫強蓉 (HYDRARGYRI SUBSULPHAS FLAVUS) 此藥爲有力之吐藥、[1]哮聲症有效、但有惹力、用時務須謹愼、二正歲孩童之分劑、二至五厘、(0.12-0.3)過十五分鐘、如不見效、可再服之、若仍不見效、宜用他類吐藥、或用胃抽器抽之方可。

鉚黃洗藥 LOTIO HYDRARGYRI FLAVA, B. P. 此藥乃以鉚氯强塩三十厘、(2.0)加石灰消水十六量兩(480.0)製成、功用與鉚黑洗藥同、但其惹力較大。

不符之藥 鉚氯强塩、惟與鉄氯塩、及鉑氯塩相合、他藥俱不可同用、且氯類不可與鉚氯弱塩同服、鉚氯弱塩、亦不可與氰氯酸同服、蓋此酸能令鉚氯弱塩、變成鉚氯强塩也、亦不可與安替派林同服。

鐺鈉氯塩 AURI ET SODII CHLORIDUM, U. S. 此藥能醫食滯[2]症、如食畢胃痛、且吐瀉者、有效、有醫者謂、莖不舉之陽痿[3]症、服之大效、亦有醫者謂、遺精[4]症、服之大效、更有著名醫者謂、能醫啼嗽[5]症、但不可服過分劑、以免腸胃發炎、分劑一厘之二十分之一、至十分之一。(0.003-0.006)

氯 IODUM, 此藥由海草而得、嘗之味苦而辣、以試紙試之、其色不變、醇酒伊打能化之、水畧能化之、

1 Croup
2 Indigestion
3 Impotence
4 Spermatorrhœa
5 Whooping-cough

之有效、如專用此藥、畧有潰力、故與他藥合用爲妙、腸胃不消化、以致噫噎、且大便惡臭者、服此藥一厘之六十分之一、至五十分之一、(0.001-0.0012) 有效。

紅錄強羹 HYDRARGYRI OXIDUM RUBRUM, 其體質功效、與黃錄强羹同。

藥製

黃錄强羹抹膏 Unguentum Hydrargyri Oxidi Flavi, 此膏之力甚大、宜加猪脂等分用之、乾皮久症有效、睟癜炎、瞼邊癤等症亦效、但宜用新製者。

紅錄强羹抹膏 Unguentum Hydrargyri Oxidi Rubri, 其力與黃錄强羹抹膏同。

錄氯弱塩 Hydrargyri Iodidum Flavum, U. S. 此藥與錄氯强塩之功用同、但少有惹力、腎炎久症有效、癯症之中程、最爲妙劑、分劑一厘之六分之一、至四分之一、(0.01-0.015) 日服三次、但宜日增其分劑、見效後減半服之、乃爲最妙之法。

錄柳礬 (Hydrargyri Salicylas.) 此藥之大用、乃醫癯症、用法以此藥二十二厘、(1.5) 加軟怕拉芬三量錢、(12.0) 每四日以一量滴、(0.06) 深射於臀大肌內、越數次如無大效、每二日如法射之、用時宜搖動其瓶、以防沉澱、不然則所射者、盡爲軟怕拉芬矣、所用之針、射畢即宜擦淨、因此藥易塞針竅也。

1 Intestinal and gastric indigestion
2 Chronic dry skin diseases
3 Granular lids
4 Styes
5 Chronic nephritis
6 Syphilis
7 Syphilis

銶貼膏 EMPLASTRUM HYDRARGYRI, 其用亦與銶抹膏同。

銶油礬 OLEATUM HYDRARGYRI, U. S. HYDRARGYRI OLEAS, B. P. 此藥乃以銶强羹製成、可代銶抹膏之用、較銶抹膏易合人意、英揀藥册中、有銶油抹膏、Unguentum Hydrargyri Oleatis, B. P. 生陰虱[1]者、以此膏敷之大效、但越一二句鐘、即宜洗去、不然恐中銶毒、或謂此藥之效、不在銶而在油、蓋油於虱類爲毒藥也。

高銶氰强礬消水 LIQUOR HYDRARGYRI NITRATIS, U. S. LIQUOR HYDRARGYRI NITRATIS ACIDUS, B. P. 此藥之潰力大而且速、疽[2]或大瘊[3]、以玻璃箸蘸而敷之有效、路浦司[4]症、敷之亦可、至患處與四圍之皮平爲止、但敷之之時、宜用猪脂擦四圍之皮、以免受其潰力、如恐病者過於受痛、宜先敷寇卡印、再敷此藥、後敷軟火棉酒最妙。

藥製

高銶氰强抹膏 UNGUENTUM HYDRARGYRI NITRATIS 此膏之力甚大、久皮症[5]有效、若無須大惹力之症、宜加猪脂等分用之、其效尤妙。

淡高銶氰强抹膏 Unguentum Hydrargyri Nitratis Dilutum, B. P. 此膏之惹力較小、故常用之。

黃銶强羹 HYDRARGYRI OXIDUM FLAVUM, 此藥能醫癯瘡[6]、用法以此藥一分、加白土一分、敷

1 Pediculus pubis
2 Epitheliomata
3 Large warts
4 Lupus
5 Chronic skin diseases
6 Syphilitic sores

芳氣散多半、再加錄四錢、(16.0) 研之極勻、而哥羅芳散盡、惟餘羊毛脂一分、錄二分而已、如醫癩[1]症、以此油三分、加洋橄欖油一分、每三日可射一或二量滴、(0.06-0.12) 或俱用一分亦可、有醫者云、欲射錄藥類、此油爲最妙之劑。

錄白土 HYDRARGYRUM CUM CRETA, 此藥乃以錄三十八分、乳糖十二分、白土五十分製成、畧有瀉力、其大用乃醫嬰遺[2]癩症、分劑一至十厘、(0.06-0.6) 若孩童有遺癆[3]衰瘦症、服之其效最速、成人之癩症、服之亦效、嬰孩水瀉症[4]、如大便內含未化之食物、服此藥之小分劑常效。

錄抹膏 UNGUENTUM HYDRARGYRI, 此藥之大用有二、一醫皮症[5]、二患癩[6]症者、若不能服錄、或服之不足敵此症之毒、敷此膏於皮薄處、有效、醫癩症之用法、第一日敷於左脇腿處、第二日敷於右脇腿處、第三日敷於左腋、第四日敷於右腋、宜隨敷隨搓、以病勢之輕重、定日期之久暫、遞次循環、庶皮不致受惹、且速受藥力、嬰遺[7]癩症、可以此法醫之、或敷藥於絨帶上、束於腰中亦可、但不宜常換裏衣、以裏衣多有藥粘附、加增藥力耳、盡棚大症、以此藥敷之或效。

錄擦藥 LINIMENTUM HYDRARGYRI, B. P. 其用與錄抹膏同。

1 Syphilis
2 Infantile syphilis
3 Syphilitic marasmus
4 Infantile diarrhœa
5 Syphilis
6 Infantile syphilis
7 Enlarged glands

(2.0) 加猪脂一兩、(30.0) 製成抹膏、敷之大效。

藥製與分劑 因此藥之體重、故分劑似小、多有醫者、將乳糖、白糖、鈉氫碳强礬等藥、加於其內、此二糖無甚功效、只令味甘耳、用鈉氫碳强礬者、以其有鹼力、能增藥之瀉效也、此藥無味、故孩童易服、若加乳糖、製成乳糖散類尤妙、如成輪藥、宜少用壓力、不然必改變其體質。

錄氯弱塩雜丸 Pilula Hydrargyri Subchloridi Composita. B. P. 二至八厘 (0.12-0.5) 內含錄氯弱塩、銨硫弱冷、怪阿克、萆麻油等藥。

錄氯弱塩抹膏 Unguentum Hydrargyri Subchloridi. B. P. 癩症敷之有效、且有良方如左。

錄氯弱塩	℞ Hydrargyri chloridi Mit. U. S. Hydrargyri subchloridi. B. P.	四十英厘 (2.6)
鎂碳强礬	Magnesii carbonatis	四十英厘 (2.6)
玫瑰消水抹膏	Unguent. aquæ rosæ	一英兩 (30.0) —M.

此方可代錄氯弱塩抹膏之用。

灰色油 (OLEUM CINEREUM)

此藥之製法、乃以羊毛脂二錢、(8.0) 內加哥羅芳研勻、至哥羅

1 Eczema

若常患病之孩童、腸胃氣脹、口出臭氣、大便味惡、其形如漿、如每半句鐘服小分劑、即一厘之二十分之一、(0.003) 至四次爲止、隔三日再如法服之、大效、如患瞎疱炎、而兼有癆症者、以此藥撒於目內、常效、如已服氯類藥忌用、因氯由淚而祛、若撒此藥於目內、則與氯俱變其質、目則大發炎矣、疥腫症、此藥能利小便、可單用之、亦可與海葱或毛地黃並用、或兼服鴉片、以免瀉腹亦可、用法日服三次、每服一厘、(0.06) 其效最大、瀉腹者其效必小、此藥之力、不能久存、越二日如不見效、不可再服、腸熱症初起時、如大便不通、每句鐘以一厘之四分之一、(0.015) 與鈉氣碳强礬兼服、用至一厘 (0.06) 有效、大便乾燥症、而糞色淡黃、兼有頭痛口臭者、服之最妙、若畧有青黑色、服獨脚蓮尤妙、熱症甫瘉而厭食者、舌有黃苔、常用此藥之中分劑、令其瀉腹有效、服新製之皇强酸、尤爲妙劑、但不可與此藥兼服、因其二藥不符也、無論成人孩童惡心症、服此藥之小分劑、或有平胃之功、然有服後反致嘔吐者、蓋其胃或平或惹、人無從豫知也、嬰孩反乳、有時此藥能醫之、每句鐘服一厘之十二分之一、(0.005) 至三次爲止、或每句鐘服灰色散一厘之三分之一、(0.02) 過三句鐘爲止、如身體不見消瘦、不宜服藥、蓋其所吐、必其所不宜存者也、癩瀉瘡症、每日以此藥撒於其上有效、肛門作癢、如以此藥一錢、

1 Flatulence
2 Fetid breath
3 Phlectenular conjunctivitis
4 Dropsy
5 Typhoid fever
6 Anorexia
7 Nausea
8 Syphilitic condylomata
9 Pruritus ani

汞丸塊 MASSA HYDRARGYRI, U. S. PILULA HYDRARGYRI, B. P. 此塊每厘 (0.06) 內含汞一厘之三分之一、(0.02) 分劑半至二十厘、(0.03-1.3) 其瀉效與汞氯弱鹽同、但少有用之醫癆症者。

汞氯弱鹽 HYDRARGYRI CHLORIDUM MITE, U. S. HYDRARGYRI SUBCHLORIDUM, B. P. 此藥不易消化、而易於被咊、如以之爲瀉劑、每半句鐘服一厘之六分之一、至半厘、(0.01-0.03) 服至一或二厘、(0.06-0.12) 其功效與十厘 (0.6) 同、且不能中毒、蓋此藥必在鹼類中被咊、腸中含鹼之液、一時不能消化十厘、(0.6) 故服大分劑、多不被咊、用小分劑、間時服之、則腸中之液漸次而生、足敷消化之用矣、如與鈉氫碳强謺同服、其效尤大、蓋因鈉氫碳强謺含有鹼力也、所謂小分劑與大分劑之效同者、於溫道則然、於熱道必用大分劑、始有感肝生液之功、服大分劑者、越二十四句鐘、不見腹瀉、宜服鎂硫强謺、不然恐中其毒矣、如以此藥醫癆症、較服他類汞藥、中毒最易、醫者宜恒記之、有醫者用之爲射藥、以醫癆[1]症、其法以此藥五分、鈉氯鹽五分、加水五十分、深射於肌內、不宜僅射於皮內、射時醫者所用一切、務宜潔淨、免有膿腫之患、最宜之射處、乃臀肌中耳、或用此法、致有痙疥、疥脫等患、故射汞類藥以醫此症、宜考汞柳謺、汞氯强鹽、灰色油等篇、新[2]痢症、先服衣必格三十厘、(2.0) 後每句鐘或每半句鐘、再服此藥之小分劑、至大便如常而止、如病者體弱、此藥不爲妙劑、

1 Syphilis
2 Acute dysentery

倘其腹受風、雖用此藥、恐難痊瘉矣、癩皮癇症[1]可將此藥半兩、(15.0)與鋅氯鹽一兩、(30.0)置於水內、每三四日沐浴一次、或效、白濁久症[2]若將此藥半兩、(15.0)加水六量兩、(180.0)每三日射於尿脬內、大效、各類寄生之皮症[3]若將此藥二厘、(0.12)加水一量兩、(30.0)日敷三次、有效、英揀藥册有錄氯强鹽消水、Liquor Hydrargyri Perchloridi, B. P. 乃以錄氯强鹽半厘、(0.03)加水一量兩、(30.0)鋅氯鹽半厘(0.03)而成、其加鋅氯鹽者、爲免此藥之沉澱也。

錄氯强鹽 HYDRARGYRI IODIDUM RUBRUM 此藥之惹力、與錄氯强鹽同、服過分劑者、其狀亦與服錄氯强鹽過分劑者同、癩症[4]之晚程大效、分劑一厘之三十分之一、至十五分之一、(0.002-0.004)初患喉門[5]棚炎症、若每句鐘服微分劑、即一厘之二百分之一、(0.0003)服四或六次、或能敵之、有醫者云、此藥之免腐力、較錄氯强鹽爲大、近有人查明、其免腐之力、仍遜於錄氯强鹽耳、英揀藥册有錄氯强鹽抹膏、Unguentum Hydrargyri Iodidi Rubri, B. P. 癭[6]或久皮症[7]、敷之有效。

錄黑洗藥 Lotio Hydrargyri Nigra, B. P. 此藥乃以錄氯弱鹽一錢、(4.0)加石灰消水十六量兩(480.0)製成、癩瘍[8]或癩症[9]洗之有效。

1 Obstinate syphiloderm
2 Gleet
3 Parasitic affections of the skin
4 Syphilis
5 Tonsillitis
6 Goitre
7 Chronic skin disease
8 Syphilitic sores
9 Eczema

則胃痛、嘔吐、瀉腹、所瀉者先則如常、繼而泗液、後則帶血、終則腦力脫失、暈仆而死、解法、人中此毒、宜使之多服卵青、後用胃抽器抽之、用煖身法煖之、若絡與呼吸過於受阻、則用激此二部之藥、或不致殞命、然痊瘉亦必甚遲、或有因育道受傷、歷數月而殞命者、此藥不但服之中毒、即敷於破傷之處、或灌於陰道、與㽲內過多者、亦然、但其狀與服者不同、若灌銶氯强塩消水於陰道或㽲內、最易中毒、其腹先疳而後瀉、所瀉者有血色、其尿或少或閉、遇此病狀、醫者宜立換他藥、中此類之毒者、雖可漸次痊瘉、然亦有忽爾殞命者、[1]癯症、如用空針射銶藥類、宜以此藥一厘之六分之一、(0.01) 深射於腐肌、較銶氯弱塩之效大、隔一二日一次足矣、但所用之針、與醫者之手、務須潔淨、此藥之大用、乃爲免腐藥、(見免腐篇) [2]疹、[3]癯、[4]腎久抽、[5]喉門棚炎等症、常用此藥醫之、如因紅輪缺少、致患[6]血虧症、以此藥之小分劑、即一厘之六十分之一、至四十分之一、(0.001-0.0015) 日服三次大效、若因癯症而血虧者、其效尤妙、無論成人孩童、若大便色綠、且有惡臭、如服此藥之微分劑、即一厘之五百分之一、(0.0001) 有效、或以此藥半厘、(0.03) 加烝水五量兩、(150.0) 每句鐘服一小勺、(4.0) 至大便如常而止、新久之[7]泗瀉症、如上服之大效、成人之[8]痢、或[9]瀉等症、每句鐘可服此藥二小勺、(8.0) 但病者所著之衣、醫者切宜留意、

1 Syphilis
2 Diphtheria
3 Syphilis
4 Chronic contracted kidney
5 Tonsillitis
6 Anæmia
7 Mucous diarrhœa
8 Dysentery
9 Diarrhœa

瀉力、但其效每不及銶氯弱塩、心[1]體炎、與心[2]統膜炎等症、銶則有效、痨[3]症初起時亦效、若用敵痨盟、則他藥庶可不用矣、凡用銶氯弱塩時、宜以乳糖九十分、塩十分研勻、製成乳糖散類、使其易於被味、其效尤妙、以上所論、乃銶藥之總效、下則分論之。

錏銶氯塩 HYDRARGYRUM AMMONIATUM,

此藥不可用爲服藥、每製成抹膏、名錏銶氯抹膏 Unguentum Hydrargyri Ammoniati, 皮科常用之、痔[4]症或乾[5]癩症、大效、以其大有惹力也、且有殺癬[6]寄生之能、揀藥册內錏銶氯抹膏之力甚大、宜與猪脂各等分、和而用之最妙、不然恐有惹皮之患、鼻[7]臭症之良方如左。

錏銶氯塩 R-Hydrargyri ammoniati 四英厘 (0.25)
白糖散 Pulv. sacchar. alb. 半英兩 (16.0)

作爲聞藥、擤淨鼻涕、吸入鼻孔。
M. S.—To be used as a snuff, after thoroughly blowing the nose.

此方不第能治鼻臭、且能醫鼻泗膜炎症、若以惹力過大、則以此藥二厘、(0.12) 白糖散半兩、(16.0) 和而用之、亦可、此方內之錏銶氯塩、亦可以紅銶强[illegible]代之、而功效亦同。

銶氯強塩 HYDRARGYRI CHLORIDUM CORROSIVUM, U. S. HYDRARGYRI PERCHLORIDUM, B. P.

此藥之毒力、與惹力甚大、中此毒者、先

1 Carditis
2 Pericarditis
3 Diphtheria
4 Psoriasis
5 Dry eczema
6 Tinea
7 Ozœna

加重、患癨症者、如因腦內有癨瘤、以致頭痛、此藥大效、若因血薄所致、其痛反增。

瀉效　此藥有瀉力、且有感肝之能、所常用爲瀉劑者、乃鋊丸塊、或鋊氣弱鹽、但鋊氣弱鹽之力較大、如與鈉氣碳强磬兼服、其感肝之能加增、若以此磬製之成丸、存之過久、則變灰色、其感肝之能減少矣、患痰症者、欲服貴林、宜先服鋊氣弱鹽、不然則貴林之效難見、患此症者、如嘔吐不止、服鋊氣弱鹽有效。

免腐　鋊氣强鹽與鋊氣强鹽、大有免腐之能、外科之醫生、常用鋊氣强鹽一分、加水二千至二萬分用之、但宜加菓酸數分、以免此鹽與肉中之液、變成不易化之胎磬、用鋊氣强鹽亦然、但鋊氣强鹽、少用爲免腐藥、若用爲滅癘毒藥、宜以鋊氣强鹽一分、加水五百至二千分方可。

解炎　强壯者、忽患胸統膜炎[1]或腹統膜炎[2]或顱腦衣炎[3]、鋊氣弱鹽大效、若有重症、兼患此類之炎、不但無益、反致有損、若用爲解炎藥、兼服鴉片、則能減其惹育道之力、並阻瀉力、如因頭受傷之故、致顱腦衣發炎、常理乃將鋊氣弱鹽與鴉片各一厘半(0.1)製成六丸、每句鐘服一丸、至服畢爲止、服時宜將冰囊覆於其首、室中亦當安靜、如是其效甚速、强壯者、心內衣炎[4]症、服鋊氣弱鹽之足分劑、最妙、用鋊氣强鹽亦可、且少有

1 Pleurisy
2 Peritonitis
3 Meningitis
4 Endocarditis

祛者、一厘之十六分之一、(0.004) 因此患癘症者、如先服足分劑、至見體功效後、則服中分劑、其效與先相同、故常服鉍者、宜每月服鉍氯塩數次、以免積效。

療效 此藥之用有四、一醫癘、俗名楊梅二瀉劑、三免腐、四解炎、一四兩用、凡鉍藥類、皆有此效、第二用、惟鉍氯弱塩、與鉍藥丸塊有效、第三用、惟鉍氯强塩、與鉍氯强塩有效、醫癘[1]症最妙之鉍藥、乃鉍氯弱塩、若不能服此藥、宜令病者沐浴、坐於椅上、用絮被自頸至足、和椅嚴裹之、以鉍氯弱塩置於藥機上、將酒燈燃著、置於椅下、使變成氣、熏入皮內。

吸法 以鉍氯弱塩四五厘、(0.25-0.3) 置於藥機之C處、加熱變氣、使首距藥機約六寸、吸八或十口、畢、用水漱口、以免中毒。（見第五十圖）

射皮內法 此法不宜常用、因射時人多受痛、且有時生瘍、如不得已、最妙之射藥有二、一以鉍氯强塩一厘之六分之一、(0.01) 加水十或十五量滴、(0.6-1.0) 射之、二以灰色油一二量滴、(0.06-0.12) 每三日射一次、若射於腐肌或背後、宜先用醋洗其射處、再以酒洗之、以針深入皮內、緩緩射之、有醫者云、將鉍氯强塩射入皮內、此法不宜用、因其危險過大也、患癘症者、病勢甚重、宜用以上各法解之、癘瘡久症、若服鉍類藥、其瘡每至

1 Syphilis

中毒之証、倘仍服之、必致口臭、舌腫、齦則鬆輭、易於流血、最顯者、卽口多流涎也、若服之不已、各等病狀、必至加增、涎常流至頦與胸之間、故頦胸易生癩症、緣涎內所含之錄惹皮故也、後則牙齒脫落、頜九頭二骨癈腐、腭之功用全失、血虧而紅白朕少、至此則殞命矣、三正歲以內之孩童、服此藥而中毒者、則不甚流涎、醫者切不可以不甚流涎、卽以爲未嘗中毒也、匠人用錄、惟製鏡者易中此毒、其病狀不一、有時腦部受傷甚重、且顯微顫、後漸成顫癱、但少有轆眼之患、醫者宜恒記此理、尋常之系炎、多有此患、惟中此毒者則否、尋常之顫患、少在頸肌、而中此毒者、則多在頸肌、且多患肌跳症、此症乃孩童所常患者、若成人患之、醫者宜考其果中錄毒否、有中此毒、皮膚變色、儼若腎上棚敲症者、有目盲耳聾、覺系失其功用、或過靈、或痲木、或一處之肌瘦者、亦有中此毒而血薄、致身體衰憊者、所見之狀、人各不同也。

味 此藥被味之遲速、宜視其服何類錄藥、如服不易化者、被味則遲、易化者、被味則速。

祛 此類藥乃白汗、淚、乳、涎、與大小便而祛、人服錄氣弱鹽、過二句鐘始祛、至二十四句鐘其祛始盡、如日服錄氣弱鹽數次、必積於各經之內、醫者察明、常服此藥、每日所

第四十八圖



此圖係使鉃氣扇塩變氣之機、置藥處如C、四圍有槽、必滿之以水、下用酒燈如A。

第四十九圖

此圖表明熏鉃氣扇塩之式。

常用爲殺台盼[1]䏰之藥、著名化學家、研究數載、始製成此藥、然未至極品、必求無損於人、而專殺此類寄生、乃爲最妙之藥也、此藥之毒力、較銻砒弱礬消水、只有四十分之一、殺寄生之能、較他藥爲大、其殺寄生之功效、與貴林醫瘴[2]症相同、[3]瘻熱症此藥有效、以其能滅血中之寄生也、非[4]洲蟲熱症、[5]白朕旺症有效、[6]癯症無論何程、俱效、故醫此症之特藥、銻居第一、氯居第二、而此藥居第三也、以上諸症、分劑均七厘、(0.5) 用法以此藥七厘、(0.5) 加水三十五、至五十量滴、(2.3-3.3) 置於火上滾之、至二分鐘撤下、俟冷射於皮內、或肌內、每日一次、連用二日即止、待至十日、再如法射之、如以此藥加水化之、存貯瓶內、每致失其功用、故宜臨用時製之方可、按七厘 (0.5) 之分劑、在成人少顯毒力、且無惹患、如用大分劑、或用此分劑過勤、或令病者視系枯槁、有盲目之患、有用足分劑、以致腹內疳痛、或腸胃受惹者、但罕見之、以此藥醫寄生之症、必須用之日久、且必用足分劑不然寄生既不立被殺死、其敵藥之能、必漸增大、後即用足分劑、雖至病者受毒、而寄生亦難滅也、故必如法用之、方能見效。

銻 (HYDRARGYRUM,) 此藥乃係流質、其體甚重。

體功效 如常服此類藥者、先無顯狀、若驗其中毒與否、則以物敲其牙、如覺疼痛、即爲

1 Trypanosomiasis
2 Malaria
3 Relapsing fever
4 African tick fever
5 Leukæmia
6 Syphilis

儼若癲症、但其中或有含血少許者、如認之不確、宜以化法驗之、其據立顯、延至二四日、病似見愈、然非眞愈也、此乃與中硫毒者同約在三至六日之內、必至殞命第三日、皮則發癍、形狀無常、或有立時腹痛、腦力脫失而殞命者。

積毒　漸積此毒者、氣脘被惹、腎經發炎、皮膚有變色之處、亦有因腦系受傷、全身有痲或癱處、若痲在手指或足趾、必多於第一或第二之骨節內、或有因受此毒、間致多系炎症者、其狀與脊腦後柱硬症相同、亦有時皮膚受傷、而腦部無損者、亦或有因氣脘被惹、但患瘵症者、又有遲延日久、週身之腑變壞爲脂者。

解毒法　新毒解法　宜先用胃抽器、抽淨胃內之物、以煖身之法煖之、且用化學新製之敵藥高鐵沁解之、此敵藥之製法、以鐵氯強鹽消水、或鐵氯強鹽酒、加鎂羹、或鋅沁消水、所沉之澱、即成此藥、如用鋅沁消水製之、必以烝水洗去澱內之鋅沁、不然恐有惹胃之患、但鋅沁不如鎂羹之妙、因鎂羹本有敵此藥之能、且無惹胃之力也、服敵藥後、宜服吐藥亦宜服鴉片、以止其痛、且宜多飲水、不然胃經必甚受損。

積毒解法　宜審致此毒之原而祛之、使之立即避去、並當服鈹氯鹽以祛其毒。

阿托益(ATOXYL)　此藥係鈉砒製成之礬、每百分內、含砒三十五分、可代砒礬之用、醫者

藥製與分劑　孩童之分劑、固必少於成人、若以身體之輕重、定分劑之法論之、孩童較成人能多服此藥、但宜在飯後、不然恐有惹胃之患、多服此藥者、醫者宜詢其清晨瞼腫否、腹痒瀉否、若有此狀、當止服一二日、不然恐全體漸成痠腫之症。

砒弱酸　Arseni Trioxidum, U. S. Acidum Arseniosum, B. P.　一厘之四十分之一至二十分之一　(0.0015-0.003)

鉀砒弱鎂消水　Liquor Potassii Arsenitis, U. S. Liquor Arsenicalis, B. P.　一至五量滴　(0.06-0.3)　加水服之。

鈉砒鎂消水　Liquor Sodii Arsenitis,　一至五量滴　(0.06-0.3)　加水服之。

砒弱酸消水　Liquor Acidi Arsenosi, U. S.　一至五量滴　(0.06-0.3)　較他砒消水多有惹胃之力。

砒錄氯塩消水　Liquor Arseni et Hydrargyri Iodidi,　二至十量滴　(0.15-0.6)　加水服之。

砒弱氯塩　Arseni Iodidum,　一厘之二十分之一、　(0.003)

鈉砒强鎂　Sodii Arsenas,　一厘之三十分之一、至十分之一、　(0.002-0.006)

乖效　服足分劑者、皮則發炎而作痛、或成膿皰、或成系瘍狀、見第四十八圖　惟各人不同耳、敷之亦然、每有皮炎後而皸脫、如紅熱症者、亦或有服之致泗膜發炎、鼻噻等患者。

毒力　新毒　服毒分劑者、則嘔瀉甚重、而膛胃與腹內、皆甚疼痛、先則如常、後似米湯、

圖六十四第



此圖表明患脾白癲症多過脉白其時卧躺而吡服

少減何如脉白

製之成漿、攤於布上、厚約二分餘、敷患處、至二十四或四十八句鐘揭下、另敷糊藥、越五或十日、疽即脫落矣、又有二方、亦治此症、而病者受痛較少。

一方

歐特方	R. Orthoform.	一英錢	(4.0)
砒弱酸	Arseni Trioxidi, U. S. Acidi Arseniosi, B. P.	一英錢	(4.0)
醇酒	Alcohol.	五量兩	(150.0)
烝水	Aquæ destillat.	五量兩	(150.0)—M.

一方

砒弱酸	Aseni trioxidi, U. S. Acidi arsniosi, B. P.	七十五英厘	(5.0)
非蒲散	Pulv. acaciæ	七十五英厘	(5.0)
寇卡印氯塩	Cocain. hydrochloridi	三十英厘	(2.0)
甘油	Glycerin.	三十量滴	(2.0)
烝水	Aquæ destillatæ..... q. s.....	酌用	

敷於患處 M. ft. paste. S—Apply locally

鐵粉 Ferri reducti, U. S / Ferri redacti, B. P 十英厘 (0.6)

馬前子膏 Extracti nucis vomicæ 四英厘 (0.24)

共成二十丸、每餐後服一丸。 M. Fiant pilulæ No. XX. S.—One t. i. d. after meals. ℞.

年邁之人、因心經虛弱、致久立而足腫[1]、或用力時而氣喘者、此藥大有助毛地黃、與士的年之功、醫者遇宜服毛地黃、或士的年之症、若兼用此藥、其效尤大、生瘡[2]者以砒消水、或砒弱酸消水、或鈹砒弱礬消水敷之、數日則必脫落、若甚堅硬、先敷鈹汝消水、使其變輭、再敷砒消水、其效尤速、釘胼症[3]、俗名雞眼、若以此法治之、必效、贅疽症[4]、敷之有效、但宜厚敷、如患處甚大、仍宜厚敷、可免被陳之虞、倘敷之淡薄、膈則變壞遲緩、該處之血、運行如常、因而砒多被陳、以致中毒、若患處過大、雖一次不宜敷滿、亦宜厚敷、有著名醫者、醫贅疽症之良方如左。

砒弱酸 ℞. Arseni trioxidi U. S. / Acidi arseniosi, B. P. 一英兩 (30.0)

非洲散 Pulv. acaciæ 一英兩 (30.0)

水 Aquæ 五量錢 (20.0) ℥ss.

1 Swollen feet
2 Warts
3 Corns
4 Epithelioma

Bibulous paper is to be wetted with this compound, and after drying is to be rolled up and smoked as a cigarette.

若專以鉄砒弱礬十五厘、(1.0) 化於一量兩 (30.0) 水內、仍蘸以無礬之紙、成捲、燃而吸之亦可、[1]久痹症、服之每有大效、[2]久膿口白瘍、[3]嗓炎、[4]鼻泗膜久炎等症、亦效、[5]草泗炎症、每效、[6]癆症、無論新久、服之有效、[7]胃疽、或[8]胃瘍等症、若勤服小分劑、常能止痛、且止嘔吐、[9]孕吐者、服之亦效、常[10]食牛乳之嬰孩、如胃泗膜久炎而嘔吐、或[11]宿醉而晨吐者、服之俱效、[12]胃弱食物不化、且有久瀉症者、服之有效、[13]盟瀉症、如勤服微分劑、即每一句鐘服一厘之百分之一、(0.0006) 有效、[14]胃弱之良方如左。

鉄砒弱礬消水 ℞- Liquoris potassii arsenitis, U. S. / Liquoris arsenicalis, B. P. 三十量滴 (2.0)

馬前子酒 Tincturæ nucis vomicæ 一或二量錢 (4.-8.0)

水 Aquæ 加至三量兩 (90.0) —M.

飯後服一小勺、(4.0) 以水送之、但必先搖動藥瓶、以免沉澱、胃炎者忌用。S.—Shake the bottle. Teaspoonful t. i. d. in water after meals.

又方

砒弱酸 ℞- Arseni trioxidi, U. S. / Acidi arseniosi, B. P. 一英厘之三分之一 (0.02)

1 Chronic rheumatism
2 Chronic coryza
3 Cancrum oris
4 Sore throat
5 Chronic nasal catarrh
6 Hay fever
7 Phthisis
8 Gastric cancer
9 Gastric ulcer
10 Vomiting of pregnancy
11 Vomiting of hand-fed babies
12 Morning vomiting of drunkards
13 Atonic dyspepsia
14 Chronic diarrhœa
15 Serous diarrhœa
16 Gastric atony

效、乾[1]皮症有效、若濕皮症、則無益而有損、患痔[2]症（俗名牛皮癬）者、服之其處必先發紅、病勢似增、服至數日、病即痊瘉、醫者宜切記之、大[3]皰瘡[4]痳[5]瘋等症、每有功效、糖[6]尿症、與陰[7]門癢症亦效、糖[8]尿癲症、若以鋰碳强礬、與鈉砒强礬並服、亦常有效、若因氣脘泗膜、易於發炎、致患痚[9]症、此爲妙劑、服吸俱可、製砒烟捲之方如左。

顛茄葉	R-Belladonnæ foliorum	九十六英厘 (6.4)
鬧羊花葉	Hyoscyami foliorum	四十五英厘 (3.0)
佛茄兒葉	Stramonii. foliorum	四十五英厘 (3.0)
鴉片膏	Extracti opii	四英厘 (0.2)
菸	Tabaci	八十英厘 (5.3)
水	Aquæ	十六量兩 (480.0) —M.

製成消水、後加 Fiat solutio et adde,

鉀氰强礬	Potassii nitratis	一百六十英厘 (10.6)
鉀砒弱礬	Potassii arsenitis	三百二十英厘 (21.3) —M.

以未浸礬之紙、蘸此消水內、俟乾製捲、燃而吸之。

1 Dry skin diseases
2 Psoriasis
3 Pemphigus
4 Lichen
5 Lepra
6 Diabetes
7 Pruritus vulvæ
8 Gouty diabetes
9 Asthma

第四十七圖



此圖表明服砒太過者、患系瘭症之狀。

第四十六圖



此圖係血多白朕症、圖中大綫、乃脾經過長之狀、小綫乃服砒後脾經縮小之狀、未服砒之先、白朕有三十四萬二千之多、服後減至三萬二千、且身體重數、亦增二十磅。

用亦失、中分劑、有激絡部、與增司育系之能、若多服之、各類元漕、必受其毒。

絡部　服中分劑者、與此部少有功效、過分劑、大有阻此部之能、以致血壓減少、脉緩而微、夫血壓減少者、乃因司絡腦所受阻、週身之血脈變爲鬆軟、腹內之血脈尤甚。

呼吸部　小分劑、大有激此部之能、過分劑、則有阻此部之力。

喋　此藥被喋甚速。

祛　此藥由腎而祛者居多、亦畧有由汗涎膽液而祛者、若服中分劑、其祛也、必過十六句鐘始顯、乳婦服之、乳內必含砒少許、若服足分劑、其所乳之嬰孩、易致腹痛。

胭廢　此藥於胭之功用、曾經名醫考察、謂中分劑、大有保胭之能、過分劑、極有廢胭之力。

療效　此藥爲肌跳[1]症之敵藥、然非用足分劑不可、但初服之、分劑宜小、後再漸次增多、瘴[2]症而致血虧者、與鐵類並用、大效、腸胃泗膜[3]弱症、此爲上品、血虧惡[4]症、無藥可醫、惟此藥稍效、血多白朕[5]症、此藥最妙、然必服足分劑、始有功效、如病者胃經不受、宜自肛射服分劑之三倍、或以鈹砒弱馨消水一分、與水四分、射於皮內亦可、瘴[6]症、此藥不但能防之、亦能醫之、病漸瘉時、且能補助之、若因氣脘泗膜、易於發炎而傷風[7]者、服之有

1 Chorea
2 Malarial anæmia
3 Atony of the mucous membrane
4 Pernicious anæmia
5 Leucocythæmia
6 Malaria
7 Coryza

第四十五圖



此圖表明砒中毒者肝中之白點係肝變脂之體功效

顯、瘧或濕瘧、市醫每用此藥祛之、亦有用之以祛膚疽者。

腦部 試以小分劑、使蛙食之、即失激反應之能、繼則行動不能自主、後則覺系之功

領骨癰耳、若牙齒與齦無恙、則毒無從而入、否則宜早防之、庶免此患。

砒 (ARSENICUM) 此質不入藥用、所用者乃砒弱酸、與鈉、鉀、銅、三類砒強鬱、無味、以火烤之、則發蒜味、水能化之。

Arseni Trioxidum, U. S.
Acidum Arsenosum, B. P.

毒力 此藥之毒分劑、於篇論之、如皮受傷、或生瘍、敷之大有潰力、若敷於無恙之皮上、則其力不

硫浮酒 (Spiritus Phosphori,) 一至五量滴、(0.06-0.3)

硫甘香酒 (Elixir Phosphori) 十五至六十量滴、(1.0-4.0)

毒力 或浸火柴於水內、飲之而自盡者、其形狀先或如常、越八或十句鐘、口有硫味、膛胃腹內、痛如火燒、後則嘔瀉、嘔瀉之物、在暗處必發光、所嘔者、先乃胃中之食物、後則泗液、繼則膽液、末或帶血、病狀儼若腸胃炎症、抑或有不瀉而反乾燥者、不久肝經腫大而痛、過一二日、病似少癒、未數句鐘、睟顯黃色、越片時、遍體俱黃、竟成癢症、至此景況、嘔吐疼痛、復又大作、所吐者、形色與加非渣相似、大便乾燥、即或有之、必然堅硬如石、其色淡黃、因其中無膽液耳、所吐者、亦無膽液、蓋因肝經發炎、肝腔俱腫而堵塞也、此時腦部之病顯、如肌跳、頭痛、頭暈、昏譫、慾瘈瘲等患、後則不省人事、以至殞命、雖延至數日、亦難痊癒、因五臟變壞爲脂、生活亦不久耳、服過分劑者、其尿必少、中或含胎、中此毒之狀、有時與肝黃枯症相同、若不於其所吐瀉者、詳加考驗、則此二病難以分別。

解毒法 高銅硫强鎂、雖有敵硫之能、但其毒力、與硫相等、故不宜用、惟氫氯强洽、或鋏錳上鎂、乃最妙之敵藥、製火柴者、因常吸硫氣、亦有漸中毒者、然病狀與服者不同、但

第十二章　論改症藥類

硫 PHOSPHORUS.

此乃化學中原質之一、油易化之、醇酒與伊打、畧能化之、別具一種氣味、如先置於光處、後置於暗處、則發光、遇空氣則燃、必加水貯於瓶內、塞嚴方可、骨腦二部、俱含此質、故有補此二部之能。

療效　此藥有補骨之功、無論成人嬰孩之骨軟[1]症、俱大有效、人因腦力耗竭、以致生汗過多、或因過用腦力、致患憂鬱[3]症、服之常效、凡重熱症、如腸熱[4]或腸熱肺炎等症、若腦部受傷過甚、此藥有效、即病勢漸瘉、服之亦妙、因有補助之功也、戒鴉片[7]與患陽痿者、服之有效、癰癤[8][9]腮腺炎[10]等症、大效、有醫者云、肺炎[11]症、宜服微分劑、以其有補腦之功、故見效甚速、若因腦部被阻、以致系痛[12]症、與顱腦變軟[13]及顱腦衣[14]久炎症、此藥皆效。

藥製與分劑

硫 Phosphorus　一厘之百分之一、(0.0006) 成丸服之、Pilulæ Phosphori, B. P.

若病勢沉重、漸增至一厘之五十分之一、(0.0012) 至二十分之一、(0.003) 亦可、但初服時、不宜過一厘之百分之一、(0.0006) 恐其有服藥之癖忌也。

硫油 Oleum Phosphoratum, B. P.　一至五量滴 (0.05-0.3)

1 Rickets
2 Sweats
3 Melancholia
4 Typhoid fever
5 Typhoid pneumonia
6 Opium habit
7 Sexual exhaustion
8 Boils
9 Carbuncles
10 Acne
11 Pneumonia
12 Neuralgia
13 Cerebral softening
14 Chronic meningitis

飯時服二量錢、(8.0) 用水送下。S.—Dessertspoonful in a little water with meals.

皇强酸 Acidum Nitro-hydrochlorieum, U. S. 一至五量滴、(0.06-0.3) 此乃氫氯酸、與氯强酸相合而成。

淡皇强酸 Acidum Nitro-hydrochlorieum Dilutum, 十至三十量滴、(0.6-2.0) 若服過分劑、有道驟然發炎、胃經甚受其害、宜用鹼類、或鹹、北方俗稱臊子 油、卵青等、以抵其力、兼用鴉片、以止其痛。

淡硫强酸 Acidum Sulphuricum Dilutum, 五至二十量滴 (0.3-1.3)

香硫强酸 Acidum Sulphuricum Aromaticum, 五至二十量滴 (0.3-1.3)

此酸最爲妙劑、用時宜多加水冲服。

鹽氣酸 ACIDUM HYDROCHLORICUM, 此酸乃無色之流質、臭嘗俱有酸味、無斂力、而大有潰能、宜存貯於黑瓶内、胃液每千分中含此酸二分、胃化腥梅、(倍辛)必有此酸、方能成其功用。

療效 患熱症者、胃經少生此酸、於病時或病後服之、大效、患胃疽(1)症者、亦少生此酸、服之有效、酒醉後、胃經不能消化、服之有效、胃泗炎(2)症兼有鬆大之患、宜多用此藥、以助胃經之功用。

藥製與分劑

淡鹽氣强酸 Acidum Hydrochloricum Dilutum, 五至二十量滴 (0.3-1.3) 食滯症之良方如左。

淡鹽氣强酸	R-Acidi hydrochlorici dil.	二一量錢 (8.0)
倍辛香酒	Pepsin. essentiæ	一量兩 (30.0)
龍膽草雜酒	Tinct. gentian. comp.	加至四量兩 (120.0) M.

1 Gastric cancer
2 Gastric catarrh with dilatation

始顯者、如服此藥而大便結燥、以致額痛、與輕瀉劑同服、則免此患、服此類藥時、大便結燥、無論頭痛與否、宜服瀉劑、但患癆瘵等症者、服之常致頭痛、雖服瀉藥、亦少有效、或有服之其脫不安、常欲小便者、孩童服之、間有遺尿之患。

高錳酸鹽 MANGANI DIOXIDUM PRECIPITATUM, U. S.

如因血薄而致經閉[1]症、此藥有效、分劑三致五厘、(0.2-0.3) 日服三次、成丸用之、當於行經之前數日服之、但不可常服。

硫强酸 ACIDUM SULPHURICUM,

此酸大有潰力、能攝盡肉內之水、而留碳質、故肉變黑色、凡入藥之硷酸類、惟此酸最有斂力、且有凝腑之功。

祛療效 此酸可爲花柳[2]瘡之潰藥、然其大用、乃醫盟瀉[3]癘[4]等症、醫盟瀉症、如與植類之斂藥同服、其效最大、癘症不但有醫之之能、並有防之之效、如用之以防此症、可將香硫强酸五滴、(0.3) 加水二量兩、(60.0) 日服三四次、有效、中鉛毒[5]者、此方亦效、因此酸與鉛合成不易化之鬱、可免鉛被陳於身也、匠人之用鉛者、恐中其毒、當服此方防之、肺癆[6]症之盜汗、與顛茄或莫非並用有效。

藥製與分劑

1 Amenorrhœa
2 Venereal sores
3 Serous diarrhœa
4 Cholera
5 Lead poisoning
6 Night-sweats of phthisis

硫强酸、則發氣硫洽之味、是乃不純之明證、其大用乃醫血薄症、因其無味、且斂力無多、故孩童服之最宜、分劑三至六厘、(0.2-0.36) 又有鐵粉餅、Trochisci Ferri Redacti, B. P. 每餅內含鐵粉一厘、(0.06)

鐵乳鬱 (Ferri Lactas,) 水四十分、能化藥一分、分劑五厘、(0.3)

鐵硫强鬱 Ferri Sulphas, 分劑五厘、(0.3) 久瀉兼有血薄症者、[2] 成丸服之、有效、如以此藥五至二十厘、(0.3-1.6) 加水一量兩、(30.0) 則爲有斂力之洗藥、另有二種、即枯鐵硫强鬱、Ferri Sulphas Exsiccatus, 粒鐵硫强鬱 Ferri Sulphas Granulatus, U. S. 分劑三厘。(0.2)

鐵甘松鬱 (Ferri Valeras,) 癆症兼血薄者、服此藥或效、但平腦之力無多、分劑一厘。(0.06)

鐵苦葡酒 Vinum Ferri Amarum, U. S. 成人或孩童之血薄症、用之有效、如兼服魚肝油尤妙、分劑一至二量錢、(4.0-8.0) 又有鐵檸鬱葡酒、Vinum Ferri, U. S. Vinum Ferri Citratis, B. P. 其功用分劑、與鐵苦葡酒同。

鐵醋鬱消水 Liquor Ferri Acetatis, B. P. 分劑十五至六十量滴、(1.0-4.0)

鐵貼膏 (Emplastrum Ferri)

乖效 有服此類藥而胃不平、或兼有額痛者、此等乖效、有服一次即顯、亦有服數日而

1 Anæmia
2 Chronic diarrhœa with anæmia
3 Hysteria
4 Anæmia

加水、以絮蘸之、塞於鼻內、有效、然所成之血塊、仍存於鼻中、不易取出、故醫者不常用之、如腸熱症而便血者、不可用、因此藥之體質、於胃內必被改變也、以高鐵硫强鬱製成三厘 (0.2) 之堅丸、服之方可、如因胃經有恙而吐血者、可加水內服之、以其惹力過大、故不可勤服、喉門棚炎、或喉炎等症、以絮蘸之、敷於炎處、大效、亦可用水與甘油各半敷之、或其效尤大、但用時最宜謹愼、不可使藥滴於嗓內、痧症亦效、鵝北方俗稱胰子乃此藥之敵。

鐵草鬱 (Ferri Oxalas) 分劑二至三厘、(0.12-0.2)

鐵硫鬱類此類分數種、乃

易化鐵硫强鬱 Ferri Phosphas Solubilis, U. S. 分劑四厘、(0.25)

鐵硫强鬱 Ferri Phosphas, B. P. 分劑二至五厘、(0.12-0.3)

鐵硫貴林糖漿 Syrupus Ferri Quininæ et Strychninæ Phosphatum, U. S. Syrupus Ferri Phosphatis cum Quinina et Strychnina, B. P. 分劑一量錢、(4.0) 此方內之鐵、即鐵硫强鬱。

鐵硫强鬱糖漿 Syrupus Ferri Phosphatis, B. P. 分劑一量錢、(4.0)

鐵粉 Ferrum Reductum, U. S. Ferri Reductum, B. P. 此粉之精純者、撒於燈火上、則必燃著、否則必有炭煤雜質、如加

1 Intestinal hemorrhage
2 Tonsillitis
3 Pharyngitis
4 Diphtheria

高鐵沘 Ferri Hydroxidum, U. S. 此乃敵砒毒之藥、惟新製者有效、製法、無論何鐵、製成流質、加鹼類、即鍾沘消水、或鎂蔞所沉澱而成者、如用鍾沘消水所製者、必以水洗數次、去其鍾味、方可用之、否則恐有惹胃之患、以鎂蔞製之最妙、蓋鎂蔞原有敵砒毒之功、且無惹力、如遇中砒毒者、即宜多備、少則恐不敷用。

鐵氯糖漿 Syrupus Ferri Iodidi, 此藥乃透光之漿、味甜似鐵、若加糘於其內、其色不變、倘變爲藍色、則不宜用、因其內含未成塩之氯質也、未成塩之氯大有惹力其大用、乃醫血虧癆等症、如孩童癩症、而兼血虧者、其效尤妙、二正歲之孩童、可服二至三量滴、(0.12-0.2) 成人可服三十至四十量滴、(2.0-2.6) 滴於水內、以玻璃管服之、可免牙齒受傷、又有糖鐵氯塩、(Ferri Iodidum Saccharatum.) 可代鐵氯糖漿之用、分劑二至五厘、(0.12-0.3) 鐵氯塩丸、每丸內含鐵粉一厘之六分之一、(0.01) 氯一厘之八分之一、(0.008) 分劑一至三丸。

高鐵硫强鬱消水 Liquor Ferri Subsulphatis, U. S. Liquor Ferri Persulphatis, B. P. 此藥大有斂力、遇血則凝成黑硬之塊、必須外敷方效、若身內流血者、服之無效、咳血症、以此藥十至六十量滴、(0.6-4.0) 加烝水一量兩、(30.0) 置於噴霧具內、噴於口中、令其吸之、或效、瘡流血症、無論因何而致、可加水一半、敷患處有效、瘡頸流血、或瘡瘜流血、可敷此藥、但不必加水、鼻肭症、或加水一半、或不

1 Anæmia
2 Scrofulosis
3 Eczema
4 Hæmopysis
5 Uterine hemorrhage
6 Cervical hemorrhage
7 Hemorrhage from uterine polypus
8 Epistaxis

此藥、敷服俱可、宜用足分劑、切當加水、以玻璃管服之、可免牙齒受傷、分劑七至三十量滴 (0.5-2.0) 另有泡製之鐵氣鹽二類、一爲鐵氣强鹽消水、Liquor Ferri Perchloridi B. P. 服之者甚少、分劑四至十量滴 (0.25-0.6) 一爲濃鐵氣强鹽消水、Liquor Ferri Perchloridi Fortis, B. P. 斂力頗大。

鐵檸礬類 Citrates of Iron 此類藥原分數種、乃

鐵檸礬 Ferri Citras, U. S. 分劑五厘 (0.3)

鐵鉀檸礬 Ferri et Ammonii Citras, B. P. 色紅而結薄晶、分劑五厘 (0.3)

鐵貴林檸礬 Ferri et Quininae Citras, B. P. 分劑五至十厘 (0.3-0.6)

鐵士的年檸礬 Ferri et Strychninae Citras, U. S. 分劑一至三厘 (0.06-0.2)

易化鐵貴林檸礬 Ferri et Strychninae Citras Solubilis, U. S. 分劑一至五厘 (0.06-0.3)

均畧有激斂二力、且與青道無所妨碍、水易化之。

鐵菓礬類 Ferri Tartras, 此類藥原分二種、乃

鐵鋞菓礬 Ferri et Ammonii Tartras, U. S. 分劑五厘 (0.3)

鐵鈄菓礬 Ferri et Potassii Tartras, U. S. 分劑五厘 (0.3)

淡醋酸	Acidi acetici dil.	六分
鹽醋消水	Liquor. ammonii acetatis	四十分
陳皮甘香酒	Elix. aurantii	十分
甘油	Glycerini	十五分
水	Aquæ	二十五分—M.

分劑一至四量錢(4.0-16.0)多加水冲服。

S.—The dose is from one to four drachms, well diluted.

低鐵氣鹽 (Ferri Bromidum) 曾有名醫以此藥五至二十厘(0.3-1.3)加糖漿以醫血虧而兼有肌跳者有效。

甘鐵碳强鬱 Ferri Carbonas Saccharatus, U. S. 此藥無甚斂力可成丸服之分劑三厘(0.2)因血虧之經閉症多以此藥醫之或用鐵碳雜調水半至一量兩(15.0-30.0)亦可。

鐵氣强塩酒 Tinctura Ferri Chloridi, U. S. Tinctura Ferri Perchloridi, B. P. 此藥爲最常用之品鐵類中利小便者惟此效最大癆症宜用足分劑並當勤服如胃經能受每句鐘服五滴(0.3)亦不爲過腎久炎症服此藥有效並有減尿腥之功血虧症於其所含之酸有滋補之功痨症與喉門棚炎症

1 Anæmia associated with chorea
2 Amenorrhœa
3 Erysipelas
4 Chronic Bright's disease
5 Anæmia
6 Diphtheria
7 Tonsillitis

之、血旺者忌用、小分劑之功效、與中分劑同、並少有大便乾燥之患、血虧重症、如因血中之鐵、祛之過多、用足分劑以補其不足、最妙、然必有宜用之確據方可、否則必有損傷、因此類藥之用不同、故一一論之。

鐵鋅硫强鬱 Ferri et Ammonii Sulphas, U. S. 婦女虛弱而患白帶者、可服、因其斂力過大、故病者胃經發炎、則不宜服、分劑二至五厘。(0.12-0.3)

鐵香調水 (Mistura Ferri Aromatica,) 此藥含鐵甚少、倘病者服鐵宜多、則不便用之、若因熱症、致微有血虧[2]、飯後服一二量兩、(30.0-60.0) 頗效、此水內有鐵與辛蔻那皮、加林啤、丁香、豆蔻雜酒、陳皮酒、薄荷冰等藥。

低鐵砒强鬱 Ferri Arsenas, B. P. 乾皮症類[3]、服一厘之十六分之一、至十二分之一、(0.004-0.005) 有效、久瀉而血虧者亦效、不但補虧、且能止瀉。

鐵鋅醋鬱消水 Liquor Ferri et Ammonii Acetatis, U. S. 此藥乃爲易服有效之品、新久腎炎之[5]血虧症、服之能利小便、且能發表、製法如左。

四分

鐵氯强塩酒 ℞ Tincturae ferri chloridi, U. S.
Tincturæ ferri perchloridi, B. P.

1 Atonic leucorrhœa
2 Anæmia
3 Dry forms of skin disease
4 Anæmia of chronic diarrhœa
5 Anæmia of acute and chronic nephritis

第十一章 論補藥類

鐵 FERRUM.

此係金類、因人血中含有鐵類、故爲人身必需之物、或謂不但入藥、亦能養身、揀藥册中、所載鐵製藥類甚繁、然不常用者居多。

體功效 此藥只服一劑、無甚功效、若連日服之、血與血紅朕、俱必加增、服過分劑而不能喫者、則由大便祛之、即使被喫、祛之則緩、其祛也不藉膽腎、乃被血運至腸內、仍由大便祛之、故於其糞中、以化法亦可得回此藥、或謂此藥既已被喫、永不能祛、然絶無此理、夫鐵能令氣變成臭氣、故改變物體甚速、因而知其有養育人身之功也、鐵之入藥者有二類、一可化者、一不可化者、可化者、於胃中與胃液、成爲不易化之鐵類、被喫甚緩、故不可化者甚妙、按此類藥中、鮮有無斂力者、若服之過多、必致大便結燥、胃經略失功用、最有斂力者、乃高鐵硫强鬱、(Ferri Subsulphas.) 與低鐵硫强鬱、Ferri Sulphas, 其次乃鐵鋿硫强鬱、Ferri et Ammonii Sulphas, U. S. 與鐵氯强塩、Ferri Chloridum, U. S. 斂力最小者、乃鐵粉、Ferrum Redactum. U. S. Ferri Redactum, B. P. 甘鐵碳强鬱、Ferri Carbonas Saccharatus. 鐵鋿檸鬱消水、Liquor Ferri et Ammonii Acetatis, U. S. 鐵檸鬱類、鐵菓鬱類、鐵乳鬱、鐵砒强鬱等。

療效 鐵藥類、常用於血紅朕紅腥缺少、及血虧等症、醫此等症、宜先以紅朕紅腥表試

1 Anæmia

積毒　服此礬日久者、必沉澱於皮、以致週身發青、其最先顯著者、乃於肝眸或唇泗膜上有青綫一道。

解毒法　新毒解法　化學中敵此毒者、乃鈉氯塩、(即常食之塩)以水化開服之、兼服鴉片、並油類、以平其育道、且宜多飲牛乳、並鹹水、以抵其毒力、並宜以煖身之法煖之。

積毒解法　漸積此毒者、皮之青色、無善法可去、用鉄氯塩、或有微效。

銀脛礬 (PROTARGOL) 此藥近數年來、始入藥用、乃以銀與脛製成、色黃、其質細粉、每百分內含銀約八分有奇、冷水滾水、俱能化爲消水、其色黑紫、此消水內加胎、或淡氯氯酸、或鹼藥類、俱不能使之沉澱、故與銀氯强礬不同、白濁與白濁之眸炎、用之有效、因其能滅此症之稚也、醫白濁之用法、以此藥一至五厘、(0.06-0.3)加水百量滴、(6.6)射入尿脬內、乃爲合宜、醫白濁眸炎之用法、以此藥一分、加水二至四百分、製成淡消水、滴於目內、方爲合宜、他類眸炎久症、用之亦可。

1 Gonorrhœa
2 Gonorrhœal conjunctivitis

若喉癆症[1]可以半至二厘(0.03-0.12)化於一量兩(30.0)水內、用噴霧具噴之、或效有名醫以此法醫啼嗽症[2]、令病者或能安然睡卧、因此藥易致人嘔吐、故宜在飯前噴之、噴具之口、病者必銜於唇內、則免染黑之虞、白濁症[3]之中程、將此藥半厘(0.03)以水三量兩(90.0)化之、射入尿脬、有效、宮頸生瘍與白帶症[5]如宮頸腫痛、以淡銀丹敷之有效、倘敷此處、而覺頭痛、當服鉄氰鹽十厘(0.6)以止其痛、陰肛二處作癢[6]、用此礬四至六厘、(0.25-0.4)化於一量兩(30.0)水內、每日用刷敷二至四次、有效、卧瘡[7]將起時、其皮先紅、可以此礬二十厘、(1.3)化於一量兩(30.0)水內、以刷敷於紅處、可免成瘡之患、如已成瘡、此法無效、癤[8]初起時、頂有膿皰、四圍發硬者、可用五厘、(0.3)化於一量錢(4.0)水內、敷之、可免生膿之患、睫瘍炎[9]可用淡銀丹擦之、或以此礬十厘、(0.6)化於一量兩(30.0)水內、敷之亦可。

毒力 新毒 服毒分劑者、霎時必有腹痛、嘔瀉等患、育道發炎、腹內凝結、面紫、容戚、且生汗不止、所吐者、或白、或棕、或黑、無一定之色、唇則先白、不久變爲棕色、後則變黑、或腦部受惹過甚、致有似癎之瘓瘂、並有譫語、其死也、或因育道發炎、或因呼吸司所停止、氣脬必有淡泗液充塞其中。

1 Laryngeal phthisis
2 Whooping-cough
3 Gonorrhœa
4 Ulceration of cervix
5 Leucorrhœa
6 Pruritus pudendi vel ani and vulvæ
7 Bed-sores
8 Boils
9 Granular lids

久、宜停半月、然後再服、如久服之、恐皮色改變、因其被祛最緩也、已有人查明、連用此藥一兩、面色有變黑紫之處、然僅用一兩、而皮色改變者鮮矣。

淡銀丹 又名銀鈦氰礬 Argenti Nitras Mitigatus, 此係銀氰强礬一分、鈦氰强礬二分、製成、乃外科之淡潰藥。

鑄銀丹 又名鑄銀氰强礬 Argenti Nitras Fusus, U. S.

韌銀丹 又名韌銀氰强礬 Argenti Nitras Induratus, B. P.

外用 痘熟作漿時、在第四五日內、將此礬二十厘、(1.3) 化於一量兩 (30.0) 水內、以針蘸之、挑破其痘、則免成痘痕[1]、亦有人謂、以此礬五至十厘、(0.3-0.6) 化於一量兩 (30.0) 水內、敷於痘上、其效與用針挑破之法同、此二法皆爲免其生膿太過也、前數十年、醫者常以此礬化於水內、以敷痧[2]症、今因有較此法尤妙者、故少用之、然於他類皮炎症、敷之有效、陽腺炎[3]、或精腺冠炎[4]、於症初患時、用大分劑、化於水內敷之、一可止痛、二能消腫、指筋鞘炎[5]、初患時、以此消水敷之、或免生膿之患、喉噪喉門口各類之炎症[6]、敷之有效、然此消水、必有濃淡之不同、若受風之喉痛症、自覺喉泗膜有脫落之勢、以六十厘、(4.0) 加水一量兩、(30.0) 化而敷之、大效、此法用藥雖多、然較少用者受痛輕、而功效大、

1 Pitting of smallpox
2 Erysipelas
3 Orchitis
4 Epididymitis
5 Felon
6 Inflammations of pharynx, larynx, fauces and mouth

至達於層下之肌已。

祛　此藥被祛甚緩。

療效　胃瘍[1]症、與鬧羊花膏、或鴉片相合、成丸服之、最妙、無論新久之胃泗膜炎[2]症、如多有噫噎嘔酸、或飯後嘔吐者、頗效、宜在飯前半句鐘、服一厘之六分之一、至四分之一、(0.01-0.015) 乃乘胃經空閒之時、俾藥力易達於病處也、有名醫用此謩以醫腸生瘍症、謂爲最妙、但宜將此謩製之成丸、以角素爲衣、使其過胃、方能融化、則藥力乃達於患處、鬧[3]肛等處生瘍、或新久痢症、可用爲射肛藥、惟鬧瘍必以六十厘、(4.0) 加水三量磅、(1500.0) 射之、若醫肛瘍、只用謩三厘、(0.2) 加水四量兩 (120.0) 射之、但未射之先、宜用溫水將胴洗淨、水內忌有鹹謩五厘、(0.3) 加水四量兩 (120.0) 射之、但未射之先、宜用溫水將胴洗淨、水內忌有鹹

北方俗名曉子

與鈉氯鹽、因其有敵此謩之能也、射之之時、宜備鈉氯鹽消水、倘病者不勝謩力、即以鹽水射之、其力可解、脊腦旁柱後柱變硬症、[5]如非因楊梅牽累者、此藥或效、癲[6]肌跳[7]等症、昔日多以此藥醫之、近少用之、因其鮮有功效也。

藥製與分劑

銀氰強謩 Argenti Nitras, 一厘之六分之一、至四分之一、(0.01-0.015) 成丸用之、服兩月之、

1 Gastric ulcer
2 Chronic and acute gastric catarrh
3 Ulceration of cæcum and rectum
4 Acute or chronic dysentery
5 Lateral and posterior spinal sclerosis
6 Epilepsy
7 Chorea

而死也、可知此藥之毒、較硇毒尤速也、育道生瘍之瀉症[1]、與鴉片並服有效、分劑一厘之四分之一、至一厘、(0.015-0.06)乾皮症[2]癆症[3]等、常以砒醫之、如服砒而不受、則以此藥之微分劑代之、即一厘之十分之一、(0.006)有效、或謂微分劑有感肌之能、故服之者、肌必硬而有力、近有醫家云、血虧症[4]以高銅砒弱礬(Cupri Arsenitum)醫之、爲最妙之劑、頑瘍症[5]以銅礬塊擦之、或研爲細末撒之、有效、睛炎[6]之中程、用銅礬一至三厘、(0.06-0.2)化於一量兩(30.0)水內洗之、乃爲妙劑、嗓鬆痛症[7]以銅礬四厘、(0.25)化於一量兩(30.0)水漱之、有效。

解毒法　先服鈸低鐵藍洽、Potassii Ferrocyanidum 此乃化學中之敵藥也、後服洋橄欖油、與卵青、再後用吐劑、或用胃抽器抽之、倘業已吐瀉、腹痛必甚、不可再用吐藥、宜於吐後服鴉片酒之中分劑、敷芥末糊藥於腹外、然中此藥而成積毒者鮮矣。

銀氰強礬 ARGENTI NITRAS,

此礬結晶、透光、水一分、能化藥一分、敷於皮上、先發櫻色、後則變黑。

體功效　此礬與鉛鉍鉦等礬類同、凡泗膜發炎、此數礬皆可服之、因其頗有斂力、少有惹力也、若敷之、則潰力甚大、緣其有凝胎之能、故所潰不深、既凝胎成層、其潰力即不

1 Diarrhœa
2 Skin diseases of the dry type
3 Scrofula
4 Anæmia
5 Indolent ulcers
6 Subacute conjunctivitis
7 Relaxed Sore throat

鉦醋強礬 ZINCI ACETAS, 此藥結晶、形如鱗片、色白、味澁、無臭、水能化之、敷於皮或泌膜上、則有斂力、然較鉦硫強礬之斂力爲小、睛炎症用此藥一或二厘、(0.06-0.12) 化於一量兩 (30.0) 水內、洗之有效、白濁症、以此藥一至二十厘、(0.06-1.3) 加玫瑰水一量兩、(30.0) 射入尿脬、有效、中此藥之毒者、醫法與醫育道炎症同、中毒日久者、肌肉被攤、腦系作痛、身體疲憊、然不常有之。

銅 (CUPRUM) 此係金類、不入藥用、入藥者乃高銅硫強礬、俗名藍礬 Cupri Sulphas, 色藍、味澁、結晶、晶之大小不同、冷水四分、或滾水二分、皆能化藥一分、醇酒不能化。

體功效 此藥敷於泌膜、大有斂力、敷於瘡口、微有潰效、服毒分劑者、越一句鐘、胃甚燒痛、口覺銅味、後則嘔吐、所吐者乃藍水與粘沫、再後瀉腹、先則其糞如常、後則血與粘沫、育道發炎、至力耗盡而死、將死時、必有似癎之痙攣、或有流涎甚多者、

療效 此礬乃爲速而有力之吐藥、其令人嘔吐者、非激嘔吐司所、乃激胃系末也、分劑五至七厘、(0.3-0.5) 以其惹力過大、如服一次無效、不可再服、宜以鉦硫強礬、或芥末代之、按此藥不可輕用爲吐劑、惟中砒毒者、可謹愼用之、因其在化學中爲砒之敵藥也、近有人以砒毒犬、用此藥醫之、卒不可救、細查其故、非因砒毒而死、乃因中此藥之毒

1 Conjunctivitis
2 Gonorrhœa

鉦碳強礬澱

ZINCI CARBONAS PRÆCIPITATUS, U. S.
ZINCI CARBONAS, B. P.

此藥之功用、與鉦羹同、因其有斂力、敷於患處、可免衣服蹭磨之虞、故常用之於皮濕與濕癩等症、多有醫者、醫濕癩症、不用過澱者、良方如左。

鉦碳強礬 ℞-Calaminæ 一英錢 (4.0)
鉦羹抹膏 Unguenti zinci oxidi 七英錢 (28.0) —M.
敷於患處。 S.—Apply to the eczematous spot.

嬰孩因大小便惹皮、致患對磨癜者、良方如左。

鉦碳強礬散 ℞-Pulveris calaminæ 二英錢 (8.0)
鉦羹 Pluveris zinci oxidi 四英錢 (16.0)
甘油 Glycerini 四量錢 (16.0)
醇酒 Alcoholis 二量兩 (60.0)
水 Aquæ 加至一量磅 (480.0) —M.
每換兜布時、用絮蘸藥、敷於患處。 S.—Apply with a mop after each removal of the diaper and allow to dry.

1 Weeping eczema
2 Intertrigo

瘍癩[1][2]等症之良方如左。

筋膠	R-Gelatini	四分
水	Aquae	十分
甘油	Glycerini	十分
鉛蔇	Pulveris zinci oxidi	四分

此方先以筋膠置於水內、用火化開、後加甘油、再後加鉛蔇、宜隨加隨調、調勻即傾於盆內冷之、俟其凝塊、方可用之、有消腫之能、亦有平輔二用、用時、先以鹹水、將患處之全肢洗淨、再用淡酒洗之、將此藥化開、以刷蘸之、敷於患處之四圍、以絮覆其瘡口、用二寸寬之紗布條纏之、務須裹平、後用剪通上下鉸開、再敷藥一層、仍用紗布如前裹之、又復剪開敷之、如此裹至三四層爲止、最要者、宜從足趾裹至膝蓋、然後用尋常之布捲、再裹一層、越二十四句鐘、乃可去之、先裹者狀如白色庫秋、如瘡口流膿過多、宜於該處剪開一口令膿流出、亦由此口敷之以藥、但宜令病者躺臥、使其腿高於身、越一二日、令其行走、必見功效。

1 Ulcers
2 Eczema

皮症皆可用之、孕婦之㪅患[1]良方如左。

鉦 莠	℞-Zinci oxidi	三英厘 (0.2)
錄錏洽	Hydrargyri ammoniati	一英厘 (0.06)
蔻蔻脂	Olei theobromæ	一百五十英厘 (10.0)
萆麻油	Olei ricini	一百五十量滴 (10.0)
玫瑰花油酒	Essenciæ rosæ	十量滴 (0.6)

日敷二次。S.—Apply to face night and morning.

癩皰[2]症之良方如左。

樟腦散	℞-Pulveris camphoræ	三十英厘 (2.0)
鉦 莠	Pulveris zinci oxidi	一百八十英厘 (12.0)
甘 油	Glycerini	四十量滴 (2.6)
安息香豬脂	Adipis benzoinati	一英兩 (30.0)

敷於患處、或先撒鉍礬類、後敷此膏亦可。S.—Apply to the part.

1 Chloasma of pregnancy
2 Eczema

空氣即成細粉。

服法 此藥有惹胃系末之能、以十至三十厘、(0.6-2.0) 溫水化服、可作吐藥、如服一次、過二十分鐘而不吐、可再服之、如仍不吐、可以芥末代之、此藥令人嘔吐、較銅硫强礬之力小、然毒力亦小、白濁[1]症、可用此藥少許、以水化之、射入尿腔、有效、盟[2]瀉症、製成二厘(0.12)之丸、服之有效、如用鴉片小分劑、或獨脚蓮楠一厘之六十分之一、(0.001) 尤妙、睟[3]炎症、可以此藥一至二厘、(0.06-0.12) 加水一量兩、(30.0) 洗之有效。

鉦蓉 ZINCI OXIDUM, 此藥色白、無味、形如細粉、水不能化、對磨癜[4]、睟[5]炎等症、用之有效、如與鉍礬、倍辛等藥並用、以醫孩[6]童之暑瀉症有效、癆[7]症之盜汗、良方如左。

鉦蓉 ℞-Zinci oxidi 三十英厘、(2.0)

顛茄膏 Extracti belladonnæ foliorum 三英厘、(0.2) —M.

製成十丸、每晚服一丸。Fiant pilulæ No. X. S.—One at night before going to bed.

此方之功效、在乎顛茄、有名醫用此方、醫瘵[8]與啼嗽[9]等症。

鉦蓉抹膏 Unguentum Zinci Oxidi, 此藥皮科常用之、燙[10]傷膿[11]瘡等有效、乾皮症忌用、凡濕[12]

1 Gonorrhœa
2 Serous diarrhœa
3 Conjunctivitis
4 Intertrigo
5 Conjunctivitis
6 Summer diarrhœa of children
7 Night-sweats
8 Asthma
9 Whooping-cough
10 Burns
11 Sores
12 Moist skin disease

鉍柳下磬 Bismuthi Subsalicylas. U. S. Bismuthi Salicylas. B. P. 此藥色白、質軟、水、醇酒、伊打、哥羅芳等、皆不能化、惟酸類能化之、育道泗膜發炎時、所食者如有釀患、此類藥能醫之、因其有免釀之力也、分劑三至十五厘。(0.2-1.0)

鉍加泌下磬 Bismuthi Subgallas, U. S. 此藥無味、色黃、置於盤中、歷久不改其體質、其外敷之功用、能令瘡口發乾、生膿之稚無從而生、與黃氣同、因其斂力過大、故頑瘍忌用、宜用有惹力之藥、方能見效、醫瘰癧瘡、此藥或不如黃氣之妙、然其毒力、較黃氣微小、故少有中此毒者、皮濕症類、或散、或抹膏、皆可用之、抹膏之製法、每兩(30.0)內有鉍加泌下磬散三十至六十厘、(2.0-4.0)或加鈺羹相等之分劑、亦可、曾有以此散五至十厘、(0.3-0.6)醫中耳[2]睜症而見大效者、亦有以之醫食滯[3]之釀症、謂有大效者。

鈰草磬 CERII OXALAS, 此藥色白、無味、形係微粒、空氣不能變其體質、水與醇酒皆不能化、氫氣酸能化之。

療效 孕吐患[4]、與鉍氰下磬同用、或專用、此藥皆效、若用之以醫胃酸[5]藥亦可、分劑二至五厘、(0.12-0.3)製之成丸、每三四句鐘服一丸。

鋅硫強磬 ZINCI SULPHAS, 此藥色白、結晶小如砂粒、臭之無味、嘗之味酸、水能化之、遇

1 Moist skin diseases,
2 Otitis media
3 Fermentative dyspepsia
4 Vomiting of pregnancy
5 Gastric acidity

常有噫噎者、服鉍礬類俱效、胃系痛[1]、胃瘍[2]、胃炎[3]等症、鉍礬類有平斂之功、惟育道新炎症、鉍錏檸礬忌服、因其惹力過大也、夫鉍礬中微含磷質、服之日久者、口中必有蒜味、大便每有黑色、若舌生苔、亦每有黑色者、手臉皴裂[4]之良方如左。

鉍氰下礬	R-Bismuthi Subnitratis	百八十英厘、(12.0)
鉦礬油礬	Zinci Oleatis	百八十英厘、(12.0)
金粉	Lycopodii	百二十英厘、(8.0) —M.

日敷三次。 S.—Apply to the parts t. i. d

近今入藥者、更有數礬、列之於左。

鉍安息礬 (Bismuthi Benzoas.) 此藥色白、無味、形如細粉、水不能化、近數年來、德人常用之以醫瘨[5]症、因其收口最速、所留之瘢痕亦小也、各類之楊梅瘡、或他類之頑瘡[6]、用之亦可、用法、先以淡錄氯强塩消水洗患處、後以此藥撒於瘡上、覆之以絮、用合口貼膏貼之、每二十四句鐘、必換一或三次方可、敷後或覺熱痛、然不久即止。

1 Gastralgia
2 Gastric ulcer
3 Gastritis
4 Chapping
5 Chancroid
6 Indolent ulcer

者謂、多服此藥、則育道發炎、近代人細心考查、乃知昔時之鉍礬類、與砒(又名礵)混雜、故有育道發炎之患、若用過分劑日久、無論服敷、間有中毒者、用中分劑則否、若不常服、雖日服半兩、(16.0)亦不受毒、人之受毒、育道有黑色之疥塊、腎必發炎、尿中多含胎類、英‖揀藥册、另有鉍藥數種、如左。

鉍錏檸礬消水 Liquor Bismuthi et Ammonii Citratis, B. P. 分劑三十至六十量滴、(2.0-4.0)

鉍雜餅 Trochiscus Bismuthi Compositus, B. P. 每餅內有鉍二厘、(0.12)

鉍 鎊 Bismuthi Oxidum, B. P. 分劑五至二十厘、(0.3-1.3)

體功效 鉍氰下礬、與鉍碳强礬、無體功效、服敷略有斂力、此二藥入腹、必徧附於育道之泗膜、正所以保護泗膜也。

療效 服鉍礬類之足分劑、功效有二、一有斂力、二保衛發炎之泗膜、不受惹患、因胃受惹而嘔吐[1]者、服之有效、瀉泗液[2]症、宜先服萆麻油、瀉淨泗液、後服鉍礬、有效、盟瀉[3]症、如以鉍氰下礬 Bismuthi subnitras 十厘、(0.6) 與焼醇 Phenol, U. S. Acidum Carabolicum, B. P. 一厘、(0.06) 置於藥壳內服之、其效尤大、且微有改酸之能、鉍錏檸礬、頗有斂力、在鉍礬中、惟此礬水能化之、盟瀉久症[4]、每二三句鐘、可服五厘、(0.3) 如因乳酸乳油酸之釀患、以致胃不消化[5]、且

1 Vomiting
2 Mucous diarrhœa
3 Serous diarrhœa
4 Chronic Serous diarrhœa
5 Dyspepsia

藥製

淡鉛醋下劑消水 Liquor Plumbi Subacetatis Dilutus 因其力薄、故不常用。

鉛醋下劑蠟膏 Ceratum Plumbi Subacetatis, U. S.

鉛醋下劑擦藥 (Linimentum Plumbi Subacetatis.)

鉛醋下劑甘油 Glycerinum Plumbi Subacetatis, B. P.

此四藥、俱能代鉛醋下劑消水之用。

鉛貼膏 Emplastrum Plumbi. 此膏乃用鉛醋下劑製成、有著名醫者云、足生汗過多者、以鉛貼膏、與胡麻子油各半、攤於布上裹之、三日一換、乃係妙法。

鉛氧弱 PLUMBI OXIDUM, 此藥醫家鮮有用之者、製藥者、常用之以作鉛醋下劑消水。

鉛氧強劑 PLUMBI NITRAS, U. P. 此藥只用爲敷藥、甲母炎重症可用之。

鉍 (BISMUTH) 此係金類、不入藥用、入藥者、係鉍質所成之數劑、即鉍碳强劑、

Bismuthi Subcarbonas, U. S.
Bismuthi Carbonas, B. P.

鉍氧下劑、Bismuthi Subnitras, 鉍檸劑、Bismuthi Citras, U. S. 鉍鍾檸劑、Bismuthi et Ammonii Citras, U. S. 前二劑功效相同、可隨意用之、分劑均五至二十厘、(0.3-1.3) 後二劑之斂力、較前二劑甚大、故宜服小分劑、均二至四厘、(0.12-0.25) 昔有醫

1 Sweating of the feet
2 Onychia

鉛碳强礬 R-Plumbi Carbonatis 六十英厘 (4.0)
糙散 Pulveris Amyli 六十英厘 (4.0)
玫瑰水抹膏 Unguent. Aquæ Rosæ 一英兩 (30.0)
洋橄欖油 Olei Olivæ 一百二十量滴 (8.0) —M
敷於患處。S.—Apply to inflamed skin.

鉛氯塩 PLUMBI IODIDUM, 分劑半至二厘、(0.03-0.12) 然不常用爲服劑。

鉛氯塩貼膏 Emplastrum Plumbi Iodidi, B. P.
鉛氯塩抹膏 Unguentum Plumbi Iodidi, B. P.

鉛醋下礬消水 LIQUOR PLUMBI SUBACETATIS, U. S. LIQUOR PLUMBI SUBACETATIS FORTIS, B. P.

此藥與鴉片酒並用、以醫筋扭[1]、與跌打[2]等傷、用法、以此消水四分、鴉片酒一分、水十六分相合、敷傷處頗效、若醫漆咬[3]症亦效、如皮膚已破、則不可用、其故有二、一恐藥被嗹而中毒、二此藥之斂力、能令傷口血少、難於收斂、指筋鞘炎[4]初起時、可將饅首浸此消水、敷於炎處、以免生膿之患、肛癢[5]症、洗之有效、如濕癩[6]作癢、每日敷淡消水一二次、有效、敷後宜用淡鹼水類洗之。

1 Sprains
2 Bruises
3 Ivy Poisoning
4 Folon
5 Pruritus pudendi
6 Eczema

鉛醋軟膏 R-Plumbi Acetatis 四十英厘、(2.6)
鴉片散 Pulveris Opii 十英厘、(0.6)
樟腦 Camphoræ 四十英厘、(2.6) -M.
共成二十丸、每四句鐘服一丸。 Fiant pilulæ No. XX. S. One every four hours.

痢[1]症、此藥可用、白濁[2]症、以一至八厘、(0.06-0.5)加水一量兩、(30.0)射入尿腔內、有效、漆咬[3]症亦可用之、因其能抵拒漆毒、不使散佈也、用法以此藥半厘、(0.03)加醇酒一量兩(30.0)洗之、後敷涼藥類、油類忌用、因漆毒能藉油性散佈也。

藥製與分劑

鉛醋鴉片丸 Pilulæ Plumbi cum Opio, B. P. 三至五厘、(0.2-0.3)

鉛醋雜肛彈 Suppositoria Plumbi Composita, B. P. 每彈內有此藥三厘、(0.2)鴉片一厘、(0.06)

鉛醋抹膏 Unguentum Plumbi Acetatis, B. P.

鉛碳強軟

PLUMBI CARBONAS, B. P.

此藥色白、不易融化、燙傷[4]以油調敷、有效、曬炮[5]之良方如左。

1 Dysentery
2 Gonorrhœa
3 Ivy poisoning
4 Burns
5 Sunburn

解毒法　新毒解法　宜使之多服易化之硫强鎂類、因此類藥購之甚便、且能變鉛醋鎂、成不毒之藥、亦能令人瀉淨腸內之物、並宜服吐藥、如未能吐淨、必須用胃抽器抽之、後用煖身之法、煖其腹與四肢、亦當服鴉片、以止腹痛、並平其育道也。

積毒解法　一宜去中毒之原、二宜除淨身內已有之鉛、三宜治所傷之處、中此毒而腹痛者、當服渣笠鉢氯弱塩等膽瀉藥、亦當與鴉片白鬱並用、惟白鬱只用二厘、(0.12)餘者可用足分劑、此方亦可謂爲特方、若積中毒者、只服瀉劑、不與莫非並用、或無功效、因鉛之惹力、有阻大便之能、莫非有敵鉛惹之能、故用莫非以輔瀉藥之力也、如有因之而腦發炎者、宜在項上敷起皰藥、內服瀉劑、且可服披路加便、令其生汗、更宜服鉄氯塩、因其能令身內不易化之鬱類、變成易化者、日服三次、每服十至三十厘、(0.6-2.0)若有漸癱之勢、宜服士的年、或鉄氯塩、但此二藥、性質相反、不可並用、亦可用法拉兒氏電具、以助肌之功用、如不見效、則用電池、或有裨益、此毒大半由肝而祛、亦有由大小便而祛者。

鉛醋鬱　PLUMBI ACETAS,　此藥結晶、色白、其酸如醋、水能化之。

療效　盟瀉症、可用此藥、且有良方如左。

1 Serous diarrhœa

綫、亦或有中毒者、因售此綫者、常攙鉛礬於其內、以圖獲利也、作茶食者、偶因雞卵價昂、以鉛鐲强礬代之、人食之或有中毒而殞命者、華人每用錫器、或磁器、以盛食物、亦或有中毒者、蓋因錫器中含鉛、磁器之釉亦含鉛也、積毒之狀、最明顯者、乃雙手下垂、因伸手肌被癱之故、惟伸拇短肌、與骶扳肌、不至被癱、但如此形狀、不常見之、亦有中此毒而成對眼者、因眼外直肌被癱也、亦有腹痛者、其痛自臍而起、佈滿全腹、且大便乾燥、所便者白或淺黃、不一其色、蓋因膽液缺少故也、至腹痛之時、血壓加增必甚、舌生白苔、大便乾燥、有此現狀、若不速去有鉛之處、顱腦必漸積毒、終則發炎、如顯癡癇、則殞命不遠矣、然亦有非因腦炎、乃因腎炎致腦中尿毒而癡癇者、中毒者、以尿表試其尿、如體質過輕、則爲凶兆、緣其腎經大受其毒、而功用已失矣、亦有工匠、日與鉛礬細粉相近、呼吸之間、隨空氣入肺、致患瘵症者、以上所論中毒之狀、惟近牙之齦、顯有藍色、乃常見之狀也、無此藍色者、亦不敢定其果未中毒也、積毒症、多有血虧者、以致面無血色、久之腦系幹、少得血之養育、其狀如繩、或有脊腦前柱發炎者、而後柱變硬者甚鮮、倘有失和動之狀、乃因身內諸系發炎也、按鉛與尿酸相合、成爲不易化之礬、血將此礬催入骨節、故中毒者、或似癲症。

枯白礬 ALUMEN EXSICCATUM, 此藥撒於瘡[1]上有效、患齦[2]頂齦者、用此藥敷於齦上、大效、但用時必須謹愼、以其有傷牙之力也。

鉛 (LEAD) 此乃金類、不入揀藥册、其所成之礬或羹類、有入之者。

體功效 以易化之鉛礬、敷於泗膜上、其斂力必使該處發白、若其處先覺發炎、其白尤顯、鉛類之最毒而有惹力者、即鉛氰强礬、其次乃鉛醋下礬、惟鉛醋礬毒力最少、凡鉛中之礬、不易化者、不能立受其毒、然匠人用之日久、每有中毒者。

毒力 新毒 服鉛醋礬之過分劑者、受毒必速、口覺甜味、並金類之味、後覺胸痛、再後則吐白水、或帶食物、其水色白者、乃因胃內所存之輕氯酸、與鉛變成鉛氯塩也、其痛加增必速、大便或瀉或閉塞、所瀉者、其色必黑、因腸內存硫故也、形狀至此、其脉必速、硬如鐵綫、後則微弱、面色憂戚、或白或紫無常、並口甚乾渴、或腓肌轉筋、或全身之肌、間有微顫之處、迨至昏迷不省、乃將死之兆也。

積毒 中此毒者、少因易化之鉛礬類、多因不易化之鉛礬類、其形狀各有不同、如形狀異常、醫者當先審明果中鉛毒、抑或楊梅症所致、易中毒者、多係作鉛礬類之人、或多用鉛礬類之匠人、亦有因用烏髮水、偶中其毒者、蓋因此水常含鉛礬也、人以牙斷

[1] Old sores.
[2] Swollen gums.

量滴、(1.0-4.0) 與水與甘油同服、尤妙。

鈣白礬 ALUMEN, 此藥自礬石煉成、色白、透光、嘗之味澁、其後畧酸。

體功效 此藥敷於泗膜上、必畧白而縮、敷於皮上、必漸厚而硬。

療效 喉[1]痛症、以二十厘、(1.3) 加水一量兩、(30.0) 敷於喉上、有效、因其易於傷牙、故少用之、流血症[2]敷之乃爲止血之妙劑、其止血之能有三、一能使血內粹腥凝塊、二能使傷處縮緊、三用布蘸此藥之消水、礬即成晶、血遇此晶、即凝成塊、摘牙而流血不止者、此藥大效、癆症之盜汗[3]或手足妄汗[4]、以此藥二厘、(0.12) 加水、或醇酒一量兩、(30.0) 洗之有效、吐血[5]症、以二十厘、(1.3) 加水一量兩、(30.0) 置於噴霧具內、細密噴之、有效、此法於氣脘炎而生痰過多、或喉嗓[6]久炎症、亦可用之、凍瘃[8]作癢、或陰門[9]作癢、用消水洗之、有效、白帶[10]症、以十至二十厘、(0.6-1.3) 加水一量兩、(30.0) 洗其陰道、有效、喉門[11]棚微核炎、可用白礬莖塞於微核竅內、或以消水刷之、俱可、趾甲[12]入肉、用食水絮蘸濃消水、塞於甲傍大效、若用之爲吐藥、孩童之分劑一錢、(4.0) 成人四錢、(16.0) 初受鉛毒[13]者、可服之爲敵藥。

毒力 此藥雖有毒力、然少有服之而死者、緣其能令人嘔吐也。

1 Sore throat.
2 Hemorrhage.
3 Night-sweats.
4 Localized sweating.
5 Hæmoptysis.
6 Bronchorrhœa
7 Chronic catarrh of the pharynx and larynx.
8 Chilblains.
9 Pruritus vulvæ
10 Leucorrhœa.
11 Follicular tonsillitis.
12 Ingrowing toe-nails.
13 Acute lead poisoning.

風呂草 Geranium, U. S. 二十至六十厘、(1.3-4.0)

風呂草流膏 Fluidextractum Geranii, U. S. 三十至六十量滴、(2.0-4.0)

陽葛 RHUS GLABRA, U. S. 此藥係一類矮木、產於美國、入藥者乃其子。

喉痛[1]症以陽葛流膏 Fluidextractum Rhois Glabræ, U. S. 加水與甘油、漱之大效、且有良方如左。

鉀氯強鬱 R-Potassii chloratis 六十英厘 (4.0)

陽葛流膏 Fluidextracti rhois glabræ 半量兩 (16.0)

烝水 Aquæ destillatæ 加至二量兩 (180.0) M.

每二句鐘用半量兩、(16.0)再加水半量兩、(16.0)漱之。

S.—To be added to an equal quantity of water in a glass and used as a gargle every two hours, after stirring.

香葛 (RHUS AROMATICA) 此藥亦係矮木、與陽葛相類、入藥者乃其根之皮、未入揀藥冊、然醫者多用之、故不得不載之於書、若尿血[2]經旺[3]遺尿[4]等症、有醫者以爲妙劑、如因胱弱、致患遺尿、用香葛流膏頗效、分劑、八歲之孩童、可服十五量滴、(1.0)成人十五至六十

1 Sore throat
2 Hæmaturia
3 Menorrhagia
4 Incontinence of urine

玫瑰流膏 Fluidextractum Rosæ, U. S. 五至百二十量滴、(0.3-8.0) 只用之爲引藥、以解他藥之惡味。

玫瑰糖菓 Confectio Rosæ U. S. Confectio Rosæ Gallicæ, B. P. 此藥乃爲和他藥成丸之用。

玫瑰蜜 Mel Rosæ U. S. 六十至百二十量滴、(4.0-8.0)

玫瑰糖漿 Syrupus Rosæ, 一至二量兩、(30.0-60.0)

玫瑰酸冲藥 Infusum Rosæ Acidum, B. P. 一至二量兩、(30.0-60.0)

玫瑰水 Aqua Rosæ 常合他藥製爲敷藥類、亦與他藥合用、射入尿腟、以醫白濁[1]症。

玫瑰水抹膏 Unguentum Aquæ Rosæ, 常用以醫燙傷[2]、刃傷[3]、手裂[4]、脣裂[5]等患、如加甘油、或安息香酸少許、暑熱時可免腥味。

風呂草 GERANIUM, U. S.

此藥乃一類之草、入藥者係該草之根、內含炭匿酸、加泌酸、其用乃醫瀉[6]症、若孩童之瀉症、可將此草一二根、以牛乳一量磅、(480.0) 煮而服之頗效、且無藥味。

藥製與分劑

1 Gonorrhœa
2 Burns
3 Cuts
4 Chapped hands
5 Chapped lips
6 Diarrhœa

佳奴酒 Tinctura Kino, 二量錢 (8.0)

佳奴雜散 Pulvis Kino Compositus, B. P. 內有佳奴十五厘、(1.0) 洋桂四厘、(0.25) 鴉片一厘、(0.06) 醫瀉症[1]大效。

赤蘇木 HÆMATOXYLON, U. S. HÆMATOXYLI LIGNUM, B. P. 此藥係一類之樹、產於中亞美利加、與西印度羣島、入藥者乃其樹心。

療效 此藥之斂力無多、且氣味不惡、故孩童易服、[2]盟瀉或[3]孩童瀉症、大效、服之者、大小便必色紅如血、抑或有藍色者、醫者當先言明、免人驚恐、[4]白帶症、服之亦效。

藥製與分劑

赤蘇膏 Extractum Hæmatoxyli, U. S. 八至三十厘、(0.5-2.0)

赤蘇煮水 Decoctum Hæmatoxyli, B. P. 六十至百二十量滴、(4.0-8.0)

白槲樹 QUERCUS, U. S. 此藥係一類之樹、中西均有、入藥者、乃其細嫩之內皮、婦人之白[5]濁、或[6]白帶症、以白槲樹冲藥射之、有效、脫肛[7]痔[8]等症亦效、喉[9]痛症、用爲漱藥亦可。

玫瑰花 ROSA GALLICA, U. S. ROSA GALLICÆ PETALA, B. P. 此藥中西均有、內含炭匿酸、加沒酸。

藥製與分劑

1 Diarrhœa
2 Serous diarrhœa
3 Diarrhœa of children
4 Leucorrhœa
5 Gonorrhœa
6 Leucorrhœa
7 Prolapsus recti
8 Hemorrhoids
9 Sore throat

每四句鐘服二小勺、(8.0) 用時切宜和勻。
S.—Dessertspoonful every four hours till relieved. To be shaken before using.

喉痛症、流涎過多、已至中程者、可作漱藥、齦[2]鬆症、用之漱口、或效。

藥製與分劑

兒茶散	Gambir, U. S. Catechu., B. P.	二十至三十厘、(1.3-2.0)
兒茶雜酒	Tinctura Gambir Composita, U. S.	六十至百二十厘、(4.0-8.0) 此酒但以洋桂兒茶製成。
兒茶餅	Trochisci Gambir, U. S.	喉痛症、可噙於口內、但用之者少。
兒茶酒	Tinctura Catechu, B. P.	六十至百二十量滴、(4.0-8.0)
兒茶雜散	Pulvis Catechu Compositus, B. P.	二十至四十厘、(1.3-2.6) 內有佳奴加美喇。

佳奴 KINO, 此藥乃印度一類樹汁、曝乾而成、瀉[3]症服之有效、亦可用爲漱藥、以醫喉痛、或腭垂鬆軟[5]症。

藥製與分製

1 Sore throat
2 Spongy gums
3 Diarrhœa
4 Sore throat
5 Relaxation of uvula

加沒酸 Acidum Gallicum, 二至四十厘、(0.12-2.6) 與鐵藥類不合。

加沒酸抹膏 (Unguentum Acidi Gallici)

無食子 GALLA, 此藥生於各類櫟樹之上、因蟲卵而生、其效皆在所含之炭匿酸。

藥製與分劑

無食子酒 Tinctura Gallæ. U. S. 二十至百二十量、(2.0-8.0)

無食子抹膏 Unguentum Gallæ,

無食子鴉片抹膏 Unguentum Gallæ cum Opio, B. P. 此膏有平斂之力。

兒茶 GAMBIR, U. S. CATECHU, B. P. 此藥乃由本樹之枝葉取出、其色深紅。

療效 此藥之大用、乃醫瀉症、如所瀉者、內多含鹽、其效尤妙、若多含泗液、宜先用蓖麻油、或鎂硫強馨以瀉之、後用此藥、如與鴉片並用亦可、良方如左。

兒茶雜酒 R- Tincturæ Gambir Compposit. U. S. Tincturæ Catechu Composit. B. P. 一二量兩 (60.0)

樟腦鴉片酒 Tincturæ Opii Camphoratæ, U. S. Tincturæ Camphoræ Compositæ, B. P. 一二量兩 (60.0)

錯碳強馨調水 Misturæ Cretæ 一二量兩 (60.0) —M.

1 Diarrhœa

英揀藥册、每餅內含此酸半厘、(0.03)

炭匿酸甘油 Glyceritum Acidi Tannici U. S. Glycerinum " " B. P.

炭匿酸抹膏 Unguentum Acidi Tannici, U. S.

火棉止血藥 Collodium Stypticum, U. S. 其功效俱在所含之炭匿酸。

炭匿酸肛彈 Suppositoria Acidi Tannici, B. P. 每彈內含此酸二厘。(0.2)

加沒酸 ACIDUM GALLICUM, 此藥大半由炭匿酸取出、結晶似針、冷水百分、或滾水二分、或醇酒四分半、皆能化藥一分。

體功效 此藥歸斂藥類、然無凝血之能、故身外流血症、敷之無甚功效、因有縮緊血脘之能、故身內流血症、服之或有功效。

祛 此藥藉腎而祛、仍不改其體質。

療效 尿血[1]、咳血[2]、盜汗[3]、及氣脘久炎[4]、致痰生過多[5]等症、用之有效、尿過多症[6]、與鴉片並用最妙、糖尿症[7]或因腎弱致患胎尿症[8]以及新久之瀉症[9]、服之俱效、瘍症[10]、與多生膿之瘡[11]、以加沒酸抹膏敷之、有效、外痔症[12]、以此膏與佛茄兒抹膏各半敷之、有效。

藥製與分劑

1 Hæmaturia
2 Hæmoptysis
3 Colliquative sweats
4 Chronic bronchitis
5 Bronchorrhœa
6 Diabetes insipidus
7 Diabetes mellitus
8 Albuminuria
9 Acute or chronic diarrhœa
10 Ulcers
11 Sores
12 External hemorrhoids

第十章　論斂藥類

炭匿酸 ACIDUM TANNICUM,

此藥自無食子取出、純而不雜、不能結晶、色淡黃、味酸、惟甘油與水能化之、醇酒伊打、俱不能化、各類植物之斂力、皆含此酸。

體功效　此藥敷於各類之膈、膈即縮緊、其血減少、蓋因血脂縮緊、故有阻生液之能、接此藥服之之後、必先變加泌酸、而後被味、祛時仍爲加泌酸、此理宜切記之、倘醫流血症、患處不能敷藥、莫如用加泌酸、因加泌酸被味尤速也。

療效　此藥之用有二、一能止血、二爲斂藥、虛弱之瀉症、服之有效、無論全身或一處、易於生汗[1]以及初產之乳頭痛、與腳氣等症、敷之有效、咳血[2]症宜用五至十厘、(0.3-0.6) 加水一量兩、(30.0) 置於噴霧具內噴之、有效、泗膜[3]虛弱或頑瘍[4]宜用二兩、(60.0) 加甘油八量兩、(240.0) 用煖化法化之、敷患處有效、流血痔[5]症、以此藥製成肛彈、大效、白帶[6]症、以絮蘸炭匿酸消水、塞於陰道、有效。

藥製與分劑

炭匿酸　Acidum Tannicum, U. S.　二至十厘 (0.12-0.6) 成丸服之最妙。

炭匿酸餅　Trochiscus Acidi Tannici,　美捺藥册、每餅內含此酸一厘、(0.06)

1 Sweating
2 Hæmoptysis
3 Depressed mucous membranes
4 Indolent ulcer
5 Bleeding hemorrhoids
6 Leucorrhœa

醋酸 Acidi acetici 一量兩 (30.0) —M.

S.—Apply with a camel's hair brush.

以筆蘸之、敷於患處。

尋常所用之醋、與淡醋酸相近、乳婦不宜多用、恐嬰孩有瀉腹之患、服過分劑者宜多用牛乳、或灰水鎂蒸等鹼藥類、以免育道受惹。

分四次服之方可、如因肝[1]經畧失功用、或腸泗膜發炎[2]致患癤症、此酸有效。

藥製與分劑

檸酸糖漿 Syrupus Acidi Citrici, U. S. 一至二量錢 (4.0-8.0)

檸檬汁 Succus Limonis, B. P. 半至二量兩 (15.0-60.0)

檸檬糖漿 Syrupus Limonis, B. P. 半至一量錢 (2.0-4.0)

醋酸 ACIDUM ACETICUM, 此藥由一類之木用烝法取出、臭之略甜、醫家所用者、乃無色之流質、每百量滴、(6.6) 內含冰醋酸三十六量滴、(2.36) 水六十四量滴、(4.25)

療效 此酸少用爲服劑、生胞藥類、冰醋酸 Acidum Aceticum Glaciale, 乃爲有力者、如以冰醋酸敷於瘊上、有祛之之能、若日久之瘡[3]肉芽過長敷於其上、有潰藥之功、淡醋酸 Acidum Aceticum Dilutum 可作洗藥、能醫盜汗[4]症、若輕流血[5]症或肺[6]患、以淡醋酸與水各半洗之、其血可止、嘔吐[7]症、每用布蘸熱醋酸嗅之、或可止其嘔吐、陰陽具生瘊[8]類、敷之有效、且不覺痛、其良方如左。

柳酸 R-Acidi salicylici 三十英厘 (2.0)

1 Hepatic inactivity
2 Catarrhal jaundice
3 Sores
4 Night-sweats
5 Minor hemorrhage
6 Epistaxis
7 Vomiting
8 Vegetations about genitals

菓酸 ACIDUM TARTARICUM, 此藥由鈸氫菓鬱取出、酸力無多、若服過分劑、必致腸胃發炎、宜服灰水鎂養等鹼藥類、吐藥類亦可用之、若甚疼痛、可用鴉片止之、此藥鮮有單用者、常與鈉氫碳强鬱、或鈸氫碳强鬱、製成自沸藥類、分劑五至二十厘 (0.3-1.3)

檸酸 ACID CITRICUM. 此酸大半由檸檬或香櫞取出、無色、透光、結晶、嗅之無味、嘗之味酸而美、如置於暖處、則外起白霜、置於潮處、則漸次融化、冷水半分、或醇酒一分半、或伊打十八分、俱能化藥一分、不但檸檬含有此酸、各類酸菓俱含之、用化法查驗、與檸檬汁同、而其效不同。

療效 此藥不但能豫防癆[1]症、且能醫之、然不如檸檬汁之效大、故檸檬若便、總宜取其汁、不必用此酸也、若欲存貯此汁、以便取用、其法、壓取寧檬之汁、置於火上滾之、乘熱灌入瓶內、然不可使瓶盈滿、以距瓶口半寸爲度、後以洋橄欖油、灌滿其瓶、以塞塞嚴、如此可免日久變壞之虞、如患腸熱症者、常食牛乳、因乳內多含鐵鬱、或致絡內結成血團、越二三日、可兼服此酸三次、每次五厘 (0.3) 則免此患、以其能敵乳內之鐵鬱也、倘服之過多、亦能令血成團、故不宜日日服之、無論新久痺[2]症、日服檸檬汁四次、每服一至二量兩 (30.0-60.0) 有效、但宜多以水送下、如檸檬汁不便、日以此酸二錢 (8.0) 亦

1 Scurvy
2 Acute or chronic rheumatism

淡氫藍酸 R-Acidi hydrocyanici dil. 六十量滴 (4.0)

洋郁李糖漿 Syr. Pruni virginianæ 三量兩 (90.0) —M.

每四五句鐘服一小勺。 S. Teaspoonful every four or five hours.

陰門癢[1]或他處作癢者、敷之有效、其良方如左。

鋞氯强塩 R. Hydrargyri chloridi corros, U. S. Hydrargyri perchloridi. B. P. 一英厘半 (0.09)

淡氫藍酸 Acidi hydrocyanici dil. 六十量滴 (4.0)

苦杏仁水 Aquæ amygdalæ amaræ 六量兩 (180.0) —M.

以布蘸藥敷患處、倘有忌用鋞氯强塩者、於此方內亦可去之。

S.—Poison. For external use. Apply to the itching surface with a small rag.

藥製與分劑

淡氫藍酸 Acidum Hydrocyanicum Dilutum. 一至五量滴 (0.06-0.3)

毒力 服毒分劑立時殞命者、先微瘈瘲、死後面紫、目瞪、齒齗、口出血沫、如所服之分劑、不至立時傾命、先覺呼吸甚難、心思不靈、心之舒縮遲緩、後即瘈瘲呼喊、瞳亦散大、知覺全無、嘔吐、遺尿、遺精、遺糞、迨面色發紫、全身癱瘓、則氣絕矣。

1 Pruritus vulvæ

氰藍酸 (ACIDUM HYDROCYANICUM)

第四十四圖



此圖表明禽獸中氰藍酸毒時、其呼吸如何、

I 乃尋常之呼吸、

II 乃甫受藥氣之呼吸、

III 乃大受藥氣之呼吸、

IV 呼吸停止、

此藥乃無色之流質、其氣易散、宜存於黑色瓶內、其塞必須嚴密、人微吸之、必至頭暈、若此氣不與空氣勻和、吸之立死、醫家只用淡氰藍酸、每百量滴、(6.6) 含此藥二量滴。(0.12)

體功效 毒藥類中、此藥爲最、蓋因其氣易散、於肺經被陳甚速、其正感乃行於呼吸絡二部之中、因其陳祛皆速、故服過分劑者、若能活至二十至三十分鐘、諒不至殞命、服毒分劑者、全身受毒、有癱瘓之狀、倘所服尤多、生命司所、倏爾停止。

療效 若因腦系致患胃系[1]痛、或嘔吐[2]者、此藥俱效、如胃[3]經受惹飲食下咽、即覺疼痛者、此藥有效、腸系[4]痛亦效、患乾嗽[5]症者、頗效、其良方如左。

1 Gastralgia
2 Nervous vomiting
3 Irritable stomach
4 Enteralgia
5 Irritable cough

毒力　服過分劑者、泗膜先受其痲力、後則痛如火燒、越片時痛即不覺、唇與指尖或全身皮膚、皆覺痲痛、形神倦怠、先則脉緩而微、後則速而難診、遍體生汗、或至暈仆、亦偶有嘔吐者、呼吸甚微、所吸之氣、謹保其不死而已、面白容戚、如不暈仆、至氣絕方無知覺、目之凸凹無常、眸白似珠、少有瘈瘲者、瞳或散大、或縮小、或如常、而無定式、身之熱度甚減、心於舒時停止、或驟然而停、或漸次而停、亦無常例。

解毒法　中此毒者、宜躺卧於牀、令其首略低於足、可使生命司所、於延腦內多得血之養育、且宜以煖身之法煖之、如中毒甚重、不當令其嘔吐、恐嘔吐時心即停止也、且其胃已甚受阻、雖服吐劑、恐亦無效、即或嘔吐、其首不宜離牀、當以布接其所吐者、宜用胃抽器洗其胃經、若形勢甚危、宜先射伊打於皮內、後則射酒、再後射毛地黃、蓋伊打之效甚速、其效未過、酒效亦顯、酒效未過、毛地黃之效即至、毛地黃乃此藥體功效之敵藥也、倘絡部仍受其阻、可以阿刀便射之、以其有激司絡腦所之能也、如呼吸將止、宜用代引呼吸之法、倘心經將停、可略嗅炆氣弱礬或效、然不宜多用、恐有阻心之患、亦可用士的年之足分劑、即一厘之二十分之一至十分之一、(0.003-0.006)射於皮內、以激其呼吸絡二部。

久用之、不但無益、反致有損、患瘧症、先有鼻涕者、初起時、服之有效、如因腦系失其功用、或心膈過長、致患心跳症、此藥有效、與毛地黃並用尤妙、因患此症者、心經少得腦系之功用、此藥能平心肌、兼阻毛地黃之激力太過也、良方如左。

草烏頭酒 R-Tincturæ Aconiti 二量錢 (8.0)
毛地黃酒 Tincturæ Digitalis 四十五量滴 (3.0)
顛茄酒 Tincturæ Belladonnæ 一量錢半 (6.0)
龍胆草雜酒 Tincturæ Gentian. Comp. 加至三量兩 (90.0) —M.
每六句鐘服一小勺、(4.0) S.—Teaspoonful every six hours.

藥製與分劑

草烏頭酒 Tincturæ Aconiti 一至五滴 (0.06-0.3) 每句鐘、服一次、若每刻鐘服一滴之四分之一 (0.015) 或二分之一、(0.03) 較日服足分劑三次、尤妙。

草烏頭膏 (Extractum Aconiti) 一厘之四分之一、至四分之三、(0.015-0.045)

草烏頭流膏 Fluidextractum Aconiti, U. S. 一至二量滴 (0.06-0.12)

乖效 人服此藥、有皮作癢、或生癌、或生皰者。

1 Palpitation

呼吸部　此藥之中分劑、有畧平呼吸之能、作燒時、其能尤顯、如服毒分劑、則呼吸司所被癱。

身熱度　此藥有令人生汗、並血運略緩之功、故作燒時服之、可減熱度。

陳　此藥被陳甚速、祛之亦速、但於身內爲氣所變者居多、服足分劑、其感能約可存三句鐘之久、凡服之者、尿則必多。

療效　此藥乃醫家通重之藥、其效他藥皆不能及、且於身內所成之效、與體功效所言者、無不相符、其正感、乃平絡部與覺系末也、如因孕吐[1]、或某處炎症、以致腦系受惹、血壓加增、此藥有平腦系、並減血壓之能、若各類新炎[2]症、初發時、服之有效、系痛[3]症、如系與皮膚相近、可以此藥二厘、(0.12) 脂六十厘 (4.0) 研勻、製成抹膏、敷之有效、血旺之鼽症、此藥常效、白濁[4]初患時、勤服小分劑、有效、如初程已過、亦可用之、以免莖舉硬痛[5]之患、因其有阻腦司所之能也、哮吼[6]、喉門[7]棚炎、喉痛[8]、傷風[9]、氣脘炎、受風之痿等[10]症、初患時服之有效、受風之經閉[11]症、與熱茶同服、並令其坐於熱水盆內、其經或可復至、心統膜[12]炎症、服之有平心之效、亦有退燒之功、健壯[13]之肺炎症、初發時、血壓之力必大、此藥能減之、孩童[14]之猛燒症、此藥有平腦絡二部之功、惟各類虛弱症忌用、倘於各類熱症、常

1 Vomiting of pregnancy
2 Acute inflammations
3 Neuralgia
4 Gonorrhœa
5 Chordee
6 Croup
7 Quinsy
8 Sore throat
9 Colds
10 Asthma
11 Suppression of menstruation
12 Pericarditis
13 Sthenic pneumonia
14 Sthenic fevers of children

其力之大小、乃在蛛之多寡、近代之醫家云、另有二蛛含於其內、但人尚未得其確據耳。

體功效　此藥敷於舌上、必覺痲熱、漸至滿口皆然、以其先有惹覺系末之力、後有痲覺系末之能也、此藥之力、顯於身內甚速、祛之亦速。

第四十三圖



此圖表明草烏頭能使脉緩、其故有二、一激顱臟腑系司所如A、一阻心肌如B、因司絡腦所被阻、故血壓減少如c、呼吸司所亦被阻如d

腦系部　服足分劑者、覺知司所、與脊腦覺徑、均受其阻、然其正感、乃阻覺系之末、若敷於泗膜、該處必覺痲木、因其惹力過大、不可用爲眼科之痲藥、足分劑、無感脊腦動徑之能、毒分劑、則脊腦動徑、與其動系末俱被癱。

絡部　服中分劑者、惟絡部大受其感、脉即略緩、蓋因顱臟腑系之司所被激、亦因心肌受阻也、心肌既受其阻、故血壓畧減、如用足分劑、脉尤緩而微、血壓更顯減少、乃因司絡腦所受阻也、服毒分劑、脉則甚緩、血壓甚微、漸次加重、心於舒時停止。

狀如痙症、與癇症不同、癡瘂甫過、即成癱患。

絡部　服毒分劑者、其心之舒縮、必緩而微、終於縮時停止。

呼吸部　此藥能癱呼吸司所、令人殞命。

療效　此藥乃歸敷藥類、常製成抹膏、Unguentum Veratrinæ, 用之於肌痺[1]痺節[2][3]系痛等症、又有韋拉抵印油謬、Oleatum Veratrinæ, U. S. 此油謬有毒力、用時宜加謹愼。

辣菜根 ARNICA, U. S. ARNICÆ RHIZOMA, B. P. 此藥係一類之草、產於歐洲美國等處、入藥者、乃該草之花與根。

體功效　此藥敷於皮薄處、必覺發熱、並有惹力、重者色似漆咬、服之者、脉則略緩、血壓亦增、服毒分劑、則脉緩而微。

藥製與分劑

辣菜花酒 Tinctura Arnicæ, 十五至三十量滴、(0.1-2.0) 此藥少有用爲服劑者、可服者惟此酒。

辣菜貼膏 (Emplastrum Arnicæ) 此膏有止痛之功、跌打等傷、敷此藥之酒有效。

草烏頭 ACONITUM, 此藥亦係草類、產於歐洲印度中華美國等處、入藥者乃該草之根、

1 Muscular rheumatism
2 Rheumatic joints
3 Neuralgia

藜蘆酒 Tinctura Veratri, U. S. 五至二十量滴、(0.3-1.3) 乃此藥製之最美者、

藜蘆流膏 Fluidextractum Veratri, U. S. 一至二量滴、(0.06-0.2)

健壯者、患各類新積血症、每半句鐘、或一句鐘、當服藜蘆流膏一量滴、(0.06) 過二句鐘、皮如濕而鬆、脉畧緩而平、或略有惡心、是此藥之效已顯、則當止服、如病勢沉重、多用一二劑亦可、倘服之者、藥效未顯、再服時、宜防其嘔吐、須於前一刻鐘、服鴉片酒五至十量滴、(0.3-0.6) 可免此患。

禁用之狀 凡虛弱症、並腹統膜炎、與胃炎等症、如有嘔吐者忌用。

毒力 此爲最毒之藥、然服毒分劑、少有殞命者、蓋因其毒未盡被喋、必有嘔吐以祛之也、令人嘔吐之故有二、一因非拉特丁、原有此力、二因內含一類之楠、有令人嘔吐之力、中毒者、宜用阿刀便類之激心藥、以敵之、並宜煖其身、令其頭略低於足、亦可用士的年、以激其呼吸絡二部也。

韋拉抵印 VERATRINA. 此藥乃阿撒憂草子之旋、其質細粉、其色銀灰、嗅之令人生嚏、過數句鐘方止。

體功效 此藥於顱腦少有感能、其正感乃行於脊腦與志肌之中、服過分劑、令人瘈瘲

癱、心即停止矣、其正感乃行於司絡腦所之中。○非拉特丁、較直分多有惹力、如服過分劑、則必嘔瀉、肌亦畧有抽搐與痿瘓之患、然不似直分之甚。○藜蘆能阻心肌、並感顱臟腑系、故令脉緩、因其能阻心肌、並阻司絡腦所、故令血壓減少。

療效　藜蘆之正用、乃醫初燒[1]症、若久燒與身弱者禁用、凡肺炎[2]、胸統膜炎[3]、肝炎[4]、腹統膜炎[5]、腦炎等症、如用之於初積血時、甚效、倘積血之時已過、則無益而有損、腦炎、腹統膜炎二症、多有嘔吐之患、如用之、宜加謹愼、因此藥畧能使人嘔吐也、患腹統膜炎者、其嘔吐之勢、多令統膜動宕、恐此藥更增其人之病也、故用草烏頭較妙、按藜蘆能令血腔鬆大、故凡有積血者服之、其效與放血同、若遇宜放血之症、用之亦可、產後熱症[6]多有醫者以之爲妙劑、然宜謹愼用之、產瘓[7]瘓多有以之爲上品者、但須用足分劑、即藜蘆流膏二十至三十量滴、(1.3-2.0)射於皮內、射後每二刻鐘、服五量滴、(0.3)至脉如常爲止、緣其有阻脊腦動徑之效也、但當謹愼用之、以免絡部過於受阻、健壯者、或患心胸過長或鬱心[10]等症、此藥有效、血囊[11]症、如血運不週、並血壓之力過大者、用之尤宜謹愼、以防血囊崩裂之險。

藥製與分劑

1 Acute inflammation
2 Pneumonia
3 Pleurisy
4 Hepatitis
5 Peritonitis
6 Cerebritis
7 Puerperal fever
8 Puerperal eclampsia
9 Cardiac hypertrophy
10 Irritable heart
11 Aneurism

不顯、呼吸極微而短、呼吸之有無、他人不易知也、全身之水、幾至瀉盡、以致腓肌轉筋、熱度漸減、因而殞命、其形與患癘症者毫無差別、當癘症流行之時、若中此毒、倘不用化法、或顯微鏡無能辨之者、如有所疑、當用以上之法試之、亦或有五臟變壞爲脂者。

解毒法　中此毒者、當多服炭匿酸、如此酸不便、多飲濃茶亦可、並用胃抽器抽之、最要者、無論何故、不可使之起牀、頭亦不可離枕、當令其頭畧低於足、宜服毛地黃與酒之足分劑、並當煖其身、呼吸如不甚微、當射莫非於皮內、以止其痛、並平其育道、形勢如甚危急、莫非禁用、若必須用之、當與士的年同射、蓋莫非有阻呼吸司所之力、士的年能敵之也。

藜蘆 VERATRUM, U. S. 此藥係一類之草、產於北亞美利加、入藥者、乃該草之根、味苦而辛、內含數甌、最要者有二、一名直分、(Jervina) 一名非拉特丁、(Veratroidina) 本藥用於成人、以阻絡部、最爲穩妙。

體功效　欲論本藥之體功效、宜先明二甌之體功效、試以直分之毫分劑、用於獸類、肌則無力、行動甚緩、厥後肌畧抽搐、狀如癎症、隨即仆倒、流涎不止、越片時、即成癱瘓、至死方無知覺、以腸胃未受其惹、故不嘔瀉、絡部甚受其阻、故脉緩而微、後呼吸司所被

銨鈲菓葡酒 Vinum Antimonii U. S. Vinum Antimoniale, B. P. 十五至三十量滴 (1.0-2.0) 乃常用之劑、二至四量錢、(8.0-16.0) 爲嘔吐之劑、每量兩 (30.0) 內含此藥二厘、(01.2)

銨鈲菓雜丸 (Pilulæ Antimonii Compositæ) 一至三丸、有改症之功、每丸內有銨硫粉半厘、(0.03) 鉥氯弱塩半厘、(0.03) 怪阿克一厘、(0.06)

銨鈲菓抹膏 (Unguentum Antimonii Tartarati) 此抹膏有外惹內效之功、用時攤於布上貼之、

銨散 Pulvis Antimonialis, B. P. 三至十厘、(0.2-0.6) 成丸服之、痺熱等症、可爲退熱之劑、內含銨弱羹、鎉硫强礬等藥。

海葱雜糖漿 Syrupus Scillæ Compositus, U. S. 二十至三十量滴、(1.3-2.0) 爲成人平絡之劑、三十至六十量滴、(2.0-4.0) 爲孩童嘔吐之劑、每量兩、(30.0) 內有此藥一厘之四分之一、(0.045)

毒力 服毒分劑者、脉畧緩而微、皮濕而鬆、全身無力、且惡心過甚、胃經不安、越片時即有極重之嘔吐、所吐者、初則食物、後則泗液、膽液、或血等物、當時必兼瀉腹、所瀉者先則腸內所積之物、後則泗液膽液、或血等物、此勢既過、或有忽然而過者 則所瀉者、形如米湯、凡中毒者、必有如此之瀉、至此面目青瘦、並生冷汗、脉速於梭、診之似無、血壓之力幾乎

療效 此藥之用不一、常用以平絡部、近世醫者、多以他藥代之、如强健[1]之人偶患炎症、脉速而有力者、服之大效、身體虛弱者忌用、如防傷風[2]服中分劑有效、健壯者氣腔炎症、此藥可以祛痰、用足分劑令其嘔吐、亦效、或服小分劑、即每句鐘服一厘之六十分之一、(0.001) 或以半厘、(0.03) 加於四量兩 (120.0) 水內、每句鐘服一小勺 (4.0) 亦可、此分劑、孩童用之最妙、且因其無味、亦不令其嘔吐也、孩童育道泗膜新炎、而無重燒者、服此分劑、每立見效。按此藥爲緩而有力之吐藥、因其見效不速、故中他藥之毒者、不可用爲吐藥、如胃經受惹、或腎經有重症者、服之無益而有損、倘服足分劑、仍不嘔吐者、不可再服、免中其毒、當以他類吐藥代之、或用胃抽器抽之、中分劑之力、或不足令人嘔吐、此藥必存於胃中、致中其毒、若用之爲吐藥、宜用足分劑、如用爲外惹內效之藥、宜製成抹膏用之、敷於痼症尤妙、如敷於骨節久炎[5]、或癰症之頸、皆效、此藥有發表之能、常有惡心瀉腹等乖效、故近日多以他藥代之。

藥製與分劑

銻鉀菓礬 Antimonii et Potassii Tartras, U. S. Antimonium Tartaratum, B. P. 一厘之二十分之一、至十分之一、(0.003-0.006) 爲平絡之劑、半至一厘、(0.03-0.06) 爲嘔吐之劑、

1 Sthenic inflammation
2 Colds
3 Sthenic bronchitis
4 Acute catarrh of alimentary tract
5 Chronic enlargement of joints
6 Epilepsy

爲時畧長、先則發紅、後成小皰、漸次成瘡、難於收口。

第四十二圖



此圖表明銻激嘔吐司所如A、且惹胃中之系、亦令人嘔吐如B、

絡部 此藥之正感、乃行於絡部、小分劑、令脉漸緩、蓋因心肌被阻也、且令血壓減少、蓋因司絡腦系於血腔內受阻也、或言司絡腦所亦同受阻、但無確據耳、服毒分劑者、絡與呼吸二部、甚受其阻、以至殞命、如速用毛地黃大效、因其有敵此藥之力也。

呼吸部 若不用毒分劑、於此部則無感能、如用之、則令人殞命、其故有三、一因呼吸司所於延腦中受阻、以致呼吸停止、二因心經虛弱、以致肺有積血、三因氣腔泗膜受惹、致令生痰過多、吐之無力、以至殞命、與溺死者無異。

胃道 此藥大有惹胃道之力、足分劑、可爲緩而有力之吐劑、其能令人嘔吐者、乃因其感胃經、並延腦中之嘔吐司所、故此藥爲感腦系首末之吐藥也、但服之者、惡心過甚、過分劑、則有水瀉疼痛等患。

祛 此藥藉各液而祛、由大便而祛者居多。

第九章 論阻心藥類

銻 (ANTIMONY)

此係金類原質、最難消化、故少入藥用、所常用者、乃銻鉀菓鬱 Antimonii et Antimonii 或純銻硫弱洽 Antimonium Nigrum Purificatum, B. P. 銻硫粉 Antimonium Sulphuratum, B. P. 銻弱養等類。 Antimonii Oxidum, B. P.

Potassii Tartras. U. S. Tartaratum B. P.

銻鉀菓鬱 ANTIMONII ET POTASSII TARTRAS, U. S. ANTIMONIUM TARTARATUM, B. P.

此藥乃以銻弱養與鉀輕菓鬱、加水煮之而成、結晶、遇空氣則成細粉、醇酒不能化、淡酒畧化、冷水能化、滾水尤能化、與酸鹼二類不符、故不可並用、若與炭匿酸相合、即成一難消化之藥、故炭匿酸、乃解此毒最效之藥也。

第四十一圖



此圖表明銻、阻心肌如A、阻遲中之肌如B、或阻延腦中司絡腦所如C、亦阻呼吸司所如D、

體功效 此藥置於泗膜上、則該處覺熱、爲時畧長、必顯有發炎之勢、如敷於皮薄處、則必受惹、

阿大那典 Adonidina 一厘之八分之一、至四分之一、(0.008-0.015)日服三次、

阿大那冲藥 (Infusum Adonidinæ) 半量兩、(15.0)乃此草四至八分、加水一百八十分泡成、日服三次。

顫癱[1]症、用金雀印一厘之四分之一、至二分之一、(0.015-0.03)日服三次、有效、心症之疎腫[2]、用金雀花梢半英兩、(15.0)加水十六量兩、(480.0)煎成八兩、(240.0)每三句鐘服一量兩、(30.0)乃爲妙劑。

藥製與分劑

金雀花汁 Succus Scoparii B. P. 二十量滴 (1.3)

金雀花冲藥 Infusum Scoparii B. P. 一至二量錢、(4.0-8.0)

毒力 中此毒者、失和動之功、四肢發顫、且有抽搐或痙攣者、後則腦系部受阻、以致全身疲憊。

阿大那 (ADONIS VERNALIS.)

此藥係一類之草、產於歐亞二洲、內含一葡糖鬱類、名阿大那典。

阿大那典 (ADONIDIN)

惟此可入藥用、其功用乃醫各類心虛症[3]、如因心症之疎腫[4]、此藥爲合宜之品、然其力不敵毛地黃、與加非印、如用毛地黃加非印而無效者、用此或可見效、近數年有與鉄鹽並用、以醫癲[5]症者、自謂有效。

藥製與分劑

1 Paralysis agitans
2 Cardiac dropsy
3 Cardiac weakness
4 Cardiac dropsy
5 Epilepsy

三次、有醫者云、每日宜服一次、免有積效之患。

金雀花 SCOPARIUS, U. S. SCOPARII CACUMINA, E. P. 此花產於英美中等國、入藥者乃其嫩枝、內含二鹼、一名俗革仁、一名金雀印、惟金雀印入藥用。

體功效 此藥之功效、多在金雀印、故此藥之體功效、亦金雀印之體功效也。

腦系部 用過分劑、顱腦與脊腦必甚受阻、其感能多行於動徑之中、因此感應之能與動能、必皆減少、久則必癱、中此毒之形勢、人畜相同、其心必皆於縮時停止。

絡部 此藥有激絡部之能、服中分劑者、血壓與脈力俱增、顫之縮力尤大、用過分劑、此部必受其阻。

呼吸部 中分劑、無感此部之能、毒分劑、則呼吸司所被癱、以致殞命。

療效 有醫者云、凡毛地黃所能醫之心症、金雀印亦能醫之、然亦有心症用毛地黃無效、用金雀印或有效者、用過此藥之人、謂脈亂行[1]與心跳[2]等症、有效、猶有醫者謂於突[3]眼症、並各類血運不週之症、有效、多有醫者謂此藥爲無甚緊要之品、不屑用之、然用其同類者無效、仍當試用此藥耳、因金雀印之力不同、故有只用一厘之二十分之一(0.003)者、亦有用二至四厘(0.1-0.25)者、如初用時、小分劑無效、漸次加增可也、有醫者謂、

1 Arrhythmia
2 Palpitation
3 Exophthalmos

藥製與分劑

加非印 Caffeina 二至五厘、(0.12-0.3)

加非印檸檬 Caffeina Citrata, U. S. Caffeinæ Citras, B. P. 二至五厘、(0.12-0.3)

沸加非印檸檬 Caffeina Citrata Effervescens, U. S. Caffeinæ Citras Effervescens, B. P. 六十厘、(4.0)

乖效 患心症者服之、或有不寐之患、重則當止而勿服、不然或致酒狂之狀、服過分劑者、因腎內血管抽搐、尿或減少、曾親見一人日服三次、每次二厘、(0.12)竟有作燒之患、實可奇也、久用加非者、或有不寐、微顫、心跳、耳鳴、胃系痛、面黃、肌瘦等患、但罕有之。

洋鈴蘭 CONVALLARIA, U. S. 此乃一類之花、產於美俄中等國、入藥者係該花之根、與毛地黃同爲補心之劑、但其力不敵毛地黃、而其功效或大於毛地黃、脉亂行症、此藥有效、但使脉緩之力無多。

藥製與分劑

洋鈴蘭流膏 Fluidextractum Convallariæ, U. S. 四至八量滴、(0.25-0.5)日服三次、

洋鈴蘭酒 (Tinctura Convallariæ) 五至二十量滴、(0.3-1.3)

洋鈴蘭精 (Convallamarina) 此精係葡糖糖類、每服半厘、(0-03)日服

1Arrhythmia

定理、因其有感呼吸之能、故中鴉片毒者、服之大效、或服濃加非、或射於肛內亦可、其輔效有二、一令人警醒、二增身熱度、痙症將發時、服濃加非一盃、或能醫之、過用腦力之頭痛、與安替派林鉄氮塩並用、大效、有時用經烤之加非豆、以作引藥、若免腐避臭之藥不便、可用經烤之加非末代之、按此藥不可用爲射藥、因入水改其體質也、如必射之、可用左方。

鈉柳謈	R-Sodii salicyl.	三十分
加非印	Caffeinæ	四十分
烝水	Aquæ destillat.	六十分

又方

鈉安息香謈	R-Sodii benzoat.	四十五英厘 (3.0)
加非印	Caffeinæ	三十英厘 (2.0)
烝水	Aquæ destillat.	七十五量滴 (5.0)

用時以火熱之、每次射十量滴、(0.6)

1 Opium poisoning
2 Asthma
3 Headache

宜切記。

絡部　此藥有增血壓之能、故昔人謂其有感心之力、今經多人察明、言其只能感腦、由腦感心耳。

呼吸部　此藥大有感呼吸司所之能。

腎經　此藥能使腎微脬舒鬆、故有利小便之功、其效易顯於腎球、並感於腎司祛膚、故尿中所含之尿脞基、與水類較多。

第四十圖



此圖表明加非印使腎球之血脬舒鬆如A、且激腎微脬之司祛膚如B、

腑廢　此藥有阻腑廢之力。

祛　此藥於身內被氯改變體質。

療效　此藥不但爲感心補心之上品、且有感腎之能、無論心痟[1]腫、或腎痟腫[2]症、服之大效、故有舍毛地黃、而專用此藥者也、腎新炎症忌用、蓋新炎處不可用感之之藥、此爲

1 Cardiac dropsy
2 Renal dropsy

續過於受感、心竭之血不盡入續之故、服毛地黃如顯乖效者、此藥大效、因心病而患疝症者有效、因大有感心之能、少有感腎之力也。

藥製與分劑

康畀箭毒酒 Tinctura Strophanthi, 五至十五量滴、(0.30-1.0) 日服三次、

康畀箭毒膏 Extractum Strophanthi, B. P. 一厘之四分之一、(0.015)

康畀箭毒精 Strophanthinum, U. S. 一厘之一百五十分之一、至五十分之一、(0.0004-0.0012) 射於皮內、其效可存七日之久、究無定評。

乖效 此藥之足分劑、或令人瀉腹。

加非印 CAFFEINA,

此藥係加非豆所含之鹼、並含一類之油、斯油無體功效、不易消化、飲之者或有食滯之患、如不在飯時、其患尤甚、人所常飲者乃加非、入藥者即加非印、與加非印檸檬酸 Caffeina Citrata, U. S. Caffeinæ Citras, B. P. 更有沸加非印檸檬酸。Caffeina Citrata Effervescens, U. S. Caffeina Citras Effervescens, B. P.

體功效 腦系部 此藥之正感、行於顱腦脊腦之中甚速、惟其感於顱腦、故助人心思之敏、惟其感於脊腦、故增人感應之能、是以人謂多用加非、易成悸患、按加非只有感腦之力、毫無脊腦之能、常以加非感腦者、必致減食、其人之腦卒致失其功用、醫者最

數日而殞命者、亦有不足二句鐘而殞命者。

解毒法　中此毒者、宜服炭匿酸、因其爲化學中之敵藥、亦當服草烏頭、因其乃體功效之敵藥、如此毒未嘔、宜服吐劑、並用胃抽器抽之、如心經受毒已甚、吐劑有險、宜以煖身之法煖之、最要者、乃煖其腹、此毒祛後、宜躺卧數日、曾有人以爲無患、如常起坐、倏爾殞命。

康畀箭毒 STROPHANTHUS, U. S. STROPHANTHI SEMINA, B. P.　此藥乃亞非利加一類生蔓之樹、入藥者即此樹之子、苗人塗此子於箭鏃、用以射獵、故名箭毒、內含一精、名康畀箭毒精、昔人論此藥有痲效、今已查明、此效只顯於禽獸。

體功效　此藥之正感、乃行於心肌與心結、於顱臟腑系毫無感能、不似毛地黃令人脉緩、血壓加增、按此藥不感司絡腦所、乃感心肌而增其力、故其正用、乃醫心經虛弱、致脉脗抽搐之症、因其增血壓之力無多也。

療效　此藥於各類心症、可代毛地黃之用、但其力較小、十二歲以下之孩童、服之常效、此等孩童、若服毛地黃、易見乖效、雖胃經不甚受惹、然腦系被激、易於動怒、且有氣促皮紫等患、血壓大而心虛弱者、服之較毛地黃尤妙、蓋其無增血壓之力也、成人因心

顯。

禁用之狀　血腔變壞至甚、或血囊、中瘋等症、服之甚爲有險、因其有加增血壓之力也、心肌變脂、其未變之肌絲雖受其感、但此藥有加血壓之力、心之功用亦必加增、以致過用其力、愈爲衰弱、此爲禁用之狀耳。

乖效　此藥能惹胃經、令人嘔吐、與消化之功有妨、孩童服之、脉易不穩、用足分劑時、宜常躺卧、不可驟然而起、免致暈仆、便溺亦不可起牀、曾有起牀便溺者、倏爾暈仆、以致殞命、此藥祛之甚遲、服之或遇積效者、其人忽有中毒之形狀、即如患疝腫者、服之日久、若與之放疝、則易成積效之患、醫者云、未放疝之先、此藥不全被噉、尚有存於身內者、及放疝後、腹中之血腔不被疝壓、藥力忽然被噉、其人受感太過、以至如此、患熱症者、服此藥至燒退時、或亦有遇此患者、常服足分劑者、不俟其祛盡、即又服之、則必遇此患、總之有積效之前、其人之尿必較常減少、若遇如此景況、宜止而不服、或少服之。

毒力　服毒分劑者、其脉先緩而有力、後則不勻而雙浪、又後甚速如梭、試聽其心之跳動、甚爲有力、躺卧時、脉或緩而有力、坐起時、則驟然不勻、過時不久、多有嘔吐之患、亦有突暗之形、甚肝各見藍色、然靈性知覺、至氣絕方止、且每令人有甚重之額痛、或有

酒並用有效、按此藥之功效最緩、而藥力之存時最長、故初服之而見效者、後每日只服一二次即可。

藥製與分劑

毛地黃酒 Tinctura Digitalis, 五至三十量滴、(0.3-2.0)

毛地黃冲藥 Infusum Digitalis, 六十量滴至半量兩、(4.0-15.0)

毛地黃流膏 Fluidextractum Digitalis, U. S. 一至四量滴、(0.06-0.25)

毛地黃膏 Extractum Digitalis, U. S. 一厘之四分之一、(0.015)

毛地黃葉 Digitalis Folia, B. P. 一至四厘、(0.06-0.25)常製丸用之、

毛地黃瘋、有易化於水者、有易化於酒者、因其效不同、故其製亦不同、心虛弱症、毛地黃酒、或流膏最妙、利小便者、乃毛地黃冲藥、此冲藥較毛地黃酒與流膏、多有惹胃之患、如人不能服之、可將其瘋名狄吉塔雷印者、射於皮內有效、若射以他類之瘋、則改其質、而無效矣、或將此藥之葉、盛於布袋中、浸於滾水內、製成糊藥、敷於腰際、則有激心之效、然宜謹慎用之、蓋此藥被喫、遲速無從預知、恐有中毒之患也、此藥常用於緊要之症、故醫家須用藥局中已試驗者、有病者久用無效、及改用已試驗者、其功效立

藥者、速而不穩之脉、變成緩脉、故絡部受其阻、然論此藥之功用、實有感絡部之能、而令速而不穩之脉變爲緩脉者、非因力微、乃因力增也、按此藥之體功效、必有阻心之能、究其所以阻心者、乃因人已中毒耳、凡血運不週之心症、此藥有效、若心膈過長、無論因何而致者、其心若能運血如常、此藥不但無益、反至有損、總脉門扇血廻流之患、此藥不爲甚妙、因其能使心舒之時較長、致血多廻流蟄中故也、若已日久、致兩扇門俱有血廻流之患、則大有功效、然每有兩扇門有血廻流、服此藥無益而有損者、蓋蟄受感過甚、縮力大而且長、雖多有血入總脉腔、亦必多有血廻流入盌、故盌有餘脹之勢、但未服藥之前、此患則無從知之、鬱心症而心跳者、非因飲食不化、此藥大效、心鬆大症亦效、肺炎症之中程、而心運血之力不足者、亦大有效、重熱症、用小分劑補心亦可、若此症有肺經積血之患、亦有催血之能、如熱度過大、則無甚功效、凡因腦力脫失、或受傷中毒、腦力猝衰、而致心虛弱症、用之俱效、中草烏頭之毒者、此藥乃其體功效之敵藥、如病勢甚險、務當先服鍮汝消水、與伯蘭地、因此藥不能立見功效也、中菌類之毒者、此藥乃其敵藥、亦爲利小便之劑、若心運血之力不足、以致血積腎經、大有功效、如腎兼有他症、不可專用此藥、當與海葱、或加非印同服、方可、腎久炎症、與杜松雜

1 Cardiac weakness
2 Irritable heart
3 Palpitation
4 Cardiac dilatation
5 Second stage of pneumonia
6 Exhausting fevers
7 Congestion of the lungs
8 Collapse
9 Injury
10 Poisoning
11 Shock
12 Aconite poisoning
13 Muscarine poisoning
14 Congestion of kidneys
15 Chronic kidney disease

肌放鬆、或謂心跳動甚速、諒必顱臟腑系受阻也、如將其人驟然扶起、當時或即殞命、蓋心之縮力已盡、若驟然而起、心多因之停止矣。

呼吸部　尋常之分劑、與此部無效、過分劑則阻之。

身熱度　尋常之分劑、與熱度無關、用過分劑、則熱度減少、患熱症者服之、則熱度暑減、然少有用之爲退熱劑者、人作燒時、此藥不能使脉緩如常、因作燒時、顱臟腑系之司所、於延腦中受阻、或顱臟腑系之末兼受其阻、此藥故無感之之能耳、此係療效中最要之理也。

腎經　此藥於腎經無甚感能、心症之疥腫、服之有利小便之功、非因其有感腎之能、乃因絡部受阻、血壓加增、將腎內所積之血催出、則腎經之功用復原矣、若服過分劑、有時因腎經血腔抽搐、致有尿閉之患、此患之後、常有積效之虞、醫者當切記之。

祛　此藥由何經而祛、人不得而知、化學家於服者之尿中、亦未能得其確據、諒於身內改其體質耳。

療效　此藥有感絡部之能、亦有謂其有阻絡部之能者、惜乎所論有未盡耳、所謂有感能者、以服此藥血壓加增、心力之舒縮較大、故絡部受其感、所謂有阻能者、因視服此

第三十九圖



此圖表明毛地黃激絡部之功、

I 係未用毛地黃之先、血壓之至數爲八十六、

II 係已用毛地黃之後、血壓之至數爲一百五十、

III 係用毛地黃、血壓之至數爲一百六十四、

VI 係仍用毛地黃、血壓之至數爲二百一十、

II III 脉浪較常爲大、IV 因用藥太過、雖血壓加增、而脉浪較小、

勻、或甚速、而血壓必微、其故有二、一因心經失其功用、二因司絡腦所受阻、故血脘之然者、昔者有人謂此藥不但有感心之能、且有補心之力、如實有感司育系之效、是有雙功矣、服過分劑者、心之跳動不勻、脉顯雙浪、夫不勻者、人尙不知其所以然、然實非因心之縮力不足也、蓋心縮時、其力過於尋常、諒必因心肌和動之功受擾亂之故耳、亦有心之跳動甚速者、但無論其心之跳動不

者較野外自生者力小、英德二國所產者、較美國者力大、用者當於著名藥行、購其曾經試驗者方妥。

體功效 如胃泗膜畧受惹者、此藥不宜服、以其有加增此患之力也、若病勢甚危、胃經雖畧受惹、亦不得不服。

腦部 此藥若不用過分劑、於此部無感能。

絡部 此藥之正感、乃行於絡部、若用中分劑、則脉與血壓之力必增、且使脉緩、而脉浪加大、其脉力加增者、乃因心結與心肌受感也、血壓加增者、乃因脉力與脉浪加增、並因司絡腦所與血腔之肌受感、脉腔縮小也、脉緩者、乃因顱臟腑系之首末受感也、脉浪加大者、乃因顱臟腑系受感也、此系受感時、心舒而大、舒時亦長、心蟌血滿、故縮時脉浪較常爲大、其顱臟腑系、果爲心之司育系否、醫家固未敢定、然於形迹觀之、多有以爲

第十八圖



此圖表明毛地黃激心經如A、激顱臟腑系之司所如B、激顱臟腑系之末如C、激司絡腦所如D、激血腔之肌如E

受此二毒者、靈性無甚差別、惟有一法、乃查其尿含鴉片與否、則知其所中爲何毒矣。受酒毒與中瘋者之別、列表如左。

中酒毒者	中瘋者
一 脉速而易壓	一 脉多半緩而有力
二 皮潮而鬆	二 皮熱而乾
三 身之熱度減少	三 身之熱度加增
四 二瞳多半散大而大小相同	四 二瞳大小不同
五 無偏癱之狀	五 有偏癱之狀
六 睡不甚鼾氣不偏出	六 睡甚鼾而氣偏出
七 面無癱處	七 面有癱處
八 知覺未必全無	八 知覺全無

聞人口內有酒氣、不可即謂之非中瘋、或因飲酒令其顱腦中之血脘崩裂、亦致中瘋也。

毛地黃 DIGITALIS, U. S. DIGITALIS FOLIA, B. P.

此藥乃一類草葉、產於歐州美國等處、必經年者方入藥用、內含數種、若分而用之、俱與本藥之效不同、用時必選有效者、蓋此藥之力不等、自種

人飲酒至成癮時、肺經最易發炎、乃因心之右衄、不能如常運血也、醫者宜切記之。

毒力　中酒毒者、若靈性無知、肌肉無力、絡與呼吸部漸次微弱、當以毛地黃與士的年、射於皮內、並用煖身之法煖之、若身生冷汗、再服顛茄、以激其司絡腦所、有效、若腦顯病狀、可用外惹內效之藥、敷於頸上、俟其酒毒畧散、再用錘醋礬消水與辣類、激其胃經、蓋令其思食也、如胃經有發炎之勢、此二藥忌用、服平胃之藥方可、如醉者嘔吐不止、當食冰塊、或服草烏頭、寇卡印之微分劑、與衣必格等藥、並以外惹內效之藥敷於腹上、大便稍覺滯塞者、當服渣笠散四十厘、(2.6) 或伊拉替印一厘之八分之一 (0.008) 以瀉之、如欲輕瀉、先服銶鎎弱塩足分劑、後服鎂硫强礬、若早晨嘔吐、服鉄砒礬消水每效。

中酒與受鴉片之毒者、不易分辨、特將不同之狀列表於左。

中酒毒者	
一	瞳散大或如常
二	呼吸與尋常所差無多脉先速後微
三	面或發白
四	皮凉或發汗
五	脉速先有力而後微

中鴉片毒者	
一	瞳縮小
二	呼吸緩而有力脉亦然
三	面瘇而紫
四	皮較煖
五	脉緩而有力至死方微

飲酒者若胃經無消化之力、良方如左、

辣椒脂柄 R-Oleoresin. Capsici	十量滴	(0.60)
丁香油 Olei Caryophylli	十量滴	(0.60)
鉀鹽弱鹽 Hydrargyri chloridi Mit Hydrargyri Subchloridi	二十英厘	(1.30)
阿羅 Aloes	四十英厘	(2.60)

共成二十丸、每飯後服一丸。

若不令其瀉腹、當加鎂硫强鬱少許。

酒痼症、與癲癇症、有時不易分別、特將其不同之狀列表如左。

酒痼症	癲癇症
一 昏譫之時不長	一 昏譫之時較長
二 昏譫之狀無定	二 昏譫時必有高徼之狀
三 所見之像必甚兇惡	三 所見之像皆係快心之事
四 頭臂發顫	四 他處亦有發顫者
五 飲酒卽無顫患	五 飲酒顫患尤甚
六 飲酒昏譫暫愈或見輕	六 飲酒昏譫尤甚
七 顫患多在早晨	七 顫患無定時

其效尤妙、但宜加冷水或熱水、服之方可、若病者胃經失其功用、服乳汁葡酒、最爲合宜、以其易於消化也、自沸葡酒、必不含糖質者、乃可用、腎久炎症、荷蘭酒可服之、癆症或熱症後之無力者、畀兒酒可服、乳婦服之亦可。

禁用之狀　凡腦受激症、非因用力太過者忌用、各類之新炎症亦忌用、酒癮已斷、或酒癮未斷、以及中瘋、腦衣炎、腎新炎、血囊、脉變壞至甚者、皆忌用。

中癮　中酒癮者、身內必有損傷、蓋酒自胃先至於肝、與匯孟血相離、故肝受其毒、因而變硬、胃則大受其阻、身則少得養育、心才亦常覺昏迷、或令系炎致成癱瘓者、亦有與失和動相似者。

戒法　戒癮之法有二、一令其居於密室、立時斷之、二令其居於密室、遞減其飲、漸次斷之、此法較妙、總之不容病者設法得酒、亦不容其與人來往、並使妥實之人服役之、如此設法、似甚完全、然猶宜日查其室內、一切器用、以防其竊飲、倘防守稍疎、必歸徒勞、戒後身體必覺無力、當食肉湯、或他類易消化之物、並當食辣物、激發胃經、如身甚虛弱、可服莫非、或寇卡印少許、但不可常用、恐其中癮、酥酪乃養人之物、戒癮者食之最宜。

強葡酒 (Vinum Portense) 又名破透酒、其製法與葡酒同、作成後內加酵酒、以增其力。每百分內含酵酒三十分、亦係葡酒類。

庫厘酒 Vinum Xericum, B. P. 乃以大麥緩釀成糖、後取其汁而成酒、但不用烝法、每百分內含酵酒四至六分。

畀兒酒 (Beer)

破特酒 (Porter) 與畀兒酒同類、但製時將大麥烤煳、故較畀兒酒色深。

伯蘭地雜酒 Mistura Spiritus Vini Gallici, B. P. 製法乃以卵黃二枚、加白糖半兩、(16.0) 調和後、再加伯蘭地、與洋桂水各四量兩、(120-0) 即成、服之有養育之功。

服法 伯蘭地或穀烝酒、多爲激絡部之用、用時當審其病狀、譬如暈仆者、必須立使見瘉、宜以熱酒加水少許服之、則被噴甚速、如欲其效尤速、當射於皮內、若欲激發胃經、以助其身力、宜與飯同用、並多以水、或用乳酒、(即酒與乳合成者) 或卵乳酒和之、但卵乳酒消化較難、成人之腸熱症、每三四句鐘、可服伯蘭地、或穀烝酒、半至二量兩、(15.0-60.0) 若孩童之分劑、一月者、服五至十量滴、(0.3-0.6) 二月者、十至二十量滴、(0.6-1.3) 三月者、二十至三十量滴、(1.3-2.0) 四月以外者、六十量滴、(4.0) 有時每二句鐘、以此分劑減半服之、

以酒擦病者之身、大有增力之效、常患病者、以穀烝酒加塩、用之擦身、乃激皮膚之法。

藥製

穀烝酒 Spiritus Frumenti, U. S. 由黑麥釀成者、方入藥用、然必存貯四年以外者方可。

伯蘭地 Spiritus Vini Gallici, 乃以葡酒烝之而成、必存貯三年以外者、方入藥用。

紅葡酒 Vinum Rubrum, U. S. 乃以帶皮之葡萄、取汁釀之而成、但不用烝法。

白葡酒 Vinum Album, U. S. 乃以去皮之葡萄、取汁釀之而成、亦不用烝法。

淡醇酒 Alcohol Dilutum, U. S. 乃以醇酒一分、烝水一分、相合而成。

醇酒 Alco hol Spiritus Rectificatus, B. P. 每百分內含水五分、英揀藥册內含水十分。

濃醇酒 Alcohol Absolutum, 每百分內含水一分。

蔗酒 (Rum) 乃以糖漿釀之、用烝法而成、每百分內含醇酒四十至五十分。

荷蘭酒 (Gin) 乃以大麥或黑麥、並杜松子、洋葒草、釀後烝之而成、有利小便之功、腎新炎者忌用、若常飲此酒、易患肝變硬症。

杜松雜酒 Spiritus Juniperi Compositus, U. S. 其功效與荷蘭酒同。

皆在酒之多寡、故少飲酒者、有助消化之功、以其能激胃而使之多生化腥羶也、若多飲者、其消化之功反受其阻。

祛　酒在胃內被嗅甚易、祛或變質亦易、若用之合宜、皆成爲身內當用之物、倘用之過度、乃藉肺皮腎腸而祛。

療效　酒之大用、一或因受傷、或受毒等故、而心[11]將停止者、用以激心、其效甚速、一低熱[2]症、並一切勞力之久症、與熱症後身體無力者、或肺[3]葉炎、與肺[4]細葉炎等症、用之俱效、如因暈仆[5]、蛇咬[6]、或受傷[7]而腦力猝衰、肺[8]癆炎之晚程、年[9]遠之膿瘡等、用之皆效、若絡部受激、則不宜用、然絡部受阻時、則可用之、孩童肺炎症、其效尤妙、每二句鐘、以伯蘭地、或穀烝酒、五至六十滴、(0.3-4.0)滴於乳或水內服之、如瘟熱[10]腸熱[11]二症、病人甚爲虛弱者、酒乃正用、患此症每以酒爲激發胃經、輔助身力之用、然決不可視爲常規、總當審明可用與否、如脉速而微、或全身無力、或不思飲食、則當用之、否則不可用、甚重之腸熱症、若服尋常之伯蘭地、或穀烝酒、而胃經受惹、則服陳伯蘭地、或葡酒、可免此患、有時人嘔[12]吐不止、將伯蘭地少許、滴於碎冰塊上、服之有效、按酒非但爲內服之藥、亦可外敷、受跌[13]打等傷者、以酒擦之、可去患處之燒、且能免腐、[14]骨節炎、以布浸酒裹之、有效、

1 Cardiac failure
2 Low fevers
3 Croupous pneumonia
4 Catarrhal pneumonia
5 Fainting
6 Snake bite
7 Traumatic shock
8 Chronic pneumonia
9 Excessive wasting
10 Typhus fever
11 Typhoid fever
12 Persistent vomiting
13 Bruises
14 Inflamed joints

中之伯蘭地酒、或穀烝酒、乃醫家所常用。

體功效　腦部　此酒之力、能激司動系、若服足分劑、此部不但受阻、恐有暫癱者、若滴於腦系之末、先有激力、後則被癱、飲之者、心思敏捷、然與其才能之淺深、毫無加增、且有阻滯、按酒有加增感應之能、若服過分劑、則失和動之功、蓋因知覺受阻、則捫覺不靈、故醉者行動蹣跚。

絡部　飲酒者心經受激、脉必速而有力、血壓亦增、此其故、少因司絡腦所受激、多因心經受激也、飲之過甚者、絡部與腦部、先則受激、後則被癱。

呼吸部　小分劑則激之、大分劑則阻之。

身熱度　此藥無增身熱之能、然飲之覺煖者、非因熱度加增、乃因身內熱血被催、運至四肢也、若多飲之、熱度反減、其故有二、一因熱血催入四肢、身體反失其熱、二因人身之熱、先激後阻、被激時、身胴虛耗、被阻時、生命司所亦受其阻、以致熱度漸減、曾有人查考飲酒者之熱度、謂飲酒時、身內生熱雖多、而祛散甚速、且其所散者、較多於所生者。

胃經　若將食物與胃化腥梅、同置於玻璃試筒內、加之以酒、其消化之功、或遲或止、

常用之、恐失胃經之功用、有醫者云、流血過多、與肺炎等症、若用鎩氿消水、射入腿盂內、可免心血凝塊之患、如射入皮內、其處必至生瘡、射於臂盂內、恐藥力至心過速、而受其阻、如欲使皮成皰、以鎩氿濃消水、滴數滴於皮上、後以表鍋覆之、即能生皰、蝎蜂等螫傷此消水最效、若以鎩氿消水、加於擦藥類內、用以止痛、其效尤妙、若因食滯釀爲酸類、致患胃酸症、服此藥最有神效、胃已受惹者忌服、最宜常服者、乃鎩氿香浮酒。

藥製與分劑

鎩氿強消水 Aqua Ammoniæ Fortior. U. S. Liquor Ammoniæ Fortis. B. P.

每百分內、有鎩氿氣二十八分。

鎩氿消水 Aqua Ammoniæ, U. S. Liquor Ammoniæ, B. P.

每百分內、有鎩氿氣十分。

鎩氿浮酒 Spiritus Ammoniæ, U. S.

三十至六十量滴、(2.0-4.0) 以水送下。

鎩氿香浮酒 Spiritus Ammoniæ Aromaticus.

三十至六十量滴、(2.0-4.0) 以水送下。

此酒以鎩碳強鬱、肉蔻油、檸檬油、拉芬大油、和醇酒與鎩氿消水製成。

鎩氿臭浮酒 Spiritus Ammoniæ Fœtidus.

內有阿魏、其用與鎩氿香酒浮同。

鎩氿擦藥 Linimentum Ammoniæ.

扭傷敷之有效。

醇酒 又名燃酒 ALCOHOL

此酒係流質、以糖糈類、用火釀之而成。泰西入藥用者、卽此酒、惟其

1 Heart-clot
2 Spots stung by insects
3 Gastric acidity

第八章 論激心藥類

鋞沘 (AMMONIA)

此藥乃係氣類、其味甚辣、能使鼽之者、氣脘發炎、嗓口抽搐、以至殞命、故純者不入藥用。

體功效 此氣最有惹力、肌受其惹、初見紅色、久則成疥。

腦部 試以此藥射於禽獸血脘內、立即癈瘓、蓋因脊腦受惹也、

絡部 此藥能激絡部、可使脉速而有力。

第三十七圖



此圖表明鋞沘能激速系如A、且激心經、療效如B、故使脉最速而有力、且能激司絡腦所如C、並激呼吸司所如D、

呼吸部 此藥亦能激呼吸部。二激呼吸部、三外惹內效、四攸酸、如因蛇咬[1]暈仆、或驚懼、或受傷、或食物不化等故、以致心經虛弱症、用他藥不及者、可用此藥、肺炎症、或他類之熱症、偶有心將[2]停止之勢者、此藥頗可用之、有著名醫者云、薰哥羅芳、心經停止者、以鋞沘消水、射於盂內、可使復原、因其藥力易散、有痼症者忌用、若

1 Snake poisoning
2 Cardiac failure

之力也、瘍疽[1]等症、若疼痛過甚、可研其葉成末、撒於敷藥上、敷之有效、醫者切記此草之力不同、故初用此藥時、當以小分劑、如不見效、漸次加增可也。

藥製與分劑

哥念膏 (Extractum Conii) 半至一厘、(0.03-0.06)

哥念流膏 Fluidextractum Conii, U. S. 二至六量滴、(0.1-0.4)

哥念酒 Tinctura Conii, B. P. 半至一量錢、(2.0-4.0)

哥念印 (Conina) 此係哥念之蘗、乃爲流質、不宜用之。

哥念汁 Succus Conii, B. P. 一至二量錢、(4.0-8.0)

哥念氣 (Vapor Conii) 此以哥念汁半量兩、(16.0)鋟祕消水一量錢、(4.0)烝水一量兩、(30.0)製成、以二十量滴、(1.3)加熱水、置於噴霧具內噴之、能醫乾嗽、抽搐之痿[2]等症。

哥念抹膏 Unguentum Conii, B. P. 此膏之常用、乃醫肛門作癢之患、

毒力 此藥之毒與黃茉莉同、解法亦同。

1 Ulcers
2 Cancers

解毒之法　先用吐藥或用胃抽器、後用鞣酸消水、毛地黃等藥、以激其心經、再用士的年、阿刀便等藥、以激其呼吸、庶可救之。

哥念 CONIUM, U. S. CONII FOLIA, B. P.　此藥乃一類之草、產於英美二國、入藥者、乃該草之葉與果、內含一種、名哥念印。

體功效　服足分劑者、其肌無力、其體疲倦、服過分劑、則頭覺懸暈、步履不穩、目視迷離、血運不勻。

腦部　此藥能阻動系幹、服過分劑、覺系幹亦必受阻、其感脊腦、不甚顯然、乃緩緩阻之、無感大腦之能、服毒分劑者、臨死時、其靈性猶有知覺。

絡部　此藥有阻絡部之能。

呼吸部　此藥有癱呼吸肌系之力、故能阻此部。

第三十六圖



此圖表明哥念阻動系幹如A、療效　此藥在揀藥冊中、非緊要之品、如因系幹被惹、致患癡癎者、服之有效、若因腦或脊腦被惹所致、忌用、因其無平腦之力、只有阻顱腦傳於系幹

a Irritation of nerve trunk

目 此藥能癱動眼系之末、故置於目內、瞳必散大。

療效 凡因腦系過於受勞、或過用目力、致患偏頭痛[1]者、此藥有效、若與印度麻同服、其效尤顯、或言此藥能醫瘧症、人多不以爲然、某著名醫者、謂此藥於肺炎[2]、肺統膜炎[3]等症、大效、但當於初患時、用之方可、若痚[4]、乾嗽[5]、啼嗽[6]、嗓口抽[7]等症、與歪頸[8]、經痛[9]等一處之抽搐、皆效、惟身體軟弱者忌用、或謂用黃茉莉印散瞳、其力與阿刀便同、但於目內、較阿刀便之力易祛耳、用法將此印八厘、(0.5) 以水一量兩 (30.0) 化之、滴於目內、初一句鐘、每刻滴一滴、至二三句鐘、每兩刻滴一滴、必有功效。

藥製與分劑

黃茉莉流膏 Fluidextractum Gelsemii, U. S. 一至五量滴、(0.06-0.30)

黃茉莉酒 Tinctura Gelsemii, 五至十五量滴、(0.30-1.0)

黃茉莉印 (Gelsemina) 一厘之六十分之一、(0.001)

毒力 服毒分劑者、其必顯之形狀、先則身倦、思卧、肌肉無力、上瞼下垂、頷骨下墜、脉漸速而微、身生冷汗、面消瘦而戚、喉嚨瘖啞、或有成對眼者、其殞命之故、乃緣呼吸司所被癱也、但其人必氣絕後、方無知覺。

1 Migraine
2 Pneumonia
3 Pleurisy
4 Asthma
5 Nervous cough
6 Whooping-cough
7 Laryngismus stridulous
8 Torticollis
9 Dysmenorrhœa

大便久燥症、臨睡時服十量滴、(0.6)若與洋鼠李同服尤妙、人受漆咬、以此藥一兩、(30.0)加滾水一量磅、(480.0)洗之有效。

藥製與分劑

路卑利酒 Tinctura Lobeliæ, U. S. 十至六十量滴、(0.6-4.0)爲平胃之劑、二至四量錢、(8.0-16.0)爲令人嘔吐之劑。

路卑利流膏 Fluidextractum Lobeliæ, U. S. 一至五量滴、(0.06-0.3)爲平胃之劑、十五量滴、(1.0)爲令人嘔吐之劑。

路卑利伊打酒 Tinctura Lobeliæ Ætherea, B. P. 五至十五量滴、(0.3-1.0)

黃茉莉 GELSEMIUM, U. S. GELSEMII RADIX, B. P. 此乃美國生蔓之樹、入藥者乃此樹之根、內含一鹼、名黃茉莉印。

體功效 腦部 此藥最易癱脊腦、然受其毒者、先則覺徑、後則動徑。

絡部 此藥有阻絡部之力、而阻心尤甚。

呼吸部 此藥因能癱呼吸司所、故令人殞命。

身熱度 服過分劑者、熱度必大爲減少。

* Constipation

玻璃瓶內、只宜貯於馬口鐵盒內、嚴密封之、置於冷處。

藥製與分劑

甘油氫弱礬浮酒 Spiritus Glycerylis Nitratis, U. S. 一至二量滴、(0.06-0.12)

甘油氫弱礬輪 Trinitrini Tabellæ, B. P. 一至二輪、

甘油氫弱礬消水 Liquor Trinitrini, B. P. 半至一量滴、(0.03-0.06)

鈉氫弱礬 SODII NITRIS, 此藥之功用、與鈸氫弱礬同、分劑一至二厘。(0.06-0.12)

路卑利 LOBELIA. 此藥係美國所產之野草、入藥者乃其葉。

體功效 服毒分劑者、必致嘔吐、脉微、皮白、面紫、生冷汗、全身之肌無力、亦有瀉腹之甚者、臨死時、呼吸司所、與第十對腦系之末被癱、服過分劑者、當以鴉片平胃、止其嘔吐、以酒與鎂沘香浮酒、激其心經、並當煖其身。

療效 此藥之正用、乃醫痎症、泰西之名醫、有重視此藥者、亦有輕視此藥者、乃因醫痎症、必用至足之分劑、方能見效、故其所視不同也、患此症者、若因胃失功用、或氣脘發炎而致、此藥常效、若因心經致患痎症、或兼有心症者、忌服、醫此症之法、當將痎之時、服路卑利酒、三十至六十量滴、(2.0-4.0) 或每刻鐘服十量滴、(0.6) 以痎止或惡心爲度、

1 Asthma

鈑氰弱礬 (POTASSII NITRIS) 近來此藥多代炆氰弱礬之用、其效較炆氰弱礬畧長、[1]心痛急、[2]胃痛癇[3]等症、用之有效、分劑三至五厘、(0.2-0.3) 亦有用分劑較大者、然不能無險。

祛 此藥藉肺腎二經而祛。

甘油氰弱礬 (NITROGLYCERIN) 此藥大有崩力、故用者每一分、必加醇酒百分方可、分劑一至二量滴、(0.06-0.12) 加水或成丸服之、初則切不可多用、若服之日久、即至六十量滴、(4.0) 亦不爲過、醫者須切記此理、如用之見效、必日加分劑方可、此藥之正用、爲使絡部受大而且速之激力、因其激力易過、故宜每三四句鐘服一次、其體功效、與他類氰弱礬相同、炆氰弱礬、亦與此藥相類、但其激力、較此藥畧短、鈑氰弱礬、與鈉氰弱礬、其激力較此藥畧長、[4]心痛急症、多用此藥、[5]癇、[6]肌跳、[7]胃系痛等症、用之亦可、多有著名醫者、謂其能醫[8]腎脫膚久炎症、蓋因服之者尿胎減少也、然恐不能竟其功、[9]腎變硬炎症、如心經受其牽累、且血壓加增、並於右脇第二骿肋處、能聽心之第二聲過大、此因總脉門扇闔力甚大也、服此藥有效、心痛急症、無論痛時與痛先、如血脘肌有抽搐之勢、用之最效、若因氣脘泗膜積血、致患[10]痚症、此藥最妙、各類[11]嘔吐症、除孕吐與腹統膜炎之外、俱效、醫家所用之甘油氰弱礬酒、因其與水或酒合成、故無崩力、此酒不可貯於

1 Angina pectoris
2 Gastralgia
3 Epilepsy
4 Angina pectoris
5 Epilepsy
6 Chorea
7 Gastralgia
8 Chronic parenchymatous nephritis
9 Interstitial nephritis
10 Asthma
11 Vomiting

即仆倒、心動速而有力、呼吸短而有聲。

腦部 阻腦藥類中、其效最速者、係氫藍酸、第二乃此藥。

第三十五圖



此圖表明炆氰弱礬如何阻脊腦動徑

療效 此藥之正感、行於脊腦動徑之中、若不用過分劑、覺徑不受其感、故不能用之止痛、其妙用、能醫全身、或一肢之抽搐、亦能防癇[1]症之瘈瘲、但必須甫覺癇兆時用之、方能有效、服士[2]的年之過分劑、與有痓症者、此藥能防其瘈瘲、心[4]痛急症、若大顯血壓者、此藥有效、婦人經[5]痛症、屢有痓抽搐之勢、亦大有效、暈[6]船患、或謂其有效、如因驚懼、或因熏迷蒙藥、以致心[7]力虛弱者、或畧齅之、少頃復齅之、若不立時見效、即不可復用矣、啼[8]嗽、嗓[9]口抽、哮[10]吼痿等症、或因偏[11]頭痛、絡部有抽搐之處、此藥皆大有效、醫痓症、或中士的年毒者、當在瘈瘲之先用之、亦可射於皮內、用法、以此藥三至五滴、(0.2-0.3) 滴於布上齅之、或滴於糖上服之亦可、齅此藥者、越片時、其效尤大、故宜迭次齅之、但不可一氣齅之、恐有意外之虞、醫者當切示病者藥效甚速、齅之不宜太驟、恐心經大受其阻也、最妙之用法、以此藥三滴、(0.2) 置於薄玻璃管內、用時即折此管於布上、而齅其氣。

1 Epilepsy
2 Convulsions of strychnia poisoning
3 Tetanus
4 Angina pectoris
5 Dysmenorrhœa
6 Seasickness
7 Cardiac failure
8 Whooping-cough
9 Laryngismus stridulus
10 Spasmodic croup
11 Migraine

或勢欲逞兇者、亦有成癔狀、或瘋狀、或幻想者、且幻想之事多屬兇惡、更有成極重之氣腔炎症、使病者難獲其必需之氧、身變紫色者、顯腸熱之狀者、亦有之、若兼服砒類之藥、或能免腦腺發炎之患、如婦人必須久服此類藥、宜將鋅砒弱礬消水、加此類鹽消水內、可常用之、服此類藥者、因身之腦腺受阻、故腦腺發炎、宜令病者每晚以溫水沐浴、用粗布搓身、以激其皮、有醫者云、倘病者須久服此類藥、宜兼服納透、或撒婁、可免以上之患。

禁用之狀　腦部受阻、或肓道泗膜受激者、忌用、如腸熱症稍瘉、或產後癲、或年邁顱腦變軟等症、服之不但無益、反致有損、易患腦腺炎者、亦不宜用、倘必須用之、當加愼重。

毒力　中此類鹽之毒者無多、如一次服半至一兩、(15.0-30.0)胃經覺煖、全身無力、額痛、昏迷、口噤、語誤、脉緩、每分鐘之至數、僅十五至二十次、且遲速不均、沉取無力、然每能痊瘉、倘致肺成疿患、則不能救矣、亦有中毒而成顛狂者。

戊氧弱礬 AMYLIS NITRIS, U. S. AMYL NITRIS, B. P.　此藥乃係流質、其氣易散、其香似梨、其形似油、遇熱與光、即改其體質。

體功效　或服或鼻皆可、用過分劑、必致頭暈、步履不穩、且耳鳴、頭脹、面紫、身弱、越片時

鏽氮塩 AURI BROMIDUM, 此藥醫癇[1]症、有醫者以爲妙品、日服三次、每次一厘之五分之一、至二分之一、(0.012-0.03) 成丸服之、或謂此藥有平顱腦之能。

鋰氮塩 LITHII BROMIDUM, U. S. 此藥較他類氮塩之力小、故所用之分劑畧大、有著名醫者謂、他類氮塩所不能醫之癇[2]症、此藥或能醫之、一日之分劑、三十至百厘。(2-0-6.6)

鎳氮塩 (NICCOLII BROMIDUM) 此藥色綠、惹力甚大、曾經人試驗、體功效與鋏氮塩相等、服時宜製沸劑、且多飲水、免有惹胃之患、製沸劑法、乃與鈉氫碳强礬、及菓酸合勻、以酒噴之、即時過羅、後置於火傍、煨乾、用時加水即沸、沸時服之。

鈉氮塩 SODII BROMIDUM 此藥之功效、與鋏氮塩同、其惹阻二力、較小於他類氮塩、故常用之、分劑、與他類氮塩同。

銻氮塩 STRONTII BROMIDUM, U. S. 詳見銻篇。

解毒之效 無論中何毒者、如顯瘈瘲之狀、氮塩類、用之爲宜、若顯腦部不平、用之亦可。

久服氮塩之狀 久服大分劑、先則面之腫腺發炎、後則身之腫腺發炎、口出穢氣、精神疲倦、終日酣睡、大聲呼喚、雖能醒覺、隨仍酣睡、即勉强行動、亦衰弱無力、口不能辨味、耳不能司聽、先則慾心受阻、既而靈才亦然、亦有久服此類藥、形狀顛狂、或性情暴燥、

1 Epilepsy
2 Epilepsy

體功效　此藥見涎即化、敷於口泗膜、則有塩味、如服過分劑、腹內覺有熱痛、且有腸胃發炎之勢。

腦部　此藥使禽獸食之、脊腦動覺二徑、必受其阻、系與肌則不然、亦有平顱腦之功。

絡部　此藥之中分劑、雖有激此部之能、然不甚大、若用之以激此部、宜與他藥同服、方能見效。

療效　此藥之用、與鉄氫塩同、其阻腦之力、較鉄氫塩爲小、惹胃之力、較鉄氫塩爲大、若醫癲[1]症、其功與鉄氫塩同、有醫者謂、若治此症、二塩同用尤妙、又有名醫謂、若醫痺[2]症、此塩大效、每日服六十至八十厘(4.0-5.3)多用水送下方可、常用之分劑、乃十至三十厘、(0.6-2.0)忌與燃氣弱酒同用。

錯氫塩 CALCII BROMIDUM,

此藥有平腦安睡之能、初入藥時、有醫者謂其能代鉄氫塩之用、其效較鉄氫塩尤妙、蓋因少有惹力、與阻腦之患、但今之醫者少用之、其故不能盡述、一日之分劑、三十至九十厘、(2.0-6.0)如不易受此類藥之感、雖多用之、亦無妨碍、癲[3]癎[4]等症、服之有效、凡鉄氫塩所能醫之症、此藥亦能醫之、如與鉄氫塩各半用之、較專用此藥尤妙。

1 Epilepsy
2 Rheumatism
3 Hysteria
4 Epilepsy

孕吐症、此方有效、如嘔吐過甚、每半句鐘以此分劑減半服之、至四量兩 (120.0) 爲止、如不見效、當用射肛藥、良方如左。

鈉氰塩	℞-Sodii bromidi	三十英厘 (2.0)
無臭鴉片酒	Tinct. opii deodorat	三十量滴 (2.0)
糊水	Aquæ amyli	六量兩 (180.0)

此乃射用之方、存於肛內愈久、功效愈大。

S. To be injected gently into the rectum and retained as long as possible.

過服貴林[2]以致耳鳴者、若與此藥同服、則能預防此患。

服法 此藥之分劑、每日服五至百二十厘、(0.3-8.0) 因其味與祛皆緩、故不宜勤服、如先受大分劑之感、後雖日服小分劑、其感仍存、最妙之服法、乃以水化之、畧加糖漿、則可解其鹹味。

錏氰塩 AMMONII BROMIDUM, 此藥係結晶體、藥店所售者、常爲白散、如遇空氣、畧變黃色、水易化之。

1 Vomiting of pregnancy
2 Cinchonism

頭痛而吐膽液者、此方不可用、經痛[1]與經旺症、此藥有效、幼婦尤效、但經旺症、宜於行經之前七日、早晚服之、每服十厘 (0.6) 方可見效、若醫經前錯症、當常服此藥、雖已痊癒、仍當服二三月之久、可免再犯、暈船[3]者、此爲最妙之防藥、在未上船之前數日、每日服三次、每服五至十厘 (0.3-0.6) 其嘔吐司所即能安靜、如已懸暈、當以他藥佐之、良方如左。

檸酸	R-Acid. citric.	百二十英厘 (8.0)
烝水	Aquæ destillatæ	四量兩 (120.0) —M.

貯於瓶內、再以 Fiat solutio.

鈸氫鹽	R-Potassii bromidi	六十英厘 (4.0)
鈸氫碳強酸	Potassii bicarbonatis	六十英厘 (4.0)
烝水	Aquæ destillatæ	四量兩 (120.0) —M.

另貯一瓶內、服法、將此二瓶之藥、各以半量兩、(16.0) 傾於玻璃杯內、立即沸起、正在沸時服之。S. A tablespoonful of each of these solutions should be added to one another and drunk during effervescense.

1 Dysmenorrhœa
2 Menorrhagia
3 Sea-sickness

婦人因㾓病而頭[1]痛者、無論其痛在頂在項、病原在㾓頸者居多、當先治其病原、後服此塩、有效、成人或孩童之瘈[2]瘲症、與哥拉同服、大效、若孩童因胱抽搐而遺[3]尿者、與哥拉同服屢效、若因脊腦司所、受激太過、致遺[4]精症、此藥乃最妙之品、慾[5]迷、花[6]顛二症、大有功效、用照喉鏡之時、或不能忍受、服此藥一二劑、則能忍受矣、嗓[7]新炎症、日服六十厘、(4.0) 均開用之、有效、孩[8]童生牙時、如有瘈瘲之勢、服之亦效、常有孩童在酣[9]睡之時、忽然驚咋、若用此藥之小分劑、大效、有時人因勞[10]碌太過、不得安睡者、服之亦效、過[11]用目力、致頭與腦系作痛、若與加非印同服、乃爲良劑、蓋因加非印能激受阻之腦系復原、鉄氰塩能阻覺痛之司所也、治頭痛之良方如左。

安替派林	℞ Antipyrinæ U. S. Phenazoni B. P.	二十五英厘 (1.6)·—M.
加非印檸礬	Caffeinæ citratæ	十英厘 (0.6)
鉄氰塩	Potassii bromidi	二十五英厘 (1.6)

均爲五分、每二句鐘服一次、以痛止爲度。

Fiant in chartulæ, No. V. S. One powder as needed.

1 Headache
2 Convulsions
3 Incontinence of urine
4 Seminal emissions
5 Satyriasis
6 Nymphomania
7 Acute laryngitis
8 Teething
9 Night screaming
10 Insomnia of overwork
11 Migraine and neuralgia due to eye-strain

腦部此藥於顱腦默質動覺之功用大有阻力且阻人思索之才可爲平脊腦之妙藥其阻力多行於脊腦覺徑之中故激反應與覺痛之能俱減。

胃經因有惹泗膜之力故多用水送下可免惹胃之虞。

祛療效凡腦部之症若因受感太過此藥最妙惟腦部受阻忌用醫癲[1]症此藥爲上品癆[2]症或婦女癜[3]症此藥有效無論成人孩童或婦女懷孕或經絕時而受驚者亦效良方如左。

銨氯塩	R-Ammonii bromidi	二英錢 (8.0)
鈦氯塩	Potassii bromidi	半英兩 (16.0)
銨泯香浮酒	Spt. ammon. aromat.	三百六十量滴 (24.0)
樟腦消水	Aquæ camphoræ	加至六量兩 (180.0) —M.

每四句鐘服一量兩之四分之一至二分之一 (8.0-16.0)

S. A dessertspoonful to a tablespoonful every four hours.

1 Epilepsy
2 Nervousness
3 Hysteria

厄司連柳馨 Physostigminæ Salicylas, U. S. 一厘之八十分之一、(0.008)

厄司連硫强馨 Physostigminæ Sulphas, 較上柳馨易於消化、用之最宜、然眼科之醫者、仍多用柳馨。

厄司連鱗片 Lamellæ Physostigminæ B. P. 每片內有厄司連硫强馨一厘之千分之一、(0.0006)

鈑氮塩 POTASSII BROMIDUM.

此藥乃氮與鈑化消水製成、色白、過光、結晶、無臭、味腥而鹹、乾燥之時、不改原質、陰雨之際、即返潮濕。

第十三圖



此圖表明服鈑氮塩者、顱三叉腦司動處必受其阻、如A、司靈處亦受其阻、如B、

第十四圖



C圖乃表明脊腦之覺徑受阻、D圖乃表明激反應之能受阻、蓋因脊腦中之覺脉受阻也、如a、

體功效 此藥令人睏睡、並減少其感應之能。

第七章　論阻動系藥類

此類藥有阻脊腦之能。

加拉巴豆 PHYSOSTIGMA, U. S. PHYSOSTIGMATIS SEMINA, B. P.

此藥產於亞非利加之西、乃一類樹子、內含二脈、一名厄司連、一名加拉巴印、最要者乃厄司連。

體功效　服中分劑、常令人胃痛、身憊、脉緩、瞳縮、呼吸受阻、過分劑、則全體癱軟、若藥內多含加拉巴印、必至令人痰瘲。

腦部　用毒分劑、脊腦覺徑先失其功用、後則脊腦動系之末被癱。

瞳　若以厄司連置於眼內、能令瞳縮小。

療效　醫者於痓症[1]、抽搐[2]與嬰痓[3]（俗名四六瘋）等類症、常以此藥醫之、微效、胱無力[4]、腸弱[5]、腸胃鬆[6]大等症、皆效氣腫[7]症亦效、因其能激氣脘之肌、使痰易於吐出也、若加於瀉劑內用之、亦效、因其能激腸內之肌也。

藥製與分劑

加拉巴豆膏　Extractum Physostigmatis.　一厘之八分之一、至四分之一、(0.008-0.015)

加拉巴豆酒　Tinctura Physostigmatis, U. S.　五至三十量滴、(0.3-2.0)

1 Tetanus
2 Spasms
3 Trismus neonatorum
4 Atony of bladder
5 Atony of intestine
6 Gastric and intestinal dilatation
7 Emphysema

毒力　服毒分劑或有驟然痙攣者、亦有漸次使頸項發板、眼目發直者、厥後腦部受惹、忽爾痙攣、如狂風之來、當此之時、大概脊必反張、形似彎弓、呼吸之肌、亦必發板、或有他類之痙攣、惟脊之反張、乃常見者、中此毒者、或微有所聞、或畧受風吹、或有人稍撫其身、彼即因而痙攣、蓋脊腦之動徑、受惹甚重、一受覺系之感、遂至於此、然非盡痙攣至死、或偶有間斷者、或迭次不止者、間斷時、呼吸如常、痙攣時、肌肉甚痛、其死亡之故有二、一因力量用盡、一因呼吸之肌發板、以致呼吸窒塞、遂至殞命者居多、近有人試將毒分劑、射於禽獸皮內、用代引呼吸法、尚能救之、再加五百倍、方能令其死亡。

解毒法　人受士的年之毒、未至痙攣之先、當熏炷氣弱礬、止其痙攣、以便易用胃抽器、熏此藥時、當用炭匿酸、以水化服、蓋炭匿酸乃化學中解此毒之藥也、後用胃抽器、取出胃中之毒、取淨、將鈹氣鹽六十厘、(4.0) 哥拉二十厘、(1.3) 化服、此二藥與士的年有相敵之效、如已痙攣、不能服藥、待間斷時、用哥羅芳謹慎熏之、後用糘水化鈹氣鹽與哥拉、射入肛內爲宜、但熏時不可驟然停止、必以肛內之藥被喫爲度、忌用伊打、因其惹力過甚、功用較緩也、在痙攣時、因其不能呼吸、熏藥俱不能用、倘痙攣不止、宜用炷氣弱礬、射於皮內、如有功效、再用以上之法、挨次醫之、中此毒而殞命者、氣將斷時、靈性猶存、至呼吸停止、方無知覺。

然、當心經將停之時、方可用之、受哥羅芳毒者、此藥最效、人熏哥羅芳、有時心將停止、或肺不呼吸、宜用士的年一厘之十分之一、(0.006)射入皮內、過十分鐘、如不見效、可再射之、大有激絡部、與呼吸部之力、因受傷[1]而腦力猝衰者、用之大效、氣促[2]症、無論年邁寒嗽[3]或氣腔痰盛、此藥有效、大便久燥[5]症、與瀉劑同服、最效、以其能免瀉力之過猛也。

藥製與分劑

馬前子膏	Extractum Nucis Vomicæ,	一厘之六分之一至四分之一 (0.01-0.015)
馬前子流膏	Fluidextractum Nucis Vomicæ, U. S, Extractum Nucis Vomicæ Liquidum, B. P.	一至五量滴、(0.06-0.3)
馬前子酒	Tinctura Nucis Vomicæ	五至四十量滴、(0.3-2.6)
士的年硫強鬱	Strychninæ Sulphas, U. S.	一厘之三十分之一、至二十分之一 (0.002-0.003)

服與射同

士的年氰鬱	Strychninæ Nitras, U. S.	與士的年硫強鬱之分劑同、
士的年綠塩	Strychninæ Hydrochloridum, B. P.	亦與士的年硫強鬱之分劑同、

割症後如腦力猝衰過甚、即以空針射一厘之四分之一、(0.015) 亦不爲過。

士的年氯塩消水 Liquor Strychninæ Hydrochloridi, B. P. 二至八量滴、(0.12-0.5)

1 Traumatic shock
2 Dyspnœa
3 Winter cough
4 Bronchorrhœa
5 Chronic constipation

劑、因癡癎之故、或能使熱度加增。

祛　士的年於肝經之內被氣所奪者多、由腎而祛者少。

療效　馬前子有數類功效、因其味甚苦、且有補力、故可作苦補藥、凡於腦部、呼吸部、及心經、眼目、皆有功效、且能解鴉片之毒、如因腦部過力、致某經有功病、服之有效、然腦部初得腘病、（如中瘋癱瘓並小兒癱瘓等症）此藥不但無益、反致有損、曾有患癱瘓者、每服此藥、其所癱之處、反有抽搐之患、若腦系新炎症忌用、蓋腦系業已受惹、如用此藥、乃益增其惹力也、油匠多用鉛粉、有時中毒、漸成癱瘓者、用士的年之足分劑、能抵禦之、並當用鉄氣鹽、以祛身內之鉛毒、酗酒兼吸煙葉者、有時令目失明、馬前子酒、乃爲妙劑、服法、第一日服三次、每次三量滴、(0.2) 第二日、每次五量滴、(0.3) 如此每日遞加二量滴、(0.12) 至見體功效爲止、人用此法、一日之中、有能服此酒六十量滴 (4.0) 者、過用目力者、此藥有效、肺炎與各類熱症、或致腦力脫失、士的年最效、觀腦力脫失之形狀、常有謂其不能治者、若用士的年醫之、多能救其死亡、用法、以士的年一厘之四十分之一、(0.00 15) 加阿刀便一厘之百分之一、(0.0006) 射於皮內、但不可止用一次、當視病者之景況、即用二三次亦可、日久之重症、最要者、不可常用之、以激絡部、蓋用此藥、如車夫用鞭

1 Functional disorder
2 Progressive lead palsy
3 Amaurosis
4 Pneumonia

第六章　論激動系藥類

此類藥乃增脊腦中激反應之司所、故多服者行動不穩。

馬前子 NUX VOMICA.

此藥乃一類之樹子、產於印度、內含二鹼、一名士的年、一名步魯先、其功效多本於士的年、故論士的年、即論本藥也。

體功效　服足分劑者、甚有感應之能、耳目鼻呼吸、及血壓之力、必俱加增、如不受其正感、則受其惹力矣。

腦部　士的年之正感、乃行於腦部、能感脊腦之動徑、或令覺所受感之能力過度、服過分劑者、即患癇癎、服毒分劑、或於癇癎時殞命、或癇癎後殞命。

呼吸部　士的年爲最能感呼吸司所之藥、不但能加呼吸之速、並能多使肺經舒展。

第十三二圖



此圖表明馬前子之末如B、能激脊腦動徑、亦能如A、若服過分有畧激動系幹之劑、則阻肌中動系尤速。

絡部　士的年不但加增脉力、且能使之身熱度　中分劑、與身之熱度無關、毒分

加水百量滴、(6.60)其消水與寇卡印不同、以火沸之、並不減少其力、冷水百量滴、(6.60)能化藥三厘半、(0.21)若敷於泗膜、不能縮該處之血脘、非若用寇卡印、少有流血之患、若滴於眼內、初覺疼痛、乖效與寇卡印同、治法亦同。

第三十一圖

此圖表明射藥於脊腦潤衣內之法、其針較常用者畧長、醫者欲知針果至合宜之處否、必須卸去針筒、只留針於肉內、如有液由空針流出、可知其已入潤衣、後將藥置於針筒內、仍安於針上射之、

由呼吸絡二部、顯種種之病狀者、中此毒者、小便清長、並內含胎、查其中毒之由、惟因割治之症、必須射藥於尿脘者、多顯此乖效。

解毒法 中毒者若腦系受阻、可用錏沎、加非、或伊打、士的年、波蘭地等藥解之、如有痰癡之勢、宜用解士的年毒之法。見馬前子篇

猶肯氯塩 (EUCAINÆ HYDROCHLORIDUM)

此藥由猶肯用化法而得、體質甚與寇卡印相似、猶肯分爲二種、即甲猶肯、乙猶肯、常用爲痲藥者、乃由乙猶肯取出之氯塩、緣其惹力無多也、製此藥者、謂此藥較寇卡印少有亂絡部之患、若敷於泗膜、不似寇卡印有先白後紅之色、如用爲浸潤痲法、見寇卡印篇 未痲之前、必覺疼痛、良方如左。

乙猶肯 R-Eucainæ hydrochloridi B 一英厘 (0.06)
鈉氯塩 Sodii chloridi 十英厘 (0.6)
烝水 Aquæ destillatæ 三量兩 (90.0)

用時當置於火上沸之。

眼科常用者、即此藥二厘、(0.12) 加水百量滴、(6.60) 如用爲他處痲藥、乃此藥五厘、(0.30)

謂之無險、曾有醫者訪查、用此法於一千七百零八人內、有八人殞命、以此論之、較熏哥羅芳之險尤大、低熱症、服此藥或寇卡流膏祇、可作暫時之激藥、如服之日久、不但無益、反致有損、有醫者云、此藥可敵黃熱症之嘔吐、孕吐患、此藥有效、緣其能阻胃覺系也、中鴉片癮者、此藥有解之之能、如常用之、鴉片癮雖去、寇卡印之癮又成矣。

第三十圖



此圖表明可射藥處、三四腰脊骨之間如A、四五腰脊骨之間如B、

藥製與分劑

寇卡流膏 Fluidextractum Cocæ, U. S. Extractum Cocæ Liquidum, B. P.

寇卡印鹽 Cocainæ Hydrochloridum. 半至一量錢、(2.0-4.0)

一厘之四分之一、至二分之一、(0.015-0.03)

中癮 此藥最易中癮、故當謹慎用之、有此癮者、身體消瘦、血運屢形不週、靈才被阻、狀如酒醉、常有兇惡之幻想、此癮最難斷絕、易於反復、如立斷之、恐致腦力脫失。

乖效 此藥無論服敷、有時致口噤、目盲、惡心、嘔吐、暈仆等患、亦有癈癡似癎狀者、猶有

第二十九圖



此圖表明用浸潤痲法、

有斷肢者、倘不可用迷蒙藥、則用此法割開皮肉、至本肢之腦系、後用寇卡印之小分劑、以似盬消水化之、射入系鞘內、則本肢即有痲效、若割緊要之症、（如腸熱症兼有穿腸瘍等患）倘不宜用迷蒙藥、可用此法、但宜隨射隨割、連膈包裹之處、宜以刀割開、不可以手撕之、恐有意外之痛、最要者、用時先以法防稡入藥、可免生膿之患、若欲用補皮之法、可以電池之正極、蘸於寇卡印水內、置於將割之皮上、其副極、宜置此皮之邊際、如此、正副二極間之皮、即有痲效、近有醫者、用此藥射於脊腦潤衣內、於四五腰脊骨之間、用寇卡印二厘、(0.12) 加水百量滴、(6.6) 射入十至十五量滴、(0.6-1.0) 速則二分鐘、遲則不過十五分鐘、下體必有痲效、其效可存一至五句鐘之久、但皮膚與所用之針、並藥品、俱當潔淨、如患處在四五腰脊骨以上、不宜用此法、因其效只能下行也、然用此法不可必發起白皰、形勢甚圓、再於皰旁射之、如是數次、至割處爲止、第二方乃常用者、第一方惟新炎症時可用之、第三方、迭次射之甚妙、此藥之痲效、於身內可存至二十六分鐘之久、遇

卡那少許、可免其痛、近今外科之醫生、遇斷指之症、常將寇卡印四至八厘、(0.25-0.5)加水百量滴、(6.6)作爲痲藥、用法、先縛其指根、後射於割處、縛指根之故有二、一免血流太過、一免藥味入血、割後宜將縛處稍鬆、容血少流片時、爲將藥冲出也、所用之分劑、不宜過一厘之四分之一、(0.015)倘必須多用、當將指根多縛片時、緣該處之肌有解此藥之力、俟藥力稍解、再鬆其縛、可免中毒、近有醫者、用痲藥之法、名爲浸潤痲法、此法所長者、乃因用藥不多、不易中毒也、其方如左。

	一方	二方	三方
寇卡印鹽 B-Cocainæ hydrochlor.	四英厘 (0.25)	二英厘 (0.12)	一英厘之五分 (0.012)
莫非鹽 Morphinæ hydrochlor.	半英厘 (0.03)	半英厘 (0.03)	一英厘之十分之一 (0.006)
鈉鹽 Sodii chloridi	四英厘 (0.25)	四英厘 (0.25)	四英厘 (0.25)
烝水 Aquæ dest.	四量兩 (120.0)	四量兩 (120.0)	四量兩 (120.0)

用此等方時、外以炸醇五厘、(0.3)化於百量滴(6.6)水內、每方內加三量滴、(0.2)尋常射藥、必射於皮下、惟此則射於皮間、然宜射於無恙之皮、否則易成膿腫、所射之處、皮

印鬱塩類、油不能化、如欲製成抹膏、必用寇卡印方可、凡眼科之割症、此藥最爲合宜、若眼新炎[1]症、或有微物[2]誤入眼中、以至疼痛者、良方如左。

寇卡印鹽 R-Cocainae hydrochlor. 八英厘 (0.5)
硼强酸 Acid. Boric. 七英厘 (0.46)
烝水 Aquae Dest. 一量兩 (30.0)—M.

每半句鐘滴一滴於眼內、至痛止爲度。

S. Use with a dropper in the eye every fifteen minutes until relieved.

曾有患瞭炎症、用此藥而成瞭瘢者、亦有時令眼之瞭膚發乾者、婦人乳[3]頭裂患、於嬰孩未食時、將寇卡印二厘、(0.12)加水百量滴、(6.6)敷之有效、但食乳時、當將藥拭淨方可、或曰此法恐有阻生乳之虞、如用於陰道與肛內、不爲甚妙、蓋此二處之泗膜較厚故也、若必須用之、宜以藥十分加水百分、且迭次用之、方有功效、口瘡[4]炎症、如欲用潰藥、先敷寇

第二十八圖



此圖表明寇卡印敷於泗膜上、則覺系之末暫癱、而成痲效、覺系如A、泗膜如B、

1 Acute inflammation of eye
2 Foreign body in eye
3 Fissured nipples
4 Stomatitis

寇卡 COCA, U. S. COCÆ FOLIA, B. P. 此藥乃寇卡樹葉、其形似茶、產於皮路玻利非亞二國。

寇卡印 COCAINA 此藥乃寇卡所含之質、爲人所常用者。

體功效 服此藥者、越片時、自覺舒暢、常有服後、腦與肌暫增其力者、如敷於泗膜、則必先白而後紅、因其先令血脘縮緊、故變白色、及此效一過、則血脘鬆大、故變紅色。

腦部 如以此藥敷於覺系末、必暫被癱、若用爲服劑、大有激腦之力、然與覺系毫無關係、服過分劑者、必有癡癎之勢、因腦過於受激也。

絡部 此藥之中分劑、畧有激心之力、過分劑、則激力特甚。

呼吸部 此藥之足分劑、大有激此部之力、服毒分劑而死者、蓋因此部被癱也。

身熱度 服中分劑者、與身之熱度無關、過分劑、則熱度增加、異乎尋常。

眼 此藥滴於睫上、易於透過、使覺系末失其功用、故爲眼科第一之痲藥、用此藥者、一至五分鐘、便見功效、然瞳雖散大、而睛肌不失其功用、仍有視近之能。

祛 此藥由腎經而祛者少、因所吸之氣、於身內而改其體質者多。

療效 寇卡印鹽 Cocaine Hydrochloridum. 乃眼科常用之痲藥、將此藥一至四厘(0.06-0.25)加水百量滴、(6.6)滴三至五滴(0.1-0.3)於目內、此爲常用之法、寇卡印、油能化之、寇卡

候阿刀便氰塩 (HOMATROPINA) 此藥乃以化法製成、水十分、能化藥一分、其效與阿刀便同、但較阿刀便見效甚速、而效過亦速、以此藥滴於目內、瞳必散大、越四十八句鐘、即能復原、若阿刀便、必須半月之久、方能復原。

用法 以此藥半至一厘、(0.03-0.06) 加烝水一量錢、(4.0) 每十分鐘滴一滴於目內、至一句鐘查驗之。

佛茄兒葉 STRAMONIUM, U. S. STRAMONII FOLIA, B. P. 此藥內含一𤭯、名佛茄兒印、其效與阿刀便同。

體功效 與顛茄同。

療效 亦與顛茄同。

藥製與分劑

佛茄兒膏 Extractum Stramonii, 一厘之六分之一至二分之一、(0.01-0.03)

佛茄兒流膏 Fluidextractum Stramonii, U. S. 一至五量滴、(0.06-0.3)

佛茄兒酒 Tinctura Stramonii, 五至三十量滴、(0.3-2.0)

佛茄兒抹膏 Unguentum Stramonii, U. S.

佛茄兒印 (Daturina) 一厘之百二十分之一至八十分之一、(0.0005-0.0008)

鮮顛茄膏 Extractum Belladonnæ Viride, B. P. 一厘之四分之一至一厘、(0.015-0.03)

加酒顛茄膏 Extractum Belladonnæ Alcoholicum, B. P. 一厘之四分之一至一厘、(0.015-0.06)

顛茄肛彈 Suppositoria Belladonniæ, B. P. 每彈內有顛茄膏一厘半、(0.09)

阿刀便硫强鬱 Atropinæ Sulphas 一厘之二百五十分之一至四十分之一、(0.0002-0.0015)

阿刀便硫强鬱消水 Liquor Atropinæ Sulphatis, B. P. 半至一量滴、(0.03-0.06) 滴於眼內、爲醫眼之特劑。

阿刀便鱗片 Lamellæ Atropinæ, B. P. 每片內有阿刀便一厘之五千分之一、(0.000012)

阿刀便抹膏 Unguentum Atropinæ, B. P.

近有人查明、服此藥者、必阻胃經生液之能、故宜在飯後數句鐘服之。

毒力 中此藥之毒者雖多、而殞命者甚鮮、一因受毒之處不甚緊要、一因祛之甚速、曾有四歲孩童、服阿刀便一厘、(0.06) 乃成人百倍之分劑、竟未殞命。

解毒之法 先服吐藥、後用煖身之法、如呼吸漸微、可用士的年激之。

解鴉片毒之力、但不似士的年、與加非印之力大、中草烏頭、與鈹鈇菓蓉、或氫藍酸等毒、此藥有效、緣其有激司絡腦所、呼吸司所、以及心經之力、並能保護人之熱度、中蘑菇毒者、阿刀便之足分劑能解之。

藥製與分劑

顛茄葉膏 Extractum Belladonnæ Foliorum, U. S. 一厘之六分之一至四分之一、(0.01-0.015)

顛茄葉酒 Tinctura Belladonnæ Foliorum, U. S. Tinctura Belladonnæ B. P. 五至十五量滴、(0.3-1.0)

顛茄根流膏 Fluidextractum Belladonnæ Radicis, U. S. 一至二量滴、(0.06-0.12)

顛茄流膏 Extractum Belladonnæ Liquidum, B. P. 一量滴之四分之一、至一量滴、(0.015-0.06)

顛茄擦藥 Linimentum Belladonnæ.

顛茄貼膏 Emplastrum Belladonnæ.

顛茄抹膏 Unguentum Belladonnæ.

顛茄汁 Succus Belladonnæ, B. P. 五至十五量滴 (0.3-1.0)

之、每效、如因胱經抽搐、致患遺尿[1]症、此藥大效、如因痙頸抽搐、致患經痛[2]症、或服此藥、或敷顛茄抹膏、或作陰道彈用之、俱有大效、無論成人孩童之乾嗽[3]症、此藥甚妙、大便乾燥[4]、有效、緣其於阻腸系、有阻之之能也、緊口抽[5]症、與呃逆[6]症、用之亦可、睛簾炎[7]症、以阿刀便令瞳散大、能免簾珠相粘之患、用法、以阿刀便一至四厘、(0.06-0.25) 加水一量兩、(30.0) 滴一滴於眼內、未用驗眼鏡時、用之亦可、但有漲大眼球之力、故患眼疼者忌用、腦力猝衰[8]與腦力脫失[9]等症、或因受傷、或因病重、此藥有激絡部之能、肺炎[10]或腸熱[11]等症、如恐病者有腦力脫失、或司絡腦所失其功用、宜先備此藥於屋內、以便取用、且宜用足分劑、或可救其死亡、肺炎症稍瘉時而生汗不止、心經無力、如用他激心藥無效、用此藥常效、並能止汗、乳腺炎[12]、此藥之足分劑、服敷並用、大效、嗓新痛[13]症、喉乾而炎、自覺泗膜脫落者、服足分劑大效、突眼[14]症、此藥或效、如與康畀箭毒或毛地黃並用、其效尤大、系痛[15]症、此藥之貼膏、或抹膏俱可、惟用抹膏時、當勤於揉摩、方可見效、幼年頭痛[16]、如因過用目力所致、其額必痛、儼若睛眶不能容留睛球者、此藥有效、髀間系痛[17]、顛茄貼膏、貼之有效。

解毒之效　鴉片、加拉巴豆、乍波蘭的等藥之毒、此藥爲其體功效之敵藥、雖阿刀便有

1 Urinary incontinence
2 Dysmenorrhœa
3 Nervous cough
4 Constipation
5 Laryngismus stridulus
7 Iritis
8 Shock
9 Collapse
10 Pneumonia
11 Typhoid fever
13 Acute sore throat
14 Exophthalmic goitre
15 Neuralgia
16 Headache
17 Intercostal neuralgia

妙劑、系痛[1]症亦效、盜汗[2]症尤效、孩童生涎[3]過多症、或成人中鉍毒、而流涎者、皆可醫之、臭汗[4]症或服或敷均效、乳腺炎[5]症、欲止其生乳、將顛茄抹膏、敷於炎處最善、盟瀉[6]症亦效、曾有著名醫者、醫白帶[7]症、將顛茄膏二厘、(0.12) 炭匿酸六厘、(0.36) 撒於食水絮上、每日納入陰道、挨近窟頸、存至一日之久、患此症而兼疼痛者、良方如左。

鈉輕碳強鬱	R-Sodii bicarbonatis	一英錢 (4.0)
顛茄酒	Tincturæ belladonnæ	三量錢 (12.0)
烝水	Aquæ destillatæ	加至十六量兩 (480.0) —M.

病者宜躺卧、墊高其髀、射藥於陰道內。S. Use as a vaginal injection.

歪頸[8]症、以阿刀便射於肌內大效、腸抽搐[9]症、此藥有效、轉筋[10]症、或服或敷皆可、抽搐之痙[11]症、與莫非並用、乃爲最妙之劑、若用以防症亦可、患此症者、可以顛茄葉作捲吸之、或以煙袋吸之皆可、啼嗽[12]症、如用足分劑、每有功效、肛門[13]圓肌之抽搐症、如因肛[14]裂、或因他故、用顛茄抹膏、或製成肛彈用之俱可、尿腡[15]或胱經抽搐症、服此藥、兼敷顛茄抹膏於尿腡下、有效、莖舉[16]硬痛、用之亦可、膽石腎石[17]之痒、以阿刀便之足分劑、加莫非射

1 Neuralgia
2 Night-sweats
3 Idiopathic ptyalism
4 Bromidrosis
5 Inflamed breast
6 Serous diarrhœa
7 Leucorrhœa
8 Torticollis
9 Spasm of intestine
10 Cramps
11 Asthma
12 Whooping-cough
13 Spasm of sphincter ani
14 Fissure of rectum
15 Spasm of the urethra and bladder
16 Chordee
17 Hepatic or renal calculi

嘔 此藥被嘔甚速。

第二十七圖



此圖表明阿刀便如何增血壓、

I 係平常之血壓、

II 因受披路加便之阻、血壓減少、

III 血壓尤減、

VI 因用阿刀便、血壓之力較常甚大、

祛 此藥由腎與育道、祛之甚速、雖服過分劑、亦少有殞命者、如驗人中此毒與否、可將其尿一滴、滴於牲畜眼內、若中此毒、獸瞳必至散大。

療效 生液過多之患、[1]此藥能使之減少、且有解抽之能、如某腺[2]初炎症、大效、亦有激司絡腦所之效、[3]心跳症、服小分劑、或敷顛茄抹膏於前心最妙、[4]腦力脫失者、此爲

1 Excessive secretion
2 Local inflammations
3 Cardiac palpitation
4 Collapse

此藥暫阻脊腦也、其癆瘵者、乃因動覺二徑先脫此阻、其司所尙未脫此阻也、服足分劑、能阻動系、亦能平覺系、與志肌無效、與無志肌有解抽之能、亦有阻激反應之力。

絡部　此藥能令脉速、且令血壓加增、脉速之故有三、一因阻顱臟腑系、一因激心肌一因激速系、夫血壓加增者、乃因司絡腦所、與心肌被激也。

呼吸部　阿刀便之中分劑、有激此部之力、然不似士的年、與加非印之大、過分劑、有阻此部之能。

第二十六圖



此圖表明阿刀便能阻顱臟腑系之末如A、亦能激心速系如C、因其激司絡腦所、故增血壓之力如B

育道　此藥有增腸蠕動之力、因其於阻腑系有阻之之能也。

液　此藥能減少全身之津液、惟尿不減、或反有加增者。

身熱度　服此藥之足分劑、每增身之熱度、孩童服之、其熱則增至一二度不等。

眼　此蜄能令瞳散大、因其激睛簾之和系、並癱動眼系末、尤有阻睛簾圓肌之能、用之者、有令人患眼瞭之虞。

新炎已過方可用之、服小分劑、有激陰陽之效、按此藥之長處、不但能醫病、且能令病者思食、故與莫非迥異、泰西之人、服此藥無成癮者、惟印度人有之、並成癲狂、然過數日或數月、自能痊癒。

藥製與分劑　此藥功效無常、雖係妙藥、用之不易、如欲用之、必選已經試驗者方可。

印度麻膏、Extractum Cannabis Indicæ　一厘之四分之一至二分之一、(0.015-0.03)

印度麻流膏、Fluidextractum Cannabis Indicæ, U.S.　四至二十量滴 (0.25-1.3)

印度麻酒、Tinctura Cannabis Indicæ　十五量滴、(1.0)

顛茄根 BELLADONNÆ RADIX

顛茄葉 BELLADONNÆ FOLIA,

此藥內含一鹼、名阿刀便、Atropia 水不易化、常用者、乃阿刀便硫強鬱。

體功效　服此藥之足分劑者、面有紅色、喉門乾而赤、瞳則散大、或有雙視者、有時皮生癜癍、亦或有昏譫者、如服過分劑、昏譫尤甚、語言猛烈、脉速而微、所生之癮、與紅熱症之癮相似、過數日則必脫皸、亦如紅熱症然、惟用之於孩童最妙。

腦部　服過分劑、大有激腦之能、以致昏譫、若敷於某處、該處之覺系、必至受阻、試用此藥之過分劑、以灌禽獸、始則脊腦必癱、繼而有似痙之瘛瘲、後則痊癒、其癱者、乃因

馬前子酒 R-Tincturæ nucis vomicæ 一—量錢 (8.0)
印度麻酒 Tincturæ cannabis indicæ 一—量錢 (8.0) —M.
日服二三次、每次十五滴、(1.0) S. 15 drop in water twice or thrice a day.

胃痛[1]症、良方如左。

辣椒酒 R-Tincturæ capsici 一量錢 (4.0)
印度麻酒 Tincturæ cannabis indicæ 半量兩 (16.0)
無臭鴉片酒 Tincturæ opii deodorati 一量兩 (30.0)
哥羅芳浮酒 Spiriti chloroformi 一量兩 (30.0)
拉芬大雜酒 Tincturæ lavandulæ compositæ 加至四兩 (120.0) —M.
每句鐘服一小勺、(4.0) 至痛止爲度。
S. Teaspoonful every hour until pain is relieved.

產後[2]宮不復原、宮久炎[3]癥、與抽搐之經痛等症、服此藥、不但止痛、並有平宮肌之力、腎[4]新久炎[5]二症、可減腰痛、白濁[6]症有效、並免莖[7]壅硬痛之患、初患白濁時不宜用、當俟其

1 Gastralgia
2 Uterine subinvolution
3 Chronic uterine inflammation
4 Metrorrhagia
5 Spasmodic dysmenorrhœa
6 Acute and chronic nephritis
7 Gonorrhœa
8 Chordee

第五章 論激腦藥類

此類之藥、服之者、瞳則散大、且激顱腦使之昏譫。

印度麻 CANNABIS INDICA

此藥產於印度、乃由其帶花之梢取出、採藥者務宜加意、因此花有三類、形甚相同、惟本花有效、若取之不以其時、亦無功效。

體功效 服足分劑、令人不能自主、有可笑之小事、則大笑之、可樂之小事、則極樂之、有甚覺憂悶、自以爲將死者、亦有自覺呼吸過大、恐肺經崩裂者、此狀一過、必致沉睡、或睡至十五句鐘之久、方能醒覺、服過分劑者、不曉時之短長、一分鐘、常視爲一句鐘、其腦之兩半球、各主其意、不能符合、若服過大之分劑、呼吸必緩、然卒無因此藥而殞命者、如敷於泗膜上、先覺惹力甚大、後有痲效、因有此惹力、究不可作痲藥用之。

療效 此藥與他類嗽藥並用、以醫乾嗽[1]症大效、且精神如常、無大便乾結之患、系痛[2]症、此爲妙劑、顫攣[3]症、此藥能減其顫患、脬抽搐[4]症、或因脬炎、或因痙症所致、有效、陽痿[5]症、如因腦部所致、與士的年麥奴並用、有效、婦人經絕[6]時、或有頭痛者、有效、如兼有大便結燥、並血虧等症、當與阿羅、鐵類同服、頭痛[7]症、如因視衣疲弱之故、良方如左。

1 Nervous cough
2 Neuralgia
3 Paralysis agitans
4 Spasm of the bladder
5 Sexual impotence
6 Headaches at the menopause
7 Headache

劑而殞命者、乃先停呼吸部、後停他部、其阻心之力、不似哥拉之大、若常服之、則睡效漸減、分劑二十至六十量滴、(1.3-4.0) 置於藥壺內服之、良方如左。

怕拉第亥	R-Paraldehydi	二量錢半 (10.0)
醇酒	Alcoholis (90 per cent.)	一量兩半 (45.0)
凡匿拉酒	Tincturæ vanillæ	半量錢 (2.0)
烝水	Aquæ destillatæ	一量兩 (30.0)
糠漿	Syrupi	四量兩 (120.0) —M.

每半句鐘服一量錢、(8.0) 至安睡而止。

S. A dessertspoonful every half hour until sleep is obtained.

乖效　久服足分劑者、必睏倦無力、步履不穩、若仍服之、則致下身有癱瘓之虞、既中此患、雖止而不用、其患或有日重一日者、亦或有覺系過度者、情形若此、必致胃經受阻、食物難化、且尿減少、色如紅酒、凡此乖效、多因此藥之積效也、服此藥者、每至第二日、精神疲倦、步履不穩、如與瀉劑同服、可免此虞、嘗有服此藥一次而殞命者、亦有常服而殞命者、均因呼吸受阻也、曾有服至百二十厘、(8.0) 並無乖效者、亦有服至千四百厘、(63.0) 幸遇名醫調治、仍得不死者。

台歐那 SULPHONETHYLMETHANUM, U. S. 此藥之功用、與索弗拿同、形若魚鱗、無色無味、嘗之略苦、其大用、乃令人安睡、服後二十、或三十分鐘、即能安睡五六句鐘之久、分劑十五至三十厘、(1.0-2.0) 但服至五六日、宜停二三日、可免積效之患、如大便乾燥、兼服鎂硫強攀方可、此藥水不易化、醇酒能化之、加於湯或茶或酒內服之最妙、常服者、當漸減其分劑、初服此藥、至第二日、每形睏倦、服足分劑者、至二三十日之久、尿含紫色、蓋因血受傷也、如尿色忽紅、立宜止服、當服鎂硫強攀數日、以泄其毒。

怕拉第亥 PARALDEHYDUM. 此藥乃無色之流質、饒之似伊打、嘗之先熱後冷、服之或有惹胃之患、宜置於黑瓶內、嚴密封之、藏於涼處、滾水難化、冷水略化、醇酒易化、服毒分

1 In somnia

牙痛症無效、因牙痛[1]而累及面痛者、有效。

服法　此藥宜製成丸服之、化於水內亦可、分劑每二句鐘服三至五厘、(0.2-0.3)至痛止、或睏睡爲度、曾有一日服六十厘、(4.0)則覺過多者、按一日之分劑、二十至三十厘、(1.3-2.0)足矣。

索弗拿 SULPHONMETHANUM, U S SULPHONALUM, B. P.　此藥由化法而成、無色無味、結晶、冷水百分、或滾水二十分、各能化藥一分、若以醇酒、或伊打、化之最易、尋常之酸、不能改其體質。

體功效　此藥之正感、乃行於顱腦中、與絡部無甚關係、如用大分劑、則有阻呼吸之能。

療效　此藥能令人安睡、不寐[2]者、如心無重症、服之有效、癲症而不得睡者、屢效、其安睡之效、小於哥拉、大於怕拉第亥、人有不寐症、服他類睡藥無效者、服此藥有效、總之其益乃在無阻心之患也。

服法　此藥因水不易化、故多置於藥壺內服之、或加於非蒲漿內亦可、最妙之法、乃加於滾水內乘熱服之、如至水冷、藥則沉澱矣、此藥之效最緩、故服者宜在未睡之前二三句鐘方可、如臨睡服之、當時不能安睡、至第二日、必覺睏倦、分劑二十至四十厘、(1.3-2.6)若服至數日、則宜止而不服、或以他藥代之。

1 Neuralgia due to decayed teeth
2 Insomnia

暈船者、以此藥與鉄氨塩各一分、服之大效、未上船之先二日、每日宜用祛膽瀉藥、既上船、宜以此藥與鉄氨塩各三十厘、(2.0) 空腹服之、當躺卧安睡、醒時自不暈矣。

哥拉瑣 (CHLORALOSE) 此藥乃以一類之哥拉、與葡糖製成、可代哥拉之用、但其味苦辣、若以水化開服之、則易有惡心之患。

體功效 此藥之體功效與哥拉同、然不似哥拉之猛、其正感乃行於顱腦中、服大分劑、脊腦與心經、皆受其阻、或亦有尿血之患。

療效 此藥之大用、乃醫不寐症、分劑二至七厘、(0.12-0.5) 初用時宜服二厘、(0.12) 過半句鐘便可安睡、服時宜置於藥壳內、多以水送下。

乖效 此藥有時令人雙視、肌顫、亦有搓摸其頭者、人中此藥之癮、或正效減少、乖效漸大、**痔**患與瘰症、服之或有痙症之狀、甚至阻其靈性。

布哥拉 BUTYL-CHLORAL HYDRAS, B. P. 此藥之體功效與哥拉同、其止痛之能較大、阻心之能較小、分劑五至二十厘、(0.3-1.3) 加於糖漿內服之。

療效 因疼痛不能安睡者、此藥較哥拉爲宜、面系痛[1]與頭痛[2]、服之有效、如第五對腦系痛、其效尤妙、[3]過用目力之頭痛亦效、頭痛兼惡心者[4]、如非因胃經有病所致、此藥有效、

1 Facial neuralgia
2 Headache
3 Headache due to eye-strain
4 Headache associated with nausea

抽器以士的年一厘之二十分之一至十分之一、(0.003-0.006)或阿刀便一厘之百分之一、(0.0006)射入皮內、後則每二十分鐘、射毛地黃酒十量滴、(0.6)待見效方止、宜使病者身高於首、嘔吐時更不可使之昂首、爲使其血易入腦中生命司所也。

哥拉阿米 CHLORALFORMAMIDUM, U. S. 此藥色白結晶、其味畧苦、水九分、或醇酒一分、各能化藥一分、若化於水內、可久存不壞、其體功效、與哥拉同、但惹胃與腎之能、較哥拉畧小、且阻絡部之力、亦不似哥拉之大、能令人安睡者、因其有平顱腦與脊腦之能也。

療效 凡哥拉能治之病、此藥亦能治之、大有平腦部之力、患不寐症、服後二三刻鐘、即能安睡、兼有止痛之功、系痛症、服之有效、失亞和行而疼痛者、亦效、分劑服十至三十厘、(0.6-2.0)可睡五至八句鐘之久、如一服無效、過三四句鐘可再服之、良方如左。

哥拉阿米	℞-Chloralformamidi	四十英厘 (2.6)
淡氫綠强酸	Acid. hydrochloric dil.	五量滴 (0.3)
糖漿	Syrupi	二英錢 (8.0)
烝水	Aquae	二量兩 (60.0) f℥.

分爲二劑、加水服之。S. Take in two doses in a little water.

皮生癜瘡。

第二十五圖



此圖表明中哥拉毒者、用毛地黃增血壓之力、且增其脉力、

I 因受哥拉之毒血壓甚微、

II 因射毛地黃、血壓加增、

III 血壓與脉力尤增、

乖效　服此藥者、或致惡心、吐瀉等患、因其有惹力也、有服十至十五厘、(0.6-1.0) 其目至顯紅膧者、亦有生癒、或癜、或粒、或團癜、或皰者。

毒力　服毒分劑者必睏倦、不久則昏迷不醒、呼吸先緩而澀、後短而微、其脉先或畧緩、逾時則速如梭、難以診視、面色白紫、頭手皆生冷汗、瞳先縮小、後則散大、全身之肌無力、故不能甦醒。

解毒法　初中此毒者、立與吐劑、並用煖身之法、可以解之、如嘔吐司所業已被阻、則吐藥無效、宜用胃

痓[1]症、或中[2]士的年毒者、此藥大效、因其有阻脊腦動徑之能、用法當以此藥二十厘、(1.3) 與鉃氰鹽六十厘 (4.0) 同服、如有瘈瘲之勢、不能下咽、以此二藥化於糙水內、射入肛門亦可、如因瘈瘲、將藥擠出、當以哥羅芳熏之、俟藥被嚥而止、此二藥之小分劑、即哥拉半至一厘、(0.03-0.06) 鉃氰鹽二厘、(0.12) 加於薄荷消水與糖漿內、可醫孩童[3]之瘈瘲症、亦可醫孩童疳[4]症、若肌跳[5]與顫[6]癱等症、哥拉有效、酒狂[7]服之亦可、然最宜謹慎緣其心已受酒阻、如服之太過、恐再受藥阻、以至殞命、腎[8]炎瘈瘲症、或曰大效、然腎新炎者、不宜服之、恐腎被惹也、產[9]瘈瘲症、如非因腎炎所致、此藥有效、呃[10]逆、夜[11]癇、啼[12]嗽等症、皆可用之、惟瘵症少效、如多用之、有阻心之險。

藥製與分劑

此藥宜加於水或糖漿、或非茜糖漿內服之、但不宜過濃、平穩之分劑、各人不同、約十至三十厘、(0.6-2.0) 均二三次服之、足爲一日之用、有一次服三十厘 (2.0) 而死者、如一日只服一次、二十厘 (1.3) 足矣。

哥拉糖漿 Syrupus Chloral, B. P. 一量錢 (4.0)

中癮 中此藥之癮者、靈才與身力、盡皆減少、有時全身驟然發紅、並有心跳之患、後則

1 Tetanus
2 Strychnine poisoning
3 Infantile convulsions
4 Infantile colic
5 Chorea
6 Paralysis agitans
7 Delirium tremens
8 Uræmic convulsions
9 Puerpural convulsions
10 Hiccough
11 Nocturnal epilepsy
12 Whooping cough

療效 此藥專爲令人安睡、身痛者服之無效、如以十厘、(0.6) 與莫非一厘之六分之一(0.01) 同服、或可使痛者得以安睡、良方如左。

哥拉	R-Chlorali hydrati, U. S. Chloral hydratis, B. P.	二英錢 (8.0)
莫非硫强馨	Morphinæ sulphatis	二英厘 (0.12)
糖漿	Syrupi	二量兩 (60.0)
烝水	Aquæ dest.	加至二量兩 (90.0) M.

臨睡時服二量錢、(8.0) 過一句鐘如無效、宜再服之。

S. Dessertspoonful in water, at 10, and at 11 P. M. if necessary.

又方

哥拉	R-Chlorali hydrati, U. S. Chloral hydratis, B. P.	一或二英錢 (4.0-8.0)
鉄氰鹽	Potassii bromidi	二英錢 (8.0)
洋有李糖漿	Syr. Pruni virginianæ	一量兩 (30.0)
水	Aquæ	加至二量兩 (90.0) M.

臨睡時服二量錢。(8.0)

S. Dessertspoonful at night.

第二十三圖



此圖表明哥拉能阻心肌、如E、

第二十四圖



此圖表明哥拉能阻延腦中之呼吸司所、如F、

腦部　此藥有令人安睡之能、緣其能平腦中之覺所、兼有平脊腦動徑、並全身動系之能、常用之分劑、不阻知覺、過分劑則阻之、小分劑或使皮膚之知覺加增、亦有阻激反應之效、緣其能平脊腦動徑故也。

絡部　健壯者服十至二十厘(0.6-1.2)與此部無甚關係、如服過分劑、血壓必減、脉速而微、因其有阻心之能也。

呼吸部　服中分劑、與此部無涉、毒分劑、呼吸漸緩而促、以至殞命、乃因呼吸先停、霎時而心亦停矣。

身熱度　此藥有減熱度之能、如服毒分劑、乃速其死也、設用毒分劑以灌獸類、用法煖其身、亦可救其生命。

祛　此藥藉腎而祛、服過分劑者、腎經被惹、尿必帶血、或有時含糖。

此藥散、與硼砂散各一分、敷患處亦可、若以此藥一分、加酒十五分、水八十五分、用空針射入皮內、可作該處之痲藥、牙痛[1]患、如以此藥化於丁香油內、以絮蘸之、塞入牙隙有效、或用伊打與此藥各一分敷之、亦效、不能安枕、或系痛[3]者、可以此藥與安替派林各半、置於藥壳內服之、分劑三至六厘、(0.2-0.4)此二藥相合、則成流質、然與藥力無損。

分劑　哥利吞 (Chloretone) 五至二十厘、(0.3-1.3)製成三厘 (0.2) 之丸、外裹糖衣、服之最妙。

哥拉 CHLORALUM HYDRATUM, U. S. CHLORAL HYDRAS, B. P.

此藥於英美揀藥册、雖命名不同、仍係一種、色白、結晶、別具一種氣味、宜置於嚴密瓶內、藏於涼暗之處。

體功效　此藥敷於泗膜、先則畧紅、痛如火燒、後則發炎。

第二十一圖



此圖表明第二圖哥拉有使人安睡之力、因其能平顱腦靈所也、如A圖



此圖表明哥拉有阻脊腦動徑之力、如B、亦有阻動系之力、如C、但不能阻肌、如D

1 Toothache
2 Restlessness
3 Neuralgia

體功效 此藥有平腦安睡之能、亦有時令人昏譫、與絡部無甚關涉、服過分劑、激反應之能必減、非因系幹被癱、乃因脊腦受阻、當用披路加便以解之、因披路加便、乃此藥體功效之敵藥也。

療效 新狂癲等症、如不能睡、服此藥大效、亦可用空針射之、分劑一厘之百分之一、至九十分之一、(0.0006) 因分劑不大、並無異味、故病者易於下咽、有時患狂者、用之無效、或反有乖效、遺精症、臨睡時服一厘之百分之一、(0.0006) 有效、兼有喉症者忌服、恐有喉嚨縮緊之虞、有心症者忌服、緣其有阻心之能也、患痔症者亦忌服、因其有增痔之力也、揀藥册中之此類藥如左。

亥歐辛氫溴 Hyoscinæ Hydrobromidum, 分劑與亥歐辛同。

哥利吞 (CHLORETONE) 此藥乃係新出者、有平腦安睡之能、其效與哥拉同、投以常用之分劑、則無阻心肺之力、不但無惹胃之患、且有平胃之能、此與哥拉不同者也、如因胃經受惹而嘔吐者、有效、胃生疽者亦效、當未熏伊打之前一句鐘、令病者服此藥散十至十五厘、(0.6-1.0) 可免熏後嘔吐之患、胃瘍或胃系痛、此藥能止其痛、且有痲效、並有免腐之能、故可以此藥一兩、(30.0) 脂油九兩、(270.0) 製成抹膏、爲燙傷碰傷之用、或用

1 Insomnia of acute mania or hysteria
2 Spermatorrhœa
3 Vomiting due to gastric irritation
4 Gastric carcinoma
5 Vomiting after etherization
6 Gastric ulcer
7 Gastralgia
8 Burns
9 Bruises

療效 各類抽搐[1]之痛或血壓[2]之力不足、此藥有效、凡顛茄所醫之症、此藥足可代之、乾嗽、啼嗽、痙等症、或較顛茄尤妙、胃泗膜[6]久炎、或胃瘍[7]等症、鬧羊花膏、與銀氰強鬱同服有效、無論成人孩童之遺尿[8]症、如因胱被惹、服之有效、最要者、在用此藥之先、醫者宜令其尿之酸鹼如常、否則不能見效。

藥製與分劑

鬧羊花酒	Tinctura Hyoscyami,	十至四十量滴 (0.6-2.6)
鬧羊花膏	Extractum Hyoscyami. U. S. Extractum Hyoscyami Viride, B. P.	一一至八厘 (0.12-0.5)
鬧羊花流膏	Fluidextractum Hyoscyami, U. S.	二二至十量滴 (0.1-0.6)
鬧羊花汁	Succus Hyoscyami, B. P.	三十至六十量滴 (2.0-4.0)
亥歐賽民硫強鬱	Hyoscyaminæ Sulphas,	一厘之六十分之一至五十分之一、(0.001-0.0015)
亥歐賽民氫塩	Hyoscyaminæ Hydrobromidum,	一厘之六十分之一至五十分之一、
	(0.001-0.0015)	

亥歐辛 (HYOSCINA) 此藥係鬧羊花之質、乃爲流質、泰西所常用者、即亥歐辛氫塩。

Hyoscinæ Hydrobromidum

1 Spasmodic pain
2 Arterial relaxation
3 Nervous cough
4 Whooping-cough
5 Colic
6 Chronic gastric catarrh
7 Gastric ulcer
8 Incontinence of urine

Codeinæ Sulphas, U. S. 緣其易於消化也、又有寇茀印硫强礬、Codeinæ Phosphas, 分劑半至二厘。(0.03-0.12)

體功效 此藥之體功效、與莫非同、但其睡效、不如莫非之大、用足分劑、能令獸類痓而成癱、較莫非尤速、惟阻肺與育道液之能無多、故鮮有大便乾燥之患。

療效 有醫者用之爲平腦劑、亦有用之醫乾嗽症者、無論何類之乾嗽、皆可用之、日服三或四次、每次半至二厘、(0.03-0.12) 加於糖漿內服之、或謂此藥於糖尿症大效、亦有謂少有效者、然遇此症、當試用之、或能有效、宜用甚大之分劑、先服一或二厘、(0.06-0.10) 後當日增一日、待病退而止、曾有一日服至二三十厘 (1.3-2.0) 者、英揀藥册中、另有寇茀印糖漿 Syrupus Codeinæ, B. P. 分劑一至二量錢、(4.0-8.0)

鬧羊花 HYOSCYAMUS, U. S. HYOSCYAMI FOLIA, B. P. 此花產於英美二國、入藥者乃其葉、內含二㼜、一名亥歐辛、一名亥歐賽民、亥歐賽民之體功效、與阿刀便同、能令瞳散大、阿刀便之力、存於眼內半月之久、此藥僅存九日、若欲使瞳散大、宜以此㼜二厘、(0.12) 加水一量兩 (30.0) 用之、有時瞳未散之前、眼忽作痛、乃因睛肌轉筋之故、若遇此患、宜勤用之、使此患速過、惟平腦之力、較大於阿刀便。

莫非肛彈 Suppositoria Morphinæ, B. P. 每彈內含莫非一厘之四分之一、(0.015)

莫非衣必格餅 Trochiscus Morphinæ et Ipecacuanhæ, B. P. 一至四枚、每餅內含莫非一厘之三十六分之一、(0.002)

莫非醋礬消水 Liquor Morphinæ Acetatis, B. P. 十至六十量滴 (0.6-4.0)

莫非射皮內藥 Injectio Morphinæ Hypodermica, B. P. 一至五量滴、(0.06-0.3) 每二十二量滴 (1.4) 內有莫非菓礬一厘。(0.06)

不符之藥 鉄錳上礬、炭匿酸、加沸酸、鉄鈉錏等之礬類、錏類中惟錏氯塩可合用 並鐵氯酒、皆與莫非相敵、不能合用。

赫囉印 (HEROIN) 此藥乃由莫非用化法所成者、形似砂粒、色白、齅之無味、嘗之畧苦、乾嗽症有效、此藥與莫非不同、因其有激呼吸之能、服之者、呼吸畧遲而有力、分劑一厘之二十分之一、至六分之一、(0.003-0.01) 用大分劑、不如用小分劑而勤服之爲妙、此藥不令人昏迷、並不使大便結燥、但不易融化、故多用赫囉印氯塩、如以此藥置於水內、加醋酸少許、亦可化之、且可製丸服之。

寇弟印 CODEINA 此藥乃鴉片之一𤭯、間有含莫非者、所常用者、乃寇弟印硫强礬、

電極不久停於一處、非但皮不受傷、並免其過力、如電器不便、不得不用以上二法耳、又有以冷水潑其身者、但用此法、恐過減其人之熱度、宜謹愼用之。

莫非 MORPHINA 此藥乃鴉片最要之質、其療效詳見鴉片篇、但不常用、緣其不易融化也、今所常用者、乃其塩類等類。

藥製與分劑

莫非硫强類 Morphinæ Sulphas, U. S. 一厘之八分之一、至二分之一、(0.008-0.03)

莫非醋類 Morphinæ Acetas. 同上

莫非綠塩 Morphinæ Hydrochloridum. 同上

莫非菓類 Morphinæ Tartras, B. P. 同上

莫非雜散 Pulvis Morphinæ Compositus, U. S. 十厘、(0.6) 內有莫非硫强類、樟腦、甘草、錯磁强類等藥、受風者服之有效。

莫非氯塩消水 Liquor Morphinæ Hydrochloridi, B. P. 十至六十量滴 (0.6-4.0)

莫非菓類消水 Liquor Morphinæ Tartratis, B. P. 同上

哥羅芳莫非雜酒 Tinctura Chloroformi et Morphinæ Composita, B. P. 五至十五量滴、(0.3-1.0)

而有力、皮熱而乾、面變紅色、瞳則縮小、形狀至此、人若近其耳呼喊之、或力撼之、雖能醒覺、隨仍酣睡、其形狀與顱腦積血者同、漸次面變紫色、呼吸甚遲、每分鐘僅有四五次、先則遲而長、此時遲而短、其肌鬆懈、皮生冷汗、則無法能使其復甦矣、終則其瞳散大、呼吸停止、以至殞命。

解毒法　中此毒者、宜先用鉦硫强礬三十厘、(2.0) 置於溫水內服之、令其嘔吐、待一刻鐘、如不嘔吐、可再服之、若景況甚險、不用吐藥、或用胃抽器、取淨胃中所存之物、尤妙、如毒已陳入血內、血仍將所含之毒、送入胃中、不可專用以上之法祛之、宜以鋏錳上礬一至三厘、(0.06-0.2) 化於一盃水內服之、蓋此藥乃化學中敵鴉片毒之藥也、亦當飲濃熱之加非或茶數杯、因能助其不睡、並有激呼吸絡二部之功也、如呼吸漸緩、可射士的年一厘之三十分之一、至十分之一、(0.002-0.006) 於皮內以激之、倘仍見緩、可再射酒與鉀沘消水、有效、緣其有激心與呼吸之能也、或熱度漸減、當以煖身之法煖之、且因呼吸司所受阻、功用已失、故當常令其呼吸、若聽其沉睡、必致呼吸停止、以至殞命、如用以上各法、仍不能使之醒覺、當以樹之小枝、撻其兩腿、或以二人扶掖而行、可免其沉睡、然此二法究不甚妙、一恐皮膚受傷、一恐過用其力、最妙者、乃以電器激之、使

身和平、但不宜加於前方內、因用時多寡無定也、近有以士的年代此膏之用者、其效尤妙、分劑、一厘之六十四分之一至三十二分之一、(0.001-0.002)製成丸藥、日服三四次、酌癮之大小用之、有重癮者、並當投以索弗拿、台歐那等睡藥、否則不能安睡、恐生返悔之心、且戒煙者之育道、必不能和平、當以合宜之飲食養之方可、外有輔助之法、乃不令其獨自悶坐是也、使數戒煙者同居一室、庶免煩悶之患、醫者宜常看望之、如有熱水袋、可令隨意置於腹上、以止腸痙之痛、可免多服藥之弊、且當以合宜之書籍、使之閱看、亦解悶之一法、如有妥實之人、常與之談論更妙、夜間尤爲緊要。

乖效　有服此藥後、數句鐘之久、不能安睡者、亦有正效已過、惡心或嘔吐者、更有非常之憂悶者、無論服此藥或莫非、若與氯甘油一厘之二百分之一、(0.0003)或鈇氯塩二十厘、(1.3)同服、俱能敵此乖效、若用無臭鴉片、其乖效較少、設或有之、則用加非印或他類激藥、稍能解釋、有服此藥後、皮膚作癢、或生瘢、後則皸脫者、孩童服之、多有乖效、曾有用莫非一厘之八分之一、(0.008)射入皮內而殞命者、必因射入盂內之故、然此乃罕見之事。

毒力　服此藥之毒分劑、初覺恬然、過片時則睏倦、後則沉睡、且呼吸遲而甚長、脉則遲

有流淚鼻涕、以至抽搐、瀉腹等患、且脉微細難診、中癮者、雖素誠樸、必致性情改變、誆哄欺瞞、無所不至、有人欲斷此癮、求醫家治之、必多有遮蓋隱瞞之情、扶侍斷癮者、務用平素妥實之人、晝夜留心、恐有竊食煙泡與灰之事、如忽有精神、醫家必疑其別有情形矣。

戒法　戒鴉片乃世界之難事、因必有系痛、嘔瀉、腸疒、抽搐、吐痰、鼻涕、流淚、煩悶、遺精、血薄、不安、不寐、身痛、不思飲食、生命司所受阻等患、以上諸患、雖不能免、醫者若先投以瀉劑、再以合宜之藥治之、必能減少其苦、良方如左。

貴林硫强鬱　R-Quininæ sulph.　一英兩　(30.0)

易化鐵硫强鬱　Ferri phosph. solub.　一英兩　(30.0)

阿刀便硫强鬱　Atropinæ sulph.　一英厘　(0.06)

共成二百五十丸、日服三至六丸、酌癮之大小用之。

Fiant pilulæ No. CCL. S. Three to six pills daily.

另有印度麻膏、製成丸藥用之、每丸內有此膏一厘之四分之一、(0.015)　此丸能使人

無臭鴉片酒 Tinctura Opii Deodorati, U. S. 十至三十量滴 (0.6-2.0)

鴉片葡酒 Vinum Opii, U. S. 十至三十量滴 (0.6-2.0)

鴉片醋 Acetum Opii, U. S. 十至三十量滴 (0.6-2.0)

以上各藥、除鴉片樟腦酒、皆有鴉片十分之一、故分劑相同。

鴉片表散 Pulvis Ipecacuanhæ et Opii, U. S. Pulvis Ipecacuanhæ Compositus, B. P. 五至十厘、(0.3-0.6) 內有鴉片散一分、衣必格散一分、乳糖八分。

衣必格鴉片酒 Tinctura Ipecacuanhæ et Opii, U. S. 五至十五量滴 (0.3-1.0)

鴉片流膏 Extractum Opii Liquidum, B. P. 五至三十量滴 (0.3-2.0)

鴉片雜散 Pulvis Opii Compositus, B. P. 二至十厘 (0.12-0.6)

鴉片錘洗酒 Tinctura Opii Ammoniata, B. P. 三十至六十量滴 (2.0-4.0)

鹹雜丸 Pilula Saponis Composita, B. P. 二至四厘 (0.12-0.25) 此丸內亦有鴉片。

鴉片擦藥 Linimentum Opii, B. P.

鴉片貼膏 Emplastrum Opii, B. P.

中癮 吸鴉片者、久必成癮、食之亦然、成癮後、必日增一日、不然、內則煩悶、外則疲乏、兼

有乖效、雖莫非、寇第印、於此症俱效、但不如此藥之妙、患糖尿者、最易動怒、皮膚作癢、並累覺飢渴、若服此藥、可減以上諸患、曾有患該症者、一斷此藥、則昏迷不醒、以至殞命、患泗瀉症者、宜先服蕓麻油、或鎂硫强馨、瀉淨腸內之泗液、後服此藥、有效、孩童暑瀉症、若以莫非一厘之八十分之一、至五十分之一、(0.001) 射入皮內、或有立效者、若不用射法、服鴉片樟腦酒亦效、總之止痛莫妙於莫非、止瀉莫善於鴉片。

藥製與分劑 近有人查明此藥與其瓶、皆有阻胃生液之能、服之則胃液之氫綠酸必減、胃中所存之食物、不易消化、故必飯後二三句鐘服之、最妙。

鴉片散 Pulvis Opii, U. S. 一厘之四分之一至一厘 (0.015-0.06)

鴉片砂藥 Opium Granulatum, U. S. 一厘之四分之一至二厘 (0.015-0.12)

無臭鴉片 Opium Deodoratum, U. S. 一厘之二分之一至一厘 (0.03-0.06)

鴉片丸 Pilulae Opii, U. S. 每丸內有鴉片一厘 (0.06)

鴉片膏 Extractum Opii, 一厘之四分之一至二分之一 (0.015-0.03)

鴉片樟腦酒 Tinctura Opii Camphorata. U. S. Tinctura Camphorae Composita. E. P. 一量錢至半量兩 (4.0-16.0)

鴉片酒 Tinctura Opii 十至三十量滴 (0.6-2.0)

1 Mucous diarrhœa
2 Summer diarrhœa, of children

S. Dessertspoonful at 9 P.M. and, if needed, again at 10 or 11 o'clock.

腸熱與肺炎症或有不能睡者、以莫非射入皮內、可使之安睡、但不如以冷水沐浴爲妙。

止炎　此藥有止炎之功、此功爲人所難解、如潤膜炎之諸症、即腹統膜炎[2]、顱腦衣炎[3]、心統膜炎等症、此藥之足分劑、或微分劑、皆效、近有謂腹統膜炎症、未必有效者、咳血[5]後之乾嗽、與尋常之乾嗽、以莫非一厘之十二分之一、(0.005) 加糖漿服之、有效、痘[6]熱症、如皮膚作癢、此藥可止之、脬炎[7]淋漓刺痛、或肛炎[8]等症、以鴉片膏一厘之四分之一、至二分之一、(0.015-0.030) 製成肛彈、用之有效、人患嘔[9]吐、除因服此藥而致者、可以無[4]臭鴉片酒三十量滴、(2.0) 加糖水四量兩、(120.0) 鈉氫鹽四十厘、(2.6) 射入肛內、大有功效、肌痺[10]、受風[11]等症、如以鴉片表散五至十厘、與熱茶同服、並將其兩足浸於熱水內、甚效、筋扭[12]或跌打傷[13]、(或稱痛傷) 以鴉片鉛水敷之最妙、如皮已破、只敷鴉片酒可也、無論內外燙傷[14]、此藥有止痛之功。

液多諸症　糖尿[15]、盎瀉[16]尿過多[17]或他類液生過多等症、此藥有效、惟汗過多症無效、或謂醫糖尿症、此藥先減其尿、後減其糖、但當日加其分劑、否則難以見效、此等病人、少

1 Persistent insomnia of typhoid fever or pneumonia
2 Peritonitis
3 Meningitis
4 Pericarditis
5 Hæmoptysis
6 Small-pox
7 Strangury
8 Rectal inflammation
9 Excessive vomiting
10 Muscular rheumatism
11 "Colds"
12 Sprains
13 Bruises
14 Burns
15 Diabetes
16 Serous diarrhœa
17 Diabetes insipidus

茄並用大效、如以莫非與阿刀便射入皮內、其效尤速、此藥當痛時服之、不似常人易中其毒、人當痛極之時、倘不可以射莫非、宜將莫非、以熱水或酒化服、依以上之法、用鴉片酒亦可、若不能用以上之法、可以鴉片流膏、或鴉片酒與糟水、射入肛內、有效、如痛在小腹內、或用射肛之法、或以鴉片肛彈、納入肛內、最妙、髖大系痛、或肌抽搐、最善之法、乃以莫非射於痛處之皮內、如痛處甚大、只在皮內、可用布蘸鴉片鉛水、覆之有效、常患痛症者、用之最宜著意、恐致病者久服成癮。

睡效　此藥雖有令人安睡之效、但非因疼痛不能安睡者、不宜用之、如不能不用、宜以哥拉、印度麻、與此藥遞換用之、可免成癮之患、有服哥拉與莫非之小分劑則安睡者、良方如左。

莫非硫強鬱	Ez-Morphinæ sulph.	二英厘 (0.12)
哥拉	Chlorali hydrati	一英錢 (4.0)
糖漿	Syrupi	一量兩 (30.0)
烝水	Aquæ dest.	加至二量兩 (60.0)

晚九句鐘服二量錢、(8.0) 如不見效、十或十一句鐘可再服之。

1 Sciatica
2 Muscular spasm

夫脉遲者、乃因顱臟腑系之本末受激也、有力者、乃因心肌與結受激也、血壓之力畧增者、或因心經受激耳、服毒分劑者、脉必漸速而微、此因心與司絡腦所受阻、亦因呼吸司所受阻、蓋缺氧之故也。

呼吸部　此藥之微分劑、或有激此部之力、毒分劑、其力足使此部受阻、令人殞命。

身熱度　此藥之足分劑、可畧增人之熱度、毒分劑、乃減人之熱度。

腦廢　此藥有護腦之能、故用之者、所祛之尿腥基、肌肉之渣滓較他人必少。

祛　服過分劑、由大小便可祛數分、其大半於肝經內被氧改變。

瞳　此藥在腦內、能激動眼系、故使瞳散大。

第二十圖



此圖表明鴉片有使人安睡之能、因其阻顱腦中之靈所如A、其能止痛者、乃因阻顱腦中之覺知司所如B、

腸胃液　此藥能阻腸胃之運動、故其液減少、大便乾燥、雖能阻身內各液、而不能阻汗。

療效　此藥乃止痛[1]之妙劑、惟醫腦系痛症、安替派林藥類、與此藥之效同、且無乖效、但大腦炎[2]症、不可用之、新顱腦衣炎症、或因受傷、或忽得此症、此藥有止痛之功、腎肝疳經痛[4]等症、與顛

1 Pain
2 Meningitis
3 Renal or hepatic colic
4 Dysmenorrhœa

第四章　論睡藥類

此類藥能令人安睡、亥歐辛雖係鬧羊花之蘗、但鬧羊花無令人安睡之能、亥歐辛則有之、故論此蘗於本章也。

鴉片 OPIUM　此藥產於印度波斯土耳其中國等處、乃係罌粟之汁、每百分內、必含莫非九分、方爲合宜、若鴉片散、每百分中、必含莫非十三至十五分、方爲合宜、其中所含之蘗、分爲十七種、最要者、乃莫非與寇第印。

體功效

腦部　此藥有平顱腦之力、亦有激脊腦之能、服小分劑、可平此部、足分劑、能令人酣睡、亦有此部受激、而不安靜者、又有此部雖平、而不酣睡者、試以此藥射於蛙身內、因脊腦受激、常有痙攣似痙之狀、試再以此藥射於犬身內、激反應之力必增、並有睏倦之狀、孩童服之、其平力行於顱腦、激力兼行於脊腦、腦中平激之力相等、故不能安睡、若服過分劑、無論人或獸、必致顱脊二腦受阻、令其睏睡、覺系少有知覺、動系止而不動、以至殞命。

絡部　此藥之小分劑、與此部無甚關係、大分劑、能使脉畧遲而有力、血壓之力畧增、

熗氯塩 (ETHYL CHLORIDE)

此藥乃以醇酒與氫氯酸、相合而成、味似伊打、其氣易散、如置於噴霧具內、噴於患處、則有痲效、因其有凍腐之力也、如吸此藥之氣、必至迷蒙、孩童用之、乃三十至四十五量滴、(2.0-3.0) 成人六十至七十五量滴、(4.0-5.0) 初用時不宜太驟、勿令空氣屬入、不然則無效、宜用嚴密之熏具、具內置綿少許、滴藥於其上、如熏具不便、可用溜筒、見第十九圖 合於病者之口鼻、以手握嚴、恐有罅隙處而空氣屬入也、越片時、可令空氣畧入方妥、售此藥者、常置於玻璃管內、管之兩端、扣以螺帽、用時去一螺帽、以手握管、藉手之熱度、令藥噴出、熏至數分鐘、即有迷蒙之勢、或謂吸藥者、脈與呼吸、皆無異於尋常、熏一二量錢、(4.0-8.0) 迷蒙之效、可存五至十分鐘、如欲迷蒙之效久存、則宜多用、但受熏者、瞳與瞭之激反應之力、至終仍存、孩童不然、如用之以懈肌力、則不合宜、去熏具後、病者甦醒甚速、且少乖效、然偶有嘔吐者、此藥入藥、年代不久、故用之者少、但用者謂爲穩固之迷蒙藥、因價甚昂、故人不欲用之、有醫者查考、吸此藥者、二千五百五十人中、殞命者一人、亦有醫者查考、千六百人中、殞命者一人、或言此二人之殞命、乃因心經有症之故。

存於黑玻璃瓶內、如藥質純淨、且用之合宜、決無乖效。

體功效　此藥之阻力、只行於呼吸部、如不用之太過、此部亦不受阻。

療效　此藥用爲割小症之迷蒙藥最妙、（如割癤放膿等類）不可用之以割大症、因吸之過多、呼吸受阻也、婦人分娩時、吸之可減其痛、蓋因此藥之力、去之甚速、較吸他類迷蒙藥、少有產後流血之患、其擅長者、只用數吸、其效即顯、並鮮有乖效、熏後或有似痙抽搐者、然片時即止、少有嘔吐之患、或口存蒜味數日之久、或云亦有熏此藥而殞命者。

第十八圖

此具用時去一螺帽則藥氣噴出

第十九圖

此圖表明如何用溜筒爲熏具

用法　以四十五量滴至三量錢、(3.0-12.0)傾於布上、或熏具上、合於病者之口鼻吸之、此分劑足能令人迷蒙、不可如哥羅芳漸次滴用。

藥之險、較疼痛之險爲輕也。

乖效並治法　熏此藥而有危險者、多顯於男、少顯於女、每六人中、或有婦女一人、熏此藥時、心經或呼吸偶有停止、有未停之先、面色變青者、亦有並無顯兆者、如遇此等乖效、務當止熏、並用代引呼吸之法、宜射伊打、與伯蘭地於皮內、但當均開用之、且宜以間流電池之兩極、磋磨其身、最要者、不可將此二極、久停於膈或膈系之上、又宜上提其腿、下垂其頭、若倒懸之狀、（見第十三圖）用布捲纏其腿、亦當擠按其腹、使血流入心腦二處、更當以阿刀便、士的年毛地黃、射入皮內、此數藥能激絡與呼吸二部、其中最要者、乃士的年、若以腎上腺線鹽射之、亦效、用代引呼吸法時、如有人以鉗上提其舌、每分鐘十至十四次、亦爲激膈之法、曾有人形狀似死、僅搓摩其前心、乃得復甦、倘遇乖效、醫者當以耐心待之、不可輕易絕望、如用以上之法救之、過一句鐘之久、則無望矣、熏後而嘔吐者、每百人中約有十五人、然不足爲險。

燈氣塩（ETHYL BROMIDE）　此藥乃以醇酒、硫强酸、鈹氣塩相合、烝之而成、係無色之流質、味香如哥羅芳、以試紙試之、其色不變、其氣易散、不散者不入藥用、傾於掌上、散後如仍存似油之痕跡、必非佳者、則不可用、此藥不宜見光與空氣、燈光亦能改變其氣、常

啦芬大雜酒 Tr. Lavandul. Comp. 加至三量兩 (90.0)

每二十分鐘服一量錢 (8.0) 至四次而止。Dessertspoonful in water every twenty minutes for 4 doses.

盟瀉症先服瀉藥一劑後用哥羅芳酒與鴉片並斂藥類同服大效腎肝二經之疼[2]覺此藥數次不但病可暫瘉且因有解抽之力亦或可除病根若以此藥加擦藥類內其效尤妙腰痺[3]與系痛[4]等症擦之有效。

藥製與分劑

哥羅芳擦藥 Linimentum Chloroformi

哥羅芳水 Aqua Chloroformi U. S. 半至二量兩 (16.0-60.0)

哥羅芳酒 Spiritus Chloroformi U. S. 二十至六十量滴 (1.3-4.0)

哥羅芳勻藥 Emulsum Chloroformi. U. S. 二至四量錢 (8.0-16.0)

哥羅芳莫非雜酒 Tinctura Chloroformi et Morphinæ Composita, B. P. 五至十五量滴 (0.3-1.0)

禁用之狀 心變脂心痕腺瘤等症與有熏藥之癖忌者忌用有心門病者如謹愼用之尙可然不若用伊打爲妥有以上諸症或兼有當割之症用迷蒙藥較不用爲善因用

1 Serous diarrhœa
2 Renal or hepatic colic
3 Lumbago
4 Neuralgia

五分、藥氣五分爲最當、故宜漸次滴之、若用之過猛、難保無險、如與氣兼用、而危險較少、熏時宜切記者有五、一熏具內宜置食水絮些須、滴藥於其上、二病者宜躺臥牀上、鬆其衣帶、令呼氣於熏具之內、熏具距鼻之遠近、以自然之呼吸爲準、三宜令病者有自然之呼吸、漸次受藥、不可猛吸、此爲最要、四如呼吸不能出於自然、因空氣不足之故、宜暫行停止、容其得吸空氣、而後熏之、五病者已至迷蒙時、瞭無知覺、肌亦鬆軟、或有鼻鼾者、在鼻鼾時、瞭或仍有知覺、則宜止熏、過數秒鐘、瞭則自無知覺矣、如人屢經受熏、再熏時、仍當謹愼如初、蓋被熏而殞命者、多在未至迷蒙時、爲人所不料、未熏時、先以阿刀便射入皮內、或用腎上腺、亦可能免絡部舒鬆之患、用阿刀便尤妙、用此法於不易受熏者、實有功效、健壯者熏此藥、如不安帖、較虛弱者尤險、因其全身用力、則呼吸甚大、絡部或至忽然受阻、服此藥者、口與胃覺有熱力、曾有服之過多而殞命者、乾嗽[1]症、以哥羅芳酒、或哥羅芳水、與他嗽藥並用、大效、腸胃脹[2]症、用此藥一至二量滴、(0.06-0.12) 或哥羅芳酒十至二十量滴、(0.6-1.3) 有效、各類之腹痛症、良方如左。

哥羅芳酒	R-Spt. Chloroformi	半量兩	(16.0)
樟腦酒	Spt. Camphoræ	二量錢	(8.0)

[1] Nervous cough
[2] Flatulence

第十七圖



此圖與第十六同惟以手按其前胸令其肺縮緊能呼氣也

第十五圖



此圖表明宜如何扶病者之頭使之易於呼吸如此提上會壓且使腭簾離舌則氣易於入肺

第十六圖



下垂病者之頭兼用代引呼吸之法將病者之腿上提以手擠其兩肋使之胸膛向前令其肺脹能吸氣也

第十四圖



此具與拉來氏之熏具同、內係白氈、外係牛革、革有小孔、以滴哥羅芳、置雞毛於小口、以試病者之呼吸如何。

多不安帖、恐血囊或血腦有崩裂之虞、成人或孩童、若已有氣腦炎症、此藥較伊打合宜、因其少有惹泗膜之力、若遇須剖開髏骨之症、此藥最妙、如用伊打、病者嘔吐時、腦衣必多有積血之患、若遇須割總氣腦症、宜用此藥、勒症、以此藥熏之、或能收縮、因人至迷蒙時、其肌鬆軟也、婦女分娩時、熏此藥少有乖效者、其故有四、一因常用者乃小分劑、二因婦人至此時、心經畧長、多能敵此藥之毒、三因婦人當此時、必樂熏迷蒙藥、並無懼心、四因產痛激發司絡腦所、此藥少有阻之之力、孩童啼嗽症、滴此藥數滴於掌上、鼴之有效、倘病重日久、最宜謹愼、因此症使心經鬆軟、難敵此毒、故必滴於掌上鼴之、可免多用之患。

有心症、伊打較此藥妥善、若兼有腎症、此藥較伊打妥善、緣其分劑較小也、如兼有血囊、或脉變壞症、用此藥熏之最妙、因其有阻心之能、而伊打有激心之力、故受熏者、

用法　熏此藥者、用手巾一塊、距鼻三四寸、漸次滴下、如有熏具尤妙、熏時空氣宜九十

1 Strangulated hernia
2 Whooping-cough

習用此藥者、較用伊打、多有危險、然亦多有裨益、用之較少、而其效較速、且其味不惡、於氣脘喉嚨、並無惹力、熏後少有嘔吐者、此藥用爲迷蒙、雖不如用伊打之穩妥、然習用者、無甚危險、但熏時宜留意其呼吸、視人呼吸之大小、則知用藥之多少、緣熏之過多者、先停呼吸、後停心經、乃其常理、用藥之室、宜多有清氣、倘熏時呼吸不正、或身不安帖、宜暫停止、如特有一診脉者、專司其脉、以便熏藥者、專視其呼吸更妙、如病者兼

第十二圖

此圖乃厄司馬克氏第之熏具、與哥羅芳瓶、十熏具係銅絲架、覆之三以布、將瓶內哥羅芳、圖滴於其上。



此圖乃拉來氏之熏具、以竹四片相合而成、以絨覆之。

所受阻、血腔鬆軟、且因坐熏、則血更難運至生命司所也、遇此險狀、如以鹽消水射入

第十一圖



此圖表明熏哥羅芳時、用脈針顯出脈與血壓如何受阻、第一行、畧顯血壓之力減少、第二行、尤顯血壓之力減少、第三行、血壓之力全無、至此則脈甚微、呼吸在X時停止、而心仍舒縮、然血壓之力、必先衰微、後顯於脈、再後顯於呼吸、末後心則停止。

盂內、無甚功效、因其愈射鹽水、盂鬱愈鬆也、宜在未熏之前、射阿刀便於皮內、使司絡腦所、少受其阻、因阿刀便爲最能激此部之藥也、如因受傷流血過多、宜用布帶纏其兩腿、如脈微細、宜用擠腹之法、總之無論何症、熏時不可墊高其首。

身熱度 熏此藥時、人之熱度、必漸減少。

祛 此藥由肺腎而祛、如腎經祛之過多、則易於發炎。

療效 此藥之大用、乃在迷蒙、不

盾醫院、則謂因心經被癱之故、故熏時惟著意診脉而已、泰西各國、多有醫者考驗此二論、前二十餘年、印度亥德拉巴之總督、招集著名醫生、仍復考查、以倫盾名醫主理其事、此醫始以前次考定者爲非、終則又以爲可信、遂明言被熏而殞命者、大半因呼吸被癱、亦或有因心經被癱者、仍多有醫者、不服此理、該總督又請倫盾名醫二人、美國名醫一人、即著此書者復行查驗、務須盡致、令人無不佩服、考查多日、其識見只有一事相同、乃謂熏時司絡部受阻、以致血壓之力、大爲減少、而英之二醫、復以爲心經受阻之故、究之被熏而殞命者、非因心經受阻、亦非因呼吸受阻、實司絡腦所受阻、致使其人之血、散佈週身之細脉與盪、以致生命司所無血、如放出然、若人身之脉與盪舒鬆、則能容血至數倍之多、如不服此理、當思用塩消水射入血脉時、若絡部鬆軟、雖所射者、較血多至數倍、而血壓仍不見增、因盪與盪舒鬆、則能容水甚多也、故熏此藥時、亦因絡部鬆軟、血多積於盪盂之內、致使心經空虛、可知其人殞命、非因心經呼吸受阻、實因生命司所無血、致使各部挨次被癱也、可引一據、證明此理、如熏犬至呼吸停時、使其頭下垂、手擠其腹、令血流出大盂、入於心腦二處、並用代引呼吸法、則可救之復生、曾有名醫、以此法救過性命若許、泰西之醫報、屢言人坐熏而殞命者、因其司絡腦

也、然亦有心先停而殞命者、若以此藥敷於動覺二系、有效、然醫者不用之爲痲藥、因其惹力過大也、其效與系幹無關。

呼吸絡二部　此藥自用爲迷蒙藥、直至於今、其所以能感此二部者、醫家所論不同、厄丁布耳醫院、論人被熏而殞命者、乃因呼吸部被癱之故、故熏時當於此部留意、倫

第七圖



此圖表明熏哥羅芳受阻之效司絡腦所受阻如A心經受阻且鬆大如B呼吸司所受阻如C

第八圖



此圖表明哥羅芳迷蒙之效、阻腦內覺知司所如A後阻靈司所如B再後阻動司所如C

第九圖



此圖表明熏哥羅芳先阻脊腦覺徑如D

第十圖



此圖表明後脊動如E

將白灰撒於其內、合勻過淋、倘尚有雜質、再以此法過之、便可用爲熏藥、試以此藥傾於掌上、乾時觀之、若有油味、必其製法不善、不可用爲熏藥、此藥必須淸澈如水、以試紙投於其中、終不改色、置於掌上而無惹力、傾於表鍋內、必散之無餘、且無存味、其重率乃 Specific gravity 1.401-1525 如加銀氰强礬、而無沉澱、加鋏沎熱之、而無古銅色、加濃硫强酸合勻、雖有灰色而不甚深、如此方可用爲熏藥、如夜晚熏人、室內有煤氣燈、亦能使此藥之氣、變爲氯與鐵氯酸、必致病人之氣脂受惹。

體功效　此藥敷於皮膚、或微有熱力、以表鍋覆之、該處必起皰、人熏此藥、口內覺煖、厥後全身之肌力必懈、再後則無知覺、肺之呼吸、先大而長、後則漸急而短、或有因腦部受激、而脉力加增者、過片時、脉速而力減、此藥無惹緊口腦系之力、故初用時、罕有停呼吸之患、但其瞳、先則畧散、至迷蒙時、乃復縮小、如再散大、乃爲險兆、恐驟然而死、熏此藥時、或有手舞足蹈之勢、而强壯與嗜酒者、尤易有之、若遇此狀、仍勤熏之、不爲無險、總之以此藥熏人、不可散盡其肌力也。

腦部　此藥之正感、先行顱腦、後則脊腦覺動二徑、延腦覺動二徑、挨次受阻、若延腦動徑、受阻過甚、其人必致殞命、蓋司絡腦所既受其阻、呼吸部亦必因之被癱、乃常理

炭尼利、並伯蘭地之小分劑、或免此患、如與氰同用、亦爲免此患之法、孩童與虛弱者、熏後或有氣脘炎症、此多因受寒而致、非盡因泗膜受惹也、亦有熏後患肺炎症者、或因此藥激惹之能力所致、然多因嗓口失其功用、令食物或血入肺所致也、未熏之前、口宜漱淨、熏後不可下咽口中之液、或有熏後而小便不利者、惟割腹中之病多有之、此乃險兆、如射氰甘油於皮內、射似盟塩消水於肛內、或可治之、若腎經無重症、且熏之不多、則與腎無傷、有名醫云、腎經之病、若不至垂危、亦可用之、有糖尿症者忌用、如用之、恐不復甦、孩童或年邁者、熏後氣脘泗膜、過於生液、致難呼吸、乃常有之患、如遇此患、宜用阿刀便之足分劑、射入皮內、有效、或有熏後而患單癱症者、非因此藥之故、乃因迷蒙時、該處之系被壓、致失功用、如用善法、亦可調治之。

哥羅芳 CHLOROFORMUM,

此藥初製於美國、俗革蘭之名醫、始用之爲迷蒙藥、係無色之流質、味熱而甜、齅之畧香、氣最易散、且有免腐之能、分爲二種、一純者、一不純者、不純者不入藥用、此藥宜存於冷暗之處、如置於透光處、不久有變爲碳氯氯塩與氯氯酸及氯者、則不可復用爲熏藥矣、如欲試此藥、可以藍試紙、蘸於藥內、若已變成氯氯酸、此紙必變紅色、如以銀氰强礬、置於其內、若已變氯、則有白澱、如欲去淨藥內所變者、可

千五百五十三人內、被熏而殞命者、有二十五人、是每萬六千三百零二人中、有一殞命者也、如用之過分、有時令人面顯紫色、亦有頸盂如脈脖之舒縮者、此因血內缺氣、與心經鬆軟之故、亦有時心經或呼吸驟然停止、然不多見、被熏而殞命者、多因其心或腎有重症之故、熏此藥者、血壓必增、亦有因之中瘋者、然亦無幾、如遇以上各患、宜立止而不熏、並用代引呼吸法、如面顯白色、宜令其身高於首、若面色紅紫、不可如此、因紅紫乃停呼吸之兆也、至此形狀、當以士的年阿刀便毛地黃等藥、用空針射於皮內、如果甚險、可以鹽滷消水、射入盂內、雖見效甚速、而危險較大、或有用伊打射之者、雖有時見效、究不合當然之理、因其人已受此藥過多、再以此藥射之、不更險乎、其所以見效者、乃因曝內積痰、或初用此藥時、熏之過猛、少得空氣、以至呼吸受阻、非因熏之過多也、若射酒於皮內、以醫此患、亦不甚妙、因其效與此藥相同、如能用以上所言之藥、酒則不必用矣、並當搓摩其身、使血運行、亦當溫煖週身、且膈爲呼吸最要之肌、每分鐘當上提其舌十五次、此乃激膈之妙法、並宜用此藥澆其胸、使有激反應之呼吸、因此藥較冷水尤冷、故激反應之能力更大、並免濕病者之衣、熏此藥亦有嘔吐不止者、故於未熏之先、當令病者十二句鐘之內、勿進飲食、熏後可食冰塊些須、與阿司

熏此藥有效、他類肌抽搐之患、亦可用之、有醫者云、腎炎腦中毒症、如用足分劑、或服或射皮內、有效、倘心經或呼吸受阻、此法尤妙、勒[2]瘂症、可以此藥熏之、緣其有鬆肌之能、醫者或可上推其瘂、令腸復原、有畏服魚肝油者、如以此藥二十滴、(1.30) 用冰水送下、或滴於藥壳內、與魚肝油同服、或服油後、一刻鐘服之皆可。

第六圖



此圖係阿拉色熏具

藥製與分劑

伊打 Ether, 三十量滴至半量兩、(2.0-16.0) 如不用冰水或藥壳服之恐難下咽、緣其氣有過激喉門之力也。

伊打酒 Spiritus Ætheris, B. P. 一至二量錢。(4.0-8.0)

禁用之狀 人患氣腔炎、或腎新炎症、不宜用之、緣其激力過大也、腹統膜炎或胃炎症、亦不可用、因其有令人嘔吐之患、血囊與脉變壞症、仍不可用、緣其有增血壓之力、恐致血腔崩裂、糖尿症亦不宜用、恐其人不能復甦、血虧症、如紅朕紅腥缺半者、用之亦不妥善。

祛 此藥由肺、腎、而祛。

乖效 此藥較哥羅芳雖爲穩妥、然未嘗無險、有醫者業已查明、用此藥於四十萬零七

1 Uræmia
2 Strangulated hernia

熱九度、若人受熏過重、一句鐘則減熱四度、因其腦部受阻也。

療效　此藥若作迷蒙之用、則宜熏之、如無熏具、當以手巾硬紙各一、捲作漏卮之形、小口置海絨、滴此藥於其上、大口合於口鼻熏之、若遽然合之太嚴、其人或生懼心、或形氣悶、如漸次合嚴、則免此二患、至能受時、宜急用之、可令藥氣少與空氣雜、此等用法、與用哥羅芳廻乎不同、宜防此藥與其氣入病者目內、緣其有惹目之力也、如以濕布覆於目上、可免此虞、熏此藥之具甚夥、最合用者乃阿拉色所製、近有醫者、以熏哥羅芳之具、（見下圖）合於病者之口鼻、滴此藥於其上熏之、但用時宜連滴不止、否則病者必立即甦醒、此法見效甚速、且少有危險、其長處、乃在吸之之時、藥與空氣相雜、不易中毒也、此藥與氯如何用法、詳見氯篇、未熏藥前、病者於十二句鐘之內、當勿進飲食、則熏時與熏後、可免嘔吐之患、熏時口內不可含易咽之物、恐入氣腔、以致殞命、有醫者以此藥與酒及哥羅芳相合熏之、非爲妙法、如以此藥置於噴霧具內噴之、能令割處甚冷、可作痲藥之用、如欲用針刺腹或胸、此法最易、皮系痛症、用此法冷之、有效、此藥亦可作服藥、孩童或成人之疼[1]或腸胃脹[2]等症、服之有效、而伊打雜酒尤效、腦力脫[3]失症、如心力虛弱、此藥合宜、或射或服或熏皆可、較用炭氣弱鬱、見效或速、呃逆[4]症、畧

1 Colic
2 Flatulence
3 Collapse
4 Hiccough

第四圖



此圖表明熏伊打者因經挨次受阻而成迷蒙之功顱腦知覺之功用如（A）靈之功用如（B）動之功用如（C）脊腦覺徑如（D）脊腦動徑如（E）

第五圖



此圖表明上提其舌令曾厭離嗓口使空氣易於入肺之法

非緣其變血、或攺腦部之元養、且與系幹並無關涉。

絡部　此乃激心之藥、效來甚速、而去之亦速、因其有激心與司絡腦所之力、能使脉速而力增、如用之過多、則心經受阻。

呼吸部　人初吸此藥時、因喉與肺之系末過於受激、其呼吸必不安舒、膈與胸之動法、異乎尋常、熏此藥未至割治時、其喉尚有激反應之力、如緊不甚通暢、膈必縮緊、骾肌向內而凹、腹內各臟、被逼而下、見此形狀、須上提其頷、令緊通暢、使空氣多入肺中、雖腹內各臟未盡如初、然較前大有裨益、骾肌如常矣、如仍用此藥、呼吸止在胸間、膈必鬆而不縮、亦有過鬆者、吸氣時、膈則上凸、並上引腹內之各臟、而顛倒腹間呼吸之動法、此乃激呼吸之力、多行於司膈之司所、若用之太過、此司所先被癱矣、醫者熏此藥時、宜視膈與胸之動法、並瞳之大小、且宜勤診其脉、此皆緊要之理、如膈停而不動、乃險兆也、若欲再用此藥、務須謹愼、蓋因此藥而殞命者、膈先被癱、胸則補膈力之不足、及胸被癱、頸肌又補胸力之不足、至終頸肌被癱、則殞命矣、總之用之適中、乃能激發呼吸、若過用之、則呼吸司所被癱。

身熱度　受此藥而迷蒙者、如時刻過長、必至熱度減少、試以此藥熏犬、一句鐘必減

之、血壓必增、恐有中瘋之患。

伊打 ETHER 此藥之純者、乃伊打九十六分、醇酒與水共四分所成、不純者、不用爲熏藥、英之純伊打、則無酒水**釐**雜、製法、將醇酒與硫强酸相合而成、乃無色之流質、其氣易散、別具一種烈味、嘗之有熱力、易於燃着、故用時宜去燈火五尺、緣此藥之氣、較空氣沉重、故割症室中之爐火、必高過割症之案方可。

體功效 此藥之功效、最速而短、其力多與酒同、較酒力尤速、若置於皮膚上、該處必覺甚冷、故醫者可用爲一處之痲藥、如以此藥或其氣、置於泗膜上、惹力甚大、當人被熏之初、大半呼吸被噎、故面與目必發赤、有欲避之狀、然不久即過、則帖然矣、及至呼吸甚長、脉畧速而有力、眼之激反應仍存、此勢一過、其人仍有嚷鬧辱罵、或喜笑哀哭、或惱怒尋鬪等不安之勢、此等情形、各人不同、有時必須用力管束方可、如仍用此藥、越片時則靈性無覺矣、至此即宜割治、如未至此時而割治者、其人決不安帖、但用此藥時、不宜散盡肌力、若一散盡、則呼吸之肌、必受其阻、以至殞命。

腦部 此藥之功效、先行於顱腦之中、後行於脊腦、覺動二徑、延腦覺動二徑、如用毒分劑、必至呼吸司所被癱、因而殞命、夫此藥能令人迷蒙者、乃因其有暫阻知覺之能、

令人缺氧、故血壓畧增、其所以能令人迷蒙者、或因熏時、其人血內缺氧之故、且因本藥原有迷蒙顱腦之能、按此藥與他迷蒙藥不同、最奇者、受迷蒙之人、其脈激反應之力仍存、昔有人謂、熏此藥者、必暫有糖尿症、近有人查明此理、不足爲證、有熏後而成糖尿症者、緣小腦下房底受損故也、亦有熏後或頭暈一二句鐘者、然中患者卒鮮。

療效 割瘤或指筋鞘炎等、用此藥迷蒙之、最爲合宜、近有醫者欲用迷蒙藥、先用此藥、後用伊打或哥羅芳熏之、此乃省工之法、用此藥之難有二、一迷蒙之效不久、二不易携至他處、然其見長之處、少有因熏而殞命者、較寇卡印尤無危險、因其不易携帶、故常以寇卡**印**代之、此藥常用爲摘牙之蒙藥、用時宜以片木置於上下牙之間、以免其閉口、易於下鉗也、然此木宜以繩繫之、可免下咽之虞、此藥與氫並用之益、與伊打或哥羅芳與氫並用之益同、但其效畧遲、今將此藥與氫並用者、開列於左、一如孩童專吸此藥、全身不能安靜、與氫同用、可免此患、一如血虧與虛弱者、專吸此藥、易於抽搐、效亦不長、故宜與氫並用、一用過此藥之人、初用時、如效來甚速、而去之亦速者、若以此藥與氫並用、可令迷蒙之效畧長、一已用此藥、而覺有危險之狀者、可與氫並用、一年邁或喉門棚過大、有心症或肺症者、皆宜與氫並用、惟年邁而脈變壞症忌用、如用

第三章 論迷蒙藥類

此類之藥、其氣易散、人吸之則失其知覺、被喙極速、由肺而祛之亦速、用時如止而不熏、不久即甦、若於未熏之前半句鐘、以莫非射於皮內、則蒙效較長、如服哥拉後、以伊打熏之、則迷蒙之初程必易過、而迷蒙之效尤長、其大用乃爲止痛、外科割症時常用之、如用於產科、可減分娩之痛、然不可多用、恐有產後痲之險、脫節或勒疝症、如患處之肌抽搐、以此藥熏之、易於施治、蓋熏時肌則鬆軟、不致抽搐也、膽石或腎石之疼、熏之屢效、不但止痛、且令含石之腔鬆軟、其石易出也。

氫氣下治 (NITROUS OXIDE)

此藥又名喜氣、鼽之無味、嘗之畧甜、製此藥時、所用之器具甚多、故醫者難以自製、泰西所售者、皆用壓力製成流質、置於鐵管內、故醫者可購而用之。

體功效 此藥如少用而緩吸之、其人必至喜笑、故俗名喜氣、若多用而速吸之、則少見喜笑之容、用法乃以氣管置人口內、將鼻捏住、令其用長氣呼吸、不久面先發紅、後則發白、再後頷骨下垂、至此則全身迷蒙、醫者宜速行割治、但當用精純者、以免意外之患、若有禁用哥羅芳伊打二藥之故、此藥最宜、近有人言、此藥於絡部無正感、然吸之

此圖乃熏氣囊下洽之具、近今始出、具之中間有一鐵筒如M、上端有一吸具如K、二者連以大庫秋管、兩旁有二鐵筒如A B、一貯以氣、一貯氣下洽二筒之旁、各有庫秋



袋如C D、以二小庫秋管、連於二筒上、上端各有合頁如E F、用時可隨意啟閉、氣由二筒入庫秋袋、由二袋入中間之鐵筒、由此筒入大庫秋管、通至吸具而熏之、用此具時、熏氣或氣之多寡、可隨醫士之意。

洋升麻膏 Extractum Cimicifugæ, U. S. 一至五厘。(0.06-0.3)

洋升麻流膏 Fluidextractum Cimicifugæ, U. S. Extractum Cimicifugæ Liquidum, B. P. 十至三十量滴。(0.6-2.0)

洋升麻酒 Tinctura Cimicifugæ, B. P. 一至二量錢。(4.0-8.0)

洋升麻 CIMICIFUGA, U. S. CIMICIFUGÆ RHIZOMA, E. P.

此藥乃美國一類蓄根之草、入藥者係該草之根、內含一樹脂、並一氣易散之油、如欲用此藥之酒、或流膏、當隨製隨用、並當用本年所產者、因其力易失也。

體功效 試將此藥之大分劑、射於禽獸之皮內、則脊腦覺徑被癱、故激反應之能減少、雖肌與腦系不受阻、而心與司絡腦所、俱受其阻、終則因呼吸停止而殞命、服小分劑、微有激心之力、足分劑、鮮有不額痛者、但其體功效、與療效無甚干涉。

療效 醫肌跳[1]症之妙劑、砒爲第一、此藥居第二、如無他恙、此藥尤妙、但宜防其大便乾燥、並當常與鐵類同服、若有痺[2]症之根、用之最爲合宜、有醫者以此藥爲治系痛[3]之妙劑、若卵腺之系痛、用之尤妙、婦人經閉[4]、窒痛窒不復原等症、或降階時覺卵腺或窒作痛、此藥俱效、心變脂[6]症、如用毛地黃無效、可用此藥爲平心之劑、以其大有激窒之力、故懷孕者宜愼用之、可免小產之虞、然有醫者、特用此藥爲免小產之劑、且因其有激窒之能、可代麥奴之用、或較麥奴尤妙、因其當生產之時、令窒之縮力、仍如尋常、不似麥奴之猛、然少有用之爲縮窒者、過用目力之頭痛[7]、用之有效。

藥製與分劑

1 Chorea
2 Rheumatism
3 Neuralgia
4 Amenorrhœa
5 Subinvolution and tenderness of the womb
6 Fatty heart
7 Headache

服法 此藥宜置於藥壳內、或冰水內、然後服之、方免伊打之氣味散佈、如不用極冷之水、恐其氣味散佈而不易服也。

分劑 成人一至二量錢 (4.0-8.0) 因其氣大有激喉之力、故嬰孩不易服之。

酵母花 HUMULUS, U. S. LUPULUS, B. P. 入藥者、乃其花子、此子湊合成毬、內含一氣易散之流質、名酵母花精、並含一苦酸、名酵母花酸、因英美二國之命名不同、以致多有舛錯。

療效 癲瘋[1][2]二症、可用爲解抽平腦之藥、莖舉[3]症、有效、用糊藥時、如以此藥加於其內、其效尤大、若因痿症致不能安睡、用此花作枕、睡時以酒濕之、或效、此法因人虛想而出、然能令人安睡者、或因酒氣之故耳。

藥製與分劑

酵母花酒	Tinctura Lupuli, B. P.	半至二量錢。	(2.0-8.0)
酵母花精	Lupulinum.	二至五厘。	(0.12-0.3.0)
酵母花精脂桶	Oleoresian Lupulini, U. S.	十至四十量滴。	(0.6-2.6)
酵母花精脂桶流膏	Fluidextractum Lupulini, U. S.	三十至百二十量滴。	(2.0-8.0)
酵母花精冲藥	Infusum Lupuli, B. P.	一至二量兩。	(30.0-60.0)

1 Hysteria
2 Nervousness
3 Priapism

熱茶、或熱檸檬水、則當多以被覆身、無論成人孩童、用之爲表劑、有效、孩童腦部過於受激、因而作燒、有效、以其有退熱之力、並有解抽之功。

分劑 成人每服二十至六十量滴、(1.3-4.0) 一正歲之孩童、每服五至十量滴、(0.3-0.6) 以冷水服之。

伊打雜酒 SPIRITUS ÆTHERIS COMPOSITUS,

此藥乃以伊打伊打油與酒相合而成。

療效 此藥用爲祛風之劑、最爲有力、且因其中之酒及伊打、能激腸胃而增其蠕動、故大有醫呃[1]逆之能、心痛急症[2]、當患時服之最妙、如吸煙過度、或食物不化而致心跳者[3]、此藥俱效、若嬰孩忽顯腦力脫失、良方如左。

伊打雜酒	Spiritus ætheris compositi	十二量滴 (0.8)
鍾沁香酒	Spiritus ammoniæ aromatici	十二量滴 (0.8)
陳皮酒	Tinctura aurantii	十二量滴 (0.8)
樟腦水	Aquæ camphoræ	一量錢 (4.0)

此方係一次所服之藥。 ℞—Spiritus ætheris compositi S. Give at one dose.

1 Hiccough
2 Angina pectoris
3 Tobacco heart

若尿少而色深、至使胱過於受激者、良方如左。

鉀檸馨	R—Potassii citratis	一或二英錢 (4.0-8.0)
燄氣弱酒	Spiriti ætheris nitrosi	半量兩 (16.0)
烝水	Aquæ destillatæ	加至四量兩 (120.0)

每五句鐘、服二量錢、(8.0) 至尿色變淺爲止。 S.—Dessertspoonful every hour until the urine becomes clear.

尿色變淺後、宜改服顛茄、如復變深色、可再服前方、若孩童虛弱、致脊腦司所受阻、可以左方代顛茄之用。

砒弱酸	R-Arseni trioxidi Acidi arseniosi	一英厘之四分之一 (0.015)
馬前子膏	Extracti nucis vomicæ	二英厘 (0.10)
貴林硫强馨	Quininæ sulphatis	二十英厘 (1.3)

共成二十丸、日服三丸。 Fiant pilulæ No. XX. S.— One pill t. i. d. after meals.

此藥若用爲利小便之劑、宜以冷水服之、並不可多以被覆身、如用爲表藥、服後當飲

樟腦酸 ℞—Acidi camphorici 四英錢 (16.0)
醇酒 Alcoholis 二量兩 (60.0)
非洲水 Mucilaginis acaciæ 三量兩 (90.0)
陳皮糖漿 Syrupi aurantii 加至六量兩 (180.0)

汗前一句鐘、服一量兩之四分之一、或四分之二、(8.0-16.0) S.—Dessertspoonful to a tablespoonful one hour before sweat is expected.

此方於臭汗症少效。

燄痠弱酒

SPIRITUS ÆTHERIS NITROSI,

此藥乃以酒水與燄氰製成、功用多在燄氰、藥行中如不用合宜之瓶、謹愼存貯、則燄氰必至散失、其中僅存酒與水而已、若試藥力果散失否、可將此藥半量兩、(16.0) 加安替派林一或二厘、(0.06-0.12) 如先變紫色、後有綠色沉澱、則知其力未嘗散失。

體功效 此藥有平絡腦二部之效、並有發表、及利小便之能、如頻服足分劑、必致皮變紫色。

療效 泰西之人、常以此爲家藏備用之藥、用之合宜、功效甚妙、雖誤用之、亦少有妨礙、有醫者以爲少有功效而輕視之、然無效之故、因用之不恰、或藥力散失、孩童遺尿[1]患、

1 Incontinence of urine.

而成、結晶如針、或如鱗、色白、透光、味似樟腦、水不能化、酒、伊打、哥羅芳、三者俱易化之。

體功效 此藥之效似氨類、並似樟腦。

療效 此藥有止痛之功、若與他藥並用、其效尤妙、腰痺[1]症、或腦部不平而作痛者、服之有效、癲[2]症之婦女、如不能睡、亦效、因其有暖胃之功、並睡藥之力、故戒酒者服之亦效、因其惹力過大、故胃炎症不可服、遺精[3]症服之大效、酒狂[4]症、倘胃經受阻、並多筋跳之患、服之有效、啼嗽[5]症、或效瘁[6]症、多因腦部受阻、致患系痛者、以及癇[7]症、小癇、肌跳[8]等症、亦或有效。

服法 成丸服之、但不可用爲射藥、因其惹力過大也、分劑五厘。(0.3)

樟腦酸 ACIDUM CAMPHORICUM, U. S.

此藥之製法、乃以氯强酸加樟腦而成、肺癆[9]症之盜汗者、此爲最妙之劑、有名醫云、此類症他藥所不能治者、惟此藥能治、且無危險、但宜於汗前一二句鐘、服二十或三十厘、(1.3-2.0) 如汗出甚多、可服六十厘、(4.0) 但用大分劑、有惹胃之患、宜分二次用之、相隔二句鐘、因其水不易化、可置於藥壳內服之、且有良方如左。

1 Lumbago.
2 Hysteria.
3 Spermatorrhœa.
4 Delirium tremens.
5 Whooping cough.
6 Influenza.
7 Epilepsy.
8 Chorea.
9 Night-sweats of phthisis.

後以樟腦油擦之、可免生膿之患、婦人經絕時患頭痛喜睡者、曾有著名醫者云、以此藥加花露水、擦於頭上、大效、婦女行經、或絕經時、如[2]頭上有一處甚痛、若用鍼洗消水、與樟腦酒各一分、製成洗藥、擦之有效。

藥製與分劑

樟腦水 Aqua Camphoræ, 半至二量兩。(15.0-60.0)

樟腦酒 Spiritus Camphoræ, 三十量滴。(2.0)

樟腦 Camphora, 一至三厘。(0.06-0.20)

樟腦雜酒 Tinctura Camphoræ Composita, B. P. Tinctura Opii Camphorata, U. S. 十五至六十量滴。(1.0-4.0)

最易服者、乃樟腦酒、或樟腦丸。

樟腦擦藥 Linimentum Camphoræ,

鹼擦藥 Linimentum Saponis, 此藥內之樟腦、較少於樟腦擦藥。

樟腦蠟抹膏 Ceratum Camphoræ, U. S.

樟腦鍼洗擦藥 Linimentum Camphoræ Ammoniatum, B. P.

樟腦氯弱鹽 CAMPHORA MONOBROMATA, U. S. 此藥之製法、乃以樟腦與氯入於鐵管內、熬熟

1 Drowsiness and headache of menopaus.
2 Headache.

(1.0) 於皮內、但用時最宜謹慎、所用之油、亦務求純淨、有著名醫者云、癆症之腦部受阻、或積效之患者、常用此法治之、呃[1]逆症此爲妙劑、如用力太過而致心跳[2]症、與細氣腔[3]久炎、或氣腔泗膜[4]久炎、服之皆效、鼻泗膜久炎症、聞樟腦酒、有補助泗膜生液之功、口出臭氣者、用之漱口有效、人患傷風[5]症初患時、聞樟腦酒大效、並有良方如左。

樟腦	Ʒ-Camphoræ	二英厘 (0.12)
顛茄流膏	Fluidextracti belladonnæ U. S. Extracti belladonnæ Liquidi, B. P.	一量滴 (0.05)
貫林硫强磬	Quininæ Sulphatis	二英厘 (0.12)

共成十丸、隔一句鐘、服一丸、每日只可服五次。

Fiant tabellæ No. X.
S.—One every hour for four or five doses.

如於初患時服之、可減頭痛[6]呃[7]噦鼻噦[8]等患、若不早用無效、無故鼻噦流淚不止、並呃噦不斷者、宜以樟腦散、或樟腦塊、置於滾水內、鼏之、或鼏樟腦酒亦可。

敷用 患停瘍[9]者可用此藥激之、對磨[10]癜、以白石粉與樟腦散敷之、有效、因筋[11]扭、或因痺[12]症、以致骨節[13]炎者、用樟腦擦藥有效、系痛[14]症、擦之亦有效、癤[15]初起時、日敷樟腦酒二次、

1 Hiccough.
2 Cardiac palpitation.
3 Capillary bronchitis.
4 Chronic bronchitis.
5 Cold.
6 Headache.
7 Sneezing.
8 Coryza.
9 Indolent sores.
10 Interrigo.
11 Sprains.
12 Rheumatic joints.
13 Inflamed joints.
14 Neuralgia.
15 Boils.

八厘。(0.24-0.5)

樟腦 CAMPHORA. 此藥原出於中華日本等處、由樟木取出、泰西所售者、乃屢用升法製成、純者色白、或淡紅、其氣易散、味熱而臭烈、別具一種氣息、最易燃著、其煙色黑、冷水千分、或醋酒一分、各能化藥一分。

體功效 服過分劑、必致頭暈、耳鳴、譫語、後則癡癎、有如癲症、脉速而微、皮冷而紫、全身生汗、或覺腹內燒痛、中毒日久者、腎必發炎、若服小分劑、則能增人氣力、脉畧速而有力、亦覺胃睘、腦部清明、全身暢快、服足分劑、有謂爲平陰陽藥者、有謂爲激陰陽藥者、大概服過分劑、有激陰陽之力、此藥於人身內改其體質者居多、由腎而祛、亦有由汗與呼吸而祛者。

療效 此藥服敷皆可、孩童或婦女服之、可作平腦[1]或解抽[2]藥、若經痛[3]之婦女、有頭痛[4]或痙[5]患者、此藥有效、如與阿司炭尼利、或安替派林同用、甚效、若製成輪藥、服之尤妙、癘[6]與似癘[7]症可用之、各類盟瀉[8]症、亦可用之、惟各類泗瀉症少效、莖舉[9]硬痛、與鈹氣塩同用、有效、有著名醫者、於各類低熱[10]症、曾以此作激力藥用之、無論何症、致腦部驟然受[11]阻、有效、倘病勢已危、恐服藥不及、宜以樟腦一分、用洋橄欖油九分化之、射十五滴

1 Nervous Sedative.
2 Antispasmodic.
3 Dysmenorrhœa.
4 Headache.
5 Nervousness.
6 Cholera.
7 Cholera morbus.
8 Serous diarrhœa.
9 Chordee.
10 Adynamic fevers.
11 Sudden nervous depression

之最妙、孩童腸胃脹之疳、亦可用之、孩童之氣臌症、或腸熱症之氣臌、可用爲射肛藥、氣腔痼炎症、可用爲祛痰藥、孩童腦部過於受激、亦常有效。

藥製與分劑

阿魏丸 Pilulæ Asafœtidæ, U. S. 每丸內有此藥三厘、(0.2) 每次可服二三丸。

阿魏勻藥 Emulsum Asafœtidæ, U. S. 半至一兩。(15.0-30.0)

阿魏酒 Tinctura Asafœtidæ, U. S. Tinctura Asafetidæ, B. P. 三十至六十量滴。(2.0-4.0)

阿魏肛彈 (Suppositoria Asafœtidæ) 每彈內有此藥八厘。(5.0)

年邁人食後、因氣虛致腸胃脹滿者、良方如左。

馬前子膏 ℞-Extracti nucis vomicæ. 五英厘。(0.3)

冦拉膏 Extracti kolæ. 五英厘。(0.3)

阿魏 Asafœtidæ Asafetidæ 四十英厘。(2.6)

共成二十丸、早晚各服一丸。 Fiant pilulæ No. xx S.— One night and morning.

阿虞雜丸 Pilula Galbani Composita, B. P. 此丸乃以阿魏阿虞沒藥等製成、分劑四至

1 Colic of children.
2 Tympanites of children.
3 Tympanites of typhoid fever.
4 Bronchitis.
5 Intestinal flatulence.

鉦甘松礬 Zinci Valeras, U. S. 半至三厘。(0.03-0.2)

鐵甘松礬 (Ferri Valeras) 一至三厘。(0.06-0.2)

貴林甘松礬 (Quininæ Valeras) 二至十厘。(0.12-0.6)

錏甘松礬 Ammonii Valeras, U. S. 二至十厘。(0.12-0.6)

痵癪二症之良方如左。

貴林甘松礬 ℞-Quininæ valeratis. 二十英厘。(1.3)

鐵甘松礬 Ferri valeratis. 二十英厘。(1.3)

錏沘甘松礬 Ammonii valeratis. 二十英厘。(1.3)

共成二十丸、日服三次、每次服一至二丸。 Fiant Pilulæ No. xx. S.— One or two pills three times a day.

阿魏 ASAFŒTIDA, U. S. ASAFETIDA, B. P.

此藥產於阿弗干、乃以樹汁製成、兼紅黃白三色、味似蒜、其臭頗烈、服之而胃覺暖、有平育道之功、亦可爲祛風之藥。

療效 此藥常用爲祛風藥、其功多顯於大腸內、年邁者、因[3]胃不消化、致腸胃氣脹症、服

1 Nervousness.
2 Hysteria.
3 Indigestion and flatulence.

氣易散之油、亦含一酸、油名甘松油、酸名甘松酸。

體功效 此藥畧有阻腦之力、能令腦部平靜、服過分劑、脉則畧速、身自覺暖、並有時嘔吐、如所服之分劑過大、必致瀉腹、知覺亦受其阻。

療效 婦女腦部受激、致患不寐[1]症、或專用此藥、或與他藥並用、有效、癲[2]症亦有效、酒狂[3]症、與莫非兼服、乃爲常用者。

藥製與分劑

甘松流膏	Tinctura Valerianæ, U. S.	六十量滴。	(4.0)
甘松鍾[4]沘酒	Tinctura Valerianæ Ammoniata,	半至一量錢。	(2.0-4.0)
甘松冲藥	(Infusum Valerianæ)	二量兩。	(60.0)
甘松酒	Tinctura Valerianæ, U. S.	一至二量錢。	(40-12.0)
甘松油	(Oleum Valerianæ)	二至四量滴。	(0.12-0.25)

此藥不入揀藥册。

甘松酸 (ACIDUM VALERIANICUM) 此藥乃無色之油、味甚猛而濃、入藥者、惟此酸中之鉦、鐵、貴林、鋅等鬱、有平腦之力、與補藥之功。

藥製與分劑

1 Nervous excitement.
2 Insomnia.
3 Hysteria.
4 Delirium tremens.

第二章　論解抽藥類

此類藥人所常用者、因其性和平也、腦力虛弱、易生惱怒者、用之有效、如不甚重者、名曰瘁症、甚重者則至於癲症、因此類藥能補腦力、故有謂爲補腦藥類者、其中僅有樟腦與伊打雜酒、畧含毒力、然必用過分劑、其毒力方顯。

麝香 MOSCHUS, 此藥多出於西藏、乃麝鹿陽莖前袋所含者、香味甚濃、舖中所售者、多係不純。

療效 此藥有補力之效、並有解抽平腦之功、各類低熱[1]症、如其力過於微弱、腦部甚受阻者、宜以此藥五至十厘 (0.3-0.6) 加糖水、射入肛內、有效、如腦部[2]受激、或腦力脫失、此藥有效、但不可早用、惟病至危急時用之、可使病者出此危險、若早用之、則藥力漸失、及至病危之時、反無功用矣、呃逆[3]重症、此爲最妙之品。

藥製與分劑

麝香酒 Tinctura Moschi, U. S. 四十至六十量滴。(2.6-4.0)

麝香散 Moschus, 五至十五厘。(0.3-0.6)

甘松 VALERIANA, U. S. VALERIANÆ RHIZOMA, B. P. 此藥有數種、出歐洲中華等處、入藥者係該草之根、內含一

1 Low fevers.
2 Nervous excitement or nervous collapse.
3 Hiccough.

硫弱酸 Acidum Sulphurosum.

袱毛 Formalin.

衲他連 Naphtalenum.

來蘇 Liquor Cresolis Compositus.

鉠錳上礬 Potassii Permanganas.

衲透 Betanaphthol.

錄氯强塩 Hydrargyri Chloridum Corrosivum. U. S. Hydrargyri Perchloridum. B. P.

氫氧强洽消水 Aqua Hydrogenii Dioxidi. U. S. Hydrogenii Peroxidi Liquor. B. P.

烑醇 Phenol, U. S. Acidum Carbolicum, B. P.

硼强酸 Acidum Boricum.

義斯蘭苔 Cetraria.
胡麻子 Linum.

潤皮藥 EMOLLIENTS,
鯨頭油 Cetaceum.
胡麻子油 Oleum Lini.
羊毛脂 Adeps Lanæ.
糊藥 Cataplasmata.

改酸藥 ANTACIDS,
澱錯碳鬱 Calcii Carbonas Præcipitatus.

殺腸蟲藥 ANTHELMINTICS,
藜蘆 Chenopodium.
東瓜子 Pepo.
洋蘇冰 Thymol.

化食藥 DIGESTANTS,
糟膏 Extractum Malti.

滅瘴毒藥 DISINFECTANTS,
氯 Chlorum.

洋石花菜 Chondrus (Carrageen)
豬脂 Adeps.
白蜂蠟 Cera Alba.
洋橄欖油 Oleum Olivæ.
甘油 Glycerinum.
鈉輕碳強鬱 Sodii Bicarbonas.
山道年 Santoninum.
松節油 Oleum Terebinthinæ.
卡瑪拉 Kamala.
胃化脢 Pepsinum.

甘草 Glycyrrhiza.
蔥蔥脂 Oleum Theobromatis.
黃蠟 Cera Flava.
棉子油 Oleum Gossypii Seminis.
軟煤油蠟 Petrolatum, U. S. Paraffinum molle, B. P.
錯弱鬱 Calx.
士拜枝喇 Spigelia.
非利瑪 Aspidium, U. S. Filix Mas, B. P.
石榴 Granatum.
脢梅 Pancreatinum.
木瓜精 Papain.
錯綠粉 Calx Chlorinata.

蒜 Allium. 海葱 Scilla. 湤 Pix Liquida.
阿摩慝 Ammoniacum. 辛伊加 Senega. 替利笨 Terebenum.
檀香油 Oleum Santali.

調經藥 EMMENAGOGUES, 鋏錳上礬 Potassii Permanganas. 洋班蝥 Cantharides.
怪阿克 Guaiacum. 沙芬 Sabina. 芸香 Ruta.
炭阿西吞 Tanacetum. 芫荽油 Apiol.

縮宿藥 OXYTOCICS, 麥奴 Ergota. 金印草 Hydrastis.
棉根 Gossypii Radicis Cortex. 玉蜀黍菌 Ustilago.

外惹內效藥 COUNTERIRRITANTS, 洋班蝥 Cantharides.
芥 Sinapis. 辣椒 Capsicum. 松節油 Oleum Terebinthinæ.
鋂沘 Ammonia. 把根地柄 Pix Burgundica.

潰藥 CAUSTICS, 鋏沘 Potassa. 砒酸 Arseni Trioxidum, U. S. Acidum Arseniosum, B. P.
鉦氯塩 Zinci Chloridum. 銶氯强塩 Hydrargyri Chloridum Corrosivum, U. S. Hydrargyri Perchloridum, B. P. 硫强酸 Acidum Sulphuricum.
低銶氰强礬消水 Liquor Hydrargyri Nitratis.
氰强酸 Acidum Nitricum. 鐄强酸 Acidum Chromicum. 氰 Bromum.

潤藥 DEMULCENTS, 非菡 Acacia. 卡喇桿 Tragacantha.

重瀉藥類 PURGES,

士金無年 Scammonium.
籐黃 Cambogia.
渣笠 Jalapa.
獨腳蓮 Podophyllum.
巴豆油 Oleum Tiglii, U. S. Oleum Crotonis. B. P.
海葱 Scilla.
哥羅新 Colocynthis.
洋苦瓜汁 Elaterium.

利小便藥 DIURETICS,

鋞鎓弱鹽 Hydrargyri Chloridum Mite, U. S. Hydrargyri Subchloridum, B. P.
毛地黃 Digitalis.
烏羅透品 Urotropin.
沛利拉 Pareira.
杜松 Juniperus.
玉蜀黍 Zea.
畢澄茄 Cubeba.
洋班蝥 Cantharides.
鉀 Potassium.
鍶 Strontium.
唘花 Uva Ursi.
以利準油 Oleum Erigerontis.
松節油 Oleum Terebinthinæ.
瑪替蒞 Matica.
金雀花 Scoparius.
煙氰弱酒 Spiritus Ætheris Nitrosi.
派怕拉辛 Piperazine.
布球 Buchu.
愛冬葉 Chimaphila.
檀香油 Oleum Santali.
哥拜把 Copaiba.
卡伐卡伐 Kava-Kava.

發表藥 DIAPHORETICS,

祛痰藥 EXPECTORANTS,

披路加便 Pilocarpina.
路卑利 Lobelia.
鉀檸鰲 Potassii Citras.
煙氰弱酒 Spiritus Ætheris Nitrosi.
銻鉀菓鰲 Antimonii et Potassii Tartras, U.S. Antimonium Tartaratum, B.P.
阿甫莫非印 Apomorphina.
膠草 Grindelia.
透路脂柳 Balsamum Tolutanum.

衣必格 Ipecacuanha.
鍮氯鹽 Ammonii Chloridum.
皮路脂柳 Balsamum Pruvianum.

唎瑣辛 Resorcinum.
安息香 Benzoinum.
芬阿錫吞 Phenacetin.

激胃藥 STOMACHICS,

加林啤根 Calumba.
洋桂 Cinnamomum.
薑 Zingiber.
白柴油 Oleum Cajuputi.
馬兜鈴 Serpentaria.

吐藥 EMETICS,

阿甫莫非印氯塩 Apomorphinæ Hydrochloridum.
鉦硫强礬 Zinci Sulphas.

輕瀉藥類 APERIENTS,

洋杜仲 Euonymus.
萆麻油 Oleum Ricini.
阿羅 Aloe.
鈉硫强礬 Sodii Sulphas.

柳酸 Acidum Salicylicum.
安替派林 Antipyrina, U. S. Phenazonum, B. P.
瓜沙 Quassia.
印度龍膽草 Chirata.
丁香 Caryopyllum.
胡椒 Piper.
沙沙油 Oleum Sassafras.
加思架 Cascarilla.
衣必格 Ipecacuanha.
甘露 Manna.
鎂羹 Magnesia.
錄 Hydrargyrum.
辛那 Senna.
鈉硫强礬 Sodii Phosphas.

撒婁 Salol.
阿司炭尼利 Acetanilidum.
龍膽草 Gentiana.
洋郁李 Prunus Virginiana.
豆蔻 Cardamomum.
辣椒 Capsicum.
洋苦菊 Anthemis.
芥 Sinapis.
槐花青 Cassia Fistula.
硫 Sulphur.
大黃 Rheum.
鎂硫强礬 Magnesii Sulphas.
鈉鉄菓礬 Potassii et Sodii Tartras.

架美喇 Krameria.
鉛醋礬 Plumbi Acetas.
鈰草礬 Cerii Oxalas.
銀氰强礬 Argenti Nitras.
白礬 Alumen.
鉍碳强礬 Bismuthi Carbonas.
鉦硫强礬 Zinci Sulphas.
鉛弱羹 Plumbi Oxidum.
鉍氰下礬 Bismuthi Subnitras.
銅硫强礬 Cupri Sulphas.

補藥 TONICS,
硫强酸 Acidum Sulphuricum.
氰强酸 Acidum Nitricum.
鐵藥類 Ferrum.
氯氰强酸 Acidum Hydrochloricum.
皇强酸 Acidum Nitro-Hydrochloricum.
高錳弱羹 Mangani Oxidum Nigrum.

改症藥 ALTERATIVES,
錄藥類 Hydrargyrum.
氯 Iodum.
魚肝油 Oleum Morrhuæ.
洋茯苓 Sarsaparilla, U. S. Sarsa, B. P.
牌橢 Thyroid Gland.
硫 Phosphorus.
鏽鈉氯强塩 Auri et Sodii Chloridum.
鈇氯塩 Potassii Iodidum.
硫强酸 Acidum Phosphoricum.
怪阿克 Guaiacum.
腎上橢 Suprarenal Gland.
砒强酸 Arseni Trioxidum, U.S. Acidum Arseniosum, B.P
黃氯 Iodoformum.
哥枝禁 Colchicum.
魚石湍 Ichthyol.
療症盟 Antitoxins.

解瘧藥 ANTIPERIODICS,
匹克酸 Acidum Picricum.
貴林 Quinina.
郁加列脊 Eucalyptus.

退熱藥 ANTIPYRETICS,
幾阿蘇碳礬 Creasotum Carbonas.
烑酵 Acidum Carbolicum, B. P. Phenol, U. S.
怪阿冦 Guaiacol.
幾阿蘇 Creosotum.
洋蘇冰 Thymol.

佛茄兒 Stramonium. 鬧羊花 Hyoscyamus. 寇卡 Coca.
猶肯 Eucaine.

激動系藥 EXCITO-MOTORS, 馬前子 Nux Vomica.

阻動系藥 DEPRESSO-MOTORS, 加拉巴豆 Physostigma.
炫氣弱鬱 Amylis Nitris, U.S. Amyl Nitris, B.P. 路卑利 Lobelia. 鉄氣塩 Potassii Bromidum.
哥念 Conium. 黃茉莉 Gelsemium.

激呼吸藥 RESPIRATORY STIMULANTS. 魁拔寇 Aspidosperma.

激心藥 CARDIAC STIMULANTS, 錏沁 Ammonia. 醋酒 Alcohol.
毛地黃 Digitalis 康畀箭毒 Strophanthus. 加非印 Caffeina.
洋鈴蘭 Convallaria. 金雀印 Sparteina.

阻心藥 CARDIAC DEPRESSANTS, 鉀鈲菓鬱 Antimonii et Potassii Tartras, U.S. Antimonium Tartaratum, B.P. 草烏頭 Aconitum.
綠藜蘆 Veratrum Viride. 辣菜根 Arnica Radix. 菓酸 Acidum Tartaricum.
氫藍酸 Acidum Hydrocyanicum.
檸酸 Acidum Citricum. 醋酸 Acetum.

斂藥 ASTRINGENTS, 炭匿酸 Acidum Tannicum. 加泌酸 Acidum Gallicum.
兒茶 Gambir, U.S. Catechu, B.P. 佳奴 Kino. 赤蘇木 Hæmatoxylon.

廿三　胃化腥梅與腔梅不可合用、因胃化腥梅能於酸內成功、腔梅乃於鹼內成功。

病者之飲食　多有醫者於病人之飲食不甚留意、以致飲食不當、難獲痊癒、可知但以藥醫病、不足爲妙、必須留意於病者之飲食、否則不但少有功效、恐病者亦不以其爲名醫、而信賴之矣。

藥之分類 CLASSIFICATION OF DRUGS,　打胎藥類、非醫家所宜用、故不細論、然遇有胎之婦人、因有故必須打落者、用器具取下可也、但須約同他醫、協和辦理。

解抽藥 ANTISPASMODICS,

麝香 Moschus,
樟腦 Camphora,
洋升麻 Cimicifuga,
阿魏 Asafœtida, U. S. Asafetida, B. P.
酵母花 Humulus, U. S. Lupulus, B. P.

迷蒙藥 ANESTHETICS,

氯氣下洽 Nitrous Oxide,
哥羅芳 Chloroform,

睡藥 HYPNOTICS,

甘松 Valeriana,
燄氣弱酒 Spiritus Ætheris Nitrosi,
伊打 Æther,
哥拉阿米 Chloralamidum.
怕拉第亥 Paraldehidum.
索弗拿 Sulphonal.
台歐那 Trional.
哥拉 Chloralum Hydratum, U.S. Chloral Hydras B.P.

激腦藥 CEREBRAL EXCITANTS,

鴉片 Opium.
印度麻 Cannabis Indica.
顛茄 Belladonna.

十　流膏類、與水不可合用、因水必令膏力沉澱。

十一　鹼礬類與酸類不符、若合用之、必改二藥之體質。

十二　酸礬類與鹼類不符、若合用之、必改二藥之體質。

十三　植酸類、與硷酸類、不能合用。

十四　氯及氯塩類、與䗪類不可合用。

十五　銻鎳强塩、鉛類、銻氯塩、銀氰强礬、俱屬單用之藥、惟銻鎳强塩與銻氯塩可合用、銀氰强礬、與鴉片膏或鬧羊花、亦可合用。

十六　海葱糖漿、與錏碳强礬不可合用、因海葱糖漿、內含醋酸之故。

十七　郁李桂水、Cherry Laurel Water 與莫非不可合用、若二藥相合、必變成甚毒之藥。

十八　哥拉與銻藍洽、不可合用、因二藥互爲改變、致成氫藍酸。

十九　寇卡印與硼砂相合、即成不消化之礬、惟與硼强酸合用、則不改其體質。

二十　銻鎳弱塩與安替派林、不可合用。

廿一　安替派林、與熆氰弱酒、不可合用。

廿二　水藥類因消化之力已盡、而猶用之製他類濃消水、則無消化之力、故不可用。

三　凡鹼類置於瓶類之礬鹽中、則易成他類之藥、不符之方如左。

℞

士的年硫强礬　Strychninæ Sulphatis　一英厘 (0.06)

鉀氯鹽　Potassii Iodidi　二英錢 (8.0)

洋茯苓雜糖漿　Syrupi Sarsaparillæ Compositi　三量兩 (90.0)

此方之鉀氯鹽能令士的年沉澱、病者服至瓶底之時、必皆爲士的年、因有中毒之患。

四　鉀氯强礬、與炭匿酸不符、若合用之、必成崩藥、鉀錳上礬亦然。

五　鉀氯强礬、與鍶氯鹽不符、若合用之、則易燃著。

六　鐵藥類、與炭匿酸不符、若合用之、必成鐵炭礬、植物斂藥類、常含炭匿酸、故亦不可與鐵藥合用、惟此類之中、瓜沙與加林啤可與鐵藥合用。

七　瓶類若化成消水、不可與炭匿酸合用。

八　鐵類鉛類硷酸類與非蒴不能合用。

九　樟腦酒、與水不可合用。

不能令其流涎、皆因有癖忌之故、醫者於初見之病人、宜用藥之小分劑、蓋試其有癖忌否也。

宜用之狀 INDICATIONS. 見病狀而用所宜用之藥、且所用之藥、不宜令其他處受害。

禁用之狀 CONTRAINDICATIONS. 見病狀而禁用所不宜用之藥、如腦衣炎症、熱度過多、貴林雖能退熱、則不可用、因其能令腦衣絡、多有積血也。

不符之藥 INCOMPATIBILITY. 醫者所以必學化學者、爲免其將不符之藥合爲一方、至變成毒類、或崩類之藥也、按藥類之不符者、不可勝數、惟將人易犯者畧言之。

一　酸鹼二類不可合用。

二　酸類與酒類不可合用、不符之方如左。

℞

鉀氫塩	Potassii Iodidi	二英錢 (8.0)
皇强酸	Acidi Nitro-Hydrochlorici	一量錢 (4.0)
辛寇拳雜酒	Tincturæ Cinchonæ Comp.	三英兩 (90.0)

此方之酸與氫不符、亦與酒不符。

藥册加倍、若用此藥之足分劑、甚屬危險、他舖酒中所含者、少十分之九、其不同之故、皆在所用之生藥不同耳、若用經試之藥、則免此等之虞、如無經試者、宜將𤭖藥類成丸用之、或以淡酒化服、惟毛地黃與綠藜蘆之𤭖、不可如此用、因此二藥之𤭖、其效與本生藥不同也、毛地黃之𤭖甚多、綠藜蘆之𤭖有二、然迄今未識此二藥之𤭖如何用之、方合生藥之效也、曾有幼童用鴉片表散一服、即至殞命、因配藥者、未將此藥研勻、其中所含之鴉片甚多也、按幼童原不宜服鴉片散類、如必須用、只服鴉片酒類、可免此虞、醫家用藥不知其力、正如匠人用器具不當、難免無誤矣。

服藥之癖忌 IDIOSYNCRASY,

癖忌無定理、有服某藥之微分劑、即見危險之形狀者、有服過分劑、毫無功效者、惟常患癪症之婦女、癖忌易顯、有人服錄氯弱塩之微分劑、即中錄毒者、曾有一三十歲之婦、患頭痛甚重、二日之內、服印度麻膏十五厘、(1.0) 竟不見效、此分劑、乃男子所應服之七倍也、且因其每日午後作燒、三日之內、服貴林百五十厘、(10.0) 亦無功效、並不令其耳鳴、後又於十六句鐘內、服安替派林六十厘、(4.0) 仍如未服、此分劑係常人所應服之六倍也、又每二十分鐘、射披路加便氯塩、一厘之八分之一、(0.008) 共射一厘之四分之三、(0.045) 亦無功效、此等過分劑、不能令其發汗、亦

則呼吸司所、不致被癱矣、醫者必查明藥祛之遲速、方知每日宜服幾次、譬如錘鍰强礬被祛甚速、每二句鐘宜服一次、毛地黃被陳甚遲、即一日服一至三次、亦不爲少、被祛甚遲之藥、若不謹愼用之、或有積效之虞。

用藥得輔效

COMBINATION OF DRUGS FOR JOINT EFFECT,

近代醫者、多研究藥之體功效、故醫病之法、亦漸次加增、如哥拉有阻心之力、莫非有阻呼吸之力、若擇此二藥之一而專用之、能治不寐之症、但不如以此二藥之小分劑、兼而用之爲妙、且無阻心與呼吸之損、若配瀉藥、加顛茄與馬前子、爲補腸內肌之藥、相輔用之、大爲有益、醫者選藥配方、不但宜取同效之藥、且留意於難服之藥、若其症必須用難服之藥、固不能不用、然遇有可變通者、宜盡心變通之、令病者易服也。

藥力無定

STRENGTH AND RELIABILITY OF DRUGS,

昔日輪車輪船未興、生藥從遠方而來、受風雨摧淋、藥力故常減少、近因轉運較速、少失其藥力、然多有生藥產於原野、或深山之處、採藥之人、取非其時、藥力亦必不足、近之製藥者、能將所備之藥、試其力與揀藥册同否、但用已試之藥、價値必昂、然價雖昂、較未試之藥、功效甚妥、曾有人遞購五藥舖之馬前子酒、以化學之法、挨次取其酒中之士的年、最著名之藥舖、酒中所含者、較揀

記之、否則不知用藥之時、夫藥被嘔之遲速、大半由於血運之遲速、如救溺水者、血運不週、形狀似死、必當防用藥過多之險、若頻灌有力之藥、存積胃中、及其蘇醒時、血一運動、藥即被嘔、恐生命司所大受其害、酒狂症、宜用莫非、或服或射、蓋欲令其安睡也、如用足分劑無效、不宜再用、恐有中毒之患、曾有忽畧此理者、用之過多、以致殞命、患疝腫者、嘔藥甚遲、必致藥力存於身內、俟其瀉腹、或放水後、此藥方能被嘔、如用之過多、則中毒矣、若於此病用空針射藥、不但無益、反致有損、因射藥之處、易於生膿也、論嘔藥之常理、飽腹時嘔藥必遲、空腹必速、如人飯前飲酒、雖未及量而醉、飯後飲酒、即及量亦不至醉、其理一也、藥在胃、或腸內、惹力若不甚大、則無感身之能、因其未曾被嘔之故、近有人查明酒藥類、較水藥甘油等類、易於被嘔、如胃經受阻、嘔藥之力、必致減少、果有此患、當於所用之藥內、加辣椒類之激發藥、則被嘔甚速矣。

藥效存時 DURATION OF ACTION OF DRUGS.

藥效存時之久暫、一在被嘔之遲速、一在身內之改變、或祛之遲速耳、如酒、伊打、哥羅芳、戕氣弱磬等氣易散之藥、效於身內、存時不久、緣其被祛甚速也、若鈹氣鹽與毛地黃、效於身內、可存十數句鐘之久、因其改變或被祛甚遲也、若以固拉拉射於皮內、必致呼吸司所被癱、如服中分劑、隨嘔隨由腎而祛、

抹膏類 Unguenti, 將藥置於脂內、調勻而成者。

葡酒類 Vini, 此製法與製他藥酒相同、但此必用葡酒而成之。

藥之分劑 DOSAGE, 分劑所以無定者、緣人有男女老幼強弱與病勢之不同、且因人有服藥之癖忌與否、最妙之法、乃視人身體之輕重而定、如體重百斤者、宜服十厘 (0.6)、五十斤者、宜服五厘 (0.3)、由此可以遞推、若身體過胖、與得冰腫者、仍當按本體定之、若醫孩童之症、有一常用之法、如孩童四正歲、加十二、得十六、用孩童本歲除十六、得四、此孩童可服成人分劑之四分之一、無論孩童之年歲幾何、皆宜加十二、後用本歲除之、此爲常理、用流質藥類之分劑、宜按量滴量之、不可論滴、緣其滴之大小不同也、用藥射入皮膚、當按所服分劑之半、用有力之藥、如恐人有癖忌、初宜用最小之分劑、後漸加之、射入肛內、宜用服分劑之兩倍、如係被喫甚速之藥、宜少用之。

第一圖

第二圖

量盃

第三圖

藥喫之遲速 ABSORPTION OF DRUGS, 藥喫之遲速、醫者宜切

勻藥類 Emulsiones, 乃以油藥類、置於非滴內、漸次加水、研勻而成者。

膏藥類 Extracta, 乃以生藥置於酒或水內、煎之而成乾膏者。

流膏藥類 Fluidextracta, U. S. Extracta Liquida, B.P. 此類之製法、與製膏類同、但煉之成漿而止。

甘油藥類 Glycerites, 乃以藥置於甘油內而成者。

冲藥類 Infusa, 以滾水冲之、候至冷時、隔渣而成、亦有以冷水冲之者。

擦藥類 Linimenta, 此類之製法、與抹膏類同、惟其油乃爲流質耳。

丸藥類 Pilulæ, 此丸之大小、約不可過三厘 (0.2)、過則不易下咽、如藥體沉重、至五厘 (0.3) 亦可、有裹皮者、亦有無皮者、裹皮之益有二、一免藥力散失、二免藥味觸鼻、惟以筋膠爲皮最妙、裹糖皮者、日久不宜用之。

肛彈類 Suppositoria, 將藥置於寇寇脂內、製成彈形。

輪藥類 Tablets, 乃用機器壓之而成輪。

藥酒類 Tincturæ, 將生藥散置於漉筒內、以酒澆之、淋出而成。

乳糖散類 Triturates, 將藥一分、乳糖九分、研勻而成者。

藥餅類 Trochisci, 以藥與糖及非滴相合而成者。

病人、至能用食物之時、但所射之食物、亦不宜過二至四兩。(60.0-120.0) 肛彈類之用有二、一令藥達於病處、二令藥被噏、感於全身。

藥製 PREPARATIONS,

藥製繁多、所常用者如左。

強散藥類 Abstracta, 乃以某藥之膏、研成細末、置於乳糖內而成者、使其力倍於本藥。

醋藥類 Aceti, 乃以某藥浸於醋內而成者。

堿藥類 Alkaloids, 乃以化學之法、由生藥取出、與酸類相合而成鬱、其力較本藥甚大。

水藥類 Aquæ, 多係氣易散之藥、置於水內、消化而成者。

糊藥類 Cataplasmæ, 多係胡麻子、或饅首、用滾水浸之而成者。

蠟抹膏類 Cerata, 乃流膏內加以蠟者、使其不易融化耳。

紙藥類 Chartæ, 以吸水紙浸於藥內而成者。

糖菓藥類 Confectiones, 乃以糖菓和藥搗爛而成者。

煮水藥類 Decocta, 乃以藥置於水內煮之熟時隔渣。

甘香酒藥類 Elixir, 乃以淡酒加糖與香類而成、爲使病者易服。

貼膏類 Emplastra, 乃以藥置於粘性物內、勻攤於紙或布或皮革上。

可化之藥、忌用惹力過大者、恐有生瘍之患也、可射藥處、一在外肘、一在腓、俗名腿肚一在背、總之不宜射於血脈多處、與皮膚硬處、其法以左手之拇食二指、提起皮膚、用右手執針、射入其內、但用此法之險有二、一如針射入靣內、藥必隨血立至生命司所、或至殞命、二如所用之針與藥、有一不淨、必致生瘍、預備射藥、宜用滾水化之、且針內不可少存空氣。

射肛內法　此法有二、一射肛類、一肛彈類、射肛類之用有三、一能令藥被喫、二能令藥達於肛、或胴內（俗名大腸）之病處、三肛胴被塞、易於冲下、若用此法、令藥被喫、切不可用之過多、從二至四兩（60.0-120.0）爲止、如過四兩、肛肌受惹、即將所用之藥逼出矣。如欲冲下肛胴內之塞物、即至一二斤亦無妨、有時肛受激而其肌發板、不能存所射之藥、故宜緩緩射之、若加油與鴉片酒數滴尤妙、有時人雖日見大便、胴內仍有餘糞存積、日久必成重患、此等症多射溫水、可洗出之、如遇腸塞症、無論因何而致、宜用溫水數斤、以弔水袋緩緩射之、此水當熱至百度、弔水袋當高於病者二三尺、切不可射之過猛、須滴滴而入、可免腸外統膜崩裂之虞、如多用此水、當加鈉氯鹽少許、令與血中所含之鹽同、（即此水之百分之一之十分之七）方可、若病者不進飲食、可以合宜之食物、射入肛內、亦能養育

與用藥同視爲緊要、否則必少見功效也。

用藥之法 MODES OF ADMINISTERING DRUGS.

此法甚多、所常用者有五、一服、一熏、一敷、一射皮內、一射肛內、最常用者惟服法。

服法　服藥之常理、多在飯後、若胃經生瘍、宜在飯前、必如此藥力方能達於患處、小腸生瘍、宜在飯後數句鐘、必如此藥力與食物同入小腸、患處方得藥之功效。

熏法　此法多用於氣脘炎症、用法、有以藥置於滾水內、令病人吸其氣者、有置藥於噴霧具內以熏之者、亦有專治痚症、用顛茄佛茄兒等葉、裝入烟袋內、令病人吸之者、人患楊梅症、有時不能服藥、以銶氯弱塩置於火上、令病人吸其氣者、亦有數類之症、令病人吸氯者、惟哥羅芳伊打喜氣等、只用爲迷蒙之藥、此皆熏法之類也。

敷法　此法可用之藥、大約係魚肝油、銶抹膏、氯抹膏等油藥類、宜敷於皮薄而濾脘多處、即腋與內股等處、此外有氯酒與各類擦藥、更有貼膏與糊藥、亦歸敷藥類、貼膏乃貼於皮膚上、令藥力由皮膚達於患處、糊藥因其濕熱之力、令患處速於生膿、並有止痛之功。

射皮內法　此理乃因皮內之連膕、陳藥甚速故也、但用時藥與針務必潔淨、且必用

療學

第一章　總論

療學者、乃講明各病之醫法、並各藥之功效也、夫醫之所當學者甚繁、惟此學爲醫家之根本、若不研究此學、雖通達化學體學與體功內科外科等學、於行醫一途、尙未必能有把握。近二十餘年、外科之療法、較昔年大有進步、非僅在器具之新巧、與割法之習熟、乃因療學日求日精耳、倘於此學中免腐之藥、未能考究而通曉之、則所見之功效、恐亦無殊於昔日也。蓋醫者之醫病、其盡心設法、無非欲其痊癒、如遇不治之症、不可置而不顧、亦必設法俾病者減少其苦難、夫療學者、乃在考查各藥之妙能、以顯示於來學、醫者果能通達此學、所用之藥、必有神效、如輕視此學、雖素善割症、其所見之效、尙不如精熟療學之拙手。醫者每遇病人、最宜細詢其病源、既得其病源、又宜診明其病體、然後投之以藥、此論雖係常理、亦有時不可拘泥、如初見病人、病勢已至危急、宜先治其表、因無暇治其裏也、即如膽石胱石等症、痛極難忍、宜用空針射莫非、先止其痛、後再追其病源、蓋考查病源、有時須遲至數日、方能通曉、且於未用藥之先、當有定章在心、按定章投藥、較無定章者、其效必大、遵此理而行、所用之藥味、必不甚多、自能醫病、至於定分劑之大小、當

病之法中國醫書歷來所未闡發者此書無不備載於我國醫道豈小補之哉是書原爲諸葛高管三君分執筆政及已酉翻印增新訂舊余亦忝列末席因中西之醫理文法迥不相同難免有遷就之處且以此爲壽人壽世之書洵不敢舞筆弄墨修成演義文章致貽以詞害意之誚也

宣統三年歲次辛亥暮春北通州陳貫卿筆於公理會盈樓書室

重序

醫之一道所宜學者雖屬甚繁莫不以用藥爲根本中國之醫書自軒岐以來不啻汗牛充棟其於各藥之性質功用非不詳載非不闡明但現今全球大闢中西之土產各殊寒溫之氣候亦異故泰西醫家所研究之異藥奇方多爲中國所未有詎可徒執一方之見遂謂中國醫道燦然大備哉美國醫士亨利盈君本愛人之心行濟世之道以素所心得於西醫賀氏療學一書譯成漢文傳佈中土直將西國至善之大本草合盤托與中國也書中於各藥之出產性質以及功用之大小分劑之多寡無不言之盡致每用一藥或製而去其滓或化而取其精投藥不必甚夥而見效罔不甚神也況用藥之外更有講求飲食選擇居處以及冷熱各等療

以故世有其人則方藥有效世無其人則服食無功豈非我國醫學中一大缺點哉茲有美國醫學博士盈亨利者本其愛人之心欲廣行濟世之術將美國賀德所著療學一書精心考究譯成漢語口授於記者而筆削之凡男婦老幼各科以及藥之性質功用皆括其中雖述筆不能鉤深攄微使中西語氣適合然苟能以中語道出者必細心抽譯不憚煩言以期易於明了其有爲原文所限並無正當之中語可代者明知詞句生澀亦不敢稍加遷就致失原意操斯術者倘能案置一編合諸說曲證而旁通之則析疑補缺未始非濟世活人之一大助也

光緒三十三年　歲次丁未　北通州管國全序於公理教會書舍

原序

攷自神農嘗百艸以立方藥內經一書實爲我國醫道之祖厥後名家代出各本其心得著爲論說以成一家之學雖所論不無少異然總以不離乎內經者近是迨我朝醫宗金鑒一書出合諸說而折衷之凡施診之秘訣主治之方法莫不燦然大備可謂洋洋巨觀斯道之極點矣雖有名醫再世亦不能出此範圍然而宇宙極大氣候互遷燥濕之性質不同斯人物之感受各異怪症奇方其爲中國所未嘗經歷而他國早已發明者亦必不尠例如臟腑經絡之屬以中國舊日圖說證之於新近剖解家而多誤蓋得之理想終不若徵諸實驗爲確鑿也且講求診治者畧於製藥之方研究內科者不解針砭之術欲求一完全善本戛戛乎其難之

P.B. Chinese 272

PREFACE TO FIRST EDITION

The work of translating Dr. Hare's Therapeutics into the Chinese language was begun over five years ago. The unsettled condition of medical nomenclature has been a serious hindrance and even at the present time, a further revision is in process, consequently there are not a few terms used in this work which will not agree with the revised list of nomenclature when it appears.

The Latin names of drugs and preparations, as they occur in the United States and British pharmacopœias, follow the Chinese name; when identical in both, they are ascribed to neither; the name of a drug or preparation which is only found in one of the above pharmacopœias is followed by the letters "U.S." or "B.P." as the case may be; if a drug or preparation is found in neither, but is of sufficient importance to deserve mention, the Latin name is printed in parenthesis.

Two systems of weights and measures are used, viz; the Apothecaries' and the Metric. It is unfortunate that the weights and measures in common use, by the medical profession, in the United States and England, are not the same; in the United States the Apothecaries' system is still in use, in which 480 grains make an ounce and there are 12 ounces to the pound. In liquid measure, according to the Apothecaries' system, there are 480 minims to the ounce, the same as in the "Imperial" system, but there are only 16 ounces to the pint. The size of the grain is the same in both systems, thus in the doses of the stronger drugs and preparations there is no discrepancy, and that which occurs in the less potent drugs and preparations, is seldom sufficient to require adjustment. In the Metric system the approximate equivalents are used. In the prescriptions, the prescription symbol is omitted, but the names of the ingredients are put in the genitive case.

That part of the science of toxicology which treats of the recognition of poisons in the dead body, or in food and drink, belongs to the domain of the chemist, and is not included in this work.

The translator wishes to acknowledge the kind assistance of the author, Dr. Hare, and of the publishers of the original work, Lea Brothers & Co., of Philadelphia, who furnished the illustrations at cost thus materially improving the book, both as regards usefulness and appearance.

Valuable assistance was rendered by Chu Ke Chü Ch'uan, Kuan Fu Ch'en and Kao Shang Chih, Chinese scholars, in putting the translation into acceptable form.

J. H. I.

TUNGCHOU, NEAR PEKING,
DECEMBER, 1907

PREFACE TO SECOND EDITION

This work has been entirely rewritten and over one hundred new drugs have been added. The indexes are rearranged and in the prescriptions the sign and the English directions have been incorporated.

Thanks are due to Dr. Hare for contributing additional cuts. In addition to the former staff of native scholars, the name of Mr. Ch'en Kuei Ch'ing should appear.

J. H. I.

TUNGCHOU, NEAR PEKING,
MAY, 1911.

A Text-book

of

PRACTICAL THERAPEUTICS

WITH ESPECIAL REFERENCE TO THE

APPLICATION OF REMEDIAL MEASURES TO DISEASE

AND THEIR

EMPLOYMENT UPON A RATIONAL BASIS

BY

HOBART AMORY HARE, M. D., B. Sc.,

PROFESSOR OF THERAPEUTICS AND MATERIA MEDICA IN THE JEFFERSON MEDICAL COLLEGE OF PHILADELPHIA; PHYSICIAN TO THE JEFFERSON MEDICAL COLLEGE HOSPITAL; ONE-TIME CLINICAL PROFESSOR OF DISEASES OF CHILDREN IN THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA; LAUREATE OF THE ROYAL ACADEMY OF MEDICINE IN BELGIUM, OF THE MEDICAL SOCIETY OF LONDON; MEMBER OF THE COMMITTEE OF REVISION OF THE UNITED STATES PHARMACOPŒIA OF 1905

THIRTEENTH EDITION

WITH OVER A HUNDRED ILLUSTRATIONS

TRANSLATED BY JAMES H. INGRAM, M. D.

SECOND CHINESE EDITION

博醫會

PUBLICATION COMMITTEE
CHINA MEDICAL MISSIONARY ASSOCIATION

UNDER THE
HENRY S. WELLCOME CHINA PUBLICATION FUND.

SHANGHAI

1911

美國醫士賀德著

盈亨利譯

武清 諸葛汝楫 巨川 校訂

北京 高志 尚之 參校

北通州 陳貴卿 佐廷 管國全 繡臣 述稿

西歷一千九百十一年

療學

博醫會印發

宣統三年　歲次辛亥

第二次出板

北通州書院印字館鐫

22500969618