

Dissertatio medica, de meloë vesicatorio / [Knut Aug Lenaeus].

Contributors

Lenaeus, Knut Aug, respondent, 1738-1799.
Linné, Carl von, 1707-1778.

Publication/Creation

Upsaliæ : [publisher not identified], [1762]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/n26hckvb>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

I. N. 7.
DISSERTATIO MEDICA,

7

DE

MELÖE VESICATORIO,

QUAM

CONS. NOBIL. ET EXPER. FACULT. MED.
IN ILLUSTRI ATHEN. UPSALIENSI,

PRÆSIDE

VIRO NOBILISSIMO ETEXPERIENTISSIMO,

D:NO Doct. CAROLO
LINNÆO,

EQVITE AURATO DE STELLA POLARI,

S:Æ R:Æ M:TIS ARCHIATRO,

MEDIC. ET BOTAN. PROFESSORE REG. ET, ORD.

ACADEM. SCIENT. UPSAL. HOLMIENS. PETROPOL.

BEROL. IMP. NAT. CUR. LONDIN. MONSPEL.

TOLOS. ET FLORENT. SOCIO,

PUBLICO EXAMINI MODESTE SUBMITTIT,

CANUTUS AUG. LENÆUS,

JEMTLANDUS.

IN AUD. CAR. MAJ. AD DIEM XX. DEC.

ANNI MDCCCLXII.

H. A. M. S.

UPSALIAE.

Nobilissime atque Celeberrime Secretarie
Regiae Scient. Academiæ Holmensis

Nec Non
Eques Aurate De Stella POLARI,

D:NE PETRE WARGENTIN.

Avuncule Honoratissime,

Ne mireris, Honoratissime Avuncule, me in conspectum Tuum jam prodire. Graves certe subsunt causæ. Prodeo, inquam, non quasi bene, hoc tenui meletemate, de Te mereri videar: non quia mos est receptus jam dudum usu qui invalidit majorum. Veneratio, qua Te amplector, tan- ta, quanta esse solet, dum maxima, non adeo ar- etis continetur limitibus. Verum enim vero, ani- mus effuso exsultat gaudio quod, in præsenti, qualemcumque naetus sit occasionem semet pa- lam, hoc est, longe deditissimum gratissimumque declarandi. Adsit Tibi Deus faxitque, ut prospe- re omnia Tua succedant: faxit, non nisi satur an- nis honoribusque, e vita discedas. Permansurus
Honoratiss. Nominis TUL

cultor & cliens humillimus
CANUTUS AUG. LENÆUS.

Experientissime Medicinæ Doctor & Chirurg. Professor,
Celeberrime Chirurge Primarie Nofodochii Holmens.
Legionisque Vexilli Equestris, Academiæ Reg. Scient.
Holm. & Academiæ Reg. Chirurg. Paris. Coll.
Med. Regii Holmens. Nec Non Societ.
Chirurgiæ Holmens.

SOCIE,

D:NE O L A V E A C R E L,

L imina Tua vix, aut ne vix quidem, salutare au-
derem, nisi animum adderet, quo me semper
excepisti, favor plane singularis. Quoties ille mihi
succurrit, succurrit autem semper, haud exigua me
adficit sollicitudo, quod parum meritis in me Tuis
respondere potuerim. Utinam venerationem, qua
Te prosequor, longe maximam, verbis sat dignis
publice testificari possem! Immortales Tibi habeo
gratias, & habebo, dum vivam; referre enim ne-
queo. Usque adeo, Experientissime Domine Doctor,
in ære suin Tuo. Summum implorare Numen,
nunquam intermittam, velit omnia Tibi largiri ex-
optata, ut diu felix, Patriæ decus, vivas, floreas.
Futurus, dum vixero,

Celeberrimi Nomins TUI

cultor & cliens humillimus
CANUTUS AUG. LENÆUS.

Regements Fåldtskåren,
Ådel och Högaktad

HERR AUGUSTIN
LENÆUS
Och
Dygdadla Frun,
FRU ANNNA
HAGSTROM,
Mine Huldaste Föräldrar.

Jag kan icke uttrycka den glädje, med hvilken jag emottager et så önskadt tillfälle, men jag finner likväl alt för inskränkt ämne, at afbörda mig en af mina Käraffe skyldigheter. Thet är at för almänhetens ögon å daga lägga den ouphörliga vördnad och Tacksamhet, jag är mina Föräldrars skyldig för så otaliga välgjärningar, så ogemena prof af de ömaste huldheter, som jag från vaggan haft lyckan och förmån af mina Föräldrars uppbåra. Ach! om pennan vore skickelig at göra hjertat den tjenst, som det vid detta tillfället önskar fig. Ach! om de vördnads och ärkänsamhets rörelser, jag i mit innersta känner för mina Föräldrars, kunde allenast med allerminsta delen af deras liflighet afskilldras. Med hvad nöje upfatte jag icke då dessle rader, och med hvad hopp, at de visserligen skulle föra och behaga mina Föräldrar? Mina Föräldrars håppas jag ej anser gäfvan för den, som alt kunde vedergälla, utan hjertat med hvilket jag gifver den såsom härflytande af ett rått sonligt, vördnadsfullt och ärkänsamt sinne; hvars önskan är att länge se Sina Föräldrars höga ålder af den Högsta välsignas med hälsa, ro och välgång, då får jag och länge med sonlig vördnad lefva

Mina Huldaste Föräldrars

lydige son.
KNUT AUG. LENÆUS.



A n*o* 1. Ω.

Dum anxius hærerem, quodnam argumen-
tum, in tanta Morborum & Medica-
mentorum varietate, speciminis Aca-
demici loco publici juris facerem;
dubitanti mihi illico occurrebant Cantharides.
Haud equidem diffiteor, hocce argumentum, velut
alia, quæ ad scientiam Medicam spectant, adeo ab-
undanter, magnorum virorum opera, multis volu-
minibus, jam diu illustratum esse, ut ne tempus
quidem ac vires ad ea perlegenda atque recensenda
sufficerent; quæ quamvis uberioris tractationis an-
sam nobis præberent, curta tamen domi suppellex
longiorem rei propositæ explicationem prohibet. I-
taque, quam fieri potest, brevissime opinionem me-
am hac de re sistere animus est, ea minime spe,
fore, ut rei aliquid novi addam, vel dignitatem illi-
us proprio marte augeam, sed ut sententiæ oppu-
gnato-

A

gnatoribus argumentum, ad Materiam Medicam pertinens, adferam.

Præsens qualiscunque opella in tria Capita commode dividiri potest, dum Cantharides, 1:mo ut simplices, 2:o ut præparatas, 3:o quem effectum usum præstent, paucis considerabimus.

Cap. I. DIAGNOSIS.

Cantharides, in foro medico, quarum usus vulgaris atque communis est, ejusdem semper, per Europam, speciei ac nominis sunt. Cantharides sunt insecta coleoptrata, Antennis filiformibus, simulque moniliformibus; Thorace subrotundo; Capite gibbo, inflexo; Elytris flexilibus; Corpore viridi-sericeo. Insectis, hocce seculo, in ordinem systematicum redactis, atque Coleoptratis ab aliis distinctis, imprimis in his observabatur; Elytra esse flexilia instar pellis, cum tamen Elytra aliorum plerumque essent rigida & flexione fragilia; quam ob causam quoque Historiæ Naturalis cultores existimabant, omnia insecta coleoptrata, Elytra flexilia habentia, ejusdem esse generis & his igitur cunctis nomen Cantharidum tribuebant; sed postea, dum in eo res vertebatur, ut insecta accuratiori subjicerentur examini, eorumque Antennæ votum decisivum generum coleoptratorum habere perciperentur, hocce genus in duas partes est divisum, nempe 1:mo in ea, quæ habebant antennas setaceas, cum thorace planiusculo. 2:do in ea, quæ antennis pollebant moniliformibus, cum thorace teretiusculo seu rotundato. Eo modo, duobus generibus distinctis, ad ipsius naturæ datum & eorum structuram, necessum quoque ducebatur, cuilibet generi nomina addere diversa.

Priori generi nomen Cantharidis retinere concessum est, quoniam plures comprehendebat species, & minori immutazione indigebat; posterius vero coniunctum cum genere alio, antea stabilito, *Meloë* est dictum, quod nomen a Paracelso sumtum hic quoque recipere necessum habebant. Hanc ob causam Cantharides nostræ ad id genus non pertinent, quod a Zoologis nominatur *Cantharis*, sed *Meloë*.

Genus Meloës sequentibus Characteribus definitur.

Antennæ moniliformes, articulo ultimo ovato.

Thorax subrotundus.

Elytra mollia s. flexilia.

Caput inflexum, gibbum.

SPECIES, in omni materia medica, distincte propo-
ni debent, quare necessum duco, divisionem etiam *Meloës* observari, qui quoque commode in duas phalanges primarias distingvi potest, nempe, in earum *Meloës* spe-
cies, quæ habent 1:0 *Elytra abbreviata* absque subjacentibus aliis; 2:0 in eas, quibus sunt *Elytra longitudine abdominis* cum subjacentibus aliis: ad has pertinent *Cantharides nostræ officinarum*; ad illas vero *Scarabæus Majalis* seu *Scarabæus Unctuosus*, vel *Pro-Scarabæus*, in *Pharmacopoliis* olim dictus, cuius usus hodie apud Medicos fere in desuetudinem venit, forsitan eam ob causam, quod Medicis vera ejus vis & efficacia ignota fuerit; quam haud facile perspicere po-
tuerunt, quamdiu eum, vinculis propinquitatis, *Cantha-
ridibus nostris* coniunctum esse, nesciebant.

Species, quæ vesicatorium habent effectum, ad quem a Medicis usurpantur, sunt variæ, licet Medici hucusque una solummodo specie per totam Europam sint usi, quam huic loco subjiciendam esse necessum duco, ut Medicus *Pharmacopoliis* carens, aliis, si forte facilius obtineri queunt, inservire possit.

lmo. MELÖE vesicatorius alatus viridissimus nitens, antennis nigris. Syst. nat. I. p. 419. Faun. svec. 2. n. 827. Sultz. inf. t. 7. f. 55. bona.

Cantharis officinarum It. Scan. 186. Raj. inf. 101. Mouff. inf. 144. Aldr. inf. 276. Jonst. inf. t. 7.

Cantharis cæruleo-viridis, thorace teretiusculo. Mat. Med. 2. p. 328.

Habitat in Europa.

Hæ Cantharides Officinales nostrates sunt, quas Pharmacopæi plerumque a Belgis emunt, & hi ab aliis regionibus adsporant. Langius Oper. med. I. p. 430. dicit, eas per Germaniam colligi & deinde transportari in Hollandiam & Hispaniam.

Olim ex Hispania eas solummodo sumsimus, unde quoque, quæ, nostris temporibus, in Officinis referuntur, dicuntur Muscæ Hispaniæ, Spanska flugor; sed abunde satis occurunt per totam Europam, in locis, quæ, respectu ad Sveciam habito, meridiem spectant, ex. gr. in Hispania, Gallia, Germania, &c. Quid, quod, D. Præses in Scania quoque eas copiose juxta Malmogiam, Trelleburgum & Ystadium atque finitima loca reperiit, ubi sustentantur foliis Ligustri vulgaris, Syringæ vulgaris, Loniceræ Xylosteonis, Loniceræ Caprifolii, Sambuci nigrae, Fraxini excelsioris, (non vero in Orno reservata Cicadis), Populi nigrae & albæ, Bignoniæ Catalpæ; tamen imprimis ac plerumque Ligustri folia in margine rodunt, ita ut arte vel natura quasi ferrata videantur, ut quoque, solum e foliis ejusdem fruticis statim dijudicare possimus, an in loco obvio reperiantur: raro autem tempore meridiano in ramis fruticum commorantur, sed tum ad inferiores terræ latebras se conferunt. Qvum igitur Patria nostra sufficientem earum copiam ferat, non necessum erit, ex aliis regionibus eas accersere, cum sufficiens quantitas intra Patriam occurrat, & si non sufficeret

ret, in aliis locis plantari & multiplicari possent. Peracta Metamorphosi brevi tempore & vix ultra mensem Junii vigent, sed sensim pereunt & evanescunt, unde & Auditores, qui viderunt eas celeriter præsentes, magna cum multitudine, in arbustis se sistere, crediderunt, hæc infesta esse migratoria, originem e terris australibus deducentia, & summa deinde celeritate ad septentrionem advolantia. Insectum esse inquiunt nonnulli, quod aestivo tempore turmatim accedit, & vix moratrum vel quatuor dierum apud nos facta, iterum abit, nec apud nos nidulatur vel ova ponit. [Et alibi:] Tamen si vero nostris in oris subinde largam earum copiam videoas, adventus tamen & discessus brevi dirimuntur spatio, nimirum alimento deficiente avolant alio, ita ut vix per quatriduum uno in loco subsistunt, sed uti turmatim accedant, ita, agmine facto, rursum abeunt, & sine dubio loca calidiora, utpote Siciliam, Italiam ac Hispaniam petunt. Hinc sit, ut his nostris in regionibus, etiam si coire videantur, ova tamen non ponunt, nec pullos excludunt, qui videantur, sed omnes ejusdem magnitudinis, qua adultiores gaudent, conspicuntur. Hoc autem ab indole hujus insecti longe alienum est, quod, omnium tardissime jactando alas, sese in altum tollat; quare &, dum arbor feritur, in qua sedem suam habet, illico terram petit & vix ac ne vix quidem, e loco se movet, dum facile, nullam opem fugam quærens, carpi possit. Occasionem vero huic opinioni vel ipsæ dederunt Cantharides, quæ, brevissimo tempore, post peractam Metamorphosin, vident & brevi quasi evanescunt, unde rerum ignari illas migratorias judicarunt.

DESCRIPTIO harum Officinalium Cantharidum hæc est: *Corpus Oblongum, subcylindricum, viridi-sericeum. Antennæ corpore paulo breviores, filiformes, nigrae, articulis undecim subclavatis. Caput inflexum, subpubescens, punctis excavatis adspersum. Os labio e-*

marginato: Mandibulæ duæ, nigræ, vix labio longiores. **Palpi** quatuor, quorum duo majores viridisericei; duo breviores nigri. **Thorax** pubescens, linea longitudinali concava, lateribus superficie inæquali. **Elytra** longitudine abdominis, costis duabus longitudinalibus obsoletis, superficie punctis vix conspicuis concavis undique testa, margine exteriori patulo. **Ale** nigricantes. **Pectus** pubescens. **Abdomen** minus pubescens. **Pedum** ungues nigricantes. **Larvas** vel Pupas non vidimus.

2:do. MELÖE *Schaefferi*, facie & colore ad præcedentem accedit, ita tamen, ut distingvatur magnitudine triplo minore, sed imprimis antennis adeo singularibus, ut a reliquis omnibus differat & paucis vix describi possit.

3:to. MELÖE *bimaculatus* alatus niger, coleopteris luteis: maculis duabus nigris posticis. *Faun. Svec. n. 828.*

Hæ Species, Upſaliæ & in Fennonia, mature, mense regulationis & germinationis, reperiuntur, & nullum est dubium, quin eadem vi polleant cum antecedente. Nescio, qua se herba alant, nam hic in fossis arenariis interdum occurruunt, quo remigio alarum se contulerunt, sed propter innatam suam inertiam inde fugere non valuerunt.

4:to. MELÖE *Cichorii* alatus niger, thorace hirsuto, elytris fasciis tribus flavis. *Syst. nat. I. p. 419. Amæn. acad. 5. t. 3. f. 188.*

Chrysomela Cichorii. *Hasselq. It. 410. n. 101.*

Cantharis fasciata. *Imperat. nat. 901. f. 1.*

Hoc insectum non solum in toto Oriente, sed etiam in China & finitimis regnis reperitur.

Dioscorides Lib. 2. cap. 54. de suis Cantharidibus dicit, potentissimas esse variegatas luteis lineis, quas in pennis, (Elytris) transversas habent, promissoque corpore crasso & præpingvi.

Plin.

Plinius Lib. XXXIX. cap. 4. iisdem verbis fere utitur: *potentissimæ inter omnes variæ luteis lineis, quasi penas transversas habent, multum pingves.*

Imperatus, qui primus descriptionem hujus speciei reliquit, hunc Meloën Cichorii veram *Cantharidem Dioscoridis* & veterum statuit; quod facile largimur, quum hoc variis argumentis, facile demonstratur. 1:mo. Ex descriptione Hasselquistii sciamus Meloën Cichorii in toto oriente vulgarem esse. 2:do Ex ipsis proprietatibus, viribus & effectibus generi propriis, ad quod spectat. 3:to Ex loco, quod in agris eum degere afferit; visitat enim Cichorio, quod vulgariter in marginibus arvorum crescit. 4:to Ex fasciis seu latis transversisque lineis Elytrorum huic propriis. 5:to Ex eo, quod etiamnum hic hodie apud Chinenses officinalis sit. Ante aliquot annos a N. J. Fothergill. M. D. integrum Pharmacopolium Chinensium reportavit D. D. Praeses, in quo etiam unam scatulam hoc repletam inveniebat: adeo ut Chinensibus praesenti aëvo, hanc Dioscoridis Cantharidem usui esse, haud falso arguimus. Alias species, ut minus cognitas, parvas & usui Medico insufficientes prætereo.

Cap. II. PRÆPARATIO.

Ex datis sequitur, duas imprimis species Cantharidum, *Meloën vesicatoriorum* scilicet & *Meloën Cichorii* pro usu medico receptas esse, quarum prior in Europa frequentissimus officinis Europæorum sufficiat; posterior vero seu Meloë Cichorii, Cantharis veterum & Dioscoridis relinquatur gentibus orientalibus, apud quas vulgarissima.

Cantharides ab antiquissimis retro ævis Medicis pro usu vesicatorio innotuisse, dubium esse nequit, cum ipse Hippocrates eas usurpaverit; adeoque quod usus earum originem suam apud Arabes habuerit, uti Baglivius contendit, prorsus alienum nobis videtur. Mo-

Modus Cantharides colligendi perfacilis est ; si enim linteum super terram explicetur sub arbore, ubi reperiuntur & baculo leviter ramos percutamus, omnes decidunt supra linteum & facile colliguntur. Sic lectæ citissime exsiccentur in fumo vel in olla supra ignem, ut mox pereant, vel etiam prout Dioscorides tradit, quod facile, vase non picato condantur & raro mundoque linteo, obligato ore & deorsum converso, suspendantur super acetum ferventis, quam acerrimi, balitum, donec æstu exanimentur, postea linteo transfixæ reponantur. Perinde vero est, quomodo interficiantur & siccentur fumo, seu quavis alia faciliiori methodo.

Veterum plurimi jubent rejicere Caput, Elytra & Pedes, solumque Corpus retinere pro usu Medico ; sed hoc supervacaneum esse ducimus, cum omnes earum partes eadem gaudent vi, adeoque & integræ, prout apud nostrates in Pharmacopœis occurrunt, servari possunt.

PRÆPARATA Cantharidum in Officinis nostris communiter tria occurrunt.

1:mo *Pulvis*, circa quem observandum, quod, qui eas in pulverem redigit, sedulo caveat, ne pulvis in fauces evolet & excitet faicum inflammationes aut Hæmoptysin ; quod neque pulverem nudis manibus vel digitis nimis verset, quia pulvis facile inhæret Epidermidis & vesicas exitat.

2:do *Essentia* Cantharidum sequenti modo præparatur.

Pharmacop. Londinensis formula:

Rec. *Cantarid. pulverisat.* Drach. duas.

Coccionell. Unciam semis.

Spirit. Vinos. tenuior. Libram semis.

Digere & colare per chartam.

BARTHÖ.

BARTHOLINI Th. formula:

Rec. *Pulveris Cantharid. Scrup. unum.*
Vini Rhenan. Uncias quatuor.

M. stent per aliquot dies, filtrantur per bibulam Dr.
dosis cochlear 1. in vini Cochlear. 7. pro vehiculo.

3:to Emplastrum vesicatorium secundum Pharmacopœam Wurtenbergensem ita præparatur:

Rec. *Pulveris Cantharid. Uncias quatuor.*

Ceræ flavæ Uncias decem.

Terebinth. venet.

Olei. rosar. a a Uncias binascum semis:

Camphoræ drachmas tres.

M. f. Empl. extendendum supra alutam, ad justam
determinandamque latitudinem.

Quod si vero in votis sit, ut hocce emplastrum fortius operetur, aliquid pulveris cantharidum superficie Emplastri extensi inspergimus, nec non partem corporis ante applicationem aceto inungimus, ut promptius vim suam vesicatoriam exferat; quamvis plurimi statuant vim Cantharidum ab acidis potius infringi, quam augeri. Ceterum, qui ruri degunt, possunt pulverem Cantharidum miscere cum miva aut fermento panis acidi & nudo corpori applicare.

LOCA corporis, quibus applicari debeant, sunt partes teneriores: 1:mo *Nucha seu Cervix.* 2:do *Pone Aures.* 3:to *Brachii musculosa supra carpum.* 4:to *Crura* quatuor digitos supra malleolum. 5:to *Caput,* abrasis capillis. MODUS applicandi hic est: 1. Abluitur locus aceto, postquam crines, si adsunt, scalpello ablati sunt. 2. Applicatur Emplastrum Vesicatorium vel pulvis Cantharidum cum fermento panis in formam Emplastri redacto. 3. Munitur Emplastro glutinante, spleniis & fascia. 4. quando, post decem circiter horas, vesica se-ro turgida conspicitur, Chirurgus forcipe illam sauciet

ut serosus humor exeat. 5. Quando folia Brassicæ ad manus sunt, ulcerata pars aperta per ea vel alia servatur. 6. Chirurgi autem plerumque imponunt Empl. de sperm. Ceti, Empl sperm. Ranar. de Minio, Cerussæ vel aliud quocunque. 7. si scopus Medicis sit, ut ulcerata pars diutius aperta servetur, aliquantum pulveris Cantharidum ulceri inspergunt, unde fluxus seri diutius continuatur. 8. Si vero ulcus inde malignam induat naturam, Melle Rosaceo illinendum.

Cap. III. VIRES.

Plura sunt infesta, quæ, more Cantharidum acroribus spiculis seu particulis scatent, ex. gr. Onisci, Coccionellæ, Grylli, Larvæ Phalænarum, &c. Dum Listerus aliquando pyxides aliquot repurgaret, in quibus Larvæ Phalænarum in perfectam abierant Metamorphosin, & pulverem ex his relictum flatu dispergeret, evolabat pulvis in ejus faciem, quæ inde tota in pustulas elevabatur, certo indicio, pilos lanamque quarundam Phalænarum non minus vesicatoria scatere qualitate, quam ipsæ Cantharides. Immo *Meriana* aliquie Surinamum petentes, narrant, speciem Larvarum Lepidopterarum hirtarum ibi reperiri, quas tangere nudis manibus, sine periculo inflammationis, nemo audet.

Qua ratione hæ acres Cænthonidum particulæ vim suam exserant, unde tantam obtinuerunt famam, æque nobis est ignotum, ac, cur succus Euphorbiæ, eodem modo ac eæ, pustulas operetur: Interea, per quotidiam infallibilemque experientiam certissimi sumus, Cantharidum vim esse vesicatoriam, easque, haud aliter ac subtilissimas, novaculae, corporis solidas partes dissecare, fibras rodere, & vasa Lymphatica perterebrare, adeoque ubiunque aditus datur inflammationes excitare; qvare etjam unum hoc Medicamentum inter heroica & violenta reponendum, nec sine summa cautione interne propinandum est.

USUS

USUS Cantharidum duplex est, internus & externus.

INTERNUS usus, qui apud veteres magis receptus fuit, a recentioribus Medicis plerumque rejicitur, quoniam fidem nunquam habere potuerunt medicamento ejusdem indolis, ut omnes partes, quas attingit, dissecet, præterquam quod a paucis in *Hydrope* desperata ad hibentur Cantharides, dum, haud aliter ac interna Paracentesis, vasa Lymphatica dissolvunt & apertam viam sero per alvum vesicamve reddunt; quare etjam ab Hoffmanno tom 3. p. 541. inter specifica in *Hydrope* numerantur, præsertim ob vim earum summam in pellenda urina seu aqua Hydropicorum. Ex observationibus autem *Listeri* evidenter constat, ejusmodi corrosiva potius palliativa dicenda, quam vera & genuina medicamenta; quamobrem etjam ægri quibus Essentiam Cantharidum propinavit, initio quidem ab his malis æque ac paracentesi externa non nihil levati fuere; brevi tamen omnes inevitabili fato occubuerunt. Dum interne præscribuntur, omnibus observationibus constat, eas imprimis aggredi vias urinarias, qvare etjam inter prima habitæ sunt *diuretica*, eamque ob caussam, a veteribus in *Ischuria* seu omnimoda urinæ suppressione, tanquam duro cuneo in duro ligno adhibitæ fuerunt; cum aliis diureticis, in Gonorrhœis, ad expurgandum virus siphiliticum, saepè insignem effectum præstantes.

Medicamenta, quæ excitant & urgent sanguinem ad renes, plerumque etjam genitalia, per vasa Emulgentia petunt, qvæ originem suam prope renes habent; quare etjam Cantharides pro valido *Aphrodisiaco* a veteribus habitæ sunt, sed ob noxam quam adferunt, unanimiter hodie apud sapientiores Medicos in hunc plane usum exulant. Medicinæ studiosus Upsaliensis Holmiam accendens a viro quodam, Holmiæ habitante, rogatus fuit, ut Elestuarium gustaret sibi præscriptum tanquam egregium

Aphrodisiacum, cuius dosis magnitudinem æquaret glan-
dis; hic nescius isti Eleætuario inesse Cantharides, duplam
assumit dosin. Ex templo profectus Upsaliam, in itine-
re, sine omni tentigine libidinosa, horrenda stranguria
una cum Hæmaturia correptus est, tantaque vis morbi
erat, ut nisi in proximo diversorio obtinuisse & ingur-
gitasset maximam copiam laetis calentis, & dein Upsa-
liæ redditus infusum Radicis Althææ haussisset, faci-
le de eo aëtum fuisset.

Debitam circumspectionem, circa internum ejus u-
sum, vix, ac ne vix quidem adhibere possumus vel ac-
curatissime dosin observantes, ideoque nulli Canthari-
dum internum usum valde svaldemus; sed potius nisi
summa urgeat necessitas plane exulare jubemus.

EXTERNUS usus Cantharidum vero maxime pro-
ficius est. Pulvis inspersus mali moris ulcera mundifi-
cat, & pus promovet. Ulcera *Cacoëthica* ægerrime, ut
notissimum est, curantur, nisi prius vesicatorium, ex
Cantharidibus confeatum, applicetur, quod consumat
putrida, ut ulcus purum obtineatur, unde facilius dein
sanatur.

Revulsionis loco inservit, ut rubefaciens & de-
mum exulcerans. Duæ namque regulæ in Medicina ob-
tinent, quæ maximi sunt momenti, nempe 1. *Dolor dolo-
rem trahit;* 2. *Duae evacuationes simul stare nequeunt.* Du-
plici hinc scopo Cantharides applicantur, quod scilicet
irritent, quodque evacuent. Quamobrem hæ usus fre-
quentissimi sunt, nimirum, cum materia *Artbritica* est
retrograda ad viscera nobiliora, ut ad Caput, Thora-
cem & Abdomen, quare etiam tunc pedibus sunt appli-
candæ, ut materia morbifica trahatur ad partes inferio-
res. Alteri scopo inserviunt Cantharides evacuando se-
rum corruptum & stagnans, quemadmodum venæ
sestione educitur ex inflammatis visceribus sanguis cor-

ruptus. Quando subito frigori aperti pori corporis calentis exponuntur, attrahitur & irruit atmosphæra frigida, unde serum corrumpitur, quod vitiatum habet vim multiplicativam uti acidum lactis, unde *Catarrhus*, *Rheumatismus*, *Odontalgia*, *Otalgia*, immo *Febres intermitentes* & exacerbantes derivantur. In hisce malis utramque saepe paginam absolvit vesicatorium, quod educit corruptum serum ipsamque morbi caussam tollit.

Applicatur interdum vesicatorium ipsi Thoraci in *Pleuritide*. Certe in Pleuritide spuria eximum est, cui sedes est in musculis intercostalibus, ut hac ratione per latus exulceratum serum corruptum seu crusta inflammatoria evacuetur, & inflammatio versus exteriora trahatur, ne ad interiores nobiliores se diffundat partes; præterquam quod Pleuriticorum sputum mire sollicitat & promovet vesicatorium. *Soporosis* etiam infervit morbis, capiti impositum, abrasis pulis; ut serum extravasatum, vel copiosius si adsit, evacuetur. In *Delirio* frequenter adhibetur ad locum a Capite remotissimum applicandum, ut trahat impetum sanguinis ad partes a cerebro remotissimas. In *Pbrenitide* vero præstat illud capiti raso impone-re, sed circumspeti Medici hic, si unquam alias, caute agunt, cum observarint vesicatoria copiosioria febrem saepe accendere & lingvam sicciorum reddere, atque inde, ægrum pejus adfici.

Baglivius gravissimus Medicinæ Auctor in egregia sua Dissertatione *de usu & abusu vesicantium*, pulchre docet p. 592. §. II. in quibus morbis vesicatoria omnino exulare debent.

Qui graviter vulnerati Capite fuerunt, cum vomitu, defectu sensuum aliisque gravibus læsi cerebri symptomatibus, dum illis applicabantur vesicantia, nonnulli paulo post vehementissimis convulsionibus corripiebantur. Alii sudoribus frigidis, quibus superveniebat mors, paucis interjectis horis aut diebus,

labo-

laborabant; alii sequenti nocte moriebantur. Qui lue venerea semel laborarunt, ab adhibitis vesicantibus summopere læduntur, in quocunque demum morbo adhibeantur; unde nonnisi in maximis sanguinis coagulationibus & morbis soporosis in talibus ægris præscribantur, haud tamen sine debita prudenter. In febribus ardentibus & continuis, in quibus adest magna sanguinis agitatio & impetus. In tempestate anni calida & sicca, atque in ardentioribus pariter temperamentis, regionibus, vietis generibus, ætate juvenili &c. In affectibus nervosis cum febre ad ardente inclinante. In affectibus, comatosis febrium, quæ accedunt ad ardentes. In Morbis pectoris spasmoidicis, inflammatoriis, & a salino acri constitutione sanguinis productis, in omnibus, inquit, hisce casibus in pejus cessisse vesicantia, pluries observavimus.

Commendat quoque vesicatoria Baglivius in affectibus impetuosis & quidem modo derivandi, modo revellendi animo. Hujus generis sunt, *Dolorifici, Chronicæ:* in Capitis affectibus præcipue *Hemicranicis, Ophthalmicis & Odontalgicis* & tandem in *Artbriticis* insultibus recentibus, præcipue quando congestio est seroso acris; magis autem sanguineis congestionibus Phlebotomiæ seu evacuationes sinceri sanguinis utiliores sunt.

Prosunt etiam adversus *Lippitudinem*, præcipue illam, quam humidam vocant; adversus *Lethargum* & si inexpugnabilis dormiendi necessitas hominem urget.

Vesicatoria non operantur in partibus mortuis, sed eo ferocius aggrediuntur vivas; unde separatio vivæ a mortua parte per illa facile obtinetur.

Inter stimulos, certe principem obtinere locum vesicantia, ac omnibus affectibus ante memoratis convenire, Mechanici uno omnes ore fatentur. Quamobrem plurimi morbi, vix ac ne vix quidem curantur, nisi adhibeantur vesicantia: in aliis contra in pejus abeunt, si imprudenter usurpantur.

Verbo. Conducunt vesicantia,

1. *Pulsui*, ubi debilis observatur.
2. *Expectorationem* Pleuriticorum promovent.
3. *Exanthematum* eruptionem augent.
4. *Arthriticis*, ubi materia est retrograda, conveniunt.
5. In *Rheumatismo*, *Catarrho*, *Gravedine*, *Coryza*, *Odontalgia*, *Otalgia*, febribus intermittentibus & exacerbatibus profundunt.
6. In *Amblyopia*, *Suffusione*, *Lippitudine*, *Ophthalmia*.
7. In *Tussi* cum sputo crasso copioso.
8. In *Apoplexia* & morbis Soporosis.
9. In *Asthmate* ex repulsa scabie.
10. In *Convulsionibus* sine febre & in *Epilepsia* juvant.
Nocent vero in primis sequentibus.
1. *Plethora*, *juvenibus* calidis, constitutione aëris calida, Macilentis.
2. *Siphiliticis* & iis, qui antea Siphilitide laborarunt.
3. *Febribus ardentibus* seu *Phlogisticis* & *Phrenitidi*.
4. *Gravidis*, *Calculosis*, *Menstruantibus*.
5. *Evacuatoriis* morbis.
6. *Convulsionibus*.

S. D. G.



Min VÅN,

Att spanska flugan känna rått,
Och hennes kraft med fördel bruка,
Till önskad lindring för de siuka,
Ej sker, som mången tror, så lätt.

Erfarenhet din lärdom ökt,
Uti din konst du intet felar,
Din hand så väl, som flugan, helar,
Jag har det kánt och sielf försökt.

En sáker løn dig förestår,
På flit förtjenst och beder fólja,
Sig måste afund modfåld dólja,
Når dygden främst bland dessa går.

Far stilla fort till årans høgd,
Din vetenskap i gerning lyse,
Din omsorg andras vålgång byse,
Den lyckan gör dig vårdigt nøgd.

P. E.