

Disputatio medica inauguralis, de epilepsia / [Johann Georg Macasius].

Contributors

Macasius, Johann Georg, -1653.
Schelhammer, Christoph, 1620-1652.
Universität Jena

Publication/Creation

Jenae : E Chalcographeo Lobensteiniano, 1644.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/yqkabnap>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

D. O. M. A.
 DISPUTATIO MEDICA INAUGURALIS
^{De}
EPILEPSIA,

Quam
 DECRETO ET AUTORITATE
 NOBILISSIMI ET GRATIOSISSIMI COLLEGI MEDICI
 in Academia Salana

Præside
 MAGNIFICO RECTORE
 VIRO

Nobilissimo, Excellentissimo atque Experientissimo

Dn. CHRISTOPHOROSCHEL-
 HAMMERO, Hamburgensi, Medicinæ Do-
 ctore, Anatomiaæ, Chirurgiaæ atq; Botanices Professo-
 re Publ. Horti Medici Præfecto, Facultatis Decano Spectatissimo,

Dn. Promotore ac Patrono suo colendo,

Pro consequendis summis in ARTE MEDICA HONORI-
 BUS & PRIVILEGIIS DOCTORALIBUS

Publicæ disquisitioni subjicit

JOHAN GEORG MACASIUS,


Egranus.

ad diem 9. Octobr.

Horis locoq[ue] solitis.

JENÆ,

E Chalcographeo LOBENSTEINIANO.
 ANNO CLX XCIV.



VIRIS

*Nobilissimis, Amplissimis, Excellentissimis,
Experientissimis*

DN. JOHANNI MICHAELIS, Phil. & Med. Doctori, & in Academia Lipsiensi Professori Publ. celeberrimo, Facultatis Seniori, minoris Principum Collegii Collegiato, & Illustrissimi Principis Dn. Dn. Frederici Wilhelmi, Ducis Saxoniae Consiliario Medico &c.

DN. WERNERO ROLFINCKIO, Phil. & Med. Doctori, per Europam famigeratissimo, Practicæ & Chim. in Academia Jenensi Professori Publ. Celeberrimo, Facultatis Seniori venerando, &c.

DN. JOHANNI REHFELDIO, Med. Doctori Eminentissimo, in perantiqua Erphordana Professori Publ. Celeberrimo, ejusdem Reipubl. Consuli spectatissimo:

*Dominis Praeceptoribus, Patronis ac Promotoribus
suis filiali observantia & honore colendis,*

*Hoc exercitium inaugurale in grati animi τεκμή-
γεων & ulterioris favoris incitamentum*

submisè offert

Johan Georg Macasius,
Autor & Respondens.

POPE POPE POPE POPE

I. N. J.

Variantum & portentosum morbi genus Epilepsia! ad cuius nomen *Plinius* despiciens sicutum scripsit, terribile siquidem in accessione, horrendum in vigore, turpe in desinentia ; adeò, ut si se mutuò in accessiōnibus spectantes ægroti, quæcunque patiuntur, cernerent, non ultra vitam ducere vellent. Ab ea homo, omnium animalium potentissimus rex, à quo omnia debellari debuerant, tam subito prosternitur, tamque horronda distensione cōcussione atq; tortura, atrocissimè dilaniatur ac disperditur cum magno astantiū pavore & timore. Præcipuum enim ejus propugnaculum, ac fortissimam arcem, cerebrum nempe, rationis & animæ summam sedem, invadere audet, hacque ob sidione & incautis insultibus prorsus æquat ea solo, ac extremam ruinam sensibus nostris tum internis, tum externis, nec non ipsis spiritibus, vitæ nostræ assertoribus, intentat & minatur. Abstrusa autem est ejus natura, ægreque se cognoscendam præbet ; lis quidem est perpetua, æquus autem judex inventus adhinc nullus : unde *Averrhoës* omnes de hoc morbo disceptationes fabulis cantantium aut musicorum dixit esse proximas. *Crito* etiam celeerrimus medicus veram mali epileptici ante vitæ exitum dignotionem exoptat *epist. 137. Scholtzij.*

Sed cum hostis ingenio ipsius incognito & spreto potissimas exerat vires, ideò, ut insultus ejus manifestos & machinationes clandestinas devitemus, naturam ejus quantum ex arte licet, ex fontibus Dogmaticis & Hermeticis expiscari, quaque ratione aggressiones ejus præsentes elidi, futuræ verò devitari queant, thesibus hisce inaugralibus tradere conabimur. Tu verò

O nostris quæso Deus annue cœptis.

Ut autem πολύμορφον n. est epilepsia, quam alii ab Ἐπιλέστειν, quod cerebrum & partes subjectas ita apprehendat, ut functiones illarum intercipiat Cælius Aurelian l. 2. ac. c. 4. alii ab Ὑπείπειν derivant, ita etiam varia tum apud Dogmaticos, tum apud Hermeticos sibi acquisivit nomina, partim à symptomatibus, partim à loco, causis, subjecto de-
prompta. Hipp. dicitur

morbū sacer communiter lo-
quendo l. de morb. sacr. (quan-
quam hanc nominis notatio-
nem l. d. refutet) vel ob ma-
gnitudinem, vel ob curæ diffi-
culturam, vel ob causæ subli-

Paracelsus, qui morbis reme-
diorum nomina plerunque
accommodavit, vocat mor-
bum Φlatum, viridellum t. 1.
p. 72. caducum l. de cad. mor-
bum sideratum Quercet. in-
tetrād. p. 158.

mitatem, vel ob partem obsessam Aretæus de caus. & sig. diut.
morb. l. 1. c. 4. pulchrè de hac nominis notatione differit Lan-
gius l. 1. epist. 25. Morbus item puerilis l. de aér. loc. & aq. ful-
gor puerilis 6. Epid. s. 1. t. 5. νέος etiam μεγάλη. Aristoteli
probl. 1. s. 30. vocatur morbus Herculeus, sive, ut ipse vul-
quod Hercules tanquam melancholicus ea laboraverit, sive
secundum Gal. 6. Epid. com. 6. t. 7. quod sit δυοπαταυχητόν ॥
Cælio dicitur lunaticus. A Latinis sc. Celso L 3. c. 23. vocatur
major morbus Comitalis, quod in Comitiis frequentissime
manifestetur, & quod hujus causa antiquitus differebantur.
Q. Serenus; undè etiam Plinio, Cassio, Gellio l. 1. c. 20. Sonticus
dicitur, Apulejo divinus, aliis caducus. Avicennæ puerorum
matrem appellari placuit. Germanico idiomate venit
das Fresel/schwere Noht/Gebrechen fallende Sucht.

Sumitur vox caduci vel generaliter l. 3. paragr. c. 1. §. 2.
& 3. t. 4. l. de cad. t. 5. p. 239. pro vertigine, tremore,
ecstasi, syncope, matricis suffocatione, tetano, oris tortura,
incurvatione spinæ dorsi, jectigatione &c. vel specialiter
pro epilepsia propriè dicta à Paracels. d. l. Severin. id. med. c. 14.
Scheuneman. med. ref. c. 3. Quercet. in tetrad.

Est autem Epilepsia (*secundum Hermeticos Dogmaticos*) motus convulsivus interpolatus totius corporis, cum sensuum principumque facultatum detentione, dependens ab insigni irritatione principii nervorum & membranarum cerebri.

GENUS est motus convulsivus, symptoma in motu depravato *Gal. 3. loc. aff. 7.* hunc præ detentione facultatum principū elegimus. Quæ cunque enim facultatum animalium primò afficitur, ejus etiam symptoma generis loco ponendum; jam verò fa*l mon. l.r. diff. 6*

cultati motrici hoc accedit. Nam quando causa epileptica cerebro communicatur, membranas & nervorum principium vellicat & molestat. Hinc facultas expultrix insurgit ad expulsionem molesti, undè dilatat se cerebrum & magna deinde vi constringit. Quia autem ex se sufficiens non est ad noxiū depulsionem, facultatem motricem in consensum trahit, quæ lacessita totum genus nervosum in expulsionem movet. Interim dum ita constringitur cerebrum, spiritus variis modis turbantur. Cum autem ad functiones principes non solum spirituum præsentia, sed & in motu legitima dispositio requiratur, cum sola quies secundum *Hipp. l. de morb. sacr. cerebrum* sapere faciat, prudentiam subministret & intelligentiam causet, illo læso, has etiam lædi necesse est; hæc tamen, læso saltem secundariò & ob spirituum vehementem *rieg. 2.* accidit. Imò dantur etiam epilepsiae spuriæ, in quibus tamen nec internorum nec externorum sensuū manifestæ lassiones apparent, motus verò convulsivi utpl. adsunt *Valles. l.s. contr. 16.* id quod nuperrimè in fœmina quadam Cygnea ob-

Epilepsia (*secundum Hermeticos*) est morbus spirituallis, ortus à vapore & ali, maligno, mordicante, pungente, acido, membranas cerebri & nervosum genus constringente, vellicante, spiritusque turbante, cum sensuum & rationis interceptione.

GENUS est morbus spiritualis, quod docent causa ejus subtilissima, generationis modus spiritualis, penetratio validissima, qua sæpe ex improviso, momento q.s. adoritur, nec non curationis ipsius momento *Petr. diff. harco* ponendum; *mon. l.r. diff. 6*

servavi, quæ illas convulsiones etiam aliquo modo sensit. Ex eadem causa sensuum etiam abolitio deduci potest; nam, ut sensio fiat, duobus opus est, alteratione scil. instrumenti & alterationis perceptione & dijudicatione; at hic sensus communis præpeditus est, & alterationem in instrumento factam non percipit, spiritus enim est veluti attonitus, quare nō imaginari, non ratiocinari, non meminisse potest. Hoc evenit etiam in intensioribus animi cogitationibus; nec enim vides, nec audimus, apertis etiam oculis & auribus, sensibilium tamen oblatio & instrumentorum alteratio non accusanda. Dicimus autem motum convulsivum, vera enim convulsio non est, nam motus est interpolatus & cum functionum principum & minus principum vitio conjunctus, quod alienum à vera convulsione; interim in hoc conveniunt, quod uterq; à facultate motrice lacesita proficiscatur; sibi soli enim relata non nisi ἀργαρέτως movet

SUBJECTUM primarium περιτονίου est cerebrum 3. loc. aff. 7. adæquatum vero & denominationis totum corpus. Nam cum actiones animales in omni epilepsia, modo sit legitima & exquisita, præ vitalibus & naturalibus maximè laborent, (quod patet ex totius corporis concussione & sensuum læsione) organum etiam ipsorum præ reliquis affici demonstrant. Cor quidē in consensu nonnunquā trahitur, quod palpitationes, animi deliquia, pulsuñ perversiones &c. demonstrant indè tamen cùm Quercet. in tetrad. pro parte primariò affecta non obtrudendum; nam & sic in hypochondriaca, cardialgia, uteri suffocatione &c. in quibus maximè laborat cor, pars primariò affecta esset. Quid quod etiā pluribus in ipso paroxysmo ventriculus subvertatur, semen profluat, excrementa dejiciantur, pro primario tamen subjecto illæ partes hinc habendæ non iunt. Et licet multæ dentur epilepsiae, citra ullam imaginationis, phantasie aut memorie læsionem, salvis etiam

SUBJECTUM primarium est caput Paracelsi l. 3. paragr. c. 1 §. 1. principium n. paroxysmi est in capite: & nisi cerebro affecto nunquā paroxysmat epilepsia id. t. 4. tr. 1. de morb. ament.

etiam visu & auditu, tamen evenit hoc saltem in spuriis, in quibus vis non est tanta, ut etiam facultates principes & sensus laedat, sufficit si aliquales saltem convulsiones excitet, quarum certè cor non est autor quia nec motus animales secundum naturam imperat. Quod autem una afficitur cor, fit, vel quod materia peccans à cerebro expulsa cordi etiam communicetur, vel quod ob respirationem impediat fuligines & sanguinis collectus cor angustent, vel quod mali fomes & causa antecedens in corde lateat ex obs. *Donat.* *Marcel.* l. 2. hist. med. mirab. c. 4. vel quod vapores maligni versus caput tendentes cor in transitu laedant *Holler.* l. 1. de morb. intern. c. 15. in *Schol.* Afficitur autem cerebrum primariò non secundum medullarem ejus substantiam 4. loc. aff. 2. nec ut ventriculis distinctum, sed secundum membranam tenuem per totam cerebri amplitudinem, ventriculorum parietes & basin cerebri extensam. Eatenus enim exquisitissimi est sensus, adeò ut vel ad auram molestam insurgat, & sternutamentum cieat; per accidens quidem substantia etiam secundum poros ex constrictione laeditur.

CALISA PROXIMA & immediata est irritatio facultatis expultricis membranarum cerebri & principii nervorum. Magna quidem de hac causa est controversia, dissentientesque opinones *Hipp.* l. de morb. sac. sanguinis refrigerationem & motum ejus in venis impeditum, aërisque receptionem denegatam, à pituita in utero collecta, liquata & venis ex capite insula causatam, proximam causam statuit lib. verò de flat. obstructiones venarum partiales à crasso flatu accusaz.

CAUSA PROXIMA est vellicatio & constrictio membranarum cerebri. Cùm enim in meningum generare, quæ exquisitissimi sensus sunt partes in cerebro, acrimonia, malignitate & virulentia eæ partes erodi compungi & acriter tendi sentiunt, sit, ut inopino insultu violentoq; cerebrum cum causa morbifica confligat ac colluctetur, hacque ratione sese contrahat, ac veleti in sua arma colligat, ut à vellicantis materiæ offensione sese tueatur, undè spasmi

Ga-

Galenus vero ad partiale
ventricolorum cerebri à cras-
so humore factam obstructi-
onem recurrit, ob quam ani-
malis spiritus nequit in ner-
vos influere, undē natura im-
pedita, arctius oppressa, non-
dum tamen prostrata onus
q.s. excutiens, caput corpus-
que vehementer concutit.,
dum soluta obstructione in-

& cōvulsivimotus excitātur
Querc. intetmd. Quia v.vapo-
res & spiritus gales hinc in-
de velut in magna tempestate
venti & nubes feruntur, reli-
quis spiritibus commiscētur
eosque turbant *Pet. Job. Fa-*
ber in myrothec. spag. c. 30.
principum facultatum & sen-
suum functiones etiam læ-
duntur..
farctum humorē excutiat, hinc apoplexiā & epilepsiam.
cognatos affectus facit 2. *aph. 45.* utpote qui eundem locum
occupant, & eundem humorē habent mali causam, differunt
saltem secundum magis vel minus. Verum an sola perfrige-
ratio sanguinis , ejus motus aērisque receptio impedita epi-
lepsiam possit inducere, dubitamus ! Et si sola pituita esset
causa, qui fit, quod biliosi quoque ea corripiantur, ex ira et-
iam, odoribus, inedia &c in eam incident. Obstructio au-
tem locum habere nequit: Oporteret enim motum in uni-
versum prohiberi vel imminui, quantitate spirituum , qui
transeunt, non sufficiente ad partes inferiores movendas; ob-
structio enim ut obstructio tantum valet alicujus substantiæ
aut facultatis distributionem lädere aut impedire. Sed ve-
hementior, quàm ante, apparet concussio & motus inæqua-
litas. Et quomodo tanta humoris frigidi copia potest col-
ligi, ut uno momento obstruat ventriculos, præsertim separa-
tos per corpus callosum, & in diviso cerebro locatos, ut de
uno in alium motus sit difficultis ? Et certè cum apoplexia
& epilepsia ad diversas motus læsi species pertineant, specie
etiam diversas causas obtinebunt. Sternutatio autem sin-
gultus & epilepsia cognati affectus sunt 3. *loc. aff. 7.* undē
etiam *Avicen.* sternutationem parvam epilepsiam vocat ;
at sternutatio non oritur à viscidis humoribus obstruenti-
bus, sed acrem potius vaporem anteriora cerebri velli cantem
emittentibus, unde natura molestum excussura hunc motum

ciet :

ciet : sic & verisimile epilepsiam à simili causa sc. vellicatione
potius membranarum cerebri & principii nervorum, quam
ventriculorum obstrukione excitari. Quid quod epilepsia
sæpius nascatur συμπάθεια ex aura frigida saltem ascen-
dente Gal. 3. loc. aff. 7. ex aère etiam & vento concepto Ronde-
let. l. 1. cur. morb. c. 36. ex vapore, cuius causa multi interie-
runt Fernel. abscessu cerebri aut meninge corrupta mephytin
olente id. 5. de part. morb. & sympt. 3. 2. de abd. rer. caus. 15. ex
ira, inedia Gal. 5. loc. aff. 6. in quibus tamen talis obstructio
ventriculorum cerebri non accusanda. Tota autem de ob-
strukione partiali sententia falsa nititur hypothesi. Galenus
enim in ea fuit opinione, ventriculos & pro spirituum gene-
ratione & pro eorum conservatione constructos esse , ut vi-
dere est ex l. 7. de plac. c. 3. l. 3. loc. aff. 5. Hinc illis obstructis
spirituum in nervos Αγάδων impediri, & sic motum anima-
lem vel proflus afferri, ut in apoplexia, vel imminui, ut in
epilepsia. Verum longè aliud ventriculorum structura & spi-
rituum natura nos docet. Excrementorum enim potius,
quam spirituum sunt receptacula , unde naturaliter aqua &
pituita in ventriculis hæret Clariss. Slegelius , Praeceptor
quondam noster honorandus in demonstratione anatomi.
Cum enim caput in suprema corporis nostri parte locatum
velut tectum domus calidæ ex Gal. 9. us. part. 1. ex inferiori-
bus partibus ascendentis vapores recipiat , quos præ imbe-
cillitate coquere & discutere nequit : ex sanguine etiam in
cerebro tum pro nutritione, tum pro spirituum animalium
generatione ulterius elaborato excrements separantur, locus
aliquis pro horum collectione erit concedendus ; nam ubi
natura communem coctionis officinam instituit, receptacu-
lum exrementorum propè apposuit; Hic autem commo-
dissimus erunt dicti ventriculi ; unde infundibulum etiam
adjecit sagax natura, ut in palatum, os ac nares omne alienum
in cerebro humidum descenderet. Hanc sententiam con-
firmant etiam sectiones ; plurimorum enim ventriculi ex-
rementitio humore penitus repleti inventi fuerunt , ut in
hydrocephalis , inde tamen neque epilepsia neque apople-

xia inducta *Vesal. human. corp. fabr. l. 1. c. 5. Gvib. Fabric.*
cent. 1. obs. 12. Contra verò epileptici post mortem secti nul-
lam obstructionis notam monstrarunt. Quomodo autem
hæc causa proxima sc. irritatio & vellicatio, motum convul-
sivum excitet, explicatu difficillimum: sed dicamus, quan-
tum in hac rerum caligine assequi licet. Cum materia epi-
leptica ad membranas & nervorum principium transmitti-
tur, tanquam partes maximè sensiles pro innata potentia eas
vellicat & molestat. Hinc vis expultrix excitata insurgit, ut
noxam à se depellat, cerebrum dilatat atque comprimit, at-
que ista compressione, quod sibi molestum, excutere conatur,
quemadmodum etiam in sternutazione, quæ ideo *Avicenna*
parva epilepsia dicitur & singultu agere consuevit. Verum
quia ad hujus noxæ depulsionem sufficiens non est, anima-
lem etiam in consensum trahit, idque magis, quod ipsum
etiam principium facultatum laboret, quæ molestata ob irri-
tationis vehementiam, totius animalis salutem, & eam, quæ
est in toto corpore, sympathiam partium & actionum, obse-
qui cogitur, & hunc motum coacta seu permittit seu impe-
rat, quem non coacta nec permisisset nec imperasset, sibi soli
enim relicta non nisi *αρρεπέτως* movet. Quia autem prin-
cipium nervorum patitur, *τὰ περικόρα* etiam, nervi scil. &
musculi in consensum trahuntur, qui omnibus viribus alla-
borant, ut noxa cerebri depellatur, non quia ipsi à causa
morbifica semper obsessi, sed quia principium nervorum pa-
titur *Carol. Piso tr. de colluv. serof. obs. 24. p. 107.* Consensum
hunc videmus etiam in sternutazione; ex levè enim partis an-
terioris cerebri irritatione musculi thoracis in consensum
trahuntur, & ad expellendum insurgunt; ex punto etiam
nervo totum aliquando convellitur. Motum autem hunc
fieri cooperante facultate animali, patet; nam illa contractio
& extensio muscularum est actio propria, musculi autem
sunt organa facultatis animalis; à causa morbifica non fit
illa contractio & extensio, nam morbus & anima eundem
motum non producunt. Interim tamen lœsam esse omnino
concedendum est. Sed dies: morbum hunc ex irritatione

non

non posse provenire, quia perit sensus tactus, & hinc appetitus salutare prosequendi & noxium fugiendi. Verum ut sit de tactu, cuius vestigia, licet sub ratione confusa, remanere statu, irritationem tamen causam esse posse puto. Nam ad illam percipiendam non semper facultas animalis requiritur, sed sufficit naturalis. Nam unde quæso singultus, ab animali ne an naturali facultate irritata? Dolorem & molestiam rei vellicantis non sentimus, interim motum præternaturalem expultricis observamus. Sic humores vitiosos in crisi separatos, aut à purgante medicamento attractos natura tanquam noxios expellit, procul dubio ante lacessit, quod symptomata crisi antecedentia demonstrant, inde tamen appetitum animalem excitatum fuisse nemo dixerit. Proinde etiam in epilepsia irritationem posse consistere, sensu licet ablato, putamus: motum autem convulsivum insequentem facultatis motricis esse opus statuimus. Nec tamen abs non videtur, inferiorum motum convulsivum ex propria nervorum & muscularum passione deducere. In illa enim cerebri contractione, quæ in infantibus tactu etiam deprehensa, materia vaporosa aut substantia immaterialis, ad nervos & inde muscularum principia detruditur. Unde etiam diutius durat paroxysmus, si motus convulsivus omnino inhibetur, causa enim peccans non potest dissipari. Hinc musculi etiam lacessiti insurgunt, & ad suum principium retrahuntur. Quia tamen materia illa est vaporosa aut admodum tenuis & facile discutitur, contractio illa est saltem momentanea & ob tam extenderentes, quam contrahentes musculos affectos sit in utramque situs differentiam.

CALUSA CONTINENS
est substantia acris & peculia-
ri vi cerebro infesta membra-
nasque cerebri & genus ner-
vorum vellicans Crassa au-
tem an tenuis sit dubitant.
Crassam vult *Hip. l. de morb.*
sacr. Gal. 3. aff. loc. 5. 2. sympt.

CAUSA CONTINENS
est vapor & alis, malignis &
virulentis qualitatibus stipi-
tus. Per & autem hic intelli-
gitus partem maximè vola-
tilem, penetrabilem cujus-
cunque rei, quæ proportione
tertio principio, hypostatico

caus. 7. 3. m. m. 2. l. de atr. bil. 5. | respondet, & secundum mi-
2. aph. 45. Æginet. l. 3. c. 13. & | neræ suæ ideam variis & di-
alii. Verum cum citò fiat, | versis signaturis se prodit,
citoq; solvatur, nullo relicto | undè modò constringit, stu-
sui vestigio, nec insigni eva- | pefacit, modò vellicat, mor-
cuatione subsecente, etiam | det & alia efficit, prout sc. ex
si centies una die paroxysmū | minera salina, sulphurea aut
excitet, evidens etiam da- | mercuriali elevatur Paracels.
mnum ex translata ad partes | t. 4. p. 253. Interim tamen
materia non oriatur, tenuis | principium mercuriale in
potius, quam crassa erit sta- | hoc præpolleat necesse est,
tuenda; hoc signum enim | alias non esset vapor Galis,
materiæ tenuis ipse Gal. po- | sed vel Θinus vel Φeus: im-
nit l. de trem. & palp. c. 5. Ac- | pressas tamen reliquorum
cedit, quod sæpiissimè oriatur | tincturas habere potest, pro-
ob victum tenuem, vaporosum, | ut etiam in ΘΦeo Φ, in mer-
vinum fumosum Holler. | curiali vero mercur. se pro-
l. i. morb. inter. c. 15. bilem, | dit. Hinc etiam rectè Paracels.
undè multis etiam solvitur | quot species mercurii, tot et-
morbus per vomitum bilio- | iam species morbi caduci seu
sum id. in schol. ad c. 16: ab aë- | differentiæ. Paracels: t. 3. l. 3.
re, vaporibus & odoribus pra- | paragr. c. 2. §. 3. t. 5. p. 213. Se-
vis, ut suffitu succini, galba- | verin. id. med. p. 315. Scheu-
ni, cornu capræ, hepatis hir- | nem. med. ref. c. 3..
ei, ellychnii extinti &c. in quibus tamen nulla crassities ac-
cusanda. Clarissimè hoc probant epilepsia per sympathiam,
quæ etiam frequentissimæ; in illis enim veluti auram frigi-
dam ascendere ægroti sentiunt, quod tamen humor crasso
competere nequit, motus enim sursum est ipsi p. n. Igitur
πνεματικὴ potius τὶς γένος, ὁστερὸν αὐλεῖ, quæ mole minima
virtute verò maxima sit, cum Pelope, aut tenuis humor, quām
crassus causa epilepsia statuenda. In idiopathica tamen ma-
jor aliquomodo crassities, quām in sympathica concedi pot-
est. A credini autem & mordacitati hujus materiæ mali-
gna quoque proprietas, membranis cerebri & nervoso gene-
ri peculiariter infesta, quæ veneni instar perpetuas q. inimi-

citias nervoso generi juravit, conjuncta sit, necesse est, *Fern.*
l. 5. part. morb. & sympt. 3. 2. abd. rec. caus. 15. qualem ipse
Gal. in uteri strangulati ex menstruo & semine corrupto or-
to, concedit *l. 6. loc. aff.* Nam multi dantur morbi, in qui-
bus acres humores & indè exhalantes vapores acres (quod ex
subsequenti cephalalgia patet) caput petunt, ut sunt lues ♀,
febres ardentes, phrenitis, meningum corruptiones, quibus
tamen epilepsia non conjungitur. Videatur *Cl. Sennertus l.*
1. pract. part. 2. c. 31. q. 3. Marcell. Donat. l. 2. hist. med. mir.
c. 4.

CAUSÆ ANTECEDEN-
TES sunt omnia, quæcunque
specifica illa corruptione
sunt infecta & materiam a-
crem, malignam, cerebroque
adversam suppeditare pos-
sunt, sive sint partes conti-
nentes, ut cranium corruptū
& cariosum, meninx cor-
rupta calvæ adhærens, absces-
sus cerebri *Fern. l. 5. de part. morb. & sympt. 3.* sive contentæ,
sc. humores quilibet, sanguis, sive intra sive extra venas con-
tineatur *Gal. 4. ac. t. 27. Avic. fen. 1. 3. tr. 5. c. 8. Zacut. Lusi-*
tanus l. 1. hist. 26. pituita, Gal. l. c. melancholia Forest. lib. 10.
obs. 62. bilis Costœus, atra bilis, humores serosi, ut urina restâ-
gnans Heur. de aff. capit. c. 22. semen corruptum in utroq; sexu
Zac. Luf. l. 1. hist. 19. aut humor semini analogus, qui corruptus
veneni naturam induit Riolan. Antropogr. l. 2. c. 34. vidit enim
duabus in virginibus testes pugno grandiores semine putrido
turgentes, sanguis menstruus Hip. l. 3. Coac. t. 12. sanies
in ulceribus, Fernel. in consil. pro epil. foetus mortuus, Schen-
kius obs. 183. l. 1. vermes Quercet. pharmac. dogm. rest. cap 7.
chylus corruptus Heurn. de capit. morb. c. 22. &c.

CAUSÆ REMOTÆ sunt
quæ ad antecedentium & me-
diatarum generationem, vel

CAUSÆ ANTECEDEN-
TES sunt radices & mineræ
epilepticæ in corpore lati-
tantes, quæ secundum dige-
stionum suarum tempora ta-
les vapores emittere & fru-
ctus producere valent, & sunt
humores ♂ rei, mucilaginosi,
æruginosi, ♂ lati arsenicales,
alūinosi, armōiaci ♂ ales, &c.
l. 5. de part. morb. & sympt. 3. sive contentæ,
sc. humores quilibet, sanguis, sive intra sive extra venas con-
tineatur *Gal. 4. ac. t. 27. Avic. fen. 1. 3. tr. 5. c. 8. Zacut. Lusi-*
tanus l. 1. hist. 26. pituita, Gal. l. c. melancholia Forest. lib. 10.
obs. 62. bilis Costœus, atra bilis, humores serosi, ut urina restâ-
gnans Heur. de aff. capit. c. 22. semen corruptum in utroq; sexu
Zac. Luf. l. 1. hist. 19. aut humor semini analogus, qui corruptus
veneni naturam induit Riolan. Antropogr. l. 2. c. 34. vidit enim
duabus in virginibus testes pugno grandiores semine putrido
turgentes, sanguis menstruus Hip. l. 3. Coac. t. 12. sanies
in ulceribus, Fernel. in consil. pro epil. foetus mortuus, Schen-
kius obs. 183. l. 1. vermes Quercet. pharmac. dogm. rest. cap 7.
chylus corruptus Heurn. de capit. morb. c. 22. &c.

CAUSÆ REMOTÆ sunt
omnia illa, quæcunque per-
corruptionem eam naturam

motionem, vel faciliorem
susceptionem faciunt, & sunt
tum internæ, tum externæ:
referri autem possunt ad res
naturales, non naturales &
præternaturales.

induere possunt, ut in ærugi-
nosum quoddam, \oplus latū aut
aliud prædictum virus dege-
nerent, aut quæ sua natura ta-
lem succum suppeditant, aut
ad corruptionem illam indu-
cendam faciunt.

NATURALES sunt conceptio aut nativitas silentie lu-
na aut in Eclipsi lunari secundum Astrologos videatur *Ptole-
meus*, aut fluentibus mensibus *Holler. de morb. inter. c. 15.* ætas
puerilis 3. *aph. 25.* juvenilis *aph. 29.* oris ventriculi aut cere-
bri naturalis *Say. Æntia*, cerebrum debile, membranarum
eius textura nimis rara.

NON NATURALES, & sunt ea quæ ASSUMUN-
TUR, ut aér crassus ex assiduis imbrisbus 3. *aph. 16.* cibi cor-
rupti, excrementitii aut peculiari qualitate epileptici, ut
carnes hædinæ, hepar hircinum & caprinum, coturnices, pass-
eres, angvillæ, *Farentinus*, tubera, fungi, allium, porrum, ex
cujus assiduo usu concitaram, & ejus abstinentia sublatam
vidit Epilepsiam *Dorvynetus l. 3. apologet. c. 2.* lentes *Jul. Ale-
xand. l. 8. salubr. c. 7.* fructuum horariorum esus, lactis ni-
mia ingurgitatio *Hildesheim. in spicileg. p. 599.* lac nutricis
ira, terrore &c. corruptum, nimia vini generosi ingurgitatio,
medicamenta purgantia fortiora 5. *aph. 1.* Odores rerum
fætidarū, bitumis, picis, gagatis *Mercurial. de morb. cap. Cor-
num, hepatis caprini assati, apii Avicen. l. 3. fen. i. tr. 5. c. 11.*
Arnold. de villa nova l. 1. c. 2. *Tral. l. 1. c. 15.* *Plin. l. 20. c. 11.* Δ ,
 \diamond subl. &c. Huc referri etiam potest inedia *Gal. 5. loc. aff. 6.*

QUÆ GERUNTUR ut vehementior exercitatio, præ-
sertim à cibo, otium 5. *san. tuend. 6.* somnus post cibum co-
piosum, evigilatio repentina *Capivac. l. 1. pract. c. 16.* nimius
♀ usus, subita animi consternatio ex decollatione *Weinrich.
l. de monst. c. 15.* epileptico cadente *Plater. l. 1. obs. ira 5. loc. aff.
6.* terror ex inopinata aquæ affusione *Hechstetter. obs. 8. dec.
4.* ex tubarum sonitu *Forest. l. 10. obs. 54.* in *Schol.* ex fabella-
rum

rum & figmentorū enarratione *Me. curial.* l. 2. de morb. puer. e. 3. hinc rectè *Plato* tales terrores prohibuit l. 2. de Repub. ob nuncium triste *Amat. Luf. cent.* 2. cur. 90. *Montan. conf.* 50. intensior animi cogitatio ; *Plater. l. 1. obs.* sic *Jul. Cæsar* cogitabundus sæpius hoc malo laboravit, titillatio, gestatio fœtus in utero *Fernel. l. 5. pathol.* c. 3. *Jacchin. in 9. Rasis c. 14.*

QUÆ RETINENTUR & EXCERNUNTUR : excrementa alvi retenta, urina retenta *Heurn l. e.* sanguis menstruus retentus *Hip. s. 3. Coac. t. 12.* hæmorrhoides suppressæ &c.

QUÆ EXTRA ADHIBENTUR, ambiunt & incidunt, calor ☀, radii ☃, tempus vernum 3. *aph. 20.* autumnale ☄ *aph. 22.* balneum *Gabelkoffer. cent. 4. cur. 59.* medicamenti venenosi applicatio *Forest. l. 10. obs. 54. in schol.* corium caprinum crudum corpori appositum &c.

PRÆTERNATURALES sunt vel adventitiæ vel innatae : adventitiæ sunt intemperies cerebri, calidi innati debilitas *Capivac.* capitis ictus *Langius l. 1. c. 10.* vulnera, *Valesc. de Taranta,* corruptiones & putredines meningum, quod observavi in tinctore quodam cygneo, abscessus, inflammationes cerebri *Fernel. 2. abd. rer. caus. 15.* caries crani *Forest. l. 10. obs. 67. in schol.* ulcus cacoëthes, détitionis dolores in infantibus, febres humores fundentes *Jacchin. in 9. Rasis c. 14.* Cruditates ib. prava viscerum constitutio, ob quam corpus fit cacoëthymicum *Fernel. in conf. pro epilept.* & continuo mali fonti nova materia supeditatur. *Ischuria, Hechstetter. decade 5. cas. 10.* menstruorum obstructiones *Hipp. 3. Coac. t. 12.* punetura scorpii, contagium teste *Bertino l. 12. suæ med. c. 3.* unde rus ablegabant antiqui suos epilepticos, ne familiam inficerent. *Apollejus 1. apolog.* venenum assumptum *Gorrhaeus in defin. med.* Innatae sunt vel hæreditariæ, vel simpliciter congenitæ : hæ proveniunt vel à nutrimento vitiioso fœtus, vel ex errore formaticis, ut quando uterus relictus imperforatus, ex qua postmodum epilepsia orta *Gvih. Fabric. cent. 3. obs. 60.* vel quando ex terrore matris dispositio epileptica fœtui imprimitur. Illæ sunt dispositiones epilepticæ à parentibus mediante semine & sanguine in liberos jure hæreditario derivatae, non ali-

aliter ac s^epiusculè parentum species & individuales secundum naturam proprietates similes unà cum semine in liberos transfunduntur.

Quomodo autem hæc mala in filios deriventur, admodum obscurum; neque enim ratione animæ, neque ratione corporis seminalis hæc propagatio videtur concedenda; non animæ, quia ex se est impatibilis, nec ulla morbis obnoxia, & in anima idea corporis simpliciter considerati, non morbos hæret; non corporis, quia corpus generatur ex semine & sangvine in testibus & utero elaboratis, quomodo igitur vitium, quod in capite hæret, propagabitur cum semine invasis spermaticis formato, nisi statuamus, semen ex toto & singulis partibus decidi, quod tamen absurdum. Verum, ut præteream, quod ejusmodi μιασματα sese multiplicandi vim habeant, si sangvinis motum observemus, facile ex hac difficultate nos extricare poterimus. Nam cum sangvis per singulas corporis partes fluat refluatque, non mirum, si in transitu hujus vel illius partis prava diathesi afficiatur, & νοσώδεις Αγκείοις secum afferat. Quia autem sangvis hic, qui jam erat in capite, mox lege circulationis potest pervenire ad partes inferas, & sic etiam ad testes derivari, & in semen elaborari, una etiam in semine manebunt morbosa hæc seminaria; nam tales formæ subordinatae à principali non expelluntur, utpote sibi non contrariæ. Dices: illa particula seminis, si totum non sit infectum, quæ in se morbosum principium continet, est indifferens ad positionem in formatione fœtus, ita ut vel manus vel pes, vel oculus, vel aliud quid ex illa possit generari, quomodo E. ab epileptico potest generari epilepticus, si particula seminis epilepticum principium continens non in caput, sed vel in pedem vel aliud membrum est formata? Sed scias: quando tale principium in aliquod membris est ingeneratum, tunc à forma superiore coeretur, ne illius potentia traducatur in actum, & tunc quietum manens in corpore ejus existentia non percipitur; interim tamen nec hoc omnino otiosum est, sed se ipsum conservare, & persuam speciem se evolvere studet, donec tandem digestio-

stione sua absoluta calore nativo vel debilitato, vel alia cau-
sa accedente, quæ superiorem, à qua coércebatur, infringit,
ipsum jam liberum & ad suam maturitatem perductum, se-
ipsum evolvat, & juxta sui ideam effectum prioris signaturis
insignitum producat. Quod autem particula prius in ca-
pite, postea vero in pede v. g. existens, eundem produc-
morbū, causa est propria essentia, quæ non hoc, sed illud
membrum respicit, quod ex venenorum varietate videre est.
Nam causa epileptica in pede existens non potest producere
epilepsiam, nisi capiti communicetur, quia aliás non potest
fieri motus convulsivus totius, nisi affecto principio motus.
Nec etiam alium producit morbum in pede, quia nervorum
principium afficere natum est, non aliud membrum; & si
evolveretur in pede, nec tamen capiti communicaretur, non
fieret epilepsia, sed levis quidam convulsivus motus partis
determinatae.

Ad DIFFERENTIAS accedimus: variæ autem eæ sunt;
præcipuè tamen sumuntur à genere, subjecto & causis:

I. Ratione GENERIS alia est simplex, alia composita;
simplex, quæ nullo alio morbo comitatur: composita, quæ
cum alio affectu v. g. melancholia, *Horst. l. 2. obs. 8.* Syncope,
suffocatione uterina *Forst. l. 10. obs. 30.* est conjuncta. Ultra-
que autem est vel exquisita vel spuria: exquisita, quæ est uni-
versalis, & cum principum facultatum abolitione vel magna
imminutione, quam supra definivimus. Spuria, quæ est par-
ticularis, qua non totum corpus convellitur, nec æger con-
cidit, sed qua aliquæ saltem partes convelluntur, & vel caput
tantum concutitur *Holler. l. 1. morb. intern. c. 16. in schol.* vel
oculi contorquentur, vel manus *Cæsalpin. l. 5. art. med. c. 29.*
& pedes hinc indè jactantur, vel manus clausæ tenétur *Dodo-
næus c. 97. obs. med. in schol.* vel æger in chyrum agitur *Eraſt.*
in anatom. comit. Mont. part. 2. pag. 195. aut hinc indè dis-
currat, stat *Beniven. de abd. rer. cauf. 97.* sedet *ib.* nec concidit
Marcell. Donat. l. 2. hist. med. mir. c. 4. nihil interim loquitur,
audit, sentit *ib.* vel exigua aut planè nulla facultatum princi-
pum læsio adest, recordatur quæ acta sunt *Brunn. conf. 14.* quæ

aliquando vertigini est finitima *Fernel. s. de part. morb. & sympt. c. 3.* Alia est gravior, alia mitior, pro symptomatum ratione: alia recens, alia inveterata: alia periodica, quæ certam habet periodum, ut illius ancillæ à *Fravenprisniß*/ quæ ante quatuor annos hic vagabatur, quæ alternis diebus epilepsia corripiebatur, alia est erratica: alia est frequens, ut in Mercatore quodam Egrano, qui singulis ferè horæ quadrantibus epilepsia corripiebatur, observavi, alia est rara, &c.

z. Ratione SUBJECTI: alia fit per primarium cerebri affectum & est idiopathica, quando sc. causa antecedens in ipso cerebro stabulatur: *Ranchino tr. de morb. sub. c. 2.* dicitur humoralis: alia sympathica, quæ accidit sine primario cerebri vitio causa ex inferioribus ad cerebrum derivata: *eidem* dicitur vaporosa. Idiopathica autem est duplex: fit n. vel per protopathiam, vel per devteropathiam; per protopathiam, quando causa morbifica in parte affecta ejus vitio generatur, vel etiam immediatè ab extra in eam immittitur. Per devteropathiam fit, quando alterius partis vitio cerebrū afficitur, translata vel transplantata causa ab aliquo loco in cerebrum relicta priore radice, foco & seminario, quod contingit vel per *άραδοχην* criticam, vel *μετάσεων* symptomaticam. *Hörst lib. 2. obs. 10.* Sympathica est, quæ sine ullo praecedente cerebri vitio contingit ob partis alterius morbum. Fit autem vel per epigenesin, cum causa morbifica per venas, arterias vel nervos à priore foco adhuc subsistente transmititur in cerebrum: vel per simplicem communicationem, vel similitudine generis, aut societate operis, vel communione vasorum. Sympathica contingit vel ob totum vitiosum, vel ob partem: ob totum, quando sanguis in totius venis est corruptus & tetur vaporem in cerebrum mittit *Capivac. l. t. præct. c. 16.* Crito in consil. Scholtz 42: id quod etiam in febribus contingit, & variolis. Pars autem est vel interna vel externa. Interna, ut ventriculus *Gal. 5: loc. aff. 5.* Ilien Holler. in schol. ad c. 16. l. 1. de morb. inter. hepar, Cor Marcel. Donat. l. 2. hist. med. mirab. c. 4. Intestina Jul. Cæsar. Claudiu. consult. 64. Quercat. in pharm. dog. c. 7. uterus, sive quod fœtus vivus.

in

in eo gestetur Fernel. l. 5. part. morb. 3. sive mortuus Forest. l.
10. obs. 66. in Schol. sive quod secundina retenta, sanguis men-
struus in eo restagnet Forest, ibid. vel jam fluat, seu quod sit
imperforatus Guilb. Fabric. cent. 3. obs. 60. Vesica Heurn. de
morb. capit. c. 22. Testes & vasa spermatica Alzaharavius lib.
pract. tr. 1. s. 2. c. 34. Domin. Leon. l. art. med. 14. Thom. à Veiga
l. 6. loc. aff. com. in c. 5. Externa pars potest esse vertex Fernel.
5. pathol. 3. labrum superius Dovynetus l. 3. apolog. c. 2. articu-
lus humeri, brachium Favent. c. 11. de med. morb. Pollex ma-
nus Zacut Lusitan. l. 1. hist. 20. minimus digitus Holl. l. 1. morb.
inter. c. 16. in Schol. manus dextra ib. sinistra Hechstetter. decad.
4. cas. 7. pes Trallian l. 1. c. 15. Sura Holler. ad c. 16. l. 1. Coxa
Gattinaria &c.

3. Ratione CAUSARUM, alia est hæreditaria, alia
adventitia: alia provenit à causa externa, alia ab interna:
alius causa autecedens est humor biliosus, melancholicus,
alius sanguineus, phlegmaticus, serosus; alia ex semine, ver-
mibus, cranio carioso &c. alia fit cum communicatione ma-
teriæ, alia cum communicatione qualitatis seu speciei spiri-
tualis. Reliquas differentias tanquam minus ad curam utiles,
sponte præterimus.

Restant SIGNA. Hæc autem sunt vel diagnostica vel
prognostica. DIAGNOSTICA vel imminentem affectum
denunciant, vel præsentem manifestant. IMMINENTIS
signa sunt oculorum caligo, somnia turbulenta, pavor in so-
mno, membrorū trepidatio, inordinatus lingvæ motus, me-
moriæ læsio, capitis versatio, dolor, gravitas, aurium tinni-
tus, pallor faciei, urina cruda, tenuis Forst. l. 10. obs. 62. PRÆ-
SENTIS signa pulchrè explicat Aretæus l. 1. c. 5. & sunt patho-
gnomonica casus subitaneus, motus corporis concutiens &
convulsivus varius, detentio functionum principum: Epi-
phænomena spuma circa os, seminis, fecum alvi aut urinæ in-
voluntaria excretio, interdum adest magna vociferatio eaq;
inconcinna, dentium stridor, sonitus cum stertore, respiratio
angusta & offendens 4. aph. 68. Et hæc sunt signa legitimæ &
exquisitæ: Spuriæ verò & partialis sunt mitiora, adest enim

interdum partialis tantum convulsio, sc. capitis, oculorum, manuum, pedum hinc indè discussio & alia leviora, quæ supra in differentiis dicta. Reliqua signa differentiarum ratione GENERIS ex medici observatione & ægri relatione facile patescunt.

SIGNA DIAGNOSTICA ratione SUBJECTI.

In IDIOPATHICA adest ingens & continuus ferè capitis dolor & gravitas, mentis, sensuum & motus stupor, insomnia sunt turbulentia, præcedit plerunque vertigo tenebrosa, oculorum caligo, frequens aurium tinnitus, & alia capitis per se affecti signa adsunt. Paroxysmus crebrius affligit, sine ulla ferè mali pressione hominem corripit, paroxysmus est longior, cum vehementioribus symptomatibus, in partibus etiam inferioribus nullum evidens vitium deprehenditur, quod hujus mali causa statui possit, nec vapor ante paroxysmum ad caput ascendens sentitur: intervallum est impurum, plerunque manet gravitas & oblivio, frequenter circa novilunium & plenilunium invadit, spuma in paroxysmo est copiosior, venæ sub lingua sunt virides secundū *Avicen.* SYMPATHICAM arguunt, si cerebri per se affecti signa absint, si sc. extra paroxysmum cerebri actiones non ita vitiantur, si pars aliqua inferior præ cæteris vitio labore, vapor vel aura ante paroxysmum per continuatas partes in cerebrum ascendere videatur, cuius etiam impetus incipiens injecto vinculo arctiori cohiberi aut imminui potest. Paroxysmus est brevior, symptomata etiam non ita vehementia, ob oculos non nulla quasi spectra versari videntur, ut in suffusionibus incipientibus. In specie sympathica ratione COR-DIS, conjunctam habet ejus palpitationem, tremorem, anxietatem, animi deliquium, pulsū varium &c. Sympathicam ratione VENTRICULI arguunt ejus rosiones, turbationes aut dolores, cardialgia, gravitas aut tensio circa præcordia, coctio debilis, adsunt ructus, difficilis inediæ tolerantia, præsertim si ab èvaginatio ventriculi oriatur, præcessit cogitatio inedia, cumque accessio proxima est, nausea, cordis dolor, animi defectio & contractio labii inferioris acci-

cidit : post paroxysmum sequitur vomitus , plerumq; bilio-
sus aut alius corruptus , quo accedente , paroxysmus etiam
cessat . Ab INTESTINIS si provenit , adsunt eorum tormina ,
in paroxysmo magis ventrem dejiciunt : plerumque autem
oritur ratione vermium in iis contentorum , quos monstrant
præcedens dentium stridor , tremor membrorum , terror &
clamor in somno subitus , narium pruritus & frictio , salivæ ,
præsertim nocturno tempore , ex ore effluxus , facies pallida ,
mox tamen incalescens & rubens , morsus & dolor ventricu-
li & intestinorum , abdominis frequens contrectatio , rugitus
& tormina ventris , ejus insolita durities , atrophia membro-
rum , tussis sicca , fœtor oris , singultus , vermium cum fecibus
ejectio . Ex HEPATE sympathiam monstrant dolor in de-
xtre latere , adsunt signa hepatis affecti vel obstructi &c .
Ex LIENE si est , declarant habitus corporis melancholicus ,
præcessit victus crassus , excrementitius , in sinistro latere sen-
sus gravitatis aut doloris percipitur , conservata sanguinis me-
lancholici per hemorrhoides evacuatio est suppressa , color
faciei est lividus , præcessit vel jamdum adest morbus melan-
cholicus . Sympathiam ex UTERO designant dolor circa
uteri regionem in pectine , in utroq; inguine , in dorso ; abdo-
minis crebro à flatibus fit distensio , respiratio difficilis , cordis
palpitatio , dolor capitis adest , & alia , quæ suffocationem
uteri sequi solent , conjungitur seminis aut menstruorum ,
secundinarum vel fœtus mortui retentio aut alia supra dicta
adsunt . Epilepsia ex sympathia PARTIUM EXTREMA-
RUM cognoscitur ex affectu illarum partium , ex aura vel
vapore adscendente , quæ nunc cum stupore , nunc cum tre-
more , nunc cum musculi alicujus cōtractione incipit Cæsalp.
art. med. l. 5. c. 29. interdum præcessit vulnus , contusio , ulcus
aut morsus animalis venenati in ea parte Sen. l. 1. præf. p. 2.
c. 31. dolor item aut tensio ante paroxysmum percipitur ,
superinjecta vincula paroxysmum instantem vel tollunt ,
vel minuunt .

Signa CAUSARUM ex propriis indiciis patent ; humor
pituitosus cognoscitur ex facie pallida , ætate puerili , temper-

ramento frigido & humido, victu tali, anni tempore frigido humido, somno profundiore & longiore, crebra expuitione, narium muco copioso, ingenii stupiditate &c. Melancholicus ex antecedente victu crasso & feculento, mœstitia, temperamento frigido & sicco, anni constitutione tali, insomnia adsunt terribilia, spuma est exigua. Bili plerunque coniunctum est delirium: atræ vero furores. Semen continuam facit in venerem propensionem, illo etiam emissio, cessat epilepsia *Alzaharavius l. præt. tr. 1. s. 2. c. 34.* plerumque effluit in paroxysmo. In vapore adest tinnitus aurium, paroxysmi sunt leviores, minusque diurni. Et ne in magnam molem ex crescant theses, reliquarum differantiarum signa consultò præterimus, & ad prognostica transimus.

PROGNOSTICA SALUTIS. Epilepsia quidem ex se lethalis non est, accessionum tamen continuatione & symptomatum frequentia interdum jugulat, hinc ratione GENERIS omnis periculosa: periculosior tamen in qua functiones animales valde sunt læsæ, convulsio est vehementior, quæ recens continenter & validè cum anxia respiratione recrudescit, & si desinat in altam quietem, nec à remediis sternuat æger, spumaque abstersa sæpius recurrit cum stertore, immemorque actorum si surgat, & si ex improviso concidat: talis enim plerunque est lethalis; valde etiam periculosa, quæ fit cum tinnitus aurium, clamore, stridore dentium, ejctione seminis, & vix curatur *Holler. l. 1. de morb. int. c. 15.*

Ratione SUBJECTI: Epilepsia per primarium cerebri affectum deterior, quam sympathica: sic universalis, quam particularis, & quo partes præstantiores in consensum trahuntur. Gravidam epilepsia coripi malum: sic & infantes vix à nativitate epilepsia correpti raro evadunt *Forest. obs. 57. l. 10.* in senibus verò eveniens raro curatur *2. apb. 39.* una tamen vel altera historia extat apud *Trincavell. l. 1. c. 29.* *Forest. l. 10.*

Ratione CAUSARUM. Epilepsia hæreditaria raro vel nunquam curatur *Holler. l. 1. c. 15.* ex pituita aut humoribus tenuioribus orta facilius, difficilior quæ ex atra bile curatur, ut & si oriatur à veneno scorpii aut alio, seu ob innatam quan-

dam

dam dispositionem pravam; à vermis difficulter etiam expugnatur, salutis tamen spes est; magnam inanitionem sequens, plerunque lethalis *Forst. l. 10. obs. 62.*

LONGITUDINIS. Plerunque est morbus longus, precepiuè si accessiones habet raras. Et si nec pubertate, nec menstruorum proruptione nec puerperio solutus fuerit, ad mortem sàpè comitatur *3. apb. 28.* Ante pubertatem eveniens, curabilis, post annum vero 25. invadens, ferè ad mortem usque durat.

MODI EVENTUS. Plerunque cum virtù partis terminatur; hinc pulchrè *Aretæus*: epilepsia quæ cum ætatis flore evanescit, abiens qd. pulchritudinem invidia quadam deformat, aut manum inutilem reddens, aut faciem torquens aut sensum aliquem afferens. Puerulis epilepticis ulcera, scabies, pustulæ prorumpentes, bonum; terminantur enim ejus paroxysmi *Hip. l. de morb. sac.* Juvenes tum ætatis mutatione, tum loci & victus liberantur si sc. ab innata intemperie fiat *2. apb. 45.* & in pueris ♀ usus, in puellis menstruorum fluxus morbum tollit, si sc. per sympath. In senibus plerunque in æque gravem affectum desinit, ut in illo, cuius *Trincavel. l. 1. cons. 29.* meminit, in scabiem enim leprosam terminabatur aut, in cœcitatem *Gvil. Fabr. l. 5. obs. 5.* Epilepsia gravidarum magna ex parte à partu cessat *Æginet. l. 3. c. 13.* nisi sit inveterata. Comitiales magna ex parte fiunt melancholici *3. loc. aff. 7.* unde etiam quartana superveniente liberantur *Gal. l. 6. Epid. in fin.* Accessiones sàpius repetentes & longæ & vehementiores in apoplexiā transiunt *Cœsalp. l. 5. art. med. c. 29.*

CURA. Difficilis autem est ejus curatio. Et qui Herculeum hunc morbum semper profligare novit, æquales cum *Hip.* ob depulsam ex Illyria pestem honores meretur. Unde Menecrates, teste *Athen. l. 7. dipnosoph.* celebris hujus morbi medicus, nunquam in publicum, nisi suis, quos curaverat, habitu Deorum vestitis stipatus, ipse vero purpura vestitus, aurea corona decoratus, crepidatus, sceptrum denique in manibus gerens, velut alter Jupiter, prodire solitus est. Est

autem hæc curatio vel therapeutica vel prophylactica: hæc causam antecedentem, seminarium & radices respicit, & ne novus paroxysmus generetur, prohibet: illa ipsum morbi insultum, paroxysmum & fructum sibi curandum proponit.

Paroxysmus jam jam instans sui inhibitionem, præsens verò remotionem indicat: quod perficitur, si causa epileptica intercipitur, revellitur, derivatur, evacuatur, dissipatur, contemperatur, fervor spirituum sedatur, venenosa & virulenta acrimonia corrigitur, cerebrumque & affectæ partes corroborantur. Perficitur hoc remediis tum internis, tum externis. Instans inhibetur, per ligaturas convenientes partium exteriorum, si sc. per consensum sit, per exhibitionē pilulae de laudan. epileptic. ol. cast. aut succini in aq. approp. pulv. alicujus epileptici per inunctionem narium cum bals. rut. succin. castor. &c. Præsens vero sequenti modo tractandus. Æger igitur statim collocetur loco lucido & mediocriter calido, capite aliquantulum elevato, inclametur proprio nomine, hinc dentes constricti diducantur, spuma abstergatur & ex ore evellatur, sacculus ruta, sinapi, pyrethro & castoreo plenus & oxymel. intinctus interseratur, quo sic aeri liberior pateat ingressus, spumæ egressus, linguaque ex præcione non periclitetur. Membra convulsa leniter ad naturalem situm reducantur, & in eo absque tamen violentia, teneantur (in totum verò prohibere motum convulsivum nihil aliud est, quam paroxysmi solutionem retardare; nam per illam partium concussionem materia partes gravans discutitur Rondel. m.cur. morb. c.36.) & inungantur cum tota spina ol. anodynus, nervinis & resolventibus vel aquis specificis; refrigerata calefiant. Pro revulsione instituantur frictiones à superioribus ad inferiora descendendo, ligaturæ fortiores dolorificæ, compressiones pollicis, evulsiones pilorum, puncture in partibus præsertim extremis, cucurbitulæ scapulis, hypochondriis, poplitibus vel malleolis, aut etiam regioni uteri grandior quedam apponantur, prout sc. ob hujus vel illius partis consensum oritur: plantæ pedum sale & aceto te-

ran-

rantur, sinapis iisdem illinantur; peculiari proprietate malignitatem epilepticam allicere dicitur *turtur fæmina* deplumata, ex observatione singulari D. Brunneri, si umbilico applicetur, ipsa enim postea convulsa moritur. Si malum ab inferiore ventre originem sumit, injiciantur *clysteres* aciores revellentes additis specificis, aut talia suppositoria intrudantur, quibus commode *crocus metallorum* adjici potest. Nonnulli, ut *Celsus*, in paroxysmo *venam* revulsionis gratia secant, quod etiam singulari experimento & observatione probat *Zac. Luf. l. 1. hist. 26.* in viro plethorico, id quod etiam suadet *Valleriol. 3. obs. 7. Vega l. 3. art. med. c. 12. s. 1. Mich. Jo-han. Paschalius* & ejus *Scholia* *Peredal. 1. de cur. morb. c. 8.* Postea materia derivetur & evacuetur, lingua & palatum illinantur *theriaca*, *mithridat.* *confect.* *anacard.* *diacastor.* cum *sinapi*, *piper.* *long. suc.* *rutæ* & alijs attrahentibus mixta. Utilia quidem hic essent masticatoria, sed præ morbi vehementia illorum usus non conceditur. Si malum oriatur via ventriculi, provocetur vomitus per pennam *ol. amygd.* *d. irin.* *oxymel.* intinctam & faucibus immissam, quod fieri potest in infantibus, qui tamen prius in ventrem dirigendi. In adultioribus verò commoveri potest per *aq. bened. specif.* *hemet.* *Conradi*, *croc. metal.* Θ ⊕ *li*; *gillum Paracelsi*, *aq. pæon.* aut *infusionis ungulæ alcis* mixtam; si verò prohibetur hæc evacuatio, statim adhibeantur, quæ orificium ventriculi exactè claudunt. Mox quæ causam discutiunt & attenuant in usum revocanda. Lingvæ igitur & palato illinantur *bals. rutæ*, *succin. extr. rutæ*, *theriac.* *mithridat.* *confect.* *anacardina*, Θ *simplex* & *rutæ* aliorumque antiepilepticorum; naribus admoveatur *ruta* præf. *sylvestr.* vel *saturna* cum *aceto* fortissimo, qua plurimos excitasse se scribit. *Forest. l. 10. obs. 58.* in *Schol.* ejus *succus*, *oleum* ut & *succini*, *camphor.* *balsama eorum*, *majoran.* *zedoar.* *origan.* *rosmar.* ipsis infletur pulvis sternutatorius ex *fl. lil.* *convall.* *helleb.* *ca-stor.* *euphorb.* Θ ⊕ *li*, qui sat fortis sit. Excitentur etiam odores ex *succin.* *peuced.* *succ.* *Cyrenaic.* vel ex rebus fætidis, si sit ex *utero* &c. Auribus indatur *ol. Cinnam.* *caryo-*

D phyl.

phyl. salv. majoran. philosoph. castor. Tempora, aures, ver-
tex, futura coronalis ungatur *ol.* & *bals. rorismar. lavendul.*
majoran. succin. de peru, ol. de cran. hum. Vertici & futuræ
coronali applicentur *sacculi, emplastra, cataplasma* ex discu-
tientibus cephalicis & specificis. Interim non omittantur
specifica interna, quæ etiam pro malighæ & acris qualitatis
extinctione faciunt, ut *castor. cum oxym. & suc. Cyrenaic. mist.*
aut mistura ex theriac. confect. de hyacinth. aq. pœon. ceras. nigr.
quæ infantibus commoda, aq. *hirund. picar. epilept. Quercet.*
Lang. Hartm. sang. hum. Poppū, theriacal. sp. fl. tiliæ,
ceras. nigr. lil. convall. rut. cerebr. hum. Excell. D. Rollfinckū Prae-
ceptoris ac Promotoris nostri filiali observantia, & honore atatem
colendi, Hartman. Cran. hum. C. C. ⊖ volat. imprægn. sp. epilept.
f. & comp. Plater. sp. ⊕ li volat. sp. ⊕ li comp. arcanum ungul.
alc. tinct. corall. smaragd. extractio ☽ *antepilept. ol. succin. cam-*
phor. rutæ, cran. hum. heraclin. ⊕ li rubr. extr. castor. rut. pœon.
sacch. succin. castor. major. rut. magister. Cran. hum. ungul. al-
cis C. C. pulv. antepil. varū Craton. Parentis mei dilect. p. m. &
alia sexcenta quæ hic recensere nimis labiosum tum ni-
mis tæiosum. Valdè etiam commendatur *Cnōēs̄ov* illud
de *sangv. nigr. galline, paroxysmum enim citò sedat, & reci-*
divam inhibet. Admirandam in sistendo paroxysmo vir-
tutem tribuit *Weickardus in thes. pharm. pinguedini catti sylv.*
si umbilico illinatur. Si verò paroxysmus est vehementior,
neque remittit, aliquid de laudano opiatu Paracelsi aut *antepi-*
leptico Hartman. vel de *oleo buxi exhiberi potest, quo sic spiritu-*
rum fervor restingvatur. Interim nec reliqua membra
compatientia negligenda: ob cordis sympathiam, appli-
centur extra epithemata, *sacculi, balsama* cordis regioni & pul-
sibus, intra vero specificis admisceantur cordialia: ubi à ven-
triculo, addenda *ol. menth. Cinnam. pœon. anisi &c.* Sic ubi
ab utero primordium sumsit malum, apponendum empla-
strum ex *galban. asafœtida, castor. &c.* internis autem admi-
scéantur specifica uterina, qualis essent. *gran. aëtes, & fœtidæ.*
Ubi à veneno sumpto vel immisso, *alexipharmacæ generalia*
& *specialia adjungenda, habita tamen semper ratione at-*

tis, sexus, temperamenti &c. Non inutilia sunt in ipso pa-
roxyfmo ~~amuleta~~, qualia sunt rad. & sem. pœon. d. t. coll. un-
gul. alc. corall. smaragdus, jaspis &c. collo appensa.

PROPHYLACTICA CURA ipsam mineram, radicem
& causam antecedentem respicit, & prohibet, ne iterum pa-
roxyfmus generetur. Perficitur hoc si humores vitiosi corri-
gantur, evanescantur, revellantur, eorum generatio impediatur,
partium mittentium & suscipientium prava $\Delta\lambda\alpha\theta\sigma\varsigma$ & imbe-
cillitas emendetur, & $\mu\alpha\sigma\mu\alpha$ epilepticum discutiatur. Ma-
teria harum indicationum ex triplici fonte sumitur, Chirur-
gico, pharmaceutico & diætetico.

CHIRURGIA. Primò occurrit venæ sectio, quæ præser-
vationis gratia commodè institui potest, præsertim vere Gal.
de cur. nat. per sang. miss. 7. cui etiam consentit Paracels. *tom. 4.*
l. 1. de caduco §. 4. tom. 5. fragment. l. 3. paragmph. de caduc. mo-
dò sangvis etiam in vitio sit; variat, autem, prout fons mali in
hoc vel illo membro hæret. Si jecur fomitem subministrat,
instituatur in dextro brachio, ex liene verò si proficiscatur, in
sinistro; commodius hæmorrhoides aperirentur, verùm ne
fistula inde oriatur, summè studendum. Nonnunquam caput
idionta\th\w\z afficitur, ubi venæ sublingvales turgidæ appa-
rent, & tunc soluta prius plethora universi, capiteque robo-
rato, cephalicæ etiam cum frontis & lingvæ venis aperian-
tur. *Aretæus* in hac etiam ad arteriotomiam pervenit. Ubi
malum stabulatur in utero, malleolorum venæ tundantur;
quanquam in viris etiam saphænæ sectionem valdè comen-
det *Rasis in mirab auscult.* & *Zac. Luf. l. 1. hist. 28.* sic enim ad
maximè distantes partes fit diversio, quam etiam ipsa natura
in hæmorrhoidibus insaniæ supervenientibus monstrat *6. aph.*
21. Imò in epilepsia uterina, si à sanguine retento, etiamsi mu-
lier sit grida, tutò posse celebrari hanc phlebotomiā, con-
tendit & elegantissimis observationibus probat *id. l. d. hist. 32.*
cui etiam assentitur *Moxius l. 2. m. m. morb. mul. per sang.*
miss. c. 20. Venæ sectionis vicariæ sunt CUCU R BI T U LÆ
scarificatæ, sive partibus superioribus, sive inferioribus adhi-

bitæ, pro ratione fontis mali & plethoræ; non exiguum emolumen-
tum promittunt, ubi malum in extremo hæret, aut per
morsum animalis est immissum, si cum profundiore scarifi-
catione, adaptentur, modò partis conditio id non prohibe-
at, aut ulcuscula diu aperta serventur. Non scarificatæ re-
vellunt etiam & discutiunt flatus, hinc modò occipitio, mo-
dò scapulis, nunc hypochondriis, nunc ingvinibus adhiben-
tut. Commodam evacuationem etiam præstant HIRU-
DINES locis convenientibus applicatæ, universalioribus
præmissis. **FRICTIONES** partium extremarum,
non supervacaneæ, *occipitis etiam commendat Heurn.* de
tap. morb. ut & vincula dolorifica extremitis injecta; potenter
enim à parte affecta revellunt; imo paroxysmum jam jam in-
stantem chorda quasi elisa suffocant. Dropaces etiam laudat
Cælius. **VESICANTIA** cōmodè etiam in usum trahuntur, &
in essentiali, & in sympathica. In essentiali, derasis prius ca-
pillis toti capiti possunt applicari, vel etiam regioni post au-
res, relictis diutius ulcusculis; sic enim *Hip.* sentétiæ *l. de morb.*
sacr. satis fit, quam operationem in contumacissimis etiam ca-
pitis morbis efficacissimam vidit *Septal. l. 6. animadvers. 55.* In
sympathica verò ulcuscula, per vesicantia in parte affecta
excitata, materiam futuro paroxysmo subtrahunt, virusque
epilepticum illuc latens, evocant. Talia sunt *flammula Jo-*
vis, taspia sinapi, tepidum &c. *Trallian. l. 1. c. 15.* Quod etiam
perficiunt **CAUTERIA** debitè instituta & fonticuli inde ex-
citati, sive sint actualia, sive potentialia; sunt enim materia
auxilii sensibiliter evanuantis, indicanturq; à causa epilepsi-
am causante & fovente. Unde Itali, præsertim *Florentini*, reces-
natos cauterii admotione quasi salutare solent, ut ab epile-
pticis convulsionibus præservent. In idiopathica supra su-
turam coronalem, seu circa concursum sagittalis & corona-
lis, excitentur, nec tantum periculum inde expectandum,
modò cautè administrentur, nec altius imprimitur; tamen
tamen nuchæ & occipiti inuri possunt; Imò in ipso etiam
paroxysmo cauteria actualia laudat *Ranchin.* *tr. de morb.*
puer.

puer. f. 2. c. 2. plurimum præstat Setaceum, validè enim evacuat à capite: exempla curationum annotavit *Gvil. Fabric.* In essentiali multi commendant apertione crani per trepanum, *Paracels. tom. 5. fragm. l. 3. paragr. de caduc. t. 3. l. 3.* paragr. c. 4. quo sic fuligines exhalent. Si verò aliundè materia transmittatur, ratione partium vel supra vel infra renes positarum, vel in brachiis vel in femoris interna & tibiæ sylvestri parte excitentur, servata semper rectitudine partiū. De harū ustionum insigni utilitate pluribus agit *Zac. Luf. l. 1. bist. 20.* Cautio tamen sit, ne ulla fiat ustio aut sectio, nisi post plurimas repetitas purgationes, modò non urgeat morbi vehementia. Sic ubi cranii pars est corrupta, aut alibi os cariosum epilepsiam fovet, eximendum aut ustione sanandum.

PHARMACIA materiam peccantem præparat, universaliter & particulariter evacuat, miasma epilepticum absimit, membrorum pravam diathesin corrigit, illaque roborat. Sed antequam hæc in usum vocentur, alvus primum sollicitanda, ut à primis viis feces, ipsisque permixta colluvies educatur, quod fieri potest *glandibus, clysteribus, aut levibus eccoproticis*, quibus stimuli loco *purgantia* in minore dosi possunt adjici v. g.

Si adjuncta sit cacochymia PHLEGMATICA.

Rx elect. ben. lax. 3f.	Rx rad. ireos
fecul. pœon.	pœon. an. 3i.
bryon. an. gr. vij.	fol. rutæ p. j.
Crem ♀ 3f.	polii
agaric. rec. trochisc. 3j	fl. lil. convall.
extr. major. griij	tiliaæ à pii
sacchar. q. s. M. F. bolus.	agaric. crud. albif. 3j
Rx ♀ ⊕ lat. 3j	Coq. om. in f. q. aq. fl. til.
fecul. aron. gr. viij	Col. 3iiij adde
agaric. trochisc. 3j	Mann. Calabr. 3j
sacchar. Cinnam. gr. iij. M.	syr. diacarth. 3l.
F. pulvis.	Ol. fœnic. gj M. F. Potio.
BILIOSA si adsit	
Rx essent. aloës gr. xvj	Rx pulv. laxat. veget. gr. xv

extr. rhabarb. gr. x	Crystall. ♀ scammon. g. x
ref. scam. gr. iij	Ol. major. g. j M. F. Pulv.
magist. Cran. hum. gr. vij	Rx cass. fistul. 3vj
M. F. l. a. Pil. xvij	pulv. rhabarb. el. 3f
Rx tinct. rhabarb. sangv. fol. sen. à 3j	Cryft. ♀ gr. x ol. anthos. gj
syr. viol. fol. 3j	sacch. par.
sp. Ol. vir. gijj. M. F. Haustus.	F. l. a. bolus.
In MELANCHOLICA hæc convenienter.	
Rx elect. diacathol. 3vj	Rx fol. sen. f. f. 3ij
extr. fol. sen. 3f	pastul. mund. & lot. 3ijj
syr. de polypod. 3f	fol. beton.
aq. Ceras. nigr. 3is M.	rotismar. à ms
F Potiuncula	fl. tiliae p j
Rx mass. pilul. ♀ rear. 3j.	gran. pœon. 3is.
extr. rad. pœon. gr. vj.	Contunde om. in pulp. injice
ol. succin. gj. M.	in vas fictile, & affunde aq.
F. pil. xvij.	cal. 3xxx.
Rx. pulp. prun. damasc. 3j.	M. & statim contege, pone in
Crem. ♀ 3i.	locum calidum per noctem,
extr. fol. sen. 3f.	postea cola & per subsiden-
helleb. nigr. gr. vj.	tiam clarefac. dos. 3f. ad 3v
Sacchar. alb. par. M. F. bolus.	vel vj.
Verum si MISTI essent humores, tale conveniret	
Rx. extr. de 4. reb.	dissolv. in juscule carnis q. s.
Crystall. ♀ an. 3j.	adde sacchar. Cinnam. gr. iij.
Mann. Calabr. 3f.	M. F. potiuncula.
Et si in ventriculo saburra vitiosorum humorum stabulatur, commode VOMITORIA exhibentur. Lene est ex jure gal- linæ pingvi cum ol. amygd. d. vel suc. raphe. & oxymel. Vali- dius operatur diasar. Fernel. coagul. asar. manna vomit. Querc. aq. ben. Rulandi, syr. vomitorius Hartm. vomitorium Plateri, Conrad.	
Hinc ad vitiosos humores PRÆPARANTIA acceden- dum, quæ pro humoris & partium affectarum diversitate varia hda sunt.	

In

In cacochymia PITUITOSA utiles sunt syr, de beton. s.	
& comp. pœon. hyssop. stœchad. fl. lil. convall. absynth. prim. ver. meliss. eupator. oxym. s. scyll. essent. beton. cal. arom. prim. ver. menth. origan. &c. cum aq. appropr.	
Rx. aq. hirund. 3vj.	facch. Cinnam. gr. iij. M.
lil. convall. 3j.	detur in charta pro 2 dosib⁹
essent. rad. pœon. 3f.	Rx. conserv. fl. pœon.
cal. arom. gr. vij.	lil. convall.
syr. stœch. arab. 3f.	tiliae an. 3j.
oxymel. scyll. 3iij.	rad. eryng. cond. 3f.
tinct. . 3g. vj.	essent. beton. 3f.
facchar. rut. gr. iiiij.	extr. zedoar. 3f.
M. F. Haustus.	pulv. rad. pœon. 3j.
Rx. fecul. pœon.	ol. majoran. g. iij.
ari	sp. Oli comp. g. viii.
scyll.	syr. de stœchad. qf. M.
magist. ♀ Iris an 3f.	F. l. a. Opiat. dos. magn.
Θ cal. arom. gr. ij.	castan.
beton. gr. iiiij.	
BILEM præparant cephalica frigida, quibus admiscen. syr. aceros. s. & comp. de cichor. nymph. fragor. ceras. acid. granat. berber. prædictorum essentiæ, tincturæ &c.	
Rx. essent. acetosel.	ol. Citr. g. ij. M.
fragor.	pro 3 dosibus.
plantag. an. 3j.	Rx. visc. q. 3ij.
aq. nymph.	Ceras. nigr. n. xv.
- dentar. an. 3ij	berber. p. r.
syr. corall. 3j.	fl. violar.
tunic. 3f.	nymph.
tinct. corall. 3j M.	til. an. p. i.
dos. coch. j. vel ij.	Coq. om. in s. q. aq. f.
Rx. magist. corall. 3f.	Col. 3 iij. adde
perlar. 3j.	syr. de cichor. 3vj.
succin. præp. 3f.	violar. 3f.
Crystal. ♀ 3j.	sp. Oli g. vj.
	M. F. Potiuncula.

ME-

MELANCHOLIAM præparant syr. de horng. bugloss.
fumar. capill. & ceterach, epithym. de pom. essentia etiam prædi-
ctor. &c.

Rx. syr. fl. tunic.

borrag. an. 3*fl.*

aq. carfunc. 3*jij.*

sp. ♀ compos. 3*j.*

sol. corall. 3*l.*

essent. borrag. 3*jij*

fraxin.

fumar. an. 3*fl.*

aq. pomor. redol. 3*jij. fl.*

M. pro duabus dosibus.

Rx. cons. borrag.

bugloss. an. 3*jij.*

Confect. alcherm. 3*j.*

essent lupul. 3*fl.*

fecul. pœon. gr. vij.

sacchar. citr. g. iij.

albis. par. M.

F. bolus.

Rx. spec. elect. de gem.

diamosch. d. a. 3*fl.*

Cran. hum. præp. 3*j.*

extr. meliss. gr. viij.

lign. aloës g. vj.

sacchar. albis. aq. borrag.

sol. 3*jij.*

F. l. a. rotulae, & illinantur

ol. citr.

Humorum præparationem excipit PURGATIO, quæ prius sit lenior, postea fortior; instituatur autem per epicrasia, intermisstis sc. præparantibus & corroborantibus; plurimum conducit, si hæc cura per totum annum continuetur, primo singulis ternis vel quaternis diebus purgando, postea unaquaque septimana, hinc mense, tandem vere & autumno: sic enim morbus futurus præcavetur; prout autem humor abundat, ita purgantia dirigenda sunt.

In PITUITOSA convenient *agaricus s. trochisc. meccioac. gialap. hermodact. turbith. colocynth.*

Rx. extr. pilul. cochiari.

succin, alb. ppt. gr. vj

colocynth. an. 3*fl.*

Ol. anth. g.i

cephalic. gr. v

sacch. alb. par. M.

fecul. bryon. g. iv

F. bolus.

Ol. Cinnam. gi

Rx agaric. trochisc.

syr. diacarth. q. f.

meccioac. alb. an. 3*j.*

F. Pilul. num. xvij.

trochis. alhand. gr. iij

Rx elect. diacarth. 3*jij.*

♀ ⊕ lat. 3*fl.*

spec. diaturbith. 3*j.*

Ol. succin. gj M.F. Pulv.

Rx.

Rx, rad. pœon. 3ij.

eryng.

scyll. ppt. an. 3ij.

polii mont. p.j.

agaric. alb. lev. 3ij.

mecchoac. alb.

sem. cnic. ponder. an. 3j.

turbith. elect. 3ij.

In causa BILIOSA conductit rhabar. myrobal. citr. cort.

frang. scammon. &c.

Rx, extract. cholagog. Q. 3j.

pilul. aur. 3f.

ref. scammon. gr. iiiij

magist. D. gr. iij

Ol. cirt. gj

syr. de cichor. c. rhab. q. f.

F. Pil. xxiv.

Rx cathart. ros. 3ijij

fecul. pœon. gvi

Crem. ♀ 3f

fecch. par. F. Bolus,

Rx ♀ ⊕ lat.

extr. scammon. an. 3f

magist. ung. alc. gr. vj

ol. anisi gj

M. F. pulv.

In MELANCHOLIA prosunt epithymum. sena, polypodium, helleb. nig.

Rx. pil. ♀ rear. c. ammon. 3j

extr. helleb. nigr. gr. ix.

cephal. gr. v.

trochis. alhand. gr. iiiij.

Θ pœon. gr. iij

ol. falv. g.j.

syr. fl. til. q. f.

M. F. Pil. n. xxv.

fl. anth.

prim. ver. an. pj.

ZZ alb. gr. x

spic. gr. ix

Coq. om. in f. q. aq. beton.

Col. 3iiij adde

elect. de tamarind. 3if.

lyr. diacarth. 3f. M.F. Potio.

In causa BILIOSA conductit rhabar. myrobal. citr. cort.

frang. scammon. &c.

Rx, extract. cholagog. Q. 3j.

pilul. aur. 3f.

ref. scammon. gr. iiiij

magist. D. gr. iij

Ol. cirt. gj

syr. de cichor. c. rhab. q. f.

F. Pil. xxiv.

Rx cathart. ros. 3ijij

fecul. pœon. gvi

Crem. ♀ 3f

fecch. par. F. Bolus,

Rx ♀ ⊕ lat.

extr. scammon. an. 3f

magist. ung. alc. gr. vj

ol. anisi gj

M. F. pulv.

Rx visc. q. 3j

sem. pœon. 3f.

fl. stœchad. arab. p ij

tiliae

pœon. an. pi

myrobal. citr 3ijij

rhabarb. opt 3ij

fl. prun. sylv. 3if.

sem. anisi 3f.

Coq. om. in f. q. aq. f.

Col. 3ijij. adde

lyr. violar. sol.

diaser. an. 3f.

elect. ros. Mel. 3j.

fecchar. Cinnam. g. iii.

M. F. Potio.

Rx. pulp. tamarind. 3ijij.

pulp. fol. sen. 3j.

Crystall. ♀ 3j.

extr. helleb. nigr. 3f.

magist. C.C. gr. vj

fecch. alb. par. F. bolus.

Rx. pulv. sen. Montag. 3ij.

♀ ⊕ lat. gr. x.

ol. foenic. g. ij. M. F. Pulvis.

E

Rx.

Rx. spec. sen. Gereon. 3iiij.
fol. sen.
follic. sen. an. 3ij.
fibr. helleb. nigr. 3j
fl. borrag.
bugloss.
tiliae an. p. j.

Infude om. in f. q. aq. prim. ver.
stant per noctem, mane lev.
ebulliant
Col. express. 3ij adde
elect. diazen. 3ij
syr. pomor. Sabor. 3f.
aq. Cinnam. 3is.
M. F. Potio.

Ubi humores SEROSI sunt conjuncti, conferunt rad.
irid. nostr. afari. gialap. esul. gratiol. coccogn. gum. de peru &c.

Rx. ref. gialap. gr. xvij.
magist. gum. gut. gr. iv.
extr. cort. esul. gr. viij.
Θ succin. vol. gr. iij.
ol. foenic. g. ij.
syr. diafer. q. f.
F. l. a. pil. n. xxi

Rx. elect. ben. lax. 3f.
fecul. irid. nostr. 3f.
ꝝ dulc. gr. vij.
ol. succin. g. ij.
sacchar. par. F. bolus.
Rx. Cran. hum. ppt. gr. viij.
hermodact. 3j.
ref. gialap. gr. x.
sacch. Cinn. g. iij. M. F. pulv.

Et si humores sunt MISTI, etiam mixtae facultatis me-
dicamenta sunt præscribenda, qualia sunt syr. helleb. Q. oxy-
mel. helleb. Julian. in forma enim syr. magistralis optimè
conveniunt, e. gr. si cacochymia in inferiore ventre resideat:

Rx. rad. cichor.
gramin.
polypod.
pœon. an. 3ij.
scyll.
bryon. an. 3i.
visc. q. 3iii
Cort. cappar. 3if.
sem. pœon. d. t. coll. 3ii.
Cass. lign. 3if.
fol. hyssop.
pol. mon.
cuscut.

ceterach. an. mj
fl. tiliæ
lil. conval. a. p. ij
tamarind. integr. 3vj.
Crystall. ♀ 3j.
gialap. ref. 3j.
helleb. nigr. 3ij.
Incid. incidentur & cont. con-
tundantur M. & coquan-
tur in aq. font. ibi iij ad par-
tis tertiae consumptionem.
Colaturam funde super
fol. sen. s. s. 3ij

rha-

thabarb. opt.	M. & dissolve iterumque colo
agaric. albiss. an. 3 <i>i</i>	& leniter exhalare sinito ad 3 <i>viii</i>
& macera per noctem, manc.	tandem admisce
semel tantum ebullire sinito,	syr. de cichor. c. rhab. 3 <i>iii</i>
& postea percola cum aliquali	diaser. 3 <i>i</i>
expressione	F. syr. qui aromatis. c.
Colat. adde	facch. Cinnam. gr. vi.
mannæ calabr. 3 <i>ii</i>	Citr. gr. iv.
Crystal. ♪ 3 <i>i</i>	dos. 3 <i>i</i> ad 3 <i>is</i> .

Ad hunc modum concinnari poterunt varia remedia, quæ tamen non indiscriminatim cuilibet offerenda; nam pueri lactanti ejusmodi minus conveniunt, igitur nutrici potius exhibenda: aut sint leniora, quale est *syr. de cichor. c. rhab.* cuius unico usu multi infantes præservarunt. *Hermetici* pro purgatione epilepticorum plerunque eligunt ♀ d. ♀ vita & correct. mannam ♀, specif. purgans *Paracelsi*.

Alterantia & purgantia excipiunt DIAPHORETICA, quæ unâ sint specifica, ut sic obstrunctiones expediantur, humores vitiosi quoquo modo præparati exhaustantur, maligni vapores excludantur, & membrorum œconomia depravata in integrum restituatur. Horum autem usus per plures dies continuandus. Inter simplicia commendantur *rad. chin. scorzon. sarsparil. pentaphyll. paeon. dictamn. vincetox. torment. fol. rut. lign. guajac. sassafr. quern. bux. visc. q. CC. &c.* Composita sunt *aq. theriac. comp. cephal. typhor. C. sp. lign. guajac. visc. q. lign. rhod. sars. paril. card. ben. sambuc. lil. convall. CC. cran. hum. sang. hum. ♪, mist. f. & comp. tinct. ♀ dia-phor. gelatina C. C. extracta prædictorum simpl.* Item *guajaci vincetox. paeon. sars. paril. volat. C. C. ♀ dia-phor. bezoart. min. f. re, re, ♀ aurat. dia-phor. &c. ex quibus varia decocta, aquæ, misturæ, pulveres &c. conninnari poterunt.*

Inter plurima tamen præstat decoctum *ligni guajaci* ad longius tempus usurpatum; nam incidendo, attenuando causam antecedentem resolvit, detergendo evacuat, & sudores movendo massam sanguineam defecatam reddit non si-

ne corroboratione viscerum, propter amicam astictoriam,
facultatem sibi conjunctam.

R _x lign. guajac. 3ij	Cinnam. elect. 3f
buxi	Coriandr. ppt. 3f. F.
visc. q. an. 3if	decoctum pro communi potu.
rad. pœon.	Ex fecibus relictis & igne re- verberii calcinatis, aq. card.
tormentil. an. 3vj	ben. sal extrahi & purificatus
ras. CC.	per crebras solutiones & coa- gulationes primo decocto ad
Cran. hum. an. 3ij	majorem efficaciam potest
sem. pœon.	Infundantur om. in aq. f. l <i>xxvj</i> , addi.
card. ben. an. 3ij	stent in digestione per horas, R _x . bezoard. min. Iris 3f.
	xxiv hinc coq. in vase clauso Cinnabr. 3 gr. vi
	ad unius tertie cōsumptionem Θ C.C. vol. gr. iv M.
	sub finem addendo fl. tiliæ F. pulvis.
	lil. convall. an. pii R _x . magist. perlar. gr. v.
ponantur in loc. frig.	Cran. hum. gr. vi
Col. adde	Δ aurat. diaph. 3f.
	rob. sambuc. 3ij
syr. fl. pœon.	sacch. par. F. bolus.
	dos. 3vj mane, sudet per hor. R _x . aq. theriac. cephal. 3i
lil. convall. an. 3if M.	dimid. in laconico. mist. f.
dos. 3vj mane, sudet per hor. R _x . aq. theriac. cephal. 3i	sp. C.C. an. 3i
adde rad. sars. paril. 3j	lil. convall. 3if.
passul. min. 3if	tinct. 3 diaphor. 3i
aq. fontan. l <i>xxvj</i>	sacch. succin. gr. viii.
Coq. ad l <i>xx</i>	M. dividatur in tres do-
sub finem adde	fes.

Eundem usum etiam præstant DIURETICA, reliquias
enim humorum vitiosorum per urinas expellunt. Talia
sunt præter multa diaphoreticorum rad. fænicul. cum aliis
aperientibus, beton. chærefol. spica, schænanth. Inter compo-
sita sunt spir. Θ s. & marini, ♀ satus, tinct. ♀, arcan. ♀ sp. bacc.
sambuc, ebul. effent. sambuc. frag. petrosel. fcula petrosel. Θ suc-

cini fixum & volatile, pimpinel. genist. junip. magist. ocul. 69. ex quibus variæ possunt fieri compositiones.

<i>R. fecul. petros. gr. x.</i>	<i>aq. petrosel. 3is.</i>
<i>magist. ocul. 69. gr. vi.</i>	<i>M. F. potiūcula pro 2 dosib.</i>
<i>Θ succin. vol. gr. iij. M.</i>	<i>R. rob. veron. 3ii</i>
<i>F. pulvis.</i>	<i>essent. fragor.</i>
<i>R. tinct. ♀ 3i</i>	<i>petrosel. an. 3i</i>
<i>spir. bacc. samb.</i>	<i>magist. succin. 3f</i>
<i>ebuli an. 3i</i>	<i>sp. Θ mar. g. iiiij</i>
<i>essent. chærefol. 3f.</i>	<i>sacchar. par.</i>
<i>sacchar. fœnic. gr. iv.</i>	<i>F. bolus.</i>

In eorum autem administratione diligenter advertendum, ne eorum crebriore usu sangvis in prægnantibus concitetur, menses aperiantur, & uteri expultrix moveatur, abortus enim periculum incurrerent.

Magnum etiam levamē sentiunt ægri ex ACIDULARUM usu, præsertim si sit sympathica, nec inveterata; obstructions enim aperiunt, mineram resolvunt & educunt, & per sp. Θ li volatilem, quo scatent, peculiari facultate epilepsiaæ contrariantur. THERMÆ etiam in essentiali conferunt.

UNIVERSALI evacuatione præmissa, particulares rite succedunt. Hæ autem præcipue respiciant partem mandantem seu locum causæ antecedentis. Si igitur caput per essentiam afficitur, expeditur per errhina, sternutatoria, apophlegmatismos, gargarismos, masticatoria. Si ventriculus est in causa, juvat vomitus, præsertim si à chylo corrupto. Si hepar aut lien, eorum obstructions & feces tollantur. Ubi ab intestinis, vermibus sc. ibidem hærentibus, malum originem sumit, repurgantur per purgantia helmintica ex ♀ præcipue desumpta aut ♂, qualis etiam aq. ex magnesia saturn. & crusta panis Querc. Uterus vero depuratur per leniora pharmaca, uterina læpius repetita, & menses moventia. Sic vesica per diuretica. Extrema commodè liberantur per vesicatoria, cauteria, fonticulos, de quibus antea in chirurgia. Semper autem hic specifica antiepileptica addenda. Formulæ videantur passim apud praticos.

Corpore siccato, SPECIFICA & APPROPRIA-
TA in usum trahenda; in his enim maxima curationis spes si-
ta; hæc tamen supradictis etiam addi aut intermediis die-
bus exhiberi possunt. Præcipua sunt md. pœon. d. t. coll. py-
reth. eryng. bryon. valer. sylv. dentar. scyll. vincetox. palm. Christ.
acori, artemisiæ in carbonem versa, ruta hortens. sylv. polium
montanum, verben. septinervia pentaphyl. millefol. fl. pœon. tiliæ
lil. convall. anagall. rubr. sem. pœon. palm. Christ. visc. q. coryl.
tiliæ, succin. ossahum. Cran. hum. secundina ppt. unicornu, un-
gula alcis, castor. turtur fæmina. hirundo tota aut lapides in juni-
oribus inventi, talus suillus, vesica apri cum urina in furno ex-
siccata C.C. coagulum lepor. massa vomitu rejecta à pullo equino,
hepar asini, turdi, ursi, ran. virid. caro mustelæ, cor lupi, leporis,
hirundinis, Cicon. vultur. Cervi, perdic. testiculi apri, ursi, arie-
tis, galli, asini, lac equinum, asinum fierius pavon. secundinae,
lac, cerebrum asin. fel catuli Coral. rub. crystal selenit. jaspis,
smaragd. chelidon. Cinnabr. nat. ♂ aq. dentar. ceras. nigr. lil. con-
vall. calendul. rutæ pentaphyll. tiliæ pœon alsin. millefol. sylv. picar.
hirund fec. hum. Matthiol. ex minera saturn. crusta panis Querc.
epileptica Langij. Hartm. Querc sp. ♂ li vol. vis. q. coryl. buxi, C.C.
Cran. hum. epilept. puer. Hartm sangv hum. Paracels. solutio tinct.
comill. ♂, arcanū ♂ li, essentia mumiæ, sang. hum. quam propriū
alexipharmacū Cl. Deodatus nūcupat, cran. hum. salviata, ol. suc-
cin. cran. hum. ligni heracl. pœon. castor. unguil. alcis, elixir pœon.
Mynsicht. confect. antpilept. Paracels. liquor ♂ virid. syr. de ni-
cotiana (cujus singulari usu plurimos epilepticos ab aliis reli-
ctos se sanasse gloriatur Zaceut. Lus l. i. hist. 29) extract. cran. hum.
C.C. lign. bux. fl. tiliæ, pœon. antpilept. Cl. Deodati, magist. comill.
succin. C.C. Cran. hum. ♂, pulveres varii Marchion. Kolreut.
Hartm. ♂ c. Ex his variæ formulæ effigi poterunt. e.g.

Rx. miner. ris

C.C. ♂ lat. an. 3j

magist. cran. hum.

ungul. alc.

fecul. pœon. an. 3i

smaragd. ppt. gr. xvi.

♂ succin. vol. gr. viii. M.

F. pulv.

Rx. extr. pœon. gr. xv

Cran. hum. ♂.

castor. gr. iii

magist. Lunar. gr. vi

Cin-

Cinnabr. antimon. 3f	tinct. pœon. 3f M.
syr. de nicot. q. s.	S: Mistura antepileptica.
F. pilul. min. pro 2 dos.	composita.
R. pulv. marchion. 3i	R. Cran. hum.
succin. ppt. 3f	C.C. crud.
Cran. hum. ppt.	ungul. alc.
ruf. ung. alcis an. 3i.	hirund. exficc.an. 3j.
extr. rad. dictamn.	rad. pœon. d.t.col.
visc. q. an. gr. x.	tormentil
facch. alb. in aq. gal. sol. 3iv	visc. q. an. 3f.
Coq. ad deb. consist.	lign. guaiac. 3ii
sub finem adde	epat. ran. virid. num.xx.
Ol. rutæ	sem. pœon. 3ii
succin. an. g. iii	Scyll. ppt. 3if.
Cubeb. g. ii	castor. 3f
ambr. grys. gr. ii	camphor. gr. vi
F. l. a. rotulæ, illinantur	Incid. incidentur & contun-
ol. Cinnam.	dantur & infundantur in
R. mist. f. 3vi	sp. lil. convall.
sp. C.C. rectif.	ceraf. nigr. an. 3f
Cran. hum. an. 3ii	aq. fl. tiliæ
sangv. hum.	mercurial. an. 3viii
aq. aur. Lang.	sp. Θli philos. 3i
sp. ceraf. nigr.	Stent in leni balnei calore per
fl. tiliæ an. 3f.	d. xiv hinc destill. feces resi-
lign. guajac. 3ii	duas calcina, Θ aq. dentar.
arcan. ungul. alc. 3i	extrahe, per crebras solu-
tinct. corall. 3if.	tiones & coagulationes puri-
lunæ 3ii	fica, & destillato adde & cir-
Ol. camphor. g. viii.	cula permensem.
facchar. succin. 3f	S. Spiritus antepilepticus.
Interim membra affecta etiam ROBORANDAtum in-	
ternis, tum externis; Ad CAPITIS corroborationem,	
R. conf. fl. lil. convall. 3vj	R. rad. irid. fl.
salv.	cyper. an. 3i
beton. an. 3f	pœon. 3f
Calam. arom. cond. 3ijj	fl. lil. convall.
	nuc.

nuc. mosch.in Ind.con.	3ij	meliss.
extr. ceph. major Querc.	3f	ros. rubr. an.p.ii
theriac. Androm.	3j	caryophyll. 3i
spec. diambr.		sem. pœon. nigr. 3f
pler. archont. an.	3ij	lign. rhodii
raf. ebor.		sassafr. an. 3ii
pulv. rad. pœon.		succin. alb.
Confect. de hyacinth.	3j	styr. calam. 3f
Ol. caryophyll.g.	iiii	ambr. grys. gr. ii
sp. Θli philos.g.	x	Incid. & cōt. & F. cū synd. rubr.
syr. fl. pœon. q.	i	Cucupha.
M.F.I. a. Opiata		

Si VENTRICULUS laborete

Rx. spec. aromat. caryophyll.	3i	Rx. ol. nuc. molch. expres.
diagalang.	3j	bals. de Peru. an. 3if
pulv. rad. pœon.		Ol. mastich. 3ij
Corall. ppt.		ladan. pulveris. 3j
nuc. mosch. an.	3f	Ol. menth.
Coriand. ppt.	3j	macis an. gj
lign. aloës	3f	ros. g. iij
facchar. ros. tabul.	3if M.	extr. pœon. 3f. M.
F. l.a. Tragea		F. l.a. balsam. stomachal.

EPATIS si adsit imbecillitas

Rx. spec. diarrhod. abbat.		Rx. spec. diatr. santal.
de gem. cal. an.	3ij	diacurcum. an. 3ii
extr. calam. arom. gr.	viiij	Corall. rubr. ppt. 3f
Zedoar. g. vj		schænanth. gr. viij
pœon. gr. iiiij		epat. lupin. 3f
Croc. o. aperit.	3f	camphor. gr. iij
facch. alb. aq. cich. sol.	3vij	aq. agrimon. 3vj
F. l.a. rot. quæ illin.		vin. malvat. 3ii M.
Ol. Cinnam.		F. Epithem. hepaticum.

LIEN ubi est debilis

Rx. aq. scorbut. Q.	3i	Rx. ol. de cappar.
syr. fl. borrag.		chamomil. an. 3f
gran. cherm. an.	3f	emplestr. splen. Sen. 3ii
sp. nasturt. aq.	3i	spec. dialac. 3f

Con-

Confect. alcherm. 3f	Ol. ablynth. dest. g. v.
extr. cort. fraxin. 3f. M.	Ceræ 3f. M.
F. haustus per 2 dosibus.	F. linimentum spleneticū.
UTERUS ubi peccaverit	
R. spec. diamarg. cal. 3ii	R. gum. galban.
secund. ppt. 3i	sagapen. f. sol. 3iii
fecul. bryon.	ladan. 3ii
pœon.an. 3f	benzoin.
magist. corall. gr. xvii	styrac. cal.
Θ meliss. gr. viii	pulv. matricar. an. 3i
sacch. cinnam. g. vi	ol. absynth. q. s.
F. pulv. pro 3 dos.	F.l.a. Empl. matricale.

Externæ partes plerunque externa admittunt, qualia sunt olea, linimenta, ungventa, emplastra, fatus &c. In hac a. remedium varietate non promiscuè quæ offeruntur, in usum trahenda sunt, sed delectus instituendus est; nam prudētis & eutantis est medici, inquit Galen. in cons. propuer. epil. medicamentorum quantitatē, qualitatē, modū & occasiones moderari secundū necessitatis indicationes; non enim eodem semper modo præscribenda, nec omni loco aut tempore exhibenda: hæc n. tradita cura generalis est, quæ in particulari variat secundū morbi speciē, locū, causas, temperamentū, ætatē, sexū, anni tempus. Id quòd etiam observat Paracels. t. 4. l. 1. de cad. §. 4. Sic longè aliter tractandus infans quam adolescens, vir, adultus; Pauca enim pueris sufficiunt, cum utpl. ætatis ratione currentur 2. aph. 45. Præservantur tamen ab hoc morbo in utero existentes, si prægnanti à quarto mense ad tempus partus sæpius detur aliquid aq. vitæ mul. aut bals. embryon. cum guttis quibusdam ſþ. antepileptici, aut pulv. spinæ mustelæ vivæ detractæ cum magist. perlar. corall. Recens v. natis, antequam lac fugant, aut cibum capiant, detur mist. ex ol. amygd. d. & sacch. hinc etiam pulvis ex ſterc. vaccæ nigr. calcinato 3f. vel 3i pro excrementorum eductione. Balnea peftea fiant ex decocto cort. ſalic. rec. Hartm. præct. chym. Stocker. pr. med. p. 16. valdè commendat ſyr. de cichor. c. rhab. propria urina mixtum; hinc etiam Cl. Sennertus l. 1. pr. p. 2. c. 31. folia ulmi cum urina propria cocta tanquā cataplasma ventriculo applicat. Utilis

F etiam

etiam est syr. fl. pœon. sp. \oplus li acidulatus. fl. tiliæ, mulſ. ſem. pœon. sp. antiepilepticus puer Hartm. In reliquis cura præcipue dirigatur ad nutricem. Sic ubiq; medici dexteritas requiritur, modo conscientiæ & famæ integritas ipſi ſit proposita.

Non exiguum etiam fructum promittunt AMULETA: pœonia ipſius Gal. 6. ſimpl. autoritate celebris: in puero enim epileptico ſui experimentū fecit. Equalē, ni dicā majorē, virtutē tribuit Hartm. periaptō ex virgultis ſambuci ſuper ſalicem crescentis: utrumque autem debito tempore ſit collectū; Modū administrādi tradit in praxi chimiatr. p. 39. Vifens q. etiam utilis. Ungula alcis miros effectus præstat, duo exempla recēſet Lemnius l. 2. de occult. nat. mir. c. 3. Eosdē ſuccessus pollicetur etiā ungul. afin. &c. Sic corall. rub ſmaragd. jaffis & chelidon. ē collo penduli reluctantur morbo. Qua v. vi id præſtēt, obſcurum: puto tamē per effluviū aliquod spirituale cōtingere.

DIÆTA. Rerum non naturalium conveniens ratio inſtituatur, nā & hæc ſola epileptiæ curationē afferre potest 2. apb. b. 45 multosq: unica hac diæta abſq; remediiſ ſe curaſſe ſcribit Gal. l. de atten. viet.

AER sit lucidus & purus, calidus & ſiccus magis & minus, pro ratione temperamēti ægroti. Si non natura, arte talis evadat. Vitetur tenebricosus, nubilosus, fœtidus, fuliginibus & fumis noxiis ex gagate, bitumine, C. C. & aliis quæ peculiariter epileptiam manifestare ſolent, repletus, venti austrini, aquilonares, radii lunares. Juvat mutatio de loco in locum, de regione in regionem 2. apb.. 45.

CIBUS & POTUS ſit moderatus: nec enim ſatietas nec inedia, ſi modum excederint, bona. 2. apb. 4. prandium coena ſit liberalius. Cibus ſit ἔυπεπτός, ἔυχυμος, flatuum expers, non varius, nec admodum jurulentus, potius affus: præparetur hyſſopo, thym. puleg. ſerpil. ſalv. majoran. Cinnam. garyoph. aſt ſalla, acria, vaporosa & nidorulenta condimenta ſeponantur, qualia ſunt cepæ, allium, porrum, eruca, raphan. ſinap. Conveniunt carnes pull. gallinac. capon. pipon. perdic. attagen. phasian. turdor. turturum, avium mont. vervecin. vitulina, lepuscul. ſeponantur contra carnes anfer. anat. & reliquarum avium palust. cervina, ſuilla, caprina, ſa-

sita, infumata. Piscium usus sit rarus & eorum tantum, qui in
flaviis rapidioribus degunt, & sunt saxatiles & squamosi. Cō-
tra paludosī penitus fugiēdi, quales sunt carpiones, anguillæ.
Lac & lacticinia non admodum utilia : ova tremula conser-
runt. Panis sit optimè fermentatus & salitus. Inter fructus com-
mendantur cappares, uva passa, pistacia. Juvat in principio
mensæ rutam viridem sumere, in fine v. panem biscoctū, tra-
geam stomachicam & antepilepticam. Potus sit parcior, præ-
sertim vini, quod planè nō concedendū, nisi sit oligophoron,
medicatū, vires imbecilles, ægerq; assuetus, talia n. minus no-
cent 2. aph. 50. talijq; consuetudini aliquid concedere jubet
Hip.1.aph.17. Nihil verò magis nocet epilepticis quam merū
Jan. Damasc. l.3.c.23. cum partiū nervosarum principiū labo-
ret *Gal.3.de temp. 2.* ad quos humores crudos defert *Avicen. 2.*
tertij c.4. Præstat cerevisia benè defecata, non crassa aut vapo-
rosa, hydromel medicatum. Et hic victus rursus pro ætatis,
temperamenti, loci affecti, causæ morbificæ &c, ratione variādg.

SOMNUS & VIGILIÆ sint moderatores : utraq; n. si
modū excedant malū 2. aph. 3. vitetur maximè diurnus & mox
accibo initus ob *ναεγέλαιας* metum : instituatur capite non
nihil elevato.

EXERCITIA non omitteantur: salutis n. humanæ qs.
basis & fundamentū sunt *Hip.6.Epid.5.4.t. 22.* & homo edens
sanus esse non potest, nisi labore *l.1. de diæt num.t.* undè et-
iam corpora multo fiunt vegetoria *l.3. de artic. t.32.* Sint
moderata, & justo tempore instituantur, præsertim vacuo vé-
triculo. Juvant frictiones à superioribus ad inferiores partes
descendendo: caput singulo manè diligenter detergatur.
Balnea corpore impuro & replete nocent, inferiorum tamen
partium lotiones ex cephalicis & specificis utiles, quantum
capitis etiā pro roboratione valde laudet *Crato in consil. Schol.*

ALVUS sit semper aperta: si non natura, arte talis evadat.

VENUS in idiopathicā valde nocet; nam *συγσία* ēstι συ-
νεγδηληψία: in sympathica v. ex utero & semine retento
moderata confert, modo licita: nutricibus penitus interdi-
cenda; lac n. odoris gratia in deterius mutatur, tenuius effici-
tur, menses citantur, utero concipiunt, unde lac imminuitur,
corrumptur Jan. Damasc. l.3.c.23.

Ab

Ab ANIMI perturbationibus liber sit æger, præsertim
ira, tristitia, terrore & aliis quæ superius in causis remotis
dicta sunt: studia à pastu nocent, & cogitationes à pastu tu-
ta non sunt.

COROLLARIA.

1. Ut arteriarum, sic etiam venarum principium est cor.
2. Affectus modi substantiae diversi sunt ab affectibus occultarum qualitatum.
3. Non omnia vulnera cerebri, etiam particula ejus abscissa, ex necessitate lethalia.
4. Sangvinis humani adhuc calentis potus & truculentus & parum ad epilepsie curationem proficuus.
5. Medicamenta preparare à medici dignitate non alienum.
6. Ex talco oleum Cosmeticum educi posse, sicut ratio & experientia.

MACASIO ZWICCAWIENSIMUM MEDICO Felicissimo Salutem.

S Eminæ qui deceat morbi extirpare caduci,
seminecesq; Orci faucibus eripere,
dum Tu, Pæonij MACASI gloria cætus
differis, aggredieris grande laboris onus.

Hinc flos immarcescibilis TIBI surget Honoris,
lambetq; ingenuas digna corona comas.

Ecce! paramus eam, quæ fulgida tempora cingat,
TEq; artemq; tuam fama loquetur anus.

MACASI

Anus agitur trigeminus quartus, cum ptdiè Nonarū Julii M. PAULUS
MACASILIS in hac Academia pro summis privilegiis de ARTHRITIDE
theses defenderet. Ille tot Illustrium personarum Medicus & Philoso-
phus iooje ονδρού ονδρού λαμπαδis fulgentissimæ instar TIBI
prælucet. Quod hactenus strenue egisti, persequere; & quam Hippo-
craticæ & Hermeticae Medicinæ tibi exquisitam cognitionem compara-
sti, experientia confirma. Sic paternæ virtutis & felicitatis admiratores
TE redivivo in Parente colent & magnifacent. Hoc ut uberrima larga
seget eveniat ex animo optat

Gvernerus Roflinck Phil. Med.D.
Practicæ & Chimiæ P. Publicus,
Facultatis suæ Senior.

F I N I S.