

Tractatus pathologico-practicus exhibens I. febres continuas, et II. febres intermittentes / [Christian Ludwig Moegling].

Contributors

Moegling, Christian Ludwig, 1715-1762.

Publication/Creation

Tübingen : Bauhof & Franck, 1758.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/axd62rhp>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

D. CHRISTIANI LUDOVICI
MOEGLINGII,

MED. PROF. ORD. CONS. ET ARCHIATR. SERENISS. MARCH.
BADO. DURLAC. ACAD. REG. LUGD. ET INST.
SCIENT. BONON. MEMBRI,

TRACTATUS
PATHOLOGICO-
PRACTICUS
EXHIBENS


I.

FEBRES CONTINUAS,

ET

II.

FEBRES INTERMITTENTES.



TUBINGÆ,
LITERIS BAUHOFII ET FRANCKIL

1758.

CHRISTIANA

MONUMENTA

ANTIQUARIA

COLLECTA

IN LIBRARIA

ACADEMICO

EDITIONE

RESTITUTA

ET AUGMENTATA

AD EDITIONEM

PRIMUM

EDITIONIS

ET CENSURAE

ADDITIONES

ET CORRIGENDA

ADDITIONES

ET CORRIGENDA

ADDITIONES

ET CORRIGENDA

ADDITIONES

ET CORRIGENDA

ADDITIONES



PROOEMIUM.

Opus plane momentosum atque
arduum insimul aggreditur,
quisquis PATHOLOGICO-
PRACTICAM TRACTA-
TIONEM *de FEBRIBUS*,
post tot tantosque edecumatæ erudi-
ditionis, subacti judicii, & consum-

*matæ experientiæ Medicos tradere
cupit. Sollicitæ jam eventuum hisce
in morbis per plures annos institutæ
annotationes inter alia lucem nobis
in ardua hac affuderunt materia.
Tractationis vero hujus non plane
nos pœnitebit, si quædam saltem in
veritatis indagine vestigia rite posue-
rimus. Ita vale, Benevole Lector!
nostrisque porro fave conatibus.*



De



DE FEBRIBUS CONTINUIS.



* * * * * * * * *

Ot inter, tamque diversos morbos, microcosmum afficientes, febris frequen-
tissima, & aliis affectibus præternatura-
libus conjuncta, observatur ; Etenim in
morbis validis inflammatoriis, febrim
semper adesse, nemo dubitat. *Ill. Dn. van SUIETEN*
Comment. in Bærbaū. aph. de cognos. & cur. morb. T. II.
Interim inficias eundum non est, nomen febris nimium
extendi, & morbis adscribi, quibus reipsa tamen com-
petere nequit. Sunt, qui febrim ut conatum naturæ,
molestam sibi infestamque rem excussuræ, conside-
rant : *Monit. & præcept. medic. Cel. MEAD. p. 10.*

cap. de febribus. **Cel. HUXHAM,** Essay sur les différentes especes de Fievres. Sunt vero alii, qui febrim potius ut morbum, ut turbatam sanguinis mixtionem, ad microcosmi interitum tendentem, respiciunt.

Quidquid autem sit, experientia tamen edocet, naturam per commotiones febriles saepius mala removere, sic, ut non semel aliorum quoque Medicorum observationes in eo confirmatas deprehenderimus, quod febres potissimum leviores & mitiores, corpori utiles exstiterint, & robustiorem sanitatis statum, in primis in juventute, reliquerint; conf. **Cl. BOEMERI** *Dissert. de febri remedio.* Id quod & de febribus, aliis morbis accendentibus, observatur. Etenim teste Hippocrate, *aphorism. p. 5.* **CHARTER.** *Tom. IX. p. 169.* a convulsione, si febris prehenderit, cessat eo die, aut postero, aut etiam tertio; Mulieri pariter ex partu, convulsione affectae, febrim supervenire, bonum. **HIPP.** *de locis in homine. cap. 13.* **CHARTER.** *Tom. 6. pag. 372.* Tetanum quoque & convulsiones febris superveniens solvit. Tandem derepente obmutescens ebrius, convulsus moritur, nisi eum febris corripuerit, aut qua hora crapula solvit, vocem edat. **HIPP.** *de morbis. L. I. cap. 7.* **CHARTER.** *Tom. 7. pag. 558.* Febris saepe præcordiorum dolores, si sine inflammatione sint, finit, & in jecinoris dolore succurrit, & nervorum

vorum distensionem rigoremque, si postea coepit, tollit, & rel. de GORTER. Annotandum tamen est, non omnem febrim, motusque febriiles universos esse ejusmodi naturae sibi prospicientis molimina.

Ii, qui limina solum medicinæ salutarunt, abunde sciunt, quod satis copiosa sit febrium familia. Primaria jam divisio generalior est in continuam ac intermittentem: Continuarum simplicissima & omnium levissima, eaque benigna Ephemera, brevi temporis spatio, vel intra viginti quatuor horas, ut plurimum larga perspiratione, plenarie terminatur; Extraordinario tamen & maligno pestilentiali modo interdum Ephemeram sese distinguere Caj. Britannus de Ephemera Britannica cum descriptione febris sudatoriæ, quæ eo tempore in Europa sœviit, A. 1556. annotavit. Hæc scilicet ingentem hominum in Anglia copiam e medio sustulit, symptomaticus enim hic sudor fuit, uti parisinus ille ante plures annos notus. Πυρετος συνεχης, febris continua, quæ ratione temporis nullam notabilem admittit remissionem, licet ratione intensionis variare possit: Συνοχος, dicitur continuæ species, nullis distincta accessionibus, vel reduplicationibus. Hæc cum sit ratione temporis continua, simul etiam homotonos est, quæ in eadem intensione, longiore temporis tractu permanet. Hinc πυρετοις συνεχεισ

con-

continuæ remittentes, *συνοχοι* autem continentes, quia nulla in his fervoris remissio: Suntque duplices, vel primariæ, ut causus &c. vel secundariæ seu symptomaticæ, quæ v. gr. ex vulneribus producuntur. Epacmaстica, sensim invalescens; Anabatica, ad ascensum vergens; Paracmaстica, cuius remissus est vigor, hinc *πυρετος παρακμαστικος*, febris ex summo suo vigore remittens.

Proprie autem sic dicta maligna febris, quæ a contagio ortum dicit, differt ab aliis, v. gr. Synocho putrida, febre ardente biliosa, inflammatoria, quæ ventriculi vel intestinorum inflammationem junctam habent, periculo. Ita tertiana continua eadem fere habet symptomata; Causus igitur in eo ab hac differt, quod in tertiana continua notabilis observetur exacerbatio tertio in primis die, in causo vero quotidie illa adsit. Differt ab Epiala febre, etenim **GALENUS** L. II. de Febribus dixit, illam proprie vocari, quando simul febricitant, (notandum quod **GALENUS** febris essentiam calorem esse voluerit,) & rigent, & utrumque eodem sentiunt tempore in quavis corporis parte. Atque idem videtur & obtinuisse in illis febribus, quæ horridæ dicebantur **HIPPOCRATI**: Quippe **GALENUS** annotat, non vocari hoc nomine illas febres, in quarum initio horror observatur, sed tales, in quibus per plurimam accessionis totius partem

hor-

horroris symptoma extenditur ; additque horridas febres tunc dici, quando brevibus tantum intervallis ab invicem illi distinguuntur motus horrifici. Si vero majoribus intervallis redeant horrores, tunc vocatur reduplicatio, quæ potissimum in hæmitritæis febribus observatur. Tritæophyæ jam febres non habent immisionem ; tales dicuntur, quæ tertio quoque die exacerbantur, sed sine rigore, aut horrore periodico, qualis observatur in hæmitritæis, tritæophyæ enim nullas habent periodos, & si habent, incertæ sunt. Gravissima & terrifica sunt symptomata, quæ hæmitritæas comitantur ; Raræ sunt hujusmodi febres extra Italiam, ut docet BALLONIUS *in Epid.* fol. 138. teste tamen BAGLIVO *Prax. Med. cap. de febr. malign.* in urbe Roma non ita raræ sunt. Differt à febribus sudatoriis, in quibus ægri sub deliquiis interdum frequentibus, profusissime sudant, sudoribus nihil proficientibus. Differunt denique ægri proprie sic dictis febribus malignis decumbentes ab iis, qui Cardiaci nuncupantur ; Etenim teste Cel. HEBENSTREIT *in Tentam. Philol. Medic. super ætii amideni synops. Med. Vet. L.8.* Cognoscemus, ait, eos, qui cardiaci dicuntur, quum acuta febri, & maxime æstuosa, affliguntur,

hoc modo: Pulsum si invenero densum & obscurum,
& extremarum partium frigiditatem, sudores circa
faciem & ad pectus usque glutinosos & nitorem cutis
ablatum & terrestrem redditum, & pulsus circa ipsum
cor vehementiores & magnos, & ad hæc accedant
desperatio, angor animi & corporis jactatio. Hoc
modo affectum, cardiacum esse dico. Os vero ven-
tris primum est, quod in ipsis afficitur, per consen-
sum vehementer oblaedens cor ipsum, propter vici-
nitatem. Porro veteres os ventris, cordis appella-
tione, cardian vocarunt, ab accessionibus nimirum,
quæ ex eo accidunt & inferuntur.

Febres continuæ periodicæ ut plurimum sunt
tertianæ, eæque frequentiores, in quibus nempe
sine intermissione febris pergit, ut subinde exacer-
betur, & ab ista exacerbatione denuo remittat.
Continuæ vero quotidianæ raro sunt acutæ, quin
fere sub censum continuarum, sed revera lentarum
veniunt. In eo autem continua quotidiana a quar-
tana sese distinguit, quod in continua quotidiana
frigus cum calore & languore, pulsu celeri
ac debili, deliquiis, in appetentia, & sudore adsint
collis

colliquativo, & quotidie sic paroxysmus accedat, in quartana continua vero horripilationes & pandiculationes primo paroxysmi die accedant, aucto calore & pulsu, reliquis duobus diebus calor solum naturali intensior, & pulsus auctus, somnus vero inquietus, appetitus dejectus, & vires imminutæ, urina rubicunda cum sedimento roseo, quarto die vero aucta sint symptomata, uti primo die. Notabilis est complicatio, quam refert PANAROLLUS *Pent. 2. obs. 33.* Tertianam nempe continuam duplicem cum quartana lethalem. Febris, vocatur vel idiopathica seu essentialis, quæ per se ex discrasia sanguinis exoritur, insimulque morbi peculiaris Schema fistit; Vel symptomatica, superveniens alii morbo, vulneri, ulceri, arthritidi, doloribus & rel. Interim re accuratius ponderata nihil omnino quoque symptomatica febris morbus existit, quamquam alii superveniat morbo, & alio in sensu vox symptomatis sumatur, quam in stricta affectuum præternaturalium divisione. Febris porro salutatur vel critica seu cum crisi, vel sine crisi ac sine separatione, aliis fientibus cum crisi ac separatione, quemadmodum inde testari possunt Erysipelas, pleuritis, bубо-nes, podagra & rel. Atque ejusmodi quoque critica

febris vel benigna vel maligna existit. Interdum tali die, quem criticum vocant, subito absque ullo abscessu, absque ulla excretione sensibili multum remittit febris.

Finita febre, vel superstes est æger, vel non: Si superstes fuerit, tunc vel rediit actionum vitalium, naturalium, & animalium omnium integritas, id est, perfecta sanitas, vel aliqua in his læsio manet post febrim finitam, tuncque est morbus, adeoque in tali casu merito dicitur, febrim in aliud morbum desinere.

Ill. Dn. van SWIETEN Comment. in aph. Bærh. Cap. de febribus. In eo jam febres intermittentes discrepare solent à continuis, quod in prioribus non in una serie, sed per vices & successive massæ sanguineæ mixtura una cum circulo turbetur, in posterioribus vero præter turbationem massæ sanguineæ progressivus insuper motus, nec non intestinus peccet, & irregularis constanter perduret, id vero insimul reticendum non est, sermone ^m nobis esse de summo gradu, etenim sedula febrium observatione edocti fuimus, in variis ægris intermittentibus laborantibus, vitiosum illum intestinum sanguinis motum, finito quoque paroxys-

mo,

mo, nihilominus perdurare, hac saltem cum distinctione, quod turbæ illæ non adeo magnæ existant, sic ut ad sensum sedatæ videantur, ex altera quoque parte monendum, in continuis febribus circulationis leges non in uno continuo semper peccare, quamquam irregularis constanter intestinus illo tempore existat motus; Etenim si rem paulo accuratius considerare velimus, motu intestino hoc irregulari existente, progressivus ille motus regularis esse potest, quamquam celerior existat, & ab ordinario, qui in fano homine observatur, deflectat rhythmo.

Jam in nostris Tentaminibus Semioticæ, Part. III. annotavimus, quod febris continua ab intermittente in prima commotione non omni tempore tam facile distingui queat; Etenim fere communia habet Phœnomena, quamquam in progressu morbi variis circumstantiis, & ipsâ continuitate decursus characterem exhibeat distinctivum, in continuis autem non tamdiu durat, nec tam vehemens horror est, sensus frigoris, & rigor, quam in intermittentibus, calor quoque ceu individuus comes modo dicta insequens, hic quoque diversimode sese monstrat, etenim interdum

moderatus, s^æpe vero per aliquod tempus subdol^o modo benignus, & tamen ex improviso maligne characterem suum immutat, & gravia producit symptoma, interdum statim ab initio manifestus, non occultus, pro ratione autem febris, & reliquarum circumstantiarum individualium etiam gradus intemperie seu caloris variat.

Turgescens orgasmo febrili sanguis cor obruit, ac distendit, stimulatque ad frequentes contractiones, inde celer & plenus exoritur pulsus. Pulsus magnus & validus in genere laudabile est signum in febribus, at dantur febres subdolæ, ubi cum pulsu magno moriuntur ægri, licet HIPPOCRATES contrarium statuat; neque tamen ab initio semper vehementia cum plenitudine pulsus adest, sed frequenter debilis existit, pulsus autem debilitatem in principio febrium raro à spirituum animalium defectu, plerumque ab eorundem suppressione oriri EDUARD STROTHER statuit: Hisce porro in febribus, urina nunc tincta, nunc magis pallida, vel turbanda facile usque ad coctæ materiæ febrilis separationem appetet; Illa autem urina quæ non lixiviosa, rutilans, saturatior,

tior, potius vero naturali similis existit, pessima est, quæ malignitatem indicat. Urinæ pariter coctionis signa præbenti, cum sedimento laudabili in quibusdam subdolis speciebus non fidendum esse, experientia monet. Dolor capitis ut plurimum summo in gradu adest, sitis porro urget, dejectus est appetitus, tanto autem in gradu sese conjungit delirium, ut sitim non sentiat, & cum superficies corporis ad attractum frigida existat, æger de æstu tamen urente interno nihilominus conqueratur, & tunc maximus caloris existit gradus, qui satis ancipitem declarat morbum.

Pro conditione porro temporis & morbi, vel nullum udoris adest indicium, vel tantum circa momentos dies criticos magis vel minus sensibilis ille fit, & agrypnia sese cum extraordinaria conjungit lassitudine, hæc tamen in continuis benignis non ita observantur: Ex annotationibus enim medicorum æque ac ex praxi clinica edocemur, non omnes continuas nequitiam alere, potius vero sine symptomatis hisce non raro in salutem ægri terminari. HIPP. L. de judicationibus, sudores, ait, optimi sunt, & citissime febrim sedant, qui judicatoriis contingunt diebus

diebus, & febrim prorsus submovent, boni quoque sunt, qui per totum corpus oborientes, faciliorem morbi reddunt tolerantiam: Urina autem optima est, quæ per totum tempus, quoad judicatus fuerit morbus, albissimum, lœve, æquale habet sedimentum, securum enim & brevem fore morbum, indicat. Si suborto sudore morbus cesset, & urina fulva sedimentum habens album, conspiciatur, iis eodem die febris reversio fit, & hæc quinto die citra periculum judicatur. Si jam in continuis quotidie rigores incidunt, ipsarum quoque est diuturna discessio. Prudenter monuerunt veteres medici, parvos tantum morbos solvi, magnos vero judicari, id est sensibilibus excretionibus tolli, *Ill. Dn. van SWIETEN Comment. sedt. 594.* De temporibus febrium propriis *Cl. HEBENSTREIT* in peculiari Programmate egit. 1748.

In malignis ab initio pulsum observari parvum, in synochis magnum & citatiorem quidam tradunt medici: Annotandum jam celeritatem pulsus non præcise signum pathognomonicum febrium continuarum constituere, cum interdum malignæ observentur febres sine tali pulsus celeritate decurrentes. Pulsus quoque

quoque intermittens à multis pro pessimo in febribus
habetur signo, at eo tempore, quo debilitas virium
ac diriorum symptomatum gravitas abest, cum eo
aliquando convalescunt ægrī. Febres continuas pu-
tridas breviores, cum urinæ suppressione, febres
continuas putridas, cum cephalalgia, corporis con-
sumptione, pilorum defluvio, auditus difficultate,
defluxione; Et febrim ardente causum cum ce-
phalalgia, delirio, catarrho, & tussi; Ephemeram
cum tumore glandularum colli interdum incedere,
PLATERUS annotavit Observation. *L. 2. de Febribus.*
Febrim Epidemicam dimidiā fere partem incolarum
Novæ Angliæ affigentem cum tumore, dolore, ma-
culis albis in fauibus & in tota cute purpura, præ-
ter consueta symptomata febrilia, **DOUGLAS** in *Ad.*
Edinb. I. IV. descriptis. Febrim malignam rariorem Hi-
storia morborum Vratislav. A. 1699. 1700. 1701. &
1702. Febrim vero Epidemiam continuam, sed re-
mittentem **C. MOERING**. *Commerc. Liter. Noric.* tradi-
derunt. **PETRUS le CERF** in *Tractatu de Febri Gallica*
malignam, à bello tum temporis durante, & hac oc-
casione Gallicam nominatam, annotavit, febrim in
genere motui lymphæ, sanguinis, & spirituum præ-

ternaturali actiones lædenti, effervescentiæ h. i. alcasit
Gallorum cum acido sanguinis Germanici adscripsit:
Quo autem cum fundamento hoc statui queat, vix
perspicere possumus.

Epilepsiam in febrim acutam desinentem, eam-
que lethalem, HENR. HOTTINGERUS in *Eph. N. C.*
Dec. 3. A. 8. & febrim lethargicam in strabismum
utriusque oculi transeuntem JOH. ALBRECHTI, an-
notarunt: Alius Medicus post febrim malignam die
vigefimo morbi dolorem, inde tumorem magnum in
sinistro brachio apparentem, observavit, quo suppu-
rato, ac curato, æger perfecte convaluit, & quod no-
tabile fuit, sanies, quæ prima ex abscessu prodiit,
atra fuit, fuliginis colore. Lanzonus pariter febrim
acutam malignam, pessimis symptomatibus stipatam
annotavit, in qua post 20. diem dentes, unus post
alium sponte, capilli etiam intra triduum à cute sepa-
rati pariter, deciderunt, *Eph. N. C. D. 3.* Febrim ma-
lignant summe periculosam, ast feliciter curatam, in
qua το Θειον HIPPOCRATIS emicuit, GENSELIUS
refert, conf. Cel. RICHTERI *Diss. de Divino Hippo-*
cratis. EL. CAMERARIUS *Epist. Taurin. Diss. II.* oc-
casione

casione febrium castrorum Tubingæ quondam illatrum , ac per aliquot annos sub diverso Schemate sœvientium earundem syndromen symptomatum, difficiles ac periculosas terminationes , anomalias insig-nes, & vermium connubium, nunc causæ, nunc effec-tus quasi rationem habentium , descripsit. Morbi pariter Epidemici ex vermibus Historiam tradunt jour-neaux des sçavants A. 1722. Metastasis febris malignæ in omnimodam cœcitatem, quæ crebris insultibus convulsivis epilepticis , quibus denique ægra foemina succubuit, tentata fuit, HELLWIG ; Et LENTILIUS febrim malignam crebra metastasi in erysipelas terminatam fuisse Eph. N.C. D. 3. observarunt , & Cel. JUCH casum exhibet in *Diss. de singulari memorie imbecillitate ex febre maligna.* vid. p. 53.

Caracter jam distinctivus aliarum malignarum in eo potissimum consistit , quod in illis subito vitales destruantur actiones cum adeo notabili agrypnia, ut ægri in lecto erecti sine syncope esse nequeant, pro conditione jam febris & subjecti vigilia variant, ut & oppressiones pectoris , quæ in febribus pnevmonicis potissimum sese monstrant, in quibus acuta continua

semper adest febris, uti in pleuritide vera sæpius initium illius valde occultum esse solet, usque dum lateris dolor, cum tussi, difficulti respiratione, sanguinis, posteaque puris sputo, & sæpe maligna febri sese declareret. Eo in casu, quo acuta febris à tempore cruditatis, ad illud coctionis ascendit, diversa intercurrere solent, pro morbi gravitate, vel levitate, pro anni temporis, prægressorum, constitutionis individualis, indolis morbi, conditione, & varietate, modo sine, modo cum deliquiis incedit, hisque vel per intervalla, vel etiam sine interruptione durantibus, exercefacti post somnum ægri, circa omnia vel quædam saltem delirant objecta, sine vel cum furore, interdum ad phrenitidem ascendentे, quibus accedunt systematis nervosi contractiones magis vel minus graviores, quæ modo certis quibusdam in partibus, modo in toto sese exserunt corpore; pro genio autem febris vel in prima statim commotione febrili, vel tempore pepasni ut plurimum intimæ destructio-
nis massæ sanguineæ & corruptionis incipientis testi-
monio, petechiæ vel purpurata exanthemata variæ
magnitudinis, & diversi coloris accedunt, quibus in
casibus febris cum nequitia frequenter conjungitur,
potissimum

potissimum quando maculæ petechiales fere atramenti ad instar nigrescentes, & purpurata livida cum depressione adsunt exanthemata, illæ autem petechiæ, quæ cum febribus castrrensibus conjunguntur, differunt ab illis, quæ in febribus pestilentialibus observantur. SCRETA *Trad. de febre castrensi*: Quippe ratione malignitatis graviores existunt hæ posteriores, cum priores integris adhuc viribus, circumspecta medendi methodo, juxta medicorum observationes, felicius curari queant; referri pariter huc debent carbunculi, bubones, parotides, in continuis, pestilentialibus prodeuntes, morbum modo in melius terminantes, si debite ad suppurationem tendant, modo in pejus, si talis non succedat.

Tandem quoque evacuationes sanguineæ vel serosæ pro diverso naturæ robore, & varia morbi indeole, proque temporis & individualium determinacionum ratione vario sese habent modo. Dissolutionem sanguinis febribus putridis à contagio ortis, conjungi, interdum vero effectum esse humorum scorbuticorum, D. HUXHAM tradit: Has igitur febres primo sanguinem, lentas autem nervorum nonnisi suc-

cum nervum & lymphaticum afficere, Hedges tradit. Febres nervorum in Britannia A. 1735. magnam stragem producentes, diverso plane modo incipientes, in progressu vero & circa statum in essentialibus congruentes, *Cf. GLICHRIST*, Medicus in Dumstries observavit. *Ad. Edinburg. T. VI.* Malignas porro febres cum lenta circulatione speciem sudoris sanguinei sub axillis referentes, alias vero putridas febres cum magno macularum flavarum & fuscarum numero, & urina fere nigra ac sedimento copioso fusci coloris, damnum intulisse, idem monet; Quemadmodum in peste sudorem purpureum & sanguinis colorem referentem, momentosum Hedges observavit. Denique sanguinis ex variis corporis partibus sudorem Transaktion. Anglic Nr. 109. tradunt. Obauditionem porro ac surditatem in febribus malignis & acutis convalescentiam indicare tradunt, nisi mox auditus redeat: Interim teste experientia modo exoptatum, modo funestum produxit eventum, sic ut nihil cum certitudine concludi queat. In fine autem febris malignæ exanthematicæ surditatem non cito evanescit, & per tres quatuorve dies durantem, bonum fuisse signum, affirmat de NILSROSEN in *Ad. Acad. scient. Suec. 1744.*

Quid

Quid denique ex strepitu in pectore inter potandum, ex prolapsu ad pedes, ex tendinum in carpis assaultu, ex floccorum venatu in stragulis lecti aut parietibus, ex luctuosis suspiriis, ex alvi & vesicæ in jussa solutione, ex imperfecte clausis palpebris, ex obtutu lugubri, ex stimulo ad desidendum, ex resolutione in fine acutorum concludendum sit, HIPPOCRATES, GALENUS, FREINDIUS, aliquique declararunt, vid. Tentamina nostra Semiotica p. II. p. 26. HIPPOCRATES pariter *de Acut.* vid. rat. Sed. IV. Quum in febribus, ait, quinto die quid terrificum contigerit, aut alvus derepente liquida dejecerit, & animi defectus inciderit, aut vocis suppressio prehenderit, aut convulsio, vel singultus evenerit, ex his jactari æger consuevit, & sudores sub naso & circa frontem ac cervicem posteriore capitis parte suboriri, at qui hæc partiuuntur, suspiriosi non multo post intereunt. Quibus vero sanguis copiosus è naribus fluxerit, morbi solutionem portendit, si minus, longitudinem, quo vero parcus fluxerit, eo deterius & diuturnum. Si urinæ crassiores pallidioresque fuerint, meliores, si vero tenuiores, nigriores, deteriores, si autem mutationes habeant, temporis diuturnitatem

indū-

indican, morbus necessario tum ad deterius, tum ad melius commutat inæqualitatem; conf. *Cel HAMBERGERI Dissert. de similitudine signorum judicationis & mortis in febribus acutis proxime instantis.* Id tamen junioribus practicis nullo non tempore inculcandum est, non unum solum signum ad prædictionem sufficere, sed plura combinata demum aliquid indicare posse.

Nimis jam generaliter iij rem pertractare videntur, qui benignas à motu concitato p. n. copiosori spirituum in cor & omnes corporis musculos deducere solent, quoniam eodem tempore & massæ sanguineæ turbatio excludi non debet, hac cum distinctione, quod intimior & major illa existat in malignis, ac quidem in benignis, non unica igitur & universalis semper in omnibus supponi potest causa, interdum adest miasma quoddam externum excitans, seu, ut aliis placet, fermentum, quod perspirando à corpore effertur, atque massæ sanguinis & humorum, imo spiritibus animalibus communicatur, eandem conditionem, eandem mixturæ turbationem excitans, ac prout major ad discrasiam talem adest prævia dispositio,

eo

eo funestiores inde sequentur effectus. Annotandum tamen est, causam febris adeo spiritus, motui animali destinatos, afficere, ut consuetum perficere nequeant officium. Constat in omni febre adesse ægritudinem, totum igitur sistema nervosum magis vel minus afficitur, prout causa validior est vel minor. Interdum in ventriculo & intestinis minera quædam latet, ex qua noxiæ partes Massæ sanguinis sensim sensimque communicari queunt, eaque sic coquinari solet. Peregrinum jam ætherem secundum quosdam mirum in turbanda mixtura sanguinis effectum exsere, probari vix poterit, si de aëre sermo esset, tum efficaciam illius notabilem facile concedere possemus, vid. *Dissert. nostra de saluberrimo aëris moderate calidi & sicci in microcosmum influxu.*

Diversa vero particularium heterogenearum actio, qua unio elementorum sanguinis in continuis turbatur febribus, varium quoque producit effectum, etenim si vel in copia, vel in qualitate morbifica peccent miasmata, & ad sanguinem deferrantur, gravissimos producere possunt morbos, ut in apice febrium omnium acutarum malignarum pe-



ste id ipsum conspicitur, si vero vel in quantitate vel in qualitate non tantus fiat excessus particularum modo dictarum, tunc mitiores propullulant affectus, modo continuæ benignæ, modo Ephemeræ, modo catarrhales, ut jam altera ex parte de epidemiis febribus malignis, diversimode grassantibus, nihil dicamus. Atque sic ejusmodi intestinus sanguinis & massæ humorum motus diversimode sese habet, insimul fluidæ & solidæ partes in eccentrico motu magis vel minus pro causæ gravitate sunt constitutæ. Dantur conditiones fluidarum partium præternaturales, quæ, cum causa non tam gravis existat, non adeo pertimescendæ sunt, quæque robore naturæ, debitoque adhibito regimine compesci queunt.

Ubi autem unio elementorum sanguinis turbatur, acriores & sulphureæ particulæ sanguini communicantur, ebullitiones fortiores vel adausto vel imminuto spirituum animalium elatere oriuntur, tandem ad corruptionem seu secessum elementorum sanguinem constituentium sternitur via, eo potissimum in casu, quo biliosarum & salinarum partium in sanguine existit copia, imminuto laudabili liquore

liquore illo diaphano lymphatico , exinde fluida len-
torem contrahunt , atque hinc inde subsistunt , sic ut
exanthemata tandem magis vel minus graviora pro-
deant , v. gr. petechiæ , & in peste bubones , si te-
nuitas sit , velexcessus salinarum partium , carbunculi
subsistente tunc sanguine , vel ad superficiem corporis
propulsa in salutem ægri materia exitiali , & liberatis
partibus interioribus nobilibus , vel infausto omne
retrocedente tali intra corpus , & ad nobiliores partes
determinata , vel summum gradum corruptionis pu-
tredinosæ mortificationem excitando.

Ex quibus patet , pro diverso virium vitæ gradu ,
vel in bonum , vel in malum tales terminari morbos ,
concurrere autem præter ægri & morbi conditionem ,
externas determinationes à subtilissimis non determi-
nandis in atmosphæra contentis partibus noxiis .
Febrim ardentem à contagio erucarum in juvene ortam
LEIDELIUS , & nebulam singularem febris malignæ
lethalis causam fuisse HOYERUS , annotarunt . Ex
rebus denique præternaturalibus disponunt v. gr. ulce-
ra , pus , scabies tam sicca quam putrida , intempestive
repulsa ; Erysipelas repulsum ab externis partibus ad-



internas ; Calculi quoque , vermes , venena assumta &c. symbolum ad acutas malignas conferunt febres. Clinica jam edocet praxis distinctionem illam continuorum febrium in magis vel minus acutas non adeo genuinam esse , quippe eas acutas , in quibus quarto die plenaria crisis & terminatio in salutem oriuntur , acutissimas salutant , genius autem probe observandus est , quippe celerem intra quatuor morbi dies iudicationem non unice ad febrim acutissimam referri posse ex eo credimus , quod & febres , quæ intra 24. horas decursum absolvunt , nec non acutæ sanguineæ & continuæ malignitate carentes , intra paucos dies ad salutarem perductæ finem , eodem forsan jure possent acutissimæ vocari ; Ad minimum de Ephemerâ pestilentiali Britannica magis hoc dici posset ; Hujusmodi in casibus gradus major & nequitia febris cum debili pulsu considerari debent.

Illæ jam febres , in quibus crisis ^{septimo} die vel per sudorem , vel per alias eruptiones contingit , ad magis acutas , illæ vero , quæ non nisi decimo quarto judicantur die ad minus acutas communiter referuntur . Non raro edocti sumus , in morbis malignis in prima

prima commotione non statim detegi & determinari posse, an ad acutissimos, ad magis vel minus acutos referri debeant, vel queant, quoniam ob diversitatem causarum, subjectorum, & ob variam constitutionem unus idemque morbus diversos edit effectus; Hisce enim in morbis per aliquot dies malignitas latere, & ex improviso saevitiam postea exercere potest, præparationem tum materiæ morbificæ, nec non intemperiei sublationem, & salutarem heterogenearum partium è sanguinis textura excretionem natura intendit, licet stata hic non semper observentur tempora. Cum exempla quotidiana monstrant, optima etiam signa nihilominus fallere, ita & nequitia diebus iudicationis, vel ante hos quoque accedens ex improviso non raro ægrum jugulat : Hisce igitur in casibus continuo memores esse debemus moniti HIPPOCRATICI, quod nempe acutorum morborum non omnino certæ sint prædictiones neque mortis, neque salutis.

Aph. 19. Sed. 2. CHARTER. T. IX. p. 59.

Quod autem morbi concernit finem, eo nimimum tempore, quo per evacuationes criticas in meilius vergit, calore urente, & in uno continuo per

morbi decursum durante, jam imminuto, notabiliter morbi variant symptomata, tuncque graviter sæviens mitiora fieri incipiunt, & una cum appetitu, diversa simul incolumentis apparent signa. Quodsi autem vires vitæ superentur à materia morbifica, agrypnia in dies magis magisque accedit, modo turbatur mens, modo ab omni turbatione libera existit, modo prior redit turbatio, intercurrentibus variis nervorum constrictionebus, quæ ad summum gradum nonnunquam ascendunt, scil. ad convulsiones, internis urentibus, externis vero algentibus, una cum variis signis, quæ alias vitæ finem antecedere solent. Variæ jam non raro existunt causæ, quæ plenariam materiæ morbificæ eliminationem in febribus acutis vel inflammationibus impediunt, exinde recidivæ in acutis producuntur. Hinc & HIPPOCRATES *Epid.* L. 4. §. 29. quæ relinquuntur post iudicationes, recidivas adferre solent, & quæ in ipsis morbis excernuntur, ut sputum præmaturum. Scrutinum vero recidivarum prolixius institutum fuit in nostris Tentam. Semioticæ P. IV.

Carum denique frequenter febrium accessionibus supervenire Antiquiores Medici plurimi tradunt, in primis **GALENUS** *comment.* & **PAUL. AEGINETA** *L. de re medica*; Tam acutis febribus, quam Chronicis, quotidianis, semitertianis, quartanis, vel semel, gravissimo cum periculo, vel iterum iterumque per periodos contingere, docet **MANGE**. *Bibliothec. Præd. T. I. & Cel.* **COHAUSEN** in *Archæo febrium fabro, soporosarum & apoplecticarum passionum mentionem* facit.

Quod nunc causarum attinet serutinum, primo statim annotandum est loco, quod diversa anni tempora, varia atmosphæræ constitutio, ventorum major vel minor vehementia, incauta & repentina corporis ex frigido ac humido in calidum, & viceversa, mutatio, imo &, si non epidemica grassatio, tamen interdum contagiosa infectio symbolum conferant, quæ fusiis diducta sunt in *Dissert. nostra de peste habita*. Raras quoque & diversas insimul febrium continuarum causas **BONETUS** in *sepulcreto distinde recenset*. *Cap. de febribus continuis.* Quid quod præter hæc omnia reliquæ res non naturales concurrere possunt,

& so-

& solent, imo & ulterius fortiora & frequentiora evacuantia, quibus cum inutilibus utiles eliminantur particulæ, repentinus porro & imprævisus ægri affectus & insequens pavor: Diæta quoque illaudabilis, cibi nimii, dyschymi & dyspepti, excessus porro in vino &c. somitem in penetralibus corporis diu interdum occultum, in motum ferre, ac impuros humores tenaces, nec non vitia solidarum partium producere possunt, retenta porro alvi excrementa, & bilem, liquores emeritos è toto corpore ad ventriculum refluos, & ibidem retardatos, HIPPOCRATES *Lib. de flat.* innuit febrium causas fieri. Confer. *Cel. de SAUVAGES Diff. qua de febrium causis hypotheseos examen exhibetur.* Dari jam generationem morborum ex morbis ex diversis speciminibus v. gr. ex inflammacionibus Laryngis, & Pharyngis, febribus catarrhalibus, mesentericis, ac lochialibus appareat.

Non raro abscessus in femore, vel dorso, vel circa anum, interdum in febribus continuis & malignioribus, præcipue ubi affectus capitis & nervorum concurrunt, observare licet, quemadmodum abscessum insigniorem in viro quodam quinquagenario

genario ad finem malignioris febris in dorso, obser-
vavimus, qui sub nostra, & Chirurgi medicatione
post aliquod tempus feliciter pristinæ restitutus fuit
sanitati. Multi Medici malignitatem in febribus sibi
tanquam venenum concipiunt, cum omnes effectus
alias à veneno provenientes adeste dicant; Alii
hoc prædicatum febris non agnoscant, sed princi-
pium in solo simplici calore acuto ponunt: Interdum
quoddam adest, quod characterem malignitatis cum
calore efficit. Febres jam à stimulo calido excitatæ
demum sine præcedenti frigore adoruntur; Exinde
varietas febrium oritur; Quodsi causa sit valida,
excitans frigus, ut plurimum priusquam calor acce-
dit, ægrum necat, subactis à gravitate morbi viribus
vitæ, uti infra de ægra tertiana laborante dicemus.

Ad proximam quod nunc attinet causam,
duplicem ea habet considerationem, primo qui-
dem quatenus ex infectis in alios venit, & se-
cundo, quatenus ex alia quadam causa aliunde afficit.
Naturæ autem salino-sulphureæ quidam sibi mias-
mata in febribus concipiunt. Ex Langrischs expe-
rimentis staticis, cum sanguine ægrorum acutis con-

tinuis febribus decumbentium institutis, & cum san-
guine sanorum comparatis, apparet, quod in ejusmodi
febribus serum patiori in copia adsit, & crassamen-
tum tenacius & viscidius existat, quam in statu sani-
tatis, per experimenta chemica idem Modern Theo-
ry and Practice of Physik T. IV. Ad. Edinburg. depre-
hendit, quod in acutis febribus salinæ & sulphureæ
partes copiosiores quam in statu sanitatis adsint, & quod
urina magis magisque salcis & sulphureis partibus re-
pleta sit, quo magis symptomata ob crisin per urinam
imminuantur. Sunt qui ad statum coagulationis in
Chronicis morbis, ad statum vero resolutionis dissolu-
tionis plus minus in acutis respiciunt: Experientia au-
tem edocet, in febribus malignis regulariter sanguinem
è vena missum, floridiorem , fluidiorem apparere.

Ex Chirurgia infusoria alii demonstrare vo-
lunt, acida sanguinem figere, alcalia vero dissol-
vere, & attenuare, quamquam & hoc quoque
annotandum sit, quod pro differentia gradus dissolu-
tionis præcipue in prima commotione ab ipso
calore lympha inspissationem pati queat: Etenim si
sanguis vena missus ad moderatum ponatur calorem,
serum ad spissam deducitur consistentiam, & in gel-
atinosam

tinosam coagulatur substantiam. Ex hoc jam intel-
ligi potest ex quoniam fundamento contrarium non-
nunquam in malignis febris fieri queat in sanguine,
nimirum spissitudo & coagulatio. Veteres fundamen-
tum febris essentialis in sanguinea quæsiverunt massa,
excludentes omnem jam factam cujusdam partis in-
flammationem, talis jam sanguis in penetralibus cor-
poris ad viscus quoddam seu quandam partem aliam
subsistens, statim febrem producet inflammatoriam,
& hinc inflammatio sequetur febrem.

Inflammationis naturam sequentem in motum
expressit *Illustr. Dn. de HALLER Opuscul. Patholog.*
In puerpera, inquit, quam cruris erysipelas extinxisse
videbatur, primum evidenter, deinde in numerosis
aliis cadaveribus, naturam inflammationis mihi sum
visus me perspexisse. Intestina flatu insigniter disten-
ta, tota inflammata erant, non quod vascula sanguini-
ne unice distenderentur, sed quod crux secundum
totam longitudinem arbuscularum vasculosarum in
cellulositatem effusus lineam obscure rubentem in
vasis circumpositam efficeret. Paulum diversæ
sunt aliæ extra vasa effusi humoris species, in quibus

in maculas late confluit. Tales in vivo homine, cum funesta febre miliari laboraret, natas vidi. Deinde in juvene, quem febris mali moris, soporosa, cum delirio & sensu incendii interni occiderat, inciso, hepar lien equidem sana, intestina vero & colon in primis, flatu distenta fuerunt. In iis plurimæ maculæ gangrænosæ, ex purpura subnigræ, aliquæ etiam in mesenterio, ventriculo, vesica fellea apparuerunt. In ventriculo aper-to signa plurima inflammationis vidi, ex eo genere, quod fit à sanguine in cellulosam telam secundam effuso. Calebat homo 24. hora à morte, media & rigida hieme. Similem effusionem in viri aorta, late extremæ membranæ impositam tanquam sigillatio-nem vidi, continuo supra cor. Uti ab inflammatio-nibus gravioribus externis erysipelaceis Phlegmonoi-deis febrem produci, & vires acquirere cernimus; Ita ex altera ejus parte tales in penetralibus & visce-ribus corporis suspicari, justum est. Diversus vero inflammationis internæ progressus gradum vel ma-jorem vel minorem nequitiæ febris efficit.

Quod nunc ipsam concernit curationem, *Cel. MEAD. Monit. & præcept. Med. S. III. de febr. contin.*
Nulli, ait, morbo magis convenit utile illud præ-
ceptum,

ceptum: Principiis obſta, quam febribus. Inter initia enim juvare plerumque facile, at cum malum invaluit, difficilius ægrotanti succurritur. Occasio enim est præceps, & fruſtra ſæpe ea medicina eſt, occupato jam vi morbi corpore, fractisque viribus, quæ in principio à periculo expedire hominem potuifſet. Neque tamen fato ſuo permittendus eſt, qui auxilium ſero petit, quando quidem morbos, antiquiſſimis temporibus ad iram divinam relatos ars noſtra, quæ Dei ipsiſus donum eſt, etiam cum res jam desperatæ videantur, non raro depellat, circumſpicere igitur oportet medicum, neque officio ſuo unquam deeffe. Ad remedia jam quod attinet, universale quod omnes curet morbos, dari, nemo saniorum statuet: Tuta vero & proficua in diversis morbis dari, experientia loquitur. Id vero mirandum, quod Medicis remedia in certis quibusdam morbis proficua, in aliis quoque præſcribant indiscriminatim, & pericula per mortes interdum faciant.

Nihil reluctantante natura tentandum, neque ea necessitari debet, potius vero leniter duci, quo ipsa fert; Autocratia naturæ ab HIPPOCRATE medicatrix vocatur,

tur, quod ipsum experientia non raro in ægris confirmat. ETHMULLER *Tom. II. De Febrium cura Opus.* ait, hoc est vel solius naturæ, vel solius Artis, vel utriusque simul. Solius naturæ opus est hæc cura, dum coctione materiae morbificæ, & hinc facta crisi, expedit; Unde in veterum medendi methodo Medici agebant spectatores naturæ, observando coctionis signa & tempora, & hinc expectando crisin, quibus rite se habentibus, morbus judicabatur, & salvabatur æger. Solius artis opus est, quando remediis specificis antifebrilibus fermentum febrile ita enervatur, & corrigitur; Id quod supereft, sponte sua & absque morboſo conatu, curante natura. Artis & naturæ opera simul curantur in methodo hactenus communiter recepta, qua naturæ laudabiliter agenti & coquenti, auxiliatrices ferimus opes, impedimenta illius, fordes & fomites primarum viarum removendo.

Ratione Therapiæ jam Medici valde inter se dissentunt, non solum quoad fontem Pharmaceuticū, sed & Chirurgicū: confer. *Cel. FURSTENAU desiderata Practica.* Et CELSUS *Cap. de Acutis Quædam,* ait, remedia increcentibus morbis, plura inclinatis convenient: Eaque quæ crescentibus apta

apta sunt, ubi acutus increscens urget, in remissionibus potius experienda. In prima invasione hinc inde quidam suadent vomitoria, sed ita promiscue, ut quo tempore morbi, an in initio, an in progressu exhibenda sint, determinatum non sit, imo à multis initium ita negligitur, ac vix pro febrili commotione habetur insultus, ut sero nimis advocatus Medicus, diebus criticis appropinquantibus, non amplius audeat ejusmodi propinare remedia, licet lenissima sint, cum motus naturæ facillime turbari queant, & interdum minera in ventriculo non lateat, potius vero in nobilioribus hæreat partibus, sic ut in vanum exhibeantur.

Interdum autem præsente etiam minera ventriculus ita constitutus est, ut vix ad vomitum, nisi fortiori commoveri queat vomitorio, quod ipsum respectu status morbi pariter tutum non est, alii autem levi vomitorio ita commoventur, ut in eccentricos motus natura conjiciatur, & turbatio mixturæ sanguinis producatur. Cum igitur in febribus acutis potissimum malignis turbatio mixturæ sanguinis primario compesci debeat, & quotidie paroxysmus adsit, ægri quoque satis graviter à paroxysmi plentur

stantur impetu, & dupli sic deperditione spiritus debilitentur, vix concedi potest emeticum, nisi manifesta in primis viis minera, vel à diæta inordinata prægressa, vel à contagio suscepto miasma adsit, tum ceteris paribus lene exhiberi potest emeticum, ex rad. Jpecacuan, Æj in adultis, in junioribus vero saltem ÆB vel gr. xv. cum aliquot granis nitri, si in principio morbi advocetur Medicus; ZWINGERUS quoque & GRUBELIUS *Eph. N. C. D. III.* hisce in casibus vomitoria cum fructu exhibuerunt. HIPPOCRATES quoque vomitoria diebus imparibus, uti è contra purgationes diebus paribus præcepit, excludent autem tale virium dejectio, systematis nervosi & pectoris debilitas, vomitus cruentus, hæmoptoë, prolapsus uteri, herniæ & rel. Adeo constans est præceptum, raro prudentem Medicum præscribere emeticum, nisi urgentibus ex causis.

In febribus continuis simplicibus in fine paroxysmi quidam lene purgans tertio die repetendum, præscribunt, uti Cl. NIHEL utile purgans in ægro quodam observavit, & RIDLINUS in *Ad. Erud. A. 1698.* tradit, tertio die acutæ febris, viribus jam prostra-

prostratis, perpetuis vigiliis, dolore cervicis per integrum spinam dorsi se extendente, æstu interiora occupante, lene purgans feliciter fuisse propinatum.

CELSUS L. 3. cap. 4. Antiqui, ait, medicamentis quibusdam datis concoctionem moliebantur, eo quod cruditatem maxime horrebant, dein materiam ducendo per alvum, subtrahebant. Summum jam importat momentum scire, quo tempore in febribus acutis purgandum: FREIND *Comment. de Febr.* Tamen, ait, cum locus iste longe lateque pateat, hæc medendi ratio tam multas habet cautions, ut neque ullæ de ea satis accuratæ ab auctoribus tradantur regulæ, neque nisi laboris & judicii plurimum accesserit, tradi possunt.

Vnica jam Hippocratis intentio purgantia in febribus acutis exhibendi, erat eliminatio materiæ peccantis, quæ mala produxit, in hoc naturam pro duce habuit, præscripsit autem purgantia non nisi eo in casu, quo hos motus salutares ægro esse credidit, hinc dixit, tum purgandum esse, quando humores in perfecta coctione, non vero in cruditate adhuc existant. Unicum tempus, quo purgatio utilis esse queat, est, teste GLASS.

Comment. VII. eo tempore, quo materia febrilis in motu est, urina scil. cocta, seu urina, in qua sedimentum est, signum præbet, quod febrilis materia in motu sit; Si vero in primis hæreat viis, per nauseam, vomitus, aut aliam quandam comotionem in primis visceribus sese manifestat, & per sympathiam in aliis partibus, verbi gratia, in capite. Materia ergo turgens molesta est materia circa primas hæren's vias, quæ aut per os, aut per alvum plerumque exuti potest, atque haud raro ventriculum aut intestinum ad expellendum irritat. Quod si jam opus sit uti remediis, id est, potentioribus, v. gr. V. S. & purgatione, in principio morbi hæc facienda sunt juxta HIPPOCRATEM, nam si ad summum gradum vigoris pervenerit, satius est tranquille sese gerere: Si purgatio autem in principio neglecta sit, differri debet usus ad decrementum morbi.

In febre jam, quæ per resolutionem terminata fuit, nunquam HIPPOCRATES suasit purgans, quia recidivam metuebat, tali in casu etiam post crisi perfectam purgantia rejicit, quia materia febrilis ita evacuata fuit, ut recidiva fieri nequeat. Raro igitur
HIP-

HIPPOCRATES in fine febrium purgavit, cum recentiores & contra ad modum Sydenhami satis frequenter alvum moveant; CL. BARKER diversitatem hanc differentiæ climatis attribuit, in ESSAY sur la conformité de la Medicine des anciens & des modernes. HIPPOCRATES quarto demum die purgationem instituit, ut tempus haberet judicandi de specie febris, sic *L. de vid. rat. in acut.* quarto die purgationem præscripsit in febre ardente. Interdum non statim purgantia adhibuit, quam V. Sne antea administrata, scil. in febre quadam inflammatoria purgationem ideo rejicit, quia materia febrilis tunc non in motu erat, sed fixa & cruda, & contra ordinavit eam illo in casu, quo febrilis materia in motu erat.

Dantur morbi interdum inflammatorii, in quibus Hippocrates approbat usum catharticorum sine prævia V. Sne, scil. in cacochymia seu corruptione humorum magis quam in repletione, & prout mobilis erat materia febrilis, juxta hanc suam ordinabat curam. MARTIANUS quoque ait, non timendum esse in hisce casibus incommodum. In primo quoque aut secundo die febris malignæ LANCISIUS purgationem commendat; BAGLIVUS & BAILLON pa-

riter in mesentericis febribus; WINTRINGHAM in Historia morborum Epidemicorum in putridis febribus; Et RAMAZZINI in febribus peticularibus; FERNELIUS in principio omnium morborum acutorum. In omni purgatione jam universalis humorum & serositatis ad primas vias amandatio supponitur, cumque operatio purgantium in primis viis non subsistat, sed ut plurimum ad M. S. sese extendat, teste nonnunquam evacuationis copia, quæ ex primis viis minime expectari potest, hinc non nisi cum circumspectione in hisce febribus exhiberi debent, ut prolixius de hisce egimus *in Diff. de tutiss. Meth. cur. Morb. quam plur. & graviss. §. 6. 7. & 8.*

Quod diuretica concernit, Medici in eo potissimum conveniunt, quod diuretica sanguinem solvant, & diluant plus solito, separationem partium serofarum & crassiorum à sanguine facilitent, atque vasa in primis renalia afficiant: Difficillimum vero est, in acutis æque ac chronicis morbis mineras morborum sic expellere, plerumque enim, vi observationum, non ad votum morbifica eliminatur materia, & sub hac expulsione sanguis in eccentricum conjicitur motum, diluens

diluenis interim, temperans, fluxilis materia inepte expellitur, reliqua vero magis inspissatur & remedium non raro majora producit mala. vid. cit. *Diff.* Præter hæc omnia jam in principio harum febrium turbæ illæ in massa sanguinea fæse exferentes, sedari debent per præparantia, scil. convenient ea, quæ coctionem materiæ morbificæ adjuvant, quo post separationem laudabiles obtineri queant crises. Non sine ratione circumspecti Medici roborantia commendant, acidulata, temperantia, absorbentia, potissimum nitrosa, & pulveres antispasmodicos.

Nitrosa jam incidere, attenuare, obstructiones rese-rare, particulas sulphureas sanguinis ligare, & figere, atque sic in omnibus morbis calidis, ubi humidi defe-stus, sitis cum vigiliis, alvus porro adstricta, egregie calorem temperare, si scil. ventriculus ea ferat, tradunt: FRID. HOFFMANNUS pariter *Dissert. de redio corticis in febribus usu Nitrum*, ait, ingentem interiorum ardorem, ipsamque sitim extinguit, & gustu non solum, sed & virtute evidenter refrigerat, quare in omni calore febrili deprimendo nihil potentius est, nitro, præterea flatus discutit, & doloribus

ac spasmis sedandis non mediocrem fert opem, ubi vero natura debilis est, ibi magna prudentia adhiberi debet. Id jam annotandum est, quod diversa existat omnium subjectorum ratio, quodque doses multum variari debeant.

Nitrosa interim apte exhibita, egregie humorum motus compescere, & calentes partes debite temperare & ad diuresin disponere solent, uti frequenti experientia edocti, hoc confirmare possumus, neque debilis ventriculus excludere potest nitrosa, modo pauca in dosi exhibeantur, id quod & de iis, qui infirmitate pectoris laborant, dicendum, nisi individualis dispositio in certis quibusdam subjectis plane hujus excludat usum. Aptè interim de GORTER febris, ait, continuæ causa, quæ non fuit ex intermitente orta, nullo mihi cognito medicamento extingui potest In febre Ephemera blando non nunquam ac miti agitur diaphoretico, præsertim ubi aëris externi frigus vel humida constitutio in causa sunt, uti laudabilem diaphoretici mitioris effectum in fœmina 60. annorum ex tali humida constitutione Ephemera correpta, observavimus, postulant autem frequenter ægri,

ægri, ut sitis tollatur & calor, adeoque refrigerantia, acidulata tunc exhibentur, aliquando præter dicta etiam absorbentia. Ubi à crapula, à nimio ciborum onere, Ephemera oritur, vomitus, leni medicamento provocatus, prodest. Eo autem in casu quo Medicus deprehendit, aliquid in corpore adhuc latere, quod erumpere & morbum producere posset, lene purgans vel diaphoreticum pro signorum & indicantium conditione exhibere poterit. Ephemeram in Juvene 20. annorum à nimio motu æstivo tempore instituto, sudore largo improvide repulso, excitatem fuisse, observavimus, hæc per diaphoretica lenia ac per temperantia debellata fuit.

In malignis febribus diaphoretica non promiscue conducunt, & prout varia dantur, vario modo agentia, ex iis pro morbificæ causæ, quam symptomata produnt, varia conditione, & indole, seligenda. Quod & de Alexipharmacis sive bezoardicis, ut vocare solent, dicendum. Aliquando enim pro temporis quoque diversitate in uno subjecto conducunt calida, spirituosa, attenuantia, resolventia, aliquando
absor-

absorbentia, invertentia, aliquando refrigerantia, diluentia, coercentia, acida, aliquando antispasmodica, aliquando papaveracea, opiata, aliquando varie miscenda sunt; Acta Vratislaviensia A. 1717. mentionem injiciunt febris malignæ, quæ juniores potissimum invasit, quæque cum horrore, cephalalgia, siti, deliriis, & 5. die Lipothymiis, convulsionibus, stipata fuit, in qua primis statim diebus vomitoria, laxantia cum ſrio dulci, in aliis vero temperantia, alexipharmacæ, & bezoardica Nitrosa nullum plane effectum, tandem sub fine m quarti, & initium quinti diei pulveres ex lumbr. terr. cran. human. Lap. Hyacinth. Cinab. Nat. & Nitro, quavis hora exhibiti, sudorem cum euphoria ad 7. diem durantem, sive remissionem, & febris tandem plenariam cessationem, produxerunt.

Plurimi Medici in acutis continuis absente etiam omni malignitate alexipharmacæ & bezoardica ceu primaria suadent remedia: Licet dentur alii, qui cum formidine oppositi ea propinare soleant, imo nequitiam harum febrium ab usu bezoardicorum demum produci, statuant, cum alii iterum ex alio agentes fundamento, effi-

efficaciam & probatam vel detectam vim adhuc ob defectum genuinorum experimentorum in dubium vocent, & absorbentem solum virtutem lapidi bezoar adscribant; Cum autem ægri & individuales mire varient circumstantiæ, hinc nec in totum rejici, nec nimia cum fiducia & dosi, ac nimis sero talia propinari debent; Potius igitur media incedendum via, & sedatioribus, fixioribus, temperatoribus, præ exæstuantibus, utendum; confer. *Cel. ALBERTI Dissert. de Diaphoreseos usu & abusu.* Lapidem bezoar interdum cum pauxillo camphoræ mixtum pro ægri & morbi conditione, justa dosi, & debito tempore exhibitum, non contemnendos præstitisse effectus, varii affirmant Medici.

Camphoram in febribus inflammatoriis humores attenuare, & causas tensionis & inflammationis propellere, *Ad. Edinb. T. II.* tradunt. Camphoram ad 3. vel. 4. grana per diem, cum aliis convenientibus remixtam, vel ad noctem in emulsione in deliriis, & ad arcendam inflammationem interdum per aliquot dies utiliter exhibitam fuisse, observavimus. Alii majorem quoque dosin camphoræ cum fructu exhibuerunt.

G

Cam-

Camphoram quoque cum aceto calide commixtam in febribus putridis malignis utilem fuisse, Huxham annotavit. Debito pariter tempore, scilicet quoad maximam partem post sextum, aliquoties intra tertium vel quartum, imo & intra 5. & 6. diem, in adultis vel globuli Mecklenburgensis, vel pulveris anglici, scrupulum mane pro dosi, & ad noctem pulverem confortantem a 3j ad 3β. & si non sufficerunt, altero die eandem dosin, & pro re nata tertio die 3β. in junioribus vero parciorum horum remediorum dosin, sine aliorum remediorum additione, præscripsimus, & laudabiles interdum obtinuimus effectus: Interim & naturæ vim & reliqua remedia hoc symbolum contulisse, credimus: Erroneo etenim ex fundamento bezoardicos illos pulveres notissimos ad emendandam malignitatem præscribi, quippe in his non omnia æque congrua vel efficacia esse, statuimus.

HIPPOCRATES medium quoad sudorifera observavit remedia, sudorifera nec ordinabat in principio morbi acuti, nec intentione ejiciendi ex sanguine venenum imaginarium, uti quidam fecerunt, sed ea intentione, ut adjuvet naturam, eo tempore, quo

quo senserat crisin per cutim, post coctionem materiæ febrilis, sequens in hoc, uti in omni alia re, viam, quam natura ipsi indicabat. Omni modo quidem Medicus procurare tenetur sudorem, attamen sudor aliquando in malignis symptomaticus, ut vocant, spiritus dissipans, resolvens nimius, vires dejiciens maxime adest, qui coercendus magis, quam promovendus. Non raro multum juvat, cum Alexipharmacæ & diaphoretica non insigni dosi pro una vice ad sudoris eliminationem exhibentur, sed sensim sensimque per unam duas tresve horas, vel in mixtura, vel in pulvere &c. ut æqualis & continuus uodor seu mador, ad minimum transpiratio libera sit.

Cum in sudore æger est, non licet abstergere faciem nisi interdum linteaminibus calefactis. Eodem tempore licebit ægrum reficere mixturis acidiusculis, vino rubi idæi, granatorum, Cydoniorum, orbiculis mali Citrei, Cerasis acidis, berberibus, ribibus conditis. Tempus sudationis non horarum numero, sed euphoria, tolerancia, virium ratione & conditione, oppressione,

resolutione determinandum, ut in æquali calore, moderato tamen, detineatur corpus; Lectum pariter non quotidie sternere, vel ægrum ab uno calido lecto in alterum calidum portare conducet. Multa interim pro bezoardicis venditantur, quæ nullo modo hac gaudent efficacia, multa iterum existunt, quæ pro talibus minime habentur: Tutissima quidem, sed magis universalia sunt sudorifera fixiora. Majorem adhuc in præscriptione requirunt circumspetionem spiritus illi & tinturæ bezoardicæ, quæ in officinis prostant, licet non pauci ejusmodi in morbis mixtram simplicem larga dosi frequenter præscribere soleant, quid autem de hac statuendum sit, *Cel. B. Dn. RUD. JAC. CAMERARIUS* in *Dissert. de mixtura simplice* prolixius indicavit. Quid porro tintura bezoardica *Cl. CLUTTONI* Angli, cuius efficaciam in febribus acutis maxime deprædicat, præstare valeat, experientia suo tempore ulterius comprobare poterit.

Formula remedii, quam CLUTTON libro sub titulo: *Methode courte, & assurée pour guérir les fièvres continues: inseruit, hæc est: Rx. Ol. Sulphur. per Camp. legitime præpar. ol. Vitr. rect. Salis ana. p. ae. Spir.*

Spir. Vini rectificatiss. triplum horum omnium, digere per mensem : ad siccitatem destilla. Hujus spiritus libris duabus add. Rad. angel. serpent. Virgin. Sem. cardam. ana. drachmas sex. F. Tinctura. Administrandi modus. Hujus Tincturæ tantum aquæ puræ instilletur, quantum ad gratam aciditatem conciliandam requiritur, Julepusque resultans saccharo ad gustum ægri edulcoretur, illique sitienti, quantum desiderat, ad bibendum exhibeatur. Plerumque sex libræ spatio viginti quatuor horarum sufficient, post earum assumptionem in sudorem æger incidit, & urina coctionis signa dat, symptomataque vel plane cessant vel saltem remittunt. Quando febris viginti quatuor horarum spatio nondum penitus est sublata, illa remedio per æquale tempus, sed in minori quantitate continuato, cum omnibus symptomatibus certo aufertur.

Liquor cornu cervi succinatus in certis quibusdam morbis satis latitudinalis, caute tamen exhiberi debet, quoniam & teneriora subiecta, & commotionibus sanguinis obnoxia in utroque sexu non æqualiter eundem ferre possunt: Spiritum quoque cornu cervi sanguinem dissolvere,

& hæmorrhagias producere , *Cl. HUXHAM* monet . *Cel. STAHLIUS* pariter usum hujus in febribus dissuadet *Praxi Med. Sect. I. Mem. VII. de Febribus.* Efficacem vero usum Acidorum ~. ♀is & ♂li , nec non acidi citri & berberum commendat . Liquor autem mineralis anodinus ad mentem *FRID. HOFFMANNI* rite præparatus , justa dosi exhibitus , magis laudabilem exserere solet effectum .

Denique pulveres illi analeptici ex lapidibus pretiosis compositi non tantam exserere queunt præstantiam , ac vulgo sibi multi persuadent : Si usum vel facultatem eorum examinabis , deprehendes , quod tantum opinio lapides istos pretiosos praxi nostræ intulerit , ut principibus & magnatibus persuaderetur , in illis singulare confortans latitare ; Quod tamen citius in vilissimo silice vel alio simplicium reperietur , quam in istis . Ego dico , quod sentio : Qui contrarium sustinet , illi probatio incumbit . Nam sine ratione vel experientia erubescat practicus loqui . Jam ratio , cur hi lapides pretiosi sint , vel debeant esse confortantes , deest ; Experientia vacillat . *Cl. DALE in Pharmacologia.* Eandem fere sententiam fovet *KOZAMERO in Lib. de*

de variolis. Lapidès pretiosi, aurum, Margaritæ orientales &c. quibus quid damnosius? Implentur corpora rebus à natura non domandis, quæ vi sua mechnica agant, & irritando, vomitus, convulsionesque producant. De HAEN, conf. FELIX PLATERUS Cent. Q. *de inanitate gemmarum, lapidum pretiosorum & auri in curandis morbis.*

In agrypnia & in omni malignitate op̄iata prescribenda esse tradunt, de fortioribus idem quoque statuimus, interim blanda op̄iata cum alexipharmacis refracta in dosi in febribus malignis propinata, ubi in primis debilitas spirituum ab oppressione producta est, utilia esse solent; Remedia somnum modice conciliantia in acutarum incremento præscribi possunt, ubi in primis cephalalgia, æstus nimius, & vigilia excedunt, hæc enim tanquam urgentia symptoma prius tollenda sunt, & si hæc sublata sint, facilius postmodum somnus insequitur: Quippe ex impedita sanguinis circulatione per op̄iata non ineleganter effectus narcoticorum deduxit FRID. HOFMAN-NUS in *Diff. Phys. Med.* Maximum jam momentum

in tempore, modo, & dosi, opium exhibendi, situm est, imo in ægri & morbi individualibus circumstan- tiis. In variis autoribus mentio fit, de miro effectu opii in mali moris febribus instante crisi, quippe spasmum vehementem exinde mitigari, & naturam ab extraordinaria confusione liberari, statuunt.

Non omni autem tempore fluidi nervei vehe- mentior influxus per opiata fortiora cohibendus est, interdum enim tales fluidi hujus turbæ, & extraor- dinarii existunt motus, ut non semel observaverimus, vigilia potius producta & dolores auctos fuisse, imo nonnulla subiecta per opiata vix ad somnum disponi potuisse, optima igitur hisce in casibus sunt, demul- centia & sedantia. Pulveres Antispasmodici, succi- num, viscus quer. castor. Lumbr. terr. nec non nitrum in se laudabilia sunt remedia, sed & secundum antedicta doses pro morbi & ægri individuali consti- tutione attemperari debent, potissimum igitur ab- sorbentia acidulata, & roborantia hisce in morbis non sine effectu præscribi solent. *Cl. HARRIS Lib. de Morbis infantum acutis* notat, quod Mercurium Sexies

Sexies sublimatum contra febres comatosas puero-
rum cum fructu usurpaverit. Uti alias entia præter
necessitatem non sunt multiplicanda , ita & idem de
remediis quoque circa hosce morbos statuimus , qui-
vis enim selectum probatorum quorundam remedio-
rum sibi comparare , & debita cum circumspectione
in morbis applicare poterit. conf. *Cel. BRENDELII*
Dissert. de vanitate cum plurimum Medicamentorum. *Cel.*
STAHLIUS in Observ. Med. Pract. Febris acutæ, quæ
somno die critico & septimo judicata fuit, mentio-
nem injicit. Rara pariter est illa curatio ægri notabili
insultu febrili, & inseguente delirio furioso correpti,
qui quidem initio morbi assumpsit remedium , in pro-
gressu autem plane nullum, tandem à musica somno
exinde conciliato , crisi perfectam obtinuit, & feli-
citer evasit. *Memoires de l'Academie Royale des*
sciences de Paris l'An. 1708.

Nonnulli cortices Peruvianum & Chaque-
rillæ hisce in febribus applicare suadent, alii vero
hos plane damnant. Monet jam *Ill. HELVE-*
TIUS Tom. II. Traité des maladies les plus frequen-
tes ; Malignitatem interdum in continuis malignis
diversis resistere remediis , malignitate interim

ultra decimum tertium aut quartum diem sese extendente, & paroxysmo certis recurrente horis, decoctum ex cortice peruviano pro potu ordinario, una cum pulvere viperarum, sale absinthii & Radice contrajervæ, cum fructu præscribi. Corticem peruvianum refracta in dosi, si periodicæ sint, & graviores, & longiores febres interponere potest Medicus, & nos quoque in continuis febribus ex causa intermittentium acutis moderatam dosin corticis peruviani & chaquerillæ, cum aliis convenientibus, non semel cum fructu propinavimus, transpirationem nimirum augendo subactam eduxit materiam.

Pari modo *Cel. WERLHOFF in obseru. ad febr.*
 In acutorum, ait, morborum reliquiis extirpandis & restituendæ perspirationi insensibili, utiliter cortex adhibetur, & egregium naturæ robur addit, & lentæ tabificæque ægritudinis metum & periculi reversiones præcidere solet; Interim corticem Peruvianum in febribus cum inflammatione conjunctis semper noxiū, in aliis calidioribus obscure remittentibus funestum fuisse notatum, Historia morborum Anno 1699. Vratislaviæ grassantium, refert. Denique in

in declinatione morbi sudor vel transpiratio aliquandiu moderate conservanda, & tonica stomachica exhibenda sunt v. gr. Elix. Bals. tem. H. vel Ess. alexiph. stah. temp. v. Ess. ambræ liquid. ad xv. vel ultra gtt. laxans vero in fine, nisi alia contra indicantia adsint, non dissuademus. Præter hæc omnia etiam externa v. gr. balneum brachiorum, hypochondriorum, pedumque gradum caloris naturalis humani corporis non excedens, in febribus inflammatoriis laudabile esse remedium *Cl. HUXHAM* asserit. HIPPOCRATES pariter *de acut. morb. viii. rat. Sect. IV. cap. 5.* Sub limitatione in acutis morbis balneum suadet; FRID. HOFFMANNUS quoque *Syst. Med. Rat. T. III.* in acutis balnea temperata bona esse affirmat. Hæc vero experimenta aliis potius relinquimus.

Ad Chirurgicum quod attinet Fontem, primo quidem loco sese offert V.S. Hic sane valde inter se dissentunt Medici, dum alii cane pejus & angue fugiendam esse tradunt, alii vero inter necessaria remedia eandem summopere suadent. Præstantissimum, ait, *Cl. MEAD Monit. & Præcept. Medic. P. XIII.* in febribus omnibus incipientibus remedium est sanguinis detra-

Etio, si culpa quavis illa prætermissa fuerit per aliquot dies, num adhuc ea fieri debeat, dispiciendum erit. Si intolerabilis igitur in quacunque parte corporis dolor urget, si spiritus ægre trahitur, vel si delirium accessit, sanguis pro ratione virium mittendus erit aut scalpello, si illæ satis constent, aut per cucurbitulas, si fuerint imbecilliores; Aut denique per hirudines, si infirmissimæ videantur. Atque hæc, si consistente jam morbo fieri possunt, multo magis in principio locum habent; Et hirudines quidem, ut illud in transcursu moneam, premente delirio, saepè insigniter juvant.

JO. BAPT. à SCARAMUCCI *in Theor. Familiar.* in febribus & inflammationibus V. S. ad orgasmum massæ humorum compescendum recte institui ab omnibus & cum successu, in comperto habet, non quod sanguis refrigeretur, aut putridus humor ex corpore extrahatur, ut alii sentiunt, sed quod, diminutione facta, proportionatum vasis spatium sanguini transfusenti concedatur; Non aliter vero, quam extrahendo, diminuendoque sanguinem obstrunctiones pelli posse, ex mechanica corporis nostri structura demonstrari posse credit. Generosum interim remedium V. S. dici potest:

Etenim

Etenim non in omni orgasmo & turgescientia ea statim administranda, cum non raro minus secura & minus necessaria sit, & temperantibus internis isti compesci queant motus. A nimia V. S. in calidioribus regionibus ad absolutam necessitatem & commoda tuto concludere non licet, copiose jam missus sanguis vitalem subtrahere solet vigorem, exinde transitus in statum cacochymicum fieri potest, imo & ab intempestiva V. S. in febribus recidivæ produci possunt, licet larga non fuerit; LOBB *in Instit. febr. cur.* parum V. S. tribuit, in primis, si magna sanguinis copia emittatur, ab 3 vi ad 3 viij eam solum extendit.

In febribus jam synochis ita agendum, ut partes vitales à nimium congesto sanguine liberentur, sique vel levior in iis inflammatio impediatur; Adeoque sanguis tempestive justa in quantitate mittendus, quippe HIPPOOCR. *L. 4. de vid. rat. in acutis venam,* ait, in acutis morbis secabis, si morbus vehemens appareat. & qui ægrotant, ætate vigeant, virium robur ipsis adfuerit; PITCARNIUS pariter *Elem. Med. Phys. Mathemat.* & TRALLIANUS *Lib. 12.* monent, in continentibus febribus solerter adhincendam

bendam esse diligentiam in administranda V. S. etenim maximum incommodum est, cum in omnibus morbis, tum in his dilatio: Nam febres vehementiores redduntur, & vires imbecilliores, ut non amplius magna præsidia ad curationem admitti possint. Hi vero indigent maxime sanguinis missione, qui urinas habent rubras & turbatas, oculos rubros, totum corpus grave, & calidioribus magna ex parte cibis, potibus vino liberaliore & vetusto, carnibusque pinguibus usi.

CÆLIUS AURELIANUS tertio acutorum die (finito scilicet abstinentiæ tempore) V. S. adhibet, vel urgente infra Diatriton, raro post eam; V. Snem in principio quoque repetitam instituendam esse, etiam si vel minima suspicio appareat morbi acuti & inflammati, BAGLIVI *in Prax. Med.* monet GUID. HARVEY *in Vanitatibus Medicinæ*, per V. S. semel vel bis institutam spiritus libertati quidem restitu*ti*, & massam sanguineam spatium capacius acquirere concedit, nihilominus, si frequentius repetatur eadem, spiritus dissipari, & febri minus consuli putat; TAUVRY *Nouvelle pratique des maladies aigues*; V. S. frequenter in malignis pariter rejicit.

Cel-

Celsus quoque cum sit, ait, minime crudo sanguis mittendus, tamen ne id quidem perpetuum est. At si morbi ratio patiatur, tum demum, nulla cruditatis ciborum suspicione remanente id fiet: Ideoque ei rei videtur aptissimus adversæ valetudinis dies secundus aut tertius, sed ut aliquando etiam primo die sanguinem mittere necesse est, sic post quartum diem utile nunquam est, quum jam spatio ipso materia vel exhausta est, vel corpus corruptum, ut detractio imbecillum facere possit; JOH. FREINDIUS vero in ægro acuta febre laborante I. 5. & 10. die, V. S. administravit cum fructu. *Comment. II. in L. I. § 3.*
Epid. HIPPOCRAT. JODOCUS LOMIUS semper matutinum tempus eligit ad V. S.

In nulla febre & veterum & recentiorum omnium consensu, tam necessaria est sanguinis missio quam synocha, & quidem sufficiens atque matura. Sed non imitandi veteres, præsertim GALENUS, & qui presse hunc sectatur, ZACUTUS LUSITANUS, qui sanguinem ad animi usque deliquium mittere suadent. Meſſuram potius sanguinis extrahendi Medicus prudens ex ratione virium, ætatis, sexus, & temperamenti, nec non ex pul-

ex pulsuum magnitudine, venarumque amplitudine dijudicare debet, ac ubi corpus firmum, succisque plenum præstat, iterare altero die V. Snam, quam simul & semel nimium evocare, quo successive demta copia, perspiratio servetur, & diffratio sordium liberior reddatur. Neque pueri & adolescentes pleni sanguine hoc remedii genus detrectare debent. Qui autem penitus aversantur, his hirudines in collo aliquando cum fructu admoveare jussi; *Cl. FRID. HOFFMANN. Med. Syst. T. IV. Sect. II. De Febre Synocha.*

Febris jam Ephemera V. S. præcise non indicat, si vero per plures dies protrahatur, cum plethora conjuncta sit, V. S. indicat, si vires validæ, & ætas permittant, & nihil aliud fortiter resistat, pro conditione autem morbi & virium ægri demum quantitas sanguinis determinari potest. Quantitas sanguinis evacuata, teste *Cl. HUXHAM*, debet esse proportionata viribus ægri, conditioni pulsus, vehementiæ febris, calori & vehementiæ symptomatum, id est dolori, conditioni pectoris, respirationi, &c. Et corporis quoque habitus considerari debet. Nam

certum

❧ * ❧

certum est, quod, si omnia reliqua paria sint, homo robustus plethoricus plus sanguinis perdere queat quam aliis, hoc non gaudens habitu, interim defecitus semper præstat excessu, quoniam V. S. semper pro necessitate reiterari potest, eo potissimum in casu, quo dolor, calor, & difficilis respiratio non immittuntur post primam V. S. Cælius jam Aurelianus nusquam gemminatæ V. S. in acutis mentionem injicit; Sed cucurbitulis & sanguisugis, post sectam venam, in iis crebro utitur. Oppressio pulsus frequenter per plethoram producta est, idque ex eo manifestum fit, quoniam experientia teste, pulsus arteriarum post V. S. hisce in casibus augentur.

Non solum igitur ea ipsa volumen & celeritatem sanguinis imminuit, sed ulterius eundem ita disponit, ut liquores diluentes, temperantes & tenues facilius recipiat, in morbis vero contagiosis cum cautela instituendam esse non sine ratione censemus, si jam urgentia hisce febribus superveniant symptomata, tum V. S. adhuc iterari potest, hac cum cautela, quod quantitas pro ægri, pro morbi & virium con-

ditione attemperari debeat, hæcque symptomata urgenter Medicum docebunt, an in collo, an in brachio, an vero in pede secunda sit vena. Accidentia periculosa in febribus malignis rebellibus in primis in progressu v. gr. deliria, convulsiones, hæmorrhagiæ, mala capitis, insomnia, oppressiones pectoris, & deliquia non raro observantur; JOH. WHITE in Nov. 5 exad. obs. circa febres, febribus continuis putridis exquisitis, absque exacerbatione tamen mortuos esse homines in summo vigore, in ætate florente constitutos, quod, qui illorum curam egerunt, nimis timidi fuerint in mittendo sanguine juxta communem methodum medendi ultra libram unam raro concedentes V. S. Servatos vero fuisse, qui naturæ beneficio per nares vel hæmorrhoides 3. 4. vel 5. sanguinis libras perdiderunt. Confirmatus fuit in sua opinione in febribus putridis exquisitis, magis periculosis, iisque remittentibus.

Et V. S. in febribus malignis ratione symptomatum quorundam locum habere moderato usu RAYNALDUS *Tract. de mal. febrib. & ZWINGERUS Eph. N. C. D. II.* statuunt. In febribus tamen malignis & con-

& contagiosis curandis A. 1701. Vratislaviæ grassantibus Medici V. S. omiserunt: Hi vero Medici in historia hac supposuerunt materiam, quæ sub halitus forma in quantitate exili in corpus irrepit, sic ut per V. S. ex corpore eliminari nequeat. Act. Vratisl. An. 1701; LANGRISCH statuit nullo alio remedio efficacius revelli abundantem in cerebro ejusdemque membranis sanguinem, quam Venæ potissimum jugularis sectione, & in deliriis magno semper auxilio fuisse, cuius antiquitatem & securitatem demonstrare & argumentis evincere annis us est FREINDIUS.

In putridis synochis febribus, nec non in ardentibus cholericis, ubi vomitus, diarrhoeæ, vel ubi corpus biliosum, non sine formidine oppositi V. S. instituitur, uti & idem in illis febribus putridis, quæ à cacochymia humorum ortum ducunt, cæteris paribus dici debet: Hinc LAUR. RIVERIUS in observ. I. multum, ait, aberrant Medici, qui in omni febre continua indiscriminatim à V. S. incipiunt, dum putridis humoribus in prima regione stagnantibus oriuntur, qui purgatione facile educuntur. Annotan-

dum jam , sanguinem non temere mittendum esse ,
nisi indolem Epidemii prægressis aliis perspexerit
speciminibus , facile enim tunc V. S. funestum edere
potest effectum . Locus quoque in quo V. S. insti-
tuenda in fæminis gravidis Medici judicio relinquen-
dus est ; In febribus malignis sanguinem vena mis-
sum interdum sanitatem , interdum funestum produ-
cere effectum , tradunt , & hoc ipso tempore V. Snem
utilem esse , illo noxiam ; In ejusmodi febribus V. S.
primis tribus diebus in plethorico , & ubi consueta
V. S. neglecta fuit , in repentinis ad peccus conge-
stionibus , in ætate non nimis tenera , & quando ma-
lignitas non adeo prævalet , instituenda est , imo si
necessariæ se- & excretiones impedianter , repetita V.S.
admitti potest , in paroxysmo vero institutam V. S.
cœcitatem produxisse , hinc inde annotarunt practici ,
uti in primis ex observationibus Medici cujusdam
Xenodochii Parisiensis quinze vingt dicti , constat .

Quamquam CELSUS *L. II. C. X.* non absolute
damnaverit V. Snem in ipso etiam febris paroxysmo ;
expectanda vero intermissio , si non decedit , cum
crescere desit , si neque remissio speratur , tunc quo-
que

que, quamvis pejor, sola tamen occasio non omitenda est. HARRIS in *Diff. Medic. Chir.* illam damnavit V. S. quæ in continuis febribus acutis nimis sero, & in statu, aut progressu, cum vires dejiciuntur, instituitur. GALENUS vero *de curand. rat.* per V. S. quocunque die mittendi sanguinis scopos in ægrotante inveneris, in eo illud auxilium adhibeto, etiam si vel vigesimus ab initio is extiterit. Scopos scilicet posuit morbum ingentem & robur virium. Pulcro quoque cum successu III. Dn. van SWIETEN V. S. aliquando serius instituit. Aptè jam nostro judicio de his omnibus Cl. KLOCKOF. *Opuscul. Med.* Est, ait, ubi ægritudo seram V. S. urgeat, impedimenta prohibeant, æqua fere ratione. Difficiles hi & tædio plenissimi casus committi debent arbitrio Medici unius cuiusque generalibus præceptis instructi ; Cujus est serarum V. S. vera pericula ita librare, ut justam simul rationem ineat morbi & symptomatum, ad quæ multa alia Medicina multoties ludibrio est.

In febre synocha quando sanguis cum impetu ad caput fertur & arteriæ intus fortiter pulsant, facies

simul tumida est cum oculis , & rubicunda, ac nares aliquot tantum guttas stillant, provocandus est sanguis, vel veteri Ægyptiorum more scarificatione narium, vel valida intrusione culmi straminei, quo delirium arceatur. Sed qui tali in casu venas sublinguales incidere solent, minus securum ob incompescibilem non raro hæmorrhagiam interponunt juxta FRID. HOFFMANNUM.

Vesicatoria tandem ob effectus ; quos præstant, laudabiles tuto admitti possunt, interim novimus subiecta teneriora, quæ ob sensibilitatem nimiam ita à vesicatoriis afficiuntur, ut abstinendo tali in casu ab illis, Medicus optimum eligat consilium. Nequē in omnibus febribus acutis vesicatoria suasmus, nisi urgentibus ex causis, interdum quoque in febribus cum spasmis, hi magis exacerbantur per vesicatoria, monet quoque HUXHAM ESSAY *de febribus*, Vesicatoria sal acre sanguini communicare, & fibras irritare, ac in primis in febribus inflammatoriis & ardentibus in principio non conducere, teste quoque BAGLIVO *Prax. Medic. cap. de usu & abusu vesicantium*: in usu vesicantium maxima cautio adhibenda, ne indiscriminatim præscribantur quolibet anni

anni tempore, cuilibet ætati, temperamento, habitiui corporis, & quibuslibet morbis, sed duntaxat dum necessitas urget. Etenim vesicantium abusu rigiditatem cruris contractam fuisse *Acta Acad. N.C. A. VII.* tradunt.

Vesicatoria in malignis febribus carpis manuum imposita, optimum exserere effectum, tradunt, interim locus talis magis tendinibus, quam carne instrutus est; Hinc & dolores intensiores & spasticas contractiones frequenter excitatas fuisse, experientia confirmavit. Carnosis igitur partibus omni tempore imponenda esse dolores & spasmi suadent, quippe scopus est compescere potius dolores, quam excitare, & debitum spirituum animalium influxum & æquabilem restituere, minime vero eccentricum reddere. Vesicatoria vero in vertice applicata delirium tollere *Ad. Edinburg. T. II.* tradunt. In principio & statu febrium, pro comate in deliriis avertendis quando pulsus debilis & caput multo sanguinis sero repletum pariter magni usus esse *EDUARD. STORTHER in crit. febr.* tradit.

Ex fonte diætetico petita præsidia quod attinet, dum sitis non raro urget, potus tenuis, sanguinem temperans, ventriculo conveniens, nec eum lædens optimus est, potus quoque sufficiens fluxilitatem sanguinis conservans, æstum temperans, se- & excretiones promovens, apprime conduit; Nonnunquam spiritum vitrioli dulcem aquæ fontanæ modica in copia instillavimus, interdum aquas Selteranas, vel acidulas Theinacenses, vel alias aquas minerales pro conditione ægri & morbi, interdum infusum ex HBis acetosellæ, Acetosæ, portulacæ, parietariæ, chærefolii, Hederæ terrestris, fl. samb. interdum decoctum ex fl. paralys. pap. rh. Rad. Altheæ, bardanæ, graminis, Scorzonerae, suasimus, alii tale quoque ex cerasis vel recentibus vel siccis, vel ex acetos. Til. flor. cass. Lign. vel ciñam. parant.

Alii species pro decocto ordinario aut potum consuetum alias ordinarium aut cerevisiam tenuem in ad-suetis commendant, licet eam multi dissuadeant Medici. Denique frigidum potum, ubi diaphoresi opus est, omnino vitandum esse, censemus. Quamquam HIPPOCRATES in ejusmodi febribus vinum exhibere

bere siadeat, nihilominus, ubi calor urget, & metus inflammationis, suspectus ejus usus est, etiamsi pauca exhibeatur in dosi, magis adhuc admitti posset vini usus moderatus in declinatione morbi. Singulare interim est, quod in febre quadam Epidemica maligna, in qua vermes teretes affatim excernebantur, vinum maxime profuerit, ceu in quo vermes pariter vivi inditi, statim perierint, cum in oleo, aqua saccharata, spiritu vini, aceto, succo limoniorum per plures horas ac dies vixerint **BAGLIVI Oper.**

Med. Præd. Eo quoque in casu, ubi sanguis nimis fluxilis & vappidus vinum adhuc concedi posset; Interim distinguenda sunt subjecta, clima, morbi indoles, & reliquæ circumstantiæ individuales.

Victum quod attinet regulariter in continuis febribus parum appetunt ægri, hinc nec ad cibos cogendi sunt, tenuis igitur victus in continuis optimus est, & quo magis acuta est febris, eo tenuior & strietior convenit diæta. HIPPOOCR. *L. IV. de acut. morb. vid. rat.* oportet, ait, initio morbi sorbitionibus ægros nutrire & ptisanæ cremore inque morbi vigore tenuissima uti diæta. Possunt vero inter alia spinachia, lupulus, Endivia, tremor avenæ & hordei

tanquam alimenta propinari non pinguia, non salita: Imo Rad. scorzoner. & HB. chærefol. quæ non multum nutriunt. Accinit huic CELSUS *Lib. de acutis continuis febribus*: in acutis, ait, morbis serius æger alendus est, nec nisi jam inclinatis, ut inedia, demta materia, impetum frangat. Esus carnium, nec non piscium viscidorum, non nisi sub cautela permittendus, imo & juscula carnium quotidie non nimia in copia, nec nimis pinguia, potius vero gelatinosa admitti debent, conf. *Coment. Bonon. Tom. II. de jurium diversitate.* Circa dies criticos interdum plane à medicamentis, imo à cibo, & à multo potu per diem & ultra abstinendum esse non sine ratione optimi monent practici: *Ill. Dn. van SWIETEN Coment. in Bærbaū. Aph. de cognosc. & cur. morb. de febrib. contin. acut.* Et de HAEN. *Method. medend.*

Superato jam morbo ad præcavendam febrim hecticam juscula ex. HB. farfar. hedr. terr. bellid. Hep. nob. &c. conducunt. Ad arcenda pessimorum morborum miasmata, & ad illorum vehementiam mitigandam nihil aptius est remediis acidis, è quibus acetum vini, & succus citri præcipue eminent, nihil potentius putredini & motui ejus intestino resistit, quam acidum;

Vino

Vino jam Rhenano & aceto vini os & nares probe colluenda , vel frustum pomi citrei ore tenendum esse , parcus tamen ventriculo jejuno , Medici imperarunt ; Etenim frangitur & enervatur hac ratione immediate & proxime contagii vis virulenta . Spectat huc quoque non condemnenda vis phlegmatis vitrioli , tinturæ papaveris rhœados & rosarum , vid . FRID . HOFMANN . *Path. Syst. Med. R. T. II.*

Aer temperatus quam maxime necessarius est ad promovendas salutares excretiones , siccus autem aër , uti in omni morbo , ita & hic magis prodest , quam humidus , qui potius debilitat . Animi quoque & corporis quies optime hisce in febribus conducit , quoniam magis criticis favet motibus , etenim si ægri nimis anxii sint , & insuper hinc inde in lecto corpus jactitant ; Eo magis naturæ turbantur motus , id quod & de loco , in quo æger decumbit dicendum , vid . Tentam . nostr . Semiotic . *P. III. cap. de eruendo genuino morborum caradere ;* Primario autem animi pathemata fortiora ob metum recidivæ fugienda sunt . Denique somnus naturalis satis bonum exhibet signum , comatosus autem , & qui malignis supervenit non æque bonus , & curatione potius indiget . Ægris autem

alias somnus nunquam arcendus est, etenim sub tali, turbæ, quæ in sanguinis ac humorum massa, nec non in spiritibus animalibus existunt, sedantur, coctio materiæ febrilis & felicius, & citius absolvitur, & cum sub somno, teste Sanctorio, quasi in balneo vaporis suspendantur corpora, eo ipso facilius heterogeneæ ex sanguinis textura eliminari queunt particulæ.

DE
**FEBRIBUS INTERMIT-
TENTIBUS.**

OMnes ii, qui clinicam exercent Praxin satis superque norunt, in febrium intermittentium progressu tria observanda esse stadia, 1. horroris, 2. æstus, & 3. remissionis: Scilicet in principio horror adest & vehemens ut plurimum existit impetus, ab æstu vero ad remissionem accendentia symptomata tunc demum mitiora evadunt. Minime vero frigus corporis occupat superficiem, quod minima & extrema vascula spastica experiantur contractionem, siveque ex his vasis repellatur sanguis. Magis contra inculpanda craſſities

ties & turbatio sanguinis unâ cum partium interiorum gravi labore. Hoc quippe modo demum ad corporis peripheriam seu cutem spasmī extenduntur , minime vero à cute ad interiora propagantur. Sanguinis autem turbatio, & accumulatio ob crassitatem circa cor, fibras afficere, sicque affluxum spirituum animalium sub his nisibus ad promptam sanguinis concussionem excitare, atque calorem producere potest.

Id jam annotandum est, magnam esse paroxysmorum differentiam : Etenim alii à matutino tempore usque ad vespertinum, alii iterum breviores paroxysmi experiuntur decursum, atque tandem in fine, larga accedente sudoris excretione, mitiora evadunt symptomata, sic ut ad sensum saltem æger ante novum accessum à morbo immunis esse videatur, qui accessus tunc evenit, quando febrilia illa nunc actu iterum erumpunt phænomena. Illud autem febrilis accessus determinatum tempus morbi demum ostendit typum. Itaque febres intermittentes in eo sese à continuis distinguere solent, quod in illis paroxysmi non solum certis qui-

busdam remittant horis , sed tandem plane intermit-
tant , tempus autem plenariæ hujus intermissionis ,
quod varium est , tunc demum declarat ; An Quoti-
diana sit , si quotidie novus accedat paroxysmus , quæ
febris vero rarer est ; An Tertiana , si alternis diebus
accessus paroxysmi adsit , quæ febris omnium æta-
tum homines , omni anni tempore , (licet veri magis
adscribatur ,) fine ulla sexus differentia frequentissime
corripere solet . An porro Quartana sit , si duobus
diebus liberis , quarto demum paroxysmus redeat die ,
has vero febres ab æquinoctio autumnali usque ad
solstitium hibernum , vel ab hoc usque ad æquino-
ctium vernale homines corripere vulgo Medici tra-
dunt , quamquam & hic morbi epidemici ceu lucu-
lenta specimina exceptiones confirmare soleant .

Frigus in quartana non adeo notabile esse mo-
nent , sed loco illius pandiculationes , oscillationes ,
horrores per spinam dorsi excurrentes , adesse , nec
vomitus adeo frequentes observari , quam in aliis
febrium speciebus , paroxysmum vero ipsum loco ve-
hementiæ longiorem esse quam in reliquis , &
pertin-

pertinaciam hujus affectus singularem esse, cum per menses, imo ultra annum quandoque duret. Quod ante dicta attinet, non semper hæc observantur in ægris quartana affectis, interim dolorem osteoco-pum primario sese hic distinguere jam in *Tent. Semiot.* P. III. indicavimus.

Recursum jam paroxysmorum adeo variii existunt, ut fere certa dari nequeat regula; Etenim non raro paroxysmi ita stata recurrent hora, ut nihil exactius esse queat, interdum vero præter omnem expectationem citius invadunt, ut quasi insciis ægris sub somno paroxysmus decurrat, atque sic brevi tempore ante consuetum tempus accedat, ut & idem ex altera parte fieri non nunquam solet, dum accessus paroxysmi tardius, & post aliquot horas fit, inde ejusmodi febres interdum rebelles existere solent. Ex Medicorum pariter obser-vationibus constat, paroxysmos quartanæ solum fere horis accedere pomeridianis, quotidianæ vero fre-quentius matutinis, denique tertianæ paroxysmos quovis etiam tempore invadere, hæc omnia jam pro norma haberri nequeunt, quippe nulla diei excepta est hora, in qua paroxysmus febrilis non accedere queat,

ut*i*

uti frequenti experientia edocti hoc ipsum confirmare possumus, hisce enim in febribus ad primam commotionem respiciendum, quæ lucem postea subsequentibus afferre potest paroxysmis. Ii, qui clinicam aliquandiu exercuerunt praxin, ultro agnoscent, miram esse varietatem paroxysmorum quoad intensiōnem illorum, & momentum symptomatum, effectus quoque modo majores esse, modo minores.

Hæ igitur observationes ansam dederunt Practicis statuendi, quartum tertianæ paroxysmum cum vigore acutæ febris æquiparandum esse, adeoque quartum hunc maximis stipari malis, & ægrum vehementissime omnium affligi, interim de febribus tertianis epidemicis hoc annotari solet, quod priores insultus vehementiores sint, sic ut acutis ratione vehementiæ non cedant, sed tamen sine extraordinario incedant rigore, hoc vero magis de tertiana, de qua HIPPOCRATES mentionem fecit, dici posset, licet & hic plures occurrere queant aberrationes; GALENUS *I. ad Clauc. Cap. VIII. in 1. Epid. Sect. 3. Comment. VIII. in 2. de crifibus. C. VII.* tradit, tertianam exquisitam septem circuitibus judicari, & non esse perniciōsam, si recte

si recte curetur ; In continuas vero ardentes malignas , colliquativas, hecticas, tabidasque ut plurimum insanabiles mutari, ALPINUS monet *Method. Med.* additque spuriam tertianam non septem circuitibus terminari, sed longe pluribus , ut VI. mensibus perdu- rasse à multis fuerit observatum , & ni cito tollatur, minari lienis obstructionem, tumorem , cachexiam, vel in continuam mutari summe periculosam. Virginem Patavinam insolitus in dextro hypochondrio tumorem à casu ab alto contractum, præter quam plurima alia mala per totam vitam corpus afflignantia, febrim tertianam, quartanam, quotidianam, lentam & acutam, ardente, malignam , inflammatoriam sustinuisse, Dominicus *Militia Neapolitanus*, in *Historia Medica de morbis exitialibus*, nobilem virginem Patavinam toto vitæ tempore excruciantibus , tradit.

Breviorem paroxysmum in tertiana quam in quartana agnoscunt Medici ; Eodem autem tempore monendum est, quartanam interdum cæteris paribus, rite tractatam , non tamdiu durare ac tertianam. CELSUS L. 3. Cap. 15. si ex quartana , ait, facta est quotidiana, in malis æger est, quod tamen nisi culpa

vel ægri vel curantis nunquam fit. In tertiana intermitente progressus paroxysmi raro per 24. horas aut ultra durat , interdum citius absolvitur. Quod si vero dictæ febres in 36. vel 40. horis totum absolvunt paroxysmum , illo in casu in principio absque ullo incedunt horrore , sed æstum in sequentem intensiorem habent , ex quibus abunde patet , tempus apyrexias brevissimum esse , & accurate attendendas esse , ne cum continuis confundantur.

Ea febris, quæ alternis diebus statis horis suas habet exacerbationes , ita tamen ut non habeat intermissionem , sed in uno continuo decurrat , ægerque tantum non per totum morbi decursum cum calore & agrypnia decumbat , malignam tertianam indicat , quæ eadem ac continua methodo tractanda est , attamen semper eo respiciendum est , an epidemica sit , nec ne ? cum tali tempore æger majori exponatur periculo , quod differentiam ratione medicamentorum afferre solet. Quemadmodum quidam morbi in exquisitos & spurios dividuntur , ita idem quoque ad intermittentes applicare solent febres , interim re accuratius considerata , hæc distinctio hanc potissimum

mum ob causam vix momentum affert, quoniam vehementia symptomatum ac operatio medicamentorum æquali sese monstrant in gradu, & cum aliquot saltem insultibus, circumspecta medendi methodo adhibita, decurrunt.

In quotidiana intermittente, paroxysmus quo-vis recurrit die, pulsus debilis & celer, urina spissa, calor est diurnior, quam frigus, quod quidem in tertiana quoque evenit, regulariter vero paroxysmus in utraque hac specie acerbior est, quam in quartana, & magis correspondet cum acutis continuis. Dudum **GALENUS I. ad Glauc. VIII.** & **CELSUS L. 3. cap. 15.** aliique Medici quotidianas febres minime periculo carere; Et soporem quotidianæ maxime proprium esse, affirmarunt: Ex altera parte **Cl. MOERING** observationem tradit *Commerc. Liter. Nor.* de validis convolutionibus febri quotidiana remittenti junctis in bimulo. Quotidiana duplex ea vocatur, quæ intra 24. horarum spatium bis recurrit. Tertiana duplex in se quidem est quotidiana, hac tamen notabili cum distinctione, quod paroxysmus primo die ratione vehementiæ & ex-

acerbationis respondeat paroxysmo, qui tertio accedit die, paroxysmus autem, qui secundo invadit die, ratione indolis suæ mitioris respondeat paroxysmo, qui quarto accedit die. Quartana duplex dicitur, quæ per duos dies sibi invicem succedentes sua instituit molimina, deinde intermissionis unicus existit dies, post illum vero iterum duo paroxysmi in duabus diebus sibi invicem succendentibus.

Addunt alii tertianam triplicem, in qua uno die bini paroxysmi, alterâ unus tantum observatur paroxysmus, alii iterum quartanam triplicem statuunt. De quintana febre *Ad. Berolinens. Vol. VI. & Vratislav.* De quintana vero duplii EBEL in *Miscell. N. C. D. I.* De sextana febre *Eph. N. C. Cent. VIIII.* De septimana SCHULZIUS. De octana, & nonana HIPPOCRATES & GALENUS in *diversis locis.* TULPIUS obs. L. 3. de decimana. PAULINI in *obs. cent. 3.* de febre menstrua. *Misc. N. C. D. III.* de anniversaria, quam & nos per tres quatuorve annos in sequentes in puella observavimus. De febre, quæ die natali quotannis affligebat, SCHENKIUS. Denique de febre chronica vicennaria intermittente *Eph. N. C. D. III. A.I.* mentionem

tionem injiciunt, adduntque ægram hac febre laborantem cæterum suis functionibus sine impedimento operam dare potuisse.

Ad tertianas intermitentes quidam hæmitritæam referunt, licet alii magis congrue continua eam accensi posse, tradant. Etenim ex 48. horis 36. fere per accessionem occupat, interdum magis vel minus, non vero plenarie cessat, & in remissione desistit, sed solum mitior evadit. Dari febres intermitentes malignas CLAUDINUS *Resp. Sennertus de febribus. L. 2.* MENOTIUS *de febr. malign.* GALENUS *Epist. 7.* EPIPHANIUS FERD. *Historia Med. Mirab.* RIVERIUS DONATUS *C. 3. obs. 51.* HORSTIUS *L. 1. obs. 12.* & HELLWIG *in Act. Erud. 1712.* affirmant. Morbum Tsemér Hungaris Endemium modo simplicem esse nauseam, modo febrim stomachicam Ephemeræ veterum ex cruditate & repletione ortæ analogiam, ex eo potissimum MILLETTER *in Dissertatione sua concludit,* quod terminus ejus intra 1. 2. vel 3. dies absolvatur, quem, si transcendat, vel in continuam febrim vel intermittentem desinat.

Fieri maculas etiam in febribus intermittentibus citra malignitatem, imo cum euphoria exemplis probat RAYNALDUS *de purpurat.* & malign. febr. Febres quartanas per menses autumnales Anno 1719. & hemales 1720. Vratislaviæ Epidemice gransantes easque curatu difficultimas JOH. GE. SIEGESBECK in *Actis Vratislavienibus A. 1720.* descriptis, quas febres Astrales & quidem Saturninas vocavit. CLAUDINUS *Respons. 7.* cumplures, ait, febre tertiana intermittente laborantes propter febris malitiam ex subsequentे cardialgia, perditos vidi. confer. Cel. VATERI *Dissert. de febre tertiana* ob empymema è vomica pulmonis erupta in cavitatem pectoris dextram effusum, indeque pulmonem hujus lateris compressum penitusque ab officio remotum mortem post se relinquente. Historiam febrium tertianarum æque ac Rheumaticarum, cum cholericis, dispnœis, diarrhoeis A. 1733. Edenburgi graffiantium *Ad. Edenburg.* tradunt.

Fœminam tertiana intermittente laborantem, sub duobus primis paroxysmis summa præcordiorum angustia affectam, sub ingressum tertii paroxysmi mortuam

tuam fuisse, à Medico quodam certiores facti sumus. Raro autem exemplo in febre tertiana intermittente nec pulsus, nec urinæ mutationem observarunt ETT-MULLERUS & KRUGIUS. Dantur quoque febres anomalæ, quæ nullum servant typum, jam tertio, jam quarto, jam quovis recidunt die, frequenter maligni moris sunt, cum urina cruda & siti magna periculum secum ferunt. *Cel. WERLHOFF obseru. de febribus*, perseveravit, ait, hinc inde in ipsis febribus acutis exanthematicis & inflammatione stipatis exquisitus quartanæ typus, siue paroxysmi intercessione gravia induxit pericula, ut semi quartanas haud immerito dicere queamus semi-tertianis quamvis rares, attamen non nimis periculosas. Felicibus & contra ægris esse contigit, quibus prius adæquato remedio curata fuit quartana, quum in ejusmodi morbum acutum hibernum inciderunt.

In principio febrium intermittentium non raro sitis adest, quoad maximam partem pulsus depressus, horrores, horripilationes, & tensiones per spinam dorsi, & postea per totum corporis ambitum decurrentes, frigoris sensus, coloris immutatio-

tio in pallidum, oscitationes, pandiculationes fortiores, torpor membrorum primam partem paroxysmi constituunt: Tandem sensim remittentibus ejusmodi turbis major circuli fit libertas, sitis adest, pulsus major celerior redditur, calor siccus exoritur, materiae variæ sub his ore ejiciuntur, insimulque caput dolet, cum extremitatibus superioribus ac inferioribus, & spina dorsi, quibus jactitatio corporis in lecto, oppressiones pectoris, interdum dolores circa orificium ventriculi superius, flatulentiae, imo nervorum tensiones in partibus dolorificæ, pavores & convulsiones, & in incremento sacci illius caloris phantasmata ac deliria accedunt, quæ vero erumpente largo in corpore sudore non solum imminuuntur, sed tandem cessant. Interdum continua transit in intermittentem & vice versa, quemadmodum exempla hinc inde prostant.

Plures Medici & inter hos MORTONUS in *Tract. de febribus*, statuunt, in tertiana esse materiam spiritibus adversam, exinde spiritus primo affici, dein ad nervos & massam humorum transire. Confer. *Cel. LINÆI Diff. de febrium intermittentium Hypotesibus.*
Patroni

Patroni jam fermentorum in febribus intermittentibus sibi concipiunt quovis paroxysmo affusionem viscidi fermenti, turbationem sic mixturæ sanguinis, & insequentem subactionem ac excretionem per sudorem evenire. In ejusmodi morbis non sine ratione statui potest, massam sanguineam quoad partes constituentes à laudabili & naturali crassi redere, ac interdum in primis viis & visceribus formari mineram minus digestarum, heterogenearum, mixturæ sanguinis contrariarum partium, sicque in quantitate & qualitate peccantem fomitem, primario ex diæta perversa contractum, frequenter inveniri.

Cel. REGA in *Dissert. de sympathia*, seu consensu partium corporis humani ac potissimum ventriculi in statu morboso, in intermittentibus materiæ febris sedem & vomitem in ventriculo latere partim per SYLVII, WILLISII, ac FERNELII auctoritatem, partim per remedia & curam demonstrari, tradit: HARRIS pariter in *Diff. Med. Chirurg.* eandem fovet sententiam: Atque FRANC. BAYLE *Instit. Phys.* alienum, ait, non est, asserere, in febribus potissimum in primis viis quandoque materiam cumulari.

M

Hoc

Hoc supposito lerna malorum & diversa propullulant symptomata , pro activitate causæ materialis , quæ vel acris est, vel bilis sui juris facta, qualitate & motu peccans, vel indigesta viscidaque existit, quæque robore naturæ, ope variorum motuum ac digestionum depurata , tandem ad peripheriam corporis, præter alias vias consuetas, delata, excernitur, sic ut quovis paroxysmo parte aliqua excreta , tandem cum materiæ illius quantitate imminuta, symptomata quoque remittant , motus in systemate vasculoſo & nervoso imminuantur , & niſi totalis intermissio , nihilominus tamen remissio inde sequatur , quo ipſo ægri viribus novo paroxysmi accessu parumper restauratis, intra certos dies , vel plenarie vel ex parte evacuaciones materiæ illius febrilis evenire queant.

LANGRISH'S Modern Theory and Practice of Physik T. IV. Ad. Edenburg. tradit, crassamentum sanguinis in intermittentibus non tam tenax & viscidum, nec serum adeo biliosum , falsum, & acre existere, ac in acutis continuis febribus, & rubicundos globulos copiosiores ac cruorem tenaciorem & spissiorem

in quotidianis , quam in tertianis , & in tertianis
magis quam in quartanis esse.

Nemo interim tuto sedem causarum in se , &
unde illæ oriantur, determinare poterit. Ii, qui ma-
jorem materiæ febrilis acredinem in quotidianis &
tertianis febribus ea ratione supponunt, quod citius
reproducantur paroxysmi, cum tardius quartanæ pa-
roxysmi, ob visciditatem majorem, redeant, hoc ipsum
ideo non tanta cum fiducia statuere possunt, quo-
niam talis acredo in benignis tertianis , in subjectis
cæteroquin sanis, non semper existit, interdum quo-
que illa abest visciditas , uti epidemiæ testantur fe-
bres , quæ homines omnium ætatum & tempera-
mentorum corripiunt. Non semper autem tempore
vernali & æstivo quotidianæ & tertianæ invadere so-
lent homines : Quamquam verno & æstivo tempore
curatio facilius procedere queat , id tamen eodem
annotandum est tempore, apta medicamenta , & cir-
cumspectam medendi methodum maximum afferre
momentum.

PECHLINUS *L. 2. observ. 20.* Quod si moram, inquit, trahant tertianæ, qui autumnalium sæpe mos est, hoc sæpe cum iis conjunctum est periculi, ut tædio morbi lentioris, ægroti in diæta delinquant, vivendique ordine morbi ~~anatomic~~ infament: Itaque in alium plerumque & deteriorem morbum mutatur, qui tandem etiam oppressis naturæ viribus, vitæ finem imponit. Quartanas autem hibernas nihilominus facile in morbos acutos transire HIPPOCRA-TES *Coac.* Et JOH. WIER. *observ. rar. L. I. Amstelod. 12.* Quartanam interdum senes necare, ob-servarunt. Atque CAMPANELLA *medicinal. L. II. c. 7. ad. 4.* Quartana, ait, intermittens habetur pro tutissima febrium, quamvis longissima, con-tingit tamen plerumque ob tot febriles circuitus, habitus hecticus.

Infantes post febres autumnales tum continuas, tum intermittentes, hectici aliquando fiunt. Ven-tres eorum inflati tumentes, ac duri evadunt; Sæpe etiam tussis, aliaque tabidorum symptomata subna-scuntur, quæ rachitidem plane mentiuntur. SY-DEN-

DENHAM *de febribus intermittentibus.* PETR. FORESTI *L. 3. de intermittentibus hædiciis.* Cum lien scirrum ob hanc febrem incurrat aut cancrosum dispositionem, lethalis est, & sæpe affert Hydropem: GALENUS *in 1. Epid. sed. 1.* Longam quartanam lie nosis valde incommodam, pluresque ipsorum exinde factos Hydropicos, & mortuos se vidisse.

Statarum jam periodorum causæ in febribus æque ac aliis morbis vix tuto determinari poterunt, quamquam forsitan inter alia consuetudini vel fluidi nervi determinato ac specifico motui sæpius recurrenti, adscribi queat, itaque quamdiu causæ non rite determinari poterunt, tamdiu notissimus ille dissensus circa remedia adhuc permanebit. Febres omnis ætatis, sexus, & habitus corporis homines corripere, quotidiana docet experientia: Febres autem intermitentes ordinario funestæ non nisi iis fiunt in casibus, in quibus per longum temporis spatium varii motus massam sanguinis, redeuntibus insultibus, alterarunt, sic ut vapidò humorum accedente statu, tumores producantur, vel ob depravatam quoque diætam, vel perversam medendi methodum.

Sudores, Cacochymiæ species, Icterus, Tabes, Phthisis, Hectica, & Hydrops, etiam Scabies facilius quartanam, quam tertianam & quotidianam, in primis ob diuturnitatem mali insequuntur, hæc vero quoque à quartana & quotidiana eo producuntur in casu, quo perversa instituta fuit curatio, in primis si teneriora sint subiecta. *ILL. LANCISIUS, de noxiis paludum effluviis:* Febres tertianas perniciosas recent set, semper in principio typum intermittentium servantes, quinta plerumque die in continuam veras, septima, nona vel raro undecima, cum gravi sopore, sudore algido, urinis tenuibus, parotidibus, in mortem terminatas, priusquam oportuna inventa fuisset medendi ratio.

Denique remedium heroicum ex spiritu vini, urina & pulvere pyrio constans in ipso febris tertianæ frigore assumtum, febrim inflammatoriam lethalem produxit Schuzer in *Ad. Acad. Scient. Suec. T. IX.* tradit. Febrem intermittentem veram subito in affetum soporosum & ipsam apoplexiam mortiferam termi-

terminatam fuisse, observationes produnt. Huc pa-
riter spectat sopor profundus, quem Sylvius inter
symptomata febris epidemiæ intermittentis Lugdu-
nensis *Prax. Med. Append.* 10. impense periculosæ,
enumerat. In senibus facile hæc fieri possunt à caco-
chymia biliosa, serosa, nec non à partibus corruptioni
putredinosæ obnoxiiis; Accedere possunt solidarum
partium debilitas, consuetarum excretionum sanguini-
nearum defectus, vitæ genus inordinatum, perversa
ulcerum & scabiei sanatio, & similia.

Exempla solutæ quartanæ triennalis per excre-
tionem calculatorum in viro; Porro per morbos
convulsivos: Per variolas erumpentes: Per ma-
trimonium: Denique per aëris mutationem, HIP-
POCRATES, *Eph. N. C. FRID. HOFMANNUS*,
aliique tradiderunt Medici. Hæmorrhoidum qui-
dem fluxus & diarrhœa sæpe quartanæ curationem
juvant, sed si absque levamine accedant, vel fluxus
hepatici indolem servent, frequenter ad febres len-
tas disponunt: Nonnunquam scabies vel purpura

scor.

corbutica solvunt quartanam, uti infra exemplo docebimus.

Febres intermittentes quosdam sub cura aquarum mineralium corripuisse observavimus; Interdum igitur diætæ, vel digestionis vitia, frequenter vero prava constitutio aëris frigidi & humidi, infectorum copia referti, individualis porro subiectorum dispositio, aliaque hic in causa esse queunt: Adeoque aquæ minerales non statim inculpandæ sunt. Pathemata pariter animi, variæ anni tempestates, nec non aëris mutationes repentinæ ex frigido in humidum & viceversa, & ex præcedente ^{conversa} insolita diurna calida & sicca aëris intemperie, unde epidemica oritur grassatio, in systmate vasculoſo & nervoso æque ac in sanguinis humorumque massa anomaloſ motus & intemperiem, pro diversitate causæ materialis differentem producere solent, quippe frequentissime febris intermittens post immīnutam cuticularem excretionem accedit, & nulla facile recidiva, quam hoc facto repetit. Scilicet eadem materia ad hepar, ad pancreas, præterea ventriculi & intestinorum glandulas defertur.

Imo

Imo è rebus præternaturalibus , morbi prægressi, qui ex corruptione sanguinis itemque lymphæ ortum duxerunt, hisce favent febribus, chronicis autem si ejusmodi evadant morbi, rebelles nimirum febres, à blanda sua temperie deflectere faciunt massam sanguinis & humorum , inde & in externis talis status præternaturalis conspicitur , coloris scil. naturalis immutatio in lividum ; Oedemata pariter in extremitibus inferioribus anguem in herba latentem innuunt.

Quemadmodum & ex altera parte mala ex tali statu præternaturali eruuntur signa , quando nec latertium illud in tertianis apparet sedimentum , sed semper spiritus nitri ad instar tintæ urina toto morbi apparet decursu . Quamquam hic ipse color præter sedimentum non semper malum importet , cum & per alias vias se se exoneret , & causa febrium diversa plane existere soleat . In cura jam attendendum , an maligni quid adsit , quod deprehenditur , cum æger apyrexias die extra lectum esse nequit , cum pejora & ferociora ordinariis , symptomata , ac

vires non dejectæ sunt : Tali in casu aliarum ad instar malignarum tractantur, & de quibus HIPPOCRATIS prognosticon, dum febres intermittentes periculo vacare pronunciat, non est intelligendum.

Therapiam quod concernit, constat eam ab iis, qui ex sanguinis textura morbificam febrium causam ulterioris eliminare, copiam illius imminuere, & characterem immutare volunt, per deobstruentia, calorem competentia, & purgantia ceu optima adornari remedias: Interim quod purgantia concernit, ea magna cum circumspectione usurpanda sunt, quidam impune eadem ferunt, in primis in principio, plures vero non item, quippe materia illa febrilis non omni tempore tam facile per crassam talem excretionem exturbari potest, potius cum subtiliores frequenter sint partes jam in sanguine contentæ, per convenientes vias excerni debent, hinc ex tali remedio facile febrium oriuntur recidivæ. In quotidianis tamen fortiorum cataracticorum usum præscribit TAUVRY *Nouvelle prædique des maladies aigues*, de quo luculenta prostant exempla T. II. p. 416. & 426. Interim præstat mitiora purgantia seligere, & raro vomitorium exhibe-

re: Blanda pariter saponacea, amaricantia, imo confortantia, dum motus febriles excitant & crisin ad juvant, non raro conducunt.

Per diversas vero observationes in ægris, intermittentibus præcipue tertianis & quartanis laborantibus, institutas, edocti sumus, modicam Rhabarbari portionem cortici peruviano remixtam, aliquoties per diem alvum laxando, utilem fuisse. Hæc quoque methodus fuit *C. D. MEAD.* qui in *Monit. Medico-Practic. Cap. de intermittentibus febribus.* Longa, inquit, me docuit experientia, necesse plane esse, exiguam portionem rhabarbari cortici peruviano admiscere: Ea scil. ratione, ut alvus bis saltem quotidie dejiciat, neque unquam virtutem illius hoc modo fractam, sed feliciter potius auctam fuisse, animadverti. Licet enim ea, quæ valentius irritant sanguinem, & humores perturbando, irrita reddunt omnia, moderata tamen purgatione id consequitur, ut ingesta quæcunque sive medicamenta sive cibos, facilius concoquat ventriculus; Et ex his quod tenue & corpori est utile, in venas emittat. Cum jam drachma una vel altera

rhabarbari assumta fuerit , ab exinanitione defistere soleo , & celebris hujus antidoti usui per se insistere: Observavi etiam, quod , depulso hac medendi ratione morbo , iterati in eundem lapsus minor semper fit metus.

Hæ quoque methodo usus est Helvetius , qui eandem Medicis commendat , *Traité des maladies plus fréquentes.* Cl. BURGGRAVIUS Comment. de aëre aquis & locis Francofurtensibus , Salia neutra , eminenter Sal polycrestum ex nitro & sulphure paratum , antimonio Diaphoretico , & Rhabarbaro adjuta vel pro re nata Jpecacuanha directa , languores febriles aut febres jam formatas certo excutere posse deprædicat , febres scil. intermittentes à cruditatibus. Salia neutra , v. gr. arcanum duplicatum , tartarus vitriolatus , tartarus tartarisatus , Sal polycrestum , Sal Ebsoniense &c. omnino aperta servant omnis generis emunctoria , obstruktiones reserant , tenacem viscidam humorum massam colliquant ; In febribus vero tertianis continuis majori in dosi exhibita in magnam perniciem ægros , ob metum inflammatis ventriculi , adduxisse , monet FRID. HOFFMANN

MANN *Diss. de recto usu corticis in febribus.* Cl. Medici in *Actis Berolinensibus Vol. II.* pro inutili declarant correctionem corticis per additionem salium digestivorum, incidentium, & purgantium, imo & chinam per menstrua alcalica, Nitri fixi, Θορι, cinerum clavelatorum, vel si cum Spiritu Vini in Essentiam vel Extractum redigatur.

Alii quoque Jalappam, vel pulverem Cornachini, vel pil. aperientes, Sal. Sedlic. aquas minerales purgantes, exhibent, distinguenda autem sunt subiecta, tempora, febris genius, & aliæ circumstantiæ individuales, antequam talia exhibeantur. MAYERNIUS in *Praxi sua* aurum fulminans ad grana 3. vel 4. cum theriaca, mithridatio aut diascordio commistum, in febribus intermittentibus paulo ante paroxysmum, in continuis instantे crisi exhibere jubet. In tractatu, cui titulus : *La maniere de se servir du Kin Kina p. 5.* legimus, quod incolæ Regni Peruviani durante usu corticis nunquam purgans assumant, statuentes causam febris sensim sensimque consumi, usum tamen febri jam profligata aliquandiu continuandum esse. Monet pariter Cl. MART. WARREN *Ad. Eruditor. A. 1729.*

quod data febris remissione , imo etiam urgente febre , ubi diutius inhæserit , nec integra aliqua intervenierit crisis , potio cathartica alternis diebus ad duas vel tres vices cum haustu paregorico repetenda , præbeatur ; Hac scil. sola methodo res ægri magis magisque in tuto collocabitur , aut saltem Medico ansa concedetur , ut opportunius & certius corticis usus morbum feriat , & confodiat . Imo ipsi cortici Rhabarbarum admiscet auctor , crebra experientia edoctus , eo certius & efficacius hac ratione expugnatum iri febrim .

Si coctio non debite exspectetur & nec vergentis naturæ indicationes , nec orgasmi rite judicentur , tunc purgans soporem , in plurimis aut duplicatam febrim aut continuam , aut lentam , aut prava symptomata producere præter alias Pechlinus observavit : Imo iis , qui nauseam habuerunt , lassitudinem , cephalalgiam , aut dorsi dolores induxisse , plures vero febre epidemia minus secura correptos fuisse . Præsentia jam biliosorum viscidorum humorum , stagnatio in primis viis , errores diætæ prægressi , ex. gr.

ex. gr. ex nimia fructuum. horræorum ingluvie, os amaricans, nausea, sputum copiosum circa vel post paroxysmi tempus, nec tamen insequens vomitus, & præcordiorum dolor, indicare quidem videntur emetica, neque tamen adeo facilis in præscriptione horum Medicus esse debet, exhiberi vero lene potest emeticum, interim annotandum est, quod summus calor & frigus excessivum huic non ita faveant evacuationi.

Addunt quidam, quod, cum in intermittentibus Epidemicis alios vomitus sublevaverit, eo ipso exhibendum sit vomitorium: Sed propter subjectorum diversitatem universale hoc non est, inter secundum vero tertiumve paroxysmum exhibendum esse vomitorium suadent, alii serius, cum aliquandiu duraverit febris; Hic autem symptomata & signorum diverorum præsentia vel absentia determinabunt tempus & dosin. HIPPOCR. *L. de Morbis C. 14.* Quum febris, ait, quartana detinet, siquidem ex alio morbo non purgatum ceperit, medicamentum deorsum purgans propinato, dein caput repurgato, postea medicamentum deorsum (iterum) dato. In robustis & bene

bene valentibus vomitorio opus est. Quum febris tertiana detinuerit, siquidem impurgatus esse tibi videatur, quarto die medicamentum purgans exhibeto, at si medicamento opus esse tibi non videatur, in potu, ea medicamenta danda sunt, quibus febris aut transferatur, aut desinat. Hippocrates quoque octavo die in febri tertiana, id est fortissimo morbi die purgationem præscripsit. Methodus Timæana febrim quartanam per purgantia 5. vel 6. horis ante paroxysmum propinanda, curandi, in *Ad. Phys. Med. N. C. D. 2.* confirmatur,

Nos non nisi urgentibus ex causis, atque eo potissimum in casu, ubi nausea & vomitus spontaneus à ructibus nidorosis, acidis, amaror oris, tensio & pondus ad scrobiculum cordis, adfuerunt, si que nullum fuerit contra indicans, vomitorium præscripsimus, in junioribus 3β vel grana xv. rad. hypcacoanhæ, & nitri gr. v. pro dosi, in adultis scrupulum rad. hypcacoanhæ vel gr. xxv. cum gr. viij. vel viij. nitri, & quidem, vel die apyrexias, vel 4. aut 5. horas ante paroxysmum, in quibusdam vero ægris quartana laborantibus sub initium paroxysmi & quidem

dām feliciori cum successu ac antedicto tempore:
Etenim HIPPOCR. *sed. I. apb. 22.* cocta, ait, non
cruda movenda & medicanda esse; BELLINUS pari-
ter cum hoc consentit, statuens, per vehementem
succussionem omnium partium in vomitu, materiam
morbificam melius separari, & impetum ad minimum
abbreviari. ALEX. THOMSON *A&E. Edenburg. Tom. 10.*
hæc methodus, inquit, vomitoria exhibendi satis na-
turalis & rationalis esse videtur, per 20. annos bono
cum successu in principio intermittentum vomitoria
exhibui, reipsa enim appareat, quod nulla incitatio per
vomitorium satis efficax sit morbum eradicandi,
quamdiu adhuc materia morbi extra febrim cum reli-
quis succis intime commixta est, sæpius inveni uni-
cum vomitorium hoc modo exhibitum integrum
morbum sustulisse, aut alia adhuc dosi ita sopitum
fuisse, ut vix sensibilis fuerit.

Febres mesentericas non testaceorum, antacido-
rum, diluentium, oleosorum usū vulgari, sed fomen-
tis, balneationibus demum educata cacochylia omni-
sero lactis cichoreato vel destillato aliquo ex succis

O

aperi-

aperientibus, curari magis debere docuit **C. BAGLIVUS** *Prax. Med.* Legi merentur, ea quæ de catharticos usū & abusū in febribus monuit **C. COHAUSEN** in *Archæo febrium fabro. C. V.* Inter remedia interna usualia sunt lenia sudorifera, acidulata, stomachica, visceralia, martialia, absorbentia, nitrosa, salia fixa alcalia; conf. *Dilucidationes nostræ Principiorum Chemicorum.*

Laudant quoque alii cinabarina, & viperina. Quod priora concernit, magis in primis viis aliquam exercere poterunt activitatem, interim strenuum in infantibus usum noxiū esse, observationibus demonstravit KOZAMERO in *Dissert. de variolis*; Viperina quod attinet, ea hisce in casibus haetenus nunquam usurpavimus, virtutem vero illorum tradit **Cel. B. EL. CAMEARIUS** *Epiſtol. Taur.* Laudat quoque **C. MARTINUS WARREN** *Ad. Erudit. A. 1727.* sequens vinum viperinum: Rec. Viperas foemellas, N. x. limat. Mart. unc. 2. succ. 2. pom. aurant. Nuc. Mosch. Cinam. ana drachm. 1 Semis. Vini. Hispanici. Lib. x. Digere in balneo arenæ per 12. dies, & filtratū

trati liquoris unciae duæ bis terve in die capiantur. Interdum in febricitantibus sudores vel aliæ depurationes salutares non debilitantes observantur. Hisce in casibus ad diaphoresin respiciendum, adeoque juxta monitum *Cl. HUXHAM traité des maladies les plus fréquentes*, rad. serpentariæ virginianæ, cum cortice peruviano conjungenda. Certis quibusdam febribus ieterus accedit, interdum vero intumescentia totius corporis, admisceri igitur potest cortici crocus martis aperitivus. De usu autem corticis à febre ad ieterum egit *Cel. B. ALEX. CAMERARIUS in peculiari Dissertatione.*

Cortex peruvianus encomiis ab his exornatur, vituperatur ab aliis, idque hanc potissimum ob rationem, quod circa causas febrium, & consequenter circa modum eas corrigendi adhuc insigniter Medici inter se dissentiant, unde remedium hoc tot quotidie imputationibus ob ineptam multorum applicationem expositum, nihilominus laudabili effectu, & genuino applicandi methodo se commendat, licet agendi modus plenarie indicari nequeat, num sanguinis laudabilem constitutionem,

ne materiam febrilem dimitat, confortet, & conservet, tubulos ac poros subcutaneos relaxatos justa constrictione in pristinum reducat statum. Religiosam quandam ab usu corticis à febre quidem liberatam fuisse, sed in tantam diabetis vim incidisse, ut quovis die 40. libras excreverit, JOH. B. SCARAMMUZZI in *Theorem. familiar.* tradit. HARVEUS *Dissert. de varietat. Medic.* statuit Chinam de China exhibitam vires potissimas cominus exserere, scil. in ventriculum, intestina tenuia, pancreas, & proxime adjacentes mesenterii glandulas.

Corticem Peruvianum vegetum, recentem, non admodum crassum à ramulis derasum, facile terendum, saporeque aromatico, amaro, & colore cinnamomi præditum, eligendum esse, Medici non sine ratione censem. Principium corticis adstrictivum patescit ex sapore linguam constringente; solutio quoque corticis, adjecto vitriolo, more omnium adstringentium, nigrescit, & atramenti colorem induit; Principium amarum naturæ est aperientis, balsamicum vero odore & sapore non tam pulveris, quam potius ex pro-

* *

prolecta, destillationis ope, aqua, nec non spiritus
vini, manifestatur. Denique terrestre principium fixum
peracta solutione & extractione conspicuum, ad cor-
rigendam, obtundendam, & involvendam materiæ
febrilis præsertim biliosæ acrimoniam. Agit igitur
simplex hoc tota substantia, & plura continet princi-
pia ad febres sanandas proficua. Quare vehementer
errant ii, qui à sola facultate adstringente febri fugum
corticis effectum derivare satagunt ; FRID. HOFF-
MANN. *Dissert. de cort. gen. usu.*

In febribus intermittentibus , antequam primæ
expurgatae sint viæ , & viscera deobstructa , à cor-
tice peruviano abstinendum esse , nec non à præ-
cipitantibus & adstringentibus , varii præcipiunt Me-
dici : Interim cum fere nunquam plenarie remotæ
sint obstructiones , hinc remedium laudabile in se
hos, vix exhiberi posset, dantur vero casus, ubi laxantia
potissimum in principio bona sunt, uti supra indicavi-
mus, nec omnes obstructiones respuunt hunc corti-
cem & præcipitantia : Interim corticem eo tempore ni-
hilominus optimos edere effectus statuimus, quo ne-

gotium se- & excretionum viget cum alvi libertate. In tertianis intermittentibus apyrexias tempore drachmas duas, vel duas cum dimidia, vel tres, non semel cum fructu præscriptas fuisse observavimus; Quodsi vero major alvi adsit laxitas, cum vel vomitus instet, sedanda prius, quippe ingressum in vasa lactea impediunt. Eo autem tempore, quo post 2. vel 3. paroxysmos sua sponte febris cessat, cortice vix opus est, visceralia, balsamica, stomachica tunc omnem absolvere possunt paginam. Adjungi tamen poterit pro circumstantiarum ratione parca corticis dosis, ad reliquias febris debellandas. In febribus duplicatis proprie cortice opus non est, eo faltem tempore, quo ex dupli conversio fit in simplicem. Contra vero *Ill. Dn. van SWIETEN Coment. Aph. Bærh. T. II.* & *Cl. D. BERGIUS Ad. Suec. 1755.* Febres, quas particulares vocant, solo curatatas fuisse cortice, tradunt.

In quartana absorbentes & præcipitantes pulvres ideo caute usurpari debent, quod acidum primarum viarum cum terreis concrescens, Ipaulo adstrictioris fiat indolis, & sic obstructiones producat;

HOF-

HOFFMANN *in cit. Dissert.* Sæpe numero succedit, exhibita China chinæ febrem non tolli, licet pluries repetatur. Id autem evenire nostris temporibus magis quam elapsis non alia de causa pendet, quam quia hic cortex non colligitur ab arbore, uti ante fiebat. Colligi enim debet tantum modo sole exsistente in leone & ab arboribus, quæ meridiem versus positæ sunt, uti mihi sancte narravit Romæ quidam Pater Dominicanus Americanus, qui recens America venerat Romam. Quodsi indiscriminatim colligatur, quolibet mense, & à quibuscunque arboribus, vim febrifugam nunquam habebit, ut idem pro infallibili mihi retulit apud Indos Americanos experientia: BAGLIVI *Prax. Med.* Addunt alii talem corticem subtilissime pulverisatum, colorem fuscum referentem, & omni humiditate carentem, demum esse optimum.

Quodsi jam supposita relationis hujus veritate talis cortex semper haberi posset, magis hic intermittentes curari possent, quam actu fit. WILLSIUS corticem Peruvianum in temperie calidiori in aqua de-

destillata aut sero lactis propinare suadet. In quartanis quoad maximam partem in glandulis abdominis & visceribus vitium latere observatur ; Deobstruentia jam & tonica stomachica , imo cæteris paribus emetica leniora , nonnunquam purgantia , Methodo supra indicata , convenient , hinc & ex hoc fundamento autumnales febres rebelles sunt ob visciditatem massæ sanguinis & humorum , in primis vero ob decrescentem perspirationem insensibilem , cortex igitur peruvianus larga dosi exhibitus sine effectu quoad maximum partem ægris tali tempore præscribitur , vera autem deprehendimus ea , quæ inter alios CEL. FRID. HOFFMANNUS annotavit , parcum nimirum corticis peruviani dosin in his conducere.

Non raro jam per flor. sal. amoniac. & Chamomill. Sal. Absinth. croc. mart. aperitiv. & per parcum dosin corticis peruviani , vel chaquer. tempore apyrexias ʒj. vel ʒjß. additis roob sambuc. syrup. acetos. cit. & contrajerv. in forma electuarii , & pro re nata per extractum chaquerill. centaur. minor. card. benedic. gum. ammon. galban. in pilulis , nec non per pilulas

de

de ammoniaco officinales attemperata dosi pro ægri
individualibus circumstantiis, omisso interdum per ali-
quot dies vel septimanas in rebellibus quartanis cortice,
substituto contra infuso saturato ex HB. cent. min.
card. bened. absynth. & pro re nata rad. scorzon. ci-
chor. chin. magis felicem obtinuimus effectum; Quam-
quam quosdam ægros, quartana ab æquinoctio autum-
nali usque ad vernale cum vel sine interruptione, irri-
tis etiam ante dictis remediis, affectos fuisse observa-
verimus: Hisce postmodum balneum sæpius reiteran-
dum suasimus, sicque erumpentibus exanthematibus
rubris purpuraceis hasce debellavimus febres.

Quosdam Medicos per nimium & intempesti-
vum corticis usum in primis in quartanis autum-
nali & hiemali tempore grassantibus inflationes ven-
triculi, dolorificas tensiones, tumores pedum, immi-
nationem appetitus, & oppressiones pectoris sub
quovis paroxysmo graviores produxisse, non sine tæ-
dio observavimus. Insolitum quoque tremorem
totius corporis in diversis subjectis post ineptam fe-
bris debellationem WILLINSON in *Ad. Edenburg.*

Tom. 10. refert. Cel. BOERHAVE à suppressione intempestiva febrium autumnalium & intermittentium & impedita coctione materiæ febrilis per incongruum corticis usum, obstruktiones insuperabiles hepatis observavit, si febris rite tractata fuisset, removere potuisset optime.

De usu pariter corticis in autumnalibus intermittentibus Act. Vratislav. A. 1717. Mens. Nov. Hoc autumno, tradunt, cortex frequenter interdum in pul. vere vel Electuario vel in potiunculis &c. usurpatus fuit, sed quonam cum effectu? Certe satis infelici, deprehendimus enim, quod tales febricitantes plus quam una vice, licet inordinate, affecti fuerint, partim quod illæ febres in obscure vel aperte lentescentes transierint: In aliis porro diuturni torpores, dejectio animi, & virium, pallores, phlogoses &c. in aliis continuæ inappetentiæ, nauseæ, pressiones præcordiales, alvi perturbationes, in aliis pressiones, imo durities in dextro latere, ut plurimum tumores pedum, & totius interdum corporis, ataxias mensium, hydropis species prodierint. Conferri quoque debent monira

SY-

SYDENHAMI cap. de febribus intermittentibus , & Cel.
BUCHNERI Commentatio in Ad. Acad. Nat. curios. de
infensissimo dolore Ischiadico , febrem quartanam immodico
corticis usu suppressam , excipiente.

LISTERUS, BOHNIUS, DEKERUS, BERGERUS,
d'ACQUIN, MORTONUS, BURGGRAVIUS, TRIL-
LERUS, ALBERTINUS, præter alios autores corticem
peruvianum valde laudant. JOH. COLBATCH *In Phy-
sico. Medical Essay, concerning - alkali and acid. &c.*
Duabus, ait, detur ante paroxysmum horis ægro
Emeticum, ejusque operatione finita, opiatum, pa-
roxysmo autem cessante, quantitas nucis moschatæ
de Electuario , quod ex cortice febrifugo & syrupo
limoniorum paratum, cum parte sextarii (pint) de-
cocti corticis Chinæ , rad. gentian. & HB. cent \ominus :
min. eademque remedia quaternis semper horis re-
petantur spatio 5. vel 6. dierum; ita tamen ut æger
elapsa hora post singulas doses , assumat parum cibi
digestionis facilis , 6. diebus elapsis mane tantum &
post meridiem hora quinta idem assumat electuarium,
& decoctum eodem modo per hebdomadem inte-

gram, hac methodo, si assumantur corticis 3*ij.* vel 3*iv.* quartana sine recidiva curatur, frustra vel libra i. adhibita juxta morem vulgarem. Denique febres per topica curari posse & corticem peruvianum ab extra admotum eundem præstare effectum statuit KENNEDY in *Tentamine circa remedia externa.* Plura vero experimenta ad confirmanda hæc requiri, censemus.

Nec semper & omni tempore cortex hic unicum hoc nostrum præsidium ad perspirationem, ad roborandum, & ad sanguinis circulum augendum, sed utique opus est, ut corpus sit dispositum, viæ & excretiorum tubuli patuli & spasmo non constricti, humores tenues & fluxiles, non crassi, viscidi & immobiles, ipsius quoque remedii virtus integra, nec à vitiosis primarum viarum succis obtusa aut enervata. FRID. HOFFMANN. *Dissert. de genuin. cort. usu.* Jam cum optima remedia relationem habeant, hinc relative solum cortex hic bonus dici potest. Num autem Sal Essentiale quod ex cortice peruviano Cel. GAURAYE feliciter evocavit, & cuius præparatio-

nem in **Chemia sua Hydraulica communicavit**, adhuc feliores exferere queat effectus ipso pulvere, experientia optima semper rerum magistra aliquando edocere poterit.

Sæpe numero in intermittentibus febribus, in primis in certa quadam grassatione tertianæ intermittentis æstivo tempore quam plurimos ægros sine ullo cortice, aliis vero convenientibus remediis curavimus. Febrim pariter tertianam intermittentem ab autumno A. 1743. usque ad æstatem 1744. in exercitu Gallico prope Rhenum grassantem, quoad maximam partem sine cortice peruviano curatam fuisse de ARELL tradit, *Act. Acad. Suec. T. 9. Cl.* pariter NENTERUS *Pathol. Med. S. 2.* affirmat, plusquam 200. febricitantes sine omni cortice pristinæ sanitati restitutos fuisse. Novum jam post corticem peruvianum remedium in Gallia olim inventum maxima parte ex \ominus alcali constans, annunciatum fuit in tractatu cui titulus: *La querison assurée des fievres tierces, doubles, quartes, en quatre, par le Remede Provençal en Tablettes, que le sieur B. Alary maître*

Apoticaire de la Ville de Grasse en Provence fait & distribuë par Privilege du Roi a Paris A. 1685. in 12.
 Hoc quippe remedium hanc prærogativam præ cortice habuit, quod partim per alvum, partim per vomitum, vel per utrumque, partim per urinam, sputum, & transpirationem evacuationes produxerit. Incipiente jam paroxysmo in tertiana bis saltem, in quartana vero quater & vel quinquies Scrupulus bono cum successu propinatus fuit; Neque tamen hi felices successus usum corticis imminuere potuerunt.

Pilulas ex tela aranearum cum theriaca compositas brevi tempore ante quartanæ paroxysmum aliquoties repetitas post irritum corticis usum, salutarem præstitisse effectum, ex observationibus quorundam Medicorum certiores facti sumus. Solum vero arsenicum vel opium ad rebelles ejusmodi febres debellandas pessime præscribi, statuimus. RIDLINUS *in curis Medicis obs. 69.* monet, quod non omnis quartana longa & curatu difficilis sit, id quod confirmatur, dum mercator aliquis 50. annorum à potiunculæ sudoriferæ & pulverum febrifugorum sale armoniaco

auto-

auctorum usū loco tertii paroxysmi totus sudore perfusus, perfecte convaluerit; HARRIS in *Dissert. Med.* In curandis, ait, intermittentibus singulis aut alternis corticis peruviani dosibus 3. vel 4. guttas olei sulphuris per campanam, aut aliquot drachmas succi limoniorum cum tantillo laudani liquidī immisceri debere pro viris, pro tenerioribus vero & præsertim fœminis infusionem frigidam corticis sufficere.

MUYIS in *Dissert. de usu præclaro ΘΧ. in febribus intermittentibus*, ait, inter 28. ægros febribus tertianis & quotidianis detentos, vix 4. fuisse, qui medicamento hoc usi, sanitati non fuerint redditi, quem sinistrum curæ eventum gravioribus ab ægro commis- sis erroribus in victu, vel dosibus iterandis, sed neglectis adscribit, & tantum abest, ut ullam aliquam noxam ex ejus usu ortam viderit, ut potius absque ullo alterius remedii subsidio appetitum excitatum, cibos bene digestos, faciei colorem, & vires ex i restitutas deprehenderit, additque in his febribus ΘΧ. cortici præstare, quod ab ejus usu recidivæ omnino rarissimæ fiant, quodque febres hæ interdum



unica & passim binis salis dosibus curentur, in quartanis vero non sat efficax deprehendatur, sub qua dosi autor dederit, sequens tabula docet:

Salis Ammoniaci dosis.

In aetate adul-	Minima.	Maxima.
ta.	3j.	3j. 9ij. vel 3ij.
XV. Añ. vel XVI.	3j.	3jβ. :
XI. Añ. vel XII.	3j.	3j. 9j.
VIII. Añ.	3j.	3j. 9β.
III. Añ.	9ij.	9ijβ.
I. Añ. vel	9β.	gr. XIV.

paulo grandiori.

Ci. Viri RENE AUME & HOMBERGIUS Gallas in febribus intermittentibus utiles fuisse de prædicant, quas *Ci.* LEMERY & GEOFFROY pro suspectis habent, *Memoires de l' Academie Royale de sciences de Paris*, 1709. Alii pulverem Berolinensem, Sal febrifugum Sylvii, RIVERII specificum antifebrile, alii Radicem Gentian: rubr: Ar: squill: pimpinell: alb: hirundinar: Guīni: heder: sagapen: HB. Marrub. alb: fumar: vel semen. coriandri. cum vino infusum aut semen hyperici; Alii fuliginem splendentem, alii denique ♀. dulcem laudibus extollunt: Plura, quæ pro specificis vendi-

vinditantur, inveniuntur in *Epb. Nat. Cur. Dec. II.*
Cl. MOERING in *Commerc. Lit. Noric.* observationem
eredit, de corticis castaneæ equinæ, & aurantiorum
vi febrifuga. Denique *Cel. BOERHAVE L. de*
Mat. Med. §. 761. antipyreticon habet, quod in inter-
mittentibus febribus raro fallens vocat.

Feliciores vero exseruit effectus semen pasti-
nacæ sativæ latifoliæ, cuius methodum præparandi
& dosin, una cum reliquis cautelis *Cl. GARNIER*, Acad. Reg. Lugd. Membrum sequentem in
modum communicavit: Recipe Granorum Pastinacæ
contusorum drachmas tres, infundantur in vini ve-
teris albi bullientis unciis tribus, post diminutionem
tertiæ partis fortiter exprimantur ac colentur, quibus
parca fecis vini dosis admisceatur. Hoc autem reme-
dium 4. vel 5. horas ante febris accessum propinetur,
eodemque tempore æger in lecto bene tectus decum-
bat, ne sudorem, interdum accedentem, impedit;
Tandem post tres horas jusculum carnis assumat, ab-
stinendo interim ab omni solido cibo usque ad finem

paroxysmi. Hæc jam potiuncula calide semper assumi debet, tum demum vero suam amittit virtutem, quum diu asservatur, vel post refrigerationem iterum calefit, unica dosis sæpius sufficit, ut plurimum tamen duæ vel tres doses, quovis paroxysmo 4. ante accessum horas propinatæ, febrim tollunt. **C. GARNIER** semen pastinacæ sativæ latifoliæ. C. B. pin. 125. usurpavit; In defectu vero hujus semen pastinacæ silvestris latifoliæ C. B. pin. 135. inservire potest. Aliud Academiæ hujus membrum à radice pastinacæ eosdem obtinuit effectus. Hoc remedium **C. GARNIER** 40. ægris optimo cum successu propinavit, inter quos quatuor solum venæ sectione & purgatione, ob circumstantias quasdam individuales, opus habuerunt. Febris autem quotidiana ante usum hujus seminis prævia generalia poscit remedia.

Febris semitertianæ curam quod attinet, ea caute adornanda est, quippe cortex Peruvianus non statim exhiberi debet, ne præsente jani obstructione in viscerum canalibus magis adhuc inflammatio augeatur, aut fomes pro febri hectica relinquatur. Laxantia lenissima per vices cum manna, Sale cathartico Anglo,

Anglico, & similibus conducunt: Interdum Rhabarbarum, fol. Sennæ, potus ex succo limoniorum cum Sale absynthii & rel: vel aqua cinnamomi minus spirituosa propinari possunt.

Soli denique & aëris mutationem ad tollendas febres quid facere, non negamus, hoc tamen pensandum proponimus, quod talis mutatio plerumque contingat, cum diu jam duravit morbus', & ad declinationem vergit, cum multa jam sunt prægressa medicamenta, an tum soli mutationi convalescentia adscribenda erit? novi, ubi juvit, non tam soli aërisve mutatio, quam remotio ab istis, quæ iræ, mœroris, aliorumque animi pathematum erant objecta. In paroxysmo ab omni potu abstinere quidam suadent, at nos id saltet monemus, ne durante rigore & horrore, & prima vel secunda paroxysmi fervidi hora bibant, facile vero postea non solum cochleatim mixturas, sed & largiores potus ordinarii haustus concedimus.

Interdum etiam aquæ Selteranæ, vel pro re nata acidulæ Theinacenses, vel aliæ aquæ minerales

propinari queunt. Acidulas, quæ de vitriolo martis participant, non solum pro potu in febribus intermittentibus, sed & per modum balnei in febribus proficuas esse, Franciscus Vicarius in Hydrophylacio novo monet. Potum pariter coffee sine lacte moderate usurpatum conducere STALIUS in *Praxi Medica* statuit, cuius utilitas & nostra experientia in quibusdam ægris confirmata fuit. Abstinentia aut cibi nimia parcitas in intermittentibus non adeo conductit, quoad paroxysmum tamen observandum, ne cibus exhibetur paulo ante, nec mox post paroxysmum, sed tali tempore, ut concoctio usque ad paroxysmum fieri possit, & ut post paroxysmum exhibetur, quippe tunc vires à paroxysmo debilitatæ iterum recollectæ sunt. Denique cum curationibus, quæ mentem afficiunt, ob incertum eventum caute incedendum est, v. gr. si per terrorē vel metum Medicus febrim profligare velit, ea inductus ratione, quod diversæ febres inde fuerint curatæ; vid. *Oratio nostra de iis, quæ extraordinarie quandoque in curationis negotio contingunt.*

Amuleta, etiam innoxia, quæ passim commendantur, ex camphora, araneis, aliisque composita vix effectu-

fectum sine usū internorum remediorum, præstabunt.
 v. WOLFIUS *de Amulet. Scrutin.* Curationes per sympathiam vel per transplantationem, licet passim allegentur, hoc tamen dubium semper remanet, an, supposita quoque veritate harum observationum, has curationes & omni tempore temere immitari liceat: conf. COHAU-
 SEN *Dissert. de superstitione circa curationes morborum magneticas & sympatheticas.* Interim HOYERUS *Eph. N. C. cent. II.* febrim tertianam periculosam sequentem in modum curatam fuisse tradit: Carnem bubulam urina febricitantis elixavit, & cani devorandam dedit, qui febri correptus, in eos paroxysmos incidit, quibus antea æger affligebatur. Præter alios vero de his prolixius egerunt, ETTMULLERUS *Med. Tom. 3. Ad. Hafniens. Vol. 2.* BORRICHUS *Miscell. N. C. D. I. Cel.* STALIUS *in Prax. C. de quartana GER. GO-*
RIS de cura sympathetica.

Quod denique ipsas concernit recidivas, experientia constat, eas non infrequentes esse, quoad durationem & vehementiam vero plane diversas existere, in epidemicis vero magis observari, quam in spo-

radicis. Recidivæ crebriores febrium aut transitus in alios morbos plus minus chronicos fiunt, ut v. gr. febres lentæ, icterus, chlorosis &c. oriantur, si perversa cura sit, sique ex cibi & potus appetitu redeunte, abusu & excessu minera generetur; Hæc jam varia esse potest, prout cibi acriores, indigesti, viscidii, aromatisati, fermentescentes sunt, nec non potus spirituosi & acidi junguntur, quando in primis nimio potu frigido præsertim aquæ cum vino aut julepi sub cursu morbi vel paroxysmi tempore nimis refrigeratur ventriculus, imo & tunc quando febres intempestive sistuntur. Sive fiat per medicamenta licita sive illicita, morbus sequitur, aut periculosior, aut recidiva non levis.

Multi dicunt per hunc vel illum cibum vel potum cum cupiditate ingestum febrem profligatam fuisse, quoad hoc notandum, aliquando cibum aut potum fuisse salubrem potissimum in declinatione febris, in principio autem febris hoc factum fuisse vix observationibus probari potest; Vel sponte vel à me-

à medicamentis vieta febris cessare jam dum cœpit , non nunquam tamen ob expletum desiderium spirituum refectionem fieri concedimus. Afflatus quoque aëris liberior , commotiones corporis nimiæ tempore æstivo , habitatio in locis humidis , ira in primis facillime dejectiones biliosas & tertianam biliosam producere valent. Præservative essentiam visceralem , Alexipharm. Stahl. temperat. fulig. Cl. & chaccarill. refracta dosi , vel tempore vernali vel autumnali succum visceralem HB. recent. fumar. millefol. Endiv. chærefol. Card. bened. trifol. fibr. cum rad. cichor. & scorzoner. similibusque admixtis , vel pro re nata cum sero lactis vel jusculo carnis pro cura ad 2. vel 3. septimanas non sine effectu interdum præscripsimus.

In rebellibus quibusdam quartanis , vel ubi spasmi cum acrimonia , vel ubi deliquia in paroxysmo vel debilitas totius corporis die quoque apyrexias adfuerunt , vesicatoria , junctis aliis remediis convenientibus , laudabilem præstitisse effectum , observavimus , licet in hisce febribus non præcise requirantur. Si

ægrum

ægrum sopore jam aut apoplexia oppressum reperi-
mus , apoplectici instar affectus , sed cum febre juncti ,
curavimus morbum vesicatoriis pluribus ad carpos ,
nucham , & ipsi capiti raso admotis ; WERLHOFF ob-
serv. *ad febres.* Fonticulos alii commendant , quibus
materia ichorosa copiose se- & excernatur , cum efflo-
rescentiæ circa os seu signum bonum non raro exi-
stentes , ob analogiam hos suadeant ; Interim hæc
labiorum ulcuscula non semper intermittentem sol-
vunt febrim . Post 8. vel 10. paroxysmos tertianæ
intermittentis in exercitu Gallico prope Rhenum A.
1743. usque ad æstatem A. 1744. graffantis , cœci-
tatem insequutam , hancque irritis omnibus aliis re-
mediis , unice setaceo in nucha posito , curatam fuisse
de ARELL tradit *Act. Acad. Scient. Suec. T. XI.*

V. S^{em.} jam in intermittentibus febribus quod
concernit , ea non promiscue admittenda est , licet
quidam sæpius illam reiterare jubeant , in plethora
tamen admitti potest ; Non raro in intermittenti-
bus debita sub cautela eandem suasimus , in quibus-
dam imminutionem vehementiæ paroxysmorum , vel
immu-

immutationem typi observavimus. RIVINUS in *Diss.*
de febr. intermitt. V. S. ait, in plethorico, ubi pulsus
magnus deprehenditur, vel solennis quidam fluxus
v. gr. mensium vel hæmorrhoidum suppressus est,
ubi paroxysmo febrili sanguinem floridum ægri rejiciunt, (uti exemplum nobis notum est,) item si quis
vel V. S. vel scarrificationes neglexit, administranda
est; Compertum enim est, in ejusmodi casibus
symptomata pejora plerumque remittere, æstum
præsertim, inquietudinem, atque dolorem circa tem-
pora pulsantem.

In semitertiana autem semel vel bis administranda V. S. Diversitas nationum, regionum, diætæ, habitus quoque corporis cuivis singularis, & plethora vera & orgasmus sanguineus generalis & magis particularis in inflammatione, aut congestione, & magna illa indicatio juvantum & non juvantum sub statu Epidemio communi vel singularium corporum simili pro morbi temporibus hoc artis auxilium V. S. seu indicant seu moderantur. Locum ostendunt excretionum naturalium ratio & adsuetudo, &

nifus naturæ bonus & malus. *Cel.* WERLHOFF *ob-*
serv. ad febres. De V. S. in hisce febribus RAMAZ-
ZINUS *in constit.* Epid. Op. & BIANCHIUS *Histor.*
Hep. SYLVIUS *Prax. Med. Append. trad.* prolixius
egerunt.

Enemata quod attinet, RIVINUS *in Diff. de febr.*
intermitt. Clysmata, ait, nonnunquam laudem me-
rentur. Si alvus sit pigrior, si dolores intestinorum
atque dorsi vehementius urgeant, si subiecta alias ma-
lo hypochondriaco vel affectibus lienis sint obnoxia,
si abdomen, inflatum, durum, atque spasmo tensum ob-
servetur, & ubi cacochymia evacuationem urgeat, ægrī
tamen per os pharmaca assumere detrectent. Hac quo-
que methodo hisce in casibus non sine fructu, usi su-
mus. ABRAH. MUNTING *in Curios. descript. plant.*
HELVETII methodum forma **Clysteris injiciendi cor-**
ticem sub censuram vocat, et modum per os assu-
mendi defendit, longeque majoribus incommodis
laborare HELVETII modum tradit, quam usitatam
exhibendi rationem, quæ effectu optato non careat,
si modo corticis illius detur quantitas debita, V. gr.
uncia

tuncia stomacho vacuo, nullaque præsentे diarhoëa.
MICH. VALENTINI contra *in Diff. Epist. de polychrest.*
exot. omnis generis febribus corticem in Clysteribus
adhibitum ad modum HELVETII laudat, uti pariter
Torti *in Therapeia Speciali* observationibus pro-
bat, quod ante 'HELVETIUM' Clysteris forma
injicere curaverit corticem. In *Eph. N. C. D. II.*
ALBRECHTUS enemata ad mentem HELVETII
laudat, licet BEHRENS exceptiones proferat, di-
cendo, quod idem effectus insequi deberet, si etiam
simplices Clysteres vel aqua calida, vel jusculo præpa-
rata, tanto numero injicerentur. Sæpe numero in
febribus intermittentibus, præprimis in quartanis,
repetitis vicibus enemata ex cortice peruviano parata,
injicere jussimus, neque tamen adeo notabiles exinde
observavimus effectus. In quotidiana tamen inter-
mittente cum torminibus colicis stipata enema ex cor-
tice cum fl. chamomillæ felicem præstitisse effectum,
edocti fuimus.

Denique si v. gr. intermittens tertiana in con-
tinuam acutam transitum minetur, vel raptus san-
guinis



guinis nimius adsit ad caput, frontale ex aceto rosato
cum sale & pane, nec non suppedanea conducunt,
quamquam et in rebellibus tertianis non sine fructu
applicentur, componuntur autem ex fermento pisto-
rum cum HB. Ruth. rec. contus. rad. raphan. rust.
raf. sem. sinap. vel aliis acribus, alii contra ha-
lecom dissectam plantis pedum impo-
nere solent.

T A N T U M!

