

**De nativo vesicae urinariae inversae prolapsu dissertatio inauguralis ... /
[Theodor Georg August Roose].**

Contributors

Roose, Theodor Georg August, 1771-1803.
Universität Göttingen.

Publication/Creation

Gottingae : Joann. Christian. Dieterich, [1793]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/dav cwdkn>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

DE NATIVO
VESICAE VRINARIAE INVERSAE
PROLAPS V.

DE NITIA
VERSICHE ARMINIATÆ INNERSÆ

PROLAPSUS

12

DE
NATIVO
VESICAE VRINARIAE INVERSAE
PROLAPSU
DISSERTATIO IN AVGVRALIS

JOANN. FRIEDR. V. M. MENBACH
QVAM
CONSENTIENTE ILLVSTRI MEDICORVM ORDINE.

PRO GRADU
DOCTORIS MEDICINAE ET CHIRVRGIAE

DIE XXVI. SEPTEMBER. MDCCCLXXXIII

DEFENDET

AVCTOR

THEODORVS GEORGIVS AVGVSTVS ROOSE
BRVNVICENSIS
SODALIS SOCIETATIS DVCALIS TEVTONICAЕ QVAE HELMSTADII EST HONORARIVS
ET SOCIETATIS PHYSICAE PRIVATAE GOTTINGENSIS ORDINARIVS.

CVM TABVLA AENEA.

GOTTINGAE
TYPIS IOANN. CHRISTIAN. DIETERICH.

ЛД
ОУТАИ
ПАЛЕОНІЕ ИНДІАНЕ ВАГІДЕ
УЗЧАЛОЧ
ДІСКРІПІТІС

МДЦ

Bewundernswürdig lehrreich ist die Natur selbst auf ihren Abwegen.

SÖMMERRING.

МДЦ

МДЦ МДЦ МДЦ МДЦ МДЦ

ГІДІЧНІ



МДЦ МДЦ МДЦ

ГІДІЧНІ

МДЦ МДЦ МДЦ МДЦ МДЦ

VIRO. CELEBERRIMO
ILLVSTRI. EXPERIENTISSIMO. DOCTISSIMO
IOANNI. FRIDER. BLVMENBACH

MEDICINAE. DOCTORI
IN. ACADEMIA. GEORGIA. AVGUSTA. PROFESSORI. PVBLICO. ORDINARIO
MAGNAE. BRITANNIAE. REGIS. A. CONSILIIS. AVLICIS
SOCIETATVM. REGIARVM. SCIENTIARVM. GOTTINGENSIS. ET. LONDINENSIS
ALIARVMQVE. SODALI
ETC. ETC.

PRAECEPTORI

SVMMA. SEMPER. PIETATE. VENERANDO

P V B L I C E

GRATIAS. AGIT. MAXIMAS

PIAQVE. MENTE

DISSE R T A T I O N E M

D. D. D.

T A N T I . N O M I N I S

C U L T O R . O B S E R V A N T I S S I M V S

A V C T O R .

PRÆFATI O.

Iter facienti ab amico meo RUMANN, Illustrissimi Comitis a Stollberg-Stollberg chirurgo aulico, in pago Rotha, in Comitatus Mansfeldae parte Saxonica sito, conformatiōnis vitium, notatu dignissimum, mihi ostendebatur. Postea beneuola Celeb. BLUMENBACH communicatione descriptionis casus ab eo examinati aliorumque exemplorum de natura huius mali magis instructus, diligentiori in hanc rem facta indagine, et plurium similiū casuum, quos splendidissima locupletissima bibliotheca academica mihi suppeditauit, comparatione, inueni, hocce vitium hucusque non adeo notum, quam mereretur, et dignum esse, quod pluribus describeretur. Casus igitur historiam, et quae hac de re legi et cogitauit, in medium profero.

Non

Non possum, quin Viro maxime venerabili SEILER,
ecclesiae Rothensis Pastori, et amico meo, WILHELMO
HORER, Brunouicensi, qui iurium studio in hacce literarum
vniversitate nunc incumbit, alteri pro humana hospitalitate,
qua mihi, ei plane ignoto, quum puerum aegrotum exami-
narem, profuit, alteri pro labore, quem amicissime in
conficienda ad naturam delineatione, dissertationi adiecta,
suscepit, — publice gratias meas hic agam.

Ceterum, L. B., in diiudicando opusculo meo perpen-
das velim aureum illud GALENI*) dictum: “Difficile est,
vt, qui homo sit, (addam: qui iuuenis sit,) non in multis
peccet, quaedam videlicet penitus ignorando, quaedam
vero male iudicando, et quaedam tandem negligentius
scriptis tradendo.”

*) *De compos. pharmac.* L. II. C. I.

DE NATIVO

VESICAE VRINARIAE INVERSAE

PROLAPSUS.

CAP. I.

MORBI DESCRIPTIO.

§. 1.

Aegrotus, de cuius morbo disserere constitui, puer est, quatuordecim annos natus, qui, quum cetera sanus sit, nec omnino pulchritudine quadam destitutus, quamquam infirmus et imbecillis dici debeat, *praua infimi ventris*, et quae a naturali conditione prorsus recedit, *formatione* laborat.

§. 2.

In toto enim ventris valde propensi ambitu (Fig. A), praesertim in regionis mesogastricae parte, quam vocant vmbilicalem, *vestigium nullum*, *vbi vmbilicalis funiculus in fetum ingressus sit*, occurrit, quare similium casuum obseruatores quidam induci, nullum omnino vñquam

hic adfuisse vmbilicum affirmarunt, nouaque inde ad firmandam doctrinam, fetum in vtero per os nutriri, argumenta elicuerunt *a*). At enim vero in regione hypogastrica, videlicet supra tumorem iam nunc describendum, plica quaedam adest (Fig. B), per quam, parentibus aliisque testantibus, vmbilicalis funiculus in recens nati infantis abdomen desiit atque terminatus est; id, quod etiam multis aliorum obseruationibus infra (§. 18) citandis confirmatum et comprobatum inueni *b*).

§. 3.

In regione hypogastrica, vbi pubis regio incipit, *tumor* (Fig. C) cernitur conuexo-complanatus, ab uno latere versus alterum ouatus, cuius diameter longitudine circ. tres digitos, latitudine duos, altitudine sesquidigitum aequat. Diluto rubore est tumor, quasi spongiosus et excoriatus, adeo ut crudae carni similis sit. Hinc inde muco madet.

Insigni,

a) E. c. STALPART VANDER WIEL *Obseruat. rario. medic. anatomic. chirurgicar.* Cent. II. P. I. L. B. 1727. p. 328.

Cl. DESGRANGES in *Journal de Médecine*. 1788. T. 74. p. 475.

b) Quod et in recensione casus modo citati coniectatur: “*Am sonderbarsten ist die Bemerkung, dass man an dem Menschen keine Spur von Nabel entdeckt hat, und es ist Schade, dass Hr. Desgranges über diesen Umstand so flüchtig hinwegeilt, um desto schneller sagen zu können, dass dieser Mensch sich in Mutterleibe von dem Schafwasser ernährt habe. Eine genauere Untersuchung würde ihm die Spuren des Nabels gezeigt haben.*” *Allgem. Literaturzeitung v. J. 1790. B. II. p. 291.*

Cf. Cl. Roux in *Journ. de Médec.* I. c. p. 477.

Insigni, quin summa sensibilitate haec pars praedita est, ita ut ne minimum quidem tactum absque summo et fere intolerabili aegri cruciatu patiatur. Reprimi potest, et pueri supino quodammodo recedere videtur. A tussi protruditur et reicitur inuicem.

§. 4.

In inferiori huius tumoris parte vtrumque latus *carunculam* quandam *papilliformem* oculorum aciei offert (Fig. DD), stylo teneri, capitello instructo, peruiam quidem, sed non sine summo aegri dolore, licet summa cautio et diligentia essent adhibitae. Ex quibus papulis continuo et inuoluntarie *vrina* guttatum *exstillat*, odorem perigratum dispergens.

§. 5.

Prope inferiorem huius tumoris partem est corpus latum, *glandem penis* quodammodo referens (Fig. F). In duas partes hoc corpus scissum esse videtur, adeo ut vrethra bifida, superius posita, corpora cauernosa coniungat. Glans omni orificii vrethrae vestigio plane caret, et, sicut corpus superne positum modo descriptum, summa instructa est sensibilitate.

Quum glandem a superiori tumore paululum removeris, *corpusculum pallidum*, cum duobus iuxta vtrumque latus positis *punctis*, visui appetet. (Fig. G.)

§. 6.

Glans *frenulo* quodam cum duplicatura cutanea, *praeputio* scilicet (Fig. H), coniungitur.

§. 7.

In utroque inguine *tumores oblongi* (Fig. EE) apparent ab osse ilii versus scrotum tendentes, qui cute non decolori circumdati crinibus hinc inde teguntur.

§. 8.

Tumores illi in *scrotum* (Fig. I) abeunt, quod valde extensem, rapheque expers, loco solito situm est, et crinibus parce obductum. In eius cauo duo *testiculi* cum *epididymis* et *funiculo spermatico*, ut videntur naturales, sentiuntur.

§. 9.

Ani orificium praeter naturam versus anteriora possum est, adeo, ut perinaei spatium vix digitum dimidium aequet.

§. 10.

Ossa pubis longe a naturali statu abhorrent. Etenim *symphysi* prorsus carent, et magno *hiatu* distant. Qua de re ut certior fierem, enchires in tali in casu ab Ill. BONN c) primum commendatam, ut *digitus* scilicet ani orificio insereretur, institui. Sed aegri impatientia impediuit, quo minus

c) ANDR. BONN über eine seltne und widernatürliche Beschaffenheit der Harnblase und Geburtstheile eines zwölfjährigen Knaben. A. d. Holländischen von H. I. ARNTZ. Straßburg, 1782. p. 36.

minus hancce distantiam interne recte sentire liceret. Ceterum iam externa exploratio omne de hac re remouet dubium, quum loco ossium pubis mollis adsit massa.

§. 11.

Inde vero, quod ossa pubis tam longe inter se distent, efficitur, vt *femorum* situs a naturali conditione longe discedat. Tantum enim inter illa est spatium, vt pueri ingressus valde sit vacillans, nutansque.

§. 12.

Vrinae effluxus ex duabus supra memoratis papillis plane est *inuoluntarius*, nec vlla, licet maxima, pressione externa augeri potest. Egomet ipse cum manutum volis omnes partes tumoris adiacentes pressi, nec umquam vrinae defluxum maiorem obseruare potui. Neque puer ipse timorem ipsum premendo stillicidium celerius aut maius ullo modo efficere valuit.

§. 13.

Aeger numquam *erectione* membra virilis gauisus est, nec ullum sexus instinctum huc usque sensit.

C A P . I I .

M O R B I N A T V R A .

§. 14.

Vsus distingui iubet inter *morbum* et inter *deformitatem*, s. *vitium conformatio[n]is*, s. *lusum naturae*. Quum igitur malum a nobis descriptum ad morbos referimus, ideoque morborum ingens agmen noua specie adaugemus, probatio nobis incumbit, hoc iure meritoque fieri.

Quum morbus ea sit corporis humani conditio, quae actiones laedit *d*), sole meridiano clarus elucet, vrinae excretionem adeo peruersam atque actionum sexus omnium cessationem morbi denominationem *in sensu latiori* omnimode mereri, nec ad deformitates, quae vitia corporis sunt, actionum laesionem non inferentia *e*), referri posse.

At enim non quaevis actiones laedens affectio, *in singulari casu obseruata*, ad morbos *sensu arctiori* referenda est. Ad morbum pathologice tractandum necesse nobis videtur, ut non semel tantum in uno quodam exemplo,

sed

d) H. BOERHAAVE *Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis*.

L. B. 1709. §. 1. p. 1. Quam Boerhaavianam definitionem curationi quidem a GAUBIO (*Institut. pathol. medicinal.* Edit. III. I. C. G. ACKERMANN. Norimb. 1787. p. 11. §. 34) propositae, morbum esse “affectionem illam corporis humani viuentis, qua fit, ut actiones homini propriae non possint apposite ad leges sanitatis exerceri,” profero, quoniam haec nil nisi negatiua mihi videtur.

e) GAUBIUS l. c. p. 12. §. 38.

sed ut saepius obseruatus sit. Licet, teste Celeb. SÖMMERRING *f*), Natura in omnibus deformitatibus et deuiationibus certum quendam ordinem sequatur neque in infinitum ludat, attamen non quaenam abnormis et monstrosa a conditione sana facta deuiaatio ad morbos pertinet. Morbi enim conditio, sine qua affectio in morborum classem referri nequit, est, ut in corpore viuente et vitali exsistat; forsitan quoque, ut medelam, quamuis non semper radicalem, admittat.

§. 15.

Vt igitur probemus, morbum nostrum a pluribus iam auctoribus in singulis exemplis obseruatum fuisse, Virorum sequentium Clarissimorum, qui obseruationes de eo cum orbe literato communicauerunt, in quibus inuestigandis notiae literariae Immortalis HALLER *g*), Ill. BONN *h*), et Cl. WOLFF *i*), nec non quas beneuole mihi impertiit Celeb.

BLU-

f) S. T. SÖMMERRING *Abbildungen und Beschreibungen einiger Misgeburten, die sich ehmals auf dem anatomischen Theater zu Cassel befunden.* Mainz, 1791. p. 38.

g) ALB. v. HALLER *Elem. physiol.* T. VII. Bernae, 1765. Lib. XXVI. S. II. §. 1. p. 296. 297.

EIUSD. *Opera minora.* P. III. Laus. 1768. p. 34.

h) In H. I. VOEGEN VAN ENGELEN *Genees- natuur- en huishoudkundig kabinet.* D. 3. St. 1., cuius versionem germanicam Auct. Cl. ARNTZ iam supra adlegauimus.

i) GISBERTI IAC. WOLFF *Diss. sistens quaestiones medicas varii argumenti.* Harderv. 1791. p. 59 sq.

BLUMENBACH, magna praebuerunt adminicula, mentionem facere liceat *h*): CNEULINI apud SCHENK *l*), CATTIER *m*), HIGHMORE *n*), BARTHOLINI *o*), VAN HORNE *p*), RUY SCH *q*), WILHELMI TEN RHYNE *r*), † TULPII *s*), GOCKEL *t*), BLAN-

CARD

k) Scriptores, de quibus adhuc dubius ancepsque haesito, an eorum casus cum nostro in eandem classem sint referendi, signo + designaturus sum.

l) I. SCHENK *obseruat. med.* T. II. Francof. 1600. p. 13. Obs. IX.

m) ISAAC. CATTIER *Obseruat. medicinal.* PETRO BORELLO *communi-*
cat. (quae PETRI BORELLI *historiar. et obseruat. medico-physicar.*
Centur. IV. Francof. 1670. adiectae sunt,) Obs. XIX. p. 82 sq.

n) NATHAN. HIGHMORE *corporis hum. disquisit. anat.* Hagae-Comit.
1651. L. I. P. IV. C. VII. p. 115.

o) TH. BARTHOLINI *historiar. anatomicar. rarior.* Cent. I. Hafniae,
1754. Hist. LXV. p. 114. 115.

Cf. EIUSD. *anat.* L. B. 1673. p. 196.

p) In BARTHOL. *anat.* l. c.

q) FR. RUY SCH *Opera omnia.* Amst. 1721. Obs. XXIII. p. 22. Fig. 23.
et in literis ad ROONHUYSEN de anno 1665. Vid. v. ROONHUYSEN
Genees- en Heelkunstige aanmerkingen. Auct. 1672. p. 66 sq.

r) W. TEN RHYNE *meditationes in magni Hippocratis textum XXIV.*
De veteri medicina. L. B. 1672. p. 284. not. a.

s) TULPII *obseruat. med.* Amst. 1672. p. 332.

t) CHR. L. GOCKEL *de vesica spongiosa extra abdomen posita cum*
defectu penis, in *Ephemerid. nat. curios.* Norimb. 1687. Dec. II.
Ann. V. p. 84. Obs. XLIII.

CARD *u*), PLOT *v*), MURALT *x*), BLASII *y*), LITTRÉ *z*), HUXHAM *a*), OLIVER, qui eundem cum HUXHAM casum describit *b*), STALPARTI VANDER WIEL *c*), † JONSTON *d*), MOWAT *e*), BERGEN *f*), WARWICK *g*), GOU-

PIL

- u) Hollands Jaarregister 1682. T. 3. Obs. 67. p. 301.*
- v) The natural history of Staffordshire by ROBERT PLOT. Oxford. 1686. Chap. 8. p. 268.*
- xx) JOHANNES MURALT's Kinder- und Hebammen-Büchlein. Basel, 1697. p. 96.*
- y) GERARDI BLASII obseruat. med. rarior. Amst. 1700. p. 52. obs. vi.*
- z) Sur un fetus humain monstrueux in Mémoires de l'acad. royale des sciences p. 9 sq. (adiectae Actis acad. Paris. s. t. Histoire de l'acad. roy. des sciences. ann. 1709.)*
- a) In epistola ad IACOBUM IURIN. Philos. transactions, Vol. XXXII. for the years 1722. 23. N. 379. p. 408 sq.*
- b) In literis ad RICHARDUM MEAD. Philos. transact. l. m. c. p. 413 sq.*
- c) ST. v. d. WIEL l. c. Cent. II. P. I. L. B. 1727. p. 327.
Ibid. p. 359.
Ibid. p. 362.*
- d) I. JONSTON thaumatograph. nat. Amst. 1732. Class. X. Artic. IV. p. 356.*
- e) An account of a child born with the urinary and genital organs preternaturally formed. In Medical Essays and observations revised and published by a society in Edinb. Vol. 3. 1735. XIV. pag. 276 sq.*
- f) Commerc. literar. ad rei med. et scientiae natur. incrementum institut. Ann. 1737. Norimb. p. 385 sq.*
- g) A remarkable conformation or lusus naturae in a child. In Philos. transact. Vol. XLII. Nr. 464. p. 152 sq.*

PIL *h*), TENON *i*), LEMERY *k*), BÖSEFLEISCH *l*), DEVILLENEUFVE *m*), IOANNIS BUXTORF *n*), INNES *o*), NEBEL *p*), SAVIARD *q*), PALLETTA *r*), CASTARA *s*), DESGRANGE *t*).

h) Sur un vice de conformation singulier, in *Recueil period. d'observat. de medec. etc.* par M. VANDERMONDE. Juillet 1746. T. V. p. 108.

Cf. *Journal encyclopedique* T. VI. Aout, 1756. p. 113.

TH. ENGEL *Diss. de vtero deficiente*. Regiom. 1782.

i) Mémoires sur quelques vices des voies urinaires et des parties de la génération, in *Hist. de l'acad. roy. des sc.* Ann. 1761. p. 115 sq.

k) Apud TENON l. c.

l) In Act. Acad. Erford. T. II. (Erf. 1761) p. 431 sq.

m) Mémoire sur une nouvelle espèce de hernie naturelle de la vessie urinaire, et sur une privation presque totale du sexe, in *Roux Journ. de medecine etc.* T. XXVII. Juill. 1767. p. 26 sq.

n) Vesica vrinaria extra abdomen sub umbilico prominens in infante recens nato. In *Act. Helvet.* Vol. VII. Basil. 1772. p. 104.

o) In Medical and philosophical commentaries by a society of physicians in Edinb. Vol. II. P. IV. p. 437 sq.

p) Descriptio atque sectio anatomica infantis trimestris, sine vesica vrinaria nati, cuius infima abdominis pars male conformata erat. In *Hist. et comment. acad. Theod. Palat.* Vol. V. Mannh. 1784. p. 345 sq.

q) Casus a LE GONRT obseruatus a SAVIARD descr. in *Et. Recueil d'observations chirurgicales*. Nouv. edit. à Paris. 1784. Obs. 118. p. 403.

r) J. B. PALLETTA noua gubernac. Hunt. descriptio. Mediol. 1779.

s) Description d'un vice singulier de conformation, in *Hist. de la soc. roy. de med.* ann. 1780 et 81. à Par. 1785. p. 323 sq.

GRANGES *t*), LE SAGE, qui descriptionem anatomicam viri, a GOUPIL XXXII annos ante examinati, profert *u*), FLAJANI, qui partes deformes, ab eo praeparatas in Museo anatomico Spiritus St., quod Romae est, servat *v*), PENCHIENATI *x*), + COLLIANDER *y*), BOSSON *z*), STOLTE *a*), CAMPER *b*), BONN *c*), ARNTZ *d*), + SÖM-

C 2

MER-

t) l. c.*u*) *Deser. anat. d'un vice de conformation de la vessie et des parties genitales d'un homme*, in ROUX *Journ. de medec.* T. LXXV. 1788. p. 291.*v*) *Osservazione anatomica fatta sopra un uomo, in cui si trovavano mancanti per difetto di conformatioe la vescica dell' orina, la verga, et lo scroto, con altre particolarità delle parte inferne del pelvi spettanti alla generazioni*. In GIUS. FLAJANI *nuovo metodo di medicare alcune malattie spettanti alla chirurgia*. In Rom. 1786. p. 131 sq.*x*) *Obs. anatom. sur une fille, qui avoit passée pour être née sans nombril* in Mém. de l'acad. roy. des sciences de Turin. Ann. 1784-85. P. I. p. 387.*y*) *Weekokskrift och naturforskaren*. Stockh. 1787.*z*) *Verhand. v. Haarlem* T. 19. p. 313. *Ib.* T. 12. p. 135.*a*) *Beschryving der wanschapene teeldeelen en waterwegen van een Man, en eenes werktuigs etc.* Zwolle, 1770.*b*) Apud STOLTE l. m. c. p. 3.*c*) L. c. et *Verhand. der Holland. Maatschappy* D. 19. St. 1. p. 321. Cf. *Translation of a dutch description of a complicated deformity by BONN*. Amst. 1791.*d*) In translatione germanica descriptionis Bonniana supra cit. p. 29. not. *)

MERRING *e*), WOLFF *f*), qui casus, a Celeb. SÖMMERRING, qui quatuor vidit, secum communicatos et breuem dissectionis historiam refert, cuius casus ab Ill. SÖMMERRING praeparatum specimen, vasis sanguiferis artificiose repletis, in Museo academiae militaris Viennae seruatur.

Eundem, quem Ill. BONN descriptsit, iuuenem, Ill. quoque BLUMENBACH iam XXX. Nouembris, 1784. Göttingae, et iterum mense Ianuarii, 1792. Londini obseruauit.

Alium adhuc casum Cl. MICHAELIS Milani obseruauit, et, quae Viri Experient. est, humanitate de eo certiorem me fecit.

Alia procul dubio exempla exstant non descripta; alia, descripta quidem, quae nondum inueni.

§. 16.

Ex iis igitur, quae supra (§. 14) de morbi natura in genere et de eo, quo a sola vitiosa conformatione differt, memorata sunt, atque ex magna exemplorum copia, in quibus malum, de quo sermo nobis est, semper eodem modo se habuit, inque singulis tantum rebus discessit, colli-

e) A. v. HALLER *Grundriss der Physiol.* Nach der vierten, mit den Verbesserungen und Zusätzen des H. Hfr. WRISBERG (praec. pie venerandi) vermehrten, Ausgabe aufs Neue übers., und mit Anmerkungen versehen durch Hrn. Hofr. SÖMMERRING, mit einigen Anmerkungen begleitet und besorgt von P. F. MECKEL. Berlin, 1788. p. 589. not.*)

f) L. c. p. 62.

colligere liceat, ad *morbos*, scil. ad *morbos chirurgicos*, qui a caussa, ut dicunt topica, toti corpori non communi, oriuntur, quique medelam tantummodo *topicam* poscunt, et ad *morbos*, quos dicunt *congenitos*, hoc malum, aequem ac e. c. labium leporinum, referendum esse.

§. 17.

De morbi natura et de explicatione phaenomenorum, oculis obuiam venientium, disquisituri, primum *anatomiam* morbi *descriptionem* ab optimis obseruatoribus sumtam, in medium promamus. Tunc praecipuas singulorum de singulis *sententias* proferre, et de *rationibus dubitandi et decidendi*, quoad virium modulum, quaedam disserere, nostrum erit.

§. 18.

Supra offam fungosam (Fig. C) semper inuenta est plica quaedam cutanea (Fig. B), in quam *funiculus umbilicalis*, ex solitis vasis constitutus, fetui insertus est, quod ex sectionibus fetuum aut recens natorum elucet g).

C 3

§. 19.

g) TENON I. c. Obs. 1. p. 116.

CATTIER I. c. p. 84.

LITTRÉ I. c. p. 10.

NEBEL I. c. p. 347., qui in figura funiculum umbilicale rite deligatum delineari curauit.

GOCKEL I. c.

§. 19. a.

Ex omnibus casuum luc pertinentium descriptionibus eorum, a quibus sectio instituta est, constat, *vesicam vrinariam a loco sueto semper abesse h).*

§. 19. b.

In corporis fungosi extra abdomen positi foramina (Fig. DD), per quae, uti notauimus, lotum exstillat, stylum inseri posse, ab omnibus fere supra (§. 15) denominatis auctoribus annotatum est i). Sectione autem patet, hasce papillas nil aliud esse, quam *vreterum*, a renibus tendentium, *aperturas h)*, ita, ut stylus, vreteribus impositus, ex offae huius foraminulis prodiret l), atque alter

h) GOCKEL l. c.

MURALT l. c.

TENON l. c.

CATTIER l. c.

LITTRÉ l. c.

NEBEL l. c. p. 349.

LE SAGE l. c.

BLASIUS l. c.

CASTARA l. c. p. 324.

BUXTORF l. c. p. 105.

FLAJANI l. c. p. 133.

i) Aegrotus, ab INNES obseruatus, ipsem et stylum sibi applicauit.

INNES l. c. p. 437.

k) Cf. auctores modo citati et Cl. WOLFF descr. casus ab Ill. SÖMERRING obs. (WOLFF l. c. p. 66.)

l) MURALT l. c. p. 96. 97.

NEBEL l. m. c.

CASTARA l. m. c.

per papillas hæsce in vreteres duci possèt, et vt aër, sub renibus in vreteres missus, per foramina haec transiret *m*). Vreteres autem non recta, sed oblique quodammodo in foramina externa aperiuntur *n*).

§. 20.

Vreteres latitudine et capacitate instructi sunt, naturali longe maiori. Licet nimirum ab obseruatione *Littriana o*) discesseris, vbi vreteres maxime dilatati erant, quod autem forsan hoc in casu a calculis vrinariis, in cädauere repertis, pendere potuit *p*), neque distentionem, a naturali longe abhorrentem peluis renalis et vreteris dextri lateris in casu, quem LE SAGE denotauit *q*), agnoscere velis, quoniam in rene et vretere dextri lateris pus contentum erat, — attamen vreteris sinistri lateris, quamquam non tantum a natura discedat, dilatatio, ab eodem auctore obseruata *r*), nec non aliorum, v. c. MURALTI^s), BLASII^t), STALPARTI VANDER WIEL^u), NEBEL^v), FLA-

JANI

m) TENON l. c. p. 116.

n) FLAJANI l. c. p. 134.

o) LITTRÉ l. c. p. 12.

p) Cf. Celeb. G. FR. HILDEBRANDT (praec. pie venerandi) *Lehrbuch der Anatomie des Menschen*, B. III. Brschweig, 1791. p. 554. not. †. ad §. 2184.

q) LE SAGE l. c. p. 294.

r) l. m. c.

s) "Die vreteres eines Fingers gross beiderseits." MURALT l. c.

t) "Vreteres magni admodum." BLAS. l. c.

u) "Vterque vreter naturali duplo, triploue crassior." STALP. v. d. WIEL l. c. p. 360.

v) "Vreteres iusto ampliores." NEBEL l. c. p. 349.

JANI x) — in apicum ponunt sententiam, hanc vreterum distentionem naturae huius mali congruam esse.

LITTRÉ y) obseruauit, quod, vt paulo infra elucebit, notatu vtique dignum est, vreterem dextrum in vesiculam quandam, septem linearum longitudine, et quatuor linearum latitudine in pelvis sinistrum latus abiisse, cuius collum in externa ventris superficie aperiebat. Vreter dexter sine intermedio loco in lucem prouenit. Disertis adhuc verbis ab auctore annotatur z), quod hinc iam sequitur, vreteres a se inuicem oblique secari, cuius rei etiam LE SAGE mentionem facit a) b).

§. 21.

Renes, nisi a caussa, huc non pertinente, morbo cor-recti fuerint, ceterum sani inueniebantur, si nempe a pelvi renali, magnitudine et latitudine adeo extensa, vt a FLAJANI cum vesicula comparetur c), discesseris.

§. 22.

x) "Gl'uretri — nel resto non erano che del doppio piu grandi del naturale." FLAJANI l. c. p. 133.

y) l. c. p. 12. 13.

z) l. m. c.

a) l. c. p. 294.

b) Huc quoque pertinet, aegrotum, quem INNES obseruauit, applicato per vreteris orificium stylo, dolorem saepe in altero latere sensisse. INNES l. c. p. 438.

c) "Trovai il principio degl' ureteri detto Pelvi molto dilatato, e rappresentante come due picciole vesciche." FLAJANI l. c. p. 133.

§. 22.

Corpus, *glandem penis referens* (Fig. F) foramine autem plane carens, sicut sola inspectio iam plerosque obseruatores docuit, reuera *bifidum esse*, anatomica disquisitione probatur d).

§. 23.

Testiculi semper naturales vel in scroto, vel ante eorum descensum in inguinibus continebantur e). GOCKEL f) nullam partium genitalium anomaliam inuenit; qua in re, quod ad *vasa spermatica, testiculos et ductum deferentem* attinet, alii auctores cum eo consentiunt. De *finibus autem ductus deferentis, de vesiculis seminalibus, et de eorum ductu excretorio* alii auctores alias tradunt obseruationes g) Sic v. c. TENON, *ductus deferentes in fundo pelvis in duo tubercula alba finiri*, auctor est, quae membranis quibus-

dam

d) CATTIER l. c. p. 83.

TENON l. c.

ST. V. D. WIEL l. c. p. 359.

LE SAGE l. c. auctor est, penem vnum tantum corpus cauernosum habere.

e) Sic v. c. in *Matthia Vssem*, quum ab Ill. BONN descriptus est, nondum in scroto reperti sunt, quo nunc, teste Ill. BLUMENBACH et Cl. ARNTZ (l. c.), iam adsunt.

f) l. c.

g) INNES (l. c. p. 438.) de iis coniectat: "it is probable that they (sc. vasa deferentia) terminate in the rectum, and that the semen is discharged with the faeces."

dam inserta, cum partibus externis non coniuncta esse videbantur *h*). — STALPART VANDER WIEL in basi penis corpus glandiforme reperit, in quo ductus deferentes inserebantur. Vesiculas seminales non vidit *i*). — Ibidem ductus aperiri, quos vasa ejaculantia vocat, CATTIER refert *h*), qui vesicularum seminalium mentionem omnino non facit. — LITTRÉ vas deferens testiculi dextri in vreteris eiusdem lateris cauitatem inseri, ductum autem a sinistro testiculo prouenientem, in vesiculae supra (§. 20) memoratae cauitatem abire narrat *l*). Nec prostatam glandulam, nec vesiculas seminales repertas fuisse, annotat *m*). — LE SAGE autem vesiculas seminales, sub renibus positas renumque pelui ope telae cellularis adhaerentes, inuenit, duobus ductibus, altero deferente, a testiculis proueniente, qui cum vasis spermaticis per telam cellulosam laxam coniunctus erat, altero, quem pro excretorio habet, et qui in corpore fungoso terminabatur, praeditis *n*). — FLAJANI refert, se in inferiori corporis fungosi interna parte duorum ductuum vunionem vidisse, aliquantum vesiculis seminalibus similem, quae autem nil aliud erat, quam ductus deferentis continuatio, cum foraminulis externis (Fig. G) cohaerens, a spermatis commoratione dilatata. Prostatae quoque glandulae analogon, muscularum autem erectorum

h) TENON l. c. p. 116.

i) STALPART l. c. p. 359.

k) CATTIER l. c. p. 83.

l) LITTRÉ l. c. p. 13.

m) L. m. c. p. 14.

n) LE SAGE l. c. p. 294. 295.

penis et bulbocauernosorum s. acceleratorum vrinae ne vestigium quidem vidit o).

§. 24.

Ossium pubis inter se distantiam iam a HUXHAM p) et OLIVER q) coniectatam, praeter enchiresin Bonnianam (§. 10), cultro quoque anatomico confirmatam esse, inter alios LE SAGE r), LITTRÉ s), CASTARA t), FLAJANI u) — testes sunt. TENON effectum huius distantiae, scil. spatiū inter vtrumque femur, delineari curauit v), de re autem ipsa non loquitur.

§. 25.

Tubercula oblonga in inguinibus posita, a plerisque auctoribus annotata, ex mera adipe constare NEBEL nos docet x).

§. 26.

Alias ad scopum nostrum non spectantes anomalias, a caassis singularibus in singulis nonnullis casibus effectas,

D 2

o) FLAJANI l. c. p. 134.

p) l. c. p. 409.

q) l. c. p. 417.

r) l. c. p. 296.

s) l. c. p. 15.

t) l. c. p. 324.

u) l. c. p. 132. Tab. 3. bonam pelvis, in Museo anat. Spir. St. adhuc seruati, delineationem dedit.

v) TENON l. c. Pl. 4. ad p. 124.

x) NEBEL l. c. p. 349.

hic praetermittamus. Ad recensendas potius praecipuas variorum sententias de corpore ouato, in quod, secundum supra dicta, vreteres terminantur, nos vertamus.

§. 27.

De *partibus genitalibus*, quamquam abnorme formatis, omnes fere consentiunt, quibus eiusmodi homines virilis sexus examinandi occasio facta est, penem esse male formatum, cum praeputio, ope frenuli ei appenso. Corpusculum illud pallidum, de quo §. 5. sermo fuit, *caput gallinaginis* esse cum ductuum deferentium aperturis, sicut Ill. BONN primum coniectauit y), secundum obseruationes STALPARTI V. D. WIEL, CATTIER, FLAJANI, forsitan quoque LE SAGE supra (§. 23) memoratas, magnam acquirit probabilitatem; obseruatione a FLAJANI publicata, nimirum e foraminulis his interdum humorem album, viscosum, spermati similem, effusum fuisse z), quod et in viro a Cl. MICHAELIS obseruato ita fuit, veritatis speciem nancisci videtur; et experimento, ab Ill. SÖMMERRING instituto, qui quum ductum deferentem, omnibus in situ naturali relictis, mercurio adeo repleuit, ut hydrargyrum efflueret, ex hoc ipso loco mercurium prodeuntem vidiit a), extra omnem dubii aleam positum esse censeo.

§. 28.

y) BONN in vers. germ. p. 35.

z) FLAJANI l. c. p. 132. 133.

a) WOLFF l. c. p. 66.

§. 28.

Corpus ouatum, de quo nunc agimus (Fig. C), a non-nullis obseruatoribus pro *fungo* absque vlla alia disquisitione habetur b). Quae quidem sententia, si solummodo externum huius massae habitum respexeris, oculorum testimonium p[re]se fert. At enim vero muci in hoc corpore facta secretio, quae sane in fungo, organisationis experie, non adest, dein insignis eius sensibilitas, quae eiusmodi fungo haud alio modo, quam inflammatione inesse poterit, quae quidem inflammatio non per tantam annorum seriem sine exulceratione maneret c), denique semper in eo detecta vreterum insertio, opinionem hancce refutare videntur.

§. 29.

Herniam massam hanc CNEULINUS vocat d). Quum autem hernia locum habere nequeat, nisi vbi viscus e cauo
D 3 suo

b) CATTIER l. c. p. 84.

BARTHOLINUS l. c. p. 114.

MOWAT l. c. p. 276.

WARWICK l. c. p. 153.

SAVIARD l. c. p. 404.

LE SAGE l. c. p. 291.

NEBEL l. c. p. 347. 349.

c) Vnicum tantum inueni exemplum, vbi in viro XLVIII annorum tegumenta externa in corporis ouati ambitu, exulcerarentur, v.
LE SAGE l. c.

d) Apud SCHENK l. c. p. 13.

suo in aliud recedat *d*), hic autem corpus, de quo CNEU-LINUS nondum inuestigauit, vtrum viscus sit, nec ne, in aliud cauum omnino non recesserit, sed extra abdomen sit *prolapsum*, opinio eius a veritate abhorret. Neque tamen negari potest, herniam *alia ratione* adesse. Scil. CASTARA inuenit, internam corporis prolapsi faciem cauum quod-dam constituere, peritonaeo obductum, in quo intestina posita erant *e*).

§. 30.

HUXHAM, qui in femina XXIII annos nata *f*), casum nostrum obseruauit, dubius haesitat, vtrum hanc massam pro *fune umbilicali* male a partu abscisso, male dein curato habeat, nec ne *g*). Annuit autem huic sententiae, exemplis, vbi vrina per umbilicum etiam in adultis fuit excreta *h*), nixus. Meatus duos vrinarios pro vreterum orificiis habuisse, nisi experimentum ab eo institutum huic

d) Cf. Celeb. A. G. RICHTER, praeceptoris pie colendi, *Abhandlung von den Brüchen*, Gött. 1785. C. I. p. 2.

e) CASTARA l. c. p. 324.

f) In qua notatu dignum mihi videtur, eam per vaginae foramen adeo exiguum, vt summa etiam penis glans vix fuerit intromissa, multo minus virga, et vt chirurgus aegre digitum introducere potuerit, imo parturienti incisione chirurgica opem afferre debuerit, grauidam factam fuisse.

g) HUXHAM l. c. p. 408. 409.

h) Exempla ex ARNISAEO, HALLER, PEYER, LITTRÉ et III. WRIS-BERG sumta, inuenies apud III. HILDEBRANDT l. c. p. 568.

huic sententiae contradicere ei visum fuisse. Mulieri scil., iam a partus difficilis et incisionis chirurgicae ope demum facti tempore prolapsu vteri diuexatae, vterum quum fortius intruserit, exsilierunt e meatibus vrinariis riuuli duo; argumentum sane, vti concludit HUXHAM *i*), cystidis cuiusdam, vrinam excipientis.

Pro funie autem vmbilicali, quamquam et INNES *k*) hoc statuit, tumorem nostrum non esse habendum, ex iis patere videtur, quae partim de funiculo vmbilicali, ex solitis eius vasis formato (§. 18), partim de dissectionibus anatomicis tumoris ipsius, vreterum orificia continentis supra (§. 19 *b*.) memorata sunt. Lotii autem procursum vehementiorem, vteri repositionem excipientem, alio modo explicare nequeo, nisi statuam, hoc in casu, sicut in exemplo a LITTRÉ obseruato (§. 20), vesiculam quandam, ab uno alteroue, aut ab vtroque vretere constitutam, adfuisse. Vesica igitur vera a statu naturali aberrans si iam adest, quod infra elucebit, hi casus ad eos pertinent, vbi vesica vrinaria adfuit duplex *l*).

§. 31.

i) L. c. p. 410. 411.

k) L. c. p. 439.

l) *Vesicae sic dictae duplicitis obseruationes praeter exemplum illustre magni CASAUBONI* (de quo in primis videatur I. I. MANGETI *theatr. anat.* Genev. 1716. p. 409 sq.) inter alia inueniuntur in VESLINGII *syntagm. anat.* ex ed. BLAS. p. 81, in I. RIOLANI *anthropograph.* p. 247, in RUY SCH *obs. anat. chirurg.* obs. VIII, in BARTHOL. *anat.* p. 119, in TENON *Mém. de l'ac. d. sc. de Paris*, 1768. p. 48. N. II., in HALLER *op. min.* T. III. p. 29. — et in

EIUSD.

§. 31.

OLIVER *m*), qui eundem cum HUXHAM obseruauit casum, et eiusdem post repositum vterum adacti vrinae procursus mentionem facit, vrinam per *vrachum* e vesica adscendere credit; cui sententiae etiam GOUPIL *n*) fauet. Evidem censeo, contra eam eadem argumenta, quibus *Huxhamianam* opinionem impugnaui, esse proferenda.

§. 32.

HIGHMORE *o*), qui exemplo a se enarrato contra BARTHOLINUM, *vrachum* esse perium, probare studet, ex stricta vasorum vmbilicalium ligatura malum ortum esse credit, vnde nempe vrina, quae nec per vmbilicum, nec per vllam aliam viam excerni potuit, infra vmbilicum cutem exederit et emanando hancce eroserit et excoriauerit. At enim vero haec *cutis per vrinam effecta erosio* potius in ipso vmbilico *p*), quam in parte infra eum sita fieret, etsi rationem habere nolimus, lotum per ipsa vreterum orificia euacuari. Ceterum et in hoc casu vesiculam quandam, vt in casibus a LITTRÉ, HUXHAM et OLIVER obseruatis (§. 20. 31. 32.) adfuisse, ex eo colligimus, quod aegrum

EIUSD. *El. physiol.* T. VII. L. XXVI. Sect. II. p. 307, vbi aliarum adhuc obseruationum series citatur.

m) L. c. p. 417.

n) L. c. p. 109.

o) L. c.

p) Cuius exemplum v. in *Edinb. medic. commentaries* Vol. VI. P. I. (Lond. 1779) p. 299.

aegrum saepe compressione fortiori externa facta vrinam emittere potuisse, auctor refert.

§. 33.

Cl. FLAJANI *q)* sententiam fouet, corpus ouatum hocce *loco crinum* tempore pubertatis ortum fuisse, relatione aegri, qui mendicus annorum LXX erat, nixus. Hic enim narrauerat, vsque ad aetatis annum decimum quartum tegumenta pubis sibi alba et maculis expertia fuisse, exceptis duobus foraminulis, e quibus vrina exstillauerit; dehinc autem tumorem ortum esse, ad vigesimum quartum annum vsque semper auctum. A suspicione licet discesseris, eiusmodi hominem, ex infima plebe ortum, forsitan non satis in primo vitae stadio de malo suo adeo instructum fuisse, vt in anno LXXmo historiam eius rite enarrare potuisset, ponas imo, tumorem in prima aetate non plane esse prolapsum, hinc certe, eum *crinum* loco ortum esse, sequi non videtur.

§. 34.

Alias opiniones de natura huius mali, RUY SCHII *v. c.*, qui *chaos r)*, *v. HORNE s)*, qui glandulosum corpus tumorem vocabat, LEMERY *t)*, qui cum vase fusorio eum comparabat, — praetermittamus, quum earum refutatio ex

dictis

q) L. c. p. 132.

r) *Op. omn. l. c.*

s) Ap. BARTHOLIN *l. c.* p. 196.

t) Ap. TENON *l. c.* p. 115.

dictis et dicendis patere nobis videtur. Eorum potius sententias, quos ad veritatem proprius accessisse aut eam plane inuenisse credimus, proferamus.

§. 35.

Pro vesica vrinaria, quam plane deesse alii credunt u), tumorem eminentem rubicundum STALPART VANDER WIEL et GOCKEL habent. Hic “vesicam protrusam foras et in hoc ipsum corpus carneo-spongiosum mutatum” v), ille “vesicam omnino planam, collapsam, in se inuicem compressam et nullo modo concavam” x) fuisse, referunt. Cui autem sententiae obstat, quod intelligi omnino nequit, quo modo in anteriori et externa vesicae facie vreretur orificia animaduerti potuerint.

§. 36.

Eadem obiectio sententiis a PLOTT, qui pro collo vesicae y), a TENON, qui pro hernia (potius pro prolapsu) partis posterioris vesicae et vreretur z), et a CASTARA, qui pro fundo vesicae a) tumorem habet, prolatis, aduersari videtur, nisi ponamus, hos auctores superficiem vesicae internam conspexisse sibi habuisse persuasum; quae si ita sint, ad nunc recensenda pertinent.

§. 37.

u) v. c. CATTIER, RUY SCH, BLASIUS, HORNE — locis citatis.

v) GOCKEL l. c. p. 84.

x) STALPART l. c. p. 160.

y) l. c. p. 268.

z) l. c. p. 117.

a) l. c. p. 324.

§. 37.

Vesicam vrinariam inuersam morbum hunc esse, Viri Cl. DEVILLENEUFVE *b)* et BONN *c)* primum demonstrarunt. Vterque pro huius theoriae inuentore haberi potest; quamquam enim *hic* serius *illo* scripserit, facile descriptionem, a DEVILLENEUFVE editam, ei non fuisse notam, ex eius tractatu patet. Hocque respectu Cl. WOLFF *d)* asserere videtur, a BONN tamquam inuersionem vesicae vitium hocce *primum* esse demonstratum. DEVILLENEUFVE, qui casum a se obseruatum pro primo et vnico habere videatur *e)*, *herniam* vesicae inuersae adesse putat *f)*, id, quod supra (§. 29.) iam refutatum est, vbi, ad *prolapsus* rem potius pertinere, probare studuimus.

§. 38.

Momenta, quibus nixi, sententiam, mörbum vesicae vrinariae inuersae prolapsum esse, pro vera habendam censemus, in primis sequentia nobis videntur:

1. *Situs corporis tumentis in hypogastrica abdominis parte, quam pubis regionem vocant, vesicae in abdome contentae situi respondens.*

E 2

2. *Huius**b)* l. c. p. 27.*c)* l. c. p. 39.*d)* l. c. p. 65.

e) l. c. p. 27. not. *a.* ait: “*Les mémoires de l'acad. des sciences de Paris, Thomas Bartholin en son livre Historiar. anatom. rarioꝝ, centuriaꝝ*” etc. “*et autres anatomistes observateurs, que j'ai consultés, ne parlent de rien, qui en approche.*” Supra autem casus, in utroque libro recensitos, citauimus.

f) l. c.

2. Huius *vesicae* in loco, naturali conditioni congruo, *defectus*, non solum ab obseruatoribus, in hanc rem cultro anatomico inquirentibus, verum etiam Bonniana in ani orificio digitus applicatione, confirmatus.

3. Corporis prolapsi insignis *sensibilitas*, ab omnibus fere auctoribus, excepto solo GOUPIL, obseruata, cuius autem testimonio g) relatio eiusdem casus a LE SAGE h) nobiscum communicata, valde obstat. Quae vero sensibilitas maxima sensibilitati internae vesicae faciei valde congrua est.

4. *Muci* in eius superficie semper facta *secretio*, qui muco in naturali conditione ad tuendam ab urina acri vesicam et eam, ut lotum transeat, lubricam reddendam, secreto, simillimus est.

5. *Vreterum* in corpus hocce non solum semper, sed et a FLAJANI (§. 19.) eo modo obseruata *insertio*, quo vreterum in naturali vesicae statu *insertio* fieri solet, i. e. oblique per eius membranas facta.

6. Ingeniosum illud *experimentum Bonnianum*, quum in cadauere viri bene formati corpora cauernosa a se invicem dissecaret, et incisione vrethram, symphysin ossium pubis, integumenta abdominis, et anteriorem vesicae partem diuideret, tunc autem posteriorem vesicae partem digito ei applicato adeo protruderet, ut eius superficies interna

g) "Mais sans un sentiment très-vif." GOUPIL. l. c. p. 108.

h) L. c.

interna fieret externa, et cum vreterum aperturis promineret *i*). Id, quod naturalem morbi conditionem optime demonstrat.

§. 39.

Hic vesicae inuersae prolapsus semper *morbus* est *congenitus*. Datur quoque vesicae per vrethram prolapsus *acquisitus*, cuius exemplum *v. c. DE HAEN k)* in femina obseruauit, vbi antecesserant hernia intestinalis et prolapsus vaginae, male curata. Mulier violenta calculi digitis suis e vesica per vrethram eductione effecit, vt vesicae, eiusdemque inuersae, prolapsus integer fieret. At enim vero eiusmodi casus huc plane non pertinent, quum prorsus aliter se habent, quoniam nec vrethra bifida, nec imperforata est.

§. 40.

Notatu dignum adhuc videtur, me nullum exemplum inuenisse, vbi morbus in animalibus aliis obseruatus esset.

§. 41.

Experientiarum, de secretione et excretione vrinae factarum, et experimentorum, cum remediis diureticis institutorum, mentionem nunc facerem, nisi ad scopum huic libello propositum haec non pertinere mihi viderentur. Forsan in posterum alio loco obseruationum, quas COLLOT

E 3

non

i) BONN *l. c.* p. 37.

k) *Rat. med. T. I. Vindob.* 1757. p. 121 - 128.

non sine maximis difficultatibus instituere poterat *l*), et quibus hoc in casu occasio facta est optatissima, publice rationem reddam. Hic tantum addere liceat:

1. Ex vreteris sinistri orificio maiorem saepe quam e dextro vrinae copiam profluxisse, quod ex vicinitate renis sinistri et aortae deriuo, quo sit, ut sanguis maior copia et vi ad huncce renem proueniat, eiusdemque secretionem augeat. Quomodo in casibus vbi vreteres sese secabant, res se habuerit, nescio.

2. Ex nulla alia vesicae parte umquam vrinam profluxisse, quam ex vreterum orificiis. Inde, si a statu morboso ad sanum valeret consequentia, vias clandestinas ex tractu intestinali *ad vesicam* abeuntes, non dari, colligerem.

§. 42.

In duobus exemplis, scil. in casu a Cl. MICHAELIS obseruato et in eo, quem INNES *m*) describit, erectio quaedam glandis interdum aderat. An hac de re forsitan explicanda penis erectione quaedam colligi queant? Certe haec erectio absque musculari vi facta est (§. 23.).

l) COLLOT (*Traité de l'operation de la taille* p. 200.), qui feminæ magnum per vrethram calculum e vesica extraxerat, hanc dilatatam vrethram et vesicam cereo collustrauit, et lotii per vreteres exitum obseruauit.

m) “Though the penis be imperfect, yet when the glans is titulated with a warm hand, there is an evident swelling.”

INNES l. c. p. 438.

C A P. III.

MORBI AETIOLOGIA.

§. 43.

Caussa morbi proxima in genere nil aliud nobis esse videtur, quam *essentiale morbi*, adeo, ut omnimode rectam morbi definitionem si protulero, simul morbi caussam proximam proposuerim. *Caussa* igitur proxima morbi, de quo agimus, atque simul eius natura, est *prolapsus vesicae inuersae cum praeternaturali ossium pubis et partium genitalium formatione*.

§. 44.

Caussa efficiens totum morbum in hiatu ossium pubis quaerenda mihi videtur, qui, vti statuere certe licet, semper cum hoc morbo coniunctus est. Nam ex vnico exemplo, a Celeb. I. G. WALTER o) prolatto, qui eiusmodi ossium pubis hiatum describit, et quam optime delineari curauit, absque morbo de quo agimus, nihil aliud sequitur, quam dari eandem caussam sine eodem effectu, id, quod in arte medica saepissime accidit. Secessione ossium pubis a se inuicem corpora cauernosa ad latera mouentur, vrethra et vesicae anterior pars disrumpuntur. *Caussa*, symphyseos ossium pubis rupturam efficiens (§. 47.), etiam in vesicam ruptam agit, eamque inuertit et per solam in abdominis facie aperturam, scil. per annulum vmbilicalem, protru-

o) *De dissectione synchondroseos ossium pubis in partu difficulti.*
Berol. 1782. p. 22. §. 24 sq.

protrudit, quae apertura cutis tensione ossium pubis hiatum excipiente versus inferiora trahitur, locumque solitum derelinquit. Vrinae excretio nunc per vreteres fit, atque omnis vrethirae apertura plane euaneat. Integumentis abdominalibus ossium hiatu a loco suo demotis, ani quoque orificio plus iusto versus anteriora ponitur, et in cute abdominis duae plicae formantur, in quibus adeps deponitur. (Fig. EE.)

§. 45.

*Caussa praedispone*ns dupli, si quid recte videam, ratione spectanda est. *Generalis* enim caussa, hominem prae ceteris animalibus huicce morbo obnoxium reddens, secundum Ill. BLUMENBACH doctrinam in peculiari humanae peluis fabrica et structura quaerenda est. Nimirum peluis plus quam in vlo alio animali in latitudinem protracta symphysin ossium pubis breuiorem tenerioremque habet, ideoque ad eius ruptionem discessionemque magis prona dici potest. *Speciale*m autem caussam, hunc vel illum fetum prae aliis ad huncce ossium pubis hiatum praedispontem, quamuis facillimum sit, hypotheticum fetus in utero materno situm statuere, quo caussa in eum agens occasionalis ossa pubis separare queat, proferre non audeo, quum factis, quibus semper hypothesis, quae non ad opinionum commenta, quae, vt ait CICERO, delet dies, referenda est, plane careo.

§. 46.

De causa morbi occasionali nunc agentes, mentionem facere oportet opinionis multorum, qui morbum ab effectu imaginationis maternae oriri putent. RUY SCH p), v. c., MOWAT q), BERGEN r), a terrore, GOCKEL s) a vitio partium genitalium genti solito, SAVIARD t), qui similitudinem quandam vesicae cum podice gallinae inuenisse sibi persuasit, a desiderio matris per tempus ex quo grauida esset facta, gallinam comedendi, CESTARI u), qui casum nostro haud absimilem narrat, a mutatione desiderii matris fetum gestantis, modo puerum modo puellam cupientis,—

morbum

p) "An ex terrore? Mater enim paucis ante partum septimanis ex alto ceciderat." RUY SCH Op. l. c.

q) "The mother tells, that in May, before she was brought to bed of her first child, she was struck in the belly with a cow's horn; she recoverd the hurt in two or three days, but the fright remained longer with her, and did terrify her sometimes in her sleep." MOWAT l. c. p. 277.

r) "Mater est rustica Lebusina, quae, vt ipsa fatetur, medio circiter gestationis tempore a vicina sua vocata est, vt suem, cuius intestinum rectum prolapsum erat, teneret; praeter opinionem vero sus per pedes eius transcurrit, quo facto territa quidem, postea tamen sanum fetus enititur, hac genitalium deformatione excepta." BERGEN l. c. p. 385.

s) l. c.

t) l. c. p. 403.

u) In VINIZ. ORTESCHI giornale di medicina, T. III. p. 78.

morbum deriuant. Verum quum nostrum hic non sit, de eo agere, quod eiusmodi explicationes non sufficient, ad ea potius lectorem ablegemus, quae Ill. SÖMMERRING v) hac de re dixit.

§. 47.

Mater pueri, cuius morbum descriptsimus, quum in ultimis grauiditatis mensibus versaretur, corbem dorso ferens, grauiter humi cecidit, et ab hocce lapsu violento symphyseos ossium pubis in fetu secessionem totumque morbum ortum esse, credimus. Quae sententia maiorem adhuc acquirit probabilitatem eo, quod in nonnullis casibus modo (§. anteced.) memoratis, scil. in casibus, qui RUYSCHI, MOWAT et BERGEN narrant, quorum igitur ipsa verba in notis dedi, caussa aequa fortis et impetuosa, matris lapsum efficiens, aderat. In casibus autem a DEVILLENEUFVE x) et a BÖSEFLEISCH y) prolatis eiusmodi caussa violentior luculenter describitur. *Lapsum* igitur, quem mater grauiditatis tempore perpessa est, pro morbi caussa occasionali habeo.

v) *Abbildungen und Beschreibungen einiger Misgeburten etc.* p. 32.

x) l. c. p. 32. 33.

y) l. c. p. 438.

C A P. IV.

M O R B I C V R A T I O.

§. 48.

Miseram hominum hoc malo affectorum conditionem qui perpenderit, quum non solum ad nauseam vsque immundicie et sorditate laborant, odoremque vrinosum ingratissimum fundunt, verum etiam quoties vestibus tangantur intolerabilibus fere doloribus crucientur et cute femorum semper corrosi atque excoriati euadunt, sane mirabitur, eiusmodi malum tam saepe obseruatum, et nihilominus per longum temporis spatium ad lenienda aegrotorum incommoda nihil factum fuisse.

§. 49.

Fuerunt quidem, qui *curam radicalem* tentarent, v. c. MOWAT z), qui emplastro papillas texit, et BUXTORF a), qui creditam herniam reposuit, sed, quod exspectari poterat, malo cum successu. Etenim sicut iam CNEULINUS b),

F 2

BÖSE-

z) l. c.

a) "Tentauit tumorem istum in abdōmen reponere, et emplastro splenioque intra illud continere, siquidem herniosi aliquid prae se ferebat, facileque prementibus digitis cedebat, verum ablato emplastro et cessante pressione mox iterum prosiliebat." BUXTORF l. c. p. 105.

b) "Parentes chirurgi opera vtuntur, at vix superuicturum opinor." Ap. SCHENK l. c. p. 13.

BÖSEFLEISCH c), CASTARA d), aliique, quorum recensio inutilis foret, monent, eiusmodi malum omnem medelam radicalem respuit, quum nec cauum vesicae, nec vrethra integra adest.

§. 50.

Cura autem, quam dicunt palliatuam locum habere omnino potest. Ad optime eam instituendam requiri nobis videtur, ut vrina cum minimis aegroti incommodis in vase colligatur, ex quo prout libet eam effundere potest.

§. 51.

Primus, qui *machinam* huc spectantem inuenit est Cl. STOLTE e), quae secundum BONNII correctionem talis est f): In capsula quadam scutiformi, vbique abdomini rite accommodata, vesica, glans et scrotum continentur. In inferiori parte in infundibulum abit, quod in vas, inter femora situm et per epistomium euacuandum, aperitur. Superne fasciis ad abdomen applicatur, quae in tergo sese secant et in abdomine globulo fibulatorio iunguntur.

Quam-

e) "A la seule inspection je reconnus facilement, qu'il n'étoit susceptible de recevoir aucun secour, qu'il ne devenoit, qu'un objet de pure curiosité." CASTARA l. c. p. 323.

d) "Quum chirurgica operatio ob conformatiōem istam, situmque partium solidarum, a partu iam peruersum, periculi valde plena, quin inutilis futura fuisset, ita ut plures peritissimi medici et chirurgi, etiam exteri, eam pro plane impossibili declararint" — etc. BÖSEFLEISCH l. c. p. 435.

e) l. c.

f) III. BONN l. c. p. 42.

Quamquam me non fugiat, quanta haec machina afferat commoda, attamen vas illud, inter crura contentum, ingressum aegroti valde difficilem reddere mihi videtur.

§. 52.

Cl. DAN. LOBSTEIN g) incommodum hocce ita corrigerere vult, vt in inferiori quodammodo acuminata capsulae parte saccus e corio paratus ope trochleae affigatur, in quo vrina colligatur, qui quum repletus sit, facile solui et euacuari possit. At enim vero necesse mihi videtur, vt quauis externa in saccum facta pressione lotium versus superiora prematur, et in capsulam redeat. Id, quod valuula, quam Cl. LOBSTEIN in inferiori capsulae parte applicauit, vix euitari poterit. Etsi valuulam adeo mobilem, vt vna vel paucis vrinae guttulis aperiri queat, et tamen vrinae a vehementiori pressione redeuntis impetui sufficiente ratione resistat, factum esse ponamus, attamen saccum inter femora non sine magnis incommodis gestari posse censeo.

§. 23.

Audeo itaque, aliam mutationem proferre. Capsula scil. aenea, in margine corio, quod oleo perfusum sit, ob-

F 3

ducta,

g) Cuius machina descripta est in Cl. ARNTZ versione germanica tractatus Bonniani nota *) ad p. 29. et in Cl. C. F. BROCKHAUSEN *Diss. de excretionis vrinae impedimentis a vitiis membra virilis* Argent. 1781.

ducta, abdomini rite applicetur, ita, ut vesica et partes genitales in ea contineantur. Fasciis vtrique ansae, capsulae lateribus affixae, applicatis, supra coxas in abdomen globulo fibulatorio, et loris, vtrumque femur ambientibus, firmetur. Inferior eius pars instar infundibuli in fistulam flexilem e corio paratam, sed annulis metallicis in eodem semper lumine retentam, exit, per quam lotium in vasculum planum abit, cui ope trochleae affigitur, quodque vas aegrotus in braccarum funda reseruat, et quod toties, quoties repletum est, retorquere et euacuare potest.

T H E S E S.

I.

Caussa praedisponens morbi est morbus.

II.

Bilem iam ante eius in hepate factam secretionem paratam in sanguine contentam esse (v. Cl. FOURCROY in Annales de chimie T. VI. p. 181. T. VII. p. 154.) nego.

III.

a. *Problema Harueianum* (G. HARVEY de generat. animal. Lond. 1651. p. 263.) *plane sufficiente ratione solui non posse videtur, quoniam facto falso innititur. Etenim recens nati denegata respiratione non subito necantur.* (Cf. HALLER sur la formation du coeur etc. à Laus. 1758. Exp. 128. p. 343. — SENAC traité de la structure du coeur. à Paris 1749. p. 413. — HALLER elem. physiol. T. III. p. 314. — BUFFON hist. naturelle T. II. à Par. 1749. p. 446.)

b. *Ideoque doctorum quorundam assertio, omnem respirationem nondum aut vix inceptam cohibitam ad infanticia referri debere* (Ill. I. C. KOCH Institut. iur. criminal. Edit. 8va. Ien. 1788. L. II. C. XXX. §. 466. — b. C. G. LUDWIG Institut. med. forens. cura BOSE. Lips. 1788. §. 263.) *magnam requirit moderationem.*

IV.

IV.

Funiculi vmbilicalis deligatio intermissa ad infanticium absolute referri nequit.

V.

Aut omnino non datur venenum, aut quoduis medicamentum ad venenorum classem pertinet.

VI.

Praecipua febrium gastricarum et dispositionis gastricae caussa in methodo medendi antigastrica quaerenda est.

VII.

De salute publica quam maxime mereretur princeps Germanus, qui in regni comitia vesanam istam inter opificium barbitonsorum et artem chirurgicam consociationem destrueret.

VIII.

Philosophia morum corporeae hominum conditionis rationem semper habeat, necesse est.

FIGVRAE EXPLICATIO.

- A. Abdomen propensum, vmbilico carens.
 - B. Locus insertionis funiculi vmbilicalis.
 - C. Vesica vrinaria inuersa, eaque prolapsa.
 - DD. Locus vbi ex duabus papilliformibus vreterum aperturis vrina emanat.
 - EE. Tubercula duo longitudinalia (in delineatione non satis expressa).
 - F. Glans penis bifida.
 - G. Locus, vbi, si vesicam paululum remoueris, caput gallinaginis cernitur.
 - H. Praeputium.
 - I. Scrotum.
 - KK. Femora ob ossium pubis hiatum praeter naturam a se distantia.
-



