

**Dissertatio medica inauguralis, de ictero ... / Eruditorum examini subjcit
Dionysius Keogh, Hibernus.**

Contributors

Keogh, Denis
Robertson, William, 1721-1793
University of Edinburgh

Publication/Creation

Edinburgi : Apud Balfour et Smellie, academiae typographos, 1783.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/pn443wz4>


License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>




DISSERTATIO MEDICA,

INAUGURALIS,

DE

ICTERO.



DISSERTATIO MEDICA
IN AUGURALS

DE

ICTER

ANNUENTE SUMMO IN URBE
EX Auctoritate Reverendi admodum Viri

PROFESSORIS ROBERTSON, S. T. P.
ACADEMIAE EDINBURGENSIS Praeceptoris

IN AGRICULTURA

Et nobilissimi FACULTATIS MEDICAE Decretis
Amplissimi SENATUS ACADEMICI consensu

PRO GRADU DOCTORIS

SUMMISSIO IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS

Indictorum examini subicit

DIONYSIUS KEOGH

ICHTER

Soc. Phys. Edin. Soc. Honorari

Printed by J. Macfarlane, Edinburgh

Printed by J. Macfarlane, Edinburgh

EDINBURGH
Apud BALFOUR & SMELLIE

Academicae Typographiae

MDCCLXXXIII

DISSERTATIO MEDICA
INAUGURALIS,

DE

ICTERO.

QUAM,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

Ex Auctoritate Reverendi admodum Viri,

D. GULIELMI ROBERTSON, S.S.T.P.

ACADEMIÆ EDINBURGENÆ Praefecti;

NEC NON

Amplissimi SENATUS ACADEMICI consensu,

Et nobilissimae FACULTATIS MEDICÆ decreto,

PRO GRADU DOCTORIS,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS;

Eruditorum examini subjicit

DIONYSIUS KEOGH,

HIBERNUS,

Soc. Phys. Edin. Soc. Honorar.

Prid. Id. Septemb. hora locoque solitis.

EDINBURGI:

Apud BALFOUR et SMELLIE,

Academiae Typographos.

M,DCC,LXXXIII.

DIONYSIUS KEOGH.

EDINBURGH
AND BALFOUR & SMELLIE

Viro Spectatissimo,

Gulielmo Power Keating Trench,

De Garbally, in Comitatu de Galway,

Armigero,

Curiae Hibernicae senatori integerrimo, &c.

Ob plurimas quibus insignitus est

Virtutes,

Summaque in se suosque collata beneficia,

Hasce studiorum primitias,

Qualescunque sint,

In exiguam, etsi sinceram, animi grati

Tesseram,

Qua par est observantia,

D. D. C Q.

A U C T O R.

Galilmo Power Reading Trench

PETRO MKEOGH

De Genua, in Comitatu de Galway

Facultatis medicæ Viennensis Doctor

Amicus

Curia Hibernica fœderis Anglicani, etc.

Philosophiæ in Academia Patrua
Opuscula quædam insignita est

Doctor, et Medicus Licentatus

Summaque in re medicæ collata peritiss

In opido Athlone, in Comitatu de Roscommon
Hæc studiorum primitiæ

Feliciter exerceat
Qualicumque sint

Ilancæ diffinitionem
In exigua, est præterea, animi gratia

Amicis peritissæ pignus
Lectum

Quæ per est conservanda
Sæcra esse vult

P. D. C.

AUCTOR

AUCTOR

Item,

Confanguineo suo,

P E T R O M ' K E O G H,

Facultatis medicae Viennensis Doctori,

Nec non,

Philosophiae in Academia Pragensi

Doctori, et Medicinae Licentiatu,

Artem salutiferam,

In oppido Athleague, in comitatu de Roscommon,

Feliciter exercenti ;

Hancce dissertationem,

Amicitiae perfectae pignus,

Sacram esse vult

A U C T O R.

Item,

Constantino suo,

P E T R O M ' K E O G H,

Facultatis medicae Viennensis Doctor,

Nec non,

Philosophiae in Academia Praecepti

Doctor, et Medicinae Licentiat,

Artem salutaris,

In oppido Aethiopiae, in comitatu de Kalamunon

Feliciter exercenti;

Hanc dissertationem,

Amicitiae perfectae pignus,

Sacrum esse vult

A U C T O R.

DISSERTATIO MEDICA,

IN AUGURALIS,

DE

ICTERO.

NASCENTE medica arte, praeter
symptomatum narrationem, summa
cum cura diligentiaque factam, nihil fere a-
liud medici lucubrationibus dignum habe-
batur: Crescente autem scientiae aviditate,
majorique animi virium usu, philosopho
naturae mysteria inspicere, ac cujusque
phaenomeni aptas reddere causas, tentan-
te, tum demum medicus contemplationi
incubuit, eumque subiit cupido uniuscujus-
que symptomatis rationem explicandi.

Circuitus sanguinis inventio huic cupidi-
tati favit, atque aliis indagationibus ansam

A

praebuit.

praebuit. Quare sub idem tempus flavedinis icterum comitantis ratio reddita fuit, supponendo bilis quantitatem solito majorem in systemate sanguifero circulare. Verum hoc minime contenti, summa inquietudine agitabantur medici, donec ulterius progrediendo modus ipsius in circuitum introductionis ipsis notus evaderet, atque hic etiam voto potiti erant, supponendo bilem per poros biliarios hepatis regurgitatam fuisse. Speciosa haecce theoria universaliter admissa fuit, donec lymphaticum detectum fuit systema, quo intimatur, illam hypothesein naturae simplicitati magis esse congruam, quae supponit, bilem iis vasis, quae in caeteris corporis partibus immediata absorptionis instrumenta percipiuntur, forberi. Hoc factum est ut Galeni sectatores in diversas sententias distracti fuissent, alii recenti, alii veteri opinioni, pro virili adhaerentes.

Me, lauream Apollinarem in illustrissima hacce academia ambeuntem, cogunt sapientes ipsius leges ad dissertationis editionem,

onem, qua innotescat quantum in arte medicinali profectum feci. Ex ingenti morborum cohorte, humano corpori contingentium, eum tractandum seligo qui a Graecis Latinisque Morbus Regius, Arcuatus, Aurigo vel Icterus denominatus fuit, ab Anglis *the Jaundice*. Morbus hic, aetati nulli nullive generi proprius, haud infrequenter medicorum attentioni subjicitur, ac, etsi detectu facilis, attamen practicam saepe eorum effugit peritiam. Veruntamen ut majori ordine procedam, instituatur necesse est

MORBI HISTORIA.

Ætati nulli nullive temperamento peculiaris est icterus; ei tamen magis opportuni sunt adulti et aetate provectiores. Qui temperamentum cholericum sortiti sunt hoc morbo frequentissime affici dicuntur. Accedentem hunc morbum maxima ex par-

te * antecedunt languor atque lassitudo totius corporis, tensio pariter et dolor in hypochondrio dextro acutus, nonnunquam obtusus. Plus etiam solaminis experitur aeger sedens quam vel jacens vel exercitans. Nunc etiam tunica oculi adnata et ungues flavedine deturpentur insolita, quae, ingravescentibus caeteris symptomatibus, magis fit colorata, perque omnes corporis, vel durissimas partes, diffunditur, adultoque morbo, externa omnia objecta quasi flavedine tincta apparent. Cutis prurigo obtinet, ipsa arefcit, calorque mordax in naribus sentitur. Morbi hujus impetum nonnunquam comitatur horror levis, quo obtinente, caloris gradus pulsusque velocitas praeter solitum majores percipiuntur; in aliis casibus deprimitur pulsus. A principio sensus ponderis, anxietas, et praecordiorum angustiae cum spirandi difficultate, sentiuntur. Inertia, oppressione, somnolentia, afficitur aeger, et

* Nam hic observetur, flavedinem oculorum caeterarumque corporis partium nullo praevio symptomate accidisse.

et nonnunquam parum recreatus fomno solvitur, dum alii capitis dolore et insigni excruciantur vigilantia. Ægri appetitus et digestio attenuantur, atque post repletionem augetur praecordiorum oppressio, dolorque excrucians circa cardiam percipitur. Nausea vomitusque haud infrequenter occurrunt. Saliva quandoque colore flavo tingitur, et quicquid ore sumitur amarescere videtur. Ingens aliquando fitis. Urina flavo-rubra apparet, sedimentumque luteum deponit, ita ut immerfis linteis vel chartulis croceo colore tingantur. Pigra plerumque stringitur alvus, et borborygmis, flatibus, atque torminibus, saepe vexatur aeger. Faeces alvinae pallent vel albescunt, foetorque, si non omnino omissus, magno-pere diminuitur.

Haec sunt omnia aut saltem praecipua quae in morbo regio obtinent; at si inveterascant symptomata, producitur ista icteri species quae ab auctoribus *ater* vel *niger* appellatur. Status hic morbi tam nitide
ab

ab Aretaeo depingitur, ut ipsius verba hic loci praetermittere nequeam :

“ Quicunque nigro arquato laborant, in
 “ his ater color viridi commixtus apparet.
 “ Iidem frigent, imbecilli, desides, tristes,
 “ atque demissi animo sunt. Tetrum odo-
 “ rem exhalant, gustatum amarum ha-
 “ bent ; spiritum non facile ducunt : In
 “ ventriculo morsum percipiunt, alvi ex-
 “ crementa porracea, subnigra, arida
 “ sunt, aegreque descendunt. Urina be-
 “ ne colorata est, ad nigrius vergens. Ad-
 “ haec cruditate laborant, cibum detestan-
 “ tur, vigilant, moerent, melancholia agi-
 “ tantur *.”

Cum statum hunc attigisset morbus, vix medelam admittit ; nam corpus tamdiu solita privatum nutritione, ob morbum obstinaciter praevaletentem, exhauritur, hydropeque, haemorrhagia, aut sudoribus colliquativis advenientibus, miseranda vita cum optanda morte commutatur.

DEFINITIO.

* Vid. Aretaei lib. prim. cap. xv.

D E F I N I T I O.

Definitioni a celeberrimo Culleno traditae, utpote caeteris omnibus longe praestanti, adhaerendum mihi videtur.

“ Flavedo cutis et oculorum ; faeces
 “ plerumque albae ; urina obscure rubra,
 “ immixta colore luteo tingens *.”

D I A G N O S I S.

Symptomata quorum in definitione mentio fit, ita huic morbo propria sunt, ut nulli obtinere queant, quin revera adsit icterus ; quare inutilis forsan evadet diagnosi. Verum, quoniam in morbis nonnullis, ut in febre flava Indiae Occidentalis, in chlorosi, et in iis a venenosorum animalium morfu oriundis,

* Gener. Morb. Cullen. G. xci.

oriundis, flavedo percipitur, haud casse me operam navaturum occurrentis hujus symptomatis rationem reddendo, quae ad rectae diagnoseos institutionem conducat, arbitror. Medicorum plurimorum auctoritate fretus, asserere ausim, in febre flava Indiae Occidentalis, symptomaticum existere icterum, qui originem a nimia bilis secretionem ducit; cui favent conditiones nonnullae in tempestate et in plaga ubi morbus obtinet, talesque conditiones bilis secretionem solito majorem producant, idoneo corporis statu prius inducto. Qua auctoritate innixus, asseruerim auctam bilis secretionem icterum gignere, ex dicendis innotescet.

In chlorosi nonnunquam percipitur flavedo, quae, me judice, oritur a systematis laxitate, sanguinisque tenuitate, locum feri effusioni praestantibus, oritur. Flavedo praeterea, hunc morbum etsi diuturnae durationis, comitans, non est aequae colorata ac in ictero ejusdem continuationis; desuntque tensio atque dolor circa hepatis regionem, vel ante, vel per icteri cursum haud infrequenter percipienda;

percipienda ; defunt infuper faeces albiae,
&c. unde fit ut facilis inftituatur diagnofis.

Quod autem ad flavedinem animalium
venenoforum morfibz oriundam attinet ;
imprimis femper generalis non eft, fed lac-
fo membro fere propria ; non primo in tu-
nica albuginea oculi percipitur ; defuntque
faeces albiae atque urina obfcure rubra,
&c. quarum in definitione mentio, potuif-
que a quadam feri mutatione quam ab ab-
forpta bilis quantitate oriri videtur.

CAUSÆ PRÆDISPONENTES.

De praedifpofitione, nihil fere certi ad-
ducitur, fiquidem exigua inter hunc mor-
bum et vitae genus, diaetam feu plagam
connectio intereffe videtur. Homines autem
fedentarii, eique qui ingratis animi affecti-
bus premuntur, frequentius ictero laborare
dicuntur ; hinc orta obfervatio foeminas
huic morbo viris effe opportuniores, litera-
tos, prae caeteris hominibus, quia nempe

minore exercitatione utuntur. Hic observare abs re non erit, immodicum potus validi usum, juxta nonnullos, tot hepatis morbis ortum praestare, quot, aliud quodvis, unde juxta eosdem pro causa icteri praedipponente habetur.

In plethoricis, quum sanguis nimiam ad vaforum vim proportionem dicit, elanguet circulatio, praesertim in vena portarum, fitque languidus per hepar motus, qui morbo praedispositionem inducere forsan potest.

Subsequitur etiam, ut ex observationibus patet, menstruorum seu haemorrhoidalium fluxuum obstructionem, intempestivam intermittentium medelam, imprudente corticis Peruviani usu, insuper in hypochondriacis et hysteriis occurrit. In calidis regionibus atque tempestatibus, augentur bilis secretio et excretio, unde nova icteri productioni praedispositio.

CAU-

CAUSÆ OCCASIONALES

In fequentes dividi possunt,

1mo, Quae ductuum latera comprimen-
do bilis in intestina descensum impediunt.

2do, Quae in canalibus existentes eos
obstruunt, et bilis excretioni interruptionem
inferunt.

3tio, Tunicarum morbi, qui transeunti
in duodenum bili impedimento sunt.

4to, Eae causae quae auctam bilis secre-
tionem excitant.

Inter causas primo modo agentes, hae
praecipue audiunt. Inflammationibus seu
schirris oriundi tumores, in hepate, pan-
create, ventriculo, duodeno, glandulis me-
sentericis, omento, partibusque vicinis. Hi
comprimendo ductus, adeo ut impediatur
bilis in intestina transitus, icterum produ-
cere inventi sunt. Adnascente carne prope
ductum communem, morbus pariter exo-
riri

riri videtur *. Gravidas etiam mulieres nonnunquam subit, ex eo quod tumidus uterus comprimat ductus; post partum autem evanescit. Flatibus ac induratis faecibus ita distendi possunt intestina, ut, distensione, latera ductus communis, ubi oblique per duodenum transit, conjungantur, bilisque in intestina introductionem impediant; quare inter causas occasionales recte recensentur.

2do loco considerandae veniunt causae quae in canalibus existentes bilis excretioni interruptionem inferunt; hujus generis sunt *concretiones calculosae*, quae inter omnes icteri causas primum sibi locum vindicare merito videntur; haud infrequenter in cystide fellea eam maxime distendentes, in ductibus biliariis quos opplent, at rarius in poris biliariis et hepatis substantia, inveniuntur. Harum natura adhuc minus inspecta est; probabile tamen est vim quandam attractivam inter stagnantis bilis particulas

* Vid. Bonet. l. iii. sect. 13. obs. 13.

ticulas existerre, quae his originem dat. Cui hypothefi robur impertit V. Swieten experimentum, quo constat bilem in vitreo vafe, ut in putredinem abeat, inclufam, grumos depofuiffe calculofos.

Biliarios inter et falivarios, atque etiam urinarios, caeterosque corporis calculos, verum intereft difcrimen. Improperie quidem lapides nominantur, fi quidem nec lapidofa nec terreftreis materia eorum compositi-
nem ingreditur. E materia febacea componuntur, reliquis oleis animalibus fpi-
fiore, foliditate fpermae caeti haud abfi-
mili. In biliariis concretionibus infig-
nis a centro verfus fuperficiem adest cry-
ftallizatio, per lapidis centrum confecanti ap-
parebunt radiatae cryftallizationes, inter-
nae fuperficie perpendicularares; percipitur
fuscae materiae nucleus, quem cryftalliza-
ta circumdat materies, fuper qua fubnigrum
forfan et coagulatum ftratum cum crufta
exiftit. Aqua calcis, faecibus alkalinis,
vel fapone minime afficiuntur calculi, funt-
que in hoc fpermae caeti analogi. Horum
plerique in aquam immerfi fupernatant,
dum

dum nonnulli fundum statim petunt. Magnitudinis formaeque diversae, frequentius autem angularis, sunt. Absque gravi aegrotantis dolore calculi in cystide diu adesse possunt. At si, per validam exercitationem aut corporis commotionem, calculus in ductum cysticum protrudatur, modo peramplus fit, icterum producet ductum communem comprimendo. Verum, si in hunc admittatur, coerceri poterit in descensu ubi duodenum ingreditur communis ductus, sicque icteri causa evadet. Quando hicce morbus calculo communi ductu inhaerenti tribuendus est, modo calculus irregulari forma donetur, corporisque agitatione, aliave qualibet causa, ita situs sit, ut canalem accurate non occupet, et bilis descensionem omnino non impediat, gradatim evanescit morbus, donec casu aliquo ita situs evadat calculus, ut canalem impleat, atque sic morbus reproducatur. Hoc modo icteri periodice recurrentis ratio redditur; verum ex aliis causis, ut viscida bile, vel spasmo, originem ducere potest.

In

In hominibus sedentariam vitam degentibus, occurrit icterus a bilis in cystide mansionem, quae adeo spissa facta est, ut aegre per ductus transeat, et quamvis per cysticum ductum transiisset, ac inferiorem communis ductus extremitatem attigisset, tamen ita viscida esse potest, ut per eam partem, quae oblique duodeni membranas intrat, transire nequeat, atque creabitur morbus, qui quidem diu non perdurabit; nam emeticis aut catharticiis cito removetur.

3tio, Post plurimas dissectiones, ipsae ductuum tunicae morbi sedes reperiuntur; constatque ex observationibus anatomicis, eas ita condensatas, et etiam ossificatas esse, ut bilis in intestina transmissioni impares prorsus sint, nullumque canalis superfuisse vestigium, quibus in casibus lethalis est.

Animi affectibus, aut vehementi exercitatione oriundus, ductuum spasmus plerumque inter icteri causas recensetur, quamvis nuperis diebus a primae notae viris negetur, qui asserunt, nullam cystidis vel ductuum tunicam muscularem post dissectionem

nem percipi; post irritationem nulla frui contractionis vi; et denique, si spasmus icterum producere possit, multo frequentius occurreret. Ut his respondeatur difficultatibus innotescat, ex eo quod musculares fibrae non percipiantur, concludi non posse, eas non adesse; nam plurima in aprico sunt exempla, quae probant, post dissectionem, nullam fibram muscularem detectam fuisse, attamen muscularem extitisse actionem. Quod autem ad vim contractionis attinet, certe aliquid erroris necessario hic supponendum; nam modo vi musculari priventur, quomodo explicabitur bilis a ductu hepatico in cystidem ascensio? quomodo obtusi doloris cystidis distensionem, aut acuti doloris calculorum per ductus descensum comitantis, ratio reddetur? quomodo etiam opii caeterorumque antispasmodicorum usum in ictero removendo explicare poterimus? Denique, ab hisce considerationibus, et aliorum vasorum excernentium analogia, maxima datur ratio cur supponamus, ductus biliarios musculari vi non destitui,

destitui, eorumque spasnum icterum producere posse; neque enim ultimum a spasmi adversariis allatum argumentum contra hanc suppositionem facit; nam in aliis exemplis observatum est, testis inflammationem animi affectus subsecutam fuisse; verum hoc rarius occurrit, neque semper animi affectibus producit.

4to capite comprehenduntur causae auctam bilis secretionem excitantes. Frigus corpori applicatum, sanguinem ad partes internas determinando, hunc producit effectum. Emetica fortia, viscera abdominalia agitando, circuitum expediendo, ductusque biliarios emulgendo, bilis secretionem augent. Purgativa draastica, intestina irritando, ob nexum cum hepate, eodem modo agunt. Denique, stimuli omnes corpori applicati, et praecipue hepati, hujus generis effectus edunt. In priori hujus dissertationis parte praemonui, me auctoritatem prolaturum, cur supponerem icterum ex aucta bilis secretionem enasci posse. Hoc quidem suadet Monroius, cujus et anatomi-

cam et physiologicam praestantiam nemo nescit. Hanc opinionem amplexus est, quia ratum habebat, in febre flava Indiae Occidentalis tantam adesse bilis redundantiam, singulari cuidam febris in hepar actioni tribuendam, ut vomitu et alvi levatione redderetur; et insuper ex eo quod infantes statim post partum nonnunquam (nam saepius mucosa seu glutinosa materie ductui communi inhaerente exoritur) cutis oculorumque flavedine dehonestantur, dum biliosa laborant diarrhoea, quod demonstrat ductuum obstructionem non obtinuisse. In duplici casu supponit bilem, sano corpore, vi stimulante, concoctioni et intestinorum actioni inservire, sed, ipso infirmo, cum major adsit bilis quantitas, tunc stimulum augeri, majoremque fieri bilis absorptionem, quod ictero locum praebet.

CAUSA

CAUSA PROXIMA.

Enumeratis modo fatis luculenter remotis icteri causis, stabilienda nunc superest causa proxima, aut ea qua bilis per corpus diffunditur.

Nunc dierum, indigna forsan habebitur doctrinae memoratio, quae olim in medicinae scholis floruit; ea nempe quae supponit impeditam bilis secretionem causam esse icteri proximam. Admissa autem ex omni parte hujus sententiae absurditate, statim ad investigationem doctrinarum regurgitationis et absorptionis memet accingo.

Quoad regurgitationem, si enumeranda suscipiam omnia argumenta quae ad hancce opinionem suffulciendam allata sunt, debitos hujus opusculi fines egrediar necesse est; praecipua igitur tribus sequentibus contenta, solummodo proferam. *Imo*, Ad stabiliendam hanc opinionem, assertum fuit, regurgitationem

gurgitationem in systemate tum arterioso tum venoso locum obtinere, ac proinde nullam esse rationem quare in bile non contingat. Verum claudicat haecce analogia; nam secretioni adhibetur quod in circuitu generali accidit, nihilque ex hoc deduci potest quod opinioni faveat. Notatum quidem dignissimum foret casus regurgitationis, fluidi secreti in progressu impediti, in systema sanguiferum, attamen ne quidem hoc extra litem constitueret rem; nam tam frequenter falsa probatur analogia, ut nullatenus ad veritatem asserendam sufficiat; neque enim creditu facile est, talem qualem depingit Eustachius, sui que sectatores, retrogressum, obtinere posse, propter anastomoses; verum esto ad instans, quod haec vera sint, esto quod bilis regurgitetur. Si tantilla resistantia bili in systema sanguiferum repellendae aequa sit, procul omni dubio idem effectus produci debet premendo ductus dum fluido distenduntur; si ulla autem illustrissimo Monroio fides habeatur, constat, ductus animalium hepaticos,

hepaticos, impositis ligamentis, fluido distentos, maximae pressiois ope, talem producere non posse effectum; citius etenim ipsi ductus, quam partes posteriores, cederent. Initisque examinibus compertum est, nec communicationes cum sanguine auctas esse, nec bilem in hepatis vasis repertam esse.—2do, Aliud argumentum ab hujus sententiae fautoribus, hoc est nimirum, injectiones a ductu hepatico in venam portarum et venam cavam propelli posse. Verum, ex auctoritate illustr. Monroi, Hunteri, et Hewsonis, hoc nunquam, illaesis vasorum tunicis, contingere assero. Atque, ut hoc clarius probetur, injectiones semper inveniri in bullis diversis, a sese aliquatenus distantibus, ac nullatenus ordinem in sanguinis circuitu perceptum tenentibus, notetur. Et certe Hallerus ipse, atque Mecklius fateri coguntur, majorem esse resistantiam hac in corporis parte quam in ulla alia; ac pro certo noscimus, validos conatus ad tenera haecce vasa disrumpenda necessarios minime esse. Praeterea
non

non magis regurgitationi quam absorptioni favet praefatum argumentum; quia nempe multo facilius vasa lymphatica e ductu hepatico quam venae cavae hepaticae injiciuntur.—3tio, Ad ultimum nunc argumentum devenimus, quo asseritur, calculum in ductu cystico repertum fuisse, et ipsam cystidem distentam, ac tamen aegrotum ictero non laborasse. Quoniam autem in praedicto casu bilis ex hepate in intestina descensio impedita non fuerit, evidens emanat conclusio, scilicet, allatum argumentum nec ullum robur regurgitationis, nec ullam objectionem absorptionis doctrinae praestare. Partes fluidiores per vasa lymphatica absorptas fuisse, extra dubii aleam constituit liquoris in cystide visciditas, atque nisi invicte demonstretur, cystidis contenta per longum temporis spatium in vesica fellea remansisse, nihil sane lymphaticorum viribus adversum deduci potest, neque ulla propitiis pro regurgitatione conclusionibus anfa suppeditabitur.

Perpenfis

Perpenſis igitur maximi momenti argumentis regurgitationi faventibus, eorumque ineptia ſtabilita, rationi conſonum me acturum arbitror, aſſenſum, quem tali opinioni denego, abſorptioni praeſbendo, et poſterioris ſententiae ſectatoribus ea praeſciſe ratione adhaerendo, quod plurima argumenta, quorum enumerationem breviter ſuſcipiam, in aprico ſint, quae rei veritatem luculenter evincant.

1mo, Vaſorum lymphaticorum commune eſt officium, partem uniufcujuſque fluidi in diverſis corporis cavitatibus ſecreti abſorbere aut imbibere.

2do, Lymphaticorum circa quodlibet viſcus contenta praeſciſe quadrant cum ſecreto talis viſceris fluido.

3tio, Abſorpta quantitas lymphaticorum numero atque magnitudini proportionem dicit.

4to, In hepate inveniuntur lymphatica numero plura quam in ullo alio abdominis viſcere.

5to,

5to, Fluidum in lymphaticis, coagulatum bilis partem, spissitate aequans, detectum fuit.

6to, Innumera extant exempla absorptionis substantiarum vel acerrimae bili acrimonia haud inferiorum.

7to, et *postremo*, Ossium atque thymi substantia per lymphatica absorbetur.

Singulatim exposita lymphaticorum in hepate proportione, quaeretur forsan, quare semper bilem non imbibant? Responsionis loco observetur, aequam esse suppositionem, talem introductionem aliqua ex parte obtinere; at motus bilis post secretionem in hepate impedit, quo minus patula eorum ora recte applicentur. Ab Hewfone praeterea probatum est, plura requiri, ut generalis lymphaticorum circa canalium cavitationem actio producat.

In intestinorum injectione, ut idem observavit, cum tunicam villosam penetravisset injectio, villos erectos esse, eorumque extremitates spongiosas et porosas, et lymphaticorum orificia nunquam nisi post perfectam

fectam villorum erectionem, ad munus apta esse ; hinc igitur ait,

“ Whenever much absorption is required here, a certain degree of stimulus and distension must take place, to render the blood-vessels of the villi turgid, that the orifices of the lymphatic vessels may stand open, and be capable of attracting, like capillary tubes.”

Jam vero eidem arguendi methodo insistere possumus quoad ductus biliarios ; nam tunicis musculari et villosa donantur, quae, cum progredienti bili nullum sit obstaculum, relaxantur, atque in hoc statu vis orificiorum valde imminuta est ; verum, juxta praeclarum Hewsonem, dum ductus obstruuntur, et bile distenduntur, augetur orificiorum vis, fiuntque ad absorbenda fluida aptiora.

Contra hanc opinionem urgebitur forsan ascitis casus, in quo distensio revera adest absque aucta absorptione ; huic vero argumento obviam ire inutile foret, quia conditiones praedictae in canalium cavitatibus

locum tantummodo obtinere supponuntur. Praeterea, haecce affectio a lymphaticorum morbo, aut ab impedito lymphae in receptaculum chyli progressu, originem ducit. Recte igitur perpenſa argumenta haec, tanti, ut opinor, erunt ponderis, ut bilis absorptionem praeternaturalem causam icteri proximam invicte stabiliant.

QUORUNDAM SYMPTOMATUM EXPLICATIO.

Languor et lassitudo.—In frequentissimo icteri casu, impedita supponitur bilis in duodenum descensio, quo fit ut intestina, solito privata stimulo, torpida evadant, et inertia, ac, ob sympathiam ventriculum inter et intestina, per totum corpus generalis languoris et torporis sensus diffunditur.

Tensio et dolor in hypochondrio dextro,
—Ab accumulata in cystide bile ipsius tunicas gradatim distendente, ac dolorem obtusum

tufum producente, pendent ; at cum acutior fit dolor, hoc irritationi aut diftentioni, calculorum defcenfu oriundis, tribuendum ; nam eo acutior aut obtufior erit dolor, quo majores aut afperiores fuerint calculi.

Oculorum, cutis, urinae, falivae, &c. flavedo—Pendet a miftura cum fanguine bilis abforptae, quae in circuitum refumpta, fecretiones omnesque corporis partes afficit, majore albugineae albore, mutationem oculi magis fenfilem efficiente. Visio flava a tinctis oculi humoribus, qui objecta quafi per flavum medium repraeſentant, pendet.

Corporis pruritus, calorque mordax in naribus.—Communicata cutaneis nervis irritatio, bile, cum materia perſpirabili mixta, et fenfilitas nervis Sneiderianae membranae propria, hocce effectus explicatu faciles reddunt.

Sensus ponderis, anxietas, praecordiorum anguftia, ac ſpirandi difficultas—Explicanda eveniunt, vicinis hepatis vafis cyftidis et ductuum diftentione compressis, unde fanguinis circuitu obſiftitur, ac in pulmonibus
formatur

formatur congestio, caetera producens symptomata.

Nausea et vomitus,—Plerumque a consensu ventriculum inter et reliquum corpus pendent. Nonnullis in casibus, nausea vomitusque duodeno calculis irritato exoritur.

Pigra stringitur alvus, faeces albescunt, &c.—Bilis cum sanguine mistura non solum est detrimentum ex tali eventu repetendum, cum ad alvum stimulandam, aliofque salubres edendos effectus adeo necessario fit; nil igitur mirum si, ipsa absente, adsint obstipatio, aliaque jam recensita symptomata.

P R O G N O S I S.

Exiguae erit durationis icterus, remotis, five natura five arte, causis eum inducentibus. In juvenibus ac robustis, quam in senibus infirmisque, minus adest periculi.

Si

Si ab hepatis aut partis adjacentis schirrositate, aut concretu, aut ductuum offificatione repetatur morbi origo, exitialis plerumque evadit. Hydrope, haemorrhagia, aut sudoribus colliquativis supervenientibus, medellam vix admittit morbus. Sudor autem naturalis prospero eventu accidit, ac diarrhoea biliosa morbi resolutionem infecuta est. Urina pallida, dum flavescit cutis, mali ominis est, oppressio ingens, animique deliquium, mortem portendunt. Haec omnia accidant; sed quoniam superius dixi calculos multo frequentissimas esse hujus morbi causas, et equidem pauci sanantur qui calculos cum faecibus non evacuaverint; idcirco, maxima ex parte, foelicem icteri exitum sperare possumus, eo majore vel minore periculo comitatum, quo magis vel minus cum aliis morbis nectatur, quo plus minusve febris adsit. Icterus a leviori hepatitide natus, quae per benignam resolutionem curari potest, facile cedit.

M E D E N D I R A T I O.

Ut ictero occurratur, quamplurimum causae occasionalis naturae attendere debet medicus. Quatuor sequentes stabiliendae sunt indicationes,

1mo, Viscerum in communem ductum pressionem auferre.

2do, Causam obstructionis in ductu ipso submovere.

3tio, Ductum tunicarum morbis obviam ire.

4to, Bilis secretionem minuere.

Viscerum in communem ductum pressionem auferre.—Ad huncce finem assequendum, febris gradui morbum comitantis sedulo est attendendum ; ac, modo gravis sit, suspicandi locus dabitur generis inflammatorii tumorem ductum comprimenter esse, et inflammationi, sanguinis missione, ac anti-phlogistico

phlogistico regimine, obviam eundum est. At, si tumor schirri naturam induit, difficillime resolvetur, etsi mercurio, pulsatilla nigricante, cicuta, aquis mineralibus, sale alcalino aut neutrali, utamur. Verum, si caro adnascens sit obstructionis causa, uti removeri non potest, sic morbus insanabilis.

Causam obstructionis in ductu ipso submovere.—Hujus generis, ut antea dixi, sunt calculi, bilis viscida, aut materies mucosa, et, ut ea submoveamus, tentanda est ipsorum expulsio seu evacuatio. Ex praedictis liquet, quam incassi fuerint conatus omnes calculos solvere mediis ad id efficiendum usurpatis, viz. Gramine, aqua calcis, sapone, alkalinis substantiis, aqua aëre fixo impraegnata, et spiritus vini cum oleo terebinth. mistura, quorum nonnulla extra corpus huncce effectum facile edunt; sed ex eo, quod hoc extra corpus accidat, an exinde sequitur hoc idem intra corpus contingere? Nonne probandum superest, haec ita immutata calculum attigisse, ut optatum producere valeant effectum. In hoc morbo,

morbo, quando gramen, fapo, vel substantiae alkalinae utilia fuere reperta, non, ut mihi videtur, calculos solvendo, sed potius intestina stimulando, partiumque consensu, obstructionis expulsiōem promovendo. Emeticis secunda aut tertia quaque die repetitis, ineunte morbo, corpus agitando in calculis, viscida bile, aut materia mucosa expellendis, fauste utimur; praeterea absorptioni favent, ac ita dolorem, e vesica fellea bile distenta ortum, saepe minuunt. Quoniam vero unicuique morbi generi accommodata non sint, nisi primis diebus utilia inveniuntur, diutius adhibenda non sunt. Laudantur etiam acria cathartica ad promovendam calculorum, bilis viscidae, faecum induratarum expulsiōem; verum tanto, quanto emetica, commodo non usurpantur. Purgativa attamen, prout res poposcerit, falis Glaub. rhei ol. ricin. aloes, uti aegri gustui gratius, bilis locum in intestinis supplendo, optimos edunt effectus, removendo eorum torpiditatem, ac promovendo obstructionum evacuationem. Nimius autem eorum

rum

rum ufus debilitatem inducit, ac itaque caute funt repetenda. Enemata non modo bilis vices aliquatenus gerunt, fed etiam ut fomenta utilia inveniuntur.

Ductuum tunicarum morbis obviam ire.—Hic operam ludimus fi in ictero, offificatione, aut ductus communis concretu oriundo, medelae ftudemus, nil poteft ars, ac morbo plerumque obruitur aeger. Quando autem fpafmus unice agit, aut cum calculo ductui inhaerente conjunctus, anti-fpafmodica indicantur, ut balneum tepidum, fomentationes, opium, &c. quibus fummo commodo utimur, dolorem calculo productum mitigando, irritabilitatem minuendo, fpafmum leniendo. Opii ufu augetur alvi adftrictio, cui laxantibus occurrendum eft.

Bilis fecretionem minuere.—Cum ab aucta bilis fecretionem pendeat icterus, inteftinorum irritatio, valida exercitatio, ac caloris augmentum, fedulo funt vitanda; fanguinis ad hepar determinatio diverti debet, fanguinem in vafa extrema modo minime ftimu-

lante propellendo. Si autem a duodeni contentorum acrimonia originem ducat aucta secretio, purgativis drafticis neglectis, eorum loco fufficiantur mitiffima laxantia ad eam removendam. Diluentia ad acrimoniam minuendam ufui funt ; fed cavendum eft ne nimis calida aegro dentur.

Haecce remedia funt, quae in ictero utiliffima reperta funt ; fed notatu indignum forfan haud foret, nonnullis in cafibus, quando urina maxime biliofis particulis tincta fuiffet, minus periculi adfuiffe, ac exinde ortum effe diureticorum ufum ; ad fanationem autem perfectam parum conferunt, fed, modo ufurpentur, diluentia anteponenda funt. Notum quoque eft, fudorem naturalem ictero finem impofuiffe, hincque diaphoreticorum ufus ; fed his pariter praeferrantur diuretica, et quoties fufpicandi anfa praebetur inflammationi difpofitionem praevalere, toties caute a ftimulantium diaphoreticorum ufu abftinendum.

Equitatio atque ambulatio praefantiffima
funt

sunt remedia, fere nunquam omittenda. Torpore atque languore obrutum aegrum sublevant, ciborum appetentiam afferunt, leniter obstructionum expulsiōni favent, cumque stomachicis, amaris, atque diaeta valente conjuncta, tonum ventriculi totiusque systematis restituendo, utilissima.

F I N I S.

in remediis, sed in modum omittenda.
 et opus est, ut in modum omittenda
 in remediis, sed in modum omittenda.
 et opus est, ut in modum omittenda.
 in remediis, sed in modum omittenda.
 et opus est, ut in modum omittenda.