

De morbo scorbuto liber cum observationibus quibusdam, brevique et succincta cujusque curationis indicatione ... / [Severinus Eugalenus].

Contributors

Eugalenus, Severinus, 1535-
Brendel, Zacharias, 1553-1626.
Stubendorff, Josef.

Publication/Creation

Hagae-Comitis : Typis Adriani Vlacq, 1658.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/jzr73vkg>


License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



DE MORBO
SCORBUTO

1658








21928/A

EUGALENUS (Severinus)



So

Cu

S

T

DE MORBO

42530

SCORBUTO


LIBER

Cum Observationibus quibusdam, brevique & succincta
cujusque curationis indicatione.

Authore

SEVERINO EUGALENO
DOCCV MANO.

Editio ultima recognita & emendata.



HAGÆ-COMITIS

TYPIS ADRIANI VLACQ.

ANNO M. DC. LVIII.



L

N

auce

annu

Viri

G A

mi d

omni

bus il

volge

dicin

finer

prop

long

nibu

tor f

com

niz,

tam

trib,

fpic

tem

libe

cent

post

LECTORI CANDIDO. S.

Non ut in mustaceo laureolam
quærerem, Lector optime, aut ex alieni
operis editione gloriolæ vel famæ aliquid
aucuparer, sed publicæ duntaxat Utilitatis gratia,
annum jam Unum & alterum hoc saxum volvi, ut
Viri clarissimi & optimi SEVERINI EU-
GALENI, Medici peritissimi juxtà ac fidelissi-
mi de Scorbuto liber, distractis jam exemplaribus
omnibus, denuo prodiret in lucem. Cum enim mor-
bus ille, qui ad imitationem nominis Germanici
vulgo Scorbutus; Plinio Stomacace & Sceletyrbe
dicitur, ab annis jam aliquot non se amplius intra
fines & Pomœria sua, sive in iis regionibus, quarum
proprius & indigena habebatur, continere, sed
longè lateq; grassari, adeoq; nostris quoque homi-
nibus frequens & familiaris esse cœperit: sæpè au-
tor fui Medicinæ candidatis, ut librum hunc sibi
compararent, attenteq; legerent, eò quod ea om-
nia, quæ ad facilem, expeditam, certam & accura-
tam ejus morbi dignotionem viam munire discen-
tib. possunt, diligentissimè omnium, maximeq; per-
spicuè exposuerit. Cæterū cum aliquandiu frustra
tentatis omnibus, tandem tamen obtinuissem, ut
liber ille ederetur, dedi operam, ut editio hæc dis-
centium usibus esset accommodatior. Et quia autor
post explicatam paucis morbi essentiam, mox sive

ADLECTOREM.

symptomatum, five specierum hujus enumerationē instituit bene longam (quanquam plura etiam addi his posse non dubito) in qua tacitè sæpe & sine accurato ordine tum regulas tradidit de signis quibus & morbus ipse universè & speciatim singula ipsius symptomata cognosci queāt, tū obiter & quasi aliud agēs prognostica adjecit de futuris eventibus: tum deniq; indicationes & medendi rationem generatim speciatimq; mōstravit: ego ut cōspectiora essent omnia, præter notas marginales, capita ipsa numeris distinxī: regulas diagnosticas, prognostica ab hypothēsi nonnunquam ad thesin translata, & Canones therapeuticos seorsim excerptos velut in tabella exposui: catalogum affectuum, quorum in observationibus autor meminit, & rerum indicem mutavi non nihil ex ipso contextu, & accessione quadam locupletavi: errata etiam typographica, quibus magna ex parte paginarum in exemplis veteris & recentis hujus editionis diversitas occasionem præbuit, quoad potui emendavi: & ad extremum alios quosdam utilissimos de eodē morbo tractatus adjeci. Hæc igitur omnia, Lector candide, æquo animo accipe, & Deo conatus tuos adjuvante, ad usum feliciter adhibe. Bene Vale.
Jenæ Cal. Septembris 1623.

*Zacharas Brendel Senior Med. Doct.
& Professor ibidem publicus.*

ILIUS-

ILLUSTRI AC GENEROSO

COMITI AC DOMINO :

DOMINO LUDOVICO GVIL-
HELMO, Comiti Nassavio, Catimeliboci,
Viandotum & Deciorum, Domino in Beil-
sthem : Frisæ occiduæ gubernatori, Domino
suo Clementi, nec non nobilissimis & am-
plissimis viris DD. ORDINIBUS,
Frisæ occiduæ &c. Dominis
suis observandis S.

O Stendunt Illustris ac Gener.
Comes, virique nobilissimi & amplissimi
DD. ordines, tot præclarissima multorum
monumenta, omnibus propemodum seculis exti-
tisse, qui ingenii judicijq; dexteritate præstantes,
artes utiles, & hominū vitæ necessarias, tractarunt,
& ad sui non solum seculi, sed omnis posteritatis
usum eas accommodarunt: Quod non ignorarent,
absque hac mutua donorum & ingeniorum omnis
temporis communicatione, nemini posse, quan-
tumvis divitiis aut potentia florenti, vitam hanc
utilem ac suavem esse. Quapropter ut quisque
semper

EPISTOLA

semper ex majoribus nostris vir melior, aut ingenio major fuit, hoc magis laborasse videtur, ut utili aliquo transmissio ad posteritatem opere, suum posteris studium propensamq; suam juvandi res humanas voluntatem testaretur.

Hunc morem, quia omnis laudata posteritas omni tempore approbavit, existimavi mei quoque officii fore, quæ in medica mea vocatione, & diligenti ægrotantium visitatione, animadversa mihi hætenus rara sunt, à nemine ante hæc satis (quod sciam) pertractata, literis prodere, & in publicum, publicæ utilitatis ergò proferre. Ideo quòd compertum multorum annorum observatione habeam, in hujus, quem proponimus, morbi cognitione, sæpe etiam (quòd tamen citra arrogantiam, & pace omnium dictum velim) ab exercitatissimis medicinæ artificibus aberrari: eò quòd aliorum morborum mores mentiri, & sub iis se suumque virus occultare, huic nostro scorbuto, quantum gallico, proprium sit & peculiare. Unde consecutū hætenus magna mortalium calamitate est, & multo artis medicæ apud vulgus nostrum contemptu, ut aliis vitam hic morbus præter medicorum spem & expectationem, aliquando subita suffocatione, aliquando verò post longiores cruciatus doloresque eriperet. Quam nonnullos nunquam pristinæ sanitati restitutos, non rarò sub perpetuo languore, veluti morbo, finire cogit.

Nec verò abs re, præstantissimorum medicorum
suffragiis

DEDICATORIA.

suffragiis primas in medicina partes semper illa meruit, quæ morborum signa & notas, & hinc profluentes prædictiones prænotionesque continet ac docet: Ab Hippocrate primùm literis prodita, & nobis singulari DE I beneficio quasi per manus reservata, atque à Galeno doctissimo ejus interprete, aliisq; eum secutis modernis medicis, pluribus locis locupletata & adaucta: Quod ad artis perfectionem & hominum salutem potissimùm hanc artis partem facere, longiore multorum usu, & ingenii exercitatione compertum ac comprobatum sit.

Cum enim in corporum ac remediorum scientia medici cognitio consistat & versetur, Corpora autem aut ægra sint, aut sana, aut neutra: apparet quātam & quāam utilem medicinæ partem hæc complectatur: Atque quam latus hujus sit campus, dum nostris peccatis, peccandiq; licentia, iram DE I provocare in nos, & sic novos nostra culpa, justaq; DE I vindicta, nobis attrahere morbos, non desinimus. Quibus quāam graviter DE US optimus maximus irascatur, ostendit (ut alias calamitates hujus vitæ taceam) multiplex hodie morborum varietas, quibus alio atq; alio tempore humanū genus DE US affligit: Quemadmodum id experta superior ætas in morbo Gallico est, qui ante Lusitanorum in novas insulas navigationem, quot hominū myriades & quāam miserè sustulerit, nemo medicorum est qui ignorat. Expertā idem posterior ætas in Anglico (ut vocant) sudore est.

EPISTOLA

Et nos ipsi anno octuagesimo experti sumus in communi ferè toti Christiano orbi morbo, à viso in aëre chasmate primùm accenso, & paucis diebus jam dictum nostrum orbem circumeunte, atq; vix ulli parcente, cum catarrhis & labentibus ad fauces ac pectus destillationibus, primùm diaria febre spiritus, & ab his sanguinis massam continua ac putrida, accendente, quibus intra triduum diaria non cessabat. Quæ etsi nihil pestiferæ luis haberet, non paucos tamen asthmaticos, seu pectore alioqui infirmos, & plethoricos, in illa omnium consternatione, consiliorumq; diversitate, suffocavit & oppressit, sicut propter recentem rei memoriam plus satis notum est. Ne quid de peste dicam, pluribus ab hinc annis passim ferè grassante, & divina quasi voce hominibus, nisi resipiscant, cōminante, quòd ejus semina aëre veluti suspensa, huc illuc spargantur, & à nobis visceribusq; nostris, alio atq; alio tempore, admirando DEI consilio, seu judicio veriùs, attrahantur, attractaq; transmittantur. Vt ab his palàm esse cuilibet possit, nunquam compleri satis hanc artis partem posse, quam diu novos nostra culpa morbos nobis attrahere nostris peccatis non cessamus.

Conqueritur in historia Asiaticæ scæminæ, & quoq; alibi Galenus, propter sui temporis incontinam fieri, quòd novi ac peregrini extarent sui seculi morbi, Hippocrati incogniti, quòd prisca ætas honestis laboribus exercita, otio & voluptatibus minus

DEDICATORIA.

nus indulgeret. Sed justior nostri seculi querela est, in quo sopitistῶ ἡγεμονικῶ καὶ θυμικῶ τὸ ἐπιθυμητικόν passim regnant, adeoque quoque inter ipsos (quod dolendum) Christianos invaluit, cæco, ne dicam stulto hominum judicio, primas ferè his tribuant, qui maximos calices maximo haustu, & ut Græci dicunt ἀμυσί exiccare queunt. Quade re longa subtexi hîc querela posset si nostri instituti aut vocationis esset, prolixius eam persequi; qui hæc attingere, & supremo quasi digito indicare voluimus, ut ostenderemus nostra culpa fieri, quòd hujus, quæ morborum differentias docet, medicinæ partis, nulla perfectæ & absoluta dari doctrina possit, dū innata peccandi libidine, justo DEI judicio, quotidie morborum numerum cumulamur. Quorum multiplicationi sufficerent præsentes temporum calamitates, ne quid his adjicere nostra culpa & vitio necesse esset.

Quas ideo prædicere in Evangelio Christum voluisse præter cæteras causas Theologis cognitatas, arbitror, ut hac pia Servatoris sui admonitione pii muniti, fortiore animo temporum incommoda perferrent, & magis quieto ac securo, quæ inde corpori adveniunt damna, declinarent, futuri scilicet, & mox sequuturi gaudii meditatione. Quandoquidem si Hippocrati credimus, non possunt abesse diu ab eo corpore melancholia morbiq; melancholici, ubi diutius timor & mœstitia perseverant: quòd hæc perpetua hujus humoris sint fomenta. Cujus quoq; sequax comes, etiam ex aliorum sententia, est stoma-
macace. Unde dubium non est, hinc fieri, quòd so-

EPISTOLA

lito frequentior hodie, & pluribus gravioribusq;
symptomatibus & signis, mortales divexare, latiusq;
suae ditionis pomœria extendere scorbutus compe-
riatur. Non enim uliginosis locis & planis amplius,
ut olim includitur, sed & camprestria & montosa
transcendit, & ad procul à nobis dissitos Germanos,
Anglos, & Gallos, eos potissimum qui ad maris
littus habitant, cōmigrat, vires eundo acquirens, &
eò gravius mortales divexans, quò longius alas ac
virus suum (ut olim gallicus) expandit & diffundit.

Quapropter celare non potui, & apud me occul-
tare, quæ circa hunc morbum mihi ostendere, meq;
longiore usu & observatione cognoscere **DEUS**
voluit, ut hac tenuis hujus libelli fortassis præma-
tura editione, occasionem viris meliore sydere na-
tis & in omni medicinæ parte exercitatis darem al-
tius hujus morbi naturam & causas scrutandi, quò
tandem collatis multorum operis (sicut factum in
morbo gallico videmus) absolutū quid de hoc mor-
bo constitui ac definiri possit. Quod in hoc morbo
eò magis, quàm in gallico necessarium est, quò
magis nos attingit, pluribusque communis, atque
huic nostro climati, quàm Gallicus, plus est famili-
aris. Siquidem nullus ferè morbus nobis in his re-
gionibus occurrit sceletyrbe frequentior, quique
fallaci sua specie, qua alios morbos mentitur, nostri
temporis medicis imponit. Dubio propemodum
argumento medicos ludificare, an ægrotum divexa-
re, magis consultò, & quadam quasi destinatione
laboret

DEDICATORIA.

laboret. Ut propterea admiratione digni videantur, qui morbum morbum, scorbutum scorbutum dicunt: Signa verò *πικρία*, ex quibus cognoscitur, sicut ex unguibus leo, contemnunt & aspernantur.

Hi si omnia legisse & ruminati esse videri velint, scire debebant, quæ de gallico morbo scripta ab aliis sunt: hodie vix dū satis suis differentibus symptomatibus & signis (quæ aliqui supra trecenta, ni fallor, recensent) omnibus ubique medicis cognito atque perspecto. Quo cum paribus ferè passibus certare stomacace videtur, ut symptomatum varietate, & multiplici eorundem differentia, ita quoque multa eorundem similitudine, qua ægrè, nec nisi à probè exercitato circa utrunque medico distinguantur. Neque id præter rationem, quatenus una eademque utriusque generationis ratio est. Nam ab iisdem causis, sed qualitate tantum differentibus, à quibus nobis scorbutus hic adnascitur, gallicum nobis dictum morbum fieri compertum est iis, qui novas & nuper inventas insulas, sub antarctico polo sitas inhabitant, adeò, ut sub diametrali cœli linea, & polorum quibus sibi invicem opponuntur, distantia, mutua communicatione aliquando colludere & virus suum transfundere videri possint. Ita ad amussim quibusdam symptomatibus sibi invicem respondent: Cujusmodi sunt, exempli gratia, dolores sub noctem gravius infestantes, nervorum contractiones, & variis corporis partibus expullulantes tumores duri atque scirrhusi. Quò magis ergo laudandum studium eorum est, qui eandem diligenti-

EPISTOLA

am, quam in Gallico enarrando morbo prædecessores nostri posuerunt, huic tribuendam esse propter jam dictas causas contendunt, in quantum publicæ utilitati studia nostra inservire debere, omnibus bonis citra controversiam receptum est.

Attamen ut contra istiusmodi sciolos tutus, & honesto quasi præsidio munitus, in hominum manus hic noster libellus veniret, communem scribentium nostri temporis morem secutus, T. Illustri Generositati, Comes & Domine Clementissime, vobisque D.D. Ordinibus, Dominis meis observantiss. eum inscribere volui, ut patriæ meæ, cui omnes obstricti sumus, hoc vocationis meæ officio, pro ingenii mei tenuitate adstitisse, & quicquid in me studii atque laboris est devovisse, Vobis Dominis gubernatoribus testatum facerē. Maximè enim convenire putavi, ut quæ primùm in cunis me vagientem, & flebilem meum in hunc mundum introitum, vitæ nostræ misérias contestantem, exaudivit & excepit terra, hoc meo qualicunque; studio & labore, functionisque munere frueretur, & miseriarum, quibus premitur, ex parte sublevaretur, ac recrearetur: indeq; quicquid boni hic liber habet, ad vicinas & finitimas ei terras propagaretur. Quatenus primam laboris nostri partem sibi vendicat patriæ, proximam vicinitatis jure, proximè contemina terra. Quibus omnibus magis quam velim & optem, hic morbus familiaris est, cum propter frigidam & crassam aëris (quod puto) constitutionē,

tūm

DEDICATORIA.

tum etiam & potissimum propter aquas patrias
crudas, sublimes & subsalsas, quibus plæræq; hæ
regiones ferè abundant.

Accipite igitur Domini gubernatores hilari fron-
te, hujus mei opusculi partocinium, vestra inscripti-
one ornati, & communis patriæ nostræ saluti in-
primis dicati. Quod etsi mole parvum & eruditione
non instructum est, tamen rei quæ hîc tractatur
necessitate ac utilitate (absit arrogantia dicto) non
omnio contemnendum, neq; quorundam de praxi
medica conscriptis hodie libellis, (quoad nostrum,
sicut rei usu comprobavit, clima) post habendum.
Quod si non displicuisse T. Illust. G. Comes & Do-
mine Clemensissime, Tuæque. Illust. G. assessoribus
amplissimis, D. D. Ordinibus. Dominis meis
observandis hunc meum librum intellexero, dabo
operam, quemadmodum nunc scorbuti, sic raras
quasdam nostras observationes apud diversos col-
lectas, olim in lucem edamus. Per scriptum Emb-
dæ Mense Februario.

*Severinus Eugalenus
Frisius.*

LECTO.

LECTORI BENEVOLO S.

Æterna laude dignos esse, qui vel ipsi quæ ad utilitatem in vita communi spectant, invenire: vel inventis feliciter ornatum, augmentum perfectionemq; adjecerunt, apud omnes in confesso est. Hinc superstitiosa vetustas, gratitudinis ergo etiam divinos honores Palladi, Iovi, Æsculapio, teste Morneo & Lactantio, assignavit: pietas vero religiosa, à summo bono, cuncta, quæ generi humano usui sunt, concessa esse constanter asserit, ad ejusque solius gloriam, referenda decrevit. Quapropter non nisi divinitus excitati sunt: qui artem medicam rudem etiamnum & impolitam colligerent, elaborarent, & inutiles sectarum opiniones, tanquam lascivientis animi ramos ablaqueantes, cultiorem, perfectioremque redderent. Omnesque Asclepiadæi, omniumque temporum ad augustum & sacrosanctum hoc sanitatis & Panaceæ monumentum, amplificandum, ornandum & perficiendum pro virili, quantum ipsis divinitus concessum fuerat, graviter suos labores contulere, & adhuc conferunt. Sicutque omnibus seculis & temporibus, ita nostro hoc erudito, ingens facta est accessio, non tam subjecti nobilissimi accuratiore indagatione, quàm materiæ medicæ locupletatione. Inter quæ ornamenta instar gemmæ radiantis est

Chy-

LECTORI.

Chymia, *Pharmaceutices* pars nobilissima, quæ comitatum herilem conspectiorem reddit. Res, si ab-usum demas, nunquam satis laudata. Sedenim hic quosdam reperias. qui dum Domina ipsa potiri obrudiatem non possunt. ancillas sectantur, & earundem favore aliquo delibuti, in dominam protervi & ferocientes asini invehuntur. Qualis est impostor & syco-phanta Erfordiensis Gramman, qui corraso uno vel altero medicamento Chymico, totum medicina corpus labefactare & tanquam Herosthratus incendio calumniarum & mendaciorum absumere conatur. Sed vani hominis vana gloria abit in fumum: & mendacia auctori & patronis istius turpitudinis, dedecori sunt & poena.

Meliore genio & ingenio fruuntur, qui suos labores iudicio eruditorum subjicientes, sibi cognita & perspecta, in communem utilitatem proximi. & Iehova gloriam, proferunt.

Talis certe fuit nostris annis Vir Clarissimus & pientissimus SEVERINUS EUGALENUS FRISIUS, qui peregrinationibus, laboribus & sudoribus sibi observata in multis seculis nondum cogniti morbi curatione, fideliter conscripsit. Nec Medicus est ex commentario, nec affectati styli pompa, conspicuus. Cujus observationes, utinam notiores essent plarisque, quam saepe in opere artis deprahenditur. Eas itaque cum propter exemplarium defectum, quæ in undis periisse relatum est, & obitum auctoris de Republica medica optime meriti, vix notæ essent,

LECTORI.

*in lucem revocare visum est, nec dubito multis bonis, qui
diu has expetivere, gratas futuras.*

*Nihil proinde ex hoc qualicunque labore vel auri vel
auræ capto. Grates potius, quibus hæc grata erunt, habe-
bunt, auctori ipsi, deinde CL. D. BALTHASARO
BRUNNERO medico celeberrimo, qui sua liberali-
tate exemplar communicavit, eumque enixè rogabunt,
ut quæ de morbis Mesenterii præ manibus habet, non de-
ponere, sed gnaviter elaborando, ad felicem colophonem
perducere velit. Tu vale & fruiere.*

E Salin. Sax.

Josephus Stubendorff. Dr.

Quod



Uod corporum humanorum
forma ac temperaturæ pro
cœli, aquarum, alimento-
rumque diversitate variant,
primus Hippocrates dixit, libro de aëre,
aqua, & locis. Et post ipsum, gravissi-
mus medicinæ testis & author, Galenus
Pergamenus. Quibus experientia sub-
scribit, rerum magistra, quæ non minus
evidenter id ipsum demonstrat, quàm
ratio. Nam qui apud diversas nationes
& gentes medicinam fecerunt, intelli-
gunt, pro regionum, sub cœli positu
diverso, situ, alias, aliis in locis, corpo-
rum constitutiones ac temperaturas
esse, & ab his diversam quoque ratio-
nem curandi.

Hi etiam ab his causis fieri non ig-
norant, quòd aliis morbis, aliæ regi-
ones obnoxia subditæque sint. Quos
quia uni genti ac cœli tractui magis
proprii sunt & peculiare, Latini indi-
genas, proprios, & vernaculos mor-
bos,

*Formas ac tem-
peramenta hu-
manorum cor-
porum pro cœli
aquarum &
alimento-
rum diversitate
variare.*

*Morbi regio-
num quarun-
dam proprii.*

bos appellarunt. Græci vero *ἑπὶ χῶρα νοσήματα*.

Nomina scorbuti.

Historia laborantium ventris lancinationibus.

Talis morbus Gallicus iis est, qui novas & nuper inventas, insulas Portugalix subiectas, inhabitant: Talis Neapolitanis Podagra: Hispaniæ finitimis gulæ bocium est: Alexandrinis elephas Galeni autoritate: Nobis vero sub frigida cœli Zona, ad septentrionalis maris littus habitantibus, sceletyrbe & Stomacace Plinio dictus morbus. Qui aliis faucius & ulcerosus venter appellatur. Belgica & vernacula nostra lingua *Schoorbuyck*: A quo suum scorbutum formasse Latini recentiores videntur: Idque nomen inditum ei esse ab effectu puto, siquidem frequenter variis lancinationibus corpus & ventrem, veluti affecto ex cruditate ventriculo, dissecat & discindit. Quemadmodum hunc ejus effectum nuper admodum in tribus observavimus: uno proxeneta Anglo, & duabus præterea puerperis: ab his ventris distensionibus, lancinationibusque gravissimè divexatis, adeo ut unruptum ab iis peritoneum fuerit. De quibus etiam latius fortè inter observationes dicetur.

De

DE CAUSIS SCOR-
BUTI. *Causa scorbuti*

O Rigo hujus mali esse putatur, cum ab aëre crasso, frigido & humido: tum vel maximè ab aquis frigidis, crudis, & subsalsis, quibus toto hoc maritimo tractu ferè utimur omnes. Quibus si crassa & nautica victus ratio accedat, & cum hac tristitia diuturnior, vel consuetæ evacuationis, mensium scilicet, hæmorrhoidum, aut alvi quoque suppressio vehementior, plurimum ad hujus morbi generationem momenti habere, usus docet.

Nam quos cum crassiore victus ratione diuturnior mœstitia exercuit, de his ægrotantibus constanter semper prædicere ausus fui, eos à scorbuto morbo vel solo, vel aliis permixto teneri. Neque ab his deceptum me fuisse scio, quin conjecturam ac *συχασμόν* meum comprabarit fœlix curationis eventus. Quod quoque ita esse experientur, qui post me animum ad hanc rem adjicere volent.

Cæterum ex hoc loco mihi incidit, quod hic rectè moneri puto, scilicet in morborum *συμβολῇ* & concursu, cum

Regula Diagnostica generalis prima.

Canon therapeuticus generalis primus.

4 SEV. EUGALENUS

quibus scorbutus noster miscetur, nulum integrè curari, nisi hunc una cures, aut medicamentis juncto morbo præscriptis, unum vel plura misceas, quæ hunc morbum respicere, & peculiariter erga eum vim & proprietatem habere, credantur: Quemadmodum haud dubiè notum iis est, qui in hujus morbi curatione leviter saltem sunt exercitati.

Interna scorbuti causa: & generatio scorbuti.

Interna hujus morbi causa, melancholici humoris exuberantia censetur, ex jam dicta vitæ victusque ratione acquisita: qui circa Lienem & Epar, vel in intermediis inter hæc & ventriculum spatiis, vel in ipsis etiam venis, quod puto; coacervatus, propriam, & huic morbo familiarem corruptionis formam subit, qua adjacentia, vicinaque viscera, sua vel substantia & contactu, vel qualitate & fumis depravat, naturalem eorum temperiem corrumpendo, donec in contagii communionem consentiant, & ad receptam semel infectionis labem, alimenta superingesta commutent viciantque similem corruptionis formam iis imprimendo.

At infra paginam 17. 26. & § 5. scorbutum ex varia humorum miscella

Nam quemadmodum à tenuibus & aqueis

aqueis humoribus corrumpi alimenta *fieri censet.*
 in hydropē, atque à specifica & pro- *Vide infra*
 pria cuique corruptionis forma in Ele- *pag. 80.*
 phantiasi, lepra, morbo Gallico, & ma-
 lo mortuo videmus: Ita etiam in hoc
 nostro fieri verisimile est, & rationi
 consentaneum. Unde fit ut alimenta
 pluribus suis partibus ad nutriendum
 indisposita, paucis incrementis ad mor-
 bosæ causæ materiam accedant, do-
 nec tandem ab hac prægravatis naturæ
 viribus, ea affectione corpus afficiatur,
 ad quam sua sponte magis pronum est
 & proclive. Nam ut aliis morbis alia
 corpora magis obnoxia sunt: ita in aliis
 aliæ partes imbecilliores sunt, atque ad
 recipiendam causam noxiam paratiores.
 Unde ab una eademque causa sæpe va-
 riæ morborum differentiæ existunt,
 tantum propter corporum diversita-
 tem, ac diversam eorum dispositionem
 variantes.

*Ab una eadem-
 que causa sæpe
 variæ morbo-
 rum differentiæ
 existunt propter
 corporum di-
 versitatem.*

*Signa seu
symptomata
scorbuti.*

SIGNA SEU SYM- PTOMATA SCOR- BUTI.

I. GINGIVARUM PUTREFACTIO.

*I. Gingiva-
rum putrefa-
ctio.*

QUibus natura robustior morbo-
sæ causæ prævalet, in iis insita vi
& virtute quàm longissimè ma-
lum à se natura protrudit, partim in pe-
des, partim in gingivas morbi causam
deponens. Nam quod tenue & calidum
est, tenuibus halitibus permixtum sur-
sum ad gingivas fertur: quæ conce-
pta hac putredine intumescunt, molle-
scunt, exulcerantur & fœtent, quibus-
dam fœtidis suis partibus à dentibus
abscendentes.

II. MACULÆ SUB- NIGRÆ, PURPU- RÆ ET SUBLIVIDÆ.

*2. macula
subnigra, pur-
purea & subli-
vida.*

QUod autem crassum, terreum &
grave est, ad crura decumbit, cu-
tem horū primū subnigris ma-
culis parvis, mox vero majoribus, purpu-
reis,

reis, & sublividis, ad violæ purpureæ
florem efflorescentibus, defœdans.
Quæ, si malum pejus fiat, sæpe into-
tas tibiæ unica macula nigra diffundi-
tur, tetra & aspectu horrenda, cum tu-
more ad elephantiasim accedente. Si-
cut evenisse cœcæ, & præpingui fæmi-
næ, ad porticum Hamburgensem me-
minimus.

III. ULCERA MA- LIGNA.

3. *Ulcera
maligna.*

A Liquando etiam sed rarius, ex
melancholici humoris superassa-
tione, carcinomatis seu crustosi
ulceris instar, nigra macula cum vel
sine pustula se offert. Quæ erosa cute &
carne, in ulcus fœtidum degenerat,
ægrè cicatricem ducens, malignum ac
gangrænosum: adeo ut sensu abolito,
quorundam sic laborantium crura, fer-
rum immissum non sentiant. Quam
affectionem primùm in viro nobili Du-
cis Ottonis Domini mei clementissi-
mi hospitii magistro, vidi. Quando
non satis adhuc perspecta mihi tum hu-
jus curatio, tum quoque morbi species
erat. Et postea in altero sene, in altera

*Historiæ labo-
rantium Ulc-
eribus crurum.*

maxilla, ab hoc malo correpto: sicut
latius de his inter observationes dice-
mus.

Prognost. 1.

Grave hoc malum est, & calamita-
tis plenum, nisi rectè curetur, mihi
nunc sexies si rectè memini, visum: In
duobus senibus, itemque nauta, uno
puello, & duabus puellis.

*Regula Diag-
nostica genera-
lis secunda.*

Cæterum quia dictis signis, quæ in
gingivis ac cruribus efflorescunt, lippis
& tonsoribus hodie hic morbus notus
est, nolo diutius his immorari.

*Dentium va-
cillationem ac-
cidens scorbuti
non esse.*

Errant tamen qui dentium ex al-
veolorum laxitate vacillationem, (gin-
givis ab acribus & falsis destillationi-
bus erosio consumptisque) hujus mor-
bi accidens esse putant. Cum in laxi-
tate, quæ ex scorbuto est, gingivæ non
consumptæ, neque erosæ, sed tumidæ;
non strictæ, sed molles & laxæ conspi-
ciantur, plærunque ut dixi, foetidæ,
& quibusdam foetidis partibus à den-
tibus abscedentes: Nam quemadmo-
dum fermentum panem, sic hi vapores
putridi in teneram gingivarum car-
nem recepti admissique, eas, ut acetum
in terram effusum, elevant & artol-
lunt.

Signa scor-

Verùm quia hæc oculis subjiciun-
tur,

tur, & in sensus incurrunt, præterea
 cuilibet ex vulgo ab eventu curationis,
 & multo experimento notissima sunt
 & perspecta, nihil necesse est, longiore
 orationis contextu legentis animum
 hic remorari. Quamobrem ad alia, &
 minus nota hujus morbi signa, non
 minus tamen atque prædicta apodicti-
 ca, transibimus. Fit enim non rarò, ut
 prius hic morbus occidat, quàm dictis
 illis in gingivis ac cruribus efflorescen-
 tibus signis, se prodat & ostendat: Ideò
 alia considerare signa ac notas oportet,
 ex quibus affectio, nùm adsit, cognoscatur.

buti minus nota, sed non minus apodictica.

Non rarò prius occidit scorbutus, quam tumore gingivarum & maculis se prodat.

IV. DIFFICILIS. RESPIRATIO.

INter quæ primum & præcipuum locum, respirationis difficultas tenet, de qua primo loco hic dicemus, cum frequens sit hujus morbi symptoma & grave, quo infiniti, propter morbi ignorantiam, sæpè præter medicorum spem & expectationem deliquio ac syncope pereunt.

4. Difficilis respiratio.

Prognosticum secundum.

Sed quia omnibus thoracis affectionib. hoc accidens commune est, diligentia distinctione opus est, quò respiratio-

Regula Diagnostica specialis prima, seu

*nota scorbuti-
cam respiratio-
nis difficulta-
tem à communi
discernentes.*

*1. à loco af-
fecto.*

*Pronost. ter-
tium.*

nis difficultatem, scorbuti comitem, ab ea, quæ thoracis morbos sequitur, discernamus. Atqui cum ea quæ à locis affectis sumitur indicatio, cæteris firmior ac certior sit, primùm quomodo hujus, id est loci affecti ratione, à thoracis morbis scorbutum, & hunc comitantem respirationis difficultatem distinguere oporteat, ostendemus. Quod difficile non erit. Ideo quod à scorbuto difficulter spirantes, nihil circa thoracem conquerantur; sed locum affectum ubi gravamen sentiunt, & cujus causa cum difficultate respirare coguntur, sub diaphragmate ad ventriculi regionem monstrent, ubi ejus orificium situm esse Anatomici, & præter hos ocularis inspectio demonstrat.

Vnde non raro etiam in hoc morbo (sicut in reliquis fieri ventriculi cruditatibus solet) flatus in utrumque latus, nec non anteriorem ac posteriorem corporis regionem diffunduntur, ventriculi affectionem mentientes. Ibi ergo premi se & coangustari testantur, quo minus liberè spirent. Quod si gravius malum fiat, adeo videmus premi diaphragma (quod puto) & consequens affici cor, ut inter decumbendum,

dum, eorum aliqui nonnunquam lipothymiam minentur, quandoque etiam subito extinguantur.

Vidi quibus à vaporibus sursum ab inferioribus ascendentibus, oculi per intervalla obscurarentur & caligarent, ne quem præsentium agnoscerent, cum tanta respirationis angustia, ut animam agere omnibus adstantibus viderentur, quando merito pulsus videri parvus potuit & inæqualis. Id quod præter alios, stateræ tributarii filiæ evenisse, nobiscum alii viderunt.

Secunda differentia, qua à thoracis morbis distinguitur, ab ægrotantis sumitur sensu. Nam qui hac difficultate respirationis laborant, magis de angustia, quam nostrate lingua *Banghe* dicimus, quàm respirationis molestia, conqueruntur, Quod semper cum hac spirandi difficultate, angustia ad præcordia conjungatur, quæ plùs ægrum gravat, quàm respirationis difficultas; ut pote cujus sequax comes hæc est, ab eadem (ut videtur) dependens. Quare ægrotantes à sensu mali sui magnitudinem metientes, de tollenda angustia magis, quàm respirationis mitigatione, apud medicum instant, obnixè eum

Historia laborantis per intervalla caliginis oculorum & aliis symptomatis scorbuticis.

2. differentia ab ægri sensu.

Regula diagnostica generalis tertia. Vide infrapag. 42.

xè eum rogantes, ut in ea removenda tollendaque intendere omnes suas cogitationes velit. Quippe qui gravamen suum melius ipsi percipiunt, & malum qua parte urget, rectius sentiunt, & intelligunt, quàm adstantium quispiam.

3. *differentia
à difficilis re-
spirationis in-
termissione
sèu remissione.*

Tertia differentia sumi à respirationis intermissione, seu ejus remissione potest. Quamdiu enim natura robustior morbo reluctatur, neque eadem vehementia, neque semper jam dicta angustia infestat, sed quibusdam quasi vicibus res geritur; ut cessante, vel de suo vigore potiùs priore angustia remittente, morbus exiguas inducias naturæ concedere videatur, quàm paulò pòst (natura interim se recolligente, & quasi ad pugnam rursus se instaurante) alia excipit priori similis, in qua frequenter mirè brevis fieri respiratio solet, sicut sub prima differentia, de tributarii filia ostendimus. Quæ quibusdam subinde adeò gravis recurrat, ut animam reddituri statim esse tales videantur. Id quod etiam sub debili natura, & robustiore morbo non rarò fit.

Quòd si robustior natura fuerit, iterum

rum reluctatur, easdem, quas prius, inducias paciscens pro vehementia ac sævitia morbi, aut renitentis naturæ robore & debilitate, modò longiores, modò breviores. Atque hoc signo non difficile est respirationis difficultatem scorbutum comitantem, ab ea distinguere, quæ ad thoracis morbos sequitur.

Cum enim proprium thoracis hoc opus sit, debet eo affecto, actio non intercidi, sed continuari: quatenus unanimi medicorum consensu receptum sit, affectus, qui primariò actionem lædunt (Græci *ἰδιοπνευστί* vocant) necessariò partem affectam, unde actio procedit, ad morbi solutionem uno eodemque modo semper afficere. Crescente tamen sub debili natura morbo, nihil à ratione alienum est, à forti & robusta causa, naturam debilem eodem modo & continuò affici posse. Quo in casu, quin de compressione sub diaphragmate, ejusque anxietate conquesturi tales sint, nulli dubium esse debet. Siquidem cum morbi augmento ac decremento, neque locum affectum, neque morbi speciem mutari, vel ex hac Dialecticorum regula con-

*Cur respiratio
difficilis à tho-
racis morbo or-
ta continua
sit.*

*Cur quando-
que etiam scor-
buticæ respira-
tionis difficul-
tas continua sit.
Regula di-
agnostica spe-
cialis secundæ
quo modo
scorbuticare-*

con-

*Spirationis
difficultas,
etiam con-
tinua à
Vulgari
dignosci
queat.*

14 SEV. EUGALENUS

constat, qua specie distare negantur, quæ gradibus inter se distant. Notum enim illud Aristotelicum est: τὰ τῷ μείζονι περὶ ἢ τῷ ἀφαιρόντι ἀλλήλων εἶδη ἔμεταβάλλειν, id est, quæ ipso majus ac minus inter se differunt, speciem non mutare.

*Quarta
differentia
à conse-
quentibus.*

Quarta differentia & ultima qua dignoscuntur, fuerit, quod cum hac, quæ scorbutum comitatur, respirationis difficultate, nihil eorum propriè sequatur, quæ consequi ad thoracis morbos necessario solent. Cujusmodi sunt, exempli gratia, tussis, sibilus, stertor, dolor pungens, orthopnœa & his similia alia thoracis affectionibus propria. Vt ab his vel primo triduo, vel potius primo, si mavis, die, à thoracis morbis dignosci hæc respirationis difficultas possit & debeat.

*Respiratio-
nis diffi-
cultas scor-
butica
morbo sæ-
vientema-
jor; mitiore
remissior.*

Atque hæc dicta nobis hæcenus de illa respirationis angustia ac difficultate sint, quæ decumbentibus sæviente morbo fit: Sed quod à mitiore morbo, tanquam ab imbecilliore causa, minùs sævos minusque vehementes affectus edi oporteat, ut naturæ, sic rationi consentaneum est.

Quan-

Quando etiam sæpè longior mora
damnosa juxta illud Ovidii, fuit:

*Vidi ego, quod fuerat primo sanabile vul-
nus,*

Dilatatum, longæ damna tulisse moræ.

Quamobrem in his etiam tempesti-
vius hunc morbum agnovisse prode-
rit, quo prius curetur, quàm ingravescat, & naturæ vires demoliatur. Quod etiam sæpè, & inprimis nobis respira-
tionis alteratio præstabit, & in nonnul-
lis quoque lividus faciei color, in iis
potissimum, qui crasso & melancholi-
co abundant sanguine, aut tempera-
mento magis sanguineo gaudent. In
his si morbus hic sublit, post levem
motum (extra manifestam viscerum
obstructionem) eum demonstrabunt,
cum difficilior respiratio, tum labra
genæque subfusco ac lurido colore præ-
ter consuetudinem, citraque ambientis
aeris frigus conspicuæ.

In quibus si major accedat ad hos
humores putrefactio, etiam quiescen-
tibus, hæc lividitas in facie conspici-
tur, quemadmodum in Marscalco,
vidua, aliisque nonnullis id observavi-
mus. In quibus citra alia indicia no-
bis hunc morbum lividitas hæc mani-
festa

*Quid proſit
maturè hunc
morbum agno-
viſſe.*

*Alia quedam
ſigna respira-
tionem diffi-
cilem ſcorbuti-
cam diſcernen-
tia à thoracica.*

*1. lividus fa-
ciei color in me-
lancholicis aut
ſanguineis,
aut color cine-
reus vel pallor
inſuetus in
cholericis.*

Historia faciem lividam habentium.

Regula diagnost. generalis quarta.

2. pulsus huic morbo proprius.

Regula Diagnostica generalis quinta. Vide infra 41. 60. 74. 76. 87.

3. Continuus languor seu gravitas crurum aut torpor aut dolor partium quarundam acutus.

Regula Diagnost. generalis sexta. Vide infra. 24.

festabat. Etsi certiore nota eum pulsus proderet, huic morbo familiaris, & ut plurimum parvus & inæqualis. Et paulò post tacitis incrementis assurgente & moram diutius trahente morbo, continuus ægrotantium languor, seu crurum gravitas, aut torpidus eorundem sensus, vel dolor partium quarundam acutus.

Sin cholicum ægrotantis temperamentum fuerit, incertum indicium esse solet, quod à faciei colore sumitur, nisi quod cineritius ejus color, & insuetus pallor, circa hunc morbum diutius exercitatis, eum leviori argumento declaraverit. Attamen quia fallax hoc indicium est & incertum, atque huic morbo cum aliis aliquando commune, utile quoque hic fuerit respirationis qualitatem considerare, & diligenter super thoracis morbis inquirere, circa quem si respirandi difficultate laborans, nihil incommodi sentire confiteatur, & locum gravaminis sub diaphragmate, ad ventriculi regionem monstret ubi ejus orificium situm est, non alienum à ratione fuerit, ad hunc morbum cogitationes suas dirigere.

De

De quo, ut certiores reddamur, ante actæ vitæ victusque rationem considerare, & circa animi affectus, quomodo se habuerit, interrogare oportet. Quæ si huic morbo consentiant, porrò pulsum & urinam examinabimus, talesne sint, quales huic morbo familiares esse postea dicemus. Cum quibus, si præterea crurum debilitas aut sutæ crurum dolor, & durties, vel molestæ plantæ pedum punctiones, & sine manifesto morbo languor, concurrant, notiora habes, quibus tutò acquiescere possis.

Aliquod etiam hujus morbi argumentum habet, si assumpto cathartico (sicut plærunq; fit) æger difficilins spiraret, & redditæ postridie urinæ, diversarum partium ac dispares apparuerint: Si quidem, quia crassa ferè, & visceribus infarcta hujus morbi materia est, ex Hippocratis consilio necesse prius est eandem ante subductionem attenuari: alioqui cathartico mota & conturbata hæc materia cruda & non concocta, varias anxietates physica ratione pariet, quæ non unius neque ejusdem substantiæ cum sit, sed ex variis humoribus permixta, quasdam suas partes medicaminis facultate commo-

4. Vita ante-
actæ victusq;
ratio & affe-
ctus animi.

5. Urina.

6. Symptomata
ab usu cathar-
ticos.

Canon Thera-
penticus gene-
ralis secundus.
Vide pag. III

tas agitataeque & serosi humoris deductione ad renes & vesicam delatas, tales ostendet, quales humores sunt, à quibus refecantur, eorundem colorem & speciem, & cum hac, morbi naturam repræsentantes.

Et quamvis cum viscerum inflammationibus hoc ipsi commune sit, attamen præter alia signa, morbi vehementia facilè ab iis distinguitur, ut nulla nostra admonitione ea res indigeat. Hi etiam, si à medicamentis huic morbo accommodatis meliùs habeant, nihil est quod præterea dubitandum quis censeat.

Convenit autem in hac respirationis difficultate, ut in omni scorbuto, imprimis nostra qualicunque observatione, cochleariæ succus.

7. iuvantia
medicamenta
scorbutica.

Vide & infra
pag. 36.

Canon therapeuticus specialis in respirationis difficultate scorbutica primus.

Canon therapeuticus specialis in difficili respiratione scorbutica secundus.

Et quia plerunque cum hac febris & obstructions subinde graves concurrunt, iis quæ ad hunc morbum usus invenit, miscere oportet, quæ febrem contemperant, & obstructions refecant & tollunt. Cujusmodi huic casui servientia sunt cuscuta, ceterach, carduus benedictus, absinthium romanum, fumaria, betonica, & his similia alia.

Qui-

Quibus si non satis curatio procedat (ut fieri in iis solet, qui cū graviore respirandi difficultate, & frequentibus hisce angustiiis, diutius urinas absque manifesta vel multa siti crassas & rubras reddunt, crasso, rubro, & fursuraceo excremento & vario subsidentibus) prædictis, felici nostro experimento, aliquid de Plirisarchontici speciebus, aut similibus addimus. Quibus statim hunc morbum obedire novimus, subsidentiis rubris, prostridie in album colorem commutatis.

Qua ratione nisi curentur, plurimi horum ab hac respirationis difficultate tandem suffocantur: vel si natura fortior diutius morbi violentiæ reluctetur & resistat, plærunque in hydropem tales incidere solent, à quo nihilo magis ab hac respirationis difficultate allevantur, etsi quiescente materia, & superata atque devicta magis natura, mitiores paroxysmi fiant. Alioqui fieri vix posset, ut aliquandis vitam tales protraherent producerentque.

Multos quoque suffocatos ab hac respirationis difficultate hoc hydrope vididi, eosque potissimum, qui catharticiis sæpius ac fortius moverentur.

Febrim contemperantia in scorbuto & de obstructia.

Canon therapeuticus specialis in respirationis difficultate scorbuticus tertius.

Plirisarchontici specierum Vis.

Prognosticum quartum.

Prognosticum quintum.

*Canon therapeu-
ticus speci-
alis in respira-
tione difficili
scorbutica
quartus.*

Quòd si cum his urinis infestans sitis & calor adfuerit, ex medendi methodo notum est, prædictis ea miscenda esse, quæ cum levi incidendi attenuandi-que facultate febrem mitigant & sitim extinguunt; habita semper cum aëris in quo vivitur, tum cibi & victus ratione, quo per vitæ cursum ægro-
tantes usi sunt.

*Canon therapeu-
ticus gene-
ralis tertius.*

Nàm quòd in frigido, crasso & humido aëre attenuantibus magisque incidentibus medicamentis uti conveniat, etiam ab universali medendi methodo, & rerum magistro usû erudimur. Quod etiam nostra qualicunq; experientia contestari possumus, ut pote qui hisce præteritis annis in iisdem morbis experti sumus, aliam Hamburgi, aliam Leoverdiæ in Frisia, aliam Embdæ curandi rationem esse. Sicut haud dubiè alius in Zelandia, & Enchusano oppido curationis modus est, aliis in montosis & campestribus locis.

Quod propterea admonere hic volui, ut qui post nos medicinam iis in locis sunt facturi, sciant quomodo ab his curatio sit varianda, ne si non satis ab uno atque altero simplici, huic
mor-

morbo accommodato, hunc curationis eventum experiantur, ilico curationem hanc damnent, sed eam intendendam, juxta hanc regulam & normam esse sciant, donec ad optatum finem demum perveniant.

Sed quia hæc cognitio à methodica doctrina (ut dixi) dependet, eaque omnibus suis partibus non satis explicari hic potest, partim quoque ab usu & experientia addiscenda est, nobis satis fuit, viam quandam aliis præmonstrasse, quam tutò sequi possint, qui post nos medicinam hisce in locis sunt facturi. Nam cum omnibus locis & corporibus, exactè accommodari hæc quantitas nequeat, necesse est, cujusq; judicio eam relinqui, quo duce non difficile est ab hac via invenire, quemadmodum pro varia humorum mixtura & temperamentorum ac cœli diversitate ea cuique sit administranda. Atque hæc dicta nobis hæctenus de respirati-

Canon therapeuticus generalis quartus.

V. VOMITUS EJUS- QUE CONATUS I N A N I S.

*Prognosticum
sextum.*

FIt autem, idq; non rarò, quòd cum hac respirationis angustia, & quoque absque ea, varii vomitus, ejusdemq; conatus non nullos infestent; & quandoque graves sursum & deorsum eruptiones, (sicut in cholera morbo) contingant, quibus nihil æger allévetur, sed quæ potius pluribus ventris intestinorumq; lancinationibus ægrotum, post longioris temporis intervallum conficiunt, utcunq; stomachicis, & ventriculorum confortantibus medicamentis ita affectus adjuvetur.

*Regula diag-
nostica specia-
lis tertia h. e.
signa seu nota
distinguentes
vomitum scor-
buticum à vul-
gari.
Prima nota.*

Secunda.

Quamobrem diligenti distinctione opus est, qua vomitum scorbutico propriū, ab eo qui ventriculi vitio, vel aliàs fit, distinguamus. Quod fiet primū, si communibus medicamentis, ventriculo, & huic symptomati à veteribus præscriptis nihil nos proficere, sed contra, ægrum in pejus delabi, quotidie conspiciamus. Præterea, si subitò subinde & præter rationē vomitum hunc intermittere, atq; rursus de improvviso eum recurrere animadvertimus; vel illū cor-
ripi,

ripi absque ulla cognita veteribus affectione cernamus, qui prius de sensibili *Tertia.*

ventriculi gravitate dolorève, vel ulla *Quarta.*
ejus intēperie morbove, ad quem sequi
hic vomitus solet, nihil est conquestus;

& si inanis magis adsit vomenti conatus
quā quòd quippiā eò dignum educatur.

In his verisimilius est à scorbuto,
quàm propria ventriculi affectione,
hunc vomendi conatum excitari.

Nam si in his regionibus, præter rationem subitò atq; de improvviso quem- *Regula diagnos-
tica generalis
septima.*

piam, ab hoc vomitu corripì contingat
qui de ventriculo nihil prius conquestus
fit, & quemlibet cibum durissimum facile
concoxerit, eamq; avidius comedet,
absque ulla manifesto ventriculi, &
adjacentium viscerum morbo, unde sequi
physica ratione debebat, in his semper
suspectum hunc morbum habere
oportet; maximè si nauticis cibis semper
usus fuerit, vel quæ consueta corporis
evacuatio, videlicet in mulieribus
menses, in viris hæmorrhoides, vel similis
substituerit: aut quis obtusus crurum
dolor & gravitas, quam facile explicare
æger non possit, sentiatur.

Quibus si auctarii loco, urina crassa *Octava.*
& rubra accedat, quæ crassa sedimento

rubro, aut subfusco & furfuraceo in matulæ fundum subsidat suaque substantia superiore supra sedimenta eminente, crassa nihilominus visitur, & conturbata, certum habes & indubitatum hujus morbi argumentum, in quo tutò acquiescere possis: Si quidem plerisque omnibus ab hoc symptomate ægrotantibus, cum his urinis, quantum memoria mecum repetere possum, morbum hunc advenisse memini. Talis enim urina pharmacopœi Hamburgensis fuit. Talis mercatoris Augustani Embdæ decumbentis. Talis rustici, & aliorum quos ab hac affectione correptos fuisse scio, paucis exceptis, in quibus morbi species, & pulsus parvus & inæqualis, absque alterius morbi, ad quem sequitur, significatione, obvio indicio sceletyrben hujus symptomatis causam facilè prodiderunt.

Historia scorbuticorum vomitu laborantium.

Nona.

Decima.

Neque infidum signum est, quod procedente morbo, eoq; diutius moram trahente, à languore sumitur, eo quòd in morbi morâ, & diuturniore ejus progressu, omnes hac affectione laborantes, magis languere, quàm ægrota te appareant, lento morbo quodammodo tabescentes.

Po-

Postremò non contemnendum hu-
jus morbi indicium & ab oblati sumi-
tur: Quod à sceletyrbe vomentes, à
lacte & lacticiiniis (à quibus in ventri-
culi & viscerum affectionibus manifestè
læduntur) sæpe melius habeant, quàm
ab omnibus corroborantibus medica-
mentis, prolixè ventriculo ab artis au-
thoribus præscriptis: Ideò quòd ad-
strictionis facultate, qua plærunque
prædita hæc sunt, materiam circa præ-
cordia constringendo, altiusque impri-
mendo, magis sic affectos illa lædant,
quam juvent: Quæ quia crassa & frigi-
da est, dilui postulat & incidi.

Cujus causa ab experientia prodesse
inventæ sunt, quæ cum attenuatoria,
& incisoria facultate succulenta sunt.
& modicè calefacientia. Qualia ex-
empli gratia becabunga, cochlearia,
trifolium aquaticum, & nasturtium u-
trunq; sunt. Quibus in febribus arden-
tioribus, magisq; infesta siti, jungi a-
cetosa, ejusq; succus potest. Atq; in
viscerum obstructionibus cum hoc
malo concurrentibus, fumaria, cus-
cuta, ceterach, vel si fortioribus opus
fuerit, carduus benedictus, absinthium
romanum, chamæmelum, betonica &

Undecima

*Canon thera-
penticus spe-
cialis in vomē
tu scorbutico.*

*Cur vulgaris
Ventriculorum
roborantia in
scorbuto noxia.*

*Canon therap.
generalis quin-
tus. Medica-
menta scorbu-
tica qualia.*

*Canon therap.
specialis in
scorbuto cum
febris, siti,
& obstructio-
nibus visce-
rum.*

his similia alia: vel si pituitosi humoris plusculum, temperamenti ac victus ratione abundare animadverto; enulæ campanæ radicem, & hyssopi summum aliquid, jam dictis admiscere consuevi, semper curationem humorum mixtorum, junctorumque morborum dirigendo, ut ea potissimum eligantur, & junctis morbis, & humoribus peccantibus, præscribantur, quæ propriam quandam & peculiarem erga hunc morbum vim & proprietatem habent.

*Canon therap.
generalis sex-
tus.*

A purgantibus vero tam diu abstinere oportet, donec concocti subactique humores, ac mitigata febris fuerit: Quando lenioribus id attentare expedit, quod validas purgationes, & largam sanguinis missionem, ægrè hic morbus ferat.

*Canon therap.
generalis septi-
mus.*

Sub frigido cælo, & aëris constitutione frigida & humida, pillulis rectius quàm potionibus alvus movetur, ex quibus, reliquis in hoc casu præstant, pillulæ hieræ simplicis, de hiera cum agarico, alephanginæ, de fumaria, eaq; vel simplices vel mixtæ pro varia corporum constitutione, & divers. humorum purgandorum mixtura.

*Canon therap.
generalis octa-
vus.*

Si

Si calidius cœlum, aërque in quo æger
decumbit ficcior & subtilior fuerit, licet
& potiones, & electuaria convenientia,
pituitam ac melancholiam trahentia,
propinare, vel pro ut hunc vel illum
humorem magis abundare, peritus me-
dicus dijudicabit, de quibus quia uni-
versali methodo docemur, nihil necesse
est, diutius hic immorari, quæ apud alios
rectius ac melius leguntur.

*Canon therap.
generalis no-
nus.*

VI. ALVI FLUOR ET
CONSTIPATIO.

*Regula diag-
nost. spec. seu
nota discernen-
tes profluvium
alvi scorbuti
cum à lienteria
& Diarrhœa.*

Postulat nunc ordinis ratio, quædam etiam de dejectionibus dicamus, hunc morbum comitantibus, quas à diarrhœa & lienteria sequentibus hisce notis non difficulter distinxerit.

Quòd in lienteria cibus ferè crudus, & qualis ingestus est, aut ut primum ingestus est, descendat, quale nihil in scorbuto apparet, ut propterea facilis ejus ab hac dejectione lienterica sit distinctio. In diarrhœa sæpe a cerebro, sæpè à vicinis remorisque ventriculi locis, ad eum humores confluunt liquidi, copiosi, & varii coloris.

Contrà, quæ scorbuti ratione excretiones, contingunt, frequentius compactæ sunt, sed copiam ingestum cibum excedentes, coloris varii, aliquando herbacei, nonnunquam cineritii coloris: Aut si victus ægrotantis errore, aut propter humidiores corporis constitutionem, liquidiores quandoque hæ excretiones occurrant, plurimum tamen ab his differre, tum
quan-

quantitate, tūm excretionis modo deprehenduntur, quæ in diarrhœa descendunt, neque pari quantitate, neq; æquè confertim, atque in hac exeuntes: ne quid de nocturnis atque diurnis excretionibus dicam, nullum manifestum discrimen in hisce nostris profluvii constitutentibus, cū in diarrhœa frequentiora illa interdū esse solent, ut in viscerum obstructionibus sub vespere & nocte.

Causam frequentioris huius dejectionis fortè referendam quis, in impeditam Epatis transumptionem censeat, ut parciore humidi in affluxus parsimonia. Cum enim viscerum facultates hic morbus labefacter, credibile est à debilita attractricis Epatis facultate, suctionem illius, venarumq; præpediri, & per consequens alimenti transumptionem ac digestionem, sicuti argumento corporis extenuatio est. Ut huius rei causa fortè frequentiores alvi dejectiones sint, magis vero compactæ, propter aliqualem viscerum actionem: nisi aliunde humores propter aliorum morborum concurrentium ad intestina confluant, & vel diarrhœa, vel similis morbus huic miscetur.

Causa frequentioris dejectionis in profluvio scorbutico, & magis compactarum excretionum.

sceatur, qui propriis suis signis discerni debet. Si quidem etiam extra hunc morbum, plures misceri contingit, qui singuli suis pathognomonicis signis distinguuntur.

VII. MENDAX DYSENTERIA.

*Canon therap.
specialis in dy-
senteria men-
daci primus.
Canon therap.
specialis in al-
vi profluvio se-
cundus.*

QUibus sanguis crassus & feculentus in venis abundat, iis venæ in intestinis desinentes, sæpe numero sanguinis aliquid cum his dejectionibus effundunt, excrementis non permixtum, sed ab his separatum, atque absque omni lancinatione descendens, manifesta à dysenteria differentia. His in initio sanguinis quid mittere conducit, maximè si menses aut hæmorrhoides substituerint. Alvi profluvium adstringentibus medicamentis curari non debet, sed iis, quæ erga hunc morbum proprietatem habent, atque per consequens mali causam præcidunt. Qua curationis via nos nuper quatuor ab hoc profluvio curavimus: unum rusticum annos sex plus minùs ab hoc profluvio infestatum, & alterum Anglum, tertium infan-
tem,

tem, quartum nautæ conjugem, penè Empirici cujusdam consilio, ad orci fauces deductam.

Historia profluvi. laborantium.

Prognosticuna septimum.

Nam prior curatio veteribus in alvi profluviis usitato adeò hac affectione laborantibus inconueniens est, ut summas angustias sic affecti (certissimo hujus morbi argumento) & aliquando extremam respirationis difficultatem incurrant, præsentis deliquii ac suffocationis periculo. Ideò, quod materiam circa præcordia constringendo, & venas constipando, putrefactionem illa adaugeat, & fortius materiam in viscere impingat, quæ crassa cum sit, dilui (ut dixi) & incidi postulat.

Itaque aucta putrefactione ab hac constipatione, necesse est vapores fumosque ab ea collectos cumulari, qui sursum petentes, cor & præcordia vehementius infestant, jam dicta symptomata inducentes, vel his pejora, si cerebrum petant. Quare tutissima curationis via est, quam demonstravimus, quæ pro morbi diurnitate, & varia corporum constitutione, variè mutari debet, sicut ab universali medendi methodo docemur. Neque enim eadem cura-

curatio omnibus convenit, non magis
atq; omnibus pedibus unus calceus.

DIGRESSIO.

*Nota alia pro-
fluvium scor-
buticum, adeoq;
scorbutum om-
nem demon-
strantes.*

MAgnam quoque, ad monstnan-
dam in his dejectionibus mor-
bum scorbutum præminentiam, pul-
sus & urina habent. De quibus pauca
quædam hoc loco tractationis conse-
quentia invitati dicemus, quantum ad
hoc institutum sufficere putabimus, &
præsenti operi necessarium: Quando
quidem citra alia indicia, non semel ad
morbi cognitionem nos sola urina de-
duxit, sicut etiam fatebuntur, qui me-
cum animum ad harum rerum confide-
rationem adjicere volent.

*x. ex urinis
qua varia.*

Sunt autem urina eorum, qui ab hoc
morbo ægrotant, variæ, pro tempera-
mentorum ægrotantium, diversitate, &
varia humorum putrescentium, morbi-
que natura.

*Urina in scor-
buti initio qua-
les.*

Nam si levior putredo & morbi
initium sit, urinæ quandoque citrinæ
& tenues, quandoque crassæ & albæ
visuntur, quales reddi in omni crudi-
tate solent. Et quibus nihil certi de
hoc morbo constitui potest: crescente
verò

vero putrefactione & morbo, nonnunquam tenues & rubræ intensæ rubedinis, sed ad fuscum declinantis apparēt, similes iis (nisi quod obscure liveſcant) quæ in ardentib. febribus redduntur.

Urina in ſcorbuti progreſſu quales.

Cum quibus ſi nulla aut nullius momenti ſitis, putrefactionis, quas urina habet notis non correfpondens, conjuncta fuerit, certiffimum hujus morbi, ſicut non ſemel experti ſumus, indicium habet; maxime ſi obambulātibus, & omnia vitæ munia ſine offenſione adminiſtrantibus, tales reddantur.

Regula diagnoftica generalis octava. Vide infra p. 39.

Novi qui curationem illius negligentes, ac differentes, poſt aliquot meſes in dimidii lateris reſolutionem inciderint.

Prognofticum octavum.

Frequenter craſſæ urinæ apparent & rubræ, manifeſta lividitate inſignes, & nonnunquam ſaturatæ rubedinis, ſed craſſæ, quæ aut tales permanent, aut craſſo, rubro, & gravi ſedimento in matulæ fundum, furfurum ceu arenularum inſtar ſubſident. In quarum plærifque præter dicta ſedimenta, multa cruda & pituitoſa excrementa, ſuperiori & eminenti ſupra reſidentias ſubſtantię appenſa adhærent, eidem neque permixta, neque integre ta-

Regula diagnoftica generalis nona ex urinis craſſis & rubris, certo ſcorbuti ſigno, ſi adſint conditiones ſequentes.

men separata, sed appendentia potius, vel ad eandem quasi suspensa, totam urinæ massam superiorem turbidam & crassam reddentia. Quibus si ferventis aquæ vel ignis calore, priorem quam redditæ habebant, formam restituas, videbis semper colorem eas monstrare, ex fusco rubescentem. Qui magis minusque rubescens erit, pro sedimentorum rubescentium copia ac paucitate.

1. Tales quoq; certum, apodicticum, ac indubitatum huius morbi signum habent, si pro putrefactionis notis, quas urina ostendit, fitis modica aut nulla (quemadmodum fieri plærunq; solet) ægrotum offendat: Si nullius febris typum morbus ostendat, si totius corporis languor, aut lenta febris ægrotum detineat, atq; is paulatim citra causam veteribus proditam contabescat, sicut fieri perseverante morbo solet.

*Regula diagn-
nost. generalis
decima ex u-
rinis crassis,
albis & tur-
bidis &c.
Vide infra pag.
45.*

Aliquibus urina in hoc morbo crassa, alba, & turbida est, quæ statim postquam reddita est, conturbatur, pluribus sæpe corporibus rotundis & albis, arenularum instar subsidens, à quibus nihilo clarior illa fit, sed turbida perse-
ve-

verat, superiori sua substantia crassa & pingui, matulae parietibus saepe adhaerens.

Talis etiam non infidum huius morbi indicium habet, quod curationis experimēto magis postea cognoscitur; si à catharticiis non clarescat sed turbidior fiat, vel aequè turbida perseveret, si nullis concoquentibus, & incidentibus pituitosos humores medicamentis illa obediat, ut vel quicquam ab iis clarescat & immutetur, aut ab iisdem aeger allevetur.

Præterea si tales absque ullo manifesti seu veteribus cogniti morbi indicio fiant & reddantur, atq; aeger languere magis, quam aegrotare videatur, & pulsus huic morbo familiaris occurrat, parvus & inæqualis.

Memini quoque cum his urinis, omnibus ferè oris siccitatem molestam fuisse, super lenta febre contestantem: & perseverante diutius, ægri negligentia, aut curantis inscitia, morbo, tandem omnibus obtusum crurum aliarumq; partium dolorem subortum fuisse, non infido huius morbi signo, sicut latius de eo, suo loco dicemus.

*Conditiones
seu notæ urinarum talium con-
firmantes.*

3.

4.

5.

6.

Prognost. notum.

*Regula diag-
nost. generalis
undecima ex
urinæ crassis,
nigris & tur-
bidis: itemque
ex nigris cum
obscura albe-
dine.*

Aliorum urinæ intemperantius vi-
sitantium, crassæ visæ sunt, nigræ, &
turbidæ, quæ vel sic permanebant, vel
turbido & nigro sedimento in fun-
dum subsidebant. Quæ aliis nigræ red-
ditæ sunt, cum obscurata albedine ex
crudo nigroq; humore quasi contem-
peratæ, ac si multo nigro, albi partem
admiscueris, ut ex obscuro palle scat.
Familiaris hæc urina iis est, qui negli-
gentius vivunt, & curis anguntur,
quantum nostra qualicunq; observa-
tione animadvertere hætenus potui-
mus. Id quod non obscure urinæ
substantia testatur, ex melancholici,
pituitosique humoris permixtione,
colorata, peccantis humoris qualita-
tem, manifesto indicio vitæ rationi re-
spondentem, demonstrans.

*Notæ hæc uri-
nis adjunctæ:
sitis gravior,
calor major, a-
riditas linguæ,
pulsus parvus
& inæqualis.*

His plærunq, sitis gravior adest, cum
multo & molesto caloris sensu, atque
infesta linguæ ariditate; n si quod ad-
natam, & huic morbo peculiarem in-
æqualitatem, parvitatemque pulsus
ostendat.

Ex quo primum in animum mihi in-
ducere ausus fui, cum scorbuto quoq;
hoc malum communicare, vel poti-
us ab eo (si mavis) excitari, quando-
quidem

quidem, cum ejus curatione reliqua symptomata concidunt, & collabuntur, sicut non semel mihi curatio monstravit, & pluribus à nobis infra inter observationes dicetur.

Ufu tamen, præmonstrante ratione, *Canon therap. generalis decimus.* apprehendi, propter crudorum humorum permixtionem, & gravem eorundem putrefactionem, quem caloris sensus æstusque commonstrant, iis quæ proprie ad hunc morbum faciunt, miscendum aliquid esse, crudos humores quod concoquat, calorem contemperet, humoremq; melancholicum digerat, extenuet, & incidat. A vehementius calefacientibus vero tandiu abstinere necesse est, donec febris sublata, aut saltē mitigata fuerit. Quibus si non satis curatio procedat, semper à mitiorib. paulatim ad fortiora assurgere oportet, donec ad eum medicaminis gradum perveniamus, qui morbum ejusq; causam demoliri sit potens.

Sunt autem ex scorbuticis medicamentis, quæ hui casui serviunt, in primis acetosa & Becabunga, quibus per- *Medicamenta scorbutica frigida, temperate calida &* misceri temperate calida, & humorem melancholicum incidentia ac digeren-

humorum
melancheli-
cum incidenti-
a: crudos hu-
mores conco-
quentia, fe-
brim mitigan-
tia.

tia possunt, cuscuta scilicet, caterach, trichomanes, polypodii quercuum radices, capillus Veneris, buglossa: Et pro crudorum humorum concoctione ac incisione hyssopus & betonica, ut pro delenda mitigandaq; febre, febrilique calore, cichorium, Endivia & id genus alia, aliquali semper incidendi attenuandi; facultate adornata.

Quibus si non satis morbus obediat, devenire ad carduum benedictum, absinthium, & fumariam oportet, eorum quantitatem eousq; intendendo, donec optatum in his finem & affectum consequaris.

Canon therap.
spec. in febr.
scorbuto jun-
cta. Cerevisia
in scorbuto
convenientes.
Einbecensis
cerevisiae
commendatio.
Andernaci
aus.

Quod autem cibus refrigerans his conveniat, & dari oporteat, atq; à vino & fortiori cerevisia eos arceri necesse sit, ex veterum & recentiorum medicorum scriptis placitisq; magis notum est, quam ut hoc loco illud admoneri debeat. Conveniunt autem sic affectis ex cerevisiis nobis usitatis, Bremensis tenuis, Luneburgensis, Brunsvicensis, Anglicana tenuis, & Einbecensis, quæ æstate non infimas inter has laudes meretur, eo quod cæteris tenuior, plus sitim sedet, & plerisq; ægris magis grata sit, ab Andernaco doctissimo ac celebr-

berrimo nostri temporis medico, et-
jam pestis ardoribus commendata, di-
alogis suis, quos de peste tres-elegan-
tissimos simul & doctissimos edidit.

Cum his urinis plærisq; omnibus si-
tis, & oris labiorumq; siccitas molesta
est, quæ tamen aliis mitior est, aliis in-
tensior, iis vero ut plurimum infestissi-
ma, qui nigras & turbidas reddunt, sed
quæ modica liquidi assumptione sem-
per facile placatur, etsi non ita multo
post eadem, ob oris labiorumq; siccita-
tem, humectandi os & labia necessitas
recurrat.

*Sitis notis pu-
tredinis non
respondens,
sup. pag. 23.*

Raro tamen putrefactionis notis,
quas urina demonstrat, potus quanti-
tas ac desiderium respondet, sæpe et-
jam horum nonnulli, qui has urinas
reddunt, largiore potu offenduntur.
Unde etiam non contemnendum ca-
pi hujus morbi indicium potest.

In quorum enim urinis majora pu-
trefactionis indicia insunt, quam
foris ex calore & siti apparet, mor-
bo lento existente, & ad nullius
veteribus cognitæ febris typum
accedente, de his certo tecum sta-
tuere

*Regula di-
agnost. gene-
ralis octa-
va repetita
cum aucta-
rio.*

tuere potes ac debes, à scorbuto tales derineri.

*Regula diag-
nost. generalis
duodecima ex
observatione
successus in
curatione
vide sup. 18.
& infra 46.
49. 213. &c.*

Id quod curatio monstrabit, si convenientibus, & huic morbo accommodatis medicamentis, eam tentare non pigebit. Videbis enim hac curationis ratione brevi & in paucis diebus (nisi inveteratus sit morbus) tales sanari, & ad pristinam valetudinem reduci, quos nulla medicina prius potuit sublevare, cadentib; indies magis magisq; ægrotantis viribus.

*Ratio cur ali-
quando notis
putredinis in
urina satis in
scorbuto non
respondeat.*

Ratio forte hujus urinæ, parciorisq; sitis fuerit, quod humor melancholicus, materialis hujus morbi causa iudicatus, putrefactus & accensus, suæ quidem putrefactionis notas in urina edat sæpè ardentibus febribus pares, aut non multum dissimiles, sed quia crassus, idemq; frigidus & terreus est, neq; facile (ut viridia ligna) accenditur, neque accensus, perinde atq; cæteri humores, urit. Cujus causa, etsi labiorum orisq; siccitatem facere potens sit, non tamen idem semper adferre bibendi desiderium, aut similem inquietudinem solet, atq; febris continua & ardens: ut pote quæ fumosis suis vaporib; magis, quam igneo calore cor ferit.

Quo

Quo fit ut quamvis crebrum, par-
vum tamen ut plurimum, & inæqua-
lem pulsum faciat, non dissimilem illi,
qui in febrium accessionibus sentitur.

*Nota ex pul-
su.*

Quo nomine aliquando etiam do-
ctissimis in medicina viris hic pulsus
imposuit, ob hujus parvitatem febrem
magno curationis errore, & ægrotan-
tis periculo contemnentibus, vel non
agnoscentibus, sicut maximi medici
exemplo ostendere possem, nisi alio-
rum famæ & existimationi nos confu-
lere, Christiana charitas juberet. Et
quotus quisq; est, qui non aliquando
dormitet & hallucinetur?

*Admonitio,
ne ob pulsus
parvitatem
febrem con-
temnamus
aut non agno-
scamus.*

Putavi tamen veritatis studio id hîc
admonendum esse, ut hac admonitio-
ne ad curationem instructiores, iis
medicamentis, quæ crassam hujus mor-
bi, in qua residet, causam materiale
attenuant & incidunt, quædam mi-
scenda esse sciremus, quæ cum eadem
facultate, leviter refrigerant.

*Canon therap.
generalis un-
decimus.*

VIII. FEBRES INORDINATÆ.

Sunt autem febres, quæ cū his urinis
nobis offeruntur, aut lentæ & conti-
nuæ, aut interpolatæ & intermitentes,
sed quæ nullo sæpe signo veterū febr-
ibus assimulatur, nisi quod falso quo-
tidianæ, tertianæ, ac quartanæ febris
typo

*8. Febres in-
ordinatæ Fe-
brium scorbu-
ticarum vari-
etas multi-
plex.*

poludant, easq; dierum imitatione potius quam signorū proprietate exprimant & referant. Frequenter etiā nullo ordine invadunt, & quandoq; quotidie bis, aliquando ter quaterve, etiam post tertium sæpe, quartum, quintum & sextum diem, variis horripilationibus & inordinatis ægrotum infestant, nullo aut nullius momenti calore sæpe comitatis. Quin etiam æstuantem calorem subsequutum has horripilationes fuisse observavi, sed cum multa ad præcordia anxietate conjunctum non infido hujus morbi, ut antea dixi signo. His circa febris vigorem pulsus aliquando esse magnus ac durus solet, qui circa declinationem rursus suo se indicio prodit, nativam & huic morbo propriam parvitatem inæqualitatemque retinens & ostentans.

sup. pag. 16.

Sed & sex, ac septem horas, ab his horripilationibus, & frigoris sensu detineri quosdam vidi, priusquam febrilis calor accenderetur, vel ad exteriora illorum spiritus & sanguis diffunderentur, qui suo reditu, ab interiorib. multo & molesto æstu corporis extrema afficiebāt, cum multa siti, & molesta linguae labiorumq; ariditate. Quibusdā

sen-

sensus fit, atq; si frigida intus ad spinalem medullâ ipsis affunderetur. Unû novi retro ad dorsum calido sensu, & in anteriore corporis parte, frigido affectum fuisse. Sed & hunc etiam, aliis quotidie semel ac sæpius, aliis post secundum & tertium diem reversum fuisse, memini, nullo aut perquam exiguo comitatum calore.

Paucos cum his utinis vehementiore corripî rigore vidi, & ab hoc alios gravissimo calore, alios levi, & nonnullos nullo pené infestari.

Quos autem calor & sitis magis excruciarunt, his omnibus cum anxietate per intervalla recurrente, id advenisse, nostra qualicunq; observatione animadversum est.

In quibus præter hanc anxietatem, si non initio, & morbi vigore, febrem hanc pulsus ostenderit, saltem in paroxysmi declinatione manifesto indicio sua parvitate ac inæqualitate eam judicabit. Sicut latius postea de hoc pulsu dicemus, ubi ad eum locum oratio nostra pervenerit. Plurimum n. momenti in his diligens pulsuum observatio habet. Quod reliquorum symptomatum propter varias & diversas corporum constitutiones ac téperaturas, facilis sit per-

permutatio, quæ tamen si diligenter attendas, fere unius pulsus notioni subjacent, quatenus ab una eademq; causa, ea proficiuntur & emanant.

In his omnib. cum propter multiplicem symptomatum varietatē raritatēque, causam subdesse raram, & veterib. incognitam, considerarem: post varias habitas mecum deliberationes & diligentē pulsuum urinarūq; examinationē. tandem scorbutō adscribendam inveni, conjecturā meam ac *συχασμὸν* de his, comprobāte felici curationis evētu. Quem similem deprehendant, qui post me animum adhæc adjicete & idē mecum explorare non recusabunt.

Adhuc levissimas putrefactionis notas, cū hujus morbi significatione habent urinæ tenues & citrinæ sub obscura fuscitudine lividitateq; conspicuæ. Atq; hæc dicta nobis de iis urinis sint, quæ cū scorbuti morbi demonstratione putrefactionis notas, & per consequēs febrilis caloris indicia ostēdūt, ideoq; cū iis quæ hunc morbum curant, quandoq; admixtionem eorum medicaminū postulant & requirunt, quæ calorem contemperant & febrem extinguunt, pro febris modo ac magnitudine, majore minoreve quantitate; sic tamen

ut quantum fieri potest, aliquali aperiendi ac incidendi facultate ea prædita & adornata sint.

Postulat vero nunc ordinis ratio, de iis urinis dicamus, quæ citra febris ac putrefactionis humorum indicia hunc morbum ostendunt. Cujusmodi inprimis urina alba, crassa, & turbida est, in cuius fundum plura paucioraq; corpora subsidunt, alba, rotunda, cineritia, crassa & gravia, arenulis majoribus, ac fractæ polentæ non dissimilia, quæ nisi fortiore matulæ motu, urinæ substantiæ rursus non permiscantur, nec à matulæ fundo eleuantur, quasi semi mortua, & instar puris, caloris nativi spirituumque vacua.

Urina citra febris & putredinis notas scorbutum ostendentes.

Hæc etiam indubitatum huius morbi argumentum habent: ut semper (absit arrogantiæ dicto) hunc morbum ex his pronuntiare ausus fuerim. Memini plærorumque qui has urinas edderent, crura ab hoc morbo resoluta fuisse. De qua re an certum quid hæ urinæ attestentur, non satis confirmare aulam.

*vide suprap. 35
Prognosticum
decimum.*

At certo scorbutum eas demonstrare, plurimis experimētis mihi constat. Quod sic esse deprehendent, quibus bis terve hæ visæ, & probata super his curatio

ratio

Historia scorbuticorum cum urinis albis, crassis, & turbidis.

ratio fuerit, quæ re ipsa comprobatur, quod ratio invenit. Talis fuit urina bulci, nautæ, mercatoris Dresdensis, sicut latius de his inter observationes dicemus. Quibus crura simul ab hoc morbo resoluta fuere, curatique ab his medicamentis, quidam eorum in quinque ac sex diebus sunt, alii etiam in paucioribus, & nonnulli in duabus plus minus hebdomadis.

Urina tenuis & spicea.

Quorundam hoc morbo laborantium urina tenuis & spicea visitur, & sæpe feri instar pallescens, qualis reddi in viscerum obstructionibus, ac ventriculi cruditate solet. Ex quibus nullum certum capi potest hujus morbi argumentum, quantum mea qualicunque observatione animadvertere hæcenus quivi.

Historia de urina tenui & spicea cum vomitu post urinam crassam & rubram.

Tres novi, quibus cum hac urina continuus vomitus molestus erat, in quibus crassæ & rubræ præcesserant, sicut ab amicis & domesticis edoctus sum. Quod fieri maxime solet, quando diuturniore morbi mora expultrix facultas afflicta, languet, ut altiores morbus egerit radices, vel quoties natura debilis morbi materiam non aggreditur. Cognoscitur autem curationis experimento. Nam exhibitis quæ huic morbo serviunt medicamentis, observabis postridie, vel saltem post biduum, ab his, ex tenuibus crassas fractas eas esse, cum similibus sedimentis rubris & crassis, manifesto hujus morbi, sicut jam dixi argumento.

Regula diagnostica i generalissima.

Proinde cum his urinis semper inquirere debemus, quales in morbi principio urinæ vel ejus apparuerint progressu, si notiora certioraque

que de hoc morbo cognoscere cupiamus. Ex quib. si nulla certa notitia haberi potest, amplius considerabimus, num quis morbus, cujus ratione sequi eum veteres dixerunt, subfit. Item num

h. est. Methodus interrogandi & tractandi ægrum ad scorbuti investigationem.

quem post modum vel alias, sub præcordiis sentiat respirationis angustiam, at quem obtusum crurum dolorem. Vel num quâdoq; scorbuto laboraverit, ex quo non satis fuerit restitutus, vel quovis alio symptomate huic morbo proprio, exempli gratia, arthriticis dolorib. varie locum affectum, & præter ratione commutantibus, aut simili.

Quorum si quid æger confiteatur, habes evidens hujus morbi signum. Si neget, majoris certitudinis ergo amplius ægrotum percunctor (licet n. nobis eadem sæpius rogare, quandoquidem ut recte celeberrimus nostri temporis medicus Guilielmus Rondeletius monet, mercatores non piget, pecuniæ calculum ter & iterum repetere) quo victu sit usus, & quibus potissimū delectatus sit cibus, num adversa tulerit & quo animo, num prius boni habitus fuerit, nunc vero præter rationem & sine manifesto morbo contabuerit.

Si nec illud, nū quid in corpore sub-

in

4

5

6

7

8

9

10

11
12

in locis commoretur, campestribus, an-
uliginosis & planis. Quis situs loci i-
stius ad mare septentrionale. Quæ ra-
tio ibidem aquarum.

13

Ex quibus si levibus tantum conje-
cturis sententiam meam de scorbuto
confirmari animadvertam: Atq; æger
interea nullo morbo manifesto veteri-
bus cognito laborare videatur; con-
venienti huic morbo medicamento se-
mel, atq; iterum eum exploro.

A quo si ex tenuibus & spicis urinis,
commutari eas in crassas & subrubas
ac turbidas conspicias, crasso, rubro ac
gravi sedimento subsidentes, habes cu-
rationis bene institutæ indicium non
leve. Quod urina hæc latentem prius,
quiescentemq; morbi causam, medica-
mentum hoc commovisse, & naturæ
directione aggressum esse common-
strat, indicans quâ cœpimus via, per-
gendum esse, donec à natura morbi
causa medicaminis interventione, con-
cocta ac separata, expulsionem obedi-
at obtemperetque.

*Historia com-
mutationis u-
rinarum in
scorbuto.*

Hanc urinarum ab his medicamen-
tis permutationem, intra biduum sub-
secutam fuisse in duob. Stadenſis urbis
senatorib. observavi, qui diu ante cum
hoc

hoc morbo fuerant conflictati, aliis atque aliis symptomatibus subinde infestati.

Eandem quoq; nuper Embdæ consideravi, in uno caupone, & altero nauta. Quorum alter, caupo scilicet, supra sex menses domi claudus ab hoc morbo defecerat, præter unius cruris paralyfin, summis quoq; crurum doloribus divexatus. Pro quibus varias chirurgorum unctiones expertus frustra fuerat, indies in deterius proficiens.

Sed & ægri sensus si melius habeat, *Canon therapeuticus generalis duodecimus. Vide pag. 18. 46.* monere nos debet, incœpta semel curatione pergendum esse. Siquidem certissimum est, quod ab eo sumitur indicium, & dignum, quod in omni curatione adnadvertatur. Unde & Hippocratem argumentari aphorismorum sectione secunda non piguit. *Aph. 17.* Nihil enim tam est perniciosum ac malum, quam ab uno, ad aliud medicaminis genus, facile, & sine causa transire. Aut leviter ab ijs recedere, à quibus melius se sentire æger testatur.

Quamobrem fugiendum vel maxime illud medicorum genus est, quod *Fugiendi Medici qui quotidie nova* E quo-

ua medica-
menta præscri-
bunt.

quotidie, quoties ægros invist, novas ac diversas medicaminum compositiones ægris præscribit.

Sed de his, quia præter nostrum institutum sunt, hæc sufficiant. Itaque unde oratio digressa est, revertentes, porro ostendemus, æque ab his urinis, sicut & à pulsu, morbiq; natura & moribus, quasdam nostras febres intermittentes, tertianæ, quotidianæ, ac quartanæ febris typo ludentes, à veterum febribus discerni & distingui, atque prædictas, quæ nullo ordine ægrotantes, ut dixi, infestant.

IX. FEBRES INTERMITTENTES.

9. Febres inter-
mittentes scor-
buticæ.

Contingit enim non raro apud nos quibusdam febribus intermittentibus, & quotidie, tertio, ac quarto die recurrentibus vulgus nostrum corripitur, præter diei accessionem nihil cum veterum febribus communicantibus, vel saltem paucissimis notis iisdem respondentibus.

Quas etiam si curationis modo veteribus descripto, curare fueris aggressus, adeo nihil proficies, ut cum artis
vitu-

vituperio, & tuo ipsius quoque tadio, curationem sistentaturus, ut propterea recte dictum à Galeno sit, febres non dierum numero, sed signorum proprietate distinguendas atq; dijudicandas esse. Et recte scriptum à Peucero viro doctissimo in præfatione libri de divinationum generibus sit, medicationem omnem everti ab eo, qui signorum considerationem tollit.

Quam multas enim (ne quid de reliquis dicam) quartanas paucis ab hinc annis vidimus & curavimus, quæ nullum cum veterum quartanis, præter diei accessionem, signum commune, neq; in pulsu, neq; in urinis, aliisve ejus symptomatibus habebant?

Nam ut cæteros taceam (etsi etiam maximi nominis & authoritatis viros ac fœminas testes hîc adducere queam) unius infantis & bimuli testimonio adhuc lactentis, contentus ero, viri in Republ. Embdani celeberrimi, & bonarum artium ac juris studiosi, nostrique amantis, filioli tunc temporis unici, qui cum nutricis lacte sibi hoc malum suxerat. In quo primum febris hæc cum levi extremorum frigiditate incepit, quæ ad horam unâ plus

Historia memorabilis infantis febris quartanae scorbutica laborantis.

minus durabat. Hanc calor subsequatur mitis, aliquando horis octo, quandoque novem eum infestans. Quando sæpius sed parum bibit, vix singulis vicibus cochlearia duo. Toto autem paroxysmi tempore libram dimidiam & nonnunquam ne quidem libræ quadrantem. Etsi interea puer langueret, omnibus ejus viribus graviter afflictis. Cui demum (perseverante diutius morbo) oculi intumescere, & prætumido tumore facies attolli cœpit. Unde de cachexia ac graviore morbo sollicitus, quibusdam propinatis nutrici medicamentis, ægrotantem DEI beneficio curavi. Pulsus etiam in ipso febris vigore parvus erat & inæqualis. Et urina in terram projecta albida viscebatur & turbida. Febris vero quarto quoque die recurrens.

Hæc si ex dierum numero æstimanda febris fuisset, haud dubie ut quartana curari illa debuisset. Cum qua præter accessionis diem, nullo signo præterea communicabat, sicut manifestum est, cum quartanæ veterum signis, hæc nostra conferendi. Ut taceam infantis temperamentum sanguineum

neum & laudatissimum, à melancholici humoris generatione alienissimum.

Quamobrem suis quæque febres notis ac signis æstimari ac dignosci, non dierum invasione debent. Id quod ubique & in omnibus febribus sibi proponere ac infigere debent, qui medicinam apud nos feliciter exercere cupiunt. Scilicet ut veterum febrium, cum his nostris de quibus sermo est, collatione distinguere norint, quibus signis veterum febribus accedant, & quibus rursus discrepent & dissentiant.

Quod imprimis nobis pulsus monstrabit, si parvus & inæqualis præter febris rationem fuerit, deinde præter pulsum urina, eo quo dixi, modo considerata. Ultimo quoque propria cuiusque febris accidentia, quæ in memoria habere eum oportet, qui feliciter has nostras dignoscere velit.

Regula I.

*Diagnostica
specialis quint-
ta, seu nota di-
scernentes fe-
brim scorbuti-
cam à com-
muni.*

*Vide infra
pag. 57. &
seqq.*

Futurum enim est, ut hac consideratione in morbi noticiam deductus, paucis diebus gravissimas quasque febres sit curaturus, quibus nulla prius veterum profuit curatio: observatis tamen scopis & indicationibus,

quas nobis medendi methodus præscribit. Quæ, quia à nemine hætenus satis animadversa sunt, quod sciam, hinc factum esse arbitror, quod tantopere vilescere apud nos & in his regionibus medicina cœperit, utpote quæ nullius febris curationem certo promitteret, sed quæ plus sæpe offenderet, quam prodesset, non medicæ artis culpa, sed artificum ignorantia, pro ratione locorum & circumstantiarum, cuiq; feбри commoda medicamina applicare nescientium.

Quo magis necessariam diligentem signorum sceletyrbes traditionem esse putavi, quod ab his ad morbi noticiam, & per consequens rectam curandi rationem quasi manu ducamur.

*Urinarum in
febrilibus scor-
buticis exa-
ctior conside-
ratio.*

*Urina crassæ
rubræ & sub-
fuscae in
scorbuto quid
notent.
pag. 34.*

Nam si in his regionibus febricitare quispiam, cum crassis, rubris & subfuscis urinis cœperit, plurimis subsidentiis conspicuis, à quibus nihilo clarior supereminens supra hæc urina extat, sed crassa & turbida atq; subalbida, persistat: quod, inquam, cum huius morbi significatione id fiat, supra ostendimus: Siquidem non unius, sed plurimum humorum & diversorum putrefactionem, urina talis demon-

monstrat, & propterea non simplicem, *Vide Hipp. aph. 33. lib. 7*
 etsi prima fronte videatur, sed compo-
 situm morbum, ex varia humorum
 miscella.

Quæ si terrianæ febris, ut quando- *Urina in ter-*
 que & sæpe fit, typum mentiat, ad- *tiana scorbu-*
 huc magis manifesta differentia, ma- *tica quales.*
 gisq; perspicua erit, quæ ab his urinis
 sumitur: Quod in illa frequenter in
 initio urinæ tenues & citrinæ conspi-
 ciantur, atque ad monstrandam suffi-
 cientem humoris peccantis concocti-
 onem, nonnunquam nubecula suffi-
 ciat, cum in hac nostra, crassa illa &
 diversarum partium occurrat.

Ut taceam, in tertiana etiam notha *In tertiana*
 urinis crassescens, & crasso sedi- *scorbatica uri-*
 mento subsidentibus, febris declina- *na crasse.*
 tionem expectari, quæ in hac nostra
 extremam cruditatem, ut plurimum,
 denotat: Sicut manifestum exemplum
 quod cum his febris quotidie invale-
 scat & assurgat, vel saltem nullam sui
 imminutionem ostendat, & certo hu-
 jus morbi præsentia testimonio, & e-
 jus, à vera vel notha tertiana veteribus
 cognita, discrepantia.

*Explicat aph.
Hipp. ex 2.
prognost. 27.
quem citat Gal.
4. aph. comm.
71.*

*Prognosticum
undecimum.*

Hippocrates urinas rubras rubro sedimento in matulae fundum subsidentes, longiores quidem morbos designare, sed tutas & sine periculo esse in aphorismis dixit. Quem si hic & in nostris aegrotis sequamur, non raro nostris praedictionibus, magna artis infamia, & nostra non vulgari turpitudine, à scopo aberrabimus. Quandoquidem cum his urinis quam plurimos hodie apud nos interire videmus, ab angustia hac, praeter medicorum spem & expectationem extinctos, vel alias morbi magnitudine & diuturnitate pressos. Quemadmodum pluribus exemplis id hic, si necesse esset, probare possem.

Quapropter Hippocratis aphorismum de ijs sedimentis intelligendum esse opinor, quae in fundum subsidentia, reliquam & supereminentem urinae substantiam claram & pellucidam relinquunt, nullis excrementis contaminatam; Ideoque naturae super peccante materia victoriam, vel aliqualem ejus concoctionem & subtractionem ostendunt. Quae in nostris urinis extremae cruditatis signum habere, superiores urinae partes crudae, in-

indigestæ, ac turbidæ demonstrant,
& propter has quotidie tacitis incre-
mentis assurgens morbus.

Quare qui medicinam facere apud
nos considerate volunt, diligenter
animadvertere debent, ne dum Hip-
pocratem in his se sequi arbitrantur,
ab his subsidentiis decipiantur, & cum
sua & artis infamia prius prædictioni-
bus suis impingant, quam morbus e-
jusque natura, recte ijs cognita sit &
perspecta.

Quod fiet, primum si ad diversas u-
rinarum partes animum attendant.
Deinde si omnia febris signa & sym-
ptomata secum diligenter expendant
& quibus signis ad veterum febres hæ
nostræ accedant, quibus discrepent.
& dissentiant, studiose dignoscant.

*Signa veterum
febris cum
nostris commu-
nia & diversa.
Vide sup. pag.
53.*

Futurum enim hoc modo est, ut plu-
rimas agnoscere notas cogantur, qui-
bus à veterum intermittentibus no-
stræ discrepent & distinguantur: Sive
caloris qualitatem, frigorisque sen-
sum, sive morbi naturam & mores fe-
brisq; continuationem, & superveni-
entia aliquando cum his symptomata
rara, & à veterum foro aliena, confi-
derent & contemplantur. Nam in
quar-

*Urina in
quartanis ve-
terum & no-
stris quomodo
conveniant :
quomodo dif-
crepent.*

quartana (exempli causa) etsi urinis
sæpe hæ nostræ febres conveniant, at-
que perinde in his nostris eæ, atque in
quartana veterum, crassæ appareant
& subfuscæ, rarissime tamen in mor-
bi principio, & prima febris accessio-
ne, rubidæ illæ, & crasso ac gravi se-
dimento subsidere conspiciuntur,
vel dispari substantia partim subsi-
dente, partim conturbata appa-
rent.

*Accidentia
rara in no-
stris febribus
contingentia.*

Accedit in veterum quartanis, cras-
sas & subsidentes urinas concoctio-
nis initium designare, quas in no-
stris extremæ cruditatis initium ha-
bere, morbi incrementum ostendit:
Ne quid de raris accedentibus dicam,
uti cum tertiana & quotidiana nostra
febre, sic etiam cum hisce quartanis
subinde concurrentibus, motibus
scilicet convulsivis, lethargo, tremo-
re, variis & pungentibus corporis do-
loribus & lancinationibus, vel hujus
febris, in alium morbum, præter ra-
tionem, transitione: Sicut frequen-
ter & inprimis apud Embdanos con-
tingere vidi, ubi etiam quam Ham-
burgi pertinacior hic morbus esse so-
let,

*Embda, quam
Hamburgs
scorbutus per-
tinacior.*

let, & difficilioris ac operosioris in quibusdam curationis.

Ab his & similibus accidentibus non est difficile, has nostras intermittentes febres ab ijs, quas antiquitas agnovit, distinguere, ijs qui exercitatum in veterum morbis, earumq; dignotione, ingenium habent.

In quotidianis plærung; urinæ crassæ & albidæ esse solent, reliquis, quæ *Quotidianæ veterum à nostris quomodo differant.* ad pituitæ generationem faciunt, correspondentibus. Quas etiam ad amussim cum nostris plærisque quotidianis collatas, plurimum differre, & ab iis discrepare, facile intelligent, qui ad ea, quæ de quotidiana febre ab antiquis scripta sunt, animum attendunt & diligenter animadverunt.

Videbunt enim ut morbi natura & moribus, sic etiam pulsu & urina plurimum ab iis has nostras discrepare. Inprimis vero urina, quæ ut sæpe varia est, ita nonnunquam in his quoq; occurrit crassa & subfusca. Sed & accessionis modo, & terminatione, & præcedentis victus ratione, plurimum quoq; eas discrepare animadvertent.

Cæterum plus difficultatis hujus *Regula diagn. Gen. 18. ex urin.* dignotio ab urinis habet, quoties eæ

va-

*commutatione
in genere. vide
pag. 234.
Urina varia
quid notent.*

*Galenus locus
de urinis va-
riis ex 4. de
victu acut.*

variæ occurrunt, modo tenues & citrinæ, modo crassæ & turbidæ, aliquando rubræ, & rursus paulo post aqueæ, vel tenues, & conturbatæ. De his urinis meminisse præcepti Galenici oportet, quod quarto de victu morborum acutorum libro, in hanc sententiam scriptum reliquit: Scilicet ex varia & facili urinarum permutatione, plures affectiones denotari, quæ ut non eandem curationem, ita neq; similem solutionis præfinitionem habent.

Quemobrem si quando in ægrotum incidamus (incidimus autem frequenter) has urinarum mutationes patientem, scire ex hoc præcepto Galeni debemus, non unum neque simplicem, sed compositum morbum, ita affectum pati, atque aliam causam ac morbum subesse, diversum ab eo, qui in oculos ac sensus incurrit, utcunq; simplex prima sua specie ac facie morbus videatur. Qui num ad hunc morbum, & specificam hujus putrefactionem referri debeat, cum ab urinis hisce variis, tum à pulsu docemur parvo, debili, & inæquali, vel magno, duro, & serratili, absq; ulla membranarum offi-

ossibus adhærentium inflammatione. Unde non contemnendum nobis huius morbi indicium ministratur, quod pro fundamento, super quo porro ædificemus, hic nobis servire queat, utpote à quo aliquando viris in medicina exercitatis, prima manus nostræ ad pulsum applicatione, differentiam, qua ab aliis febribus, quas antiquitas cognovit, hæc nostra cum scelerityrbe conjuncta discernenda sit, ostendi.

Siquidem non raro contingere videmus, quod æstuantibus, & præ calore varie jactantibus sese ægris, propriam & adnatam suam parvitatem inæqualitatemq; pulsus conservet retineatq; & huius morbi indicio, & lentæ putrefactionis significatione, suis fumis & vaporibus magis, quam igneo calore moleste. Quemadmodū *Historie de quartanis intra 10. dies curatis.* proximis hisce annis elapsis, non semel id experti sumus; Et nuper in tribus quartanis, intra decem dies plus minus, feliciter (Dei gratia) nostra opera curatis, qua nonnulli, nulla simili curatione usi, supra annum ægrotarunt.

Huius generis, & ab hoc morbo de-

*Febres scorbut.
in initio tertianæ
typum repræ-
sentantes: po-
stea quotidie
invadentes.*

dependentes illæ quoque sunt, quæ cum his urinis crassis & turbidis incipientes, in initio, tertio quodque die, fallaci tertianæ febris typo invadunt, atque postea, nisi intra dies quatuordecim sponte desinant, quotidie infestant, nonnunquam vehementi cum rigore, & aliquando quoque diuturniore cum horrore.

Prognost. 12.

Hæ febres ut plurimum in aëre salubriore cum temporis mutatione, & post tres menses, sponte solvuntur, ut quos in initio veris, febris hæc apprehendit, fere sub festum Jacobi, vel circiter, remissionem sentiant, tam qui medicinæ præceptis obediunt, quam qui omnibus artis medicæ legibus soluti vivunt, utpote quæ propter morbi hætenus ignorantiam, nullis medicorum curationibus cessit.

*Lactes & lactici-
norum
usus interd.
prodest in fe-
bribus scor-
buticis.*

*Curatio in-
terd. periculo-
sa in febribus
scorbuticis.*

In his etiam sæpe variæ urinæ occurrunt, utcunque nullus circa vitum committatur error. Vidi etiam frequenter cum laudatiore colore à morbo surrexisse, qui lacte & lactici-
niis usi fuerant, quam qui ex medico-
rum vixissent præscripto. Novi et-
jam quibus periculosa curatio fue-
rit: Sicut de Anglo uno ostende-
re

re possem, nisi odiosa hujus generis exempla essent.

Puto tamen recte id hic moneri, ut cognoscant medici juniores, quomodo hos scopulos declinare conveniat. Cum enim quotidianis febris invasionibus, ægrotantis vires frangantur & labefactentur, non alienum à ratione est, medicaminum, morbum non curantium, usu & exhibitione, magis id fieri debere. Quod medici industrii animadvertentes, victus ratione, ut tutissimo curationis modo, istiusmodi postea curare tentarunt, ab eventu nimirum edocti: Quo nihil melius ac tutius sub morbi ignorantia est.

Si æstivum tempus fuerit, nihil utilius aeris mutatione est. Procedit autem optime harum febrium curatio, ijs medicamentis, quæ scorbuto ac febre debentur, sicut multiplici nostra experientia hætenus comprobatum fuit. Præmissis (sicut id requirere corporis constitutio videbitur) universalibus, in administratione eorum observata anni temporis, morbi temperamenti, virium, & præcedentis victus ratione, sicut de his universalis medenti methodo erudimur.

Quod

*Victus ratio
in morbis igno-
tis tutissi-
mus curandi
modus.*

*Canon therap.
spec. in febris
scorbut.
primus.
Canon therap.
spec. in febb.
scorbuticis se-
cundus.*

Quod si cibandi necessitas medica-
minum exhibitionem, propter intem-
pestivas febrium accessiones impedi-
at, & vernum tempus fuerit, atque æ-
grotus in urbe decubuerit, in paten-
tem aliquem locum extra urbem æger
transportetur, ibique expectata hu-
morum concoctione, per intervalla,
quoties expedire id videbitur, facili ac
levissimo cathartico eos expurgato.

Tertius.

Quod si moram hanc recurrentes
subinde angustiae, & ad præcordia in-
festantes, propter suffocationis peri-
culum non admittant, nulla habita
temporum febris ratione, etiam ali-
quando in ipso febris vigore, neces-
sitate id requirente, magno ægrotan-
tium commodo morbiq; imminu-
tione, prædictis medicamentis ad fe-
brem & scorbutum facientibus insto.
Nam qui feliciter jam dictas febres
curare cupit, medicaminum compo-
sitionem moderabitur, pro ut vete-
rum naturæ & moribus, vel huic no-
stræ, plus minusve illas consentire a-
nimadvertit.

Quintus.

Si enim corpus biliosum, & multa
bili redundans, plures tertianæ febris
notas nobis repræsentaverit, paucio-
res

res vero scorbuti, cum iis quæ cholera temperant & extinguunt, ea misceri, sed minore quantitate debent quæ hunc morbum curant, idque quadam humectandi refrigerandique potestate faciant & promittant. Cujusmodi sunt huic usui inservientia becabunga & acetosa. Quorum succus utilior eorundem decocto est. *Sextus.*

Quibus si non satis curatio procedat, etiam aliquid de cochleariæ succo ejusque decocto addo, sed moderate quantitate. Qui prædictis convenientior est, si abique multa siti cum urinis nigris, & rubris, vel crassis & subfuscis febris contingat, in corpore multo & crasso succo melancholico abundante. *Septimus.*

Si aer in quo æger decumbit ac degit, tenuis fuerit & subtilis, eademque fuerit vivendi consuetudo, mitioribus minusque incidentibus & attenuantibus medicamentis curatio perficitur. Quæ intendi in aëre crasso & humido debet. Qualis aër Zelandicus, aër Embdanus, & in multis partibus Hollandiæ est, iis in locis potissimum & civitatibus, quæ ad septentrionalis maris littus proxime accedunt. *Octavus.*

In quibus, prædictis pro ratione ægrotantis temperamenti, ea miscenda sunt, quæ cum hujus morbi curatione humores attenuant & incidunt. Cujusmodi inter cætera sunt carduus benedictus, absinthium utrumque, enulæ campanæ radices, nasturtia utraq; trifolium aquaticum, id genus alia.

Decimus.

Quod si fortioribus opus fuerit, optime faciunt chelidonie minoris radicis decoctum, & taphani succus expressus, & jam dictis debita portione permixtus. Quibus rite administratis, paucis diebus curari febres longissimas, sæpe supra annum perdurantes, & non raro in graviores (ut fieri solet) morbos transeuntes, videbis, quibus, citra horum usum, nulla (sicut sæpius observavimus) medicina potuit subvenire.

Prognost. 13.

Atq; hoc curationis modo paucos novimus supra quatuordecim dies ab his febrib. ægrotasse. Quemadmodum infinitis exemplis si necesse esset, ostendere possem.

Prognost. 14.

Vidimus etiam præter veterum placita, in aliquibus hisce febribus intermittentibus convulsivos motus, in aliquibus Subeth sive Carū conjungi, qui cum

cum febris accessione singulis paroxysmis recurrerent, iisdemq; remittentibus cessarent.

Alterius exemplum nuper nobis Embdæ præbuit quidem Anglus, cui nomen erat Ritzardus Best, & præter eum puellus, & altera puella annorum plus minus quatuordecim. Ut Cari cū paroxysmo recurrentis, adolescens Flander Boudevinus Bogart, & præter ipsum senex sexagenarius Gandavenfis. Quos à putridis & malignis hujus morbi exhalationibus id pati, ex pulsu & urina, ac febris specie & moribus, cum adverteremus, brevi, huic malo obviam ivimus, nisi quod ab hoc caro senex multas secum mulsitans melancholiæ causas, quibus cum diutius conflixerat, semel atq; iterum revocatus, tandem sit extinctus.

In quorum curatione illud peculiariter annotari debet, quod peculiari vi & facultate in Caro ab hoc morbo excitato, nostra qualicunq; observatione animadversum sit, ante omnia nasturtii aquatici succum valere, illius scilicet, quod in limpidis & fluentibus rivulis provenit. Nam quod in cœnosis & stagnantibus quibusdā aquis apud nos

*Historia febris
intermittente
scorbatica la-
borantium
cum convul-
sivis morbus
& caro.*

Prognost. 15.

*Canon therap.
spec. in febris
scorbaticis
undecimus.
Nasturtii a-
quatici vis.*

*Nasturtii &
quat. electio.*

Embdæ crescit, sicuti saporem ingratum atq; injucundum habet, ita inefficax quoq; illud esse experimur.

*Canon therap.
specialis in fe-
bribus scorbuti-
eis duodecimus.*

Miscetur autem inconvenienter hic succus, iis quæ ad febres, veteres præscripserunt, tum etiam illis ipsis, quæ huic morbo convenire paulo ante diximus.

Quod vero ad soporem hic succus conferat, ante nos Rondelitus celeberrimus nostri temporis medicus, contra Fernelium virum quoq; doctissimum, suo de medendi methodo libro defendit. Cujus sententiæ subscribere nos veritas compellit, qui in hoc nostro Caro à scorbuto excitato, bis terve præsentī remedio eodem usi sumus, sicut suo loco de hac re latius dicetur.

*Canon therap.
specialis in fe-
brib. scorbut.
decimus tertius.*

*Succi cochlea-
rie vis contra
motus convulsi-
vos.*

Convulsivis motibus plurimum cochleariæ succum prodesse, aliquoties etiam nostris experimentis comprobatum est, si iis quæ ad febres (cum quibus ut plurimum concurrunt) faciunt, commisceatur, indicationibus, quas medendi methodus ostendit, ubique observatis, ut scilicet pro ratione humorum peccantium, & victus præ-

præcedentis, curationem intendamus imminuamusque.

Cum quibus si alvus non respondet, *Canon therap. spec: in febr. scorbut. quartus decimus.* injiciendi clysteres revulsorii sunt, ex iis quæ humorem attenuant & incidunt, ac simul humorem melancholicum, & huic pro temperamenti ac vitæ occasione mixtum humorem leviter evocant & educunt. Siquidem graves humorum commotiones, maxime in ejus initio, hic morbus non admittit.

Ex quibus autem parari clysteres hi debeant, notius est, quam ut hic mone-ri illud sit necesse. Quos etiam pro rei necessitate variare norunt, qui artis nostræ aliquem usum habent. Nos enim, quod in libri fronte diximus, prima quædam tum morbi hujus, tum curationis ejusdem rudimenta damus, quæ datura aliis occasionem esset, altius de hoc morbo inquitendi ut eorum doctis scriptis hæc nostra obscurentur.

X. FEBRES CONTINUÆ.

Atq; hæc de intermittentium febrium genere, cum scorbuto con- *10. Febres continuæ.*

junctarum, earumque à veterum differentia, dicta nobis hætenus sint. Postulat nunc ordinis ratio, quædam etiam de continuis dicamus, quas eadem facultate hic morbus exprimit & mentitur, atq; intermittentes.

Materiam scorbuti etiam in majoribus vasis putrescere:

Sanguis plumbeus ac viridis vena sectione emissus indicium scorbuti:

sive, Regula Diagnost. pec. fibrum scorbuticarum continuarum sexta.

Regula Diagnost. spec. febb. continuarum.

Unde consequitur non in ventriculo & primis venis tantum hujus morbi materiam contineri, sed etiam in majoribus putrescere vasis. Quod manifesto indicio plumbeus ac viridis quorundam sanguis ostendet, vane sectione emissus. A quo etiam plebs hodie judicium de hoc morbo ferre præsumit, eos scorbuto laborare affirmans, quorum sanguinem tinctum his coloribus videt. Et ut quod res est fatear, observavi fere in omnibus crassiori cibo indulgentibus, & qui cū hoc morbo diutius sunt cōflictati, sanguinem è venis emissum, his coloribus, quantum memoria mecum repetere possum, infectum fuisse.

Quibus autem signis à putridis febribus veterum & continuis hæ nostræ putida & continuæ sint distinguendæ, ostendunt primum febris mores, qui plerunq; in his nostris mitiores sunt, & minore cū inquietudine ac siti conjuncti. Aut si auctiora hæc videbūtur, manifesto indicio hunc morbum anxietas

per

per intervalla recurrens, & ad præcordia infestans declarabit, & pulsus comparatione illius qui in putridis veterū sentitur, parvus & inæqualis: Quibus si urinæ accedant crassæ & subrubræ, crasso & subrubo, vel albo, crasso & subrotundo sedimento, dispari & gravi subsidentes, quibus pro putrefactionis notis quas ostendūt, par potus desiderium, ac quantitas non responder, signū magis evidēs habes, quod tuto ad instituendā recte curationē te deducet.

Hæ febres si purgantibus medicamentis fortioribus in initio, vel patriis cerevisiis ex aquis nostris decoctis, vel medicaminum calidorum usu exasperentur & irritentur, plurimos subito deliquio & suffocatione enecant & occidunt.

*Prognosticum
decimum sex-
tum.*

A qua periclitantem Marescalcum, & supra triduum cum ea angusta vivere se posse negantem, intra triduum DEI gratia curavimus, cum eodem, qua ad eum venissem die, pillulas nescio quas hausisset: Sicut hujus curationis testes nobis quidam esse medici possunt, qui partim adhuc Leoverdiæ vivunt.

*Historia cura-
torum à deli-
quio & suffoca-
tionis periculo
seu angustia.*

Eodē suffocationis periculo Stateræ

tributarii filiam pene desperatam, & ab aliis adstantibus certæ morti destinatam, intra viginti quatuor horas (DEI beneficio) liberavimus, cum Luneburgo reversi, ad eam à parentibus vocaremur. Quæ convenienti horum medicaminum usu, in octo diebus integræ valetudini porro restituta fuit.

Præter hos alios quam plurimos ab hac suffocatione DEI gratia sanavimus, quos hîc referre plane longum ac superfluum esset.

*Canon therap.
spec. in febribus
scorbuticis con-
tinuis primus.*

Curantur autem eodem curationis modo, quo intermittentes, in quibus paulatim à mitioribus ad fortiora ascendere debet, qui tutam harum febrium curationem experiri volet. De qua re, quia prius monuimus, nihil opus hic molesta ejus repetitione est.

Secundus.

Conducit autem his potus quotidianus refrigerans, ex cerevisiis antea nominatis. Quarum si nulla haberi copia possit, hordeum in aqua pluviali decoquo, ejusq; decocto, Rhenani tenuis & puri partem quartam aut quintam, vel tertium aut etiam dimidiam addo, magno ægrotantium commodo, sicuti multiplici nostra experientia comprobaturum est.

No.

Nostri temporis Chirugi, & Empirici medici, quorum magna apud Embdanos licentia est, propter nigras maculas, atrii sanguinis recrementum, quod ad cutem quandoq; natura protrudit, respirationis difficultatem, qua hi ut plurimum laborant, peste sic affectos laborare existimantes, Theriacæ aliorumq; calefacientium medicaminum usu (conservandi magis à peste quam curandi eam gratiâ exco- gitatorum) & exhibitione, curationem harum febrium attentantes, non paucis mortem accelerant, febrem augmentando, & respirationis difficultatem cum suffocationis periculo intendendo.

Error Empiricorum in febb. continuis scorbuticis theriacam exhibentium pernici- sus.

XI. FACILIS LIPOTHYMIA.

Quâ tantam sæpe respirationis angustiam ægrotantes incurrunt, ut subito aliquando & præter spem intra manus eorum deficiant, veluti animi deliquio extincti.

II. Facilis lipothymie Prognost. 17.

In quibus natura fortior morbi vehementiam evincit, hi, manente morbi radice, nunquam satis confirmati, fre-

Prognost. 18. Vide infra 209.

frequenter perpetuo languore quasi contabescunt, aliis atq; aliis symptomatibus subinde infestati, donec vel in hydropem, vel atrophiam, aut aliud malum conjecti, miseram hanc vitam, feliciore tandem commutent.

Quo magis necessaria est diligens signorum huius morbi observatio, quo tempestive agnosci, & cum ægrotantis salute curari ille possit, priusquam diuturniore sua mora in majus malum ægrotantem devolvat.

Inter quæ quia quoq; plurimum momenti pulsus habet, postulat hic locus levem ejus, quantum huic instituto satis est, enatrationem, ne ubiq; ejus meminisse necesse sit.

Pulsus in scorbuto exactior consideratio.

Vide pag. 16.

41. 60. 76.

87. 90. &c. &c.

Est autem omnium fere hoc morbo laborantium pulsus parvus, debilis, & inæqualis, nisi quando ad magnitudinem cum febris vehementia disponit. Quando durus quoq; & major justo, maxime sub intensa febre sentitur. Quod etiam statim crebrior futurus sit, norunt ii, qui artem sphygmicam tenent.

Qui defervescente febris estu, vel citra febrim, at cum lenta & minima, perseverante diutius scorbuto, tandē ex magno & duro, qui vigente febre
occurre-

occurrerebat, pulsu, in parvum, crebrum, & inæqualem commutatur, à vermiculari parum aut nihil sæpe differentem, adeo ut vivere hominem cum tali pulsu posse, Italus medicus admiraretur.

Ex quo manifestum est, quantopere ab hoc sævo malo ejusq; tetrīs vaporibus cor, vītalis facultatis fons, infestetur. Atq; hinc fieri puto, quod quidam hoc morbo laborantes, ad lipothymiam animique deliquium, post levem motum adeo faciles sint & prompti. Quod etiam certo & pathognominico hujus morbi signo fit.

Nam qui in parvo, quantum ad sensus, morbo ac febre, à quo decumbentes parum aut nihil pati videantur, subito & præter rationem linqunt, aut ad linqendum proni sunt & proclives, hos sceletyrbe laborare certo persuadere tibi debes. Quod curatio, si experiri libet, comprobabit.

Unde intelligi facile causa parvi ac debilis pulsus potest, cum à venenatis hujus mali vaporibus adeo graviter infestari cor videamus. Quod magis à maligna hujus morbi qualitate, & venenatis ejus fumis, quā putrescentis materiæ essentia aut quantitate

cor

Facilis lipothymia in scorbuto causa.

*Regula diagnost. genera- 13
lis à facili lipothymia.*

Vide 228.

Pulsus parvi ac debilis in scorbuto causa.

cor pati multis evidentibus argumētis, si huius loci esset, demonstrari posset.

Nisi forte ab orificio ventriculi, & cordis cum eo consensu, syncopen hanc fieri quis arbitretur: Quod mihi certe verisimile non sit. Quandoquidē de eo sic affecti nihil conqueruntur.

Ut ut est, pulsus eorum, qui hoc symptomate laborant, similis plane ei est, qui à ventriculi orificii affectione proficisci solet, absq; eo quod quicquam, (nisi quando ventriculi affectio huic morbo jungitur) de eo conquerantur. Itaq; si quando in prædictum pulsum incidamus, (ventriculi orificio nihil patiente) sub quo æger facile linquat, vel ad linquendum pronus sit, dubitare non debemus, quin cum huius morbi significatione id contingat, sicut de multiplici nostra experientia certo id fieri confirmare audemus.

Quo cum si urinæ prædictæ, vel aliud ex jam dictis, aut postea dicendis signis, adfuerint, plura habes, quibus concurrentibus tutius, maioreq; confidentia acquiescas.

Et quanquam ad monstrandum hūc morbum, præsens symptoma sufficiat: pii tamem medici est, nihil eorū, quæ
spe.

speciem morbi declarant negligere, quo primum de morbo certum constituat, quam curationem illius aggrediatur.

XII. CRURUM DOLOR.

Quamobrem si à toto corpore ejusve partibus signum aliquod nobis offeratur, quod ab aliis morbis hunc distinguat, illud quoque considerare expedit. Sicut in hoc morbo, quo sæpe maximum à cruribus indicium sumi solet, scilicet ab obtuso eorum dolore, de quo graviter quidem ab hoc morbo affecti conqueruntur, quem aliter explicare nequeunt, quam quod in eorum profundo circa os, inter eundem, vel alias, alii dolorem tensivum sentiant, alii obtusum, alii mordicantem, alii pungentem & erodentem. Quem nonnulli similem videri ajunt, atque si malleolis crura sibi contunderentur, quem etiam gravem & prementem quidam sentiunt.

Forte prout varie à fonte & mali fonte descendentes vapores, crurum musculis & membranis, eorumve nervis, aliisve partibus immiscetur. Quo fit

*Regula diagnostica
signi- 14
nalis ex dolore
crurum.*

*Vide pag. 35.
341.*

*12 Dolorum
crurum.*

ut

*Dolor cru-
rum in scor-
buticis ut*

*plurimum per
intervalla &
noctū infestat.*

ut plærunq; non continuus, sed per intervalla infestans hic dolor sit.

Qui aliis sub noctem frequenter (ut in Gallico morbo) in gravescit, adeo ut plurimum eorum sæpe ne horulam, aliquando ne quadrantem quidē horæ in lecto commorari ac quiescere queant. Sicut Embdæ sartori meo, & cuidam meo conterraneo Frisio, item rusticæ, & nautæ conjugī, atq; alteri rustico, aliisq; quam plurimis evenit.

*13. Dolor
juxta manus
& digitorum
extrema.*

XIII. DOLOR JUXTA MANUS ET DIGITORUM EXTREMA.

ET quod de cruribus hic diximus, idem in agro Embdano permultis juxta manus & digitorum extrema advenisse, multoties observavimus: Qui etiam sub noctem, uti crurum dolores, in gravescebāt. Et si aliis sub vesperam: aliis vero post mediam noctem id evenisse sciamus, fallaci quoq; morbi Gallici indicio, adeo ut etiam exercitatis circa utrunq; morbum exquisita utriusq; dignotio negotium fecerit, quam in his certissimo indicio pulsus parvus & inæqualis demonstrat.

XIIII.

XIIII. DOLOR NU- CHÆ.

Quosdam etiam gravissimis nuchæ doloribus, iisque tensivis & præmentibus affectos, ab hoc morbo fuisse, memini.

XV: VARIARUM CORPORIS PARTIUM DOLOR.

Sed & dentium, cum dimidii, & alterius lateris maxillæ doloribus, per intervalla quosdā adeo graviter correptos vidi, ut quo se verterent nescirēt.

¶ Dentium dolor cum dimidii & alterius lateris maxilla doloribus.

Describendis nominib. eorum, qui ab his dolorib. varie exercitati elapsis hisce annis fuere, vix sufficeret præsens charta.

Longum quoq; esset eos recensere, quos ab hoc gravi malo, horum medicaminum ope, ad hunc morbum facientium, ad sanitatem rursus (Dei beneficio) revocavimus.

Cum enim in confesso sit, commune malum communem causam habere, eamq; in aere vel in aquis consistere, nō dubitavi ab iis, & aquis potissimum, hoc malū procreari oportere, subscriptibus conjecturæ & inquisitioni meæ pulsu & urina. A quibus magis con-

*1. Dentium dolor cum dimidiis
& alterius lateris maxillae
doloribus.*

Dolores scorbutici ut generentur.

*Canon therap.
spec. in dolore
dentium.*

*Dentium dolor
scorbuticus alios
continuos,
alios per intervalla
infestat.*

confirmatus, eadē curationis via quoque hoc malum curare sum aggressus, felici curationis successu, sicut hujus rei complures hic adducere testes possum, tum Embdæ, tum etiam Hambur- gi à me curatos.

Cū enim toto hoc tractu, aquis, decoquendis cibis & cerevisiis, crudis fere & putridis utamur, necesse est ab his quasdam partes tenues, crudas, & indigestas ventriculo & intestinis vicinisq; partibus & locis cōmunicari, quæ hac putrefactione, ad quam sua sponte procumbunt, infectæ, varias exhalationes sursum emittūt, acres & malignas, quæ in quamcunque partem sese insinuaverint, intolerabiles sua qualitate maligna vel intemperie excitant dolores, ad eundem fere modum, quo in Gallico morbo fieri id ipsum videmus.

Semper autem in curatione iis, quæ hunc morbum curant, medicamentis aliquid miscere soleo, quod ad partem affectā, (sicut ex communi curationis methodo docemur) eorum vim & facultatem deferre queat.

Infestat autem hoc dentium malum quosdam continuo, quosdam vero per intervalla, diem aliquādo unum, duos aut

aut plures. Quos autem continuò corripit, subinde plures exercet hebdomadas & menses: Quemadmodum nuper contigit cuidam primario civi Embdano, viro gravi & literato, Ecclesiæ Embdanæ seniori, qui nostra etiam opera ab his medicamentis curatus intra paucos dies fuit, post quam ejusdam Chirurgi & ibi Empirici, lapidicidæ operam aliquandiu frustra tentasset.

Historia laborantium dolore dentium & lateris dimidi.

Simili dolore nuper duo laborarunt, ex dimidio etiam latere, dolore adeò intenso & gravi, ut ne momentum quidem temporis, uno in loco commorarentur, sed continuò propter doloris magnitudinem, de loco ad locum sese transferrent.

His sub secundam noctis horam plarumq: dolor incipiebat, qui paucis horis ab his medicamentis nostra quoque opera, DEI gratia, domitus est, ægrotantibus integræ valetudini in decem diebus plus minus restitutis.

Ad huc præter dictarum partium dolorem, quosdam dolore dorsi corripì vidi, adeò gravi & molesto, ut mori magis, quam diutius cum eo vivere optarent. A quo nuper rusticum

z. dorsi dolor.

Historia laborantium dolore dorsi,

G

quen-

quendam DEI fârvore curavimus, supra sex annos cum hoc dolore luctantem.

Eodem hodiè quædam nostra ægrotata, cum singulis febrium accessibus corripitur, adeò gravi & molesto, ut hujus ratione febrem, alioque gravissimam, contemnat & aspernetur.

3. *Retum
dolor & ar-
dor.*

Sunt qui inflammationis circa renes sensum, perpetuo ardore molestum percipiunt, à quo nuper in paucis diebus quendam civem Embdanum curavimus, qui cum hoc dolore conflictatus hebdomadas quinque fuerat, adeò quoque molesto, ut mori & dissecari se malle diceret, quàm rursus eum, nisi aliter visum DEO fuisset, subire. Tanti quorundam hoc malo laborantium sunt cruciatus, ut nullo sermone satis explicari illi queant.

XVI. FALSA PLEURITIS.

4. *Capitis
dolor.*
5. *brachio-
rum dolor.*
6. *Pleuritis
falsa.*

PRÆter hos, alios capitis dolores, alios brachiorum, & nonnullos intensissimi laterum dolores, ad costas, falsa pleuritidis imagine ac specie exercent. A quibus nuper cujusdam civis Embdani, Bastiani Wabbens, natu
maxi-

maximam filiam, adeò graviter molestari vidi, ut præ doloris vehementia exclamans, sæpe supra pedes altitudinem iu altum sese projiceret, magna adspicientium dolore & commiseratione.

Historia laborantis falsa pleuritide.

Huic bis secta vena in oppositò latere ab Empirico satis temerariè fuerat, nullo ægrotantis commodo. Existimabat enim pleuritide, seu lateris inflammatione ad costas eam laborare. (Etsi nec huic in opposito latere repetita sectio debeat) in corpore frigido, pituitoso, & nulla sanguinis abundantia laborante.

Sed est magna istorum hominum ea in civitate, Embdana dico, licentia, magistratu nihil ad se hanc curam pertinere arbitrante: cum tamen, si Platoni credimus, summa Reip. felicitas in medico docto, & obstetrice gravi ac fideli consistat. Verùm hec missa faciamus.

Empiricorum in civitate Embdanæ licentia.

Hunc dolorem cum pleuritide nihil communicare, statim prima manus in pulsum injectione animadverti, qui mirè parvus & inæqualis erat. Dolor quoque intermittens per intervalla recurrebat, eratq; nulla, nisi ex intervallo, levis eam infestans tussis, quæ ex catarrho, à capite ad fauces delabente, ipsi adveniebat. Urinæ crassæ &

Regula diagnostica spec. 9. falsam pleuritidem scorbut. à vera discernens.

turbidæ, multo crasso excremento arenæ instar, subsidebant. Cum quibus nihil vel parùm molesta sitis erat, & respiratio extra dolorem parùm vel nihil immutata. Unde cum pleuritide nihil hunc morbum communicare facile intelligunt ij, qui veterem medicinam saltem à limine digustarunt.

Alia Historia laborantis pleuritide scorbutica.

Eodem hoc dolore subinde per diem recurrente, graviter quoque ante plures annos laborasse, celebris cujusdam viri & patricij Luneburgensis, Domini Duysterhopii filium natu maximum, memini, à quo noctu nihil infestabatur. Quo tempore non satis cognita mihi legitima hujus accidentis curatio fuit, quò factum, ut diuturnior tum illa esset. Qui etsi nostra qualicunque opera, ut plurimum in quatuordecim diebus fuerit recreatus, manserunt tamen morbi dolorumque reliquæ ad plures menses.

Prognost. 19.

Quos in prædicta filia, secunda & tertia medicaminis exhibitione (DEI beneficio) sustulimus, integra morbi curatione in septem diebus plus minus absoluta.

Alia historia.

Eadem doloris dimidii lateris specie,

cie, à quo graviter quoque divexabatur, Itali uxor laboravit, præter jam dicta medicamina, accommodatis quoque huic dolori facculis, curata,

Ludit frequenter hic dolor falsa pleuritidis specie, ut etiam hoc nomine non indoctis possit imponere medicis, nisi diligenter multa attentione, & ingenii discursu secum utriusq; signa excutiant examinentq;.

Cognoscitur autem discrimen, primum quod cum hoc dolore neq; tussiant neque expuant, nisi quando calor lentus capitis humores dissolvens, levem quandoq; ex catarrho ad fauces tussim ac sputum commovet. Quod præter tussis speciem à pleuritide facile sputum quod ejicitur, & screatus distinguunt.

Secundò à pleuriticis doloribus hos nostros de quibus sermo est, & pulsus distinguit, qui omnibus parvus, mollis, & inæqualis est, ut contra in pleuritide durus, ferratilis & altus.

Tertiò febris species, quæ in his lenta est, sicut propter affectæ partis nobilitatem, ejusq; cum corde vicinitatem, in pleuritide, maxima.

Quartò recurrens ex intervallo dolor, qui non primariò, sed per consensum partem affici ostendit, sicut de recurrente respirationis difficultate antea diximus, ubi affectus partem primariò afficientes, ad sui solutionem perdurare notavimus. Ut vel ab hoc solo signo, (ne quid de respirationis difficultate, qua pleuritici laborant, & sanguinis sputo dicam) à pleuritide & lateris inflammatione, hi nostri dolores pleuriticos mentientes, dignoscantur & distinguantur.

XVII. VENTRIS DOLOR QUASI COLICUS.

17. Ventrìs
dolor.

Historia laborantium
dolere ventris scorbutico.

At qui ut jam dictas partes variis doloribus subinde hic morbus exercet, ita ventriculum & intestina variis cruciatibus lancinationibusq; exulcerat & discindit, quæ nulli cutationi methodicæ cedunt, sed quæ post longiores exulcerationes, corpus ægrotantis paulatim extenuant & consumunt. Quæ adeò in quibusdam graves sunt, ut duos noverim, ab his distensionibus cruciatibusque in peritonæi rupturam incidisse. Ut non abs re scorbuti nomen apud Belgas nostros, &

mo-

modernos medicos, impositum ipsi esse videatur, idq; ab effectu consecutum hunc morbum fuisse, ut sceletyres & stomaeaces appellationem, à crurum & oris vitio, antea quoque in libelli initio ostendimus.

Corripiunt autem hi dolores sic affectos non continuò, sed per interval- la. Estq; pulsus plærorumque parvus & inæqualis, certam habens hujus morbi significationem.

Urina verò in quibusdam tenuis & citrina, ex qua nullum hujus morbi signum capi potest: quibusdam absque febre & siti, rubra, crassa & conturbata, evidens hujus mali argumentum continens & demonstrans. Paucis crassa, alba, & turbida. Qualis urina Gene-
rosæ cujusdam comitissæ puellæ fuit, quæ post haustum cerevisiæ anglicanę indigenæ, ut vocant, antea ab hac febre debilitata, in tantum ventriculi dolorem incidit, ut instar anguillæ convoluta, quò se verteret nesciret.

*Alia histo-
ria puellæ
comitissæ la-
borantis do-
lore ventris
scorbutico.*

Cum ex pulsu morbum deprehende- rem, & diætæ seu cerevisiæ prohibiti- onem errorē, super eo illam accusavi. Quæ etsi aliquandiu adversaretur, instanti tamen & urgenti mihi tandem errorem

confessa est, Curata unico medicamini hunc morbum respicientis, haustu est, à quo ilico ut incalescere illud cœpit, & in actum à natura deduci, ab hoc dolore, uti prædixeram, convaluit. Erat enim morbi radix jam antea cum febre à nobis eradicata.

Aliæ historiarum laborantium dolore Ventris scorbutico.

Iisdem hisce lancinationibus, nuper duæ puerperæ, cum intensiore febre & multa siti laborarunt, & alter proxeneta, & præter hunc quidam nobili familia natus, in agro Groningano.

Summà, longum esset omnes referre, quos ab his lancinationibus, hisce præteritis annis, DE I gratia, curavimus. Quare hisce contenti erimus, ne studiosè prolixitatem affectasse videamur. Qui quantum fieri potest, præcidere non necessaria nitimur, ne jejuna oratio nostra fastidium legenti pariat.

Siquidem à multis annis, quibus praxi vacavimus & à scholis abfuimus parùm vel nihil stili exercitio à nobis tributum fuit. Ideoque boni lector consulet, si non ea elegantia, qua oportuit, in lucem & publicum hæc demus. Nos in editione hac non tam styli

styli elegantiam, quàm rei necessitatem, spectavimus. Utrunque viris in scholis, & elegantiorum authorum lectione exercitatis, post nos commendamus. A quibus ut jam antea semel atque iterum diximus, hæc nostra obscurari cupimus.

Sed antequam ab hac scorbuti specie, ad aliam ejusdem morbi speciem transeamus, unum atque alterum prius exemplum dabimus, eorum qui diuturniore crurum dolore ab hoc morbo divexati, ab his ipsis medicamentis, à nobis (DE I gratia) sunt restituti.

Inter quæ primum locum meritò sibi vendicat, meus Embdæ Sartor, cui nomen Simoni est. Qui totum triennium plus minus ab hoc morbo, gravissimis crurum doloribus circa tibias fuerat divexatus, adeò gravibus & intensis, ut toto hoc temporis spacio, ne horulam unam continuò in lecto quiesceret, ac nunquam melius haberet, quàm quando flexis, & corpori subjectis cruribus, sartorum more, in mensa ijs insideret.

Historia laborantium dolore crurum.

Tentaverat hic (ut fieri in longis doloribus solet) omnem omnium o-

peram, admiserat vesicas, & cutem exulcerantia emplastra, deniq; nihil non, quò hoc dolore liberarerur, at nullo successu, nullaq; doloris mitigatione. Hic à nobis in undecim plus minus, hebdomadis feliciter curatus, firma valetudine, DEI gratia, etiam nunc utitur, cum à curatione ista elapsi anni ferè tres sint.

Iisdem & non multum dissimilibus doloribus sub genu, & circa talum, Frisius quidam caupo & mercator, Adrianus nomine, tres anni quadrantes divexabatur, Chirurgorum opera eusq; perductus, ut qui antea baculi adminiculo ingrederetur, postea domi claudus desideret. Huc etiam iisdem ferè medicamentis, sed pro complexionis, & anni temporis ratione variatis, curatus in octo, si fallor, hebdomadis media hyeme fuit, quando difficiliore esse horum curationes apud nos solent.

In his omnibus morbum hunc ostendit pulsus parvus, debilis, & inæqualis. Cui subinde certiore nota urina subscribit crassa & conturbata, crasso, gravi ac rubro sedimento in maturæ fundum subsidens.

Quæ trahente moram morbo, ut plu-

*Hyeme difficiliore
dolorum scorbuticorum
curationes.
Regula diagnost.
specialis II. in
dolorum scorbutico.*

plurimum citrina, & nonnihil ad fuscum declinare apparet, & quandoque tenuis & spicea, vel etiam aquea. De quibus si certi quid cognoscere cupias, necesse est pluribus diebus deinceps eas contueri, & num quas mutationes præter rationem patiantur considerare.

Nam si alias atque alias absque causa urinarum permutationes animadvertas, nunc crassas & turbidas, postridiè aqueas & tenues, rursus citrinas & aureas vel subrubeas, hujus morbi indicio id fieri certò tibi persuadebis. Easque, si ab epotis medicamentis scorbutum curantibus postridiè, vel post biduum ac triduum, ex tenuibus in crassas commutari cernas, crasso & jam dicto sæpius sedimento subsidentes, habes etiam sic ex his notionem, quantum mea qualicunque experientia hæctenus perdiscere quivi.

Accedit crura ab hoc morbo tentata, ad ingressum stationemque longiorem tarda & impotentia esse.

Quibus suræ crurum dolent, ijs plerumque tensæ illæ & duræ, absq; inflammationis nota sentiuntur, etiam certissimo hujus morbi signo, sicut tonsoribus ac mulierculis nostris notum est.

*Reg. diagn.
gen. ex dolore
surarum
tensarum
absque inflammatione 15.*

XVIII. TUMORES

DVRI QVASI GAL-
LICI.

*Tumores
duri & va-
ricos.*

Qui crassa & nautica victus ratio-
ne utuntur rustici ac nautæ, ali-
quando in qualibet corporis parte
tubercula consequuntur dura ac vari-
cosa, & nonnulli eorum tumores du-
ros, magnos & profundos, cum in in-
guine & glandulosis corporis parti-
bus, tum etiam qualibet corporis par-
te, ac mediis musculorum spaciis, do-
loris, dum quiescunt, aut crus super
scamno & pulvinari reponunt, exper-
tia, quæ tamen (de varicosis tubercu-
lis loquor) inter eundem, vel aliter
propendentibus cruribus, graviter
nonnullos, & sæpe ad animi deliqui-
um usq; excruciant.

*Historia tu-
moribus du-
ris toto cor-
pore labo-
rantium.*

Hujusmodi tubercula quibusdam
quasi monticulis etiam toto corpore
extuberare vidi. Quemadmodum cō-
sulis Leoverdiensis, & cujusdam no-
stratis nobilis uxoribus, advenisse
memini.

His tumoribus etiam ad Gallicum
morbum scorbutus noster quandoq;
allu-

DE SCORBUTO. 93

alludit, ut diligenti animadversio-
ne opus sit, ad exquisitam utriusque
dignotionem. Quæ hoc indicio ac si-
gno manifestatur: quod in Gallicis
tumoribus potentiâ medicamine
apertis, materia pinguis inveniatur,
larido infumato colore non dissimilis,
quale nihil in tumoribus, quos scor-
butus facit, apparet.

*Regula di-
agnostica spe-
cialis 12. tu-
mores scor-
buticos à
Gallicis dis-
cernens.*

Accedit, scorbuticos tumores vi-
tam comitari tristem & calamitosam,
ut contrâ luxuriosam & delitiis dif-
fluentem, præterea laxam & volupta-
tibus deditam ij solent, quos Gallicus
morbus facit.

XIX. IMPOTENTIA CRURVM AD IN- GRESSUM.

ADhuc præter has affectiones, cru-
ribus ab hoc morbo, citra exter-
num & extrinsecus apparens vitium,
languor advenit, & ad ingressum
debilitas ac impoten-
tia.

*19. Impoten-
tia crurum
ad ingres-
sum.*

XX.

XX TALI RETRACTIO VERSUS POPLITEM.

20. Tali retractio versus poplitem

QUibusdam talus retrò versus poplitem trahitur, ne posteriorem pedi partem terræ affigere queant, quod etiam in nonnullis, ex cujuslibet musculi ac nervi vitio fit, prout hunc vel illum hic morbus affecerit.

Quæ omnia num ab hoc morbo fiant, pulsus dijudicat & ostendit. Nam ab urina in his sæpe nullum certum indicium est.

XXI. PLANTÆ PEDUM PUNCTIONES

21. Plantæ pedum punctiones.

MEmini quoque molestas plantæ pedum punctiones subitò quibusdam advenisse, & ab his postridie omnimodam crurum resolutionem, quemadmodum illi contigit, qui ex Marchia rates Hamburgum advehebat.

XXII. CRURUM PARALYSIS.

22. Crurum resolutio.

Sed & citra punctiones, quàm plurimos subitò & de improvviso, tam crurum. quàm dimidii lateris resolutione

tionem, ab hoc morbo corripitur vidi, ut circa hunc morbum minus exercitati medici, veterum paralyfin sic affectos pati, constanter omnes uno ore affirmarent: Quod ut in illa, sic in hac nostra crura resoluta, & inutilia usibus, quibus destinata sunt reddantur ac afficiantur.

Differunt tamen, cum signorum quorundam proprietate, tum etiam curatione. Signorum proprietate hoc modo: Primum quod etsi perinde hic, ut in veterum paralyfi, pedum translatio, figendique robur & firmitas pereat, in plerisque tamen aliquis decumbentibus motus maneat, quo resoluta membra movere, & ad musculorum capita leviter ea attrahere conspiciantur, contra naturam & morem veteris paralyseos, quæ ex nervorum obstructione fit.

Hanc motus differentiam observavi in Consulis Hamburgensis genere, nauta, duobus adolescentibus, causarum procuratore, tabellario, puella, fene, omnibusque aliis, quos ferè hac affectione teneri vidi.

Altera differentia quæ à veterum paralyfi differt, quibusdam tantum ad-

Regula diagnostica specialis 13. in crurum paralyfi scorbutica.

Historia laborantium crurum resolutione scorbutica.

adeſt, non omnibus, neque ſemper, ſed per intervalla, & uno tempore magis quàm altero. Ea eſt, quòd horum quidam, qui hac affectione laborant, aliquando cruribus ſuis innitantur, & levi alterius adminiculo ſubinde in plano, non incommodè ingreſſantur, qui pridè pedem in terram figere, aut ſoli ſtare non poterant.

Cujus variæ vices ſunt, ita ut ruſum poſtridiè id iſſis negari, iterumq; paulò poſt concedi videre liceat: Alia planè & diverſa ratione, atq; in veterum paralyſi obſervatum hætenus fuit.

*Cur Veterum
paralyſis
permanens
ſit uſq; ad
ſolutionem
Scorbuticam:
aut varias
habens vi-
ces.*

In qua permanens ad ſui ſolutionem hæc reſolutio eſt, quippe quæ à propria, & primaria nervorum affectione procedit, donec naturæ robore, aut artis præſidio & beneficio illa vincatur, & expugnetur: cum hanc noſtram aliundè nervis advenire, & per ſympathiam ac conſenſum fieri, motuum viciffitudines demonſtrent.

Quin & à veterum paralyſi in quibusdam corporibus hoc indicio differt, quòd illa sæpe ſubitò, & poſt fortiorem animi ac corporis motum, plethoricis & otio ac delitiis indulgentibus

bus fiat, uti contra hæc nostra post longas tristitiæ causas, paulatim, vel subito quoque prius subinde partem affectam tentans, quam certo sedem figat, & certam aliquam corporis partem invadat, eadem levitate, qua apprehendit, subinde resiliens, & partem afficiendam relinquens, quemadmodum Hamburgensium Syndico, & alteri in Holsatia rustico, aliisque nonnullis advenit.

Sed & momentaneo stupore, ac levi membrorum post somnum, vel statim à somno resolutione, diu ante quosdam tentatos memini, quam in morbum & hanc paralyfim res erumperet. Nam in eo quoque veterum paralyfim imitatur, quod aliquando stuporem adventantis morbi nuncium, ac veluti præconem præmittat. Sed hoc signo à veterum stupore differentem, quod momentaneus sit & facile remittens, quemadmodum etiam subito rursus & de improvviso apprehendens, ut plurimum vero cum levi & momentanea affectæ partis resolutione conjunctus.

Unde manifestum est, non propriam nervorum, aut primariam eorum

*Cur stupor
eiusdem re-
solutionem*

H

af-

*scorbuticam
anteecedens
momentaneus
sit & levis.*

affectionem hanc esse, sed magis aliunde malum hoc nervis advenire, magisq; per consensum, quam primario hoc ipsos pati, à maligna scilicet & frigida vaporum, qui ab hac putrefactione resolvuntur, qualitate & natura.

Paralysis scorbutica non tam paralysis, quam paralytica passio dicenda.

Quemadmodum faciles harum affectionum mutationes ostendūt, quæ ab humorum affluxu non iisdem mutationibus, neq; æque facile, subjæctæ esse possent, ut propterea non paralytici hanc affectionem, sed potius paralyticam passionem eam dicere oporteat, ad eum modum, quo Fallopius celeberrimus nostri temporis medicus, circa finem sui de capitis vulneribus libri doctissimi convulsiones per sympathiam cerebrum subinde afficientes non convulsionem simpliciter, sed motum convulsivum appellandas esse existimat, utpote quæ ab his vaporibus excitari non aliter videtur, atque à torpedinis piscis halitu venenato, stupor.

5.

Id quod etiam curatio demonstrat, imprimis in morbo recenti, & ea resolutione, quæ particularis est, & absq; febre, in quo ab adhibitis & competentibus huic morbo medicamentis, brevi sic affecti sanantur, sæpe intra dies quatuor

Prognost. 20.

quatuor aut quinque; Quemadmodum civi accidit Dresdensi, & alteri cuidam adolescenti, à Gallici morbi curatione.

Ut plurimum vero intra dies quatuordecim aut circiter, sicut pluribus nostris experimentis probatum Hamburgi fuit, cum alioqui proprii nervorum morbi (consentiente omnium medicorum autoritate) longi fere sint & diuturni, nec nisi topicis, post universalem morbi curationem evincantur & expugnentur.

*Historia brevis
curatorum à
paralyfi scorbutica.*

Est tamen, quemadmodum nostra *Prognost. 21.* qualicunque observatione compertum est, longior horum curatio & operosior ac difficilior Embdæ. Quod etiam valere in aliis locis puto, proprius ad septentrionalis maris littus sitis.

His auctarii loco ad faciliorem hujus à veterum paralyfi distinctionem accedit, sæpe arthriticis doloribus, de quibus postea dicemus, hanc resolutionem supervenire, vel aliis hujus morbi signis & symptomatibus hunc morbum conjungi. *Prognost. 22.*

Aliis etiam pedetentim, & cum longiore mora imbecillitas hæc nervorumque impotentia accessit: Diversa ratione, atque fieri in veterum paralyfi, ex subito humorum ad nervos affluxu solet.

Nam quæ ab inflammatione & ab alto lapsu, veluti à procatartica causa paulatim fit veterum paralyfis, Galeno quarto de locis affectis libro descripta, ut propriis notis, ita quoque ægri confessione cognoscitur. De qua re vide Galenum loco & libro jam ante citato. Ubi etiam causam lector discet, unde fiat, cur manente motu sensus pereat, & contra. Quæ hic studiose omittimus, ne prolixitatem affectasse videamur, & in illud Galeni impingere, studium & laborem eorum reprehendentis, qui in unum omnia locum, quo multiplicis scientiæ laudem aucupentur, congerunt.

Institutam auctoris in hoc libro.

Estque etiam consideratio hujus rei præter nostri libelli institutum, qui non symptomatum causas, (etsi aliquando quadam rei consequentia eas attingere necesse sit) sed scorbuti morbi dignotiones, ejusdemque curationes, seu potius curationum indicationes, & huc facientes observationes nostras in hujus libelli fronte promittimus.

XXIII. PARALYSIS LATERIS UNIUS.

Quare his omisſis, ad ea quæ reſtant, pergemus, dimidii ſcilicet lateris paralyſim, huic jam dictæ reſolutioni affinem. Quam etiam ab hoc morbo excitari, frequenter anno octuageſimo ſecundo vidimus, & poſtea quoque non ſemel. Eſt pluribus familiare eo anno hoc malum fuerit, tam macilentis, quam pinguibus & obefis, iſſque quam maxime, qui præter duriorẽ victum, diuturniori triſtitiæ indulgerent.

23. Dimidis
lateris paraly-
ſis.

Hiſtoria labo-
rantium paraly-
ſi dimidis la-
ris.

Erat autem conjunctum aliis hoc vitium cum lingua quoq; reſolutione, plæriſque vero abſque hac.

Omniſibus vero cum melancholici humoris putrefactione, & lenta febre id accidiffe, oſtendit præter pulſum magnum, durum, & inæqualem, urina crassa rubra, & ſubſuſca, cujuſmodi occurrere nobis illa in quartanis ſolet febribus, atque præter hanc, quæ cum hac urina jungebatur ſitis, ac lingua labiorumque ſiccitas, coindicantibus quoque idipſum animi affecti-

bus, omnib. quantū memini ad tristitia semper diu ante morbum dispositis.

Ita enim seni accidit consulis Hamburgensis affini, diutius extra patriam molestam litem persequenti. Ita mercatori seni, in aliquot talerorum milib. à debitoribus suis decepto. Ita duobus in agro, propter continuas pluvias, segetem colligere prohibitis: Et Jurisperito, quem incertæ nugacesque astrologorum prædictiones vexabant, nescio quem vitæ terminum eo ipso anno minantes, sicut confessus mihi ipsemet fuit, etsi aliam tristitiæ causam alii conjectarent.

*Regula diagn-
nost. specialis 14
in paralyse late-
ris dimidii scor-
butica.*

Distinguunt autem à veterum ἡμι-πληγία manifestis indiciis hanc nostram, cum morbi natura & mores, & in aliquibus ægrotantis corporis temperamentum, tum pulsus & urina, præterea victus crassus & nauricus, atque ad tristitiam proni proclivesque animi affectus.

Natura vero & morbi mos hoc modo: Primum quod præter veterum paralyseos rationem, in hac nostra quandoq; ante ejus completionem, aliud atque aliud membrum prius tremor & levis resolutioprehendat, eadem

dem facilitate, qua apprehendit, subinde remittens.

Contra, quæ veteribus cognita paralyfis ex nervorum obstructione est, propria eorundem affectio est, & propterea quam semel occupavit patrem, ad sui solutionem infestans.

Atque si quis stupor (quo etiam ad veterum paralyfim illudit) hanc nostram *ἡμιπληγίαν* præcedat, observabis semper cum levi resolutione, eum quoties apprehendit, conjungi, eademq; qua comprehendit facilitate, cum stupore rursus resilire. Quam etiam eadem certitudine præsagire & attestari tumores quavis corporis parte erumpentes solent, si eadem facilitate & promptitudine, qua oriuntur, evanescant, & cum ortus sui principio, partem affectam levi & momentanea paralyfi resolvant.

Ita enim ante hanc dimidij lateris resolutionem, rustico Holfato sub Casparo à Bockwolt evenit. Ita legum & juris Doctori Hamburgensi Syndico.

Quin & post apprehensionem à veterum paralyfi hoc signo discerni potest, quod sub mediocri & spontanea quarundam partium convalescentia,

aliæ resolutæ maneant, & indies magis magisque resolvantur, vel quibusdam suis partibus ad convulsionem disponantur.

Prægnost. 24.

Nam & hoc huic resolutioni peculiare esse solet, ut post aliarum partium curationem, quidam nervi, in quos vaporosa materia ab hoc morbo resoluta decumbit, contrahantur, sua contractione partem in quam inseruntur convellentes.

Atq; hoc modo morum diversitate, à veterum paralyfi, hæc nostra distinguitur.

Cæterum quæ à corporis constitutione & temperie differentia sumitur, majore ingenii exercitatione ac sagacitate eget, qua cognoscamus, recte præsentis corporis constitutione *ἡμιπληγία* veterum conveniat, nec ne.

Nam si in his regionibus à nulla evidente causa, quam veteres tradiderunt, præter corporis dispositionem, dimidii lateris resolutione quis corripiatur, qui in laboribus & curis, cum duriori pacioreque victu vitam traduxerit, verisimilius est à scorbuto, quam nervorum obstructione id eum pati.

Quod

Quod ut veterum paralyfis in otio & crapula liberaliore viventibus, obefis & plethoricis, vel sponte vel post graviolem animi corporisque motum frequentibus accidere solet. Ita contra hæc nostra quæ scorbutum comitatum familiarior iis esse consuevit, qui tristioribus cogitationibus diutius indulgent, ac longiori mœstitia & solitudine premuntur.

Quibus si crassioris victus consuetudo, aquarumque sublimium usus accedit, majore cerrioreque indicio morbi causam manifestabunt, quo minus longiore dubitatione sit opus.

Quam pulchre quoque manus dirimet pulsui injecta, quæ celere dignotione discrimen quod inter utrumque est dijudicabit. Quod sicut in veterum paralyfi parvus ille, languidus, ac mollis sit, sic in hac nostra propter febris admissionem, quæ in initio cum hoc morbo concurrit, maxima ex parte durus & inæqualis appareat. Cui urinæ, majore certitudine subscribunt crassæ, & subfuscæ, similes iis per omnia urinis, quæ in quartana febre reperiuntur.

Quas

Quas in veterum paralyfi constat albas, tenues, & spiceas, vel albas & crassas esse, nisi alterius morbi admissione colorentur, qui propriis suis notis & signis discerni debet.

Quamobrem in morborum dignotione exercitatum esse eum oportet, qui hæc nostra recte cognoscere cupit, atque omnium morborum signa memoria prius complecti & tenere, quo promptius symptomata quisque dignoscat, quibus à veterum morbis scorbutus differt.

De quibus quia prolixè & doctè suis de morborum curationibus libris medicum ante nos scripserunt, inde eorum signa diagnostica peti possunt ac debent. Quæ cum his, quæ circa hunc morbum adveniunt collata & diligenter examinata, facilem postea distinctionem præstabunt. Nobis sufficit propria scorbuti signa, quibus ab aliis distinguitur, ostendisse.

Inter quæ cum non postremum locum hic urina teneat, præter morbum etiam humorem peccantem quandoque coindicans, paucis inter cætera signa, de ea quoque hoc loco dicere volumus. Simul ut ostenderemus, & ab hoc
hoc

hoc loco admonemur, magis à venenatis vapotibus, & melancholici humoris corruptione, specifica hac, & scorbuto competente putrefactione infecti, quam ab humorum in nervos impulsione, malum hoc exoriri.

Causa paralytica scorbutica.

Quod, juxta Rondeletium summæ autoritatis medicum, melancholicus humor de sua natura ex ratione, magis nervos contrahere dispositus sit, quam resolvere. Atq; hinc fieri credibile est rationique consentaneum, quod in morbi progressu ac diuturniore ejus mora, aliquid de melancholici humoris substantia secum vapores hi deportantes, unum vel plures semper ad convulsionem nervos disponant, prout in hunc vel illum nervum ille insinuatus delatusq; fuerit.

Cur scorbutica paralytis in convulsionem abeat.

Ita n. in fine morbi evenit Syndico Hamburgensi juris Doctore, & alteri ejusdem civitatis civi, item patritio Kedenfi, juveni Embdano, cauponi, & omnibus fere aliis, quos sponte, vel à non sufficiente curatione aliquo modo restitutos ab hoc morbo fuisse novi.

Historia eorum quibus paralytis scorbutica in convulsionem desit.

Hoc malum in initio recte tractatum, curationem minus difficilem habet, utpote quæ in febris & scorbuti

Canon therapeuticus spe-

cura-

*cialis in paraly-
lysi scorbuti-
ca.*

curatione consistit; ita tamen ut scorbuti, & attenuantia ac incidentia medicamenta, propter causam morbi crassam & frigidam, numero, gradu, ac dignitate ea, quæ calorem conemperant, superent & excellant. Eoque curationis modo factum vidi, ut supra caput, brachium & manus intra octiduum tollerent & elevarent, qui ne digiti quidem articulum prius dimoverent.

*Historia eorum
qui à dimidii
lateris paralyfi
sunt curati.*

Atque hac curationis ratione, ante paucos annos civem Hamburgensem virum annos natum suptuaginta tres, intra hebdomadas quinque, à dimidii hac lateris paralyfi (DEI beneficio) curavi. Et intra tres vel quatuor hebdomadas, alterum tabellarium, Hamburgi ad Divi Petri templum habitantem, qui jam antea plures menses ab hoc morbo decubuerat.

Prognost. 25.

Ubi semel radices agere hic morbus cœperit, & diutius ac per plures annos commorari, difficulter postea eradicatur. Itaque pluribus tum & majoribus remediis opus erit, nec non balneis & sudoriferis, omnibusq; attenuantibus, & incidentibus, ac cale-

*Canon therap.
generalis 139.*

fa-

facientibus tam foris, quam intus adhibitis, applicatisq;.

Si contractio advenerit, illa quoq; *Canon therapeuticus spec. in contracti- one primus.* calefacientibus unguentis, & ad hunc usum commendatis à veteribus & modernis medicamentis, tolli debet, cujusmodi unum descriptum apud Valeriolam suo de observationibus *Unguentum fidum Valeriolæ.* libro erudito & docto habemus, quod unguentum fidum author ipse appellat.

Sed & hujus ac paralyseos initiis, *Electuarium Empiricum cu- jusdam ad contractionem* alioquin non admodum gravibus, hoc sequens prodesse vidi, quod cujusdam Groningani medici Empirici est, pluribus experimentis divitis.

Constat autem ex aquæ libris octo & manipulis quatuor Betonicæ, quibus ad tertiæ partis consumptionem decoctis, adjiciuntur granorum juniperi contusorum libræ duæ, cum quibus ad pultis consistentiam decoquuntur, à decoctione & expressione forti, iterum cum Sacchari libris duabus ad syrupi consistentiam conquuntur, quando ab igne remotis sequentes pulveres admiscuntur, gingiberis scilicet uncie duæ, macis, calami aromatici, cubearum, singulorum uncia di-

dimidia, foliorum senæ uncia dimidia. Indeq; formatur electuarium molle, cuius ante & post cibum, cochleare unum quotidie semel aut bis sumitur, non infelici successu, sicut in uno atq; altero comperi.

Decoctum absinthij in contradictione inutile.

Ego plurimum auxilii positum in sinthii decocto esse sic affectis, nostris experimentis hisce præteritis annis non semel, sed multoties comprobavi. Nam huius decocto solo & unico curatus nauta & alii fuere, quibus citra vehementem febrem hæc passio advenit. Ab eo quoque melius rusticus sensit, & qui in agro habitabat textor.

Canon therapeut. spec. in contradictione secundus.

Quod si gravior morbus plura ac majora remedia postulat, propter concurrentes plærumque cum hoc morbo viscerum obstructions, quæ in quibusdam ob morbi causam crassam & frigidam, graves & pertinaces sunt, ac difficilis expugnationis, non sufficiunt quæ jam dixi medicamenta, sed his admiscere alia oportet, quæ quadam erga hunc morbum proprietate, viscera referare, crassa incidere & attenuare queant.

Medicamenta antiscor-

Cujusmodi sunt huic casui servientia, Enulæ campanæ radices, carduus be.

benedictus, fumaria, cochlearia, tri-^{batica deob-}
folium aquaticum, nasturtia utraque,^{struentia,}
hyemale & aquaticum, si haberi illud ex^{incidentia, &}
limpidis & puris aquis possit.^{attenuantia.}

Nam quod apud nos ex lutosiis & cœnosiis, ac stagnantibus aquis colligitur, ut mali saporis, ita inutile est, & minus efficax. Item hyssopus, betonica, cuscuta, ceterach, & id genus alia crassos & melancholicos humores attenuantia, & quadam proprietate hunc morbum curantia. Quæ etiam tum valere debent, si febris ac sitis signa, cum urinis rubris, adfuerint, idque ratione causæ materialis, cui hic morbus insedit. Id quod nostro pudore, & ægrotantis incommodo didicimus.

Atq; ab hac causa fit, quod etiam ^{Sanguinis} largiorem sanguinis missionem hic ^{missionem} morbus respuat. Sicut etiam ante nos ^{largiorem cur} recte annotavit doctissimus & cele- ^{respuat scor-}
berrimus nostri temporis medicus D. ^{butus.}
Joannes Veierus.

Purgationes quoq; prius instituen-^{Purgationes}
das non esse, quam humores concocti ^{in scorbuto}
ac digesti fuerint, & specifica hu-^{quando habe-}
jus putrefactio superata atque evicta ^{ant locum.}
sit, ab Hippocrate non uno in lo-^{Curatio scor-}
co docemur. Perficitur autem cu-^{buti internis}
ratio internis medicamentis, magis ^{potius, quam}
^{externis per-}
quam ^{ficitur.}
^{Canther. Gen.}
^{14.}

quam externis, et si nec illa suo loco adhibita obesse solent.

XXIV. TOTIUS NERVOSI GENERIS DEBILITAS.

24. Totius
nervosi gen-
ris debilitas.

CÆterum quod nunc de dimidii clateris resolutione diximus, illud etiam paulatim & in pluribus annis omnibus nervis corporis advenisse, in Consule Stadenfi, viro optimo & erudito, nec non Senatoris Hamburgensis conjuge, & paucis alijs animadvertimus.

Historia ner-
vorum omni-
um debilitate
laborantium.

In iis duo qui curationem in initio negligenter, vel medici ignorantia rectam non adhiberent: Hi facti tandem ad omnem rem adeo inepti ac impotentes sunt, ut cibum ipsis alii in os inferere cogerentur.

In his semper pulsus parvus, debilem, & inæqualem deprehendi, per omnia vermiculanti similem.

Regula diag-
nostica specia-
lis 15. in ner-
vorum omni-
um debilitate.

Qui nulla molestia & obvio indicio, exercitatis in hujus pulsus dignotione, morbum hunc prodit, iis dico, qui exercitatum in dignoscendis pulsibus ingenium habent, eaq; in vere-

rum

rum placitis ac scriptis omiffa norunt: Ideoq; peculiarem & veteribus incognitam causam hæc habere sciunt, aut ex similibus similia adstruere dedicerunt.

Si enim Plinio credimus, ex paucorum dierum depravatarum aquarum usu, crurum resolutionem Cæsaris militibus advenisse, scribenti: quod miramur, continuo earundem apud nos usu, & ex tot concurrentium causarum congerie, idem nos pati, vel pro diversa corporum constitutione, aliis atq; aliis symptomatibus & morbis nos subjici & affligi.

Duos novi post currentes arthritidis dolores (medicis morbi causam ignorantibus, & frequentibus purgationibus in initio eum aggravantibus) tandem in continuam crurum brachiorumq; resolutionem incidisse. Ex qua alter post sex menses obiit, alter adhuc domi claudus desidet, nullam morbi sui curationem, quam infelicem priorum medicorum opera expertus est, admittens.

Præter illos alium novi, post diuturnas ventris lancinationes, & frequentes vomitus, quos initio morbi

I sui

Lib. 25. c. 42

Historia eorum qui post dolores arthriticos aut alios in paralyfin aut atrophiam inciderunt.

fui experiebatur, ex intervallo recurrentes, & ab hoc morbo quoque (uti pulsus & urina evidenter monstrabant) excitatos, tandem in levissimam etiam brachiorum resolutionem ac totius corporis atrophiam incidisse, medicis quibus commendata curatio fuit, morbum ignorantibus, & communi curationis modo nullo effectu procedentibus.

XXV. COLICA IN PARALYSIN DESI- NENS.

Ægineta de passione colica in epilepsiam aut aut paralysem desinente locus.

LEgimus apud Paulum Æginetam libro tertio capite de colica affectione, suo tempore quandam colicam passionem invaluisse, quæ post diuturniores lancinationes, coliq; & ventris dolores gravissimos, plerisque ad Comitialem morbum, aliis ad artuum resolutionem transierit: Idq; malum primum ab Italiae regionibus initium sumpsisse, ideque latius dispersum fuisse.

Historia laborantis colica desinente in paralysem.

Idipsum nunc etiam in multis Rhœni partibus viget. Estq; mihi semel quoq; in Anglia in Magistro postarum

visum, cuius qualia fuerint præcedentia symptomata, qualisque urina & pulsus, non satis ad memoriam nunc revocare possum. Neque erat tunc satis mihi hujus morbi natura perspecta. Sunt enim ab eo tempore anni elapsi octodecim vel novendecim.

Hoc scio, nulla methodica curatione à colicis doloribus liberari eum potuisse, cum alioquin medicis uteretur doctissimis, & in veteri medicina exercitatissimis, Doctore Hectore Nonio. D. Lupo. D. Adriano Junio, viris literis medicinæ peritissimis. Quos propter veterem nostram consuetudinem & noticiam, honoris causam nominare hic volui. A quibus nihil sublevari (ut dixi) totius semestris spacio potuit.

Neque prius hi dolores cessarunt, quam in brachiorum resolutionem, velut in judicatione causâ translata, desissent.

Quare quia simile quid Hamburgenfi apothecario, post diuturnas ventris ab hoc morbo lancinationes, advenit, aliis post me meditandum relinquo, nunquid cum hoc morbo malum illud colludat, & eodem,

quo jam dictæ passiones modo, curandum sit.

*Historia scæ-
minæ per in-
tervallum para-
lysi unius cru-
ris correpta.*

Sed antequam ab hoc scorbuti symptomate, ad aliud digrediar, unius adhuc scæminæ Holsatæ historiam proponam, quæ ex intervallo momentanea unius cruris paralyfi correpta fuit.

Cujus meminisse propterea hic volui, ut ostendam quam varie medicine artifices hic morbus ludat. Simul ut ex hoc loco cognosceremus, magis à vaporibus (quos putridi humores intus latentes, & specifica hac & scorbuto propria putrefactionis qualitate affecti emittunt) hanc paralyfim excitari, quam ab humorum putrescentium contactu, eorumq; ad locum affectum descensu. De muliere autem illa sic se res habet.

Diutius hoc morbo laboraverat, à quo, sicut ex ipsa intellexi, ante triennium graviter decubuerat. Cujus forte hæ reliquæ erant, priore curatione forte suppressæ, & intermedio tempore tacitis incrementis rursus adauctæ. Hæ non nisi ex intervallo eam afficiebant, cum accessione alterum crus resolvebatur, ut in terram procideret, neque

neque sponte rursus in pedes se erigere posset. Qua remittente iterum baculi adminiculo, quo volebat, ibat, idq; subinde in uno die vigesies & amplius patiebatur. Curata nostrâ operâ, DE gratia, ab hoc malo brevi fuit, eo curationis modo, quem sæpius nunc monstravi. Atque hæc de paralyfi dicta nobis hætenus sint.

XXVI. CONVULSIO 26. Convulsio PAULATIM FI- E N S.

CONsequens nunc est, quemadmo- Convulsio
modum nervi ab hoc morbo convul- scorbuto ma-
lantur, corporisq; membra in se trahan- gis consenta-
tur, demonstremus; quod huic mor- nea.
bo de sua natura magis consentaneum
id esse, supra ex Rondeletii sententia
ostendimus.

Quemadmodum etiam manifestum Exemplum
aliquando ex nautis est, ex longa & convulsionis
molesta peregrinatione domum ad in nautis.
nos redeuntibus: quorum plærosque
adeo contractos ab hoc morbo videre
licet, ut in gyrum circumvoluti, nul-
lum fere membrum habeant, quod ex-
tendant, aut extendere queant.

Convulsio paulatim fiens continua & fere sine febre:

In his modicis incrementis paulatim incipiens morbus continuus est, donec vel sponte, vel medicaminum ope resolvatur cureturq;. Suntq; fere ij sine febre.

Cum febre interpolata.

Nam quos cum febre convulsio hæc apprehendit, ij quibusdam accessionibus interpolatis & recurrentibus id patiuntur, à vaporum, qui à latentibus intus humoribus putridis resolvuntur, ad cerebrum & caput elevatione. Ex quo manifestum est, non propriâ capitis affectione malum hoc excitari, sed aliunde ad cerebrum vapores elevari.

Qui validiore corporis nisu & concussione discussi, tandem inducias ægrotanti concedunt, donec alii in perditorum locum restituti, & ad caput emissi, eandem, quam prius, affectionem inducant.

Historia convulsione scorbutica laboranti.

Atque hac convulsione specie correptum cum febre tertiana Anglum fuisse, & cum continua Notarii domesticum, & præter hos nobilem ditionis Bremensis, etiam postea inter observationes dicemus, ubi horum historiam enarrabimus. Idem etiam ab hoc

hoc morbo Concionatoris filio & quibusdâ aliis evenit.

Estque pueris & infantibus Emb- *Embolæ con-*
dæ hoc malum familiarissimum, iis *vulsio pue-*
inprimis, qui à parentibus hoc morbo *ris & infanti-*
infectis, nascuntur, vel obstetricis lac *bus familia-*
hoc morbo infectum sugunt. *ris.*

Ita evenisse cujusdam mei conter- *Historia in-*
ranei viri nobilis filioli memini, cum *fantis convul-*
matris lacte hoc malum sugenti, quam *si & permuta-*
hoc morbo infestari pulsus parvus e- *tione nutricis*
videnter monstrabat. Huic infanti cū *sanati.*
nulla medicamina satis prodesse, jussī
nutricem quæri sanam & nullo morbo
contaminatam. Quo facto, intra tridu-
um hi motus convulsivi cessarunt, &
meæ prædictioni fidem fecerunt. Fuit
autem Patris filioli nomen Philippus
Meckema.

XXVII. EPILEPSIS.

Sed utrum ab hoc morbo convulsio *27. Epileptica*
procedat, ex tribus potissimum cog- *convulsio.*
noscitur, morbi scilicet proprietate,
præterea à pulsu, & urina.

A morbi proprietate hoc modo:
Primum quod semper cum febre hi
motus convulsivi incidant, Deinde

*Regula
Diagnost. specia-
lis 16. epilep-
siae scorbuticae.*

quod eadem facilitate qua apprehendunt, remittant, iterumque præter spem recurrant. Tertio quod absque causa veteribus determinata corripiant.

Prognost. 23.

*Historiae epilep-
siae scorbuticae
laborantium.*

Quibus accedit, ante hos motus alios totius corporis concussionem comprehendere, alios totius tremorem, in aliis levem præire paralyfim, aliis brachia & manus prius subinde momentaneo rigore obrigescere. Qui etiam hac nota à veterum convulsione distinguitur, quod aliquando subito & præter rationem in alium morbum, cataphoram scilicet & paralyfim vel abscessum transeat, sponte subinde evanescentem, & rursum præter expectationem redeuntem, uti Angli filiae Embdæ accidit: Prout ad hanc vel illam affectionem natura ægrotantis magis prona est.

Sed majore certitudine à veterum convulsione hanc urinæ discernunt huic morbo familiares, crassæ, scilicet, & conturbatæ, ac rubræ, crasso, & gravi sedimento subsidentes.

Talis fuit urina Angli de quo antea diximus, cum tertianæ febris accessione, multoties hac convulsione correpti. Talis domestici notarii gravissimis

mis convulsionibus subinde in gyrum circumvoluti, magna omnium consternatione, & certo ejus ex hac vita migrationis metu. Talis nautæ filioli & aliorum omnium quos hac affectione laborasse vidi.

Quæ etsi quandoque tenuis, ut in Concionatoris filio, occurrat, eam tamen crassam præcessisse intelliges, si diligentius super iis, quæ in initio morbi apparuerunt, inquiras: Hic puer, utcumque urinas tunc temporis tenues redderet & citrinas, attamen ne tum quidem absq; siti & febre fuit, ut propterea non contemnendum signum sit, quod ab his sumitur.

Quocirca si quæ nobis cum his urinis eppilepsia occurrat, faciles in initio mutationes accessionumq; intermissiones subiens & admittens, non alienum à ratione erit, à vaporibus ab hac putrefactione elevatis, corruptis & malignis, eam proficisci cogitare ac constituere: Quatenus eidem rationi consentaneum est, pro varia vaporum halantium deductione, & in cerebrum irreptione alia atq; alia symptomata procreari.

Quæ etsi sæpe ab una eademq; causa

Causæ cur eppilepsi scorbutica alias in alios affectus transeat.

sa fiant & excitentur, variari tamen illa pro diversa subjecti dispositione, & varia partium humani corporis temperatura, quotidiana experientia confirmat. Ita si multa humida evaporatione irrigatum humectatumq; ab his vaporibus cerebrum fuerit, sic effectus morbum patietur, quem Carum Græci, Arabes Subeth appellant, profundo altoq; somno ut plurimum ægrotantem opprimentem.

Quemadmodum hisce præteritis annis quam pluribus advenisse quibusdam exemplis, si necesse esset, hic demonstrare possemus. Eadem hæc si tristi sensu nervos afficiat & subintret, si humida fuerit & frigida qualitate prædita, eos laxabit; si sicca, convellet.

XXVIII. APOPLEXIA.

28. Apoplexia.

AD eundem modum si cerebri ventriculos, & arterias plexum retiformem constituentes ingressa ea fuerit, quod apoplexiam effectura sit, nemini dubium esse potest.

Apoplexia

Quæ etsi mihi visa nunquam ab hoc mor-

morbo fuit, tamen ex symptomatibus
 & signis, quæ diligenti percunctatio-
 ne ab amicis cognovi, & præcedentis
 morbi, quo laboraverat, natura & mo-
 ribus, denique ægrotantis vita & vi-
 ctu melancholico, unam viduam ab
 hoc morbo, hujusq; putridæ materiæ
 exhalationibus sic affectam fuisse, non
 vanis conjecturis & argumentis mihi
 persuadeo.

*scorbutica
 nunquam vi-
 sa auctori.*

Cujus historiam, sicut de hac ab a-
 micis & propinquis edoctus sum, hic
 propterea jungam, ut aliorum ju-
 dicio quoque hæc res exponatur &
 subjiciatur.

*Historia vi-
 duæ apoplexia
 scorbutica cor-
 rupta.*

Incepit primum, quemadmodum
 ab amicis accepi, cum urinis crassis &
 rubris, crasso & furfuraceo sedimento
 subsidentibus, lenta febre hæc ægro-
 tare, absque multa siti, aut ullo ma-
 gnopere bibendi desiderio, Cujus cu-
 rationem diutius negligens, post plu-
 rium hebdomadarum decubitum, ex
 uno symptomate (ut fieri solet) in a-
 liud incidit, & tandem in apoplexi-
 am, quibusdam interpolatis accessio-
 nibus eam corripientem. Unde ali-
 quoties ad mentis usum reversa, conve-
 nien-

nienter de rebus omnibus, horis intermissionis, disposuit. Sed frequentiore & plurimum dierum accessione, morbiq; magnitudine tandem devicta succubuit, mortem cum vita commutans.

Hanc historiam paucis hic adscribere volui, ut si quandoq; in similem apoplexiam cum his signis & moribus incidamus, celeriore inventione hac admonitione commonefacti, de singulis dispiceremus, ac morbum ejusq; causam inveniremus & cognosceremus, ne circa inquisitionem oberrantibus nobis ægrotantis salus prius nobis elabatur, quam morbus cognitus sit atq; perspectus.

Aph. 6. lib. I.

Canon therapeuticus specialis in apopl. scribitur.

Quod acutus hic morbus cum sit, exactam quoq; & promptam curationem ille postulet & requirat, juxta illud Hippocratis, extremis morbis extrema, seu ut alii rectius transtulerunt, exquisitissima remedia deberi dicentis.

Quæ hic futura illa sunt, quæ quadam proprietate ega sceletyrben valent, cum admistione eorum si febris vehementior adfuerit, quæ cum attenuandi facultate eam extinguunt, & crassam materiam incidunt. Quibus recte

recte meo iudicio misceri aliquod simplex posset, caput respiciens, & medicaminis vim ac facultatem isthuc deducens.

Et si in causæ præcisione præcipua curationis vis consistat, quemadmodum haud dubie norunt, qui saltem à primo limine medicinæ sacra salutaverunt, & aliquam vel minimam in praxi medica exercitationem habent. Sed de his quia pleni practificantium libri sunt, nihil necesse est cum fastidio legentis prolixius ea hic referre. Quandoquidem viris morborum dignotione, & medicaminum compositione exercitatis scribimus, qui, quæ componendorum medicaminum ratio sit sponte absq; nostra admonitione cognoscunt: Eamq; pro temperaturarum differentia ac varia morbi ejusq; causæ diversitate mutare ac variare norunt.

Quæ etiam ex proprietate sceletyræ convenient tam simplicia quam composita medicamenta, eleganter in suo de scorbuto libello prosequutus D. Johannes Vejerus est, celeberrimus Ducis Juliacensis medicus. Unde peti possunt quæ hic desiderantur, & ad hunc locum pertinent.

De

De varia febrium curatione, ejusq; pro subjecta materia differentia, etiam apud probatos authores legimus, in quorum lectione prius exercitatum illum esse oportet, qui cum fructu, & ægrotantium commodo ac bono, hujus morbi curationem tractare cupit: Ne quod dicitur & in proverbio est, uni calopodio calcem ubique accommodet. Multa quoque ministrat usus, artium & disciplinarum Magister, cujus ductu semper opus est. Neq; possunt particularia omnia scribi. Accedit longiorem de his doctrinã esse, quã ut hoc nostro libello absolvi ea possit.

*Canon therap.
generalis deci-
mus quintus.*

Qui vero tutam curationis viam amplecti volent, à mitioribus incipiendo paulatim ad fortiora assurgere debent, si non satis priori curationi morbus obediat, aut cum laudabilibus urinis præter rationem ingravescat. Signum enim id certum est, mitiora ea medicamenta esse, quam morbi causæ, ejusq; magnitudini conveniat: Ideoq; fortioribus opus esse, magisque attenuantibus, & ex proprietate sceletyrben curantibus.

Quæ præterea ob incidentes circumstantias hic observanda notandaq;

daque sunt, medendi methodus docebit. Eaque sponte cognoscunt, qui aliquem artis nostræ usum, & veteris medicinæ cognitionem habent. A quibus (ut antea dixi) hæc nostræ obscurari cupio. Qui hæc in lucem & publicum dedi, eorum calamum & venam ut excitarem, præterea occasione iis hoc nostro scripto præberem, pressius post nos hac de re, ad divini numinis gloriam, & proximi salutem, cogitandi.

Quandoquidem non minima DEI beneficentia est, inter cætera ejus beneficia, quibus genus humanum ornat, suppullantium quotidie morborum causas & curationem, tam benigne nobis, pro ineffabili sua misericordia ac bonitate, detegere & aperire. Quod unius & solius DEI opus ac munus esse nemo Christianus ignorat, quatenus à nobis ipsis nihil recte cogitare aut facere queamus. Etsi quid hujus in nobis reliquum à prima curatione esset, turbaret id ipsum haud dubie Sathanas, infestissimus humani generis hostis, qui hoc unum agit & satagit, ut quam plurimis calamitatibus nos implicet & involvat.

Magna Dei beneficentia est quod suppullantium quotidie morborum causas & curationes deteguntur.

Cæ -

Cæterum quia hæc alterius loci sunt, & ab instituto nostro aliena, ab his recedentes, ad ea quæ restant properabimus.

29. Convulsio particularis.

XXIX. PARTICULARIS CONVULSIO.

Convulsio totius & partis ut generetur.

NAm ut hi motus convulsivi cerebrum, id est, principium motus ac sensus apprehendentes, totum corpus convellunt, & in gyrum circumagunt: Ita ejusdem putrefactionis valor, in particularem aliquem muscolum, vel motus opificem nervum delatus, illius, in quod inseritur, membrum & particulam contrahet, sua seu frigidityte & crassitie, qua nervum adimplet, seu maligna & venenata qualitate, quæ ut torpedo piscis, sua proprietate nervos offendit, & ad hanc affectionem inducit & disponit. Quam frigidam esse curatio demonstrat.

Causa convulsioni potius est vapor, quàm humor.

Quod autem vaporosa magis quam humoralis, efficiens hujus convulsioni causa sit, affectio ostendit, nullo tumore aut duritie comitata. Fit vero aliquando paulatim convulsio hæc, absq;

absq; febris aut alterius alicujus ma-
 li implicatione & admistione, ali-
 quando cum manifestis febris indiciis,
 & nonnunquam post gravissimos ab
 hoc morbo excitatos dolores.

*Convulsio par-
 ticularis ali-
 quando absq;
 aliquando
 cum febre acci-
 dit.*

Cum convulsivi motus universales,
 de quibus diximus, semper, quantum
 memoria mecum repetere possum,
 cū manifestis febris indiciis fiant, iisq;
 vigentibus quàm maximè infestent.

Quæ autem paulatim, & citra alteri-
 us morbi admistionem fit convulsio,
 plærunq; ex crassa & nautica victus ra-
 tione oritur, aquisq; putridis & de-
 pravatis, nautis nostris, quos à conti-
 nenti diutius tempestates & molestæ
 æquoris jactationes, arcent & aver-
 tunt, familiarissima. Quos sæpe à mo-
 lesta hac peregrinatione adeo contra-
 ctos ad nos domum redire videmus,
 ut nullum fere corporis articulum ha-
 beant, quem dimovere ac extendere
 queant.

*Causa convul-
 sionis externa.*

Atque hac convulsionis specie circa
 calcaneum infestatam Secretarii Hã-
 burgensis sororem memini ex crasso
 quoq; victu, & post molestum mariti
 sui morbum.

*Historia con-
 vulsionis parti-
 culari laboran-
 tium.*

Sed quæ post diuturnos hujus morbi

K

de-

dolores, & cum vel post febrem sequitur convulsio, frequentior nostris tam rusticis quam urbanis est. Qua ante paucos menses duo correpti extra novam portam Embdanam fuerunt. Et in phaleris Embdanis ut vocant nauta, atq; præter hos mercator Antuerpianus, rusticus, adolescens Colonienfis, juvenis Embdanus & alii infiniti, Spasmodicam canino correpti ab hoc morbo apothecarii Embdani soror fuit, item mercator senex & sexagenarius, nautæ conjux & cujusdam ex Frisia occidua oriundi foemina.

Regula diagnostica decima septima convulsionis.

De quibus omnibus si sine febre sint, certius ex pulsu, quam ab urinis indicium est, utpote quæ ut plurimum tenues & citrinæ, nullam hujus morbi significationem habent, per omnia fere, nisi quod tenuiores justo sint, sanorum lotiis similes. In quibus tamen pulsus parvus, debilis & inæqualis, manifesto indicio morbum hunc iis prodit & ostendit, qui exercitatum circa pulsum diagnosis ingenium habent.

Quod si febris indicia urina habeat, eiq; conjuncta sitis & oris siccitas fuerit, præter pulsum, morbum hunc arguet urina tenuis & rubra, aut crassa & rubra, sed subobscura livedine fuscedineve tincta.

In

In quarum plerisque multa subsidunt excrementa gravia & crassa, à quibus nihil clarior, supereminens, supra hac, urina substantia conspicitur, sed tota sua essentia superiore turbida & conturbata visitur, certo, sicut antea diximus, & indubitato hujus morbi argumento.

Quibus si prædicti dolores per intervalla infestantes conjungantur, adhuc magis super scorbuto confirmaberis. Eo quod latentis intus malignæ putrefactionis, à qua materia hæc vaporosa, sua vel essentia, vel qualitate continuum discindens, dissolvitur, manifestum indicium habeant infestantes hi per intervalla dolores.

Quæ extra alterius manifesti, graviorisq; morbi significationem, quomodo ad hunc morbum referenda sit, supra etiam ostendimus, ne quid molesta ejus repetitione hic sit opus.

Restat nunc paucis hujus symptomatis curationem, quam in hoc casu felicem aliquoties experti sumus, ostendamus, quæ si sine febre & obstructionibus æger fuerit, paucissimis absolvitur, sæpe solius absinthii decocto, quod in hoc casu, sic affecto, vel ex aqua & vino, vel convenienti cerevisia,

*Canon therap.
spec. in on
vulsiione pri-
mus.*

Anglicana scilicet, aut Hamburgensi tenui, felici nostro experimento non semel exhibuimus.

Estq; hoc solo decocto curatus nauta, & extra novam portam pauper rusticus, & præter hos Secretarii Hamburgensis foror.

Secundus.

Sin cum febre & siti, atque cum obstructionibus manifestis conjunctum hoc accidens fuerit, neq; in his ab hujus usu abhorreo. Nisi quod prædicto, quædam febrem mitigantia, quæ fortius obstructiones expediunt, atque hunc morbum quadam proprietate curant, miscere consueverim.

*Medicamenta
antiscorbutica
deobstruentia.*

Quæ autem febrem hanc curent, alio loco diximus. Quibus pro tollendis obstructionib. cuscutam, ceterach, scolopendrium, hyssopum, & betonicam addimus; & pro pleniori hujus morbi curatione, si febris patiatur, carduum benedictum, raphani & enulæ campanæ radices, nec non in duris & agrestibus corporibus, iisque humidis & frigidis, raphani radice succum.

Et præter hæc cocleariam, nasturtium utrumque, trifolium aquaticum, & chelidoniæ minores radices. Quæva-
rie;

rie, pro varia corporum constitutione
& peccantium humorum conditione
permisceo.

A quibus si non satis, uti jure debe-
bat, curatio procedat, neq; tamen sitis
aut febris sub his invalescat, (admini-
stratis prius ubiq; universalibus) pau-
latim ad fortiora transeo, donec aptum
morbo ejusque causæ remedium adin-
venero; quam hîc crassam & rebellem
esse morbi magnitudo ejusq; mores re-
fractarii ostendunt.

*Canon therap.
spec. in con-
vulsione terti-
is.*

Sæpe enim ab urinis rubris & tinctis,
ac molestiore siti deceptus in his sum,
quo minus ad fortiora transirem, aut
transire propter febris indicia aude-
rem, magno ægrotantis incommodo,
& nullo curationis successu.

Quod in his, utcumq; urinæ tinctæ
videantur, morbi causa crassa & frigi-
da, ea medicamina postulet & requi-
rat, quæ cum levi calefaciendi faculta-
te, attenuandi incidendiq; vim & pote-
statem, cum quadam ad hunc morbum
proprietas, habent.

Ideoq; si non satis à mitioribus uri-
næ immutentur, vel iis ad melius im-
mutatis, & ad naturalem colorem re-

deuntibus, morbus nihilominus in-
gravescat, diligenter ad a gri tempera-
mentum, & precedentis vitæ victus-
que rationem attendere oportet, &
omnibus discussis examinare, satisne
secundum hæc, intensa medicamenta
sint, nec ne.

*Urina laudabi-
lis cum morbi
incremento &
perseverantia
certo notat,
Medicamenta
esse mitiora
quam pro mor-
bi causa.*

Siquidem certum signum, urina lau-
dabilis cum morbi incremento ac per-
severantia habet, mitiora medicamina
esse, quàm pro morbi causa conveniat,
& idcirco juxta dictam normam inten-
di augerique ea debere, donec causæ
morbi contrario gradu adæquentur.

XXX. ARTHRITIS.

ATque hæc de paralyfi & convul-
sione dicta nobis hætenus sint. *30. arthritis
scorbatica.*
Sequitur nunc, quemadmodum hæc
facere morbum hunc ostendimus: ita
particulares & quarumlibet partium
dolores ab eo commoveri, porro
monstramus.

De quibus quia partim antea dixi-
mus, hoc loco de iis saltem dicemus,
qui in articulis tantum excitantur, &
falsa arthritidis imagine medicos de-
cipiunt ludificantque.

Qui, si in morbi principio catharticis
medicamentis fortius curentur, ab iis
adeo non mitigantur, ut etiam gravius
exasperantur, & sæpe in paralyfin, ali-
umq; ea deteriore morbum, atro-
phiam scilicet vel similem degenerent.
Qua propter diligentem animadversi-
onem, & exactam à veterum arthritide
distinctionem, hæc res exigit & mere-
tur, ne curando prius impingamus,
quam morbus ejusq; causa nobis co-
gnita & perspecta.

Dignoscuntur autem primum ex eo,
quod diu uno in loco, maximè in

Prognost. 26.

*Regula Diag-
nost. spec. deci-
ma octava in
arthritide scor-
batica.*

*Causa arthri-
tidis scorbuti-
ca.*

morbi initio, hi dolores quos scorbutus facit, non subsistant, sed errabundi ad alium atq; alium ejusdem, vel oppositi lateris articulum transeant: Indubitato argumento, à vaporibus magis, tenuibus humoribus permixtis, quam humorum defluxu malum hoc procreari, utpote ad mutandum locum stationemque suam minus promptorum. Quemadmodum à veterum arthritide docemur, etiam illa, quæ à tenuissimis & subtilissimis humoribus accidit.

Atque hoc indicio hos dolores scorbuto proprios, ab iis, quos veteres cognoverunt distinguimus. Quod hi ad sui solutionem usque infestent, neque cum alterius membri apprehensione, statim prius relinquunt, sicut in hisce nostris scorbuticis, maxime illorum initiis videre licet.

Qui in quibusdam aliquando adeo vagantes sunt & discurrentes, ut quos omni dolore solutos existimas, subito alio dolore præter spem & expectationem, cum & sine tumore, apprehendi cernas, qui æque atq; prior ægrotum membrum discruciet.

Eum si topicis curare aggrediaris, vide-

dehis membro eo derelicto postride,
& sæpè eodem die & hora ad aliud
ejusdem, vel oppositi lateris membrum
& articulum transiisse.

In quo illud etiam præter veterem
arthritidem occurrit, huic morbo pro-
prium & peculiare, quod semper cum
levi resolutione dolor hic conjunctus
sit, adeo ut hoc malo infestati, raro
membrum affectum dimovere, & ad
aliud locum transferre spontè que-
ant, nisi ab alio & sano membro ad-
juventur. Quæ etiam cum dolore re-
mittit, eodem quo dolor commigrans.

*Dolor arthriti-
dis scorbuticæ
semper cum levi
resolutione con-
junctus.*

Atqui hoc malum illud esse puto,
quod doctissimus & celeberrimus no-
stri temporis medicus D. Joannes Ve-
jerus vernacula & Belgica nostra lin-
gua *varen* appellat.

de Varen Pieri.

Nam quod Belgis *varen* dicitur, la-
tinis translatio ac commigratio est, cæ-
terum est proprium hoc & pathogno-
micum sceletyrbes signum. Quemad-
modum curatio id ipsum ostensura iis
est, qui post nos eam explorare volent.

*Regula Diag-
nost. gener. deci-
ma sexta ex ar-
thritici scorbu-
tica vaga.*

Exhibitis enim quæ stomacacæ con-
ducunt medicamentis, ab iis hæc sym-
ptomata discuti & evanescere videbūt,
ut ab excisa arboris radice, ejus folia &
fructus

fructus. Cum alioqui in vera & veteribus cognita arthritide. physica ratione officii ab his pejus debebant.

*Canon therap.
generalis deci-
mus sextus.
Decimus septi-
mus.*

Bibuntur in hoc casu, ut in reliquis omnibus, herbarum huic morbo conducentium succi, feliciore successu, quam earum decoctum. Estq; in una quadam Senatoris Hamburgensis conjugē probatus mihi ad hunc casum cochleariæ succus destillatus. Quem debilioribus ventriculis libentius distillatum, evitandæ noxæ causa propino, quod in destillatione succus hic cruditatem, qua debiliores offendere ventriculos solet, dimittat.

*Decimus octa-
vus.*

Quod si crudis humoribus immixtum esse hoc malum videatur, conveniunt medicamenta, quæ citra multam commotionē ac digestionem, eos concoquunt & incidunt. Qualia huic ului servientia sunt Betonica, origanum, enulæ campanæ radices, cum iis quæ proprie stomacem curant.

Prognost. 27.

Ab his & similibus ab occulta qualitate & partim à manifesta convenientibus medicamentis, & usu cognitis atq; probatis, hi dolores evanescent & dissipantur, ut ab oriente Sole matutino, a livido tempore nubes.

In

In quibus vero diutius medicorum ignorantia aut ægri inobedientia, vel quovis alio dolore, morbus hic perseverat, qui initio discurrentes intermittentesq; dolores fuerunt, postea stabiles, & eodem loco cum accessio-
ve subsistentes, in debilitato longiore *Reg. diagnost. spec.* mora membro fiunt. Quando cum pulsu urinæ morbum nihilominus manifestant.

Quæ quantum memoria mea repetere mecum possum, aut crassæ, sublividæ & rubræ, vel albæ, subsidentes, & turbidæ, apparuerunt, cum, & sine sedimentis. Cujusmodi quoque visæ urinæ illius fœminæ sunt, cujus venter, crura, & abdominis muscoli, mirifice ab hujus putrefactionis halitibus discindebantur. Ex cujus felici curatione primum in hujus mali noticiam deductus sum, inquisitionem meam confirmante curatione, quæ cum aliis methodica ratione adhibitis medicamentis obedire nollet, ab his sequuta statim est.

Urina in arthriticis doloribus quales. Hæstoria fœminæ ventris, crurum & musculorum ab dominis dolor laborantis.

Aliquorum urina crassa apparuit & subnigra, cum crassis & furfuraceis excrementis, sublividis & nigris. Qualis urina fœminæ Holsatæ fuit.

Hæc

*Historia femi-
na Holsata do-
loribus arthri-
ticis per inter-
valla correpta.*

Hæc per intervalla ab his doloribus correpta, statim in terram cōcidit, levi resolutione cum iisdem attētata. Quibus remittentibus, ilico, quo volebat baculi adminiculo ibat. In hac præter morbi speciem raram etiam sceletyrben mihi patefecit cum pulsu parvo, urina varia & crassa, dispari substantia conspicua.

*Canon therap.
spec. in dol.
arthriticis pri-
mus.*

Ipsa quoque hujus symptomatis ignara, confessa mihi fuit, ante triennium graviter se scorbutō ægrotasse. Curata iisdem medicamentis est, quæ ad hunc morbum valere usus monstravit. Quibus subinde cathartica validiora admiscuimus, crudum & melancholicum humorem evocantia. Quod hoc hominum genus rusticum, ut celerem, sic validam curationem amet & amplectatur.

Prognost. 29.

Fit etiam aliquando hujus morbi indicio, in hac arthritidis specie, post longiorem hujus morbi morem (deficiente forte facultate expultrice) loca, ante juncturas infestari solitas, eadem difficultate ab his doloribus premi, qua prius ipsæ juncturæ affici solitæ sunt.

Quemadmodum post diuturnam
&

& molestum hujus mali sensum Notario Embdano, & paucis aliis accidit.

Historia Notarii Embdani.

Cotinuus dolor coxendicis in scorbuto.

Historia Ischiae de scorbuticis laborantis & curati.

Nonnullos novi continuo coxendicis dolore ab hoc morbo divexari. A quo ante paucos annos supra tres menses lecto affixus fuit Sartor meus Hamburgi. Quem variis inunctionibus aliquandiu quidam non incelebris aliqui chirurgus, sed frustra curabat, cuius mali causam, ego ex urina crassa, rubra & subfusca, & ejusdem coloris in matulae fundum descendantibus subsidentiis crassis & furfuraceis cognovi, absque siti sic, aut ullo molesto caloris sensu exeretis.

Quapropter media bruma ex vino rubro cochleariae succum ei propinavi, quo intra quatuor aut quinque ad summum dies, ab his doloribus liber evasit, etsi plurimum dierum & hebdomadam integra morbi curatio postea fuit, propter cruris, qua laborarat, contractionem.

Ab his ipsis doloribus plures praeterita hyeme curavi, & nonnullos qui supra tres anni quadrantes claudi fere domi desederant, & non nisi summa cum difficultate loco dimoverentur. Sicut praeter hos alios, quos vapores

Historia altæ curatorum à doloribus arthriticis scorbuticis.

musculorum membranas subeuntes;
brachia, crura, aliasve corporis partes
disceindabant.

De his omnibus certum à pulsu &
urina, vel ab horum alterutro indici-
um est menimeq; fallax. Adeo ut circa
hæc exercitari, magnam imo maximā
aliis de se admirationem sint præbituri.

*Canon therap.
specialis in do-
loribus arthri-
ticis alter &
tertius.*

Nunc, ut quæ curationem hanc con-
cernant persequar, celare non possum,
nostra qualicunq; observatione com-
pertum esse, nonnullos in prima mor-
bi invasione, solo absinthio in vino seu
cerevisia suspenso feliciter in quotidia-
no potu usos fuisse, per semestris unius
spacium usum ejus continuantes. Qui-
bus autem inveteratum malum est,
pluribus fortioribusq; egent, & præter
ea quæ assumuntur, etiam topicis.

Ex quibus non postremum in diu-
turniote morbo locum sibi vendicat,
oleum per destillationē factum, quod
suo de medicis consultationibus libel-
lo, Joannes Fernelius celeberrimus no-
stri temporis medicus describit, con-
sultatione sua decima tertia.

Atque hæc de arthriticis doloribus
scorbutū comitatibus, vel ab eo, si ma-
vis, excitatis, dicta nobis hætenus sint.

XXXI. HYDROPS SCOBUTICUS.

REstat nunc de iis dicamus, in quibus morbus hic diutius perseverans, & sub robusta natura paulatim increfcens (adjuvante huc quoq; corporis temperatura & dispositione) crura inflat, & in hydropicum ac renitentem tumorem attollit, & cum his moram trahente morbo, ventrem. Ita ut veterum hydrope tales laborare, doctis etiam medicis videri possint.

33. *hydrops
scorbuticus.*

Circumscribuntur autem horum plerisque in inveterato morbo, sæpe manifesto tumore, ex crasso & melancholico succo Epar & Lien. Siquidem non solum venæ horum viscerum, sed & ipsissima eorum substantia sæpenumero hoc tumore crasso & melancholico sic infarcitur, ut manifesto tumore intuentium oculis foris viscera sese offerant.

*Tumore patis
& lienis manifestus.*

Quemadmodum accidisse Senatori Hamburgensi, & alteri cuidam nobili arcium trium præfecto vidimus, & uni ex plebe Embdæ. In Senatore & præfecto præter alia signa, de quib. postea dicemus

*Historia tum.
ep. & lienis.*

mus, morbum sceletyrben non obscuro indicio, labra genæque sublurido colore suffusæ, demonstrabant.

Hydropis scorbutici generatio.

Qui sic afficiuntur, his à dicto humore crasso & melancholico credibile est primum viscera affici & debilitari, ab ejusdem vel substantia, vel fumo & evaporatione, seu specifica (quod verisimilius est) putrefactionis quam conceperunt, qualitate, aut ab his omnibus simul.

Atq; ab hac semel intra se recepta qualitate rationi consentaneum est, facultates eorum lædi, & ad similem impressionem, qua affecti sunt, alimentis imprimendam disponi; reciproca vice adventantibus ad se alimentis reddentia, quod ab humoribus receperunt. Quæ hac qualitate infecta ac contaminata verisimile est aliquibus aut pluribus suis partibus ineptitudinem quandam concipere, nutritioni corporis incongruam.

Quibus paucis & tacitis incrementis coacervatis cōgestisq; cum amplius ab innato calore occultari & dirigi non queant, primum à fortiore naturæ nisu, ad remotiores corporis partes crura scilicet, devolvuntur, quibus super-

superfluum amplius non recipientibus, quod residuum est, intra viscera hæret, & tandem à robusta natura ad abdomen & peritonæum ejicitura præduro ac tenso tumore illud attollens, & falsa hydropum veterum specie medicis imponens.

Qui ignari differentia, in curatione communi methodo, maximo ægotantium incommodo, procedunt: *Prognost. 30.* Quod communia hydropis remedia, vulgaremque curationis modum hydropi competentem, adeo hoc malum respuat & contemnat, ut non raro ab eadem intra medicorum manus præter expectationem ita affecti expirarent.

Quo magis utile erit differentias quibus discrepant, prius observasse, ne in curatione prius impingamus, & salus ægotantis nobis elabatur, quam morbus cognitus fuerit.

Deprehendi autem discrimen potest, cum ex eo, quod à purgantibus difficulter spirent, & quotidie in deterius prolabantur, tum extra purgationis experimenta, ex vehementiore respirationis difficultate, cum angustia sub diaphragmate conjuncta. *Regula diagnostica specialis 12. in hydrope scorbutica continens notam hujus primam.* Que
L etiam

etiam in morbi initio, nondum premente valde tumore, gravior his est, quam in veteri hydrope, aut hydropis ratione esse consuevit.

Nam quod maxime in hujus initio conqueruntur, illud præcipuum est, quod plerique horum præcludi sibi aerent, & ad orificii ventriculi regionem coangustari se contestentur. Adeo ut quidam ipsorum erecti spiritum trahant: instar eorum, qui orthopnoea laborant: A crassis flatibus vaporibusque diaphragmate (quod puto) compresso atq; distento.

Quo fit ut iis discussis, hæc difficultas remittat, redeatq; iis regeneratis, & rursum, ut prius, ad diaphragma elevatis. Siquidem in plerisq; quibusdam quasi vicibus res geritur, in initio potissimum, quando non semper neque continuo infestari eos ab hac angustia videre licet, nisi quum causa mali fortis & instans est.

Si corporibus plethoricis & multo sanguine refertis malum hoc advenierit, statim etiam sublurido colore tincta labra genæq; apparent, cum peccantis humoris qualitate morbi speciem ostendentes.

Quam

Quam à communi quoque hydrope tumoris qualitas, (nam à leucophlegmatia etiam alia signa distinguunt) dirimit & discernit: Quod in hoc nostro hydrope tumor durior sit & tensior, ut mollis est & laxus in veterum ascite & hydrope.

Ideoq; neque æquæ altam, neque æque facilem digiti impressionem, atque veterum hydrops admittit: Haud dubie propter humoris melancholici, à quo fit, admixtionem. Quem ut alibi sæpe, sic libro de curatione per sanguinis missionem, Galenus tumorem duriores scirrhioremq; efficere docet, uti laxum pituita facere solet.

Hunc tamen pro temperaturarum, atque redundantium ab his humorum diversitate rationi consentaneum est, aliis duriores, aliis laxiores fore, quatenus alia corpora pituitæ, alia alterius humoris feraciora, de sua natura sunt. Qui dum morbosæ causæ miscetur, in tantum tensionem mollitiemque variabit, in quantum huic tumori hic vel ille humor permiscetur. Qui tamen nunquam, aut perquam raro, nec nisi in mollissimis laxissimisque corporibus,

adeam mollitiem, quæ veterum hydropi familiaris est, accedit, idque ob crassioris, & melancholici humoris, à quo fit, admixtionem.

Quamobrem impressus his digitus in aliquibus nullum post se vestigium relinquit, in aliquibus exiguum, paucis altius descendit: Cum in communi & veterum hydrope notum sit, quas post se foveas ille relinquat. Hanc differentiam à multis ab hinc annis observavi.

Historia hydrope scorbutico laborantis.

*Prognost. 31.
Canon therapeuticus spec. in
hydrop. scorb.
primus.
Secundus.*

Ex qua in nobili Batavo, præ cæteris meæ patriæ medicis, hunc morbum cognovi, non sine artis encomio, & ægrotantis, quod maximum est, salute: Frustra alioqui doctissimis, & non vulgaris eruditionis medicis, curationem hanc ex authorum præscripto persequentibus; qua (quod eorum pace, ad multorum salutem mihi dicere liceat) pene ad orci fauces æger perductus erat. Quod ægerrime sic affectos, (ut obiter particularem hujus curationem attingam) purgationes sustinere, maxime in morbi principio, usus demonstret.

Cæterum medicamentis, incidendi attenuandique facultate præditis, mi-

sceri

sceri debent, quæ erga hunc morbum scorbutum peculiariter valere, aliquoties antea ostendimus.

Quo curationis modo citra purgantium opem, plurimos sanatos novi. Siquidem sublatis obstructionibus, venisque reseratis, unaq; curato scorbuto, sæpe præter opinionem tumor hic evanescit. Quod si non satis succedat, ubi curata ex parte vel de toto sceletyrbe videbitur, tum demum catharticiis superflua deturbare convenit, iis potissimum & inprimis, quæ proprietate sua humorem melancholicum educunt. *Tertius.*

Cujus generis Electuarium Indi utriusque est, confectionis hamech, diacatholiconis, & his similia alia sunt, passim authoribus decantata.

Verum nec illos purgari in initio debere, quibus ex venarum obstructione, & humorum in visceribus coactione. Epar & Lien intumescunt, nisi prius convenientibus unguentis & emplastris, tumor & obstructio sublata sint, ex communi curationis methodo magis notum est, quam ut hic moneri illud oporteat. *Quartus.*

Semper vero quoties cum his scorbutus *Quintus.*

butus occurrit, dictæ qualitatis medicamentis ea miscenda sunt, quæ specificam erga hunc morbum vim & proprietatem habent. Eo sublato communem tunc in eradicandis quæ supersunt vitiis, viam sequi licebit.

Sextus.

Si calor & sitis, atq; febrilis caloris signa majora adfuerint, ea convenientibus medicamentis quoque temperanda esse, sponte notum est. Quæ tamen ejusmodi esse debent, quæ aliquali incidendi facultate prædita & adornata sunt.

Septimus.

Quibus crassior in venis sanguis redundat, vel quæ consueta sanguinis evacuationo substitit, iis vena aperiri, & reduci consuetudo intermissa debet, atque tantum sanguinis mitti, quantum morbi & virium ægrotantis ratione commodum erit.

Observatis scopis & indicationibus, de quibus eleganter Galenus, ut reliquis omnibus, libro de curatione per sanguinis missionem, scribit.

Octavus.

*Historia ab
hydroposcor-
butico liberata
fluxu hamor-
choidum.*

Profuit in aliquibus sic affectis hæmorrhoidum quod memini, apertio, sponte nigri atrique sanguinis redundantiam effundentium. Quo naturæ beneficio præter alios, conservata à
gra-

gravissimo suo morbo, rustica Keden-
sis fuit.

Si non satis officium suum naturæ *Natus.*
fecerit, & venæ ani turgent, applicari
iis sanguisugæ poterunt. Quod si nec
sic satisfactum naturæ fuerit, vena a-
periri sub poplite debet, quod melius
est, aut in sinistro brachio è regione
lienis. Et si ita casus ac necessitas po-
stulaverit, modicis vicibus sanguis ex-
trahatur, nisi admodum plethoricum
esse, & crasso copiosoq; sanguine ab-
undare, ægrotantis corpus videatur.

Alioqui nostra qualicumq; ut & Do-
ctoris Vejeri celeberrimi Ducis Cli-
vensis medici, observatione animad-
versum fuit, in genere largam sangui-
nis missionem ægrè hunc morbum
perferre.

Quod inprimis notari in locis fri-
gidis & humidis debet, ubi simul fre-
quens crudarum sublimiumq; aqua-
rum est usus. Qualia sunt apud nos
Frisia utraq; tam occidua, quàm ori-
entalis, & plæraque Hollandiæ loca,
proprius ad septentrionalis maris lit-
tus sita, in quæ venti humidi & frigidi
perpetua ferè nubila inducunt crassa
& humida.

*Sanguinis mis-
sio larga cur in
scorbuto non
conveniat.*

A quibus ad frigiditatem humiditatemq; disposito aere, corpora nostra ut & ab aquis frigidis & crudis, plus satis refrigerantur, ut propterea largiorem sanguinis missionem, in Gallia, Italia, & pluribus Germaniæ locis usitatam, respuere videantur. Rationi enim consentaneum est, ab his aquis (ne quid de aere dicam) multos tenues crudosque humores, cum in prima, tum secunda & tertia corporis regione coacervari, quibus sanguis spiritusq; contaminati, haud dubie refrigerantur & obtunduntur, ad sui concoctionem longiore tempore, fortioreque calore indigentes.

Quæ omnia largiore sanguinis missione conturbari, cui dubium esse potest? Ut non abs re dictum ab Hippocrate sit, medicum cujusque loci, ad quem accedit, victum, aerem, & aquas considerare debere, & his curationem attemperare.

XXXII. HYDROPS VESICALIS.

Id obiter admonere hic volui, cum
peculiarem hujus morbi curationem
ut

ut ostenderem, tum etiam ad harum regionum clima eam accommodarem, quam sic affectis prodesse, ratio monstrat, usus confirmat. Præter ^{32 Hydrops vesicalis.} hanc hydropis speciem, etiam alia occurrit, nostris regionibus quoq; familiaris, quam à vesicarum toto corpore & qualibet ejus parte extuberantium forma, Belgica lingua nostrates *Bougwater* appellant.

Hanc communis vulgi opinio incurabilem tenet, ideo quod paucis ab ea convalescere, etiam vulgi observatione constet. Siquidem ante hæc tempora nulli medicorum, quod sciam, illius causa & curatio satis cognita fuerit. Unde non mirari infelicem ejus curationem oportet: Quandoquidem quæ veteribus in suis hydropum speciebus descripta curatio est, adeo huic nostræ adversatur, ut etiam fortissimos apta sit, paucis diebus & hebdomadis prosternere & debellare.

Sicut testem hic (nisi aliorum famæ parceremus) facere virum juvenem ac nobilem possemus, non ita pridem, eum, hac curationis via, finem adeptū, quem mox prædiximus, simul ac medi-

dicamina præscripta ei in officina videremus. Nam cum ægroto prius semel atq; iterum fueram locutus.

Errores & suos & alienos in curatione commissos cur detegat autor.

Quod tamen non obtrectandi causa, sed veritatis studio à me scribi, omnibus persuasum velim. Nam mea forte contentus nulli invidео. Et debet procul hoc vitium à Christiano pectore abesse. Cujus unicum studium esse debet, ut collata sibi à DEO dona in publicum ad communem omnium utilitatem adferat. Sicut de hac re à Divo Paulo Corinthiorum prima epistola, capite 12. admonemur. Sed & homicidii à quodam accusantur, qui collata sibi à DEO dona dissimulant.

Atque hæc præcipua mihi scribendi hujus libelli causa fuit. In cujus contextu, si veritatis confirmandæ gratia, quandoque quorundam errata attingere contingat, velim hic mihi viri docti ignoscant, sibi que certo persuadeant, non à malitia sed simplici veritatis studio ea proficisci, in quo etiam neque nostra dissimulare constituimus.

Sed ut ad institutum nostrum, unde digressa oratio est, revertar, paucis in
ha c

hac hydropis specie, sicut attentatum nobis in reliquis hujus morbi differentiis fuit, signa notasq; ostendam, quibus à veterum hydrope distingui hic noster queat. Necum nostro ipsius & artis turpitudine prius quam morbus cognitus fuerit, curando impingamus. Quoniam periculi, & calamitatis plenum est, morbum curare omnibus suis partibus non satis prius examinatum & discussum.

Cognoscitur autem ex tribus potissimum, morbi scilicet qualitate ejusque natura, & moribus, præterea à pulsu & urina. A morbi vero natura & proprietate hoc modo: Primum quod prius quam certas sedes figat, aliquando aliam atque aliam corporis partem momentaneo tumore & inflatione hic morbus attollat & distendat.

Quod iis tamen accidit magis, qui ex subtiliore aëre ad crassiorem sese transferunt, aut humoribus præditi sunt tenuioribus, & multis flatibus refertis, præterea victus ratione usi sunt minus melancholica & crassa. Nam quibus humores crassiores sunt,

Regula diagnostica specialis vicesima in hydrope vesicali.

mi-

minusq; vaporosi, in his minus conspicuæ hæ tumorum mutationes sunt; sed his pedes primum, postea totum quoque corpus, duro & inæquali tumore paulatim assurgit, variis tuberculis, sua subinde quasi cute circumscriptis, extra reliquum tumorem extantibus propendentibusque.

Quæ etsi inguini & scroto familiariora sunt, tamen pedibus quoque & brachiis, scapulis, dorso, reliquisque corporis partibus ea adnasci videre est.

Suntq; hæc ut plurimum dura, semper vero doloris expertia, præter morbum, humoris quoque qualitatem indicantia. Quibus, majore scorbuti morbi confirmatione, pulsus accedit parvus, & inæqualis. Quem sæpius huic morbo proprium ac familiarem esse, jam antea diximus. Subscribentibus his omnibus urinis in initio crassis, rubris, & sublividis, aut variis, modo rubris & instar Gallici vini rubri claris, modo rubris & crassis, ac conturbatis, modo crassis albis & turbidis, & nonnunquam albis & aqueis.

Quæ

uæ tamen procedente morbo, non agg'ediente amplius morbi causam natura, ut plurimum crudæ & tenues, sicut in reliquis hydropum speciebus conspiciuntur.

Sed & hac nota aliquando cognoscitur, si de præcedentibus signis altius inquiras. quod ante ejus generationem, alia atq; alia symptomata ægro- tantem infestarint, huic morbo familiaria, & nulli curationi methodicæ, cui physica ratione debebant, parentia, veluti exempli gratia frequens vomendi conatus, vel variæ & inconfuetæ alvi dejectiones, vel sine morbo manifesto diutius continuans languor, aut cum pulsu parvo, crebro & inæquali, oris siccitas, vel perpetua, vel à somno tantum matutino infestans, & diutius absq; sensibili morbo perseverans.

A quibus diutius commorantibus, facilis ad hunc hydropem transitus est, & hujus rursum à veterum hydrope distinctio.

Curatur autem eodem curationis modo, quem supra in priore hydropis specie ostendimus. Quo discuti tumor universalis, & cum hoc extantia
hæc

Secundus.

hæc tubera solent, nisi morbus nimium sit inveteratus. Quando etiam post interiorum curationem, particulari tumoris tuberumq; curatione opus est, ex iis quæ discutiendi dissolvendique facultatem habere prædecessores nostri medici prodidere.

*Medicamenta
discrepantia.*

Inter quæ non postremum locum in hoc casu habent absinthium, ruta, arthemisia, & chamæmelum, & his similia alia. Convenit & ex lupinorum, absinthii, & chamæmeli farina cum oxymelite in puliculæ formam redacta, & cruribus calida obvoluta pulicula duplicatis aut triplicatis linteis densioribus.

Histeria mulieris ab hydropese vesicali curata.

Hac curationis via nuper admodum extra novam portam Embdanam, cujusdam acicularii conjugem, quæ menses tres plus minus decubuerat, intra septem dies DEI beneficio sic curavi, ut rursus consueta domi munia obiret, & cibum cum appetitu assumeret, paucis medicamentis porro integra curatione peracta.

XXXIII. ATROPHIA
SCORBUTICA.

Restat nunc aliud sævum hujus ^{33. atrophie}
morbi accidens, quod Latini nu- ^{scorbuticæ.}
tritionis defectum, Græci commodi-
ore vocabulo atrophiam appellant.
Quandoquidem ab hoc sævo malo
intra corpus latente, non semel omnem
succulentiam carneniq; corporis ita
absumi vidi, ut sceleti verius, quam
hominis formam, sic affecti referre vi-
derentur.

Quod à levissima & latente intus ^{Atrophie scor-}
putrefactione, cum hoc morbo con- ^{buticæ causæ}
currente, & specificam hanc humo-
rum corruptionem redolente, iis ad-
venire solet, non nisi specificis, & huic
morbo accommodatis medicamen-
tis, depellenda.

Cæterum cum hoc symptoma plu-
rium morborum sequax comes sit,
multa distinctione opus est, quæ atro-
phiam scorbutum comitantem, ab a-
liis atrophie speciebus, veteribus me-
dicis cognitis, distinguamus ac dig-
noscamus.

Quod minus difficile erit, si causas
&

*Regula diag-
nostica spec. 21
in atrophia
scorbatica, seu
nota eam dis-
cernentes ab
aliis, quæ vete-
ribus sunt
nota.*

& morbos omnes, à quibus fit, memo-
ria teneamus, & his discussis celeri
mentis cogitatione dispiciamus, num
quæ veteribus cognita causa, à qua se-
qui ratione physica solet, subfit.

Quod si his examinatis, nulla causa
à qua sequi eam veteres dixerunt, sub-
fit, promptior futura inventio causæ
fit, quam hic scrutamur.

Nam si ex nulla veterum causa æ-
ger citra rationem lente contrabescat,
quod in hoc rara esse debeat causa, ne-
mini non notum esse potest. Quæ an
scorbuto adscribenda sit, cum propria
cujusq; morbi & pathognomonica
signa, tum pulsus & urina monstra-
bunt.

Nam quæ à puris in thorace colle-
ctione, sanguinisque sputo neglecto,
suppurataq; pleuritide, nec non acri
ad thoracem defluxione, & serosorum
biliosorumq; humorum in eo putre-
factione, atrophia fit, partim suis sig-
nis, partim ab ægrotantis relatione
cognoscitur.

Sed nec illa virum in medicina ex-
ercitatum latere potest, quæ à visce-
rum ex inflammatione aut erysipela-
te putrefactione & abscessu, aut ven-
tri-

ariculi vitio fit, humorumq; deprava-
torum in eo collectione, quod de his
præter alios, doctissime suo de me-
dendi methodo tractatu Galenus scri-
bat.

Quæ etiam diarias febres, & conti-
nentes malè curatas, sequitur atrophica
& hæctica febris, facilè quoque digno-
scunt, qui memoria tenent, quæ de his
Galenus medendi methodo, de febri-
um differentiis, & crisi bus libris, ac a-
libi prodidit.

Quæ partim, si de morbi principiis
altius medicus inquirat, etiam ab ad-
stantibus, & ægrotante ipso cogno-
scuntur. Ideo quod raro diariæ febres
absq; procatarctica causa fiant, & con-
tinentes vehementiores sint, quam ut
latere aliquem queant.

Sicut nec illa facile ignorari potest,
quam nobilioris partis inflammatio-
ne facit, quam in Epatis inflammatio-
ne color citrinus ostendit & ictericius.
In Lienis inflammatione color subfu-
scus & niger, in testibus acutus dolor.
Quemadmodum de uno nuper nobis
compertum est, ex unius testis inflam-
matione, & latente intra scrotum
morbo post plures menses, ex gravissi-

*Historia atro-
phia ex inflama-
tione testis
consumta*

mis morbi doloribus, in atrophiam & corporis consumptionem incidente, ex qua post annum medicorum errore, morbum ignorantium, extinctus est.

De tabe dorsali primus Hippocrates scripsit, & post ipsum luculenter insignis nostri temporis medicus, & in morborum dignotione excellenter doctus, Doctor Jedocus Lomnius, suo de observationibus medicinalibus libro secundo.

*D. Jedocus
Lomnius.*

A quo facile hujus atrophix notas lector discere potest, ne quid molesta signorum repetitione hic opus sit, quæ multo rectius apud ipsum authorem leguntur loco & libro citato.

Hæ quidem atrophix species cum propriis signis, passim à medicis descriptis, non difficulter dignoscantur, quædam etiam causam manifestam habeant, in sensus & oculos incurrentem, non difficilem distinctionem habent apud eos, qui in veterum recentiorumq; authorum lectione sunt exercitati.

Quarum si nulla sub sit, atq; æger nihilominus citra manifestum morbum veteribus cognitum, lente contabescat,

scat, primum tentandus pulsus est. Qui si parvus, debilis & inæqualis fuerit, hectico dissimilis, habes ni fallor aliquod stratum tibi ad morbi inventionem fundamentum, à quo ad reliquorum superstructionem, nullo negotio deduci possis.

Cui si urina crassa & sublivida, vel citrina & subfusca responderit, propius sic ad morbi cognitionem accedes. Eoq; plus, si cum his anxietates ad præcordia per intervalla infestantes, aut in toto corpore & cruribus efflorescentes maculæ nigræ & citrinæ apparuerint. Quod his notis & signis, etiam lippis & tonsoribus hodie hic morbus cognitus sit.

Accedit hac atrophia laborantibus sæpenumero totum corpus languere, ipsiq; ægrotantibus videri magis languere se, quam certo aliquo morbo detineri, utpote qui de nulla re magis quam corporis languore conquerantur, multo animi dolore, membra tabefacta monstrantes, certæ mortis & sepulturæ præsagium, tacite, quod sciunt, continentia.

Hujus curatio, quia paucis quoque ad hæc usque tempora innotuit, & à

plærisq; medicis ob corporis consumptionem in oculos incurrentem, magno errore & ægrotantium periculo, humectantibus refrigerantibusque attentata fuit, visum propterea nobis fuit, operæ precium nos facturos esse, si, quæ ad curationem hujus symptomaticis pertinent, prolixius persequamur. Quod grave malum hoc sit, & pluribus apud nos, hoc tristi rerum statu, familiare.

*Historia de
duobus atrophis
scorbut. extin-
ctis.*

A quo cum hæc scriberem, intra tri-
duum duo è medio sublati fuere. Et
plures in agro graviter periclitati sunt.
Inter hos fuit unus præclaris ingenii
dotibus ornatus, Dominus Hæctor ab
Oldorsum, nobili genere, & honesta
stirpe prognatus, qui propter excel-
lencia dona ejusq; in Republica illa au-
thoritatem, longiore vita dignissimus
fuerat.

Quod hic propterea admonere, &
hoc loco inferere volui, ut ab his ex-
emplis, quam necessaria hujus rei con-
sideratio sit, eo plus admoneremur, &
ad curationis investigationem excita-
remur.

Quæ ut in reliquis morbis, ita hic
quoque à causæ mali cognitione ac
re-

remotione dependet, quæ diversa in hac atrophiae specie est, ab ea iisve, quæ cognitæ veteribus fuerunt.

Nam in omnibus fere veterum atrophiae speciebus, malum illud miseris mortalibus ab æstuante calore advenire solet, cordi infixo, vel aliunde ad cor accedente.

Quod in hoc nostro nutritionis defectu, potissimum à fumis vaporibusque fit, à putrescente intus, & in prima corporis regione materia melancholica, crassa, & frigida, vel aquea, & cruda, sed hac specifica putrefactione scorbutica infecta, multa copia elevatis. Quorum continua evaporatione & copiosa, (sicut de aliis hujus morbi symptomatibus demonstrari posset) cordis calor modicis incrementis adauctus, assurgit, & præter naturæ modum accenditur, sed adeo lento & gliscente propter causam morbi frigidam calore, ut vix nisi longiore temporis mora, ab affectu percipi possit.

Qui arteriis, & per consequens toti corpori communicatus, sæpe post plures menses & annos, hunc (quem dixi) affectum producit, citius aliquando, aliquando etiam tardius, prout

Atrophia scorbutica generatio.

maiore minoreve copia, administratæ sic affectis causæ adjuvantes, & morbum ejusque causam adaugentes fuerint. Qui de sua ipsius natura, propter morbi causam frigidam & crassam, partim ab aquis crudis, partim ab aëre frigido & crasso, victuq; melancholico & crasso, collectam, tardus est & lentus, nisi ab extrinsecis, ut dixi, adjuvetur.

*Canon therap.
spec. in atroph-
phia scorbuti-
ca primus.*

Ex quo, quæ sit in his curandi ratio facile intelligit, qui saltem aliquem medicinæ usum habet. Quæ in legitima sex rerum non naturalium administratione consistit, adhæc convenienti potionum ac medicaminum usu, præter peculiarem hujus morbi curationem, tenues & crudos, vel crassos frigidosq; humores, de sua natura concoquentium, attenuantium, & incidentium: Quatenus crudorum, humorumq; melancholicorum, non multum dissimilis, si veterum placitis credimus, curatio est.

Quæ quomodo pro corporum, ac morbi causæ diversitate varianda sit, à medendi methodo docemur. Cujus exacta quantitas omnibus accommodata, cum infinita sit, à nullo deter-

terminari satis potest, sed cujusq; judicio considerata relinquatur.

Quæ autem sint, quæ cum peculiari hujus morbi respectu, crassos crudosque humores incidunt, supra diximus. Sed nec hic repetere ea pigabit. Quandoquidem uti suprà ex Rondeletio clarissimo nostri temporis medico admonuimus, mercatores non piget circa pecuniam calculum ter quaterve repetere.

Itaque quæ ad hunc casum probata mihi sint, prædictas facultates possidentia, inter cætera numerantur, carduus benedictus, absinthium romanum, cochlearia, trifolium aquaticum, becabunga, nasturtium utrumque, & si humor adsit melancholicus, majorque venarum obstructio, cuscuta, ceterach, scolopendria, epithymus, buglossa, polypodij quercini radices; vel si plures fuerint humores crudi & aquei, enulæ campænæ radices, hyssopus, betonica, cinnamomum, macis & alia his similia. Quibus felicissimè DEI gratia curatio procedit.

*Medicamenta
antiscorbutica
concoquentia
& attenuantia.*

Sed & victus esse debet calefaciens,

*Canon therap.
spec. in atro-
phia scorbut.
secundus.*

attenuans & incidens. Vitentur angue pejus aquæ patriæ crudæ, falsæ, & sublimes, præterea quæcunque cum his, vel ex his parantur. Sunt & alia huic morbo convenientia remedia, eleganter Doctori Joanni Veiero, suo de scorbutico libello, conscripta, unde depromere quisq; poterit, quæ ad hujus curationem pertinere putabit. Ego usitata & probata mihi pono.

*Canon therap.
spec. in atro-
phia scorbut.
tertius.*

Si tussicula (ut aliquando ex destillantibus ad pectus catarrhis fieri solet) adfuerit, pectus exasperans, prædictis aliquid hordei mundati, & paucas jujubas, ac liquiritiæ modicum addo, vel pillulas bechicas ægrotanti exhibeo, ex tragacantho in vino præstantissimo dissoluto, & cum amylo ac saccharo in massam trochiscorum redacto.

Quartus.

A quibus si non satis mitigata tussis videbitur, & somnum illa interturbat, fuerintq; ad pectus delabentes humores tenues, etiam ad cynoglossæ pillulas, nullo ægrotantis incommodo, devenio.

Quintus.

Si expectorantibus opus fuerit, sintque humores crassi & visciidi, ijs utor, quæ

quæ incidendis educendisq; crassis & viscidis humoribus, authores præscribunt.

Nam cum causa morbi frigida sit, à multum refrigerantibus hic abstinere oportet. Sæpe etiam si morbus sit diuturnus & longus, ad duodecimam hebdomadam & ultra curatio extenditur, juxta illud Joannis Manardi, quo longos morbos longam curationem habere scribit. *Prognost. 33.*

Solet tamen prædictis semper, quod sciam, curatio obtemperare, accitius & melius verno & æstivo tempore, quam hyberno. Quando à frigore ca- vere sibi ægrotantes debent, quod illud huic morbo inimicissimum esse, quotidiano usu experimur, maxime si Boreas spiret. *Canon therap. spec. in atrophia scorbut. sextus.*

Vinum Gallicum rubrum quandam erga hunc morbum proprietatem habere putatur, estq; plus Rhenensi nutritiens. Commendatur & lac caprinum stomacacæ. *Canon therap. spec. in atrophia scorbut. septimus. Ofarus.*

Quod meo judicio efficacius, & huic symptomati conducibilis erit, si huic lacti thymus incoquatur, & post concoctionem croci paululum huius misceatur, cum modico melle vel saccharo

*Lactis capri-
ni in atro-
phia usus.*

charo, ne in ventriculo coaguletur. Erit-
q; adhuc meo iudicio huic malo accom-
modatus, si ijs, quæ ad hunc morbum
proprietaem habent, herbis & simpli-
cibus, aliquandiu ante lactis usum ca-
præ alantur, sicut in œsophagi exulce-
ratione factum legimus à Galeno, & in
calculi præscriptionibus usurpari vide-
mus à modernis, in hædini sanguinis
præparatione.

*Herbæ capris
objiciendæ.*

Quæ autem objici ad hunc usum ca-
pris possunt, hæc sunt: folia acetosæ,
nasturtii hyemalis & aquatici, trifolii
aquatici, becabungæ, cochleariæ, num-
mulariæ, raphani sylvestris, & tenuis
herbæ secalæ, aliorumque folia & flo-
res, usu & experientia huic morbo
probatos.

Atq; hæc de atrophia quam scorbu-
tus facit, dicta nobis hætenus sint.
Qui post nos majore ingenii felicita-
te præditi, manifestiorem hujus, &
omnibus magis obviam, à veterum a-
trophix speciebus, distinctionem no-
bis dederint, ijs gratiam habebimus
omnes.

Si quid etiam mihi incidat, quod
certiore signo & magis omnibus no-
to, ab aliis atrophix speciebus, hanc

no-

nostram discernat, id quoque in medium adducam. Interea jam dicta lector boni consulat, rogo, & quo à me animo dantur, eodem accipiat peto. Quæ etsi ob styli ruditatem atque inelegantiam luce indigna sunt, magisque indocta, quam quæ doctorum manibus contrectentur, aut contrectari mereantur: Attamen quia usum non vulgarem hoc tristi nostro tempore habent, & ante me nemo extitit, qui absolutum quid (quod sciam) de hoc morbo pertractarit, & in publicum dederit, malui inscitiam meam prodendo, indocti nomen, quàm utilia celando, invidi crimen subire. Quod hoc malitiam simpliciter habeat, illud etiam si sit ἀκομψον, tamen cum publico bono conjunctum esse, omnes boni mihi attestabuntur.

Malevolorum judicia perversa, & obtreptiones, ut semper, ita hodie quoque contemno & aspernor, fretus conscientia recti. Sed de his forte plura, quàm oportuit, sæpe diximus. Quare his omisis ad institutum revertemur, ad ea quæ restant, pergentes.

XXXIV. ULCUS ET GANGRÆNA DIGITO- RUM PEDIS.

24. *Ulcus &
gangræna di-
gitorum pedis.*

INter quæ reliquum aliud malignum
Iac sævum hujus morbi accidens est.
Quod etiam doctissimus vir, omnium
artium & disciplinarum, linguarumq;
cognitione excellens, Doctor Peuce-
rus, & clarissimus nostri temporis me-
dicus Doctor Joannes Veierus, obser-
vasse videntur. Quod ego primum vi-
di quale fuerit, paucis hic describam.

*Historia cu-
jusdam Ulc-
re & gangræ-
na digitorum
pedis scorbu-
tica correpti.*

Incipiebat autem circa tali pedisq;
extremum, multis nigris & purpureis
maculis, scorbuto, sicut antea dixi, fa-
miliaribus. Quarum una summo pe-
de non procul à pedis digitis, exulce-
rari crustoso ulcere, cum pustula ci-
trina, cœpit, quæ parum supra macu-
lam illam extabat. Et non ita multo
post in ulcus gangrænosum, siccum,
neque pus neque saniem reddens, de-
generabat, utcunq; turundis ac spleniis
id chirurgus moliterur.

Quotidie serpebat latius. Et quod
ante ulcus membrum erat, pes scilicet
supremus, mortuum cum pedum digi-
tis

tis apparuit, ita ut ægre & vix immis-
sum fertum æger sentiret. Reliquæ
quæ circumstabant, maculæ nigræ,
absq; exulceratione perstiterunt.

A quibus secundum tibiæ longitu-
dinem plures lineæ, septem in univer-
sum vel octo, ni fallor, pellucidæ, & sa-
turatæ rubedinis ascendebant, non se-
cus atque si rubrâ cretâ ductæ fuissent,
tenuem & cholicum sanguinem in-
tra se contineri, vel ab hoc procreatas
se esse, demonstrantes.

Erat enim ægrotantis temperamen-
tum cholericum, & multo sanguine
cholericò redundans. Eratq; facie
ruffus æger, præterea clara & nobili
familia natus, & aliorum perfidia,
meliore fortuna, ut postea intellexi,
dejectus. Quæ res haud dubie tacite
senem cruciavit, maximè in suo con-
jugio, quod in senili ætate primum in-
ierat, vel prolium causa, quas senex
ex conjugè susceperat.

Hic cum primo eum viderem, uri-
nas reddidit instar vini Gallici, rubras
& claras, quibus totâ earum superficie
multa densa & citrina spuma innata-
bat, sed absque ulla siti aut potus desi-
derio. Hæ in morbi progressu magis
livi-

lividæ magisq; subfuscæ, cum eadem spuma, totam urinæ superficiem, ut dixi, tegente, apparuerunt.

Pulsus parvus, debilis & inæqualis vix digitis percipiebatur. Mortuus autem æger duodecima morbi hebdomade propter morbi ignorantiam est. Quod, ut verum fatear, nondum tum cognitus mihi satis hic morbus ejusq; curatio esset.

Cum ego ei adessem, æger pedis demortui præcisionem rogabat. In quo consentire nolui, quod totum corpus præterea male affectû urinæ monstrarent, & quod septuagesimum ætatis annum æger implevisset, eique ætioni omnes ejus cognati adversarentur.

*Historia eorum
qui gangrena
vulgaris correpti
sunt.*

Qui extra hunc morbum partium mortificationem senserunt, ijs subito, & cum frigoris sensu illud advenisse memini, & alios post biduum mortuos fuisse, sicut rustico accidit; alios post horam, quemadmodum Superintendentis quondam Hamburgensis Joachimi Westphali conjugis evenit.

Quod etiam de quodam Antuerpiensi eodem tempore Dominus Licentius

tiatus Carolus Battus, vir integræ fidei nostriq; amantissimus admonuit. Cui adjunctus in hac curatione collega, quasi in ipso mortis articulo fui. Ut propterea hac nota & differentia forte, hæc nostra mortificatio distinguenda ab ea sit, quæ sanguinis virus, vel alias sequitur causas cum membro ægrotantem subito perimens & occidens. Cum hæc nostra paulatim, & post longius intervallum id faciat.

Sed de his aliorum esto iudicium. Nos enim hujus causa id proponendum putavimus, ut diligentius huic considerationi doctiores post nos incumberent: Interea certiores esse notas & diagnostica signa judicamus, quæ pulsus & urina monstrant. A quibus nullo negotio distingui & agnosci ab aliis morbis sceleratè poterit. Ab iis dico, qui vel hæc nostra diligenter loquunt & observant, vel alioqui aliquam hujus morbi cognitionem pleniorē habent.

XXXV. ULCERA VARIARUM CORPORIS PARTIUM.

35. *Ulcera
scorbutica va-
riarum corporis
partium.*

*Historiacivis
Hamburgensis
Ulcere cancroso
corrupti in facie
& vicinis locis.*

HUic simile & affine malum est, quod Hamburgi olim in ejus oppidicive conspexi. Quod cum tumore ingenti ad elephantiasim accedente præter dimidiam faciem, & magnam cervicis partem, nasum & labia utraq; occupabat, aspectu horrendum, adeoque tetrum, ut citra horrorem nemo intueri ægrotantem posset. Siquidem præter dictam faciei inflationem, nasus lividus erat, labia prætumida & nigra, oculi prominentes, præterea sublurido & fusco colore palpebræ tinctæ, & variis pustulis variegatæ.

Hæ serpendo quotidie latius, per totam fere faciem dispergebantur, subjectas carnes erodentes, & circa tempora in ulcus nigrum, tetrum, malignum, ac glomerosum, quod carcinoma Græci vocant, desinentes.

*Marcelli Vir-
gilii locus de
carcinomate,*

Notum enim cum ex aliis authoribus, tum ex Marcello Virgilio est, doctissimo Dioscoridis interprete, carcinomatis generationem, ex melancholico

lico humore, cū referbuit, fieri. Cujus de natura hujus verba eleganter secundo commentatoriorum in Dioscoridem libro descripta, huc adferre placuit, quæ sic ad verbum habent:

Grave hoc malum est, quod nec discuti, nec divelli potest, nec corporis purgatione minui. Sed tam malefici ingenii est, ut mitiora remedia negligens asperioribus irritetur, neque ante exulcerationem alia spes est, quàm ut differatur exulceratio & incrementum.

Ibidem idem quoque author ad remorandum ejus exulcerationem, quædam Dioscoridis medicamina simplicia examinat libro citato, capite 147.

Hoc malum ægrè curationem admittere, etiam clarissimi quidam nostri temporis medici judicarunt. Itaque quæ felici experimento, & nostra qualicunque observatione & inventionone, probata nobis ad hunc usum medicamina sunt, in medium adferre non gravabimur. Ita tamen ut suum cuique maneat liberum de hac re judicium. *Prognost. 35.*

In hoc posteriore, in prædicto ulcere

*Canon therap.
spec. in Ulcere
scorbutico nigro
& crustoso.*

cere nigro & crustoso, felici successu
usi sequenti medicamento sumus, quod
constat ex resina, olibano, & oleo ro-
faceo in unguenti formam redactis sple-
niis quibus illinebatur, in vino Rhena-
no prius intinctis.

Quo brevi ad suppurationem sepa-
rationemq; & puris generationem, ul-
cus hoc productum fuisse vidi. Sicut
in altera. decem annorum puella, se-
quens profuisse, experti sumus, quod
domi parentes ipsi nostro jussu ex o-
leo rosaceo, ovi vitello, tritici farina,
olibano, & paucissimo melle parabant,
spleniis illitum, quod crustoso & ni-
gro ulceri imponebant.

A quo intra dies plus minus quinque;
vel sex nigrum hoc à sana carne sepa-
ratum excidit; Reliquam ulceris cu-
rationem sarcoticis perfecimus. Hanc
curandi hæc ulcera rationem, etiam
Hippocrati placuisse, tertio de fractu-
ris libro legimus. Ubi aperte ostendit,
nigrefactas partes mollibus medica-
mentis, non acribus ad suppurationem
& separationem perducere de-
bere.

Quapropter nigrefactæ tam carni,
quam cuti aut nervo, album ceratum

Hip-

Hippocrates illinit. Quod, ut ipse dicit, curationem ambustis similem talia postulent & petant, sicut latius ac melius loco citato apud ipsum lector cognoscet.

Eandem quoq; curandi hæc ulcerationem Galeno placuisse 14. medendi methodo legimus, ubi medicamina mordacitatis expertia hisce affectionibus nigris & crustosis commendat, ideoq; ex metallis ea lotis & ustis parari jubet, quod ab acribus hanc exulcerationem irritari, ipse quoque de sua experientia comprobaverit. Quemadmodum latius hæc legi apud ipsum authorem possunt.

Qui in facie hoc malo laborabat, ille neq; delectum ciborum, neque ullum in ijs ordinem servaverat, sed promiscue uti sese obtulerant & sine discrimine, duros & infumatos ingererat. Hujus urinæ dum adhuc obambularet, visæ sunt nigræ, crassæ, & ex pallido sublivescences, ac turbidæ semper.

Historia laborantis ulcere scorbutico in facie.

Pulsus decumbenti durus erat, præterea ferratilis & inæqualis, & propter febris admixtionem justo alior.

Morbus vero, quantum ad sensus, mitis. Sitis nulla & perquam exigua putrefactionis notis, quas urina monstrabat, minimè respondens, non felici huius morbi, sicut prius ostendi, argumento.

36. Febres pestilentiales & earum tumores.

XXXVI. FEBRES PE- STILENTIALES ET EA- RUNDEM TUMO- RES.

Est hoc malum apud Embdanos frequens, quod imperitum chirurgorum ac practantium ibi, vel medicinam facientium vulgus, pestis indicium esse dum arbitratur, theriacæ aliorumq; calefacientium medicaminum (pro conservatione à peste magis, quàm curatione excogitatorum) usu & exhibitione, curationem magno ægrotantium incommodo, ac certo vitæ periculo molitur, febrem his adaugendo, & super sanguinem adurendo.

Regula diagn-
nost. spec. 22. in
febb. pestilentia-
libus & earum
tumoribus.

Dum à peste hunc morbum, præter symptomata mitiora, quibus quandoque se prodit, facile pulsus, & aliquando urina discernat.

Quæ

Quæ in aliquibus varia occurrit, modo tenuis, modo crassa, & conturbata, & multo quasi sabulo in fundum subsidens, vario & dispari sedimento conspicua: cum qua pulsus parvus & debilis apparet, contrarius putrefactionis indiciis sæpe, quæ urina demonstrat.

Et si etiam in aliquibus durus & feratilis subinde ille sentiatur, instar illius, qui in pleuritide, & membranarum inflammationibus percipitur. A quo nos nuper in duabus puellis, primam nostræ ad pulsum applicatione, statim hunc morbum cognovimus, cum peste eas laborare, persuasum omnibus domesticis esset.

Historiæ laborantium febribus pestilentialibus cum tumoribus, &c.

Cœperunt autem eodem tempore in iisdem ædibus ambæ simul ægrota-re, ancilla cum duobus in inguine tumoribus, & filia præter alterius inguinis tumorem, nigra & crustosa macula ac ulcere, mediam fere tibiæ regionem occupatente.

Unde de peste opinio adeo fortis parentum animis impressa fuit. ut nullo nostro sermone evelli ipsis ea in initio potuerit. Quam tamen post tri-duum procedens juxta nostrum pro-

gnosticum curatio remove cœpit, & post septimum diem planè eradicare.

Fuit hæc puella filia cujusdam nostratis Frisii occidui Regneri Cornelii, olim Consulis Bolsuerdiensis, nunc vero Embdæ, propter belli turbas exulantis, cujus & ancilla erat. Quem nominare hic volui, quo magis fidem omnibus facerem, nihil præter comperta, usuq; probata, hic me affingere, qui sicut antea dixi, nihil in hoc libello asserere constitui, non multiplici nostra experientia comprobatum.

Similibus tumoribus duris, renitentibus, dolorisq; plenis, cum nausea multa, multisq; ex intervallo recurrentibus anxietatibus, & febre ac siti, urinisq; citrinis in initio & tenuibus, correptæ aliæ duæ scemina Embdanæ fuerunt. Quarum una civis primarii filia, altera Groningana scemina erat, aromatarii conjunx, quæ Embdæ ad Delphit plateam, ut vocant habitabat.

Qui præter has, jam dictis tumoribus correpti ibidem fuere, in horum plerisq; præter dicta symptomata, à peste hanc febrem distinguebant rara quæ-

quædam signa, scorbuto morbo magis, quam pesti convenientia.

Cujusmodi exempli gratia, nervorum resolutio imprimis est, in quam etiam cum hac febre, atque cum his tumoribus incidisse nonnullos memini. Siquidem adolescentem novi, cum colli ab hoc morbo tumore, ilico quoque linguæ usum amisisse, majore hujus morbi (utpote qui nervis infestissimus est) quam pestis indicio.

*Rara quædam
accidentia
scorbuto magis
quam pesti con-
venientia.*

Sed & anxietatibus, quas ad præcordia infestare diximus, plerique omnes, quos hac affectione laborare novi, infestati fuere. A quibus nonnulli, etiam præter spem & expectationem ilico suffocati, periere.

Atque hoc symptoma etsi pestilentialibus febribus quoque familiare esse consuevit, est tamen in ijs magis continuum, minusque interruptum, propter diversam morbi sedem, quæ in peste præcipue cor esse putatur, ut in scorbuto inferior venter & lien. Unde varii ad cor & diaphragma vapores exhalant, prædictas anxietates causantes. Atque ab hac causa anxietates hæ, sicut & vomitus cum hac febre incidentes, magis inter-

*Anxietas pe-
stilens ut à scor-
butica dister-
natur.*

ruptæ sunt, quam in peste eas esse videmus.

Quibus majore hujus morbi certitudine accedit, quod minus grassantes, & paucioribus communes hæ febres, quam vere pestilenciales esse solent, unde *πορὰδες* dicuntur. Hæ quod magis publicæ sunt, magisq; in populum grassantur, epidemiæ vocantur.

Cum hæ nostræ cum scorbuto conjunctæ, vel ab ejus (si mavis) putrefactione specifica excitatæ, sæpe ad unam atque alteram familiam tantum constringantur, in eaq; non omnes, sed propter vitæ victusq; errorem, ad hunc morbum magis dispositos, apprehendat. Quod diligenter considerari hic necesse est, ab eo, qui inter has febres rectè sit distincturus.

Cur febres pestilenciales scorbuticæ cum vere pestilentibus conveniant.

Alioqui pluribus, quibus inter se collidunt, signis, facile practificantium oculos & mentem obfuscant. Quandoquidem non solum pædictis tumoribus anxietatibusq; sed & vomendi conatu, & pari, ob materiæ crassitatem, aut obstructionum venarum magnitudinem, urinarum laudabilitate, sicut & siti, nec non molesta linguæ

labiorumq; ariditate, ut & morbi propagatione, & nigris crustosisq; ulceribus, sibi invicem assimilantur; Ut propterea acuto & sagaci medico opus sit qui inter has febres rite sit distincturus. Neq; mirari de his hanc symptomatum similitudinem oportet, cum una utrobiq; utriusq; causa materialis putetur.

Nam si clarissimo nostri temporis medico Guilielmo Rondeletio credimus, videbitur ex crasso & melancholico sanguine putrefacto, pestis generatio esse. Qui sanguinem nostrum incendere, conturbare, inficere, & ad putredinem venenositatemq; disponere creditur, sicut caniculæ tempore vinum ebullire & conturbare facit fex ad superiora excitata.

Ut non abs re humorum pessimus dicta Galeno melancholia, libro de febrium differentiis & alibi sit. Siquidem fex & sordicies sanguinis, à principiis vitæ quam longissime elongata est, liberalitati inimica, & senio ac mori cognata. Nullus etiam humor plures ac magis varias affectiones inducere solet atque melancholia, cum propter locorum, quæ occupat & in-

*Pestis materia
seu generatio ex
Rondeletii sententia.*

*Melancholia
est humor pessimus
Galeno.*

sedit, diversitatem, tum propter varias ejus qualitates, & generationis modum. Qui facit ut alia naturalis, alia non naturalis sit, prout per adustionem ab hoc vel illo humore generatur.

Illa igitur cum tam pestis, ex Guiljelmi Rondeletij sententia, quam scorbuti recentiorum authoritate, materialis utriusque febris causa sit & origo, solâ putrefactionis specie tantum differentium, quid mirum, si pluribus indifferentibusq; signis & symptomatibus, inter se colludant concertentque.

*Curatio pestis
& scorbuti
diversa: sicut
& morbi
Gallici & le-
præ.*

Est tamen distinctio necessaria propter curationem, quæ propter specificam utriusque & differentem putrefactionem, alia in peste, alia in scorbuto est. Quemadmodum diversæ curationi subjacet putrefactio morbi Gallici, diversæ & alii, ea quæ Elephantiasis & lepræ est.

Et utcumque pluribus signis cum sceletyrbe Gallicus morbus colludit, doloribus scilicet juncturarum sub noctem ingravescentibus, tumoribus duris, nervorumque contractione, aliam tamen curationem hæc in sceletyr-

letyrbe, aliam in Gallico morbo requirunt, quatenus non una utrobique causa, aut putrefactionis species est.

Quæ ut in Gallico morbo ligni decocto, ita in scorbuto cochleariæ, & similibus, hunc morbum à proprietate curantium, exhibitione tollitur & removetur.

Atque ad hunc quoque modum res in hisce febribus habet, utcunque signorum similitudine eandem morbi speciem mentiri ac repræsentare videantur.

Quomodo autem signorum similitudine se invicem repræsentent, paucis exemplis ostendemus, quo dilucidior res fiat, & magis omnium oculis exponatur.

Nuper cum hisce symptomatibus ad pestem colludentibus, correpti duo viri, & una puerpera ab hoc morbo fuerunt. Quorum alter Groninganus nobilis & classium præfectus, alter Antuerpianus fuit, puerpera indigena & Embdæ (quo puto) nata.

Historia febribus pestilentialibus scorbuticis laborantium.

Inceperunt autem cum citrinis & tenuibus urinis multo æstu, & æstuan-
te intus calore, omnes hi febricitare, cum multa siti, & majore labio-
rum

rum linguæq; ariditate, adeo ut classium præfecto, si vel minimum à potu sibi temperaret, maximis, & ad minimi digiti latitudinem, fissuris, labia linguæq; diffecarentur & dissilirent, quæ rursum (quod admiratione dignum) à largioris potus assumptione, illico coaluerunt.

Interea exterioribus frigebant, & anxietatibus omnes laborabant gravissimis, ita ut ab his sæpè supra dimidiam horam puerpera, gravissimis animi deliquiis correpta, quasi semimortua jaceret. Quod etiam in morbi initio, post levissimum motum Antuerpiano advenit.

Attamen utrique in his deliquiis pulsus arteriarum fortior videbatur, quam alioqui extra deliquia in morbo ipso. Præfecto classium ad cætera signa quoque delirium accedebat. Eratque cum his signis pulsus omnibus parvus & inæqualis. Quæ omnia malignæ & pestilentialis febris signa esse, quis ignorat?

*Alia historia
febris pestilentialis
scorbutica.*

Qualia & illa quoq; fuerunt, quæ cum hac febre concionatori Embdano, viro perhumano & docto adven-
runt, ad pestis symptomata, prædictis
pro-

proprius adhuc accedentia. Qui etiam febricitare cum gravissimis ventris torminibus cœpit, & iisdem ad præcordia anxietatibus, nec non æstuante interiorum calore, exteriorum frigore, præterea & inexplebili siti, ac infesta linguæ labiorumq; ariditate: Sudabat multum, sed è corpore exiens sudor, adeo fœtebat, ut intolerabilis odor ad lectum adstantibus esset.

Circa faciem & pectus variæ subinde efflorescebant maculæ purpureæ & subnigræ, vel potius sublividæ, eadem facilitate, qua erumpebant, evanescentes.

Quæ omnio pessimo indicio delirium adaugebat, per intervalla tamen magis, quàm continuo eum infestans. Hanc febrem pluribus signis cum pestilentialibus & malignis febribus communicare, nemo medicorum ignorat.

A quibus hanc tamen post quintum, ni fallor, diem, febris intermissio distinguebat. Quam salutarem in Aphorismorum libris Hippocrates dixit, *Lib. 4. aph. 43.* quocunq; modo fiat.

Curati autem omnes DEI gratia ijs medicamentis sunt, quæ, cum scorbutu

*Canon therap.
spec. in feb. pesti-
lentialib. scor-
but. primus &
secundus.*

ti morbi eradicatione, obstructions tollunt, humoresque crassos & melancholicos concoquunt & incidunt.

De quibus quia dictum nobis alio loco est, nihil necesse est, eadem hic cum legentis tædio repetere.

Cum similibus symptomatibus ab his febribus correptæ, Groningana, & Embdani filia, fuerunt, quibus post quintum vel sextum, si recte memini diem, ad femora tumores duri & rubri, doloris pleni, eruperunt. Quæ etiam his ipsis medicamentis curatæ intus sunt, tumoribus localibus discussis sublatisque. Qui in Embdani filia, chirurgi opera sublatis curatiq; post plures hebdomadas.

*Experimentum
ad tumores pe-
stilentis scorbuticos.*

In Groningana aromatarii conjuge, Embdæ ad Delpht plateam habitante, sequenti experimento, hilce tumoribus accommodatissimo, quod in duobus ac tribus diebus, omnem hunc tumorem & duritiem discutit ac tollit.

Capit autem absinthij communis pulveris quantitatem sufficientem, quæ ovis recentibus eodem die exclusis, cum albumine, vitello, & ovi testis conquassatis, & minutissime con-

contusis, ad pultis consistentiam permiscetur, frigidaque tumoribus præfenti ut dixi remedio, applicatur, cuius affectum in his & similibus, utcumque vile & facile parabile medicamentum videatur, admireris.

Illud autem in hac curatione animadversione dignum est, scilicet *Prægnost. 36.* minuta curationis indicio fieri, quoties cum medicaminum ad hunc morbum pertinentium exhibitione, urinæ tenues cum morbi manent incremento. Vel cum crassis & subsidentibus, nihil morbus remittit.

Ideoq; fortiora, & fortius incidentia ac attenuantia, quæ hunc morbum concernant, medicamenta desiderari, quibus morbi radix præcidatur. *Canon therap. spec. in febb. pestil. scorbut. tertius.*

XXXVII. MORTIFICATIO CUM ET SINE ULCERE CRUSTOSO ET NIGRO.

ATque hæc dicta nobis quadam orationis consequentia de his febribus sunt. Quæ proposita à nobis propterea sunt, ut aliis nobis doctioribus cogitandi diligentius occa-

37. Mortificatio cum et sine ulcere crustoso & nigro.

occasionem præberemus. Nunc quæ de horum curatione relicta nobis sunt paucis persequemur.

*Canon therap.
spec. in mortifi-
catione primus.
Mortificatio
paulatim facta.*

Inter quæ primum mortificatio est, quam cum, & sine crustoso ac nigro ulcere incidere, & cum eo advenisse præclarissimi Ducis Ottonis Domini mei clementissimi hospitii Magistro, antea diximus, quoq; feliciter tolli & curari postea in similibus fimo vaccino vidimus, si quotidie bis renovatū, affectæ parti accommodetur.

*Canon therap.
spec. in mortifi-
catione secundus.*

Fit quoq; paulatim aliquando hæc mortificatio; advenitque vel uni vel pluribus corporis partibus, sicut in utroque crure civi Embdano accidit, & in brachio altero tributarii Embdensis ancillæ. Quæ eidem quoq; curationi subjacet & paret, cui prior, nisi quod utrobique ob morbi, & causæ morbi frigiditatem, absinthij pulveris, nec non piperis, ac seminis sinapis partem, rectè adhiberi posse putem.

XXXVIII. E R Y S I P E- L A S.

§ 8. *Erysipelas.*

FIt præterea hujus morbi indicio (sicut nostra qualicunq; observa-
tio-

tionem animadversum sæpenumero fuit, & multiplici nostra experientia comprobatum) phlegmones seu inflammationis specie efflorescentia rubea, quamlibet corporis partem prout hanc vel illam magis imbecillam sic affecti habent, apprehendens, Quam quod rubeo roseoque colore cutem plerumque suffundat, vulgus nostras communi & vernacula nostra lingua, *de Roofs* appellat.

Estque hoc malum quoque nostris ^{*Causa erysipelatis.*} hisce regionibus frigidis, propter pravas aquas corruptam qualitatem sanguini nostro inducentes, pluribus, quam velim & optem, familiare. Quod nonnullos aliquando ferè perpetuo, nonnullos post singulas hebdomadas & menses, aliquando post trimestria spacia plus minusve infestat, pro causæ, & concurrentium atque adjuvantium extrinsecus causarum magnitudine, ac maiore minoreve congerie.

Cæterum hanc affectionem ab hac ^{*Regula diagnostica specialis*} sanguinis putrefactione, quæ scorbuto ^{*23. in erysipela scorbutico.*} competit, procedere, præter pullum

& urinam morbi mores, humorumque

O

qui

qui eâ corripuntur, temperamentum & constitutio denotat & demonstrat.

Quandoquidem non semper plethoricis & sanguineis (ut veterum phlegmone) aut alioqui sanguinis copia laborantibus, hæc efflorescentia contingit, sed etiam ab hac constitutione quam longissimè remotis. Certissimo argumento, magis à depravata sanguinis qualitate, quàm ejusdem copia & plethora, malum hoc provenire & originem suam ducere.

Quæ an cum specifica hujus morbi putrefactione consentiat, ejusdemque cum ea qualitatis sit, porro ab urina & pulsu, ac morbi moribus discimus: Sint ne talia hæc, cujusmodi ea huic morbo competere, pluribus antea demonstravimus. Nam si pulsus occurrat parvus & inæqualis: & dispari substantia, vel varia in initio urina, seu crassa & conturbata, aut tenuis, & quibusdam rotundis corporibus cineritijs aut rubris, in fundum subsidentibus, vel cum his turbida etiam urina & conturbata, habes ex his evidentiâ hujus morbi signa, quæ de hoc morbo te confirmare possunt.

Sed & facilis ejus in quibusdam, præ-

præsertim junioribus de loco ad locum commigratio, certo tibi persuadere debet ac potest, cum hoc morbo malum hoc communicare, utpote quod magis ab halitibus vaporibusq; ab hoc morbo & putrefactione resolutis, quam simplici humorum ad partem affluxu hæc fieri, certa ratione convincat: quibus, sicut pluribus ostendi & probari posset, hæc materia ut plurimum abundat, eaque ratio est facilis erysipelatis hujus permutationis, aliorumque qui subito ab hac putrefactione eveniunt affectuum. Atque ab hac facili & momentanea, de loco ad locum hujus affectionis commigratione, nos primum cogitare ausi fuimus, ab hoc quoque morbo hoc symptoma provenire. Quod postea curatio confirmat, quam millies ferè hic, si ita dicere licet, sumus experti.

Quam in hac specie, ut reliquis hujus morbi differentiis, plurimum proportionem aquarum, victus, & aeris, in quo sic affecti vivunt, variari comperimus.

In quibusdam (ut hoc obiter addam) etiam plurimum dierum ante ejus

eruptionem, horrores, etiam à veterum phlegmone, hanc efflorescentiam distinguunt, Et si sufficiant ad denotandam mali causam, quæ ab urina & pulsu indicia sumuntur.

*Canon therap.
spec. in erysipelate scorbutico primus*

Quibus si reliqua consentiant, pluribus ad instituendam rectè curationem confirmaberis. Quæ hic eadem est, quæ in reliquis huius morbi speciebus, habita humorum concurrentium, temperamenti, aeris, victusque præcedentis ratione. De quibus alio loco & ab aliis docemur.

Nos ne eorundem repetitione, prolixitatem affectasse videamur, non necessaria, quantum possumus, ressecamus. Quare ad alia huius morbi accidentia transibimus, delirium scilicet & memoriæ læsionem. De quibus parcius dicemus, quod rariora sint atque nullum admodum apodicticum huius morbi signum contineant.

*39. Delirium
scorbuticum
& læsio memoriæ.*

XXXIX. DELIRIUM ET LÆSIO MEMORIÆ.

*Canon therap.
spec. in scorbut.
delirio & læsione memoriæ.*

Q Uod, ut fieri in aliis morbis solet, sic in scorbutica putrefactione,

ne, ex materiæ ad caput elevatione, ista consequantur: nullam (quemadmodum & in aliis affectionibus symptomaticis) peculiarem sui curationem postulant, præter eam, quæ morbi radicem præcidit & evellit.

Quæ quia diversa ab ijs morbis hic est, qui veteribus cogniti fuerunt, exacta ejus cognitione opus est, quo ab aliis & veteribus cognitis morbis & causis delirium sua natura efficientibus, ea distinguatur, quæ hoc nostrum delirium, ac mentis memoriæq; læsionem operatur.

Quandoquidem ad curationem imprimis hæc distinctio conducit: Quatenus rei ipsius cognitio, imprimis vero morbi ejusq; causæ noticia, primum in inquisitione sibi vindicat gradum, à quo ad finis consecutionem, mentisque nostræ intentionem, tutâ porrò ducimur viâ, illud efficiens, ut propria & debita cuiq; morbo curatio, radicem morbi præcidens, adhibeatur.

Quæ in hac mentis nostræ alienatione, primum ex facili ac inopinata ejusdem commotione, ejusque præter rationem intermissione cognoscitur.

*Regula diagn.
nost. spec. 24. in
scorbut. delirio
& læsione me-
moriæ.*

Deinde ex miti & lento morbo, nullo sæpe æstu aut siti molestiore, vel inquieta jactatione infestante, & sua qualitate magis venenata, quam caloris copia, spiritus cerebri turbante: cum veterum deliria non nisi acutos & peracutos sequi morbos consueverint.

Atque hoc solo indicio, ne quid de reliquis dicam, facile à veterum symptomatico delirio hoc nostrum distinguitur. Nam quod ex propria capitis affectione excitatur delirium, ut pathognomonicis morbi signis, & morbi vehementia, sic affectionis assiduitate dignoscitur, ut propterea ea res nulla nostra admonitione indigeat.

Magnum quoq; ad monstrandam utriusq; differentiam, vim & potestatem urina habet. Quæ in hoc delirio sæpe crassa & rubra absque multa siti visitur.

Cui & pulsus subscribit aut durus & ferratilis, similis illius, qui in pleuritide occurrit, absque tamen ulla membranarum inflammatione, aut parvus & inæqualis, nihil ferè differens ab eo, qui in orificii ventriculi obstructionibus

bus sentitur, absque ulla quoq; huius affectione.

Sed & victus ratio crassa & nautica, & in locis planis ac palustribus habitatio, multum etiam momenti ad confirmandum de his iudicium habent, si cum prædictis concurrant & conferantur.

Atqui quæ circa delitium hoc observanda sunt, eadem quoq; circa memoriæ læsionem considerantur.

Nam & hæc interpolata magis, quam continua, in hoc morbo esse solet, per intervalla, sicut delirium, ex nulla manifesta causa, & quasi præter rationem, sic affectum, infestans. In his ut plurimum variæ urinæ conspiciuntur tam in colore, quam earundem substantia, & subsidentiis.

XL. CARUS ET SOPOR PROFUNDUS.

Diversos quoque vidi alto sopore ac caro ab hoc morbo correptos fuisse, ex vaporum & flatuum (quibus aliquando mirum in modum hæc materia abundat) conferto in cerebrum impetu.

50. Carus & sopor profundus.

Caric causa.

*Historia caro
scorbutico labo-
rantium.*

A quo ante annum, cum tertianæ febris accessione, & recurrentibus paroxysmis, singulis vicibus opprimi adolescentem, cum hujus morbi significatione vidi, adeo alto somno, ut nullis nostris clamoribus vellicationibusque excitari aliquando potuerit.

Et post ipsum, virum sexagenarium, olim Zelandiæ præfectum, qui ante nostrum ad ipsum adventum quatuor integros dies ab hoc morbo dormiverat, unde nullis domesticorum clamoribus expergeri, & è somno excitari quivit. A quo, ut prior, nostra opera & curatione, DEI gratia, ad sanitatem sic revocatus ijs medicamentis est, quæ hunc morbum curare postea ostendam.

Duos novi post diuturnum cum hoc morbo conflictum, & varia hujus, quæ passi fuerunt, symptomata, somno aliquandiu plus satis indulgisse, propter corporis, ut fieri solet, pigritiem, & spontaneam, qua laborabant, lassitudinem, ad motum minus expeditos.

A quo, diuturniore irrigatione cerebri lethargo oppressus alter fuit postridie, quàm ad eum veni. Al-

Alter quoque diu ad ingressum impotens & tardus, insolitam, ab anno uno atque altero solitudinem amplexus fuerat, otio & somno plus justo indulgens, quantumvis juvenis & robustus. Hic etiam cum rubris, crassis & turbidis urinis ægrotare cœpit, sed quod à medico ejus viro doctissimo intellexi, absque infesta siti, aut momentaneo & molesto caloris sensu.

Cui nulla methodica curatio profuit, etsi medicum haberet doctissimum, & in veteri medicina exercitissimum: Utpote quæ internam hanc putrefactionem, ut specificam, ita peculiari curationi subjectam, non coerceret.

Quo circa exhalantes ab hac vapores, tandem hunc quoque profundo somno, præter medici spem & expectationem substulerunt. In quo post mortem, sed post festum, ut proverbium habet, sceletyrben morbum, variæ maculæ nigrae & purpureæ, toto corpore erumpentes monstrarunt. Quem ante morbum & mortem, crurum languor, & præter hunc urinæ, absque siti, & vehementiore calore rubescences, non fallaci indicio indicabant: ut
in

in priore recurrens subinde paraly-
sis.

*Vulgi opinio
sommum existi-
mantis esse cau-
sam scorbuti.*

Usitatum nostris hominibus est, ut scorbuto eos laborare dicant, qui somno præter consuetudinem indulgent. Quod etiam vulgi observatio-
ne, sed consequentia inversa, somnus huic morbo familiaris esse credatur, existimantis eum hujus morbi non effectum sed efficientem causam esse, cum potius ejus in quibusdam sequax comes sit, ut lassitudo febris ac intemperiei est. Plures Embdæ (ubi vehementior hic morbus propter aerem humidum & crassum, aquasq; salvas & putridas est) ab hoc caro extinctos scio.

*Embda plures
pereunt.*

*Carus ut pluri-
mum cum febre
conjunctus.*

Concurrit autem plærunque cum lenta, nonnunquam etiam cum intermittente febre hoc malum, quod iisdem quoque, quibus febris ipsa, signis ab hoc morbo esse dignoscitur, cujus hic somnus, ut antea dixi, symptoma & accidens est. Curatur etiam iisdem, quibus febris medicamentis, juxta illud, quo, sublata causa, tolli quoq; affectum, dicitur.

*Canon therap.
spec. in caro scorl.*

Nostra tamen qualicunque experientia constat, inter cætera, quæ huic mor-

morbo præscribi possunt, primum locum sibi nasturtium aquaticum, ejusque succum vendicare. Quod tamen de eo hic intelligi velim, quod in claris & limpidis provenit aquis, minimè vero quod in putridis & lutosus nascitur stagnis.

Nam illud præter quam quod inefficax, etiam ingrato sapore est.

Atque hac in re rursum subscribere Guilielmo Rondeletio, doctissimo nostri temporis medico cogor, contra Fernelium acutissimi alioqui judicii & maximi ingenij virum, alto sopori nasturtium hoc facere defendenti.

Siquidem præsentis remedio ad hunc soporem illud conferre, de nostra qualicunque experientia attestari possumus.

Cujus, ad hunc carum, adeo efficacem facultatem experti sumus, adeoque evidentem, ut DEI manu quasi adjuvari viderentur, qui illud assumerent, uno aut altero tantum excepto, in quibus nimios progressus hic morbus fecerat.

Nam cum ante annum, unico, divini verbi ministri apud Embdanos filiolo, quem ab hoc caro nulli clamores
aut

*Historia pueri
subito à caro
usu succi na-
sturtij aqualici
liberati.*

aut vellicationes excitabant, refracto per vim ore, succum hunc infundere-
mus, ilico in ipso temporis articulo
ad se redire, & nos apertis oculis aspi-
cere cœpit.

Idem etiam in prædicto præfecto &
adolescente, de quibus paulo antè di-
ximus, experti sumus. Sed de hac re,
quia etiam prius mentio incidit, nihil
opus prolixiore ejus enarratione est.
Ideoq; ad alia hujus morbi accidentia
transibimus, quæ ab hoc morbo varia,
propter variam corporum dispositio-
nem, fiunt.

*41. Sputi deflu-
xio continua.*

XLI. SPUTI DE- FLUXIO CONTI- NUA.

Ic molesta & longa humidi sputive
Sapore rejectione ab hoc morbo,
(sicut etiam fieri aliquando in Galli-
co morbo solet, ut etiam hoc signo &
symptomate cum venerea lue quan-
doque colludat) quosdam divexari
novi, qua totum corpus paulatim ex-
tenuaretur.

*Sputi continui
generatio.*

Quam putridi & circa viscera col-
lecti humores excitabant, spirituum

vaporumque, quibus abundabant, vi & potestate sursum ad os elevati, & continua hac sputatione rejecti.

Cui rei perpetuum quasi fomentum alimenta assumpta præstabant, maxima sui parte in eandem substantiam conversa, & continuo veluti æstu, per membranam intus os, œsophagum ventriculumq; vestientem, spirituum vi & evaporatione, eversa atque educta.

In una quadam, alioqui forma præstanti scæmina, retenti divitius menses, huic malo occasionem dederant. Et in altera tristitia & adversa multa, quæ perpeffa fuerat. Ut inordinata victus ratio, & crassorum ciborum ingestio, in hunc casum perduxerat, nobilitatis stemmate clarum, castri præfectum.

Cui menses substiterant, medico usque doctissimo est, sed circa hunc morbum minus exercitato. Cujus rei causa, nihil commodi ex methodica ejus curatione percepit. Quo factum, ut relicto eo ad Empiricum & impostorem confugeret, qui acribus medicamentis rem eo brevi perduxit, ut rupta vena, post aliquot sanguinis reje-

*Historia labo-
rantis sputa-
tione continua.*

ctio-

etiones, subito & præter suam, haud dubiè, opinionem, sanguinis copiâ intra fauces hærente, suffocaretur.

Ad quam, post sanguinis eruptionem, vocati etiam nos fuimus. Qui tunc morbum hunc mali causam, cum ex urinis & crurum affectione, tum à pulsu, & cæteris, quæ præcesserant, symptomatibus, cognovimus.

*Canon therap.
spec. in sputati-
one continua.
Prognost. 37.*

Qui nostra curatione usi fuerunt, mixta curatione, partim feбри & tenuibus catarrhis, partim scorbuto competente, feliciter, paucos intra dies sunt restituti. Præter unam, in qua diuturnior, propter alia accidentia, curatio fuit.

*Cur in sputati-
one scorbutica
etiam catarrho-
rum habenda
ratio.*

In hac curatione haberi ratio fluxus debet, ne ab acribus & calidis irritetur, & nimia evaporatione vaporum fumorumq; & in cerebrum delatione, ac eorundem ibidem concretionem, atque ad pectus postea defluxione, gravior, sicut nunc dixi, morbus excitetur,

*Regula diagn-
stica spec. 25. in
sputatione conti-
nua.*

Qui hac sputi rejectione, & ab ore defluxione laborarunt, eos à scorbutica putrefactione idipsum pati urinæ crassæ & subfusæ, aut crassæ & rubræ ostenderunt, quas absque siti, aut

molesto caloris sensu, sic affecti reddiderunt. Quibus, hujus morbi significatione, pulsus subscribit parvus, debilis & inæqualis. Cujusmodi sentiri in omnibus ventriculi affectionibus frigidis & crudis solet, absq; eo quod quicquam de hoc sic affecti conquerrantur.

Sed & morbi species plurimum quoque ad monstrandum morbum momenti habet. Quo nullo manifesto morbo veteribus cognito tales infestati, languere magis, quàm ægrotare videantur. Et quod absque fiti & calore ij vivant, utcunque rubræ urinae, aut crassæ & subfuscae, vel citrinæ & subfuscae conspiciantur.

Adhuc præter jam dicta, aliud malum nobis occurrit, his regionibus quoque non infrequens, quod cum hoc morbo scorbuto communicare, præter peculiaria hujus morbi signa, aliquoties etiam nobis curatio monstravit. Quam pro hoc morbo instituere, post longam deliberationem ausus fui, primum quod ad nullum veterum morbum, affectionem hanc accedere viderem, præterea quod post neglectam diutius hujus curationem, qui-

quibusdam maculis scorbuticis tandem se prodere hoc malum in quibusdam observavi.

A quibus de specifica hujus putrefactione magis confirmatus, majore confidentia postmodum curationem hujus sum aggressus.

Quale autem hoc malum sit, paucis describam. Nam in initio adeo lentum est & parvum, ut nihil à sanis, aut quam minimum differre ita affectos, etiam acutis videri medicis possit. Quod tamen neglectum, diuturniore temporis mora ita invalescit, ut nonnullos plures sæpe hebdomadas & menses lecto affigat. Et nonnunquam (sicut fieri in diuturnis morbis solet) in graviora incommoda nonnullos conjiciat. nec non præsens vitæ discrimen.

Quemadmodum quibusdam exemplis id, si necesse esset, hic probare possim, nisi inter observationes etiam quædam de his dicturi essemus, & ad eū locum hæc reservaremus. Nunc quāvis possum brevissime rem hic depingam, & ob oculos ponam, quo magis omnibus conspicua fiat.

XLII. LANGUOR

SINE CAUSA.

Contingit autem sic affectos in i- ^{42. *Langnor*}
 nitio ut plurimum languere, ci- ^{*se ac cusu.*}
 tra evidentis morbi significationem,
 nulla tamen firi, quam levissima oris sic-
 citate subindè infestatos. De qua ra-
 rò, nisi interrogati, conquerantur. Et,
 si aliquando molestior ea nonnullis
 fuerit, semper tamen modica humidi
 rejectione ea placatur, cujus largiore
 assumptione ut plurimum offendun-
 tur. Et si non ita multò post rursus
 æquè labia linguaq; ijs exiccantur.

Pulsus his varius est, semper autem
 inæqualis, etiam in uno sæpe ictu. U-
 rinæ ut plurimum albæ, crassæ & con-
 turbatæ, pingui sua superficie matulæ
 parietibus adhærentes. In quibus quæ
 subsidunt, urinam non claram, sed
 turbidam relinquunt.

Quòd si diutius moram morbus ^{*Prognost. 38.*}
 traxerit, tandem hos obtusus crurum
 dolor vel languor, aut facilis appre-
 hendit lipothymia, maximè quoties
 sese erigere in rectum statum, aut de
 lecto surgere volunt.

*Prognost. 39.**Canon the-
cap. spec. in
languore
scorbutico
primus.**Secundus.**Prognost. 40.*

Eo ulterius perseverante, quidam horum in atrophiam, aliasque difficultates incidunt, quæ vitam hanc cum morte commutare eos cogunt.

Postulat autem hoc malum, (ut orbiter curationem ejus attingam) cum ijs, quæ crudos humores concoquunt & incidunt, medicamentorum administrationem, quæ scorbutico valere usus monstravit.

Inter quæ in tenuiore aëre primum locum cochlearia ac becabunga tenent, eorumque succus. Quæ in crassiore aëre qualis hîc Embdanus est, & Enchusianus, aliisque ad maris septentrionalis littora sitis locis humidis & frigidis; magis fortia, magisque attenuantia & incidentia sint oportet.

Quibus paucis diebus (si recens & non admodum inveteratum malum est) sic affecti restituuntur, qui alio-
bui plures hebdomadas & menses
graviter sæpè cum hoc
malo luctari so-
lent.

XLIII. AFFECTUS LANGUORISIMILIS.

Huic simile est, quod in neutra va-<sup>43. affectus
languori si-
mili</sup>letudine aliqui patiuntur, dum adhuc domi forisque omnia vitæ munia obire solent. Quorum aliqui subinde languorem sentiunt inusitatum, aliqui calorem momentaneum, faciem momentaneo calore inflammantem, & subinde ac inopinatò recurrentem. Sub quo & pulsus sæpe subest durus & inæqualis, & alvus aliis præter consuetudinem stricta, aliis justo laxior.

Mulieribus hoc malum patientibus, nonnunquam menses fluunt copiosius. Quas ab hoc morbo id pati languor demonstrat, & præter hunc pulsus parvus & inæqualis. Quarum plærâsq; vi-^{Prognest. 41.}rium excipit debilitas, & quandoq; nervorum resolutio, aut aliud incommodum sæpe citra appetitus imminutionem.

Nam nonnullos hac affectione correptos, sæpe avidius comedere vidi, unde nihilo magis corroborarentur. Quod si diutius malum perseveraverit

(nam in initio sæpe adeò lentum est, ut harum plærque pluribus annis præter languorem nihil incommodi sentiant) symptomata omnia tacitis incrementis assurgunt, donec tandem in manifestum aliquem morbum erumpant, ut plurimum verò, quantum mea qualicunque observatione animadvertere hætenus quivi, in atrophiam seu nervorum resolutionem & debilitatem, aut utrumq;.

XLIV. SUDOR COPIOSUS ATROPHIÆ PRODROMUS.

45. Sudor copiosus atrophie prodromus. Histerie copiosi sudoris atrophiam præcedentis.

Prognost. 42.

ATrophiam plærunque præcedit copiosus sudor, qui aliquibus etiam media hyeme, sub levissimis tegumentis erumpit. Sicut consuli accidit Stadenſi, & duobus apud nos Angliſ. Vnde physica ratione magis indies corpus consumitur & perit.

His sanguis à lenta febre & copioſiore sudore, instar glutinis, spissatur. A quo in quibusdam sanguinis (quod puto) spissitudine & pravitate, adeo subinde nervi contrahuntur, ut cibum

bum ūc affectis alii in os inferere cogantur.

His pulsus valdè parvus & inæqualis, ac subdurus esse consuevit, non infido indicio morbum hunc demonstrans. Quem certiore indicio felix curationis successus demonstrat. Pulsus in melius commutans, non contemnendo curationis rectè institutæ argumento.

Regula diagnostica special. 27. in sudore copioso.

Quæ etiam hîc, ut in reliquis hujus morbi speciebus, variari pro temperamentorum diversitate, & humorum putrescentium varia mixtura debet, quò simul ij quoque, quibus hic morbus insedit, humores concoquantur ac digerantur, nec non expulsionì adornentur, eradicata interea, specificis & ad scorbutum facientibus medicamentis, sceletyrbes radice.

Canon therap. spec. in sudore copioso primus

Hac curationis ratione præstitum vidi, ut è languore suo liberatis his, propriam & nativam magnitudinem rursus pulsus consequeretur.

Quòd si tristitia (ut plærunque fieri solet) occasionem huic malo dederit, ea postposita, revocari ægre ad læticiam debet, & à tristibus arceri.

Secundus.

XLV. LANCINATIO PARTIUM INITIO ACCES- sionum febrilium.

45. Lanci-
natio par-
tium initio
accessionum
febrilium.

IN februm enarratione supra dixi ,
frequenter sub tertianæ febris typo
hunc morbum occultari , ejusque cura-
tionem , nisi hic morbus unâ curetur ,
plerumq; impediri.

Hæ autem adeò frequentes anno
octuagesimo secundo fuerunt , ut nu-
mero comprehendere facile non sit ab
hac febre tunc infestatos.

Incipit autem in horum plærisque
cum tanta membranarum , crurum , a-
liarumque partium vellicatione , &
lancinatione , ut divelli ac dilacerari
sibi carnes conquererentur , & plæris-
que lancinatio hæc , quàm febris in-
fensior esset , atque hujus ratione fe-
brem aliqui contemnerent. Quemad-
modum fecisse memini quandam D.
Theologiæ conjugem , Gallum patri-
tium agri Kedenfis , mercatoris uxo-
rem , aliosq; permultos.

Quod hîc admonere obiter volui ,
cum quòd prætermisum supra id sci-
am , tum quoque quòd hujus morbi
præ-

Historia
lancinatio-
nis partium
initio acces-
sionum fe-
brilium.

presentiâ & pathognomonico signo id fiat, propter vaporum acrimoniam, qua præditi ij sunt, qui ab hac corruptione sceletyrbes dissolvuntur,

Reg. diagn. gen. 17. ex lancinatione partium.

Quem præterea, præter has lancinationes, etiam pulsus ostendit, in ipso febris vigore parvus & inæqualis.

XLVI. JACTATIO MEMBRORUM.

DE tristi, & plena commiserationis membrorum omnium jactatione, cum levi eorundem resolutione conjuncta, in duobus tantum nobis hætenus visa, plenius infra inter observationes dicemus, quando historiam unius, à nobis curatæ, puellæ enarrabimus.

46. Jactatio membrorum.

Siquidem nec hoc malum communi curationis methodo subjacet, eandem, quam paralytis scorburica, curationem postulans, Quam etiam ab hoc morbo esse, pulsus & urina ac morbi mores facile indicabant, in ijs, quos ego hac affectione tentatos vidi.

Obs. 50. pag. 356. quam nulla ibi jactationis mentio. Canon therap. spec. in jactatione membrorum primus.

Regula diagnostica spec. 28. in jactatione membrorum.

Quandoquidem admodum varia

P 4

prio-

prioris puellæ urina erat, aliquando tincta, aliquando tenuis & citrina, mox alba, turbida & crassa, rursus paulò post clara, vel rubescens; manente nihilominus eadem semper morbi facie, quotidie ingravescentis, etsi medico uteretur doctissimo, & in veteri medicina exercitatissimo, Doctore Joanne Bentzio, olim Electoris Saxonix, nunc vero Daniæ Regis medico dignissimo, & nostri amantissimo.

Quem honoris causa nominare hîc volui, & ut veritatis studio ostenderem, communem curationis methodum hunc morbum respuere, nisi specificis & ad scorbutum facientibus medicamentis, simul curetur.

Nam cùm hac curationis ratione minus feliciter res procederet, vocatus prædicto Doctori Bentzio collega à parentibus fui. Qui ad primum conspectum symptomatum raritatem admiratus, ad quem veterum morbum hunc potissimum referrem, diu mecum dubitavi: Quòd neque ad paralyfin referri, neque ad convulsionem, neque ad palpitationem aut tremorem posset,

set, sed mixta potius ex paralyfi & convulsione affectio videretur.

Quare de his dum cum collega meo conferrem, diligenter tum pulsus, tum urinam observavi; quæ ad amissum huic morbo, sicut jam sæpius dixi, responderunt. A quibus concepta primum mihi de scorbuto opinio fuit. Quam postea non minore argumento crurum suræ dolor confirmavit.

Nam cum quodam die in pedes meo jussu eam mater erigeret, atque mira celeritate invicem eos puella sursum attraheret, requisita à me fuit, quidnam ad hanc attractionem eam commoveret. Ad quæ magno spiritu & afflatu, (nam lingua quoque resoluta ei erat, ut nisi multo conatu vix verbum unum proferret) id à crurum suræ dolore sibi provenire respondit, à quo in terram pedes figere, eosque extendere prohiberetur.

Ex quibus etsi satis de hoc morbo confirmatus fuerim, attamen quia nondum cum collega meo viro aliquo egregiè docto, & in veteri medicina exercitato, de sceletyrbe satis mihi conveniebat, in ejus curationem

P s

per

per dies ferè quatuordecim consensi ,
ea conditione , si non satis methodica
hac curatione ea procederet , toti-
dem curationis dies nihil concede-
ret.

*Canon the-
rap. spec. in
jectione
membrorum
secundus.*

Quæ in sequentibus diebus quatu-
ordecim absoluta nobis , DEI gratia,
cum puellæ commodo ac sanitate fu-
it , ijs medicamentis , quæ scorbutum
curant , & cum hoc immixtos ei hu-
mores crudos & pituitosos conco-
quunt , concoctosque expurgant & ex-
pellunt.

Ubique enim in hac curatione op-
servari debet , ut curatio pro incidenti-
um morborum differentia , & varia
humorum permissione limitetur.

Exempli gratia , si calor & intempe-
ries calida adfuerint , ea refrigeranti-
bus contemperetur , & inter scorbuti-
ca medicamenta frigidiora exhibean-
tur , nisi causa morbi , & victus ratio
quæ præcessit crassa & nautica , aut
aër crassus & frigidus obstiterint.

*Canon the-
rap. gen. 19.*

Quod si partis dolor adfuerit , u-
num aut alterum simplex reliquis mi-
sceatur , quòd ad partem affectam vim
medicaminis deferat & deducat. Ita
si crudus & pituitosus humor admix-
tus

tus fuerit, vel crassus & lentus, is quoque simul attenuari, concoqui, & incidi debet.

Atque sic de cæteris statuere debemus, quemadmodum de his medendi methodo docemur. Siquidem eadem eorum hîc, atque in aliis & veteribus cognitis morbis ratio est. Ideoque ijs imitanda, qui feliciter, & cum iudicio ac ratione medicinam exercere volent.

XLVII. TREMOR MEMBRORUM

PRæter hanc lamentabilem membrorum concussionem jactationemque & ex paralyfi ac convulsivo motu mixtam (ut videtur) affectionem, quàm plurimis ab aquis crudis & pravis familiaris in agro Embdano tremor est. Quem etiam ab hoc morbo fieri pulsus ostendit.

47. Tremor membrorum.

Nam urina in horum plerisque, nullum hujus morbi indicium habet, nisi quòd plerunque citrina sit & tenuis.

Ostendimus antea ex Plinij sententia, & Græcorum medicorum, medicinam in castris Cæsaris facientium, autho-

*Aqua cruda
nervis
nocent.*

*Tremoris
membrorum
generatio.*

*Canon the-
vap. spec. in
gremore.*

authoritate, quam quotidiana experientia apud nos confirmat approbatque plurimum, aquas nostras crudas & corruptas nervis infensas esse, sua vel qualitate frigida vel substantia crassa, vel specifica, quæ ex his oritur, putrefactione ac corruptione.

Nam cum cumulata ab his cruditas amplius naturæ beneficio digeri ac separari non possit, necesse est alieno concepto calore, eam corrumpi & putrescere; putrefactione pro ratione subjectæ materiæ sæpe lenta, & sensibus vix perspicua.

Unde elevati vapores frigidi & crassi, si ad nervos delati fuerint, ea afficiunt, quæ dixi. Atque ab hac causa communi, non alienum à ratione est, morbum & affectionem produci, multis communem. Quatenus etiam ex Hippocratis & Galeni, omniumque probatissimorum medicorum sententia, communes morbos communem causam habere constet.

Curatio hujus non multum variat ab ea, quæ paralyti, & prædictæ concussioni debetur.

XLVIII. PENIS EX-
ULCERATIO.

ADhuc aliud hujus morbi accidens 48. Penis ex-
ulceratio.
est, quod etiam cum Gallico mor-
bo colludit, eodem modo, quo in lue
venerea fieri solet, à specifica & mali-
gna hujus putridæ materiæ qualitate
erodente & exulcerante excitatum,
dum per penem cum serosa sanguinis Penis exul-
ceratio ubi
fiat.
substantia & excremento illa defer-
tur, inter transeundum sua qualitate
maligna teneram penis carnem exul-
cerans erodensq;.

Est hoc quoque grave malum, quod Prognost. 43.
propter latentem suam causam, & te-
nellum penis sensum, hæctenus gravi-
ter & duriter sæpe per plures annos, &
nonnunquam ad vitæ finem usque non-
nullos magna omnium commiserati-
one afflixit.

A quo Amsterdami graviter per Historia la-
borantium
penis exul-
ceratione.
plures annos excruciatu Sartor fuit,
unde postea in cacochymiam & alia
mala, ac penis juxta scrotum exulce-
rationem incidit, qua post longas mi-
serias ab hoc incommodo liberatus est,
morbi causa aliò & ad ulcus derivata.

Ita

Ita hac ipsa carnificina supra sex annos quidam in mea patria vexatur. Et meus olim hospes, ob literarum & bonarum artium contemptum, nullam sui curationem admittens,

Est enim quoddam hominum genus, quod nihil rectè fieri putat, nisi quod à se profectum sit, aut suo iudicio approbetur.

Est autem hujus exulcerationis eadem ratio, quæ in alijs corporis partibus, in quibus ab hac materia maligna & virulenta, perforari corporis partes, aliquando sicca exulceratione videmus, non secus, atq; si majoris aciculæ capite vi carnes perforares, neq; pus neque saniem ichoremve à se dimittente.

XLIX. ULCERA SICCA.

CUjusmodi ulceris specie ante paucas septimanas quidam meus domesticus, & nuper quidam textor laborarunt, qui Wesalia habitationem suam huc non procul ab Embdanna urbe in Wolthusen pagum ante paucas hebdomadas transtulit. In

cu-

*Ulcera sic-
corum gene-
ratio.*

*49. Ulcera
sicca.
Historia la-
borantium
ulceribus
siccis.*

cujus genu uno duo profunda ulcera erant, juxta se invicem posita & perforata, sicca, neque pus neque sanien ullam à se dimittentia, non secus, atque si majoris aciculæ capite in eam partem impressa fuissent,

Totum crus ab his contractum, preterea debile & languidum erat, ut baculi adminiculo ad ingressum uteretur, & sic difficulter procederet, ac vix dimidia hora unius plateæ iter conficeret, idque multo cum dolore & molestia.

Differunt autem hæ exulcerationes ab ijs, quæ à Gallico morbo procedunt, excrementorum, quæ exulcerationi immuscentur, & circa illam apparent, figura & colore, quæ in Gallico morbo larido substantia ac calore assimilantur, hîc vero nullo certo colore, sicca. & citra pus se offerunt vel pauca puris substantia, eaque varia, cruda, ac nullius certi coloris.

Ego in his & alijs ex pulsu, & ulcerum malignitate, de morbo admonitus, intra octo dies hunc textorem (DEI gratia) sequentibus medicamentis feliciter curavi, absinthii scilicet decocto ad intra, & unguenii aurei applicatione ad extra.

Po-

*Regula diagn.
gnost. spec.
discernens
ulcera sicca
scorbutica à
Gallicis.*

*Canon the-
rap. spec. in
Ulceribus
siccis.*

Postulat enim hoc ulceris genus medicamenta mitiora, quibus citius ac prius quàm fortioribus ad suppurationem perducì illud videmus, diversa curationis ratione, quam in Gallico morbo observamus. Etsi utrique proprium ac peculiare sit; sua qualitate maligna ac venenata, curem & carnes subjectas exulcerare & erodere. Ut propterea non abs re symptomatum similitudine sub recta polorum linea inter se communicare videri possint, utcunque curationis modo propter differentem putrefactionis speciem, inter se differant, quæ alia hîc est, alia in Gallico morbo.

*Divinae pro-
videntiæ o-
pus admi-
randum.*

Estque hoc admiratione dignum divinæ providentiæ opus, eâdem copia apud Indos, quibus Gallicus morbus æquè atque scorbutus nobis, familiaris est, & ut sic dicam, topicus ac regionalis, arbores Guaiaci longas & proceras, quarum fructu ibi homines ab hoc morbo sanantur, provenire, quæ apud nos cochlearia, nasturtium, becabunga, & id genus alia huic morbo probata remedia.

Quo factò divinus rerum opifex, etiam in prima mundi creatione, sta-
tim

tim de remedijs cujusq; regionis mor-
bis accommodatis, admiranda sua
providentia prospexisse videtur, ut vel
hoc ipso suam in creandis & conser-
vandis creaturis, rebusq; à se creatis,
providentiam & propensam ac beni-
gnam erga ipsas voluntatem, testatam
contra eos faceret, qui atomorum con-
cursu, & fortuito casu, cum quibus-
dam de grege porcorum Epicuris mun-
dum hunc extitisse, etiam hodie inter
Christianos arbitrantur, si quidem
hac appellatione cohonestare eos con-
veniat.

Quorum falsam persuasionem, (ne
quid de consentiente Prophetarum,
Patrum, Martyrum, Apostolorum, &
ipsius Christi, multis miraculis doctri-
næ suæ veritatem confirmantis, testi-
monio dicam) sapientissima naturæ
dispositio & conversatio, atque ad o-
mnem usum accommodata creatio,
convincit, ut nullum habituri tales ex-
cusationem sint, qua coram Christi
tribunali in judicio subsistant & suam
contumaciam defendant.

Sed his sibi relictis ad scopum no-
strum revertemur. Nam de ijs judici-
um gravius erit, quàm nunc ipsi cogi-

Q tare,

tare, aut sibi persuadere queant,
 Quemadmodum liquidum iis fiet, si
 Christi in cruce pendentis dolores, &
 psalmistæ typum Christi gerentis ca-
 lamitates, quas Psalmo **LI**6. expressit,
 secum examinent & expendant. Ubi
 dolores infernales se circumdedisse
 ostendit, quos si ita perpassi ad horæ
 unius quadrandem fuissent, & postea
 liberati, haud dubiè aliud dicerent &
 sentirent, majoreq; studio & diligen-
 tia in divinæ voluntatis inquisitione
 & observantia advigilarent. Solent
 enim, juxta proverbium, quæ nocent,
 docere.

*Conclusio tra-
 ctatus hujus.*

Sed hæc quia alterius loci sunt, for-
 tè malè huc translata quibusdam vi-
 deri possunt. Quæ obiter pro conclu-
 sione, quadam orationis consequen-
 tia paucis hic annotare volui, ut divi-
 ni numinis prædicatione, ejusq; lau-
 datissimæ providentiæ celebratione,
 hunc nostrum de scorbuti morbi sym-
 ptomatibus libellum clauderemus.
 Siquidem hæc ferè hujus morbi sym-
 ptomata omnia sunt, quod sciam.
 Quod si quid præterea emergat hic
 prætermisum, id facile ab his colligi
 ac dignosci poterit. Volui autem in

pu-

publicum hæc adferre: Primum, ut *Causæ cur e-*
 gravissimorum virorum, editionem *diderit hunc*
 hanc flagitantium, iudicio ac volun- *tractatum*
 tati satisfaciam. *autor.*

Deinde præclarissimorum medico-
 rum studium & industriam excitem,
 ad dandum meliora, aut de suis obser-
 vationibus & inventis, quod deest, ad-
 jiciendum. Quam enim necessaria
 hujus morbi noticia sit, & diligens
 symptomatum horum omnium ob-
 servatio, ostendit multitudo eorum,
 qui quotidie hoc morbo corripun-
 tur.

Videtur enim hodie à temporum
 angustia & calamitate hic morbus in-
 crementum capere. Ut propterea, *Vide scor.*
 quam Amatus Lusitanus, excellens *curationis*
 nostri temporis practicus medicus, de *85. cent. 7.*
 vermibus opinionem habuit, de hoc
 morbo concipere debeant, qui hoc
 nostro, ad septentrionalis maris
 littora, tractu, medicinam sunt fa-
 cturi.

Sed & humanæ fragilitatis nos ad-
 moneri ab hoc morbo decet, ab uno
 eodemq; morbo & causa, tot tantisq;
 miseriis calamitatibusque impetitos,
 Q² quo

quo vel hujus recordatione mutuis odiis, rixis, invectivis & condemnationibus minus inter nos sæviamus, qui ignari mali, mortem ejusq; causam sæpe nobiscum, & intra viscera nostra circumferimus.

Sed hæc querelam longam habent, si quis ingredi eam volet, medicinam vero nullam præter eam, qua DEO vindictam dare jubemur, fratri vero reconciliationis locum. Et sunt hæc præter nostrum institutum.

*Transitio ad
partem sequen-
tem.*

Quare ab his receptui canentes, ad ea quæ in libri fronte promittimus revertamur. Ubi post universalem hujus morbi enarrationem, particulares nostras observationes promittimus, quantum huic loco & instituto sufficere, ad pleniorum hujus declarationem judicavimus.

*Utilitas exem-
plorum & obser-
vationum.
Gal. lib. 9.
meth. med.
cap. 6.*

Nam si Galeno gravissimo medicinæ testi credimus, non sufficiunt ad exactam cognitionem universalia, nisi in exemplis & particularibus unà exercitemur. Quod in ijs, ut Galeni verbis utar, methodus; in his exercitatio consistat.

Nam quemadmodum iter aliquod ingressuri, celeriter illud conficiunt, qui

qui utroq; invicem crure, & alterno pede incedunt: tardius vero, qui altero pede claudicant: Ita qui doctrinam alicujus artis ac disciplinæ absolutam consequi & addiscere volunt, duobus his (ex Galeni ejusdem authoritate) instrumentis uti debent, in universalibus methodo, in particularibus exercitatione, quod hisce duobus quasi adminiculis, optimè cujusque rei cognitio, quam nobis parate studemus, procedat.

Sunt autem ad docendum exempla illa pro potioribus habenda, quibus ipsi interfuimus, quæq; nostris oculis vidimus, quod de his notiora ac veriora scribere queamus. Quod nos sedulo studentes, paucula quædam nostra exempla proponemus, quantulacumq; huic nostro instituto pro eorum, quæ dicta nobis sunt, declaratione, sufficere putabimus. In quibus brevitatæ causa historias tantum annotabimus, quo citius & melius ad hujus morbi cognitionem lector pervenire queat. Quandoquidem cognito morbo facilis ejus curatio est.

Quæ in morbi initio sæpe paucissimis & simplicissimis perficitur medi-

camentis, de quibus prolixè & doctè, in suo de scorbuto libello, D. Joannes Weierus scribit, apud quem varios curationum modos lector cognoscit.

Noster scopus præcipuus est, morbum hunc suis signis depingere, quo magis obvius omnibus esse, & à quolibet cognosci possit. Quod primus ad sanitatem gradus sit morbum cognovisse.

Ad cujus curationem prius nemo medicus pius properare debet, quam eum perspectum, & ab omnibus suis partibus bene cognitum habeat. *Ἀλλὰ ταῦτα ὡςπερ προλογίζοντες εἰπομεν*, ut instituti nostri rationem redderemus, cur post universalem sceletyrbes descriptionem, particulares nostras observationes scripserimus.

Restat nunc promissis satisfaciamus Hippocratem hic sequuti, cui usitatum est, in curationibus suis rationes suas prius confirmare, quàm nos eas docere, ne videamur ea alijs facienda proponere, quæ ipsi nunquam fecimus prius.

Observatio I.

Qui habitu melancholico & squa-
lido, alba morphæa, circa bra-
chij manumq; extrema laborabat se-
nex, sub hyemem levi & lenta corre-
ptus febre, cum respirationis difficul-
tate, & recurrentibus per intervalla
anxietatibus, & sub diaphragmate ad
ventriculi regionem infestantibus fu-
it, quæ ob respirationis difficultatem,
de amittenda hac vita anxium eum
solicitumq; fecerunt, etsi alioqui mor-
bus lentus, parum vires defatigare ac
prostrernere videretur.

Hic urinas habuit crassas, rubras, &
sublivescentes, cum quibus pulsus di-
gitis occurrēbat inæqualis & subdu-
rus.

*Signa scor-
buti.*

Horripilationes sensit frequentes,
sed nullo, aut quàm minimo comita-
tas calore aut siti. Ad hunc ita affectum
vocatus sum, cum primum Hambur-
gum venissem, nondum autem natu-
ram loci, victum & aquas, quibus ibi
utuntur, cognitæ satis perspectasque
haberem.

Cujus causa propinquos rogavi, secundum & exercitatum in illius loci morbis medicum mihi adjungerent. Quod etsi in initio ægre, tandem tamen post longas propinquorum deliberationes obtinui, ut accerteretur D. Franciscus Rodewolt, senex sexagenarius, publico Hamburgensium stipendio medicinam ibi facitans.

Qui nulla habita mecum deliberatione medicamentum ægrotanti præscripsit, in fine secundi, aut initio tertij gradus calefaciens, & obstruendis pulmonum cannis, & infarctis viscidis & crassis ejus humoribus educendis conveniens. Quo in officina pharmacopolæ viso, testatus propinquis fui, de morbo non idem nos sentire. Itaque curationem ipsi permisi, hoc meo prognostico contentus.

Ægrotus vero post sextum aut septimum, ab assumpto primum medicamento, diem, inter graviores horripilationes decessit.

In quo morbum sceleryben demonstrare debissent urinæ, absq; molesto sitis sensu, rubræ & subfuscæ, ite anxietates ex intervallo ad ventriculi regionem sub diaphragmate infestantes.

tes. Præterea morbus lentus nulli veterum morborum descriptioni respondens. Quibus victus subscribebat crassus & melancholicus, quo per omnem fere vitam tenax Euclio fuerat usus.

Observatio II.

QUæ annum vicesimum quartum agebat virgo pulchra & inculpata valetudinis, honesta & pia, continuas, maxime vero post prandium, horripilationes sensit, cum intensissimo sinistri hypochondrij per vices infestante dolore.

Sub vesperum semper omnia visa sunt auctiora.

A cibo sumpto plærunque deterius habuit, præter horripilationes etiam perpetuis ructibus, nauseis, anxietatibusq; divexata.

Quod idem etiam à pharmaco purgante ei advenit: Siquidem difficiles his purgationes esse solent, quantum nostra experientia constat, non prius putrefactionis qualitate superata & devicta, humoribusq; in quibus ea residet, concoctis & digestis.

A fomento ad eum usum nobis parato,

rato, mitigati hypochondrii dolores fuere, reliquis in eodem vigore persistentibus. Quarum curationem cum aliquando certam spem nobis urinæ facerent, de ea rursus nos post levissimum cathartici exhibitionem, deturbavit urina, perinde atque antea, crassa & conturbata.

*Reg. diag. gen.
18. ex urinarum
commutatione
pag. 60. 91.*

Quæ res & varietas suspicionem mihi fecit, ut alterius morbi admistione fieri hoc, cogitare auderem. Quandoquidem ex Galeno, quarto de victu acutorum morborum commento docemur, facilem ac frequentem urinarum permutationem plures affectiones designare, quæ neque eandem curationem, neq; æqualem habent solutionis præfinitionem.

Itaque inquirenti mihi de omnibus diligentius, confessa ægra est, ante paucos dies subnigras maculas sibi in cruribus apparuisse, quæ in citrinum colorem defuissent. Unde de scorbuto confirmatus, præscripta inter cætera huic morbo nobis remedia sunt, quibus brevi pristinam valetudinem Dei beneficio hæc est consecuta.

Hujus urina ab initio crassa & subpallida, cum rubicunda visa corona est.

est. Horripilationes sub noctem semper auctiores apparuerunt, ut quotidianæ febris typum repræsentare voluisse hanc febrem videri possit.

Siquidem honesta & modesta virgo domi plærunque desidebat. Nunc valet viro nupta, & corporis temperamento inculpato.

Quoties in his regionibus nostris urinæ à catharticis præter rationem conturbantur deterioresq; fiunt, cum sceletyrbis significatione id conjunctum esse usus convincit, curatione id confir-
mante.

Observatio III.

Eodem quo hæc ægrotabat tempore, de qua priore observatione dixi, iisdem ferè symptomatibus ab eodem hoc morbo, totam pene hyemem ægrotaverat quædam annorum quadraginta matrona, chirurgi amici mei vicina, inter cætera quæ patiebatur, incommoda, graviter quoque de obtuso crurum dolore conque-
sta.

Quem etiam hujus morbi accidens esse supra in universali morbi hujus
enar-

*Signa scor-
buti.*

enarratione ostendi. Hunc autem similem esse aiebat, atque si in profundo crurum malleolis ea sibi contunderentur.

Atqui præter hunc dolorem molesta quoque ei ex intervallo cordis palpitatio erat, cum levissima oris siccitate conjuncta, quam haud dubie putridæ materiæ intus latentis evaporation, intra cordis capsulam admissa excitavit, quemadmodum de cordis palpitatiois efficientibus causis, recte annoravit & observavit acutissimus doctissimusque nostri temporis medicus Joannes Fernelius Ambianus.

Cui nos subscribere hic veritas cogit, non solum ob hanc præsentem historiam, sed varia nostra hac de re experimenta, & quod plus est, propter firmissimas rationes, felici curationis nostræ experimento, non in hoc exemplo solum, sed pluribus aliis animadversas & comprobatas.

Urinæ hujus quoque ab initio crassæ, albæ & turbidæ, sicut ab ægrotante edoctus sum, apparuerunt, cujusmodi tum etiam erant, cum primum mihi eam videre contigit, pingui ac viscida

da sua superficie matulae parietibus
adhaerentes.

Has nulla exhibita, post digestiva, <sup>Regula diag-
nost. gen. 19. ex
urinarum con-
turbatione à
purgantibus,
Vide 235.</sup> medicamenta purgantia attenuabant
sed magis conturbabant. Quamobrem,
cum varia tum concoquendis, tum di-
gerendis humoribus crudis & pituito-
sis medicamenta ei praescripta nihil
proficerent, ad ea quae hunc morbum
curant devenimus.

A quibus intra paucas hebdomadas
& dies restituta integrae sanitati fuit. ^{Signa scorbuti.}
Quae ut exhiberem, primum obtusus
crurum dolor, & cum hoc urinarum à
catharticis conturbatio suasit; Secun-
do, quod à nullo manifesto morbo,
sed perpetuo languore potius, ægro-
tantem detineri animadverteterem. Nam
experientia doctus, pro scorbutici <sup>Signum scorbuti
apodicticum.</sup> morbi apodictico signo teneo, si vide-
am ab ijs, quae merito & ex ratione at-
tenuare urinas debebant, eas praeter
rationem conturbari, morbo lento
existente, & nulli veterum morbo ac
descriptioni respondente.

Ob-

Observatio IV.

BYssi mercator apud Hamburgen-
ses, vir staturæ brevis & quadra-
tus, de spontanea omnium membro-
rum lassitudine, cuidam juveni medi-
cinæ studioso, sed in artis nostræ prin-
cipijs non infeliciter versato, conque-
stus, purgatus rhabarbari infusione
ab eodem, nullo sanitatis commodo,
fuit.

Præscripta deinde varia medica-
menta ei fuerunt, quæ lassitudinem
mitigent, humoremq; crudum dige-
rant & concoquant, at eodem, quo pri-
us successu. Nam & languor cresce-
bat, & quotidie appetitus magis im-
minuebatur, carne à corporis substan-
tia magis ac magis flaccescente & per-
eunte.

*Signa scor-
buti.*

Ideoq; super har re consultus, cum
de omnibus quæ ægroto adessent, dili-
genter inquirerem, inter alia hujus
signa, etiam de obtuso crurum dolore
eum conqueri intellexi.

A quo de hoc morbo statim admo-
nitus fuit, de quo iudicium ab hoc
symptomate sumptum, confirmabat
pul-

pulsus parvus, debilis & inæqualis: & cum hoc urina crassa, alba, turbida & varia, in qua quæ subsidebant corpora, alba quoque, rotunda, & cineritia apparebant, quibus nihilo clarior superior urinæ substantia facta est, sed æquæ turbida perstitit, non infido huius morbi, sicut antea dixi, argumento.

Si scilicet absque graviore morbo cum perpetua lassitudine talis excernatur, si nullum æger morbum ostendat veteribus descriptum, si languere magis, quam ægrotare ita affectus videatur, idque cum lento & vix sensibili virium decremento fiat.

In hoc ægroto, sicut fieri solet, quando in morbi cognitione aberratur, variae fiebant urinarum ut dixi permutationes. Adeo ut si quæ ex melioribus urinis affulgeret de morbo victoria, & sanitatis spes, eam postridie everterent eadem, perinde ut antea, crassæ & conturbatæ, ut huius morbi apud nos significatione certa & indubitata, ita firmissimo curationis non rectè institutæ argumento.

Occulta enim causa & malum sub-

fit

fit necesse est, medicationem nostram subterfugiens, quod recidivæ occasionem præter spem & expectationem præstet.

De quo cum diu multumq; mecum dubitarem ac cogitarem, post longas deliberationes ac retiocinationes, nec non diligentem signorum omnium examinationem, tandem scorbuto morbo causam hanc adscribendam inveni, iudicium meum ac *σοχασµόν* hac de re comprobante, felici curationis eventu.

Quem sic experientur, qui post me in similibus casibus attentare eam vellent; velle autem debent omnes, quibus vita & salus hominum curæ est.

Atque hac curationis via à gravissimo suo morbo hic quoq; paucis diebus restitutus est, à quo plures menses, hebdomadas, ni fallor, sedecim, maxima ex parte decubuerat. Quæ in hoc ægroto sceletyrben ostendant, in historiæ enarratione annotavimus, ut nihil eorum repetitione hic sit opus.

Observatio V.

Non dissimilibus symptomatibus

ab

ab hoc morbo hujus vicina, eadem quoque byssi mercatrix, & hujus prædicti ægroti à parte uxoris affinis, ægrotavit. Cui inter cætera accidit, ut quoties sese erigere conaretur, facile linqueret, aut ad linquendum prona & proclivis esset. In hac quoq; præter morbi speciem morbum hunc, prima manus nostra ad pulsum applicatione, mihi manifestavit pulsus parvus, debilis, & inæqualis. Cui urinæ sub-
Signa scorbuti.
scribebant crassæ, albæ, & conturbatæ, cum iisdem, de quibus antea dixi, sedimentis, quæ superiorem urinæ substantiam æquè post se crassam & turbidam reliquerunt.

Os maxima ex parte ei siccum fuit, etsi potum parùm appeteret aut ferret. Nam à largiore liquidi hauſtu statim offendi se sensit. Diu ante morbum eadem quoque molestum crurum surarumque dolorem sensit, qui graviter etiam inter decumbendum eam divexavit.

Ab his de scorbuto confirmatus, iisdem ferè medicamentis, quibus in prioribus, curationem perfeci, nisi quòd ijs quæ ex proprieitate quadam ad hunc morbum faciunt, quædam

R

misce-

*Exemplum
Canenit
therap. gen.
18.*

miscerem crudos & pituitosos humores concoquentia & incidentia, caloremq; temperantia. Quibus DEI beneficio feliciter hæc convaluit, quæ diutius & multas hebdomadas ab hoc morbo decubuerat.

Hoc exemplum hîc subjungere volui, ut promptior esset hujus mali cognitio. A quo sæpe contingit plures hebdomadas, menses & annos, nonnullos lento & vix sensibili morbo lecto affigi, & ab eo quandoque in deteriores & ægrè curabiles morbos, atrophiam scilicet, spasmus, aut paralysem, devolvi, magna rerum suarum jactura, & totius familiæ ἀναρχία ac confusione.

Quemadmodum eodem, quo hæc scriberem tempore, alteri cuidam viduæ accidit, quæ medicorum ignorantia integrum penè annum domi desedit, & maximam temporis partem in lecto transegit. Quò magis cogitare celebres viros decet, quam necessaria hujus morbi observatio, & legitima ejus distinctio sit ijs, qui medicinam

apud nos, & in his locis ma-

ritimis sunt fa-

cturi.

Ob-

Observatio. VI

Qui in Balwerder habitabat, agro Hamburgensibus subjecto, olim Præfecti in Tritou amanuens & scriba, sub diaphragmate, eo loco ubi orificium ventriculi situm est, tantas anxietates sensit, ut erectus spiraret & variè præ angustia corpus de loco in locum transferret, nullo tumore, inflatione, aut inflammatione, thoracem, præcordia, aut ventriculum infestante.

Huic faciei color planè cineritius erat.

De morbo quia cum collega curationis, viro sene & sexagenario, mihi non conveniebat, atque is curationem hanc ante me tractasset, propter ætatem ei cedere & curationem hanc permittere volui, sed cum hac præmonitione, ne quid in assumendis catharticiis facilè suo medico consentiret.

Quòd non vanis argumentis persuasum mihi haberem, ab ijs non ita multò post, in hydropicum tumorem corpus inflari, & attolli debere.

R 2

Nam

Nam æger cum hoc morbo multis aqueis & tenuibus humoribus, in primis venis & visceribus ipsis abundat, unde futurum suspicabar, ut fortiori cathartico ijs motis & conturbatis, flatus qui in ijs continerentur, dissolverentur, atque subito sic in tumorem ventrem attollerent.

Prævidi etiam saburram partim visceribus & intestinis adhærentem, partim in venas transumptam, medicati-
onis vi & facultate ad viscera trahendam, & in ea impingendam esse, spontè jam obstructa, & hoc tenui & aqueo humore infarcta, ex quibus sequi, sicut omnes medici rationales norunt, hic tumor solet. Nam crapulæ & ebrietati perpetuo hic indulserat, & in ea totos non solum dies, sed integras quoque noctes, ut fieri inter aulicos solet, transegerat.

Ex quibus non fallaci ratiocinatione colligi potuit, futurum id quod ego prævidebam, atque res ipsa, & rei eventus postea comprobavit. Nam sexto curationis die, qui fuit dies Saturni. revocato mihi & iterum super hac re consulto, tres pillulas majores ostendit, à medico suo sibi præscri-
pras,

ptas, tertia hora pomeridiana eas deglutiret.

Quando paucis sententiam meam dixi, negavique de ijs iudicium mihi competere, additi præterea, cuique facti sui rationem reddendam esse. Itaque per me liberum ei relinqui, quod vellet, faceret. Atque sic medici sui consilium secutus, has pillulas deglutivit.

A quibus postridie qui fuit dies Solis, adeò intumuit, ut factum hoc adstantes & propinqui, imò medicus ipse admiraretur.

Quo tempore suasi ut Hamburgo in prædium ac domum suam rediret, admonui quoque seriò, beluinam illam, quam egerat, vitam detestaretur & deploraret, atque ut gravissima sua peccata DEO confiteretur, eorumque veram pœnitentiam ageret, quo facto, promissiones in scriptura sancta propositas, & à Filio DEI nobis revelatas, firmiter amplecteretur, atque in unica DEI misericordia, Christi morte & passione nobis confirmata, acquiesceret, propterque eum remissa sibi, quæ seriò detestaretur peccata, certò ac firmiter crederet. Dùm his operam meam

folatij ergò ei obtuli, si qua in re eam expeteret. Atq; ita ei valedicens abij.

Ille vèrò post quartum à purgatione diem cœlestia loca, quod spero & opto petijt, nostro prognostico fidem faciens. In hoc, morbum hunc demonstrare anxietas gravis debuit, sub diaphragmate ad ventriculi regionem, absque tumoris, inflationis, aut inflammationis significatione, infestans & difficilem respirationem citra thoracis affectionem efficiens. Nam cruditates quiescentes absque manifesto tumore anxietates tantas inducere non potuerunt.

Observatio V II.

HAc ipsa angustia & respirationis difficultate, correptus ab hoc morbo adolescens in Pumenberch ditione Schouenbergensi fuit, adeò difficili & gravi quoque, ut erectus spirare, & variè angustia corpus jactitare cogeretur. In his plærunque si morbo ejusque causæ vires ægrotantis fortiter resistant, neque prius illæ concidant & succumbant, plærunque hydrops subsequi has angustias solet, nisi

si tempestiva curatione & huic morbo competente ijs occurratur.

Hujus urinæ crassæ & conturbatæ, cum obscura nigredine virescebant, hujus morbi non contemnendo signo, si, uti usus demonstrat, extra hydro-
pem & malignæ febris indicia, in longiore morbo tales reddantur.

Observatio VIII.

VIdua gibbosa, gracilis, pedibusq; hirsuta, corporis temperie, inprimis verò epate calidiore, diu à mariti sui morte, vitam egerat sedentariam & tristem. Hæc quoque ijsdem correpta anxietatibus per intervalla fuit, sub diaphragmate ad ventriculi regionem infestantibus.

Cum quibus labia genæque sublurido colore præter consuetudinem media æstate tinctæ, cum superioribus oculorum palpebris, apparuere. Fortè ex mestrurorum, quæ suppressa aliquandiu fuerant, ad superiora refluxu. Quæ huic morbo (haud dubiè) occasionem dederant.

Quibus ciendis, hujus morbi curatione neglecta, dum medici instant,

R 4

mi-

*Canon therap.
gen. 20.*

misera hæc subito & præter spem, ab angustijs his suffocatur & perit.

Observatio IX.

VIduarustica dives pecorum & agri, per omnem ferè vitam patrijs aquis crudis & sublimibus assuefacta, levi in initio febricula ægrotare cœpit sed absque multa siti, aut molesto caloris in principio sensu, utcunque urinas redderet crassas & cum quadam fuscedine rubescens; quæ in morbi progressu multis rubris & crassis excrementis, à quibus nihilo clarior superior urinæ substantia eminuit, in matulæ fundum subsiderunt.

Quo, ut variorum humorum confusionem, ita diversorum morborum concurrentiam, denotari supra in morbi enarratione ostendimus. Ubi breviter quoque specificam sceletyrbes putrefactionem has urinas continere annotavimus, Eadem anxietates quoque passa graves est, per intervalla recurrentes, & à diaphragmate ad ventriculi regionem infestantes.

Quæ à catharticis semper magis irratari, quàm mitigari, etiam hujus mor-

Signa scorbuti.

morbi indicio, visæ sunt. Quòd ægrè pag. 26. IIII;
253.
sic affecti purgationes sustineant, nisi
post devictam prius hanc putrefactio-
nem, & ad cencoctionem separatio-
nemque crassis & aqueis, qui miscen-
tur, humoribus perductis, ea admini-
stres.

Estq; alioqui Rhasis sententia, quam
experientia & quotidianus compro-
bat usus, frequentes super rubris uri-
nis purgationes lethales esse. Quod
etiam diu ante ipsum Hippocrates a-
phorismorum libro primo aph. 22. &
lib. 2. aph. 9. ostendit,

Nam qui sublata prius putrefactio-
ne qualicunque humores crassos &
tenaces extenuat & incidit, meatusque
per quos isti transmittuntur, & à me-
dicamentis trahuntur, aperit, facilem
& agrotanti salutarem purgationem
experietur, quæ absque fastidio ullo,
torminibus, vertigine, & id genus ma-
lis procedit,

Quod obiter hîc propterea admo-
nere volui, quòd in eo aberratum in
hac curatione à juvene medico fuerit,
alioqui non indocto, neque in artis
principiis infeliciter instructo. Qui
non habita hujus præcepti ratione,

cathartico vehementiore jam dicta
synptomata omnia exasperavit, cum
præsenti ægrotantis discrimine, acce-
dente ad reliqua mala & delirio.

Quod tamen non continuum, sed
intermittens, & per intervalla recur-
rens fuit. Tandem hæc quoque pro-
pter morbi ignorantiam ultimum clausit
diem.

*Signa scor-
buti.*

Quem hîc monstrare potuissent,
cum morbo & febre lenta, urinæ cras-
sæ, rubræ, & variæ, absq; molesta siti
calorisve sensu redditæ. Et præter has
anxietates prædictæ, nec non habita-
tionis situs ad mare in locis planis &
palustribus existens, aquarumque ibi-
dem natura, & cum harum usu, victus
melancholicus & crassus.

Quibus abundantiore indicio ad-
numerari delirium sub febre lenta
potest, & difficilis, si placet, purgan-
tis medicaminis tolerantia.

Similibus urinis rubris, crassis &
sublividis absque gravante siti, com-
plures anno septuagesimo perierunt
post memorabilem illam agrorum o-
mnium inundationem, ex aquarum,
quibus necessario in nostra Frisia oc-
cidua rustici nostri utuntur, falsedine.

Cum

Cum quibus etiam ab hac febre ille prope Leoverdiam in Virdum pago, ut vocant, rusticus ægrotabat, qui plurimas secum & graves tacitè melancholiæ causas fovebat. Quas plurimùm ad hujus morbi generationem conferre supra ostendimus.

Observatio X.

SENATORIS Hamhurgensis conjugii adhuc obambulanti, & omnia domi fortisque munia citra incommodum obeunti, aliquandiu difficilior respiratio erat, quoties locum aliquem acclivem ascendere conaretur. Quo diutius neglecto, subitò & præter expectationem in articulares dolores incidit, variè locum suum commutantes, & nusquam diu subsistentes.

Cum quibus urinæ visæ albæ, crassæ & turbidæ sunt, superiore sua substantia matulæ parietibus adhærentes; existentibus, quæ in fundum subsiderunt corpora, arenularum instar, crassiss, rotundis & gravibus.

Signa scorbuti.

A pur-

A purgantibus & humores crudos & pituitosos concoquentibus medicamentis, ut nihilo melius habuit, ita nihilo emendatiores visæ urinæ sunt. Unde mihi primum hujus morbi suspicio incidit. Quam pulsus confirmabat parvus, debilis & inæqualis, atque majore certitudine felix curationis eventus, rationis inventum comprobans.

Siquidem prima omnium hæc fuit, in qua hanc affectionem ab hoc morbo procedere observavi & animadverti.

Quæ tridui vel quatrIdui ad summum curatione, integræ valetudini ab ijs, quæ scorbutum curant, medicamentis restituta, de his & similibus mihi indicium reliquit certum & indubitatum, quod postea pluribus utile fuit, In quibus illud tamen notatu dignum ac necessarium est, ne gliscentem febrem & putrefactionem, cum his doloribus concurrentem, negligamus. Quod fortè ex hujus contemtu futura minus prospera ac diuturnior curatio esset.

Observatio XI.

Dictæ Senatoris conjugis ex sorore neptis & puerpera, decimo quarto à partu die, primùm dentium: deinde scapularum, mox genu, manuum, & musculorum laringis, graves dolores, cum levi earundem partium resolutione experta est, Qui locum subinde mutabant, & variè quoque discurrebant, modò hunc, modò alium corporis articulum divexantes, & eòdem etiam resolutionem jam dictam secum transferentes, ut semper quò dolor, eòdem quoque resolutio hæc commigraret,

Urina hujus, quemadmodum urina materteræ suæ, etiam crassa & con-
Signa scorbuti.
 turbata, cum crassis subsidentiis fuit.

A ventriculi orificio ad os usque
Accidens scorbuti peculiare.
 quiddam instar pali figi sibi conquerebatur, quod etiam in hoc morbo pluribus advenisse memini.

Si quando de lecto surgere conaretur, statim animo liquit, aut ad linquendum prona fuit. Quod etiam in aliquibus familiare hujus morbi symptoma est.

*Canon therap
spec. in dolo-
ribus arthrit.*

*Quartus
Remedium
arthritidis
vaga scor-
butica,*

Quintus

*Historia a-
lie arthriti-
de vaga
scorbutica
laborantium.*

A catharticiis pejus habuit, visæque urinæ deteriores, magisque crassæ & conturbatæ sunt.

Quocirca medicamina ei à me præscripta sunt, ex herbis & radicibus incidentibus attenuantibusque, & quadam proprietate hunc morbum respicientibus, quibus ad sufficientiam decoctis & colatis, addidi succi cochleariæ uncias duas, suspensis ex filo radicum raphani sylvestris taleolis tribus, & convenientibus syrupis potione condulcorata.

A qua potione quotidie bis hausta, intra triduum sanitati restituta fuit, in biduo dolore tumoreque evanescente. His ipsis doloribus ab hac causa cum similibus urinis Senator Stadenſis, & apothecarii Leoverdiensis uxor, item civis Nordenſis, & Secretarii Ham-burgensis L, Tueſterengh ſoror, aliq, complures laborarunt, his ipsis medicamentis ſanitate rursus reſtituti.

Observatio XII.

SUb idem fere tempus, quo ab his
articularibus doloribus prædictæ
quæ

duæ sceminæ correptæ fuere, ab iisdem quoque ab eadem causa, altera quædam scemina præpinguis, quæ Hamburgi ad porticum, ad quam mercatores conveniunt, habitabat, corripitur. In qua minus discurrentes ac mobiles hi dolores, fortè propter corporis constitutionem frigidiorē, & ad senium vergentem ætatem, aut ob humores crassos & frigidos, erant, utpote quæ multo crasso & melancholico sanguine abundabat, quemadmodum pedum tumor, de quo mox dicemus, abunde postea ostendit.

Hujus urinæ crassæ, rubræ, & subfuscae fuerunt, quibus nec calor nec sitis adfuit molesta, non infida hujus morbi significatione. Nam quorum in urinis majora putrefactionis signa sunt, quam foris sitis & æstus ostendunt, morbo lento existente, & nulli veterum morbo suis signis & symptomatibus accedente, magnum, inò certissimum hujus morbi argumentum habere, usus monstrat. Redundantibus circa primas venas humoribus crudis & crassis subinde totas implevit pelves. Quod etiam huic morbo adesse in pluribus. Embdè observavimus, quos

Signa scorbuti.

quos nihil his extretionibus adjutos fuisse constat.

Ut à me de sceletyrbe hæc admonita fuit, bibit aliorum ad hunc morbum probata remedia, quibus ita defœdاتا crura ejus fuerunt, ut citra horrorem ea nemo aspicere posset.

*Anxietas
scorbutica
diversa ab
anxietate à
pituita gra-
vante.*

Anxietates, quas ad præcordia infestare diximus, adeò quoque graves hæc experta est, ut sæpe præsens suffocationis periculum non abs re adstantes metuerent: Sed quæ cum pituitosa excretionem nihil communicabant, ne quis inde profectas eas esse existimet.

Quandoquidem magna differentia inter anxietates scorbutum comitantes, & illas est, quæ à pituita gravante, vel aliis de causis fit. Et si hæc distinctio exercitationem, & diligentem observationem animadversionemque requirat.

Observatio XIII.

S Artor qui operam suam farciendis vestibis locare solebat, distolutæ vitæ & poculis ebrietatique addictus homo, sub autumnum de gravissimo

coxen-

coxendicis dolore conqueri cœpit. Qui cum variis celebris cujusdam chirurgi inunctionibus, nihil dolor cederet, illius magnitudine & morbi molestia ac diuturnitate victus, urinam ad me deferri per uxorem curavit.

Quæ rubra & crassa fuit, atq; multo crasso & furfuraceo sedimento, à quo nihilo clarior supereminens urinae substantia visa est, subsidit: nulla interea siti, aut caloris molestia, ægrotum infestante. Eratq; pulsus parvus & inæqualis: Atque ex longiore morbo & dolore ad spithami longitudinem crus retractedum. *Signa scorbuti.*

Ego ex urina statim morbi causam cognovi. Quare media hyeme ex vino rubro cochleariæ succum ei propinavi, ad singulas vini libras succi unicas quatuor admiscendo. A quo medicamine intra quatrimum à dolore liberatus est.

Duravit autem curatio tota hebdomadas plus minus decem, in quibus integræ sanitati rursus hic restitutus est, ut, quemadmodum antea, ad computationem pedibus uteretur celerioribus, quàm Christianum virum deceret,

ceret, qui omnium opinione alioqui incurabilis videbatur,

Observatio XIV.

Consulis Hamburgensis uxor, iisdem hisce coxendicis doloribus, ad talum usque sese extendentibus, divexata pluribus hebdomadis fuit. Qui paulatim ita creverunt, ut ne momentum temporis præ doloris magnitudine uno in loco quiescere posset, & propterea medicorum operam implorare coacta sit.

Purgata ab urbis Physico medico sene septuagenario deterius habuit, lachrymis per genas destillantibus morbi dolorisq; magnitudinem testata. Cû nihil proficerent ad coxendicis dolores à veteribus præscripta medicamenta, tandem ego quoq; vocatus fui. Qui prima manus meæ ad pulsum applicatione morbum agnovi.

Eratq; tunc urina tenuis & citrina, parum à sani hominis urina differens, quæ postridie ab assumpto medicamento nostro visa crassa & conturbata est, pluribusq; excrementis crassis & furfuraceis in matulæ fundû subsidere.

Cu-

Cujusmodi quoque ab his medicamentis visæ urinæ conjugis Senatoris & Licentiati Juris sunt, quæ eodem ferè tempore cum iisdem urinis, gravissimis brachii lincinationibus, cum levi ejusdem resolutione conjunctis correpta fuit.

Historia lincinationibus brachij cum levi resolutione conjunctis laborantis.

Quæ etiam ab his doloribus, & non multum dissimilibus medicamentis curata est. Nam utraque statim post biduum doloris mitigationem sensit, paucis diebus integre ab iisdem liberatæ. Cum in Consulis uxore supra sex hebdomadas dolor hic perseverasset, & aliquantum ex dolore contractus nervus esset, qui etiam convenientibus medicamentis postea restitutus est, & pristinam extensionem recepit.

Observatio XV.

Eodem hoc dolore post tristem litem correptus Hamburgensis civis fuit byssi mercator. vir gravis honestatis amans, absque ulla pulsus & urinæ permutatione. Siquidem semper ferè etiam in bona valetudine pulsus huic parvus, debilis & inæqualis fuit.

Signa scorbuti.

Quapropter morbum hic ex suis moribus cognoscere oportuit.

De quo opinionem meam confirmavit, præcedens vita tristis, & molestissima, graviter animum ejus excrucians, eoq; magis, quod præter meritum isthuc se pertrahi arbitraretur, & quorundam amicorum officia & judicia non satis æqua sibi, in sua causa, quam justissimam putabat, experiretur.

Itaque ab hac animi illius ægritudine, dolorisque proprietate de hoc morbo admonitus & edoctus, paucissimis medicamentis & huic morbo accommodatis, brevi hominem sanavi. Hujus frater, cum iisdem pene symptomatibus ante paucos annos corripereetur, & medicos nactus fuisset hujus morbi ignaros, adhuc hodie domi claudus desidet, nullam sui morbi quam priorum medicorum opera expertus est infelicem, curationem admittens.

*Alia historia
ischiade scorbutica laborantis.*

Observatio XVI.

TAlo retracto versus poplitem retro, ut eum terræ affigere non posset, ab hoc morbo Secretarij Hamburg-

burgensis soror, post diuturnum ac molestum mariti sui morbum, laboravit, cum pulsu parvo & inæquali, urinisq; crassis, albis, & conturbatis, quæ superiori sua superficie viscida & crassa, matulæ parietibus adhærerent. Unde mihi symptomatis causa revelata est.

Signa scorbuti.

Usa hæc ante nos variis muliercularum inunctionibus & balneis (ut fieri solet) fuerat, at nullo curationis successu. Ideoq; cum nihil his proficeret, tandem rem mihi significavit. Qui cognito morbo ejusq; causa, paucis medicamentis, & uno, si memini, simplici, ad pristinum statum, talum, DEI beneficio, reduxi.

Eadem hæc paulo ante etiam omnium articulorum dolore & resolutione laboraverat, ut ab aliis de loco in locum transferri eam necesse fuerit, nostra quoque opera in quinque diebus plus minus sanitati DEI gratia sic restituta, ut sponte quo vellet, iret, quam prius à pluribus transferri multa cum molestia, de uno lecto in alium oportuit.

Historia laborantis omnium articulorum dolore & resolutione.

Observatio XVII.

Genu dolorem, & momentaneam cum hoc ac per intervalla recurrentem resolutionem, experta ab hoc morbo rustica est, quæ ex Vilsiria non procul ab oppido Krempe ad me venit. Quæ ad doloris hujus adventum hac resolutione simul attentata, nec stare neque ingredi potuit, sed protinus nisi ab alijs sustentaretur, in terram prona concidit. Quo remittente rursus baculi exigui adminiculo, quo volebat, ibat.

*Signa scor-
byti.*

Urinas reddit hæc crassas, subnigras & conturbatas, quæ multo crasso & nigro sedimento in matulae fundum subsiderent.

Ipsa ægra hujus symptomatis causæ ignara, confessa mihi est, ante triennium graviter se à scorbuto ægotasse, meum de hoc malo judicium confirmans.

A quibus de sceletyrbe edoctus, iisdem, quibus priores, medicamentis, hanc quoque DEI beneficio sanavi, nisi quod iisdem validiora cathartica subinde admiscerem.

Ho-

Hodie cursus velocitate hæc etiam cum cervis decertare posse dicitur, alioqui vetula & quæ tunc baculi ad-^{signa scor-}miniculo ad ingressum uteretur. In^{buti.} hac historia sceletyrben morbum, præter recurrentem genu dolorem, resolutio ostendit subito præter rationem eveniens, & momentanea paralyfi crus afficiens, cum dolore eadem facilitate, qua apprehendebat, deficiens & remittens.

Quod urina confirmabat varia, nec non abundantiore indicio habitationis situs, & aquarum, quibus ibi utuntur, natura & qualitas. Quæ iudicium à prioribus conceptum magis confirmabant, si Plinio credimus, & experientiæ rerum magistræ.

Observatio XVIII.

Qui Senatorii ordinis dignitatem apud Hamburgenses tenebat, vir liberaliter doctus, & annos natus plus minus sexaginta, diutius & per plures annos, dum adhuc Reipubl. munia obiret, cum hoc morbo conflictatus est. Nam & faciei colorem habebat livescentem, & crura duro

ac tenso hoc tumore inflata. Cum quibus & anxietates inter eundem ad præcordia experiebatur, graves & molestas.

Quæ propter corporis constitutionem firmiorem, qua ab ipsa nativitate gaudebat, longiore tempore absq; manifesto morbo ac valetudinis impedimento sustinuit, etsi indies ab otiosa & sedentaria vita, nec non victus ratione crassa & melancholica, tacitis incrementis hæc assurgerent, ut demum in manifestum aliquem morbum ea erumpere fuerit necesse.

Nam dum diutius hæc negligit, & præcedenti ut dixi victui indulget, tandem manifesto tumore, præter crura, circumscribi ipsi, etiam utraque viscera cœpere, quæ hac saburra prægravata tandem in abdomen gravantem copiam effuderunt, illud quoque duro ac renitente tumore attollentem.

Quando urinas reddit crassas, rubras, & quasi sanguineo colore tinctas, in quibus multa subsidebant corpora crassa, rubra, & furfuracea: cum tanta visceris utriusq; tensione, ut manifesta circumscriptione extrinsecus se conspicienda illa offerrent.

Ita

Ita affectus usus est opera cuiusdam, nescio quas suas experientias jactitantis, erronis miserrimi, cui nemo sana mente præditus, lubens suum commisisset canem curandum. Qui in hisce viscerum obstructionibus, frequentibus suis purgationibus, brevi rem eo deduxit, ut neque erectus sedere, neq; in lecto dimovere se posset, nisi à duobus adjutus.

Quando mortem instare, & præforibus esse animadverteret, me vocavit, meam opem & operam implorans: diebus, quod memini, canicularibus.

A quibus ego curationem excusabam ac detrectabam, quod scirem servandis diætæ præceptis ingenium ejus minimè natum esse. Quod ille animadvertens, me nodum, quod ajunt, in scirpo quærere, cœpit animo commoveri.

Quare annui, ne afflicto afflictionem adderem, etiam propter conscientiam, qua omnibus nostro officio præsto esse jubemur: Sed non absque admonitione, quod eo loco & dignitate in Repub. constitutus, & non vulgari literarum scientia instructus, atq;
quibus

quibus mediis ac modis literæ parentur, disciplinarumq; cognitiones, non ignarus, fenestram imposteribus ad nequitiam aperuisset, & suo exemplo ad imitandum hæc alios invitasset, qui leges punire tales, & à Repub. arcere sciebat, qui temere & per hominum mortes (ut Plinij verbis utar) pericula faciunt.

*Exemplum Canonis therap.
spec. in hydropse
scorbntico pag.
149, 150.*

In hoc autem misero ejus statu, quædam medicamina ei præscripsi, cum morbo hoc obstructions eradicantia, & crudos, crassos, ac frigidos humores concoquentia & incidentia: foris visceribus tumefactis adhibitis fomentis, emplastris, & unguentis, quæ cum discutiendi, emolliendique vi ac facultate corroborandi ea potestatem habent, per intervalla quoties id necessitas postularet, Electuario Indici, pharmaco ei usitato hominem expurgans.

Quorum efficacia (constituta prius victus ratione convenienti) res eo Dei gratia brevi rursus deducta est, ut omnia rursus domi, tam publica quam domestica negotia expediret, & intra privatos parietes, quo vellent obambulare, etiam musæum, quod editiore loco

loco habebat, atque contignationem sine offensa ascenderet.

Potuisset hic integre restitutus fuisse, si victus rationem debitam observare voluisset. Sed hoc illi persuadere difficile erat, quantumvis literato & docto, quippe qui ad istas leges nunquam assueverat, eratque nulla res ei difficilior, quam è consuetis cibis abstinere.

Factum curationis hujus initium diebus, ut dixi, canicularibus est. Sequenti Martio cum diutius negotiorum meorum causa in patria mea abessem, relaxatis iterum omnibus (non admodum alioqui intensis) circa vitum habenis, ad ingenium redijt, antiquum obtinens, & quibuslibet cibis sine delectu indulgens.

Unde, nondum satis ex priore morbo confirmatus ac restitutus, rursus in recidivam sui morbi incidit. Quando ad invisendum iterum illum, ab amicis & propinquis invitatus, recusavi.

Quod talibus neq; Apollo neq; Æsculapius satisfecerint. Sed sub vitæ finem ab amicis & ipso rursus requisitus, ut solatij ergo saltem eum visitarem, obtemperavi.

Ho-

Homo hic erat egergiè doctus, pius, & non inutilis Reipub. civis & senator, nemini malus, nisi quod sibi in victu non parceret, aut minus indulgeret. Ut rectè dictum sit, neminem sine vitiis vivere, optimum vero illum esse, qui minimis urgetur.

Hunc spero cum omnibus piis ac Christi fidelibus, cœlesti nunc gaudio frui. Quod nobis quoque, peracto hoc vitæ curriculo, concedat misericors, nostriq; amans Deus, cœli & terræ Dominus.

Quæ hic specificam hanc sceletyrbes putrefactionem ostendant, ex prædictis constat: Inter cætera vero hujus signa primum locum tumor durus sibi vendicat, nullam digiti sui impressionem admittens. Cui subscribere labiorum genarumq; livor potest, nisi ex melancholici humoris coacervatione eum extitisse quis contendat. Sed & conspicua urinarum, absque siti & febrili calore, rubedo, non infidum hujus argumentum continebat. Quibus adstipulabatur victus melancholicus & crassus.

Ab hac ipsa hydropis specie renitente & dura, curatus hisce ferè medic-

Signa sce-
lentis.

dicamentis quidam à nobis chirurgus Embdanus est, postquam octo & viginti hebdomadas suam, & cujusdam ibi medicinam facientis pharmacopœi operam, nullo curationis successu expertus esset, indies morbo tumoreque crescente, ita ut sponte vix de lecto descenderet.

Itaque à medico suo, & ipso ad consilii communicationem requisitus, consensi, cum medico suo ad visitandum eum, ægroti domum accedens. Qui eodem tempore quo ad eum veni, nescio quod pharmacum purgans sumpserat, à quo plus gravaminis senserat, quam levaminis.

Quocirca ea curationis ratione improbata, utraque latera unguento emolliente, confortante, ac digerente *Unguentum in tumore hypochondriacorum.* aggressus sum, quod hæc etiam tensa, & in his viscere circumscripta suo tumore essent.

In his autem exhibui, quæ quadam caloris temperie, cum iis quæ scorbutum curant, obstructions tollunt referantq;. Nam validiore siti hic infestabatur.

Atque hinc DEI gratia effectum fuit, ut post paucarum hebdomadarum

CU-

curationem, extra urbem hic expatiaretur, qui paulo ante vix solus se dimovisset.

*Embdanorum
chirurgorum ar-
rogantia.*

Etsi pro hoc beneficio parum gratum verbis se ille ostenderat, fortè ne hac ratione de sua authoritate quid imminutum apud populum videretur. Nam adeo plæraq; ISTRUS hominum conditionis pars, in ea civitate, arrogans & superba est, etsi imperita sæpe quam maxime, ut viros in literis educatos & ratione ac judicio ex veterum præscripto curantes, præ se contemnere, & suis experimentis posthabere non erubescant.

Cum tamen frequenter ne quidem simplicem ossis fracturam, ejusq; vel minimam, absque vitio & distorsione ab ijs reponi posse observarim, sicut proli dolor pluribus quam velim exemplis, hic id, si necesse esset, demonstrare possem. Qui aliquando à me de meliore curatione ex Galeno & Hippocrate admoniti, adeo contemtim eam admonitionem acceperunt, præ fastu & φιλαυτία, qua quidam ex ipsis laborant, ut prædictorum placitis & scriptis nunquam ab ipsis cognitis, suam

suam experientiam paucis utilem, anteponerent.

Genus hominum, ut videtur, quod recta consilia cum dare non possit, bene monentibus obtemperare nolit. Interea tamen multa confidentia etiam internos morbos curat, hac parte quoque omnes præ se contemnens.

Idque magistratus negligentia & incuria, vel non intelligentis, vel ad se nihil hanc curam pertinere arbitrantis. Cum tamen (si Platoni credimus) Reipub. felicitas in bono medico, & obstetrice proba & industria consistat.

Embdani magistratus negligentia in coercendis Empiricis.

Sed hæc quia præter nostrum institutum, atq; alterius considerationis sunt, ijs considerata relinquimus, quibus à Deo optimo max. hoc munus injunctum est & commendatum.

Observatio XIX.

MArescalcus casti Leoverdiensis, generis nobilitate clarus, præterea sumptuosus & splendidus, nimio splendore res imminuisse, deterioresq; fecisse credebatur. Unde in hunc morbum eum incidisse verisimile est.

Nam

Nam alioqui temperamento erat incul-
culpato, & vivebat quoque splendide.
Ad hunc cum de via vocatus veni-
rem, præ angustia sensu, quem sub di-
aphragmate monstrabat, ægre eum re-
spirare vidi, adeo ut ipse cum ea respi-
ratione supra biduum se superesse non
posse affirmaret. Quod partim morbi
ratione, partim medicaminis assum-
pti, ei evenisse judicavi. Siquidem an-
te paucas horas pillulas, nescio quas,
à medicis suis, viris in medicina exer-
citatissimis, sibi exhibitas, deglutive-
rat.

A quibus morbi ratione facta an-
gustia adeo adaucta fuit, ut ex hac vi-
ta sibi migrandum esse æger putaret.

Accedebant ad has anxietates hu-
jus morbi indicio, venter & crura hy-
dropico, duro, & retinente tumore
inflata. Et labra genæq; sublurido co-
lore media æstate conspicuæ.

*Signa secun-
dum.*

Denique urina crassa & rubra, in
qua multa subsidebant corpora crassa,
rubra & furfuracea, non contemnen-
do hujus morbi sicut antea diximus
judicio.

*Rhesis prognost.
in hydropel. 9*

Dixit Rases cum rubris urinis hy-
dropem incurabilem esse, propter
Epatis

Epatis temperiem calidam, à qua fit, & cont. cap. 69.
lib. 1. di-
visionum
cap. 65. diversas propterea curationum indicationes, quibus occurri ex æquo non facile possit.

Quæ si apud nos, & cum his urinis rubris & crassis militaret ratio, necesse ex hac Rasis prædictione esset, sic affectos prognostico relinquere, magno, ut ex hac curatione apparet, errore, & ægrotantium perniciæ & interitu.

Differentia autem ex causæ diversitate emergit, quæ ut in veterum hydrope calida est, ita hic frigida & crassa est, hac sua rubedine non tam intemperiem, quam morbi qualitatem, & specificam scorbuti putrefactionem, urina exprimente, quæ acribus & calidis, minime vero frigidis medicamentis tollitur & expugnatur, & propterea in easdem cum hydropico tumore indicationes incidit, quæ in veterum hydrope pugnantes cum sint, morbi difficultatem adaugendo, curationem incertam, vel nullam & deploratam faciunt.

Atque ita salva manet Rasis viri doctissimi prædictio, & confirmatur nostrum de specifica hac scorbuti putre-

factione, ex curationis eventu ac veritate, iudicium. Sed ad historiam revertamur.

Sitiebat hic plusculum, nam & corporis temperatura calidiore gaudebat, eratque alioqui anni tempus æstivum & calidum.

Ego cum ab angustia, tum à duro & renitente pedum tumore, præterea ab urinis rubris & crassis, & sublivescens genis, præ cæteris patriæ meæ medicis, de hoc morbo admonitus, magno artis nostræ encomio, & ægrotantis, quod præcipuum est, salute, intra paucos dies DEI beneficio ad pristinam valetudinem hominem, non absque quorundam medicorum, inprimis vero Serapii Hanya viri optimi & piissimi, uxoris meæ conforti, quem honoris causa hic nominare volui, admiratione, reduxi.

*Curatio angustiae
& hydropis
scorbut.*

Miscui autem calorem contemperantibus, obstructionesq; reserantibus medicamentis, ea quæ ad hunc morbum usus adinvenit. Quibus, uti prædixeram, postridie respirationis angustia remittere, & æger liberius respirare cæpit, certa curationis sequutura spe & persuasione. Quæ in

tribus n̄ fallor hebdomadis absoluta est.

Est hæc hydropis species, ut illa, de qua postea dicemus, pluribus apud nos, & his nostris regionibus, familiaris, quæ à veterum hydrope facile prædictis signis dignoscitur, ut pluribus exemplis nihil hic opus sit.

Nam omnes hoc loco recensere longum esset, præterea supervacuum & inutile, quod ex similibus similia colligere quilibet per se possit.

Observatio XX.

A Cicularij extra novam portam Embdanam habitantis uxor variis toto corpore maxime circa crura, præter ventris crurumque tumorem, duris, & pendulis, atque propria quasi cute circumscriptis tuberibus, supra reliquum tumorem extantibus laboravit, hydropis scilicet specie, quam vulgus nostras vernacula nostra lingua à vesicarum prominentium forma, *bonkwater* appellat. Nam à tuberibus his extra cutem prominentib. & cum totius corporis, maxime ventris & crurum hydropica inflatione,

concurrentibus tumoribus, vesicarum modo propendentibus, appellationem hanc malum hoc consequutum esse videtur.

Sed & præter hæc tubera variis anxietatibus subinde & per intervalla recurrentibus, hæc divexata fuit, animique deliquio, quoties sese elevare, aut alias è lecto surgere conabatur. Cum quibus pulsus parvus & inæqualis, ac urina crassa, alba & conturbata fuit.

Ego ex tumore renitente, & pulsu parvo & inæquali, atque prominentibus vesicis, de scorbuto admonitus, ut & ab animi præter rationem deliquio, ijs quæ ventriculum calefacerent, obstructiones tollerent, & hunc morbum quadam proprietate curarent, ita intra octo dies Dei gratia eam curavi, ut domi sine molestia omnia consueta officia ac munia obiret, pedum tumore deinde, quibusdam ad pedes fomentationibus curato & discusso.

Hac hydropis specie plures apud nos corripuntur, estq; nostris familiarissimum pauperibus, imprimis vero qui mala victus ratione utuntur, aquisque nostris putridis, crudis, & corruptis, vel cerevisijs nostris ab ijs deco-

ctis.

etis. Quo fit ut etiam ditiores sæpe ab hoc malo non sint immunes, quibus ad hunc morbum natura magis prona ac proclivis est.

Quemadmodum nuper evenisse cuidam nobili Groningano, præclara & nobili familia nato memini, & præter hunc alteri cuidam fœminæ plebeix, cujusdam molitoris, & ex femine lini ac raparum oleum experimentis conjugii, cum iisdem fere, quibus hæc laboravit, symptomatibus, nisi quod nobili prominentes tumores etiam in dorso ipsius assurgerent, quem ante hunc morbum frequentes quoq; vomituum conatus infestarent, cum pulsu parvo, crebro & inæquali, & facili tumorum de loco ed locum permutatione.

Curatus hic ab alio medico est, veteris medicinæ alioqui non ignaro, communi curationis methodo, sed nullo curationis successu. Utpote quæ brevi succubuit, manuum robore etiam tunc, cum curandum se medico daret, fortissimus.

Quapropter diligenter medicum ad singula animadvertere oportet & decet, omniaq; providere, & discer-

nere prius, quam ad curationem accedat, ne prius impingat & curatione aberrer, quam morbus recte cognitus fuerit.

*Nonnunquam
extra hydrosem
varia tubercula
in corpore erum-
pere.*

Cæterum symptomatis similitudine hic adscribere invitor, quod, in morbi enarratione prætermisum, hic non incommodè inferi posse putavi. Scilicet nonnunquam extra hydrosem contingere, ut totum corpus, nec non quælibet corporis partes, ab hoc crasso & melancholico succo, variis tuberibus cum & sine exulceratione, quadam naturæ crisi, & hujus crassi ac melancholici succi ad exteriora & corporis circumferentiam depositione, extuberent.

*Historiæ tuber-
culis extra hy-
dropem in scor-
buto laborantiū.*

Quemadmodum advenisse ab hoc morbo & crassa hujus materia Confusilis Leoverdiensis, & cujusdem Frisæ occiduæ nobilis conjugibus memini. Quæ in posteriore variis exulcerationibus siccis, neq; pus neq; saniem reddentibus exulcerari, perforariq; & exedi videbantur, crescentibus in exulceratorum locis, aliis postea & novis tumoribus, qui variis excrescētis mamillarem carnem flaccidam & glandulosam cuti quodammodo adæquabant.

Simile

Simile etiam tinctoris filiae in altero crure ab inflammatione alba & huic morbo peculiari (sicut antea diximus) efflorescentia advenit, non intellecta, neque legitime (ut oportuit) curata, ad hunc casum miseriamque deductæ.

In hac tumor tumori adnascebatur, ac si quibusdam quasi natibus sibi invicem impressi tumores fuissent, vel quibusdam quasi monticulis, alii super alios assurgerent.

Hi quoque profundis exulcerationibus, & mediis inter monticulos vallibus, exulcerabantur, excedebanturque magnum de se foetorem reddentes, è quibus alii rursus & novi tumores enascerentur tristi aspectu, ita ut sine horrore nemo crus illud aspicere posset.

Huic malo affine fuit sed minus tetrum, quod cum resolutione & crurum paralyfi, adolescens Embdanus passus est, qui etiam hæc tubera in utroque crure, sed absque exulceratione ostendit.

Hoc malum ab hoc quoque morbo, & latente hujus putrefactione procedere, gliscenteq; ab hac febre, amplius crassos humores, hujus morbi causam

*Tuberculorum
scorbuticorum
causa & signa.*

tenuium exiccatione inspissante & adurente, præter pulsum parvum & inæqualem, atque huic morbo peculiarrem, urina crassa, variis & diversis excrementis, partim subsidentibus, partim urinam conturbantibus, insignita, vel in substantia varia, demonstrabat.

Quibus majore certitudine tumoris qualitas, morbi que novitas & coincidentia cum his aliquando hujus morbi symptomata, paralyfis, vel atrophia, aut similia huic morbo convenientia accidentia subscribunt & attestantur, omnem dubitandi ansam præcidentia,

Curatio tumoris scorbutici.

Quomodo autem & quibus remediis topicis tumores hi curandi sint, ac num, ut in Gallico morbo, ad quem etiam in tumoribus alludit, potenti-ali medicamento ij aperiendi sint, vel intrinsecus medicamentis ad hunc morbum facientibus, depellendi, non satis adhuc exploratum habeo.

Gesneri experimentum in nativis Mediolanensibus.

Laudat Gesnerus, & certo experimento, doctissima sua de aquatilibus historia, carneis tuberibus, *natis à Mediolanensibus* appellatis, commendat Rubetam, vel nigrum bufonem terrestrem,

strem, qui sub *Salviae* radicibus sæpe-
numero invenitur, his tuberibus su-
perligatum, quod sua carne & sub-
stantiæ proprietate tubera hæc eum
abolere & liquefacere putet, sicut la-
tius *Corollario* tertio, libro de aqua-
tilibus quarto, historia de ranis, qui-
libet apud authorem ipsum legere po-
test.

Sed an nostris hisce tumoribus re-
cte ille superligari possit, non satis af-
firmare ausim: Attamen illud testari
possum, viridis graminis, quod semen
ranarum quidam esse arbitrantur,
quodq; in vere & prima æstate, multa
copia super aquis nostris invenitur,
decocto, ac destillato liquore, magno
commodo & utilitate hæc tubera ab-
luta fuisse, illa imprimis, que exulcera-
tionem patiebantur.

Meo iudicio molli medicamento re-
cte hæc ulcera tractari, & vino vel solo,
vel aliis in vino ad hunc usum decoctis
ablui puto. Exhibitis intus quæ hanc
putrefactionem arceant, humoresq;
crassos & frigidos attenuent, incidant
& diluant, donec rursus ad temperiem
reducti humores sint.

*Canon therap. v.
spec. in tuberi-
bus scorbuticis.*

Que

Quo curationis modo in tinctoris filia mediocres inceperam facere progressus, nisi ordinem hunc, & diætæ ac victus rationem interturbasset avunculi mors, necessaria ad curationem suppeditantis.

Nam ab ejus morte vitæ necessarijs destituta, cum paupercula esset, necesse fuit curationis cursum nos intermittere.

*Liquor per-
larum.*

Sunt qui prædictis accidentibus perlarum liquorem commendant, quo in similibus casibus non infelicitè quendam operatum fuisse, veritatis studio nos confiteri decet. Plura quæ de his scribam non habeo. Si quid præterea quod ad hanc curationem pertinet cognovero, libens communicabo, Si quid etiam lectori inciderit, vel monstratum, & à DEO optimo Maximo concessum fuerit, ut idem faciat rogo, ne quod humanis usibus fervire queat secretum occulteretur: interea præsentia lector boni consulat oro.

Observatio XXI.

Qui discendi mercatus causa ex Marchia Hamburgum venerat adq-

adolescens, cum gravissimis & nocturnis capitis doloribus, nec non faucium exulcerationibus ex lue venerea laborarat, curatus à me decocto ligni est. In qua curatione alioqui non admodum pinguis, ita extenuatus est, ut inter curandum juscula ei & coctas carnes exhibere fuerim coactus.

Historia adolescentis doloribus capitis & faucium exulcerationibus ex lue venerea laborantis.

Huic sub curationis finem, cum fortè è lecto surgere vellet, ecce subito, & præter omnem expectationem, dolere pes cœpit, & paulo post resolvì, ut non magis atque nuper natus infans ei inniteretur. Visæque tum urinae crassæ & conturbatæ sunt, in quibus multa crassa & furfuracea corpora subsidebant.

Signa scorbuti.

Cum quibus occurrebat in brachio pulsus parvus, debilis & inæqualis. Unde de morbi specie admonitus, brevi medicamentis accommodatis huic malo obviamivi, ut rursus Dei beneficio pedibus ad libitum uteretur. Hic de utriusque parentis obitu, uno eodemque die triste nuncium acceperat.

Quamobrem num ei suavissimorum parentum ex hac vita discessus, vel con-

*Tristitia causis
scorbutum faci-
le misceri.*

conceptus ex priore morbo pudor & dolor, vel victus præcedens melancholicus, occasionem huic morbo dederit, non facile dixerim. Nisi quod usu & nostra qualicunque observatione constet, tristitiæ causis libenter hunc morbum immisceri.

*Cur scorbutus
hodie lategrassetur.*

Quas, quia plures præsens Reipub. status, & justum DEI erga peccata iudicium, suppeditant, hinc fieri arbitror, quod solito frequentior hodie hic morbus occurrat, & latius etiam ad campeltria loca, & peregrinas regiones rationesq; ut olim Gallicus morbus, promœria sua dilaret & extendat.

Observatio XVII.

*Nautæ genus
hominum miser-
rimum.*

NAuta Hamburgensis ex eo hominum genere, qui ex Marchia rates Hamburgum advehunt, (genus hominum miserrimum, quod cum arido, parco, & parabili victu, perpetuo aeris injuriis expositum, frigora nocturna, caloresq; cogitur perferre diurnos) sub plantis pedum ambabus, primum titillationem sensit molestam, & ab ea postridie utriusque cruris resolutionem, ut nec inniti his, nec in vicem

vicem transferre ea posset, nisi quod inter decumbendum leviter sursum ad musculorum capita ea admove-
ret.

Urina crassa & alba, multa corpo-
ra cineritia, seu cineritij coloris gra-
via & crassa continebat, instar arenæ
partim rotunda, quæ à fundo, nisi for-
tiore matulæ motu, non elevabantur:
Hic etiam iisdem fere quibus prior me-
dicamentis restitutus, rursus ad con-
suetas suas operas rediit, lætus de felici
morbi sui curatione.

*Signa scor-
buti.*

Observatio XVII.

Mercator Bressaviensis, qui Dres-
dæ sub Electore Augusto habi-
tabat, sub Martini festum febre vehe-
mentiore, & gravissimis Epatis ac ve-
sicæ fellis obstructionibus (contestan-
tibus id alvi ac visicæ excrementis)
corripitur. Ex quibus cum nostra, di-
vina auxiliante gratia, opera medio-
criter convalesceret, & paulatim con-
firmari inciperet, subito & præter spem
accidit, ut quodam die, cum de lecto
surgere conaretur, alterum crus ei in-
utile

utile fieret, neque quicquam ei inniti posset, aut de loco id transferre.

Quod tamen, ita ut prior, leviter inter decumbendum ad musculorum principia & exortum admovebat.

Curatus hic quoque in quatuor aut quinque diebus nostra opera DEI gratia est, ut quo vellet prodiret, non parum ob felicem & celerem hanc curationem animo gestiens.

Scorbutum cum aliis morbis vel in initio, vel medio vel declinatione aut contingere aut primum sese exercere.

Cæterum ex hoc loco mihi incidit, quod hic rectè moneri posse puto. Scilicet aliquando fieri, quod cum aliis morbis scorbutus indicat & concurrat, & quod hoc vel initio eorum, vel medio, vel eorundem declinatione & fine fiat, aut quod sub his temporibus primum sese exerat, aut suum virus ostendit.

Quod scire utile propter curationem est. Ideo quod sæpe absque hujus noticia infeliciter reliquorum, & coincidentum morborum curatio procedat, sæpe etiam integram aliorum curationem ille remoretur.

Ut propterea verisimile sit huic, & ei qui vigesima prima observatione nobis descriptus æger est, primum
sub

sub motbi finem hunc motbum advenisse, vel quod verisimilius est; vires tum suas primum exeruisse. Quod optatum omnibus velim, tam curationis, quam dignotionis ergo. Siquidem præterquam quod sic difficilior ejus agnitio sit, non raro contingit. quod competens huic curatio reliquis & junctis ei morbis advensetur.

Quo in casu utar causam *εὐν αἰτιαν*, *Canontherap. gen. 21.* id est sine qua non habeat, diligenter expendere & considerare medicum decet. Ut indicatione à viribus sumpta, ei primum & potissimum occurramus, unde maximum imminere viribus periculum putamus. Vel unde aliorum morborum causam futuram curationem judicamus, conjunctis morbis interim non neglectis. Sicut latius de his & pulchrè Galenus in collatione morbi & causæ, decimo suo de medendi methodo libro ostendit. *Cap. I.* Quem in his similibus sequi eum decet, qui industriam ac prudentem curationem, quam amare omnes debent, amplectitur & amat.

Observatio XXIV.

BUbulco à domino suo dimisso, & Balium dominum, ac habitationis sedem quærenti, eamque prope Hamburgum in Eimbsbittel, ut vocant; pagus Hamburgensibus subiecto figenti, subito & de improvviso utrumque crus resolutum fuit.

Signa scorbuti.

Quas ad me, vicinorum instinctu, deferri urinas curavit, visæ albæ, crassæ & conturbatæ sunt, in quibus quæ subsidebant in fundum matulæ excrementa, arenularum crassiorum similia erant, gravia & rotunda. Quas in morbi enarratione certum huius morbi argumentum habere ostendimus.

Quapropter etiam iisdem fere, quibus priores, medicamentis, ad sanitatem DER beneficio hic revocatus est, Quo nomine DEO maximo laus & gloria.

Observatio XXV.

ADolescens annorum quindecim, Bonarum & liberalium artium lin-

linguarumque studiosus, ac corporis constitutione molli & delicata, ab hyberno frigore, hominum quibuscum vivebat importunitate graviter læsus, sub vernum tempus paulatim, & in pluribus diebus, hac cruris utriusque resolutione tentabatur. Quæ supra sex mensium spacium morbi ignorantia, eum lecto tenuit affixum.

A qua postea frequentiore balnei usu, & duorum cathartorum validiorum exhibitione, ab empirico illi ministratorum, convalescere cum temporis mutatione, post festum Jacobi cœpit. A quibus parum adfuit quin periisset. Quod pro tenellæ corporis constitutionis ratione, nimis audacter, ne dicam temerè empiricus processerat, nulla habita temperamenti ac teneritudinis ratione. Quandoquidem tenerum corpusculum ac molle esset, literis & studiis magis, quàm laboribus natum.

Adolescens studiosus ab Empirico cum periculo curatus.

Etsi, (ut quod verum est fatear) superata hæc medicamenta plurimùm ei profuerunt, utpote à quibus indies magis magisque vires ac motum æger recuperavit. Hic nunc valet, pedibus

impedimento utens, cujus nomine sit
Deus omnipotens benedictus.

Observatio XXVI.

*Signa paraly-
ticos scorbutica.*

Senex Consul Hamburgensis gener,
diu cruribus impotens, tandem omni-
moda horum resolutione tentabatur.
Eum medici ante me ad curationem
asciti, paralyticum veterum paralyfi di-
cebant. Et si huic quoque, quod prius
commemoratis, adesset, quod leviter
crura inter decumbendum ad musculo-
rum exortum attraheret: Et præterea
peculiare huic esset, subinde aliorum au-
xilium & levi adminiculo, commodè in
plano & cubiculo suo ambulare. Cujus
variae vices erant.

Nam qui pridie levi aliorum susten-
tatione ingressus fuerat, & solus stete-
rat, postridie neque stare, neque se di-
movere, aut pedem transferre poterat.
Idque rursum post paucos dies ei con-
cedi, iterumque negari, ut alteri cui-
dam feni, videri licebat. Mira quidem
vicissitudine, & diversa atque alia, quàm
in veterum paralyfi contingere solet, ra-
tione.

In

In qua propter primariam nervorum affectionem permanens hic morbus & ad sui solutionem esse solet. Unde etiam illud consequitur, magis à vaporibus frigidis, & maligna eorum qualitate, quàm ab humorum in ipsos decubitu, malum hoc procreari, quòd non æquè facilis humorum, sicque notum omnibus medicinæ candidatis est; sit affluxus & refluxus. Juxta illud Hippocratis, *Plurima verò non turgent.*

Hunc sceletyrbe laborare, & ab hoc morbo sic pati, cùm propinquis contradicentibus, collegis ætate provectis viris, sed in arte & praxi medica. parum exercitatis, persuadere non possem, etsi manifestè præter morbi mores pulsus & urina id testarentur, curationem iis commisi. Qui pro paralytico simpliciter eum curaverunt, at nullo successu.

Siquidem post sextum vel quintum à morbi initio mensem, quotidie in deterius ipsorum curatione delabens, suum clausit diem. Scripsi de hoc symptomate exempla plura, ut de urinis, de quibus supra in morbi enarratione diximus, veritas constaret.

Et hoc ultimum, ut intelligeremus alias subinde, atque in veterum paralyfi, mutationes, in hac resolutione conspici, ex quibus non contemnendum huius indicium exoriatur. Quod maiore certitudine postea urina & pulsus confirmant, si talia qualia huic morbo familiaria ea esse ostendi, occurrent. De quibus quia abunde suo loco dictum est, nihil opus hinc otiosa ac superflua eorum repetitione est.

Observatio XXVII.

Quemadmodum jam dicti crurum resolutione tantum, ita dimidii, & alterius lateris paralyfi, ab hoc morbo anno octuagesimo correpti permulti fuere. Inter cæteros verò quidam in agro Kedenfi agricola, nobilitatis privilegio gaudens, epatis temperatura humida & calida, & corporis constitutione crassa & quadrata. Hic ob continuas pluvias frumenti collectionem prohibentes, tacite se affligebat.

Causse selectyribus.

Nam aëris constitutio humida & frigida, omnem spem messis, quæ eorum ibi opes sunt, præcidebat.

Estque

Estque alioqui familiaris ipsorum ibi victus crassus, melancholicus & excrementitius, ex anatum anserumque carnibus, quarum magna ibi copia est, ut non meminerim uno in loco, & apud unum agricolam, plures anates me vidisse anseresque, quàm ibidem.

Quibus accedunt aquæ patriæ crudæ, sublimes & stagnantes, vel crudæ & falsæ, quibus tum cibis apparandis, tum decoquendis cerevisiis suis utuntur. Ut non mirum sit hisce & similibus morbis, ex tot tantarumque causarum congerie eos corripiri & infestari, potissimum quando ad hæc tristitiæ causæ accedunt.

Qua, ob causam prædictam, diutius hunc premente, præter omnem expectationem sub horam secundam noctis, à primo somno, hac dimidii lateris paralyfi hic corripitur, ut nullum istius lateris articulum, quem dimovere posset, haberet. Qua octiduum totum plus minus laboraverat, ante meum isthuc adventum. Quando urinæ quas reddidit, visæ crassæ, rubicundæ & subfusæ sunt, similes earum, quæ in febre quartana conspici solent.

Signa scorbuti.

Cum quibus pulsus altus, durus &

ferratilis, febrem arguebat, & humorum putridorum incendium; attestante huic & siti vehementiore, qua æger infestabatur.

Ego ex pulsu & urina fusca, de specifica humorum putrefactione, & ab hac de hoc morbo admonitus, præterea à causis procatarcticis, & invasionis modo ratus æquè atque crurum resolutionem, etiam dimidii lateris, & plurimum membrorum paralyfin, ab hoc morbo excitari posse, curationem iis, quæ febri & huic morbo debentur medicamentis, aggressus sum.

Nam si Plinio credimus, à paucorum dierum vitiosarum aquarum usu similia Cæsaris militibus vitia tum in cruribus, tum in toto corpore advenisse: quid miramur ab iisdem & diuturniore eorundem usu, nobis hæc & his graviora advenire, vel à pluribus concurrentibus & simul adjuvantibus causis, ea cumulari?

Itaque ab hoc Plinii testimonio, & prædictis indiciis & signis, de hoc morbo commonefactus, ex tot differentibus à veterum paralyfi signis, nihil præter mendacem morbi speciem, cum ea commune hunc morbum

bum habere, certis rationibus mihi persuasi.

Eoque magis, quòd eodem isto anno octuagesimo, quàm plurimis communis esset, & tam macilentis, quàm pinguibus & obesis contingeret, iisque potissimum, quos cum crasso & melancholico victu, diuturnior premeret tristitia.

Quamobrem ex ejus frequentia communem causam subesse oportere, ex Galeno & Hippocrate edoctus sum, quænum cum hoc morbo & specifica hujus putrefactione communicaret, porro pulsus & urina ostenderunt, aliæque quibus à veterum paralyfi differebat, symptomata.

*Reg. diagen. 20
ex morbi frequentia.*

Nam si quis nobis in his regionibus morbus occurrat rarus, vel etiam aliquis veteribus cognitus, sub aliis & diversis, atque plurimum ab eorum descriptione discedentibus signis, statim mendacem ejus speciem suspectam habere oportet, & huc atque ad hunc morbum cogitationes dirigere, diligenterque cùm morbi mores, & causas ejus antecedentes, tum pulsum & urinam explorare, taliane sint quæ huic morbo convenient,

*Regula diagnost. generalissima.
Vid. sup. pag. 46. 47.*

eumque quadam sua proprietate expriment & demonstrent.

Quod si in hujus generationem ea conspirare animadvertas, & talem affectum effectusve edere, quos ei familiares fuisse, ante tot secula Græci medici, qui castra Cæsaris sequuti sunt, prodiderunt, non video quis præterea dubitationi locus esse possit, nisi perpetuò cogitationibus nostris oberrare, & incertum vagari velimus.

*Paralyseos
scorbnticæ
curatio.*

Quamobrem ab his de morbo ejusque causa hîc edoctus, nihil dubitavi curationem huic morbo, scorbuto convenientem instituere: curationis initio, propter ejus redundantiam & febris admixtionem, à sanguinis missione facto.

A qua mixtis porrò feбри & scorbuto medicamentis eousque rem DEI beneficio in octo diebus, quibus cum eo fui, perduxî, ut brachium supra caput elevaret & attolleret, cujus ne digitum prius dimoverat, & crus antea rigidum & immobile, quantum sanum, ad se adduceret attraheretque; paulatim magis magisque in mea absentia confirmatus, *et*si propter loci intervallum, &

& meam absentiam, multa fieret medicaminum intermissio.

Observatio XXVIII.

PRæfectus castri Ritzenburgici, etiam simili dimidii lateris paralyfi, à primo somno cum multis & manifestis febris indiciis correptus fuit, febrem indicantibus præter sitim & oris siccitatem, atque pulsum magnum & crebrum, urina crassa, rubra, & subfusca.

Est hoc castrum non procul à maris septentrionalis littore situm, ubi eadem, quæ in Frisia utraque aquarum ratio est, quibus ad decoquendum cibum, & cerevisias suas, passim ibi agricolæ & incolæ utuntur. Cum quibus & cibis præfectus hic delectabatur crassis & melancholicis, cujusmodi frequens ibi tùm usus erat, sicut meis oculis vidi. *Causse paralyfis scorbutica.*

Hic etiam propter frumentum in agro corruptum, & à continuis pluviis extinctum & submersum majore tristitia ac longiore affectu, idem quod prior, à somno repente passus est. Nam prolem domi habebat co-

piofiorē, & præfectura hæc restricta ei tantum ad certos annos, sex scilicet vel septem fuit, ex lege & consuetudine, Hamburgenfibus, hujus caſtri dominis, recepta & ſancita.

Accedebat ætas vergens, quæ ferè ad rem omnes attentiores facere ſolet, & eò plus de viatico ſolicitos reddere, quò minus reſtat hujus vitæ viæ & ſpaciū. Cùm baculus panis noſtri DEUS ſit, ſi ex animo hoc ipſi concederemus.

Sed hæc ſtulta hominum ſollicitudo eſt, ut in futurum longius sæpe proſpiciant aut proſpicere cupiant, quàm ſua aut ſuorum vita nonnunquam attingit.

*Paralyſis ſcorbut. curatio.
Vide p. 150.*

In hoc quoque cum craſſior ſanguis abundaret, à venæ ſectione curationis initium factum eſt. Poſtea convenientibus huic morbo & feбри remediis, diebus quatuordecim, quibus cum eo fui, res eò deducta DEI beneficio fuit, ut crus prius immobile, (poſt viginti dierum doctiſſimi alioqui medici curationem, ſed circa hunc morbum minus exercitati) ſpontè in altum elevare & concutere, manumque leviter movere inciperet, manifeſtos quotidie faciens progreſſus.

Qui

Qui post nostrum isthinc discessum nulla habuit incrementa, sicut à filio ipsius cive honesto, & præclaris ingenii dotibus prædito, intellexi. Nam nullis nostris monitis obtemperans æger consueto victui melancholico & crasso indulgit, genio suo serviens. Et si ad septuagesimum annum accedens ætas, suorumque salus & commodum, melius ac rectius eum hac de re admonere debuissent,

Observatio XXIX.

E Andem hanc paralyfin, alius illius civitatis Hamburgensis civis, & ce-
lebris olim mercator, post grave damnum, debitorum perfidia acceptum, expertus est. A quo eo gravius vulneratus ipsius animus fuit, quanto elegantior, & honesti rectique amantior fuit. Quos magis etiam adversa fortuna afficere solet. Siquidem talis esse omnium testimonio perhibebatur.

Hujus urina, cum eum primum viderem, rubra quoque & subobscura fuit, atque subfusca, & pulsus cum molesta oris siccitate justo crebrior. Curatus etiam iisdem à me medicamentis est,

*Causse paraly-
sis scorbutica.*

*Signa scorbutici.
Paral. scorb.
curatio. Vide
p. 298.*

est, quæ cum febris curatione malum hoc profligant, ut intra quinque hebdomadas rursus templa visitaret, etsi annum ætatis suæ ageret septuagesimum tertium.

Historia paralyse scorbut. laborantium.

Simili paralyse rusticus Holsatiæ, & senex ille, qui molestam litem extra patriam diutius persequebatur, laborarunt, & præter hos alii quàm plurimi: Siquidem hoc tempus calamitosum & triste, atque hæ annorum constitutiones frigida, & intemperata, hujus morbi ac mali feracissimæ esse videntur. Nam quos hac affectione laborasse novi, omnibus ferè vel post crassum & melancholicum victum, vel post diuturniores tristitias advenisse eam meminimus.

Quemadmodum etiam ab hac causa Syndico Hamburgensi accidit, ob nugaces astrologorum prædictiones, sicut ille mihi confessus est, gravius se torquenti, etsi aliam tristitiæ causam alii conjicerent.

Præservatio à scorbut.

Quod scribo ut hoc tristi tempore & calamitoso Reipub. statu, quomodo erga hunc morbum se tueri oporteat, quilibet cognoscat, cui mediocres facultates & mediocria commoda

da vitæ, cum Christi cognitione DEUS concessit & largitus est, ut his contentus, cum divini numinis prædicatione & laude, iis lætus utatur, & fruatur. Atque hoc cum DEI quoque munus & opus sit, qui tristis est, pro hoc beneficio DEUM invocet, interea si facultates permittant, cibis utatur laudatissimis & boni ac laudabilis succi, ac modico & generoso vino Rhenano vel simili.

Observatio XXX.

MAttrona honesta, honesti civis & mercatoris Hamburgensis uxor, gravissimis ventris, & membranarum, musculorum, crurum & abdominis lincinationibus doloribusque laboravit, adeo intensis & vehementibus, ut præ doloris magnitudine maximè sub noctem, quò se verteret, nesciret.

Ejus urinæ crudæ, crassæ & albæ, *Signa scorbuti.* multis crassis & rotundis, ac gravibus corporibus subsidebant, cum quibus tota urinæ substantia crassa & conturbata viscebatur, varia & variis excrementis variegata. Sub vesperum ferè levif-

levissimo horrore infestabatur, quem nullus sensibilis calor subsequabatur.

Pulsus parvus & inæqualis erat. A cathartico semper urinæ visæ, ut fieri solet, conturbatiores sunt & graviores dolores.

Primis enim curationis diebus, communem curationis methodum sequuti, iis, quæ crudos humores concoquant & incidunt, quæque concoctos expurgant, medicamentis curationem attentavimus, sed nullo curationis successu.

Tandem ex perseverante præter rationem urinarum substantia crassa & conturbata, atque sedimentorum substantia diversa, permanenteque super his urinarum perturbatione & pingui earundem superficie, de sceletyrbe admonitus, iisdem quæ cruditatem concoquant medicamentis, ea admiscui, quæ ad hunc morbum usus monstravit, becabungæ scilicet decoctum cum paucis aliis, ejusque expressum recenter succum.

A quibus intra tres dies curata fuit, absque purgante medicamento, urinis laudati coloris cum probis sedimentis apparentibus. Cæterum dum his medica-

dicamentis uteretur, crura & ventrem linteis conduplicatis & calefactis involvit. Tantum in his momenti diligens urinarum observatio habet. Quamobrem medica praxis virum attentum & sobrium postulat.

Observatio XXXI.

Similibus crurum lancinationibus civis alter quinquagenarius, idem quoque Hamburgensis laboravit, non continuo sed per intervalla infestantibus, & ad sui recursum ægrotantem ad ingressum tardum & impotentem facientibus, ut absque adminiculo in plano & intra cubiculum pedes invicem transferre non posset.

Hujus urinæ tenues & citrinæ, morbum ejusque causam occultabant, quam pulsus prodidit parvus, debilis & inæqualis. In hoc victum crassum & melancholicum huic morbo occasionem dedisse dubium non est. Nam ad rem attentus erat, & corpore crasso ac subrustico.

Signa scorbuti.

Curatus tamen iisdem ferè, quibus prior medicamentis in tribus diebus fuit,

fuit, constituta prius convenienti victus ratione, & pro potu communi exhibito ei vino Gallico rubro. Durtior tamen radice morbi præcisio fuit, ut illius quoque quem vehemens brachii lancinatio vexabat, etfi in illo quoque paucis diebus sublatus dolor fuerit.

*Reg. diagn.
spec. 30. in
lancinationibus
crurum.*

In his & similibus tum ad pulsum, tum ad urinam attendere oportet. Et considerare num ex certa aliqua causa & ratione ad hæc lancinationes hæ fiant & consequantur, nec ne. Quod si nulla manifesta causa subfit, ex qua sequi debebant, & hujus morbi significationem pulsus & urina habeant, quod huc & ad hunc morbum cogitationes dirigere oporteat, rationi consentaneum est, quatenus ex suis indiciis & signis unumquemque morbum dignoscere, & ab aliis discernere ac distinguere necesse est, quod signorum confusio omnem medicandi rationem tollat & evertat.

Observatio XXXII.

Altera matrona honesta & suo marito chara, cum vomitu & frequenten-

quentibus alvi dejectionibus, intensis ventris ac intestinorum torminibus, ex quibus graviter ægrotabat, ob hoc morbo quoque correpta fuit. Initio continua, ut videbatur, febre laborabat, quæ post quintum diem tertianæ & intermittentis febris typum, at mendacibus tam nothæ, quam veræ tertianæ signis ostendit.

Post septimum paroxysmum inter cætera, ægrotata de vehementi angustia sub diaphragmate ad ventriculi regionem infestante, conquesta admodum est, ut ab ea sibi & vitæ suæ metueret, erectaq; spiraret, & cibum non nisi cum difficultate deglutiret.

Cujus causa quidam ab experientia medicus, marito hujus à pluribus annis notus, cui ascitus curationis collega fui, à pituita sic eum infestari putabat. At ego contra post tot tantasque humorum eruptiones, atque tot febris paroxysmos, & tam multorum dierum inedia ac parsimoniam, adduci non potui ut crederem, de ventriculi dolore & pituitosis ejus excrementis tum magis, quam antea, conqueri eam debere, de qua nihil conquesta prius fuerat,

X

Quam-

*Signa scor-
buti.*

Quamobrem ex victu melancholico & crasso, quo usa ac delectata fuerat, urinisq; nigris & subfuscis, atq; frequēti earum & præter rationem permutatiōe aliam subesse causam defendebam & convincebam, quam ab angustia proprietate, ut & ab urinis & pulsu, ac febris specie, & raris febris hujus symptomatibus, ac invasionis modo, scorbuto adscribendam esse obtinebam, pluribusq; rationibus ostendebam & demonstrabam.

*Remedium scor-
buti cum febre.*

Quocirca feri caprini uncias quinque ex aceti affusione parari jussi, & in ijs cochleariæ manipulos duos aliquandiu macerari, ac fortiter exprimi mandavi, & post expressionem, syrupi acetosæ unicas duas ei addi. Idque totum frigidum illi bibendum dedi. Nam præterquam quod æstivum tempus & calidum esset, ac caniculæ, quod puto, tempus, ægrota quoq; plurimo calore æstuabat.

*Historia scorbu-
ti cum febre.*

A quo bidui madore perfusa, ilico liberata ab his angustiiis, ut Consul Embdanus Nicolaus Horn, cum omnium symptomatum remissione, ac manifesta febris declinatione fuit.

Quam-

Quamobrem pergendum porro mihi in mixta febris ac scorbuti curatione putavi. Qua effectum Dei gratia ac beneficio fuit, ut pristinae valetudini restitueretur, quæ omnibus deploratae ac desperatae valetudinis esse videbatur.

In hujus morbi suspicionem primum urinæ me hic adduxerunt, variæ tum calore tum consistentia. Quam postea confirmavit jam dicta angustia.

Cujus curationem sub canicularibus diebus, ac vehementi aeris æstu, tardabat febris vehementia ac magnitudo, debilitantibus quoque illam hinc inde, cum alvi dejectionibus frequentioribus, tum gravissimis ventris intestinorumque lincinationibus.

Cum iisdem & similibus omnino symptomatibus, ab hoc morbo nuper duæ correptæ puerperæ fuere, quæ etiam nostra opera, DEI gratia, his medicamentis, aut similibus, & hunc morbum curantibus, rursus ad valetudinem ex gravissimis suis morbis redactæ fuerunt.

Historia laborantium vomitu, dejectionibus, cum febre & angustia.

Observatio XXXIII.

QUæ primo partu puerpera annum decimum octavum agebat, nautæ cujusdam in Hispania absentis uxor, diu ante partum tristis & submœsta, atque præter ætatem ac consuetudinem solitudinis cupida ac amans fuit.

Hæc quintâ à partu hebdomada, pungente lateris dolore, cum tussi & sanguinolenta expuitione, notha scilicet pleuritide correpta, paucis nostris medicamentis anodynis & foris inunctis, & sputum facilitantibus concoquentibusq; eclegmatibus & syrupis, intra triduum DEI gratia ab hac liberata fuit, apparentibus tum urinis colore & substantia laudabili.

Signa scorbuti.

Quæ rursus post biduum à facta hac curatione conturbatæ, crassæ & subrubicundæ visæ sunt, cum fursura-ceis excrementis, manifeste colliquationis signum habentibus, quas sic absq; siti, aut ullo molestioris caloris sensu reddebat.

Atque tales toto morbi tempore eas fuisse, & ante partum quoque, pa-

ren-

rentes quibus cum domi vivebat affirmabant. Quas manifestum hujus morbi indicium habere, antea dixi, si absque certioris morbi significatione, & citra humoris melancholici expurgationem, tales diutius excernantur.

Appetitus extremè prostratus erat, etiam propter animi forte dolorem, quem credibile est juvenculam & nuper nuptam, puellam teneram & delicatam, ex diuturniore mariti sui absentis desiderio contraxisse, pulsus parvus sentiebatur, debilis & inæqualis, adeo ut vix digitis perciperetur.

Qui etiam meritò talis fuisse censerì potest, propter mortis instantiam, ac nativi & innati caloris extinctionem & interitum. Pridie quam moreretur, de genu alterius dolore conqueſta, ab exteriorè ejus parte, maculas nigras & scorbuticas majores, huic morbo, sicut tonsores nostri noverunt familiares, nobis ostendit.

A quarum eruptione, postridie, diebus quos bachanales ex gentilium appellatione denominant, placidè decessit. Diebus inquam, quibus ignara

*Bachana-
lia.*

DEI plebs populusq; crapula & ebrie-

tate se contra grave DEI mandatum onerare, & splendide epulari solet, hæc DEI optimi maximi mensis cum pijs omnibus accumbere, epulisq; cœlestibus suavi conditionis permutatione satiari meruit, præsentis vitæ calamitatibus defuncta.

Siquidem pia & modesta fœmina, in constanti Christi Domini & Servatoris nostri confessione ac fide, à divini verbi ministro proposita, quiete obdormivit. Quod nobis etiam peracto hoc vitæ curticulo concedat misericors Deus & Pater, in Christo filio suo dilecto, Amen.

Signa scorbuti.

Hæc ad cutem & ossa consumpta erat, cum hac pleuritide corripereetur, & à me primum visitaretur, ut sceleti verius quam hominis speciem ac formam referret. In qua si tempestivius medicum consuluisset, scorbutum morbum ostendere urinæ prædictæ, absq; siti & molesto caloris sensu excretæ potuissent.

Atque præter has pulsus, & citra ullam morbi manifesti significationem ac præsentiam languor continuus: nec non præter causam veteribus proditam adveniens ipsi tabes & marcor.

Qui-

Quibus subscribere debuissent, vitæ, & vitæ ratio melancholica ac tristis.

Observatio XXIV.

PAUPER & miser qui Hamburgi extra portam ad Albim decumbebat & annum unum ab hoc morbo ægrotauerat, ad ossa consumptus quoque erat, cum primum ad invisendum eum invitaret. Ita ut desperata tum ejus curatio videretur, ejus dico, cui nulla recuperandæ valetudinis media suppetebant.

Estq; ad conferendum liberaliter eleemosynas populus ibi tardus, cum quod Christiana charitas refrigerata sit, tum quod propter temporum angustiam ac difficultatem, sua cuiq; sit curta suppellex.

Præscripta tamen ei quædam à me medicamenta solatij ergo sunt, quæ anxietates, quibus per intervalla laborabat, nonnihil quidem mitigabant, sed radicitus morbum ejusque causam præcidere non valebant, multo minus exhaustum ejus corpus reficiebant restaurabantq;, utpote quem

ad bene beateq; vivendum media deficiebant.

Supr. 164.

Neque erat tunc satis adhuc, ut verum fatear, nota mihi hujus symptomatis curatio, quam propterea eo diligentius in morbi enarratione examinavi & excussi, quo rectius in posterum sic affectis consuli posset.

Itaque cum post plures hebdomadas mortem instare atque adesse ipse sentiret, in futuræ vitæ, & adventantis Christi Domini ac Servatoris sui spem certam manus suas attollens, cum de Jesu bonitate & misericordia, quæ omnibus afflictis præsto est, ei loqueremur, tandem vitam hanc ærumnosam feliciore morte, imo vita beatiore commutavit, nobis quoq; ejusdem auxilium favoremq; precatus.

Quem propter eundem suum filium Dominum & redemptorem nostrum sic ad ultimum vitæ halitum, mihi pro ineffabili sua misericordia Deus conferat & conservet, indiesq; pro immenso suo erga genus humanum amore ac dilectione auctiorem reddat, ad sui nominis gloriam, & animæ meæ salutem.

Hujus urina à sani hominis lotio
nihil

nihil differebat, ut nullum inde indicium capi potuerit. Sed pulsus parvus & languidus, non obscure morbum detegebat. Quem liquidè quoq; anxietates monstrabant, sub diaphragmate ad ventriculi regionem instantes, ac respirationem coarctantes.

Quibus languor accedebat, & ex nulla manifesta causa veteribus cognita, marcor & atrophia confirmantibus idipsum, quæ sub vitæ finem erumpebant, maculis purpureis & citrinis, per totum corpus disseminatis.

Atque his uberiore indicio subscribebat victus melancholicus & nauticus, quo usus hic semper fuerat. Nam piscator erat, aliis quibus operam suam locabat, certa mercede subserviens.

Observatio XXXV.

IN eandem atrophiam ac consumptionem ab hoc morbo incidit apothecarius Hamburgensis. In quo cum febre & saturatæ rubedinis urinis morbus incepit, apparentibus quæ in matulæ

tulæ fundum subsidebant excrementis
crassis, furfuraceis & subrubris.

*Signa scor-
buti.*

Pulsus in initio vigente febre oc-
currebat durus, ferratilis & inæqualis,
non dissimilis ei, qui in pleuritide, os-
sibusque adjacentium membranarum
inflammationibus sentitur, absq; eo,
quod quicquam de his æger conquere-
retur. Qui postea trahente morbo
moram, & febre deservescente, adeo
languidum & parvum se digitis offe-
rebat, ut cum tali pulsu hominem vi-
vere posse, Italus medicus, nostra-
rum constitutionum ignarus admira-
retur.

Nam repere magis quam pulsare vi-
debatur, & cum veterum pulsum a-
liquo collatus, nulli proprius assimila-
ri quam vermiculari poterat, etsi in-
terea obambulando, omnia domi &
intra privatos parietes officia, æger
obiret.

*Regula in prog-
nosi observanda.*

Quapropter qui in medicis prædi-
ctionibus apud nos aberrare nolit,
non unam tantum, sed omnes regen-
tes corpus nostrum facultates simul
considerare, & inter se conferre debet :
Et si quæ debilior aliquod mali præ-
sagium ostendat, diligenter perpen-
dere

dere & examinare, num illi quoque reliquarum facultatum actiones consentiant.

Sæpe enim ex morbi proprietate quædam nostrę facultates afficiuntur, unde non tam debilitas earum quam morbi proprietas designatur.

Quemadmodum videre in hoc morbo licet, qui quantum dijudicare ex pulsu possumus, vitali cordis facultati extremè adversari videtur, eamq; ex sua proprietate infestare, sed non tam vitæ ac mortis præsagio, quam morbi indicio, hoc signo se prodentis & ostentantis.

Quod hic diligenter cogitare medicus debet, qui in prædictionibus suis turpis videri nolit.

Quamobrem si quando in talem pulsum apud nos incidamus, non prius de vita & morte pronunciare debemus, quam reliquæ corporis facultates nobis excussæ sunt & æstimatæ.

Similem pulsum nuper admodum experti in quodam juvene Embdano sumus, continua febre ab hoc morbo correpto, cum pulsu adeo parvo & languido sed crebro, ut vix digitis eum perciperemus. Cujus causa ægro-

ægotantem præmonui, ne de lecto temerè se præcipitaret, propter animi deliquium, quod hic pulsus ei surgenti minaretur.

Quemadmodum semel atque iterum expertus est, alvi exonerandæ causa ad surgendum invitatus. Quapropter ad omnia postea (respondente prædictioni nostræ eventu) obsequentiores habuimus non solum ægotantem, sed & domesticos & adstantes.

Fuit hic domesticus cujusdam Notarij Embdani Wiardi à Lengen, viri honesti ac probi. Hanc historiam obiter hic inferere volui, ut ab his de prædictionibus consideratè institutendis admoneremur, ne ab arteriæ pulsu, ac unius facultatis consideratione ijs formatis conceptisque temerè magis quam verè cum artis ignominia deciperemur, & nostrati vulgo ad contemnendas bonas artes proclivi, ullam calumniandi disciplinas honestas ansam & occasionem præberemus. Nunc quæ de priorè historia pertractanda restant, porro persequemur.

In qua etiam hujus morbi indicio ac significatione notandi sunt, frequentes

quentes vomitus, quibus laborabat, conatus; absque ulla sensibili, quantum ad sensus & rationem, ventriculi affectione, subinde & per intervalla recurrentes, & sæpe inani magis vomendi conatu infestantes, quam quid dignum quod eo educeretur injicereturque.

Qui si aliquandiu, & per plures dies intermitterent, ut de victoria triumphum duo ejus medici senes, eadem fere curandi dexteritate præditi, canerent, ecce subito rursus & præter causam manifestam veteribus descriptam, iidem vomendi conatus, juxta nostram prædictionem, cum ventris lancinationibus, quibus impliciti erant, revertebantur, idque alternatis & divisis quibusdam vicibus, donec frequentiore eorum recurso, & diuturniore morbi glicentisq; febris ac putrefactionis hujus mora, totum ejus corpus exhaustum, sceleti magis, quam hominis formam referret, & faciei colorem æger citrinum ostenderet, super epatis affectione contestantem.

Diximus supra longiore hujus morbi mora epar vitari, ab eoq; vitiato alimen-

alimentum corrumpi ac depravari, indeque collectas superfluitates aliis in abdomen effundi, hydropico tumore illud attollentes, aliis in ventriculum, vomitu ac dejectione rejiciendas, sicut in hoc præsentî ægroto contigisse videmus.

Sed & cum hac totius corporis macie, à superata vi morbi, eum continuus languor, ac levis omnium membrorum, inprimis vero brachiorum resolutio apprehendit.

Ex quibus vix biennij spacio, post varias peregrinationes aerisq; mutationes, comparatis in eam rem curru & equis, eluctatus est, nihil missum faciens, quod ad corporis animiq; recreationem pertineret, subinde cantionibus musicis & instrumentis sese reficiens & oblectans.

Et si in cibo nullum ne tum quidem delectum servaret, ubiq; appetitui indulgens, nisi quod lacte & lacticiniis uteretur frequenter, & quibuscumque fere cibis diagalangæ pulveris aliquid misceret.

Atque ab hac victus negligentia nunc paulatim rursus eum absumi intelligo, qui hoc triennio toto mihi visus non est.

Hic

Hic si medicum in initio nactus fuisset, hujus morbi peritum, aut nostra qualicumq; opera uti voluisset, curari meo judicio in quatuordecim diebus aut circiter potuisset, sicuti ab eodem morbo curati nostra opera ibi fuerunt.

Sed fiunt hæc (haud dubie) DEI judicio ac providentia, ingenij nostri a-
ciem obfuscantis, quando nos punire, ac paterne ad animi nostri salutem castigare decrevit.

In hoc ægroto in initio multa occurrebant, quæ hunc morbum indicare potuissent.

Imprimis urina crassa & subfusca, cum sedimentis superscriptis, præterea pulsus in morbi principio ob putrefactionis magnitudinem durus & inæqualis, absq; membranæ ullius affectione, & post diuturnam hujus morbi moram parvus & debilis. Tertio vomitus ex nulla manifesta ventriculi affectione incipiens & nullis veterum medicamentis cedens. Ultimo brachiorum paralyfis & languor, & si-
ne manifesta ac veteribus cognita causa, atrophia & contabescencia.

Ob-

Observatio XXXVI.

QUæ ex diuturnis crurum ulceribus laboraverat foemina, matrona honesta & marito sua chara, etiam ab hoc morbo correpta, cum modica siti, & omnimoda appetitus dejectione fuit, nec non totius corporis lassitudine, & animi deliquio, quoties se erigere, aut de lecto surgere conaretur.

Qua de causa facili hac ad linquendum inclinatione, maritus perculsus medico empirico à multis annis familiariter sibi noto, curationem amplius committere non ausus, sub vesperrum me accersiri curavit.

Signa scorbuti.

Qui prima manus meæ ad pulsus applicatione, ut morbum, sic deliquij causam cognovi, sicut postea tridui curatio comprobavit.

Nam in tribus plus minus diebus, paucis nostris medicamentis restituta integræ sanitati fuit. Hujus urinæ, cum primum eam inviserem, crassæ, albæ & turbidæ fuerunt, multo crudo & crasso excremento conspicuæ.

Pulsus autem parvus ut dixi & debilis,

bilis, similis illius, qui in ventriculi orificii obstructionibus sentitur, absque eo, quòd quicquam de hoc ægra conquereretur. Simili deliquio complures ab hoc morbo correpti fuere, alii cum febre, alii citra febrim.

Soletque id certissimum hujus morbi argumentum haberi, sicut suprà ostendimus, si præter rationem, & in lento morbo, à qua parum vel nihil decumbentes infestantur, illud adveniat. Ita enim duabus accidit puerperis, item adolescenti, & vicini mei facta mecum tecta inhabitantis, sorori, virgini, civi Hamburgensi, nec non Illustris ac Generosi Comitis Ezardi conjugii Illustrissimæ, ac Dominæ meæ clementissimæ, aliisque quàm pluribus. Sed quia hujus symptomatis eadem ubique ratio est, nolo in recensendis hisce exemplis prolixior esse.

*Historia præli-
vium ad lipo-
thymiam in
morbo lento.*

Observatio XXXVII.

DEjectiones varias ab hoc morbo experta tributarii filia est, quæ multo crudo frumento ventriculum corruperat, quò colorem consequere-
Y
tur

tur albicantem, sicut stulta quadam persuasione, magno valetudinis incommodo, sibi invicem nunc virgines persuadent. Interea tantas sensit angustias, ut præsens suffocationis periculum, non abs re, omnes abstantes metuerent.

Siquidem præter respirationis difficultatem quam sentiebat, subinde quoque cum angustia densa caligine oculi suffundebantur, ut jam moritura videretur.

Sitis aderat infesta, etsi parum singulis vicibus biberet: Nam & febre laborabat continua, & pulsum habebat crebrum, sed parvum, debilem & inæqualem.

De angustiae sede interrogata, eam ad stomachi regionem sub diaphragmate monstrabat. Hujus curationem cum Luneburgi in curatione cujusdam patrii occuparer, tractabat doctissimus vir Doctor Joannes Bentzius, olim Electoris Saxoniae, nunc verò Daniæ Regis medicus dignissimus. Cui, post reditum ad meos, ascitus collega curationis fui.

Ideoque ut primum ad ægrotantem convenimus, consideratis morbi sympto-

ptomatibus, omnibusque excussis, præscriptis prius ab ipso medicamentis succi cochleariæ nonnihil admiscuimus.

A quo in copiosum sudorem ilico soluta, postridie à repetito semel atque iterum medicamento, ab anxietatibus respirare cœpit, quæ tertio die plurimum imminutæ, & quarto plane evanuisse videbantur, in octo diebus porrò integræ sanitati à gravissimo hoc morbo restituta, alvi dejectionibus, quæ hujus morbi syptoma erant, spontè desinentibus, ne qua alia iis sistendis curatione opus esset.

Quæ etsi frequentes fuerunt, minimè tamen copia iis, quæ in diarrhœa fluunt, respondebant.

Sed hæc usu & exercitatione rectius, quàm traditione addiscuntur. Siquidem quantitates exquisitè in medicina determinare difficile, imò impossibile est, si Galeno credimus, primo ad Glauconem libro.

Cap. i.

Observatio XXXVIII.

Æ Què frequentibus sed magis compactis dejectionibus ab hoc mor-

bo, cum maximis ventris torsionibus, subinde & per intervalla recurrentibus, laboravit quidam subruffus, brevis ac gracilis.

Cujus ruinæ crassæ & subrubræ erant, in quibus multa excrementa crassa & furfuracea subsidebant, à quibus nihilo magis superior urinæ substantia clarescebat. Quas hujus morbi non infidum argumentum habere supra diximus.

His juncta uberiore hujus morbi nota respirationis angustia erat, per intervalla recurrens, & sub diaphragmate ad ventriculi regionem infestans.

Quæ fluente alvo paulò remissior videbatur, eademque stante gravior, magisque respirationem coarctans.

A medicamentis huic morbo conducentibus, cum angustia alvi fluxus ac tormina ventris cessarunt; symptomatibus morbi manifestè mitescentibus, quæ à bidui medicaminum horum intermissione, rursus ut prius, intendebantur & crescebant.

Erat enim in assumendis medicamentis æger difficilior ac tardior, neque mihi facultas quotidie eum inveniendi.

Quo-

Quocirca cùm quodam ad eum die venirem, conspexi thoracem ea motus specie moveri, quam quarto de locis affectis libro Galenus describit, in anterioribus scilicet versus jugulum, in utroque latere ad summum humerum, ut scapulas versus in parte posteriore.

Signa scorbuti.
Cap. 4.

Sub qua respiratione pulsus occurrebat parvus, debilis & inæqualis, cùm adhuc solus ante duas horas obambulasset, & spontè de lecto descendisset, atque tunc etiam firmo & valido iudicio omnia decerneret.

Itaque tam subitam mutationem admiratus, cùm ex virium imbecillitate eam sequi non posse mihi persuaderem, ob causas prædictas, non dubitavi ab auctiore respirationis angustia huic morbo competente, eam excitari ac commoveri.

Quapropter accommodata huic angustiae ac respirationis difficultati medicamenta ei præscribo, donec pararentur in officina pharmacopæi commoratus, & aliquamdiu post, donec à calore ad actum perductum medicamentum esse putarem.

Quando rursus eum inviso, & de va-

letudine percunctor , qui percunctanti mihi , se Dei gratia melius ac rectius habere respondit.

Erat quoque illa respirationis vehementia sedata , spirabatque rursus communi respirationis modo . Quare ubi aliquamdiu ad ægroti lectum confederam , & abitum aliò pararem , ægroto mandavi , ut quietum se in lecto teneret , neque facile se dimoveret , quòd ea res animi deliqui , ex quo facile revocari non posset , periculum haberet , adstantibus verò , ut eandem potionem statim post mediam noctem rursus ei exhiberent.

Atque iis abii , ægroto & adstantibus valedicens.

Cæterum ægrotus dicti immemor , cum aliquandiu post meum discessum periculum sese evasisse putaret , in lecto se (contradicentibus amicis) erexit , ut erectus in lecto federet . Sed paulò post deliquio , uti prædixeram , correptus , subito in dorsum relapsus est , unde revocari ob imbecillitatem non potuit.

Prognost. 47.

Est hoc ad animi deliquium huic morbo familiare , unde plurimi præter spem subito extinguuntur.

Quemadmodum nuper cuidam etiam puer-

puerperæ, foeminæ Antwerpianæ contigit, de furæ ac pedum dolore hujus quoque morbi symptomate, sicut antea dixi, diutius conquestæ; quæ subitò, ut ab alvi dejectione rursus in lecto se collocare voluit, hac lipothymia correpta, extincta fuit. Qua etiam ab hac angustia nuper altera correpta puerpera, inter loquendum obiit.

Historia lipothymia subito extinctarum.

Sed hos rursus suo tempore Deus excitabit, cum præcinentibus tubis, ad judicium venturus Christus est, & se toti mundo conspiciendum dabit. Quod brevi futurum esse temporis acta commonstrant, si cum Evangelicis prædicationibus, ac vaticiniis Apostolorum conferantur.

Quæ hîc sceletyrben ostendant, in contextu diximus, ut nihil molesta eorum repetitione hîc opus sit.

Ipsemet quoque æger à medicamentis sese allevare, ac melius habere confitebatur, sed morosus & in assumendis illis tardus, quòd naturâ ab iis abhorreret, neque ægrotare antea, neque pharmaca bibere consuevisset, quoties meliusculè se habere percepit, ea neglexit, rursusque ad morbi recursus ea, sed paucis haustibus, repetiit, quantum ad miti-

ganda symptomata satis erat, non autem præcidendum radicitus morbi fontem.

Ani Vena turgida quid notent,

Sed & venæ sectione opus fuisse, ani venæ turgidæ monstrabant. Aqua adeò abhorrebat, ut nullis nostris persuasionibus adduci isthuc potuerit. Neque erant ad manus sanguisugæ, neque chirurgus dexter, qui eas aperiret, quod alioquin non satis tutum quidam existimant.

Observatio XXXIX.

Qui coelibem vitam agebat, nobilis dives & luxuriosus, de respirationis difficultate inter eundem mihi aliquando conquestus erat, cuius curationem cum diutius negligeret, accidit, ut variis dejectionibus vomitibusque per intervalla recurrentibus, cum fortè ab urbe aliò vocatus abessem, corriperetur, cum urinis rubris, multo rubro & furfuraceo sedimento, in matulæ fundum subsidentibus.

Purgatus à suo medico hujus morbi imperio sæpius est, eò quòd propter vomitus frequentiam, in ventriculo mali causam residere sibi persuaferit.

Foris

Foris quoque emplastris & fomentis calefacientibus ventriculum, at nullo successu, fovebat. Exhibitis quæ ventriculum calefacerent & corroborarent tam potionibus, quàm electuariis & pulveribus.

Quibus tandem adeò exustus in venis sanguis fuit, ut si quandoque vel minimùm brachia ei dependerent, statim ad venas sanguis conflueret crassus, ater, grumofus & glomerofus, non aliter atque si extrinsecus in venas sanguinis grumi affusi essent, qui varicoso & inæquali tumore, venas quibusdam quasi tuberibus attollerent & eleverent.

Dejectiones, quibus laboravit, compactæ quidem fuerunt, sicut fieri in coeliaca passione solet, sed pro ratione assumpti alimenti frequentes, & copiosæ, nec non variæ & diversorum colorum, aliquando cineritiæ & albæ, aliquando lividæ & nigræ, nonnunquam verò cæruleæ & crocæ, ut plurimùm autem virides, colore planè herbaceo, sed semper compactæ & copiosæ, ut mirari quis cum stupore merito tantam excrementorum copiam

Y 5

posset,

posset, sub tenui & parco, quo utebatur, victu.

*Epilepsia occa-
sione capitis à
radiis solis ca-
lesacti.*

Hic cum media æstate, medici sui permissione, sub calidissimis radiis solaribus, in multa hominum frequentia & concursu, ad spectandum de maleficis sumendum supplicium, obequiraret, subitò raptò fursum, versus caput & cerebrum, sanguine hoc crasso & adusto, vel fumorum ab hoc exhalantium copia, pluribus paroxysmis epilepticis corripitur, à quibus ut ad se reversus fuit, in urbem rursus deportatur.

Quando Doctore Joanni Bentzio medico doctissimo, ac mihi curatio commendata fuit. Qui de sanguinis missione dum deliberamus, & hinc inde indicationes capimus, & inter se conferimus, suadentibus eam venis turgidis, ac rursus dehortante eam longa corporis extenuatione & cadentibus indies viribus.

Ecce subitò fursum denuò ascendens sanguis, pluribus gravissimisque paroxysmis epilepticis & convulsivis, hic morbo quoque sicut supra ostendimus familiaribus, horrenda morte ægrotantem occidit. Utile imò necessarium

rium fuisset, revulsione ergo huic hæ-
morrhoides aperire. De quo remedii ge-
nere non semel inter nos agitatum fuit,
nisi quòd propter sanguisugarum ino-
piam isthuc devenire non potuimus.

Observatio XL.

QUæ extra civitatem Hamburgen-
sem ad portam habitabat foemina,
propter multas melancholiæ, quas secum
muffitabat, causas, à biennio ex bono &
athletico habitu macilentior facta, decu-
buit, cùm illam inviserem, de angustia
subinde recurrente, & sub diaphragmate
ad ventriculi regionem infestante, gravi-
ter conquesta.

Pulsus parvus, debilis & inæqualis erat,
& urinæ crassæ, albæ, & turbidæ, quibus-
dam partibus subsidentes, à quibus supe-
rior substantia nihilo clarior appareret.

A quibus & respirationis angustia, de
scele tyrbe admonitus, media hyeme,
duabus vini Gallici libris addidi cochlea-
riæ succi libram dimidiam, ejusque mix-
turæ uncias quatuor, bis quotidie, ægro-
tanti propinavi, optimo curationis suc-
cessu, ita ut post triduum rursus ad con-
suetas operas rediret.

*Remedium
scorbuti.*

Hanc

Hanc cum sub multa aëris serenitate ex deambulatione aliquando post inviforem, conqueſta mihi de capitis dolore ſubinde & per ſtata intervalla recurrente eſt, circa capitis verticem eam infeſtante, à quo totum ferè antea quoque biennium divexata fuerat.

Sentiebat eodem tempore iis in partibus quid quaſi repere. Atque ubi ad diem unum atque alterum ſic divexata fuiſſet, poſtea ad temporum muſculos primum, deinde ad maxillam & dentes, dolorem tranſire, dentem ſemper, in quem influeret, relaxantem, qui ruruſum ſpontè firmaretur, dolore tumoreque diſcuſſis.

Quod hîc admonere volui, ut oſtenderem, quàm varia ſint hujus morbi accidentia. Nam dentis laxatio, ejuſque ſpontanea confirmatio, ſuſpicionem mihi & non vanum argumentum præbuit, ab hoc quoque morbo malum illud procreari.

Multos etiam toto hoc tractu, & in omnibus hiſce regionibus vicinis invenies, variis doloribus infeſtari, quos alii ſimiles dicunt, atque ſi digitis ipſis carneæ corporis particulæ evellerentur, alii pungentes affirmant, alii contun-

Regula diagnofica gen. 21. ex dentis relaxatione & ſpontanea confirmatione.

Dolores ſcorbutici varii: & vario tempore infeſtantes.

tundentes & excedentes, alii ne quidem explicare queunt.

Sed & sub noctem alios gravius, uti in Gallico morbo, alios sub horas matutinas excruciarī, audimus. Tanta enim horum varietas est, ut scriptis omnes has dolorum species comprehendere, non minus facile sit, quàm arenam maris numerare.

Estque omnium agnitio ex pulsu parvo & inæquali. Nam urina sæpe nullam hujus morbi in his significationem habet. In quibusdam etiam facilis doloris de loco in locum translatio, in initio morbi speciem demonstrat. Neque est omnibus ex æquo hæc communis, sed paucis & aliquibus tantum, quamobrem certius indicium hîc est, quod à pulsu sumitur, & doloris quoque, si velis, proprietate.

*Reg. Diagnost.
gen. 22. ex fa-
cili doloris de
loco in locum
translatione.
Vide supra
195.*

Observatio XII.

S Artoris conjunx, quæ ex vico Frburgk agro Kedenfi ad me venit, de ventriculi ad os usque obstructione instar pali totum œsophagi meatum obturante, graviter conqueſta est. Quod ventriculi cruditatis signum,

fi-

signum, omnes medici practici norunt. Cui respondebant urina tenuis & citrina, & pulsus parvus, qualis sentiri in his cruditatibus solet.

Præter hæc & de molesto crurum suræ dolore, quem inter eundum experiretur, eorundemque imbecillitate conquesta, ab hoc de scorbuto admonitus fui, ut de ventriculi cruditate à prioribus.

Quare constituta prius victus ratione attenuante & incidente, pituitam incidentibus medicamentis, ea admiscui, quæ huic morbo convenire dixi.

Subinde levi cathartico primas venas non transeunte, concoctos præparatosq; prius humores subducens. A quibus in tribus hebdomadis melius habuit.

Est hoc crudum accidens, & hic dolor pluribus apud nos familiaris, sæpe cum manifesta suræ crurum duritie tensioneque conjunctus. Quapropter ejus mentionem hic facere volui, ut de similibus eò facilius lector judicare, ac secum statuere possit.

Dixi in priore historia varios dolores esse, quos hic morbus commovere solet, qui etiam varias & diversas, ac ferè quaslibet corporis partes nonnunquam infestat, ut faciliè scriptis eos comprehendere non liceat.

Ita

Ita nuper exhalantes ab hac putrefactione interna vapores, falsa pleuritidis specie & dolore latera pungebant, dolore adeò infesto & intenso, ut supra pedis altitudinem una filia se in lectum ejiceret, hoc dolore per intervalla infestata.

Quo & quidam meus etiam affectus domesticus fuit. Et ante aliquot annos cum adhuc minus notus mihi omnibus suis symptomatibus hic morbus esset, cujusdam patritii Luneburgensis Domini Duysterhopii filius, qui tum ex nullo medicamine melius habuit quàm the-riacæ usu.

In quibus quoque hujus doloris, à veris pleuriticis doloribus, distinctio, à pulsu erat. Qui omnibus his parvus & inæqualis fuit, contrarius illi, qui in pleuritide occurrit.

Sed & doloris intervalla, aliaque superius enumerata indicia, facilè à pleuritide hunc dolorem distinguebant.

Aliis miris punctionibus digitorum extrema afficiuntur & articulorum intervalla, ut quò se vertant sæpe ignorent. Quod à virulentis vaporibus haud dubiè fit, ab hac putrefactione, quæ huic morbo

morbo propria est, ad has partes derivatis, eodem ferè, quò in Gallico morbo, modo, etsi diversa sit cujusque putrefactionis species ac forma.

Quod obiter hîc admonere volui; quòd particularia horum exempla, in hac tanta ipsorum varietate, satis pro omnium qualitate poni ac scribi non possint, & omnia referre longum esset, imò tædiosum quoque, cum ab his de reliquis non difficile judicium sit.

Observatio XLII.

SCriniarius ex agro oriundus, & inter rusticas operas manuale suum opificium subinde exercens, de priorum digitorum resolutione & languore, eorundemque ac crurum inter eundum imbecillitate, paulatim vires & incrementum capiente, conquestus, eò studiosius operam meam imploravit, quò magis his membris, parandis acquirendisque vitæ necessariis indigeret.

Hujus pulsus quoque parvus & debilis erat, atque urina in initio tenuis & subrubra. A quibus & levi digitorum resolutione, nec non crurum

languore & impotentia, de morbi specie edoctus, præscripsi ei medicamenta huic morbo convenientia. Unde post triduum ad me reversus, molliores sibi celerioresq; digitos videri dicebat, Germanicè *gladt vnd schmeidig* Medicamentis bonitatem commendans, à quo tam brevi tempore tam manifestum ac præsens auxilium experiretur.

Itaq; ab iisdem bis terve repetitis, domum ad consuetas operas rediit, verbis animi gratitudinem testatus, quam etiam re ipsa pro ratione facultatum demonstrabat.

Observatio XVIII.

Adolescens qui Rigâ Hamburgum discendæ mercaturæ causa missus ab amicis fuit, vomitu molesto & subinde recurrente prius aliquandiu laboraverat, quam ad invisendum eum invitaret, multo conatu parum, & non nisi aqueum quid, per intervalla educens.

Hujus pulsus parvus & inæqualis, obvio testimonio morbum hunc probabat, Cujus curationem voluntariè

tum differebam, quod superato paroxysmo melius sibi & domesticis habere videretur; præterea ut fidem domesticis facerem, ab hoc morbo quoque id eum pati, prædicens post biduum vel triduum citius vel serius, novo & simili paroxysmo eum correptum iri debere. Qui non expectato triduo, ante biduum ei advenit.

Quapropter nihil cunctandum ejus herus censens, obnixè me rogavit, ut aliquod huic malo conveniens medicamen ei præscribere vellem, quo restitui miser, & ad pristinam valetudinem redire posset.

*Curatio vomit-
us scorbutici.*

Jussi itaque ob frigidam cœli constitutionem, in vino convenientia huic morbo medicamenta decoqui, iisque cochleariæ herbæ succi nonnihil misceri. Atque eo solo restitutus fuit, ut nullo alio medicamine fuerit opus, nisi quod huic in fine levis submissa purgatio fuerit.

Urinæ hujus citrinæ & tenues, nullum hujus morbi signum certum habebant.

Sed quando lento morbo, vel potius continuo languore affici aliquem absque manifesto & veteribus descri-

pto

pto morbo cerno, à quo citra causam manifestam paulatim consumatur, & hisce vomitus conatibus, citra manifestam ventriculi affectionem infestetur, nunquam dubitare soleo, huic occultæ causæ, quæ à scorbuto est, eum adscribere, eo quod à malignis & venenatis hujus putrefactionis, juxta splenem ut plurimum residentis, vaporibus & fumis, eum affici & everti, pluribus experimentis cognitum ac probatum habeant, quemadmodum per consensum eum affici in viscerum inflammationibus, & regio ac arquato morbo videmus, & à classicis probatisq; authoribus & rerum magistra experientia docemur.

Quam n. varias & multiplices affectiones melancholici humoris putrefactio efficiat, suprà ostendimus, ut molesta ejus repetitione hic non sit opus.

Neq; scio in his & similibus unquam me aberrasse, quin in curatione semper optatum finem sim affecutus; Quod si morbi speciei pulsus & urina (ut fieri solet) consentiant, majore fiducia ad curationem accedo. Sicut in hoc ægroto pulsus majore certitudine conceptam ex morbi proprietate sententiam confirmabat.

Observatio XLIV.

CUi menses aliquandiu steterant & hæmorrhoides, quæ mensium vice subinde functæ fuerant, cibis semper delectata crassis fuerat & nauticis, quos facile & sine difficultate concoquebat. Hæc etiam eodem hoc vomendi conatu correpta, indefinenter fere atque absque intermissione vomebat, magis inani ejus conatu infestata, quam quod dignum quid eo educeret.

Qui si aliquando aliquandiu intermitteret, gravius postea recurrebat, quamvis intermedio tempore nihil de ventriculo conquereretur, vel ullum ejus morbum læsionemque demonstraret.

Hujus curatio vicino medico, viro docto & in veteri medicina exercitatissimo, commendata fuit, nisi quod sub finem vitæ ad invisendum eam invitatus à marito ejus fuero, viro perhumano & docto, & Ecclesiæ Hamburgensis ministro. Sed quia de morbo cum priore medico mihi non conveniebat, sponte ab ea curatione abstinui.

nui, propter mariti amicitiam & benevolum ejus in nos animum simplici visitatione contentus, ut quo res vergeret, & quem habitura finem esset, viderem observaremq;.

Fuerunt autem urinæ hujus matronæ sub finem vitæ, tenues plane & aqueæ, quæ in morbi initio, sicut à domesticis intellexi, crassæ fuerant & conturbatæ, crasso ac gravi & subrubro sedimento subsidentes.

Signa scorbuti.

Sed & obtusus cruris alterius dolor graviter tum quoque eam divexabat, ut de nulla re magis, quam hac cruris lancinatione tunc temporis, cum eam visitarem, illa conquereretur. A qua adaucta mihi ac confirmata planè de hoc morbo sententia fuit. Quod ex pathognomonicis hujus morbi signis illud quoque æstimari debeat, & summo jure possit, si ut hic, cum pulsu occurrat debili, parvo & inæquali.

Profuerunt huic nulla medicamina stomachia, etsi medico uteretur docto & erudito, qui in veteris medicinæ cognitione nulli cedebat.

Qui cum omnia aspernaretur, vomituque rejiceret, lac & lacticinia nullo valetudinis incommodo retinuit,

ut à nulla re melius, quam ab ijs se habere ipsamet testaretur, & res ipsa quoque loqueretur.

Quod etiam non contemnendo huius morbi signo fieri, supra in morbi enarratione dixi. Quod porro vomitus confirmabat citra causam veteribus descriptam ægotantem infestans ac nullis veterum medicamentis cedens, atq; ab ijs allevatus, à quibus magis, exasperari secundum rationem debebat.

His ex abundanti accedebat obtusus cruris dolor, & victus melancholicus & crassus, quo per omnem suam fere vitam usa fuerat.

Observatio XLV.

Eodem hoc vomitu vomendique conatu, ab hoc ipso, quod curatio monstravit, morbo, correptus Embdæ quidam Augustanus fuit, vir juvenis & annos natus plus minus triginta. Qui ante nostram curationem, usus opera cujusdam chirurgi hebdomadis quinque (ni fallor) fuerat, nullo curationis successu, ut propterea de me accersendo, (rebus ad desperatio

tionem euntibus) quidam ejus amici deliberarent consulerentq;

Hic autem ut ad eum primum veni, ^{Signa scorbuti.} pulsum habuit majorem, durum quoque & inaequalem, non dissimilem illi, qui in membranarum inflammationibus, ac pleuritide occurrit, absq; ulla tamen harum affectione.

Urinas vero reddidit varias, ut plurimum vero rubras & subfuscas, modo turbidas modo subsidentes, modo infractas. Quæ in fundum subsidebant excrementa, rubra, furfuracea & crassa erant. Exhibantq; absque ulla vel fitti, vel molesto caloris sensu.

Hic, utcunque frequenter vomeret, & absque ulla viscerum affectionis, inflammationisq; nota ac significatione nihil tamen ab ejus continuatione, victusq; qua utebatur, parsimonia, adjutus allevatusq; fuit, ut propterea non vulgarem nec omnibus conspicuam, sed latentem hujus vomitus causam cogitare oportuerit.

Quam huic morbo adscribendam esse, urina, nec non morbi species ac pulsus monstrabant & convincebant. A quibus de hoc morbo admonitus, paucis quibusdam ad hunc morbum

pertinentibus remedijs, eum, DEI gratia, ad priorem valetudinem reduxi. Qui adhuc eodem in loco vivit & valet, etsi ab Augustano aëre salubritate, aërisq; suavitate multum ille discreper & distet.

Observatio XLVI.

Qui ex agro Hadelensi (ut vocant) ad me venit rusticus, de macie & totius corporis languore indies gravescente conquestus, cum his quoque inter eundem crurum debilitatem, & post graviolem motum etiam respirationis difficultatem, atque ad præcordia prementem anxietatem sensit.

Signa scorbuti.

De morbi principiis & symptomatibus, quæ cum morbo inceperant, à me interrogatus, respondit, totum fere semestrem varijs vomitibus se infestatum fuisse, qui à cathartics ab empiricis sibi exhibitis, nihil remisserant, sed potius intendebantur, sed qui sponte cum temporis mutatione, ætatisq; inclinatione desissent.

Urinas vero tum crassas sibi & rubras fuisse, in quibus multa subsederant excrementa crassa, fursuracea & rubra,

rubra, calculi ut putarant recremen-
ta, à quibus nihilo clarior redderetur
extans supra hæc urina, sed turbida ac
crassa perseveraret.

Etat autem æger ipse statura crassa
& quadrata, corporisq; constitutione
valida & firma. Qua nisi præditus fu-
isset, non potuisset illam empirico-
rum curationem sustinuisse ac super-
asse, utpote hujus morbi curationi val-
de adversantem.

A qua etiam non semel ad orci fau-
ces se deductum fuisse dicebat, ita ut
sæpius pro mortuo ac derelicto se ha-
bitum esse testaretur. De meo consilio
suasi ab aquis patrijs crudis & subli-
mibus abstinere: Cibisque uteretur *Vicissitudo in*
recentibus & facilis concoctionis, *scorbuto.*
præterea ab ijs, qui sanguinem cras-
sum & crudum gignerent sibi tempe-
raret; Et ex carnibus vervecinas ac vi-
tulinas deligeret, nec non caponum,
perdicum, & columbarum ac galli-
narum domesticarum. Pane vero pu-
ro & tritico uteretur, non nimium in-
veterato aut novo. Carnes quoque ad
veru affaret, (erat enim dives, ut facile
sumptus hos toleraret) vel elixis ex a-
qua pluviæ ac modico vino uteretur.

Atq;

Atque hac victus ratione spontè eum morbi reliquias superare posse putavi. Sed quid ipsi evenerit, non possum scribere, quod ab eo tempore ad me nunquam redierit. Solet etiam id hominum genus sanitate nihil vilius habere, maxime si quid in ejus conservationem ac reparationem sit expendendum.

Observatio XLVII.

VIdua vicini mei, & facta mecum tecta inhabitantis soror, cum totius corporis lassitudine urinisq; nigris crassis & turbidis, graviter febricitare cœpit, protinus atque erigetur animo linquens. In morbi initio à medico suo viro alioqui docto, & in veteri medicina exercitato, purgata in summas angustias incidit, omnibus symptomatibus prædictis exasperatis, ut deploratam ejus valetudinem omnes arbitrarentur.

Quando ad curationem à vicino invitatus, variis anxietatibus eam infestari vidi, sub quibus pulsus parvus, debilis & inæqualis erat.

Sitiebat multum, & perpetuo os & labia

labia sicca erant, bibebat vero parum
Nam copiosiore potu offende-
batur, tantum potius, quantum labia & lin-
guam humectaret, subinde assumens.
Sub morbi declinatione omnes dentes
vacillabant, ab hoc morbo laxari.

Vixerat autem negligentius, victu
usa parco & duro, patriis aquis crudis
& sublimibus, ut solent viduæ, quibus
non est maritus domi, & res angusti-
or. Erat enim splendidior fortuna
maritus dejectus. Quæ res tacite et-
iam eam cruciabat. Accedebant & a-
liæ tristitiæ causæ, quas secum mussi-
tabat.

In hoc ergo ejus statu, iis quæ fe-
brem curant, mixta nonnulla simpli-
cia mihi fuere, sceletyrben à proprie-
tate curantia, à quibus paulatim quan-
tum febris remitteret, ad fortiora a-
scendi.

Sed & unguento refrigerante spi-
nam dorsi, pro febris mitigatione, in-
ungi curavi, & sub ejusdem declinati-
one, sanguinis parum subtraxi, quan-
tum pro virium ac morbi ratione mi-
hi sufficere videbatur.

Atq; hac curationis via & modo,
mortis faucibus hæc erepta DEI bene-
ficio

ficio fuit, quæ alioqui omnium opinionone deplorata, & sæpius fato functa videbatur.

Sub idem fere tempus, cum iisdem urinis ab hac ipsa febre correpta prætoris soror fuit, quam tum propter valetudinis incommodum, alioqui obnixè à marito rogatus, invisere non potui.

Unde nescio cujus instinctu ad empiricum devolutus, artis nostræ nullam cognitionem habentem, misere conjugis suæ valetudinem prostituit.

Nam medicaminum calefacientium, & validiorum cathartorum exhibitione. brevi eo rem deduxit, ut nulla præterea curatione indigeret.

Quod propterea scribo, ut ostendam, cum his urinis plerunq; febrem validiorem conjungi, quæ ut propter materiam, in qua residet, incidentibus, ita morbi causa refrigerantibus curari postulat, cum iis quæ ad hunc morbum usus monstravit, quod neglecta hujus morbi curatio, febris curationem impediat, causam habens, sine qua curari, & radicitus evelli febris nequeat.

Prognost. 48.

Quæ sui mora diuturniore vires atterendo,

terendo, sæpe ægrotum interficit, aut in alium, & gravio rem morbum con-jicit & protrudit.

Multa hic scorbutum monstrant, *Signa scor-*
inprimis vero præter pulsum & uti-
buti.
nam facilis lipothymia, & præter hanc
angustia ad præcordia infestans, citra
tulsim ac thoracis affectionem, respi-
rationem difficilem reddens.

Ultimo & dentium laxatio. Sed
quia hæc primum sub morbi finem in-
cidit, minus ad monstrandum morbum
hunc ponderis habuit, quod prius æ-
grotæ ab hoc morbo interfici potuit,
quam ab hoc signo morbus cognosci.

Observatio XLVIII.

PRæfecti arcis in Nienhusen con-
junx, ex juncea gracilitate, brevi
& intra biennium, adeo pinguem &
carnosum corporis habitum contra-
xerat, ut cum athletico certare facile
potuisset. Etsi adhuc juvencula esset,
& annorum plus minus viginti.

Hæc etiam aliquandiu ægrotave-
rat, priusquam ad eam evocarer. Itaq;
de morbi initio, & symptomatibus,
quæ cum morbo invaserant, inquirenti
mihi

*Signa scor-
buti.*

mihi respondit, primum levissimis horripilationibus se quotidie correptam fuisse, quæ aliquando bis, & quandoq; etiam ter eam infestassent, atque cum his febris horribus simul œdematoso tumore pedes sibi intumuisse, levissimo rubore permixto, sed qui ad albedinem magis inclinasset, atque nullo sensibili dolore aut calore se offendisset, nisi quod ad ingressum tardam se & impotentem reddidisset.

Cæterum nullo in loco diu dum substitisse, sed facili momento de loco ad locum, atque de uno pede ad alium hunc tumorem in initio translatum fuisse, & sæpe ab uno pede ad alium eodem die eum resiliisse, magna sua & suorum admiratione.

Atque ab eo tempore omnes corporis vires magis magisq; indies fractas fuisse, ut eo ipso tempore cum ad eam venirem, neque manibus uti ad tollendum quid, neq; pedibus ad ingressum posset, sed vel decumbere, vel in sede perpetuo desidere cogere-
tur. Inde q; factum ipsa putabat, quod facies, manus, ac pedes laxo tumore sibi inflata viderentur.

Erant

Erant enim hæ corporis partes tumidæ & inflatæ, atque ægrotantis temperamentum calidum & humidum.

Cum quibus conjuncta, ex mesaraicarum venarum obstructione, lenta febris erat, quæ sub noctem gravius, & cum multis ventris torminibus, & omnium corporis partium doloribus, eam excruciat, os & fauces leviter exiccans.

Urinæ quoque turbidæ & albicantes cum obscura rubedine erant, cujusmodi in lentis & pituitosis febribus se offerre solent. Quibus & pulsus subscribebat parvus, creber & inæqualis. Ex quibus de lenta febre admonitus fui, ut à facili tumoris commigratione, & inusitata membrorum omnium debilitate, de scorbuto morbo.

Quapropter mixtam curationem institui feбри & sceletyrbi convenientem. Qua affectum DEI bonitate fuit, ut rursus omnia domimunia faceret & ex meo consilio currum mecum conscendens, à planis illis locis, ad arenosa & campestria transiret.

Erat eo in loco ubi hæc ægrotabat, pluribus tum communis scorbutus, à quo passim ibi rustici ægrotabant,
in-

inprimis prædives quidam manibus pedibusque impotens, qui animi deliquio statim corripiebatur, quotiescumque de lecto se erigere conabatur. Item prætoris olim minister cum uxore & privigno, nec non alia quædam obesa quinquagenaria, præter alia symptomata, etiam vehementi totius corporis tremore subinde, & per intervalla infestata.

*Reg. diagn. gen.
23. ex tumore
facile de parte
in partem com-
migrante.*

Hac tumoris ac inflammationis specie, facile de parte ad partem commigrante, complures apud nos tam viri, quam sceminae corripuntur, certa huius morbi (sicut pluribus nostris observationibus constat) significatione.

Quam languor, & inusitata membrorum omnium impotentia confirmabant, ne quid de laxo faciei & manuum tumore dicam, & sub noctem infestantibus corporis membra doloribus, quos etiam huius morbi, propter vaporum acrimoniam, vel frigidæ eorum qualitatem, indicium habere, supra in morbi enarratione dixi.

Pag. 80.

Siquidem hisce etiam doloribus cum Gallico morbi colludit, cuiusque atque scorbuto proprium jus, nocturnos

nos dolores cruciatusque , specifica sua corruptionis qualitate , exercere , quænum frigida vel calida sit , nondum hodie satis inter medicinæ Doctores decisum est. Cæterum quia illa hujus loci disputatio non est , eam hîc ressecabimus , & ad alia loca & tempora reservabimus , vel aliis enucleandam relinquemus.

Observatio XLIX.

QUædam honesto loco nata matrona , vidua proba & modesta , quotannis sæpius pedum inflammatione , seu ea , de qua in morbi enarratione dixi , efflorescentia correpta , aliquando plurimum dierum horripilationes , animique læves quasi defectiones patitur , absque ulla vel siti , vel febre , aut molesto caloris sensu , utpote quæ in his horripilationibus à frigidis offenditur , & calidis juvatur.

Urinæ sub hoc tempus esse variæ solent , aliquando tenues & citrinæ , aliquando albæ & crassæ , & nonnunquam rubro quodam sedimento , furfuraceo , & rotundo subsidentes , quod quidam ejus olim medicus calculi recre-

mentum esse perperam puravit, cum manifestè inter se differant hæc sanguinis recrementa ab arenosis corporibus, si Matthæo de gradibus, celebri olim medico, credimus.

*Arenularum
& sanguinis
recrementorum
in urina discrimen.*

Qui suo de morborum curationibus libro doctissimo, utriusque differentiam ponit. Quam in eo sitam esse dicit, quòd hæc de quibus loquimur sanguinis recrementa, mollia sint & digitis cedentia, sicuti calculi dura & retinentia.

Pulsus autem huic matronæ tum parvus esse solet & inæqualis, per omnia similis illi qui in febrium accessionibus sentitur. Ipsa interea ægra languet, ante mali hujus eruptionem variis anxietatibus infestata, & postremis hisce vicibus, sæpius ad lipothymiam prona.

*Præservatio ab
erysipelate.*

Hæc de meo consilio victus ratione utitur convenienti, & ad hujus morbi generationem minus accommodata. Præterea vivit pro ratione ætatis hilaris & læta, quòd omnia satis nunc ei ex voto, DEI beneficio, succedant, estque dives & potens, unicum filium habens

habens in literis educatum, & honestè institutum, à quo honestè quoque habetur, quique in omnibus vitæ actionibus honestè etiam se gerit, atque ex variarum urbium & regionum inspectione, & principum ac nobilium virorum consuetudine ac conservatione, ad benè & honestè vitam instituendam plurimum profecit, & cæteris naturæ dotibus morum elegantiam adjecit. Ut hac parte etiam nunc beata sit, & facile omnes tristitiæ causas, quas huic malo olim occasionem dedisse ex ipsa intellexi, amputare ac præcidere possit.

Hac ipsa efflorescentia alius Embdæ civis & mercator laborat, item nauta, & infiniti alii. Siquidem commune multis apud nos hoc vitium est, quo etiam olim matrem meam graviter divexatam fuisse memini.

Est autem curatio hujus, & integra causæ morbi præcisio, ab his medicamentis petenda, quæ scorbutum curant, & hanc sanguinis corruptionem sua proprietate tollunt & evincunt, sicut nostra multiplici experientia probatum est, & approbaturi ii sunt, qui

*Historia erysipelate laborantium.
Erysipelatis curatio.*

in his & similibus curationem hanc post nos explorare volent.

*Canon therap.
gen. & spec.
in erysipellate
secundus Vide
108.*

In qua illud observari debet, & in aliis hujus morbi speciebus omnibus, ut in longiore hujus morbi mora fortiora & magis incidentia atque attenuantia medicamenta sint, quàm in recenti & nuper nato morbo.

Observatio L.

QUæ decimum ætatis suæ annum ingressa puella fuerat, aliquamdiu præter rationem tristis vixit, solitudinis cupida & amans, ut semper seorsum secederet, & à consuetudine hominum se ad solitudinem conferret.

Quibus studiis dum parentum ignorantia diutius indulget, tandem in levem membrorum omnium impotentiam & resolutionem, ac mirificam eorundem jactationem incidit, horrendo & tristi parentum & adstantibus omnium aspectu.

Primis hebdomadis commendata curatione hæc viro doctissimo fuit, & in veteri medicina peritissimo, cujus methodica curatione cum nihil proficere-

tur,

tur, vocatus ei tandem curationis collega sum.

Qui ad primum conspectum symptomatum raritatem admiratus, tandem ex resolutione ac convulsione mixtam affectionem esse observavi, ex duobus scilicet contrariis motibus compositam.

Itaque ut causam hujus rei cognoscerem, postquam de vitæ victusque genere edoctus à parentibus essem, ad pulsum & urinam animum intendi, & diligenter observavi, num talia hæc essent, quæ huic morbo consentirent.

Cum itaque pluribus vicibus pulsum experirer, apprehendi eum aliquando parvum, aliquando magnum, quandoque durum, & rursus paulò post mollem, semper verò in uno ac pluribus pulsibus inæqualem esse.

Quo cum variæ etiam occurrebant urinarum permutationes, utpote quæ subinde crassæ, subinde turbidæ, modò tenues & spicæ, modò subfuscæ, & rursus deinde albæ, crassæ & turbidæ viderentur, crassa & viscida sua superficie matulæ lateribus adhærentes.

Cujusmodi diversorum morborum significationem habere, & non ejusdem curationis indicationem, supra ex Galeno ostendimus.

Præterea non infidum quoque scorbuti argumentum continere, si tales citra manifestam veteris morbi significationem sint & occurrant.

Quem etiam in hac certa sceletyrbes nota, crurum suræ dolor prodidit.

Nam cum aliquando meo jussu in pedes eam mater erigeret, magna celeritate alternatim crura ad se attraxit, ut ne momentum quidem temporis ea terræ affigeret, de cujus causa interrogata, respondit multo conatu & labore, à suræ crurum dolore id sibi evenire. Unde nos certum hujus morbi indicium habuimus.

Cujus curationem tum voluntariè distulimus, quòd non satis mihi de morbo cum collega conveniret, qui post dies quatuordecim in Holsatiam negotiorum suorum causa profectus, curationem nobis commisit, quæ perfecta nobis, DEI beneficio, in tot diebus fuit, etsi nec tum quidem ab hoc morbo hæc symptomata profecta fuisse, satis collegæ meo persuaderem.

Erant

Erant hujus puellæ parentes omnium testimonio probi & honesti, sed meliore fortuna dejecti, quemadmodum nonnunquam advenire bonis solet, quibus minus propitia fortuna esse consuevit, quò magis ab hac vita ad æternam & immortalem suspirent & adniantur.

Unde consequi porrò solet, ut circa victum tales minus diligentes ac curiosi, ex uno incommodo & malo in aliud incidant, communi dicto fidem facientes, quod unam calamitatem solam diu subsistere negat.

Hac ipsa membrorum omnium jactatione ac concussione, cujusdam Embdani chirurgi infans laboravit, tristi etiam omnium aspectu. Præter hos neminem hac tristi affectione infestatum vidi. Tam varii sunt affectus, quos hic morbus edit, ut minimas omnium differentias numero comprehendere, non magis ferè possibile sit, quàm arenam maris numerare.

*Lactatione
membrorum
laborantis
historia.*

Observatio LI.

Tertianæ febris typo plures ab hoc morbo hisce præteritis annis laborarunt, quàm ut numero comprehendi possint. Quamobrem ex his eos tantùm hic describemus, quos cum hac febre rara quædam & tertianæ febri minus usitata symptomata apprehenderunt, tam tertianæ veræ, quàm nothæ & spurix in-cognita.

*i. Ad Glau-
comem.*

Galenus libro de crisibus, & febrium differentiis, & alibi, tertianas febres tu-tissimas dixit. Quem si in nostris quibusdam tertianis secuti nos fuerimus, plurimum certè à scopo & prædictionis veritate aberrabimus. Etsi veriùs cen-feri illæ possint speciem veteris tertianæ mentiri & falsò repræsentare, quàm ve-terum tertianam exprimere.

A qua præter alia signa manifestâ di-
stinctione eas quoque separant & dis-
cernunt, præter pulsum & urinam, fe-
bris mores & natura. Sicuti manife-
stum hujus rei documentum nuper ha-
buimus in nauta, Doctoris conjuge,
Anglo, aliisque quàm pluribus. In
quibus ne quid de urinis dicam, & varia
ea-

earum permutatione, pulsus etiam in ipso febris vigore ita parvus & inæqualis digitis occurrebat, atque senti-ri in febrium accessionibus solet. Quamvis intus urerentur, & variè corpus propter æstuantem intus æstum jactarent, & urinam eorum quidam crassam, turbidam & sublividam, ac nonnulli eorum planè sub nigram redderent.

Quæ etiam varia in nonnullis apparuit, & non ejusdem coloris, aut substantiæ semper, pro morbi, quod puto, aut naturæ victoria.

Quibus majore hujus morbi certitudine accedebat crurum lancinatio, & cum multa tensione dolor, qui Doctoris conjugii ac nautæ, mirum in modum infestus fuit & acerbus, ut hujus ratione febrem hi contemnerent, utpote cujus magnitudine, febris cruciatus & molestiæ obscurarentur, sicut fieri sub concurrentibus duobus malis, doloris magnitudine imparibus solet.

Nauta præter jam dictos dolores & lancinationes, anxietates etiam sub præcordiis infestantes, & per intervalla

recurrentes , expertus molestas est , cui etsi sitis molestior propter oris labiorumque siccitatem adesset , modica tamen humidi assumptione , illa placata sedataque fuit.

Qui tempestivè medicum consuluerunt , & debitè curati sunt , plurimi eorum supra sex aut septem paroxysmos non senserunt : quidam eorum quarto & quinto paroxysmo , alii tertio curati sunt.

*Historia eorum
qui à febris
scorbut. brevi
sunt liberati.*

Quo etiam Doctoris conjux curata fuit , etsi diu antè cum hoc morbo conflictata fuisset , priusquam in manifestum morbum ille erumperet.

Eodem curationis modo , & Generosi Domini Comitis Edtsardi filia à me curata , DE I beneficio , in octo diebus fuit , cum summa præcordiorum anxietate , etiam gravissimis hisce crurum lincinationibus , singulis paroxysmis infestata. Et Anglus ille , qui dum adhuc obambulare , & omnia domi ad foris munia obiret , aliquamdiu ante febrem urinas reddidit rubicundas , crassas & subfuscas , quarum emendationem dum negligeret , tandem quoque in febrem tertianam , tertio quoque die recurrentem , incidit , iisdem quoque medica-

men-

mentis propemodum restitutus, quibus priores.

Nonnulli horum, quos pedum lancinatio non vexavit, gravissimos dolores dorsi experti sunt, qui etiam hujus morbi indicio, non rarò cum his intermittentibus, & continuis febribus accidere & adesse solent.

Ita ut quos absque gravioribus symptomatibus corripit ab hac febre viderim, à communi tertiana, & veteribus cognita tertiana, eam distinxerint, cum dolor & lancinatio jam dicta, tum gravis angustia & respirationis difficultas, ad ventriculi regionem sub diaphragmate infestans atque divexans.

*Dolores dorsi
sæpe febres scor-
buticas comi-
tantur.*

Quæ hîc prælibare in genere volui, quòd cum his crurum lancinationibus, frequentes nobis hæ febres anno octuagesimo occurrerunt, & postea quoque non raro, nisi quod ab eo tempore æquè communes eas fuisse non meminerim.

Quod sic affectis advenire à vaporibus malignis ac venenatis videtur, qui ab hac putrefactione resolvuntur, & in intermedia musculorum spacia sese insinuant sua vel qualitate & viru-
len-

*Causa lancina-
tionis crurum in
scorbuto.*

lencia, vel continui solutione, hunc dolorem causantes.

Nunc exempli loco Doctoris conjugis historiam breviter hic pertractabimus, ne recessisse à libri scopo videamur, & ea intentione, quam in libri fronte promittimus, cujus historiam eò brevius enarrabimus, quòd quæ in hac, hujus morbi ratione observanda sunt, maxima ex parte nunc annotata & monstrata sint.

Historia conjugis Doctoris febris tertiana, scorbutica angustia & cruris lancinationibus laborantis.

Incepit autem hæc primùm gravissimo rigore febricitare, febre tertio quoque die recurrente, cum multa angustia, & gravissimis crurum amborum lancinationibus, quæ in secundo paroxysmo adauctæ magisque intensæ fuerunt, ut præ dolore exclamaret, & quò se verteret, nesciret, atque mille febres se pati malle diceret, quàm istos cruciatus intolerabiles.

Pulsus etiam in ipso febris vigore parvus & inæqualis erat, similis illi, qui in primis febrium accessionibus sentitur.

Urina verò crassa, alba & turbida, & insuper quibusdam sedimentis in matulæ fundum subsidens, superiore sua substantia crassa ac viscida matulæ lateribus adhærens.

Ego

Ego ex pulsu & urina non simplicem hanc tertianam esse, neque notham, solum cognovi. Cujus judicium lancinationes validæ confirmabant, & angustia, ad præcordia infestans, ac spiritum difficilem reddens.

Itaque iis, quæ aperiunt, febremque extinguunt, ea miscui, quæ in sceletyrbe usus probavit, à quibus tertio vel quarto paroxysmo, hæc à sua febre liberata DE I gratia fuit, cujus nomine sit DEUS benedictus, & in æternum laudatus. Alii cum his febribus urinas rubras & subfuscas reddiderunt, alioqui reliquis signis parum vel nihil discrepabant.

Atque hæc dicta de lancinationibus, & variis musculorum doloribus sint, quos hæc febris excitare consuevit. Nunc sequentibus observationibus rara quædam symptomata pertexam, quæ cum his tertianis inciderunt, ex quibus manifestò cognosci possit, plurimum à veterum tertianis has discrepare, si cui fortè ab hisce lancinationibus id persuaderi non possit.

Observatio LII.

AB hoc ipso morbo scorbuto, vel specifica hujus putrefactione, tertiana febre seu tertio quoque die recurrente febre, ægrotare Embdæ adolescens cœpit, annos natus viginti plus minus quinque. Hic in initio urinas rubras, subfuscas & sublividas reddidit, similes illis, quæ reddi in quartana febre solent; nullis alioqui symptomatibus infestatus. Quarto paroxysmo leviter delirabat. Quinto profundo somno, caro scilicet correptus, absque omni sensu ac motu jacuit, ut ne digitum haberet quem dimoveret, & sola respiratione à mortuo differret.

A quo nullis nostris vellicationibus clamoribusque excitari, atque revocari ad se potuit. Etsi quandoque post nostras vellicationes, punctionesque leviter oculorum palpebras attolleret, statim tamen rursus illæ conveniebant, ac concidebant. Idque malum cum singulis febrium accessionibus recurrebat, iisque desinentibus spontè solvebatur, etsi obtusiores tum quoque sensus viderentur, neque planè integri, sed quodam quasi stupore præoccupati.

Pul-

Pulsus celer, parvus & inæqualis erat, & varii ac diversi coloris urinæ, ut plurimum verò substantiâ crassæ & subfuscæ.

Symptomatis hujus magnitudine ac novitate in initio perculsus, diu mecum dubitare coepi, & diligenter cogitare, ad quam causam ac morbum potissimum hoc symptoma, & febrem hanc referrem, quòd tertianæ neque veræ neque nothæ accidentia hæc esse, sed potius præter ejus naturam hæc apparere, ex veterum placitis ac scriptis liquidò constaret. Quandoquidem bilis, cujus comes veterum tertiana esse solet, magis de sua natura *ἀγρυπνίας* excitare nata est, & vigilantiam, quàm carum & cataphoram. Atque huic meæ conjecturæ, præter pullum, urina subscibebat crassa & subfusca, utcumque tertianæ typo febris luderet, quod magis ad fallendum medicinæ artifices fiebat, quàm ut ejus naturam repræsentaret exprimeretque.

Itaque diutius hæc examinanti, ac diligentius febris naturam & mores consideranti, animadversum mihi ex pulsu & urina fuit, manifestè super melan-

lancholici humoris putrefactione attestante, hujus quoque farinæ hanc febrem censerī debere. Cujus putridi vapores, cum virulenta, tūm frigida hujus morbi qualitate affecti, & sursum ad cerebrum & caput delati, torporem hunc, ut torpedo piscis, nervis afferrent, unde solutis omnibus sub capite, & ipsius quoque capitis nervis, omnibus corporis membris motus ac sensus interciperetur auferreturque.

Quemadmodum etiam ab hoc morbo Concionatoris filio advenit, & cuidam Senatori Stadenſi, atque duobus in agro matrimonio copulatis. Item Concionatori quinquagenario & duobus ex Flandria, aliisque quàm plurimis. Qui idem ab hoc morbo passi sunt, ob vaporum ac spirituum frigidorum copiam, qua hæc putrefactio abundat, quemadmodum ex prædictis laucinationibus & variis doloribus, ab hoc morbo excitatis, facilè cognosci ac dijudicari potest.

Itaque ab his de morbo & morbi causa, ut dixi, instructus, exquisitissimis, quæ huic morbo convenire potissimum putavi, medicamentis, curationem, hanc aggressus sum, quam divina gratia
fa-

*Causa carin
febris scur-
buticis.*

favente eò perduxī, ut à febre & hoc malo liber æger, pristinae sanati & integris rursus sensibus ijs restitueretur.

Quæ autem huic caro potissimum conducant, supra in morbi enarratio-

*Pag. 67. &
203. Vide infra
374.*

ne ostendi, ut nihil molesta eorum repetitione hic sit opus. Voluimus autem prolixius hæc hoc loco recensere, ut cognoscamus, quam fallaci morborum specie hic morbus ludat.

Quod ideo permittere Deus videtur, ut hoc modo iram suam adversus peccata ostendat, dum novis & inusitatis morbis & ægritudinibus, nunquam prius cognitis ac visis, mortale genus in ira sua visitat & castigat. Ut etiam vulgus nostras morborum novitate admonitum, intelligat differentes hujus temporis febres ac morbos esse, ab iis, qui ante aliquot annos homines afflixaerunt. Agamus igitur DEO gratias, quod pro sua infinita misericordia ac clementia tam benigne eos nobis revelare dignatus sit. Cui pro hoc ejus beneficio, atque omnibus erga nos meritis sit laus & gloria in secula seculorum. Amen.

*Quare Deus
permittat scor-
butum fallaci
morborum spe-
cie ludere.*

Observatio LIII.

Simili tertiana ab hoc morbo correptus Embdæ Anglus est, cui nomen Ritzhardo Best, etiam cum urinis rubris & crassis, in quibus in matulae fundum multa subsidebant sedimenta crassa & subrubra, à quibus tota & superior urinae substantia nihilo clarior apparuit, sed aequè turbida perstare visa est. In quibus quandoque variè etiam mutatus substantiae color est.

Huic idem quoq; evenit quod priori, alio tamen & diverso symptomate, ut à vaporibus ab hac putrefactione ascendentibus, & cerebrum penetrantibus, varijs & frequentibus convulsivis motibus, singulis recurrentibus paroxysmis corripere, adeò gravibus, ut in lecto à pluribus adolescentibus eum detineri fuerit necesse. Quod etiam à specifica hujus putrefactionis qualitate, nervos pungente, ei advenisse, dubium esse non debet: quam secum vapores ab hac putrefactione elevati deferunt & attollunt, variè homines, pro varia corporum di-

dispositione, & differente humorum, à quibus eleuantur, qualitate & natura, afficientes: ac certum de sese indicium ac signum præbentes, non à simplici tertiana, aut communi humorum putrefactione malum illud excitari, sed peculiari & specifica ac maligna & venenata qualitate prædita, quæ de sua natura nervis adversa & infesta, hunc nervis vaporem emittat & ablegget, ejusdem, cum sua origine, efficacis ac facultatis.

Nam si ante tot secula aquarum depravatarum usu difficilia & nervis infesta mala Cæsaris militibus extantillo tempore, quo circa Rhenum sunt commorati, advenisse Plinio & post ipsum alijs credimus, quid dubitamus nobis eadem, atque alia his majora, ex continuo earum usu, ac aeris aptitudine evenire posse & debere? Itaque ab ijs collectionem faciens, cum similitudinem eadem sit ratio, porro ad pulsum & urinam cogitationes direxi, sintne eadem illa hic, quemadmodum huic morbo ea familiaria esse, jam antea cognoveram: quæ in dijudicando ac discernendo hoc morbo pluri-

munum momenti habere, antea sæpe admonui.

Ab his igitur cum confirmari mihi de hoc morbo iudicium viderem, certus ad curationem accessi, quæ certissimo experimento rationis inventum confirmavit ac comprobavit. Siquidem ab hausto semel atque iterum medicamento huic morbo accommodato, statim mitigari sibi hos paroxysmos, & post triduum integrè curari sensit, magno artis medicæ encomio, & præsentis ægrotantis, quod plus est, salute.

Observatio LIV.

AB hac ipsa tertiana febre tertio quoque die recurrente, diutius laboraverat unicus Concionatoris Embdani filiulus, liberali facie & forma puer, antequam gravioribus symptomatibus corripereetur. Cujus causa febrem ejusque curationem tum parentes negligebant.

Accidit autem quodam paroxysmi die, cùm fortè in vicinia essem, ut subito & de improvviso puer hic, cùm nihil minus parentes cogitarent, pluribus

bus motibus convulsivis, magna omnium consternatione & acclamatione corriperebatur: Et ab ijs somno alto & profundo, ex quo nullis nostris clamoribus excitari potuit.

Fuerant & hujus quoque urinæ, quas durante febre, & ante has convulsiones reddiderat, tam colore quam substantia variæ, aliquando citrinæ, tenues & spicæ, aliquando crassæ, rubræ & subfuscæ, multis crassis & subrubris sedimentis in matulæ fundum subsidentes, & nonnunquam glaucæ, & coloris omnino aquei, quales etiam tunc erant, cum ad invisendum eum à parentibus invitaretur.

Ex quibus non simplicem hanc febrem esse, sed alteri morbo implicitam, etsi diu antè perspexissem, nolui tamen temerè curationem spontè urgere, etsi cum patre propter communes literas, & publicam ejus functionem, alioquin familiariter viverem, quòd in ea urbe plærifq; ferè persuasum sit, puerorum morbos medicinæ præceptis non subjacere. Quò tamen hunc puerum tandem devenire necessitas ac symptomatum magnitudo coegit.

Itaque à patre viro docto, probo & humano requisitus, si quid auxilij huic morbo natum esse cognovissem, id ei communicarem, & filiolo suo unico conferrem, ijs quæ febrem mitigant (nam prius febris conditio & status mihi perspectus erat) & venas modicè aperiunt, ex scorbuticis medicamentis potissimum nasturtij succum admiscui.

Nasturtii aquat. succus in cario efficax.

Quod hunc succum ut ad scorbutum, sic ad somnum facere, contra Fernelium Ambianum, summæ authoritatis medicum, non minoris estimationis & eruditionis vir, Guiljelmus Rondeletius defendat. Cujus sententiæ in hoc casu nos accedere studium veritatis cogit. Fuit autem refracto vi pueri ore, hoc medicamentum ei ejectum. A quo statim, ut ad actum deductum medicamentum per naturam fuit, ad se puer redijt, qui prius nullis nostris clamoribus à somno excitari ac expergeri potuit.

Observatio LV.

HAc ipsa febre tertio die recurren-
te, & ab hoc morbo, vel specifica
hujus

hujus morbi putrefactione excitata, correptus anno octuagesimo quinto quidam generis nobilitate clarus fuit. Qui à sanguinis missione, qui planè impurus cum manifestis hujus morbi indicijs fuit, & post ter quaterve haustum tum febris tum stomachaci accommodatum medicamentum, curatus ab hac febre, post secundum vel tertium (si rectè memini) paroxysmum est. Et si urinae quoque quas in initio febris aeger hic reddidit, rubrae, crassae & subfuscae apparerent, atque gravissimi morbi indicia continerent, nisi tempestiva impuri sanguinis missione, & convenienti medicaminum usu & exhibitione, morbo ejusque causae (DE I gratia) obviam ivissemus.

Delectatur enim cibus his melancholicis, & crassis, quia & ante meum ad eas regiones adventum tam cerevisijs, quam cibus decoquendis usus ille patrijs aquis crudis & sublimibus fuerat. Solet quoque hic aeger cum his urinis plerumq; annum suum morbum pati, qui etiam hac curatione tum remoratus, & pro ista instantia impeditus fuit. Quem porro DEUS

omnipotens ob omni malo protegat
& defendat, & diu incolumem Rei-
publicæ ac suis conservet, ad divini
nominis gloriam, & Ecclesiæ Christi
salutem & incolumitatem. Amen.

Observatio LV I.

Quartana febre, vel ad quartanæ
febris typum dierum accessione
alludente quartana, & cum hoc ipso
morbo communicante, atque ab hoc
dependente, diutius bibliopola Emb-
danus laboraverat, priusquam in no-
stri noticiam veniret, atque de hoc
morbo nobiscum communicaret. Quæ
etsi quarto quoque die suas accessio-
nes haberet, & hoc ipso quartanæ fe-
bris typum repræsentaret: nullis ta-
men præterea signis & symptomatibus
veterum quartanæ respondit. Nam
neque horrorem, neq; calorem quar-
tanis similem ostendit, & toto quoq;
genere ob ea pulsus, qui hic nobis oc-
currit, discrepabat, utpote qui etiam
in ipso febris vigore, & ejusdem incre-
mento ac statu, nativam suam parvi-
tatem inæqualitatemq; retinebat, &
exercitatis, prima manus ad pulsum
appli-

applicatione, facile utriusque differentiam, & fictam atque fallacem febris quartanæ speciem ac formam prodebat, eandem quoque quam in febris vigore & incremento parvitatē inæqualitatemq; ostendebat, in febris remissione & intermedia quiete, non fallaci hujus morbi indicio retinens & conservans.

Cui majore certitudine urinæ quoque variæ subscribebunt, quas diversorum morborum concursus significare, & non unius neque simplicis morbi notam habere, supra ex Galeno ostendimus. Ut ex his toto genere hanc febrem à veterum quartana discrepare, facile perspicerent, qui exercitatum in dignoscendis morbis ingenium habent, atque singulorum morborum pathognomonica signa memoriâ tenent. In quibus prius exerceri illum necesse est, qui cum fructu hæc nostra legere, atque in usum rectè transferre hæc & accommodare volet. Nam qui nova à veteribus distinguere cupit, necesse est vetera omnia prius perspecta habeat, ut quibus ab his illa discrepent, quibus consentiant, cognoscat: alioqui rationi
con-

consentaneum est, neque unum neque alterum eum cogniturum esse.

Sed ut ad historiam revertamur. Utcunque hic diuturniore hac febre prius diutius debilitatus fuerat, tamen media ferè hyeme in tribus vel quatuor plus minus hebdomadis, nostra opera ab hac febre liberatus DEI beneficio fuit, etsi plurium dierum languor fuit, utpote quem non ita facile ex longiore morbo evincere ac superare natura potuit, nunc tamen pancratice valet, à morbo integrè confirmatus.

*Historia quar-
ana scorbutica
& laborantiam.*

Eodem tempore quo hic, media etiam hyeme, ab hac ipsa febre quartana, ægrotabat Domina Margareta, Illustris ac Generosi Comitis Edzardi natu maxima filia, cui cum multa anxietate & respirationis ad præcordia difficultate singulis paroxysmis recurrente, hæc febris conjuncta erat, ita ut molestior S G respirationis difficultas, quam febris aut calor esset. Hæc etiam media hyeme sub nativitatis festum, nostra, laus DEO, opera, in decem plus minus diebus valetudini restituta fuit, nisi quòd aliquando post levis ejusdem febris significatio perman-

maneret, quæ etiam secundo nostro ad aulam adventu, in paucis diebus integrè sublata fuit & curata, cessante cum hac febre & respirationis difficultate: utpote quæ hujus comes apodicticum hujus morbi sceletyrbis signum continebat. Hac nunc valet, Domina modesta, pia, & benigna, sacrarum literarum lectioni addictissima.

Simili febre cum simili pulsu & urinis crassis & albis, puer iste laboravit, cujus in universali morbi enarratione mentionem fecimus, ut propterea rectè dictum à Galeno sit, febres non dierum accessione, sed signorum proprietate dijudicandas esse. *Lib. I. de diff. feb. cap. 10.* Nam si ex accessione has febres dijudicassetus, neque de curatione æquè certi esse, neque prædictione vera prælagire potuissemus, sed circa utrumq; aberrare necesse fuisset. Quatenus ex morbi noticia utriusque certitudo, tam curationis, quàm præscientiæ & prænotationis oritur.

Atq; hinc fit, quòd ex morbi hujus ignorantia, quædam febres apud nos adeò sint diuturnæ, ut nullis medicorum medicamentis expugnari queant, &

& sæpe ad annum unum, duos aut plures perseverent, nec nisi cum temporis mutatione in robustis desinant, vel in alium & deteriorem morbum aliquando cummutentur, iisque non raro debiliores succumbant, sicut aliquibus exemplis, si necesse esset, hic demonstrare possemus.

Hujus generis quoque febres sunt, quæ sub vernum tempus incipientes, primum tertio quoque die tertianæ febris typo occurrunt, & post septimum paroxysmum, nisi cum ipso desinant, quotidie infestant, & ad festum Divi Jacobi vel circiter ferè extenduntur & perseverant, nisi legitimè, & his simul ad scorbutum facientibus medicamentis curentur. Aut etiam si hanc temporis mutationem superaverint, ferè annales sunt, & ad proximum ver transeunt.

Cognoscuntur autem cum hoc morbo communicare, aut ab hac putrefactione accendi, cum ex pulsu parvo & inæquali, tum etiam ab urina crassa & subsidentijs jam dictis conspicua, vel eadem varia: Siquidem in his sic affectis nisi crassa, rubra, & subfusca urina fuerit, aliquando & citrina
occur-

occurrit, aliquando crassa, subinde aquea, mox rursus turbida & rubra, Unde non unius neque simplicis, sed plurimum & complicatorum morborum præsagium sumi, antea ex Galeno ostendi. Has febres etiam his medicamentis profligari & tolli, nostro qualicunque experimento non semel comprobatum est, & hoc ipso tempore dum hæc scriberemus, in quodam nobili Gandavensi, qui supra mensem ab hoc morbo cum gravi tussi, & multa pituitosa ac crassa expuitione, graviter divexatus fuerat.

Hinc nunc, laus DEO, vivit & valet, horum medicaminum præsidio pristinae sanitati, DEI beneficio, restitutus: ob pietatis studium & propensum ejus in pauperes affectum, longiore immò Nestorea vita dignus. Hæc breviter hic, & ad hanc historiam attexere volui, quòd sciam maximo artis nostræ contemptu, nullam hæctenus hisce febribus medicinam inventam esse, atque frustra elapsis retrò annis, & nullo ægrotantium commodo ac bono, curationem harum febrium attentatam fuisse, ut propterea non immeritò vilescere, apud nos & in hisce regio-

*Causa, ab qua
medicina apud
nos vilescere co-
perit*

regionibus medicina cœperit, postquam ejus auxilio & ope nullam arceri depelliq; posse febrem, vulgus nostras animadvertit.

Quæ in hunc finem ab hominibus & majoribus nostris inventa, atque à Deo optimo maximo monstrata fuit, ut sanitatem integram conservaret, profligatam verò restauraret, morbos pellendo, eorumq; causas & occasionem præcidendo, ubi tempus & naturæ vires id permetterent, aut ratio & causa nulla physica id impediret. Cujusmodi nihil hic intervenire, & tamen omnem curationem methodicam has febres respuere, cum animadverterem, magna artis & laborantium seu morbos curantium medicorum ignominia atq; pudore, non potui non mecum statuere ex causa morbi, ejusdemque ignorantia, necessario id provenire debere, scilicet quod in morbo, ejusve causa, ac per consequens ejusdem curatione aberrare medicinæ artifices contingeret.

Itaque diligentius omnia excutere cœpi, & multo studio ac labore omnia morborum signa examinare, & ad pulsum & urinam attendere, si
for-

fortè sic errorem deprehendere, & ab his in morbi noticiam & per consequens rectam ejusdem curationem descendere ac penetrare possem. In qua quantum profecerim, aliorum judicio permitto, qui post nos ex hac nostra imitatione periculum harum curationum sunt facturi.

Hoc sine arrogantia dicere possum, *Prognost. 49.* me certam harum febrium curationem promittere omnibus audere, qui nostris præceptis ac monitis obtemperare, & in assumendis hisce medicamentis consilium nostrum sequi non detrectant. Siquidem (absit arrogantia dicto) non minus certò harum febrium curatio mihi nota est, atque digitorum numerus. Cujus nomine soli Deo laus & gloria, qui solus medicinæ monstrator, ejus scientiam hominibus aperit & ostendit, ut bonitatem suam & propensum suum erga genus humanum amorem declaret, & rursus ob hæc & alia ejus innumerabilia in nos officia ac beneficia, nomen illius à nobis prædicetur ac glorificetur. Quapropter in omni curatione, in eum solum intentos oculos ac mentem habere, tam me-

medicum, quàm ægrotantem decet, ab eo operis sui benedictionem expectantes.

Observatio LVII.

PLures mendaci quotidianæ febris typo ab hoc morbo ægrotarunt, quàm ut numero hic comprehendi queant. Quare hic etiam uno atque altero exemplo contenti erimus. Ex quorum petractione de similibus non difficile iudicium erit, ijs qui post nos attendere ad ea quæ dicuntur, & eadem nobiscum experiri volent. Pluribus enim ad singula attendentes, à veterum quotidianis, has nostras febres discrepare, signis & symptomatibus depræhendunt, quibus magis, quàm dierum accessione febres dijudicandas esse norunt haud dubie ij, qui in Galeni placitis sunt exercitati.

Occurrit autem inter cæteros hac febre infestatos quædam illustri loco nata Domina pulchra & venusta. Quæ sub id tempus dum hæc scriberemus, & gravissima hac febre quotidie invadente

ccer;
 xpe-
 ebris
 runt,
 nendi
 atque
 Ex
 libus
 post
 t, &
 Plu-
 tes, à
 as fe-
 oma-
 agis,
 diju-
 die ij,
 xerci-
 s hac
 loco
 Quæ
 mus,
 inva-
 dente

dente correpta fuit. Quæ in initio cum
 lento frigore incipiebat, quod subinde
 horas sex, aliquando septem & plures
 durabat, priusquam calor accenderetur,
 post quas paucis incrementis calor ac-
 cendi, & ad exteriora redire cœpit. Sub
 vigorem morbi gravissima siti infestata
 fuit, ut quidlibet leniendi sitis causa bi-
 beret & appeteret. Urinæ variæ erant,
 ut longo tempore nemo nobis occurre-
 rit, qui plures & magis faciles urina-
 rum permutationes pateretur, atque
 hæc.

Nam cum aliquando ex laudabilio-
 ribus urinis certam morbi solutionem
 nobis promitteremus, non ita diu post
 ejusdem spem nobis ademit, eadem quan-
 tum prius, cruda & tenuis, vel subtur-
 bida, & paucis sedimentis crassiusculis
 conspicua, à quibus nihilo clarior supe-
 rior & supereminens supra hæc urinæ
 substantia eminnit.

Quotiescumque in lecto se erigebat,
 vel de lecto surgeret, ilico animo li-
 quit, vel ad linquendum prona fuit,
 quod planè præter morem & consuetu-
 dinem ei advenit. Pulsus in accessio-
 ne febris (ut fieri solet) parvus erat
 & inæqualis, circa vigorem verò ma-
 gnus

C c

gnus & durus, extra paroxysmum parvus
rursum & inæqualis, quem huic morbo
familiarem esse, supra in tractatione de
pulsu dixi.

Usa semper hæc per sanitatem ab an-
no 20. fuerat, tam cerevisiis, quam
cibis decoquendis, aqua patria cruda &
sublimi. A quibus propter temperamen-
ti bonitatem, qua gaudebat, pluribus
annis nullum senserat incommodum:
Temperamenti beneficio & innati ca-
lidi vi ac robore, ea quæ sua natura
cruda & vitiosa erant, in succi bonita-
tem, & laudabile corporis nutrimen-
tum convertens. Nam ut præstanti for-
ma erat, ita à primis exordiis atque
ab ipsa nativitate temperamentum con-
sequuta laudatissimum est. Non potuit
tamen longiore & assiduo earum usu
vergente paulatim ætate, vel corporis
robore *impulso* prætergresso, omnem o-
mninò poenam evitare, quin à commu-
ni causa, communem quoque mor-
bum, cum aliis pateretur, & ab his
aquis quasdam crudas & indigestas a-
quositates cumularet, quæ alieno ca-
lore accensæ, propriam & huic mor-
bo peculiarem putrefactionem subirent,
de-

depravatarum aquarum naturam & conditionem referentem.

A quibus etiam, æstuante intus calore, utcumque tenues subinde & crudæ urinæ apparerent, densæ fuligines, crassa humiditate imbutæ, resolutæ, & sursum ad os & linguam elevatæ, adeo linguam & fauces affecerunt, ut vix multa diligentia ab his eas partes vindicaremus. Solent quoque in assumendis diutius medicamentis, si non statim omnia ex voto succedant, illustriore loco nati ferè difficiliores esse. Nec desunt qui ad gratiam loquentes & ad blandientes, dum officiosi videri ac complacere volunt, sæpe magno principum damno & malo, recta & utilia consilia remorantur & impediunt, facili momento isthuc ægrotos impellentes, quò spontè omnium natura inclinant.

Illustri loco nati ad medicamenta sumenda ferè difficiliores.

Quod nos quoque in hac curatione experientes, vix quatuordecim diebus perfecimus, quod in decem diebus plus minus absolvi & præstari à nobis minore molestia potuisset. Sicut intra hos dies, & septimo (ni fallor) ab eadem febre, eodem ferè tempore curata prædictæ ægrotantis filia fuit,

Historia laborantis quotidianæ scorbutica.

annos nata plus minus duodecim. In qua non minus operosa hæc curatio fuit (etsi sæpius intra octo, ni fallor, dies ab his medicamentis certam curationem ei DE I gratia promitterem) quod æquè in assumendis iis difficilis & tarda esset atque mater. Quæ septimo die ut prædixeram curata fuit, uti decimo tertio die vel quarto mater, magna omnium læticia. Quod propter animi deliquia, quæ perpeffa semel atque iterum hæc fuerat, omnibus desperatæ valetudinis videretur, ut non satis domesticos confirmare, & hanc opinionem ipsis evellere in primis diebus potuerim.

Est enim Domina benigna & affabilis, iram facilè remittens. Et Domini sui observantissima, in id attenta, quomodo tristem Dominum suum reficere, ac blandis colloquiis, & suavissimo suo convictu, eum recreare ac oblectare possit. Mansit autem pluribus diebus debilior, quod à febris remissione, nullum catharticum admitteret. Quo factum, ut ex morbi & causæ morbi reliquiis non satis purgatis, subinde facili tumore & inflatione facies ei intumesceret, quæ eadem facilitate, qua

cor-

*Reg. diagn.
gen. 24.*

corripiebat, subinde evanescebat, etiam *ex tumore faciei*
 hujus morbi argumento quod eveni- *facile subinde*
 re sic affectis propter multos fla- *evanescente.*
 tus solet, quibus hæc materia abun-
 dat.

A quo malo levi cathartico postea
 liberata est, quod ex foliis senæ &
 rhabarbari infusione, si rectè memini,
 sibi ipsi parabat. Ea nunc vivit Domi-
 na benigna & affabilis. In qua præter *Signa scorbuti.*
 febrem, scorbutum morbum demon-
 strabant frequentes urinarum absque
 causa mutationes, præterea facilis li-
 pothymia, quoties se ægra moveret,
 nec non febris species, ejusque acces-
 sionis modus, ultimò & facilis infla-
 tionis modus & evanescencia, quibus
 adnumerari præcedentis victus ratio
 potest, vel aquarum jam dictarum u-
 sus. Cum iisdem & similibus ferè uri- *Historia quo-*
 nis, ab hac febre nuper Antwerpianus *tidiana scor-*
 laboravit, cui præter cætera etiam mo- *butica labo-*
 lestæ frequenter angustia erant, ad *rantium.*
 præcordia sub diaphragmate infestan-
 tes. Qui iisdem etiam ad febrem &
 scorbutum facientibus medicamentis,
 à nobis brevi, DE I gratia, à gra-
 vissimo suo morbo restitutus est. Sicut
 altera nuper puerpera, quæ cum gra-

vissimis ventris torminibus, eandem quoque febrem experta est.

Observatio LVIII.

Simili febre, quotidianæ typo ludente, prædictæ & jam descriptæ ægro-
tantis filia, à natu maximâ tertia labo-
ravit, Domina quoque pulchra & ve-
nusta. Quæ post inordinatas febrium
accessiones, quibus tota hyeme, ali-
quando post mensem, aliquando post
septimanam unam, duas aut plures, nul-
lo aut magno calore aut frigore mole-
stis correpta fuerat, tandem sub vernum
tempus, in hanc febrem quotidie recur-
rentem incidit, quæ singulis paroxy-
smis præter frigus & calorem, maximis
& infestissimis tam ventris quàm intesti-
norum doloribus & torminibus, eam ex-
cruciavit, cum continuo ferè vomitus
conatu, & multis ad præcordia anxietati-
bus conjunctis.

Duravit frigus horas subinde duas,
aliquando tres. Quando prædictæ sub
præcordiis anxietates mire eam infe-
stabant, cum perpetuis, sed inanibus
ferè vomendi conatibus. Videtur enim

fic

em
sic affectis hic conatus aliquid levami-
nis adferre, quasi qui eo gravamen sub-
levare velle videantur, etsi paulò post
eadem rursus necessitas recurrat, perin-
de atque prius, hanc rejectionem urgens.

en-
gro-
bo-
ve-
rium
ali-
post
nul-
ole-
num
ecur-
oxy-
rimis
testi-
nex-
mitur
xieta-
Estque hoc quoque inter cætera apo-
dicticum hujus morbi signum, si citra
gravantem ventriculum pituitam vel
manifestam viscerum inflammationem,
aut ventriculi exulcerationem fiat, sicut
curatio demonstrat, qua cum morbo hi
quoque conatus tolluntur & curantur.
Sed & graves quoque crurum dolores
ac lancinationes, hæc ipsa experta fuit,
non minus atque febrem ipsam mole-
stas. Quas etiam hujus morbi indicio,
cum his febribus incidere supra osten-
dimus.

Hanc historiam hoc loco adscribere,
priorique subjungere volui, ut melius
naturam hujus febris lector cognosce-
ret, atque hinc disceret, non simpli-
cem pituitæ, ut veterum quotidianam,
sed specificam hujus morbi putrefa-
ctionem, hanc nostram sequi. Idque
manifestum fieri, tam ab iis quæ cum
hoc morbo inciderunt, signis & sym-
ptomatibus, quam ab inordinatis acces-
sionibus, quæ per hyemem huic ægrotæ

*Materia quo-
tidiana scor-
butica.*

advenerunt, quarum soboles atque propago merito cenferi hæc febris, quæ sub vernum tempus quotidie incidit, debet: ex eadem, qua illa, putrefactione procreata, eaque cum temporis accessione aucta & cumulata.

Causa cur febris scorbutica ex inordinata quotidiana facta sit.

Quæ non quotidie tum (sicut postea aucta putrefactionis causa materiali) sed sine ordine hanc ægrotantem apprehenderunt, & aliquot quoque vicibus, quarto quoque die deinceps. Quandoquidem semel atque iterum per hyemem, post quartum quemque diem levissimis febris typis infestata fuit, quam propter typi levitatem tum contempsit, ne medicamenta à quibus alienior erat, assumere cogeretur. Ideoque neglecta causa, & cum tempore adaucta, in febrem quotidie corripientem erupit, præter accessionis diem cum veterum quotidiana nihil communicanrem, si signa & symptomata, quæ cum ea inciderunt, præterea morbi naturam & mores respicias consideresque. Quod curatio nostra quoque monstravit, quæ juxta prædictionem nostram feliciter nobis, DE I gratia, in octo diebus absoluta est, rationis inventum confirmans.

Ob-

Observatio LIX.

MIxtæ febris, continuæ scilicet & tertianæ typo ac specie, plures quæque ab hoc morbo laborarunt, quàm ut hîc commemorari omnes queant. Imprius verò Concionator Embdanus, vir pius & bonus, ac omnibus suo officio addictus. Qui cum tantis ventris & intestinorum torminibus ac lancinationibus correptus ab hac febre fuit, ut divelli sibi ac dilacerari omnia intus exclamaret, & præ doloris vehementia, quò se verteret nesciret, variè se & in omnem ferè formam convolvens, tristi omnium astantium aspectu & commiseratione. Ut non abs re scorbuti nomen hic morbus consequutus esse videatur, & rem cum nomine verè possidere.

Hic dolor cum paroxysmo semper recurrebat, eodemque remittente & cessante desinebat. Cum tertio paroxysmo in continuam abire febris hæc coepit, & post sextum rursus ac septimum postea diem intermittere, & ut prius, tertio quoque die infestare, cum iisdem, sed paulò remissioribus ventris & intestinorum doloribus.

*Reg. diagn.
gen. 25. ex ma-
culis faciei subi-
tò subinde eva-
nescentibus.*

Post tertium paroxysmum, subinde toto fere corpore, maximè verò circa pectus & faciem, maculæ purpureæ eruperunt, perinde atque si erysipelate pectus ac facies suffusa fuissent. Quæ eadem facilitate, qua subinde erumpebant, rursus subitò quandoque evanescebant. Quod sæpius & variis ac mutatis fiebat vicibus, sed absque ullo valetudinis incommodo, aut deterioris morbi, vel ingravescantis, aut remittendis morbi significatione. Quod non infido hujus morbi signo, aliquoties in his regionibus fieri observavi.

Gravis è toto corpore odor exibat, sua gravitate adstantium nares molesto odore feriens, facies variis coloribus & maculis distincta videbatur, adeò ut sibi ipsi similis non appareret. Cum quibus conjuncta summa respirationis angustia erat, ad præcordia ex intervallo infestans. Sed & crebro vomendi conatu vexabatur, quo parùm aut nihil sæpe egerebat, sed qui inani suo conatu magis eum divexabat, quàm quòd dignum quid eo educret. Atque hæc omnia pessimo indicio delirium augebat, quod tamen momentaneum erat, & per intervalla recurrens.

Quot-

Quotquot ad invisendum eum officii
& amicitiae gratia conveniebant, post
eum laborare uno eodemque ore affirma-
bant omnes, & qui timidiore erant, ac
sibi metuebant, cum scrupulo ad le-
ctum ejus accedebant, aut procul à lecto
sibi cavebant. Et certè multa pestilentis
& mali moris febris indicia in hoc ægro-
to concurrebant. Nam malignæ febris
symptomata hæc omnia, quæ enume-
ravimus, esse, nemo medicinæ candi-
datus ignorat. Et nos quoque idem in-
dicassemus, nisi hujus suspicionem no-
bis exemissent, & à nobis removif-
sent, manifestæ febris, quæ præcesse-
rant & subsequerentur intermissiones.
Quæ, si Hippocrati credimus, salu- 4. aph. 43.
tares sunt quocumque modo fiant. Pul-
sus præterea parvus erat, nec non cre-
ber & inæqualis, & calor foris mitis,
intus verò urens. Urinæ rubræ & in-
tensissimæ rubedinis apparebant, sed
crasso & gravi sedimento subsidentes.
A quibus ut & à reliquis symptoma-
tibus, de specifica hac putrefactione quæ
scorbuti morbi est, admonitus, cura-
tionem sequentem institui. Primum
quòd alvus stricta esset, & biduum

*Curatio febris
scorbutica
mixta.*

396 SEV. EUGALENUS

torum substitisset, clysteri levi eam solvi, in quo pro evacuatione diacatholiconis ʒj. dissolvi. Inde modico misso sanguine, potionem aperientem ei præscripsi, cui, quæ ad hunc morbum facerent, medicamenta admiscui, ejusque potionis unciis tribus & s. addidi succi cochleariæ ʒ. ij. & s. Ab ea portione quater ac quinquies sumpta, liber à maxima febris vehementia, omnium bonorum votis evasit, mitigatis sedatisque symptomatibus, quæ cum febre eum invaserant.

Interea verò dum hæc fierent, Epati & cordi convenientia epithemata imposuimus. De quibus quia pleni medicorum libri sunt, nihil hîc opus longiore eorum commemoratione est. Ab his utcumque vis febris superata atque devicta fuerat, tamen quotiescumque biduum horum medicaminum usum intermitteremus, aut cerevisiarum ex patriis aquis decoctarum copiam ei faceremus, statim insurgere atque vires pristinas recolligere illa videbatur. Manebat enim ab hac curatione adhuc lenta febris, quæ vires fatigabat, & ad pristinum robur non facile eum redire sinebat. Quæ etiam ho-

horum medicaminum continuatione radicatus postea à nobis extirpata fuit, ut nunc laus Deo sanus vivat & robustus.

Ex hoc loco obiter admonemur, non adeo criminandum virum doctissimum, & celeberrimum nostri temporis medicum, Gulielmum Rondeletium esse, quod suo de peste tractatu doctissimo, pestem ex melancholici humoris putrefactione generari existimaverit, cum adeò atrocia, & à pestis symptomatibus non aliena accidentia, ab hujus putrefactione commoveri perspiciamus, quibus etiam illudi ac decipi summi medicinæ artifices possunt. Sicut manifestum ab hac historia & sequenti est, quas propterea hîc describere voluimus, ut de iis, quæ in morbi enarratione nobis dicta sunt & prolixius explicata, veritas constaret.

*Rondeletii de
pestis materia
opinio. sup. 185.*

Scimus enim, omnium medicorum consensu comprobatum esse, pessima à melancholico humore putrefacto atque corrupto accidentia excitari, membrorum scilicet putrefactiones, carbunculos, carcinomata, & id genus alia. Quibus symptomatibus

&

& signis adeò cum peste aliquando hic morbus collidit, ut non semel pro peste eam parum exercitati medici & empirici, magno errore, & ægrotantium incommodo ac malo, curarint. Quo magis animadvertere, & diligenter ad singula attendere medicum decet, ne prius curationem aggrediatur, quàm omnia ei perspecta, & ad amissum morbus cognitus sit, potissimum quando in hoc casu minus universalis pestis est, & ad paucas domos & familias illa adstricta, aut inter pauperes magis, quàm divites serpens.

*Scorbutus citra
contagium ori-
tur, & ex con-
tagio propaga-
tur.*

*Causa, cur plu-
res sæpe in ea-
dem familia si-
mul scorbutus
corripiantur.*

Nostra enim qualicumque observa-
tione hætenus observatum est, quemad-
modum citra contagium ex intrinsecis
humoribus hic morbus oritur, ita etiam
ex contagio eum propagari, eodem, quo
Gallicus morbus, modo. Quem etiam
citra contagium, & ex contagio, ortum
suum apud insulares habere literis prodi-
tum est. Quare mirari non debemus plu-
res in eadem familia hoc morbo corripì,
quibus eadem cibi ac potus ratio est, vel
mori, quibus idem circa medicaminum
exhibitionem abusus & error contin-
git.

Ita

Ita Embdæ cuidam familiæ ante biennium evenit, in qua ab hoc morbo & febre ordine omnes, unus post alium, matre excepta, cum tumoribus bubonibusque ægrotare cœperunt, nulla medicaminum ac victus ratione salubri, vel huic morbo & febre competente, gubernati. Quo factum, ut filii omnes, unus post alium moreretur, in universum verò quinque vel sex, postquam alius viginti, alius duodecim, alius quatuordecim plus minus dies, ab hoc morbo ægrotasset ac decubuiisset. Solus pater periculum evasit, ab hac febre consueto suo quo per singulos annos semel atque iterum laborare solet, morbo, arthritide scilicet vel podagra hac scorbutica correptus.

Ad eundem modum ante annum quoque alteri familiæ è regione alterius accidit. In qua prius, filius natus maximus, pluribus sursum ac deorsum eruptionibus, sicut fieri in cholera morbo solet, & huic morbo usitatum scimus, subito & præter spem extinctus est, à quo paulò post filius natus minimus, & ab eo filia natus maxima, & non ita diu post filiola natus mi-

*Historia eorum,
qui plures in eadem familia simul scorbutico sunt correpti.*

minima, ultimò famulus ægrotare cœpit.

Ego ad curationem vocatus, cùm nullam tota urbe pestem grassari scirem, diligenter ad pulsum & urinam, atque omnia quæ cum hac febre inciderunt, signa & symptomata animadvertens, manifestis indiciis & certis argumentis & validis deprehendi, sceletyrbes ac stomacaces ea esse accidentia magis, quàm pestis. Nam urina filioli, ut ab hoc incipiant, varia erat, modò crassa, modò tenuis, aliquando citrina, aliquando rubra, respiratio per intervalla difficilis, cum angustia sub diaphragmate conjuncta. Quod symptoma etsi illi cum peste commune est, est tamen in peste continuum magis, sicut supra in morbi enarratione a notavimus. Pulsus creber erat, sed parvus & inæqualis.

In puella seu filia manifesto indicio hunc morbum urina indicabat crassa & conturbata, in qua multa copia, in fundum, fabulosæ substantiæ excrementa crassa & gravia subsidebant, non secus atque si manus plena arenæ obscurioris; qualis circa litus

tus maris invenitur, foris ei injecta fuisset.

Cujusmodi etiam in falsa & mendaci pleuritide ab hoc morbo excitata, urina filiae Bastiani Wabbens civis Embdani apparuit. Quem certum, indubitatum, & apodicticum hujus morbi signum habere suprà ostendimus. Est enim hæc urina non huic solum symptomati, sed pluribus alijs, ab hoc morbo proficiscentibus, communis: fallaci scilicet pleuritidis ut jam dixi, specie, & pluribus pedum paralyfin, ab hoc morbo patientibus, nec non alijs, de quibus prolixius diximus suprà.

Præter has urinas etiam pulsum ostendebat parvum & inæqualem, neque crebrum, neque celerem, sed tardum potius, etsi maximis ex intervallo angustijs infestaretur, & sit infestata. Quale etiam similiter in pleuritide falsa prædictæ filiae accidit, ut ab hoc pulsu, prima manus nostræ ad pulsum applicatione, pleuritide eam laborare adstanti empirico, qui bis sanguinem ei subtraxerat, negaremus.

Ab his, quæ dixi, (etsi contagio hic morbus serperet) non cum peste, sed

De

spe-

specifica hac, quæ scorbuto debetur, putrefactione, morbum hunc & febrem communicare, certò persuasus, curationem ei competentem institui, à qua filia natu maxima à febre & angustis liberata, abscessum tumoremq; durum, crassum & dolorificum circa cruris summa ostendit, à quo postea chirurgorum opera, Dei gratia, restituta curataq; fuit. Nam nondum tum mihi medicamentum & pulticula, cujus supra in morbi enarratione mentionem fecimus, cognita probataque erat.

Filius quoque à quatruidui medicaminis hujus assumptione, melius habere cœpit, ut rursus cibum appetere, & confirmari ab eo videretur; sed quia subitò, & præter nostram quoq; spem & expectationem, sicut aliquando in hoc morbo accidere solet, ante medicaminum exhibitionem ac præparationem, natu minima filia, ab hac angustia de improvviso extincta, ac quasi suffocata fuit, magnopere fidem apud patrem amisimus, (etsi alioqui eorum, qui nostris medicamentis usi fuissent curatio, ad votum responderet) ut propterea medicaminum inter-

termisſio fieret & filius recidivam pateretur. Qui toties, quoties vel per biddum noſtris medicamentis uteretur, ſtatim manifeſtam morbi mitigationem ſenſit, ut hac curationis ratione ſæpius repetita, atq; ruruſum aliorum perſuaſione intermiſſa, pertractaſſere noſtra curatio ad octodecim dies fuerit, quo à patre dimiſſi fuimus, quod neſcio cujus, inprimis chirurgi quoq; inſtinctu & perſuaſu, medicaminum uſum teneræ iſti ætati inutilem, imo noxium & damnoſum pater cogitaret.

Cujus voluntati neceſſe fuit nos acquieſcere, etſi recuperandæ valetudinis ſpem ei faceremus, ſi noſtra conſilia ſequi, & puerum ad obediendum nobis iuvitare vellet. Potuiſſet (ut verum fatear) in paucioribus diebus & paucioribus medicamentis, curatio nobis peracta fuiſſe, ſi quantum pro ratione huius aeris intendere medicamenta oportuiſſet, exquisitè tum, ut nunc laus Deo, nobis cognitum fuiſſet.

Quapropter admonere hic, quemadmodum & in morbi enarratione factum à nobis ſcio, omnes volo, ut ſi cognito & perſpecto morbo, non ſatis à mitioribus medicamentis curatio

*Indicationes à
febre sunt a sæ-
pe autorem de-
ceperunt.*

procedat, eam non obstante febre & calore intendant, donec ad optatum finem perveniant, ita enim certissima speranda in his & similibus curatio est. Sæpe etenim me hisce præteritis annis, in hac curatione indicationes, quæ à febre & febris signis fumerentur, deceperunt, potissimum, apud Embdanos, ubi propter maris vicinitatem, ut aer crassus, frigidus & humidus est: Ita victus ratio crassa, nautica, vel excrementitia est, utpote quæ vel marinis constabat piscibus, vel recentibus, sed in stagnantibus aquis ut plurimum captis, vel carne plerumque bubula & crassa, aut anserum, anatum, & similibus aquatilibus, à quibus crassum & frigidum, nec non excrementitium succum corpori nostro suppeditari, omnes norunt, ut nulla demonstratione hæc res opus habeat.

Accedunt aquæ crudæ, sublimes & frigida, quibus decoquendis suis cerevisiis fere omnes, vel pleraque civium pars utitur. A quibus vel crassum, vel crudum & aqueum succum gigni necesse est, qui multam sui attenuationem ac calefactionem indicat, utcumque febrili calore accendatur. Quod paucis
hic,

hic, propter communem salutem, & multorum commodum ac utilitatem, cui hoc opus destinavimus, admonere volui. Restat nunc unum atque alterum exemplum præterea, pro rei jam dictæ confirmatione adducamus, quò magis fidem omnibus faciamus. Quod nulla re æquè atque exemplis confirmemur, juxta illud Galeni, dicentis, rationis esse invenire, at confirmationem ab experientia & rei probatione procedere.

*Lib. 5. de san-
tuenda cap. II,*

Observatio LX.

Hisce pestis indicijs, & falsis ac mendacibus ejus symptomatibus quibus ad pestem hic morbus quandoq; alludit, correpta quoq; cum mitiore febre, cujusdam nostratis olim Consulis Bolsuardiensis Regneri Cornelij filia fuit, ejusq; ancilla, uno eodamq; tempore, filia cum alterius cruoris abscessu duro & subrubro, & nigro atq; crustoso ulcere, super tibia: Ancilla verò cum duobus in inguine tumoribus, in unoquoq; uno, duro quoque & renitente. Cum quibus conjuncta levis sitis fuit, & urina citrina, manife-

sta fuscedine tineta. Satis autem levissima humidi assumptione facile placata fuit, etsi continuò & ipsis os ferè ficcum esset. Pulsus parvus utrique & inæqualis erat, per omnia talis, qualem in hoc morbo eum esse soleri dixi.

Ego ab hoc pulsu & urina subfusca, morbum ejusq; causam cognoscens, parentes bono animo esse jussi, & conceptam de peste opinionem deponere. Sed quia altius illa insederat, non facile evelli illa ex ipsorum animis, primis diebus tribus potuit, donec tandem ex nostra prædictione curationem procedere conspicerent, & nos liberè atque citra scrupulum hanc curationem tractare animadverterent, Opinionem enim de me conceperant, circa pestem ejusq; curationem, minus me promptum paratumq; fore.

Prognost. 50.

Ostendi autem tumores utriusque, medicamentis & cataplasmatibus externis discuti ac dissolvi posse, sed nigrum & crustosum illud ulcus, necessariò à reliqua cute & carne separari debere, si puellam salvam & crus illud conservatum vellent. Quod à simili ulcere, aliquanbo totum corpus in periculum venisse & aliquibus cruris mortificationem advenisse, nostra observatione

tione constaret. Quemadmodum id hodie unius puellæ, Embdæ nunc degentis testimonio, docere possum, quæ à simili ulcere eò devenit, ut alterum crus ei amputari fuerit necesse: quæ simili ulcere post aliquot annos, in altero crure correpta, nostra opera, DEI gratia, intra paucos dies non sine ægrotantis dolore, curata atque integræ valetudini restituta fuit, quòd ex simili ulcere alterum crus se amisisse diceret, ideoq; infortunium suum & calamitatem deploraret, quòd chirurgorum imperitia isthuc devenisset, & in istam calamitatem incidisset, ex qua medici industria liberari potuisset.

Quibus auditis obnixè me parentes rogarunt, ut uihil eorum, quæ ad valetudinem suæ filiae pertinere putarem, missum facerem: simul etiam ancillæ, ob pestis suspicionem ac metum in aliud & superius cubiculum traductæ, curam habere, ejusq; valetudinem mihi commendatam esse vellem. Id ubi ex officio me debere, parentibus ostendi, quibusdam ad sceletyrben præscriptis medicamentis, radicem morbi præcidendam putavi, quorum beneficio post sextū plus minus diē, corpus rectè

*Curatio febris
pestilentialis
scorbuticæ cum
tumoribus &
ulcere nigro at-
que crustoso.*

valere, actiones naturales integræ demonstrarunt.

Interea tumoribus adhibita cataplasmata ex chamæmelo, meliloto, parietaria, malva, bismalva & mercuriali, ad sufficientiam decoctis, fuere, quibus pro cataplasmatibus consistentia farinæ convenientes, & dolorem mitigantes, ex lini semine, item fœnugræci & hordei additæ fuere, cum mellis rosacei & olei rosacei sufficientia quantum ad cataplasmatibus formam & consistentiam satis erat. Eoq; cataplasmate citra dolorem tumores discussi dissolutiq; sunt: nigrum autem eo medicamento, quod suprâ in morbi enarratione exposuimus, à sana carne & cute intra sex dies separatum fuit, ut propterea nihil hic opus molestæ ejus repetitione sit.

Atque hoc curationis modo, si curatus nobilis ille fuisset, cui in morbi enarratione pedem mortuum ab hoc morbo fuisse, & postea animæ emigrationem magno ejus bono subsequutam tutus ab ijs, quæ subscuta sunt, malis evasisse, & juxta naturæ ordinem ac cursum vitam suam aliquandiu adhuc pro-

protraxisse. Sed (ut verum fatear) nondum etiam mihi tum satis hæc curatio cognita erat. Et de ea dubitare celeberrimos nostri temporis medicos, Doctorem Peucerum, ac Joannem Veierum video. Cujus causa celandam eam non putavi, quò pro temperamentorum ætatumq; diversitate ea variata, alijs illa accommodari ab alijs possit, & sic atrocia hæc mala & incommoda præcaveri queant.

Pro cujus revelatione, ut DEI bonitatem prædicare decet, ita præceptorum, per quem profecimus, suo honore privare non debemus. Quem Hippocratem fuisse supra quoque ostendimus, nigra ambustis similem curationem postulare docentem. Cujus doctrinam & admonitionem hic sequuti, & in alio quoq; cive Hamburgenfi, simili affectione laborante, vera eum dicere deprehendimus, ut meritò divini & magni viri nomen ille meruerit, aptum scilicet organum & accomodatum, per quod res magnas perpetua memoria dignas, Deus optimus Maximus operaretur, & toti mundo, atq; omni ab ipso posteritati communicaret & patefaceret.

*Hippocratis
laus.*

Quem

Quem toties præceptorem suum nominare Galenum non puduit, ei soli inter tam multas sectas veram medicinæ cognitionem tribuentem. Ut meritò parens & præceptor omnium medicorum haberi ille debeat & possit. Sed ad rem revertemur, quòd majores hujus viri laudes ac dona sint, quàm ut hac nostra oratione tenui & inculta, plenè prædicari illa, ac celebrari à nobis pro dignitate possint. Nam ab annis ferè viginti, quibus à scholis absumus, styli exercitium planè nobis neglectum fuit: Qui ob continuas (ut fieri solet) ægrorum visitationes, quibus occupati fuimus, & obscurorum authorum ac medicorum lectionem, multo situ & rubigine squallet & horret, ut metuamus, ne indocta hæc nostra oratio, fastidium paritura iis sit, qui eruditis politioribusq; legendis scriptis jam dudum assuefacti sunt.

Excusatio styli.

Ad quorum manus & doctas aures, si fortè hæc nostra scripta delata fuerint, obnixè eos oratos volo, ut ob causas supra allegatas, dictionis impuritatem nobis condonent, & boni consulant, sibiq; persuadeant, non tam
ora-

orationis elegantiam hic spectandam ac considerandam esse, quàm rei, quam tractamus utilitatem atque necessitatem. Qui hæc in publicum dedimus, non ut Grammaticam doceremus, sed curandi morbos artem.

Observatio LXI.

ARomatarij Groningani, qui Embdæ ad Delpht plateam, ut vocant, habitabat, conjunx, hac ipsa correpta, anno octuagesimo sexto fuit, cum continuo vomendi conatu, & multa ac infesta anxietate, per intervalla sub diaphragmate, è regione orificij ventriculi eam coarctante & impugnante. Quas reddit urinas, crassæ & subfuscæ fuere. Primis diebus nihil subsidebant. Tertio ab assumptis nostris medicamentis die, visæ crassæ & conturbatæ sunt, & crasso, gravi ac furfuraceo sedimento subsidere. Interea toto morbi tempore pulsus parvus & inæqualis fuit, nisi quantum nostris medicamentis paulatim assurgeret, & ad pristinum robur ac magnitudinem rediret.

Post sextum vel septimum, si rectè
me

memini, diem, cum meliusculè ab his nostris, tùm febrì, tùm scorbutò destinatis medicamentis, habere inciperet, & nonnunquam de lecto surgere, & ad focum redire atque igni per diem nonnihil affidere conaretur, ex insperato ortus ei circa cruris summum, non procul ab inguine, tumor crassus, durus & profundus & oblongus ac magnus cum dolore & rubedine fuit, certa pestis suspitione, utcunque mediocriter valeret, & manifestam allevationem semper ab assumptis medicamentis sensisset: adeò ut nulla nostra oratione eam removere, & ex animis ægrotantis ac domesticorum eximere eam tum potuerim, non obstante, quòd felicem ab assumptis medicamentis nostris curationis successum, & meliorem ejus valetudinem allegarem.

Quibus etsi aliquo modo persuasi in dictis nostris se acquiescere ostenderent, dubia tamen fide id factum fuit, donec tolli & auferri ea, quæ ad hos tumores nobis descripta in morbi enarratione, pulticula est, felicissimè intra horas ni fallor viginti quatuor plus minus, hunc tumorem viderent, &

& porro ad neminem præterea morbum hunc setpere animadverterent.

In hac fœmina morbum sceletyr- *Signa scorbuti.*
ben à pulsu parvo, debili & inæquali
cognovi, iis, quæ urinæ monstrabant,
febrilis caloris indiciis, minimè respon-
dente, atque ab his quæ morbi causam
profligant, ad pristinum robur & ma-
gnitudinem paulatim redeunte. Con-
firmabant judicium ab his certum &
firmum alioqui, angustia jam dicta,
ad ventriculi regionem premens, &
respirationem difficilem reddens: Præ-
terea urina rubra subfusca. Ultimò
curatio ab his medicamentis proce-
dens. Unde etiam Hippocratem argu-
mentatum esse, in aphorismis vide- *Aph. 17. lib. 2.*
mus, si cui fortè minus validum hoc
argumentum videri possit.

Quapropter non semper pestem à *Non semper tu-
mores pestem
arguunt.*
tumoribus judicare oportet, alioqui
& in Gallico morbo bubones tumo-
resque qui cum his incidunt, hujus
generis haberi possunt. Quod quàm
sit à vero alienum, ante nos disputa-
tum probatumque ab aliis fuit. Qua- *Omnia mor-
borum signa in
memoria ha-
bere debet.*
re perdiscenda cujusque morbi sym-
ptomata ac signa sunt, & ex his mor-
bi distinguendi, ne ægotantium er-

rore,

*Et assidue De-
um invocare,
qui pura consci-
entia medicinā
facere cupit.*

rore, ut hodie proh dolor nimis frequenter fit, unum morbum pro alio curemus. Neque putare debent, qui splendidis titulis, ac vivendi pompa hominum oculos obfuscant, ita satisfieri miseris ægrotis & suæ conscientiae, nisi etiam libris quotidie assideant, & in sedulo artis usu versentur, atq; diligenter, tum vetera tum recentiora expendant, eaq; inter se conferant, & quibus discrepent, quibus rursus conveniant, discernere discant.

Cum quibus etiam invocari nomen Domini debet, ut suo spiritu nos instruat, quo purā conscientia singuli in vocatione nostra ambulare queamus. Magna etenim audacia est, morbum aliquem curare, de quo tantum levibus conjecturis edocti sumus, & cujus riatura per omnia nobis non sit cognita atque perspecta. Ideoq; qui pura conscientia medicinam exercere cupit, omnium morborum signa in memoria habere debet, & ubique secum circumferre. Quod fit continua probatissimorum authorum lectione, & assiduo artis usu. Nemo enim nascitur artifex, sicut proverbium habet, estq; usus artium Magister, qui citra artis cogni-

Cognitionem mutilus est. Sicut de hac re variis locis egregiè Galenus tradit. Sed sunt hæc alterius loci, quare ad cætera pergemus.

Observatio LXII.

Continua & putrida ab hoc morbo etiam illa laboravit vidua, quæ multas domi virgines alebat, & ex meliori fortuna dejecta erat, alioqui honestis parentibus prognata. Huic etiam recurrentes subinde, & per intervalla infestantes anxietates, mirè molestæ, cum obstructionis ventriculi ad fauces usque sensu erant. Pulsus huic parvus quoque, dibilis & inæqualis erat, & propter febrem continuam creber adeo, ut quandoque vix digitis perciperetur, & subinde reptare magis, quam pulsare videretur. Urina nigra erat, vel ex rubro subfusca, in qua multa nigra & subrubra excrementa subsidebant. Alvum laxam habebat, quæ aliquando decies, aliquando duodecies, aliquando etiam vigies quotidie solvebatur. Nam hoc symptoma etiam huic morbo quandoq; peculiare esse suprâ diximus.

Quod

Quod his diebus præteritis in pluribus observavimus, duobus infantibus, quibus plurimus cum his dejectionibus sanguis descendebat, his nostris quoque medicamentis restitutis, & una puerpera, quæ sursum & deorsum in initio morbi eruptiones patiebatur, & ab his, solas alvi perfusiones, ea copia & multitudine, ut quandoque quinquagesies intra horas viginti quatuor affellaret nullo morbi levamine.

Idem malum etiam experta alia vidua est, & per multos annos rusticus, & vetula alia, nostris curationibus, & ijs quæ ad hunc morbum faciunt medicamentis, feliciter restituti. Nam ut alijs alvus ab hoc morbo clauditur, ita alijs laxari solet. Eamque solutionem ab hoc quoque morbo procedere, præter cætera curatio docet, quæ citra adstrictoria specificis & à proprietate erga hunc morbum valentibus medicamentis, felicissimè procedit, sicut nos centies & amplius experti sumus, & illi quoque experientur, qui in similibus dejectionibus, ab hoc morbo dependentibus, (quod à signis concurrentibus dijudicatur) illud probare volent. Novi, qui adstringentibus in
hac

hac curatione procedentes, nihil proficerent ut post longam curationem tandem ægroti vel in hydropem, vel subitam suffocationem, aut atrophiam inciderent. Ut non immeritò in medicina, ab alvi curatione probationem faciendam esse, celeberrimus Italiæ medicus Joannes Baptista Montanus putaverit, in suis in secundum librum aphorismorum Hippocratis lectionibus. Sed ad historiam revertamur. *Ad aph. 20.*

Os huic foeminæ perpetuò ferè fissum erat, adeò, ut à lento hoc calore fissa labia & linguam, ac superius palatum exulceratum ostenderet. Tanta enim, etsi lenta febris esse videatur, fumante hoc calore symptomatum malitia quandoque procedit, quanta vix fieri à continua & continente veterum solet. Quod specificæ hujus morbi putrefactioni, ejusque virulentia tribuendum puto, omnia vicina quæ attingit, sua malitia exulcerantis, sicut hunc de hoc morbo effectum, suprà quoque in enarratione ejus ostendi, atque ex specifica morbi gallici putrefactione, ad quam pluribus signis alludit, manifestum nimis est.

Ee

Qui

Virulentia putrefactionis scorbuticæ.

*Convenientia
scorbuti &
morbi Gallici.*

Qui eodem modo insularibus patrius est, atque nobis sceletyrbe, & nullo alio jure hoc facere videtur, quàm quo apud nos id facit stomacace.

Utrique etiam peculiare hoc nostro seculo fuit, ut quàm longissimè latissimæque sua pomœria dilatent & diffundant, atque procul à generationis suæ locis & terminis, ad incognita & remota loca excurrant evagenturque, atque sub diametrali linea, qua sibi invicem, sub polorum oppositione, opposita sunt, se mutuò quasi complectantur, & inter se virus ac venenum suum communicent. Ita fit ut hodie etiam Germaniæ, Angliæ, Galliæ hic morbus innotescat, apud quos antea ne quidem auditum ejus nomen fuit, sicut postea una atque altera observatione ostendimus eorum, qui in Anglia & Gallia ab hoc morbo à nobis curati fuere, in quibus plurimùm hallucinati Gallici medici fuerunt, morbum ejusque speciem meritò ignorantes, etsi nigris maculis ac postulis sese manifestarat, idque propter morbi hujus iis in locis raritatem.

Sed ut rursus unde deflexit oratio redeat: Utcumque ita ficcum os & labia

labia hæc haberet, parum tamen bibit. Nam longiore potu manifestè offende-
batur. Opus tamen continua humectatio-
ne harum partium habuit. Melius quo-
que ab iis habuit medicamentis, quæ sce-
letyrben curant, à quibus quoque alvus
stetit, ut nullo, sistendæ alvo, alio medi-
camine fuerit opus.

Observatio LXIII.

Simili febre continua & putrida cor-
reptus nuper cum hoc morbo, vel
specifica hujus morbi putrefactione fuit
Notarii Embdensis domesticus, cum
pulsu adeò parvo, debili & inæquali, ut
vix percipi digitis posset, & judicari ab
Italico medico hujus aëris & constitu-
tionis imperito quisivisset, supra diem
unum atque alterum, vix eum supervi-
cturum. Ego etiam ab hujus pulsus par-
vitate admonitus, ægrotum monui, ne
temerè se de lecto præcipitaret, quòd fa-
cilis ac subitus de eo descensus animi
deliquium ei minaretur: & nihil mi-
nus inter decumbendum æger cogitaret.
Expertus tamen idipsum bis terve est,

cùm fortè alvi exonerandæ causa surgere æger cogeretur. Cujus causa postea ad omnia obsequentiore eum habuimus.

Est etiam, uti supra in universali hujus morbi enarratione ostendimus, animi deliquium familiare hujus mali accidens, quod à vaporum exhalatione fieri puto, qui ab interna hac putrefactione solvuntur & sursum ad cor & ejus capsulam exhalant. Ut etiam pathognomonicum sceletyrbes signum censeferi illud debeat, si in morbo fiat, à quo decumbentes parum infestentur, aut reliquæ facultates minus imminutæ & debilitatæ, ac mediocriter officium suum facere videantur. Monet tamen hic pulsus, ut cauti simus, & facile ægrotantis vitam non præcipitemus, ejus de loco ad locum translatione. Quòd facili momento aliquando contingat, in animi deliquium tales incidere, ex quo quandoque propter morbi vehementiam, & virium oppressiorem, non facile revocantur. Urina hujus crassa & conturbata erat, multo crasso sedimento conspicua, super quo nihilominus reliqua & supereminens urinæ substantia extabat crassa & conturbata.

bata. Os habebat perpetuò ficcum, et si modico potu esset contentus.

Idem hic hac ipsa febre ante annum laboraverat, cum gravissima totius corporis convulsione, qua in gyrum quasi contrahebatur, ita ut actum de ejus vita omnes adstantes arbitrarentur, & nos ipsi putassemus, nisi ex convulsione remissione, ac manuum relaxatione, spem vitæ superesse animadvertissemus. Quam *Signa scorbuti.* etiam ab hoc morbo & hac putrefactione excitari, urinæ indicabant variae, & maxima ex parte crasso & rubro sedimento conspicuæ, nec non faciles convulsivi motus accessiones remissionesque. Quæ certo argumento ostendebant, aliunde ad caput causam hanc adferri, magisque à vaporibus malignis rursus elatis, quàm ab humoribus malum hoc excitari ac commoveri. Convulsionem totius corporis tremor præcedebat, quem hi motus subsequantur.

Ego ab his de sceletyrbe & specifica hac putrefactione edoctus, à sanguinis missione, quòd propter continuum vini, ac copiosioris vini usum, eo abundaret, curationis initium feci. A qua cervicem & dorsi spinam con-

Curatio convulsione scorbuticam febrim continuam comitantis.

venientibus oleis inungi curavimus, studiosè quoque, ut alvus quotidie solveretur, enitentes. Cum quibus & internam putrefactionem iis, quæ ad hunc morbum & febrem faciunt medicamentis, eradicari ac tolli advigilavimus. Atque hac curationis via ac modo effectum DEI beneficio fuit, ut integræ valetudini in octo diebus æger restitueretur, nec ullas morbi reliquias sentiret, qui ante octiduum nervis musculorumque tendinibus, ad dimidii ferè brachii crassitiem contortis, totus quasi in spinam contrahebatur. Itaque in genua procumbentes, vota & supplices pro eo preces DEO offerre decreveramus, nisi solvi paroxysmum, & contractas relaxari manus & ad pristinam formam eas redire vidissemus. Quo viso nihil (ita uti res postulabat) ad omnem diligentiam reliquum fecimus.

Sunt hi convulsivi motus ut plurimum cum his urinis incidentes. Qui etiam visi aliquando sunt in alium morbum transire, sicut in morbi enarratione de Concionatoris filiolo ostendi. Sed & faciles accessionum invasiones ac remissiones, absque plenitudinis ac inanitionis

nis causis, certum quoque super hoc morbo testantur. Significant enim à vaporum, qui ab hac putrefactione elewantur, malitia ac virulentia eas procedere, sua natura ac proprietate nervos, nervosque partes infestantium. Cum nulli morbo æquè atque huic, propter malignam ejus qualitatem id eveniat. Sicut multorum testimonio probari potest, qui variis nervorum affectionibus ab hoc morbo tentati fuere, tremore scilicet, convulsione, paralyfi, & mixta ex utraque affectione, paralytica videlicet & convulsiva, cujusmodi passa puella annorum decem apud Hamburgenses est.

Malitia ac virulentia scorbutica nervos maxime infestat.

Curatus autem hic æger iis medicamentis est, quæ cum febre hunc morbum respiciunt. Nam quantumvis parvus his pulsus est, est tamen creber. Quapropter non solum refrigerantibus caloremque contemperantibus medicamentis, sed & tenui ac febrem extinguente potu opus est, quod tales, etsi sæpe ab exterioribus non appareat, intus urantur, quemadmodum etiam manifestum ex sequenti historia erit, quam hujus & curationis causa hic subjungere volui.

Observatio LXIV.

Nobilis Groninganus navium ordinum Frisiæ nomine præfectus, etiam cum hujus morbi significatione febrem passus continuam est, cum pulsu mirè parvo, debili & inæquali, adeò, ut vix digitos ferire perciperetur: erat tamen justo crebrior, & intervalla quietum, quæ systolen subsequuntur, atque diastolen præcedunt, vel inter utrumque arteriæ motum interveniunt, adeò exigua vel brevia habebat, ut vix à systole quies ulla observari potuerit. Urina tenuis & aquea erat, cujusmodi urina Antwerpiani in simili febre occurrebat. Foris frigebat, nam manus ferè frigidæ erant, neque reliquum corpus calere immodico calore sentiebatur. Interea sitis multa erat & infesta. Et calor intus adeò urens, ut post immodicam sitis repressionem, lingua maximis, & ad parvi ferè digiti crassitiem, fissuris, ei discinderetur. Quæ rursus (quod admiratione dignum) post largiorem tenuis cervisiæ assumptionem, ita subito coaluit, & inter se suis partibus

tibus concrevit, ut incantamenti simili-
lis res videretur. Quibus delirium ac-
cedebat, pessimo indicio hæc omnia ad-
augens. Quod tamen non continuum,
sed momentaneum, & subinde intermit-
tens erat.

In hoc morbum hunc pulsus maxi-
mè monstrabat, qui talis erat, qualem
huic morbo familiarem eum esse, jam
sæpe dixi, cujus morbi significationi
urina subscribebat tenuis & pallida, con-
traria febrilibus indicationibus, quas
pulsus creber demonstrabat. Quam sic
absque gravibus venarum obstructioni-
bus reddi curatio monstravit, quæ ab
iis, quæ à nobis exhibita ei medicamen-
ta fuere, subsecuta in quatuor aut quin-
que plus minus diebus fuit. Debent au-
tem in hoc casu & similibus, medica-
menta scorbutico conducentia eligi, quæ
temperatissima sunt, atque quàm mi-
nimùm calefaciunt, quibus jungi ea de-
bent, quæ cum moderato calore ve-
nas aperiunt, & humores crassiores con-
coquant & incidunt, cujusmodi sunt
cuscuta, ceterach, adiantum, & huic
morbo conveniens fumaria. Quibus fe-
rè hic, & alter ille cujus præcedente

signa scorbuti.

*Medicamenta
scorbutica tem-
peratissima :
moderato calore
aperientia ve-
nas & humores
concoquantia.*

Ee s

hi-

historia mentionem fecimus, DEI beneficio à gravi suo morbo restituti fuisse, ut nullo alio medicamine fuerit opus.

Observatio LXV.

A Dolefcens qui cum avunculo suo Hamburgo Embdam commigraverat, & isthic habitationis sedes fixerat, sub festum D. Jacobi, primùm aliquamdiu intermittente febre laboraverat, quæ tertio quoque die tertianæ febris typo eum invaserat. Cujus curationem diutius dum differebat, tandem in continuam & lentam quoque febrem incidit, à qua nihil appetitus visus est imminui. Nam & cibi multum, & magno cum appetitu assumebat, à quo nihil corroborabatur, sed quotidie in pejus proficiebat, viribus corporis magisque collabentibus, ut tandem sponte de lecto sese elevare miser non posset, & ne quidem ab alio adjutus: Quando ad invisendum eum invitabar, qui etiam tum delirare, & aliena loqui coepit, variè caput concutiens, & hinc inde quadam quasi tremoris

moris specie & conquassatione dimo-
vens.

Cum quo pulsus parvus erat, debi-
lis & inæqualis. Urinæ variæ, aliquan-
do claræ & pellucidæ, aliquando tur-
bidæ, subinde rubræ, & mox rursus
citrinæ, atque frequenter crasso & ru-
bicundo sedimento subsidentes. A qui-
bus, ut de nervorum imbecillitate ac
affectione, de morbo edoctus, mixta
curatione usus sum, cum scorbuto, tum
febri accommodata. Quæ effectum DE
gratia fuit, ut cum morbi radice sym-
ptomata hæc gravia, tremor scilicet &
delirium, evanescerent, adolescenti in-
tegræ rursus sanitati restituto, qui nunc
laus DEO adhuc valet, integer viribus,
& corpore ac mente sanus.

Observatio LXVI.

Falsa pleuritidis specie, & gravif-
simo costarum dolore, ab hoc mor-
bo laboravit Bastiani Wabbens, ci-
vis Embdani filia. Quæ ad doloris re-
cursum (erat enim per intervalla do-
lor hic recurrens) graviter præ ma-
gnitudine ejus exclamabat, & saltu
se

se ad pedis altitudinem in lecto projiciebat, præ doloris vehementia, quò se verteret nescia. Urinas interea turbidas reddebat & crassas, multo crasso sedimento subsidentes, sabulo maris per-
simili. Pulsus verò parvus erat & inæqualis, talis qualis in hoc morbo esse solet.

Curata triduum ferè ab empirico fuit, priusquam nos ad illam vocaretur. Qui in opposito brachio bis venam secuit, & nescio quibus fomentis latus, sed nulla doloris mitigatione, aut curationis successu, fovit. Et quia sicca tussi simul laboraret, qua nihil rejiciebat. Quando quorundam consilio & intercessione, & ipsius quoque Empirici suasu ego vocatus, ut dixi, fuit. Qui statim primo pulsus contactu, & manus ad atteriam applicatione, doloris causam & morbi speciem atque ejus à pleuritide differentiam, obvio indicio cognovi. Quòd à pleuritide tam vera quàm notha, manifesta differentia hunc dolorem distingueret, præter jam dictum pulsum parvum & inæqualem febris ac tussis species. Nam quam patiebatur sicca tussis, à capitis ad fauces destillatione
pro-

procedebat, & febris lenta erat, absque multa vel siti vel calore conjuncta. Quapropter de morbo ab his certus, ægro- tantem bono animo esse, & de salute benè sperare jussi. Sed quia biduum alvus steterat, à clysteris injectione curationem auspicari placuit. Estque porò ea in sex diebus nobis iis medicamentis perfecta & absoluta, quæ ex proprietate hunc morbum curare, & præterea lentam febrem extinguere dixi.

*Curatio falsa
pleuritidis.*

Eadem hac affectatione toto dimidio ferè, quæ costæ extenduntur, latere, Itali quoque conjunx correpta fuit, adeò gravi & molesta, ut ne momentum temporis uno in loco perseveraret, & variè in omnem formam corporis positum mutaret. Huic absque febre (quantum ad sensus) & citra tussim hoc advenit, etsi doloris proprietate valde ad pleuritidem alluderet. Curata quoque iisdem ferè medicamentis est, præterquam quòd præter intrinsecus exhibita, topicis etiam ex lauri baccis, seminibus flatus carminantibus, milio & sale, lineis sacculis interbastatis, uteremur, quæ loco & lateri affecto unà applicaremus. Quam-

vis,

vis quantum observari à nobis potuit, internis magis, quàm externis, juvari visa fit.

Simile costarum malum ab hoc morbo, filiulus Domini Duysterhopii Luneburgensis sensit, quem etiam, uti prædictam Bastiani filiam & per intervalla morbus hic seu dolor corripuit, sæpe quinquesies in una hora, & interdium magis, quàm noctu. Noctes enim sæpe quietas habuit. Hic pluribus hebdomadis magno parentum dolore, ab hoc malo divexatus fuit, & à nulla re melius habuit, quam à theriaca. Nondum enim tunc satis ab hoc symptomate nobis hic morbus cognitus erat. Pulsus illi quoque parvus erat, & urinæ variæ, quæ faciles haberent mutationes.

Iisdem hisce, & similibus doloribus infinitos alios ab hoc morbo infestari vidi, & nuper ex lateris quoque dolore, pleuritidis imagine, nepotem meum ex fratre. Sed multò plures aliarum partium dolor corripit, quem alii circa brachium, alii circa maxillas, alii circa scapulas, nec non cervicem, coxendicem & genua, ac intermedia quorundam malculorum spacia, experiuntur, & sæpe noctu, quàm interdium vehementer.

Dolor variarum corporis partium.

mentius, aliquando etiam interdum magis, nullo certo discrimine. Quem plerumque pulsus prodit parvus & inæqualis, certissimo suo indicio ab hoc morbo eum proficisci convincens, ut propterea diutius his inhærere nihil sit necesse. Neque possunt omnium, qui ab his doloribus laborant, exempla hoc brevi opusculo comprehendere & recitari.

Observatio LXVII.

AB hoc ipso morbo scorbuto, præter continuam ac lentam febrem, ex accidenti, longa & molesta tenuis sputi ab ore defluxione & continua aquei ac crudi humoris rejectione, complures tùm viri tùm foeminæ laborarunt; perinde ferè affecti, atque affici ii solent, quorum corpora argento vivo inunguntur, nisi quòd citra oris exulcerationem id iis, qui ab hoc morbo afficiuntur, contingat.

Imprimis autem divexata sic ab hoc morbo illa fuit, quæ longiore hujus morbi mora extenuata, ab alio mor-

morbo cum hoc incidente, faucium exulcerationes experta est, à qua ante nostram curationem, maxima uvulæ seu gurgulionis pars consumpta erat, ut per nares, quoties loqueretur, sonus exiret. Cujus curationem hic morbus remoratus est, cum alioqui chirurgum expertum haberet, & de faucium exulceratione rectè judicantem, & in curatione illius dextrè quoque procedentem, sed nullo eventu effectoque propter hujus morbi commixtionem, qui impedimento fuit, quò minus faucium ulcuscula curarentur, ut idcirco in gurgulionis discrimen illa veniret.

Spuebat autem hæc modò falsum, modò insipidum, modò tenue & spumofum. Urinas in initio, & tum etiam cum ad eam venirem, reddidit crassas, rubras & subfuscas, quæ postea ab acceptis medicamentis ad hunc morbum pertinentibus, multis crassis & furfuraceis sedimentis subsiderunt, insigniter rubentibus, etsi absque fiti, aut nullo bibendi desiderio & molesto caloris sensu esset, non contemnendo hujus morbi sicut antea dixi, argumento. Curata itaque postea à
me

me est ijs, quæ huic morbo conveniunt, medicamentis. Et si diuturnior hæc curatio fuerit, cum propter morbi diuturnitatem, tum propter insignem ejus extenuationem, quàm à lento calore patiebatur, & fumis ab hac putrefactione ad cor ascendentibus, denique & propter uteri conceptum, quem gestabat,

Interea verò dum hæc fierent, suffumigijs ad fauces usi ex pillulis cinnabaris fumus, quæ faucium malum aliquo modo mitigabant, & ne serperet, coercebant, ad solidam ejus curationem, & ligni decoctum, ejusq; exhibitionem, ut primum licuit, festinantes, Quibus, laus Deo, rursus integræ valetudini hæc restituta est, nisi quoddamissæ uvulæ partes, eo gradu, quo invenimus, substituerint. Quippe ^{uvulæ partes} quæ semel amissæ, restitui rursus non ^{semel absunt} possunt, nisi ab eo, qui omnia ex nihilo ^{restitui non possunt.} creavit. Suasimus tamen non semel, ut, quod factum esse ab aliis scimus, exulcerato palato, & foramini perforato aptari operculum, & exigam laminam ex auro puro curaret, quod foramen illud clauderet, & a-

scendentem spiritum ad nares transire prohiberet.

Intelleximus ab alijs diuturniore auri mora, & ad palatum adhæsione, ab istiusmodi exulceratione integrè quendam curatum fuisse, palati foramine auri vi & proprietate clauso. Cujus rei fides penes authorem sit. At foraminis obturatione vocem juvari debere rationi consentaneum est, & experientia comprobatum. Est tamen hoc remedij auxiliique genus nescio qua ægrotantis oscitantia hætenus omissum.

Observatio LXVIII.

Quæ eadem hac sputatione, sub idem tempus laborabat, fœmina venusta & pulchra, mala empirici curatione, acrium medicaminum, & hunc morbum non respectantium usu & exhibitione, in sanguinis sputum ex aperta pectoris vena incidit. Unde subito suffocata post triduum ab ejus eruptione fuit, quo tempore ad invitendam eam ab amicis & marito invitatus, cum de omnibus, quæ præcessissent, symptomatibus & signis inquire-

rem,

rem, intellexi toto ferè morbi tempore, urinam ægotantem subfuscam & nigram reddidisse, & varijs anxietatibus subinde eam infestatam fuisse, atque nullo tam morbo, quàm languore eam correptam fuisse, præterea mentes totum biennium plus minus substitisse, cum annum ageret supra quadragesimum secundum. Atque ab eo tempore paulatim ad ingressum eam tardiorum factum esse, & omnium ferè membrorum inusitatum languorem sentire cœpisse, qui paucis incrementis ita tandem accrevisset, ut sedens spontè amplius sese erigere non posset, nisi ab alio adjuvaretur, cum alioquin alacris prius & vegeta, ac boni habitus fœmina fuisset.

Signa scorbuti.

Ipsa quoque ægra duriori ac crassiori victui aliquandiu præter consuetudinem se indulgisse fatebatur, fortè quo hac ratione plus filiabus, quas plurimas alebat, comparceret, parùm utili parsimoniae via ac modo. Nam qui sic suum genium defraudando, res suas amplificare student, sæpe suorum fraude id experiuntur, dum præmatura morte præcepti, aliis locum concedunt, liberalius, ut fit, vivendi, & res alienas atque antea nullo suo

Parsimonia parum præposita liberis noxia.

labore partas & acquisitas, consumendi. Quemadmodum etiam hujus posteritati, post inductam novercam contigit. Quare discant parentes rebus suis à Deo sibi concessis honestè, & ad sanitatem uti ac frui. Neque judicij errore in parte quæstus ac lucri reputent, quod summum, subinde dispendium est.

Cæterum ut ad rem revertar, ab his facilè hic morbus agnosci potuisset & debuisset, si in exercitatum circa hunc morbum medicum illa incidisset. Fuerat quidem in morbi initio medico usa docto, & in veteri medicina exercitato, sed qui ad topicos harum regionum morbos parùm attenderet, atq; methodicæ veterum curationi cujusvis generis morbos includeret, & includendos putaret. Quo factum, ut longiore curationis hujus tractatione, nihil ille quoque proficeret, Sed cum mihi, post sanguinis eruptionem curatio commendaretur, & de continua hac sputi fluxione qua per totum morbum laboraverat, admonerer: postquam de reliquis symptomatibus, & ijs quæ per morbum adveniant, edoctus ab amicis essem, de sputi qua-

qualitate ægrotantem interrogavi, & ut quàm modestissimè responderet admonui. Nam ab intensiori voce, ne sanguinis eruptio exasperaretur, metui.

Respondit autem paucis ægra, spiritum quod rejiceret, modò insipidum, modò foetidum, modò subsalsum fuisse, semper autem aqueum & viscosum apparuisse. Sed suffocata hæc, ut dixi, subita & repentina sanguinis eruptione est, intra fauces conclusi, & ad interiora regurgitantis.

Simili sputatione etiam ab hoc morbo Senatoris filia, cum urinis quoque crassis, turbidis & subnigris laboravit. Cui eadem curatio profuit, quæ præcedente hanc historiâ explicata nobis fuit. Ab hac ipsa sputatione, specificam hujus morbi putrefactionem comitante, quidam laborabat nobilitate clarus, qui etiam idem malum cum urinis nigris & subfuscis passus est, & pulsu adeò parvo & debili, ut vix digitis perciperetur. Vixerat hic quoq; in perpetuis crapulis, & ex ferculorum, non optimorum semper varietate, multos crudos congefferat humores, parvos & corruptos, qui hac putrefa-

ctione accensi, perpetua exhalatione os & linguam perfundebant, crassa, aquea & viscosa.

Quam etiam hodie quidam apud nos senex experitur sexagenarius, cum omnimoda nervorum nervosiq; generis debilitate ac resolutione, paulatim magis magisq; vires & incrementum capiente. Huic quoque pulsus valde parvus est, sed appetitus constans. In his curationibus, ut ad febriculam & scorbutum, sic ad fluxionem hanc, maximè si falsa fuerit, attendere oportet, ne à nimium acribus illa exasperetur, & irritetur. Quos autem ab hac affectione laborare vidi, ijs cum scorbuto, vel ab eo, hoc malum conjunctum, profectumque fuisse, pulsus & urina ostenderunt. Præterea quòd cum lento morbo, vel potius sine manifesto morbo sic affecti, cum totius corporis languore, id paterentur. Atque hoc symptomate quoq; hic morbus cum Gallico morbo colludit, in quo æquè atque in hoc morbo, nonnulli ab eo affecti sputare, ab interna, & propria Gallico morbo putrefactione, solent. A quo tamen scorbutum facile pulsus & urina discernunt, ne
quid

quid de reliquis, quæ cum utroq; incidunt, symptomatibus dicam.

Observatio LXIX.

CONSTITUERAM una atque altera observatione, de scorbuti maculis, hunc libellum claudere. Sed propter paucas puras paginas quæ supererant, has sequentes historias hic inferere volui, ne vacuæ eæ relinquerentur, & quòd doctrinam habituræ hæ essent, non infrugiferam, neque planè inutilem. Puerpera quæ Embdæ in horti platea (ut vocant) decumbebat, in initio duobus paroxysmis tertianæ febris typo ludentibus, correpta fuit, cum multo vomitu, & frequentibus alvi dejectionibus, & ab ijs continua. In qua præter vomitus conatus, dictas dejectiones, ac ventris tormina gravissima, tantas experta anxietates est, quantas nemo alius. Non obstante, quod sæpe in naturali die quinquagesies alvus ei fuerit soluta. Quod nullo quantum ad sensus, factum est morbi levamine, aut anxietatum imminutione. Nam illud quoque huic morbo

Ff 4

fami-

*Regula diag-
nost. gen. 26*

familiaire ac proprium est, ut sæpe nullis dejectionibus ac vomitibus ille cedat, & magis morbi hujus indicio ac pathognomonico signo hæc fiant, quàm naturæ crisi, aut materiæ morbi per has dejectiones expurgatione.

Idem etiam huic miseræ fœminæ advenit. Quæ nihil obstantibus hisce dejectionibus, quæ multæ & frequentes fuerunt, tantas nihilominus per intervalla anxietates ad præcordia infestantes, à fumis crassis, quod puto, ab hujus materiæ putrefactione, ad diaphragma ascendentibus, sensit, ut sæpe manibus complicatis, suspiria sine voce, quam edere nesciebat, & præ angustia impediiebatur, ad Deum elevaret, & oculis planè contortis, & veluti ad mortem dispositis, Fato statim functura videretur. Sæpe etiam in animi deliquium supra dimidij horæ spatium incidit. In quo quod admiratione dignum, multò major semper ac fortior pulsus erat, magisque digitum feriens, quàm reliquo morbi tempore, aut in deliquij recessu. Qui alioqui, sicut in hoc morbo esse solet, per reliquum morbi decursum, parvus & inæqualis erat, excepto deliquij (ut dixi) tempore,

*Regula diagn.
gen. 27.*

tempore, in quo talem propter necessitatem, & urgentem mali causam eum extitisse judico.

Accidit autem aliquoties nobis præsentibus, vel supervenientibus, deliquium hoc ijs, quæ ad hunc morbum faciunt, medicamentis, ad duas, tres vel quatuor plus minus horas discuti & impediri, cum maxime instare, & præ foribus esse, atque ingruere velle illud videremus. Post quod tempus superata medicaminis operatione & affectu, eadem, qua prius vehementiâ, hæc anxietas & liquendi necessitas redijt. Ita ut hujus rei causa, propter morbi instantiam & magnitudinem, sæpius quotidie medicamentum hoc ægrotanti propinare fuerit necesse, aliquando scilicet octies & novies, & ut plurimum quinquies ac sexies. Sitiebat multum & bibebat sæpius, sed non magnos haustus.

Labia & lingua quibusdam fissuris divellebantur ab acrimonia vaporum ab hac putrefactione ascendentium. Qui visi in quibusdam adeo acres sunt ut non solum hæc tenera corpuscula & partes, sed etiam cutem eos exulcerare ac perforare, exulceratione sicca

com-

*Canon therap.
spec. in anxietate
& deliquio.*

compertum sit, sicut antea id ostendimus, & hoc ipso die ex quadam, quæ diutius ab hoc morbo convulsivo motu laboravit, didicimus: in qua hi motus convulsivi, in utriusque lateris exulcerationem ac perforationem transierunt, quæ sponte aliquando coalescit & clauditur, & rursus sponte erumpit, absque multa puris ac saniei collectione: ut hinc verisimile sit, magis ab acris spiritibus vaporibusq; id fieri & advenire, quàm ab humorum vitio & collectione.

Diximus antea pluribus flatibus vaporibusq; plærunque hanc materiam refertam esse, sicut ex pluribus huius morbi symptomatibus cognosci potest. Si quando sopitis symptomatibus, & devicto quasi morbo, propter fastidium, quo erga medicamenta ægrota afficiebatur, paucis diebus medicaminum usum intermitteremus, statim eadem vehementia morbus insurrexit, qua prius, & cum similibus atque æquè infestis accidentibus. Urina in initio, & ferè toto morbi tempore tenuis & pallida erat, sed sub finem morbi, paucis crasso sedimento albo & gravi subsidebat. Duravit autem curatio hebdoma-

domadas sex plus minus. Semper ab his medicamentis manifesta levamina ei adferri, etiam ij judicare poterant, & manifestò videre, qui ægrotanti abstabant, & inserviebant. Nunc laus DEO vivit fœmina elegans, pia & honesta, quam diu suis DEUS superstitem esset finat. Amen,

Observatio LXX.

QUæ diu conflictata cum hoc morbo fuerat vidua Goeckens per totam hyemem à festo Divi Martini ad festum fere Maij decubuit, varijs ventris torminibus anxietatibusq; infestata. Quando ad curationem ab ipsa invitatus, cum de symptomatibus quæ passa per hyemem fuisset, diligentius eam examinarem, intellexi semper sub noctem, vel quories dormire cuperet, mirabiliter totum corpus ei flatibus distensionibusq; & ad caput elevationibus, varias & molestas pulsationes causantibus, infestari. Quod à flatibus spiritibusq; illi eveniebat, in hac materia & putrefactione contentis, & à calore interno sub somnum

(calore

(calore naturali ex collectione fortificato) resolutis agitatisque. A quibus ita affecta & perturbata fuit, ut sæpe horam unam aut alteram tota nocte non dormiret, frequenter etiam totas noctes insomnes ageret, multiplici & vario affectu, variisque doloribus & arteriarum pulsationibus, quæ satis explicari non possunt, divexata.

Sub noctem fere lentam febriculam sensit. & quandoque levem extremorum perfrigerationem, caloremq; momentaneum, nullo molesto aut sensibili calore infestum, nisi quòd leviter sub noctem, os & labia ea exicarentur, ejusque causa subinde ad bibendum bis terve per noctem invitaretur. Bibit autem vini parum, à quo nihilo magis accendebatur, aut nihilo plus incalescebat. Appetitus planè prostratus erat, & cibum difficulter ferebat. Nam ab eo vel modica quantitate assumpto, omnia jam dicta exasperabantur. Urina quantitate modica erat, præterea crassa, conturbata, & albidior, in qua (manente nihilo minus superiore superficie conturbata) multa cruda, crassa & albida materia subsidebat, rubris quibusdam,
sed

sed mollibus excrementis permixta.

A quibus renum hunc morbum esse medici, quibus ante me commissa hæc curatio fuit, magno errore judicaverant, existimantes calculi hæc recrementa esse. Quæ quomodo à calculi recrementis differant, Inprà ostendimus. Sed à renum passione facile hunc morbum, reliqua quoque symptomata, quæ cum hoc inciderunt, distinguiebant, ut nimis crassus hic error fuerit viris, in praxi medica exercitatis. Pulsus parvus, varius ac inæqualis erat, & superior urinæ substantia lenta & viscida, viscosa sua substantia matulæ parietibus adhærens. Cum his lentè quoque corpus consumebatur, absque ullo manifesto veteribus cognito morbo, aut morbi specie. Ipsa ægrota etiam magis languere, quàm ægrotare videbatur.

Hujus curatio sub vernum tempus mihi commendata fuit. Quam ad hunc morbum cum dirigeremus, in paucis diebus & hebdomadis DEI gratia præstitimus, ut erecta & læta domesticas operas rursus per otium, & cum oportunitate tractaret: sed à morbi reliquijs recidivam passa, in varias fur-

tum

sum ac deorsum erumpentes rejectiones incidit, in quas potionum omissione eam incidisse judicabam, etsi constanter id ægrotæ negaret. Itaque cum ab his dubius aliquo modo redderet, communibus & alvum sistentibus medicamentis, vomitumque cohibentibus per diem unum & alterum curationem tentare volui, ex qua statim, pulsus artetiarum indicio, facile intellexi, nullo curationis successu, sed multo errore eam nobis susceptam esse, & veram nostram accusationem esse, quam ægrotanti impegeram: Quapropter omissa hac, ad priorem curationem redij. A qua intra triduum hæc symptomata substiterunt, pulsu ad æqualitatem suam reverso. Cœpitque rursus de lecto ægra surgere, & per diem erecta in subsellijs sedere, & non nihil domi intra privatos parietes obambulare.

Sed ut de assumptione certior essem, volui præsens & quotidie potionem ipsemet ei exhibere. A qua alvus, ut dixi, stetit, & omnia in melius commutata fuere, urinis quoque laudabilem colorem demonstrantibus. Hæc hodie adhuc in eadem curatione propter

pter morbi diuturnitatem procedit, majores indies faciens progressus. Solent enim longorum morborum longæ curationes esse. Estq; alioqui hujus morbi mos & natura, ut si quæ hujus morbi reliquæ perseveraverint, eæ plærunq; recidivum faciant, eodem, quo in alijs fieri morbis, morborumq; causis modo, etiam ex Hippocratis sententia videmus. Quæ vel iisdem, vel alijs & differentibus, quàm prius symptomatibus & signis, se prodere consuevit, ut in hac ipsa ægrota, in qua citra vomitus & dejectiones, primum varijs torminibus, & arteriarum pulsationibus, præsentibus melancholiæ indicijs, se scorbutus præsentaverat, qui post recidivam, vomitibus dejectionibusq; varijs se repræsentabat & ostendebat. Ita ut videri non admodum circa praxin medicam exercitatis alius morbus tunc potuisset, ab his signis & accidentibus, quàm antea, cum varijs exulcerationibus corpus ac ventrem proscinderet. Quem tamen unum eundemq; esse pulsus prodebat, & præter pulsum curatio, certissimo argumento confirmans, quod ratio ex prædictis indicijs colligebat.

Ob-

Ap. 12. sect. 2.

Observatio LXXI.

CÆcus & senex, firmam à nativitate sua corporis constitutionem consecutus, perpetuo crassiori victui indulserat. Correptus ab hoc morbo circa annum ætatis suæ sexagesimum, adeò deformi ac tetro tumore purpureo ac nigro (natura prævalente & ad extrema morbi causam expellente) crura defœdata ostendit, ut nemo delicatior citra horrorem ea aspicere posset. Cum quo, ad pleniorum huius morbi demonstrationem, visæ urinæ quas reddidit, cum similibus subsidentijs & excrementis sunt, crassæ, rubræ & subfuscæ. Idq; absq; ulla vel siti vel bibendi desiderio. Curatus autem maxima ex parte lactis ac vini rubri usu est. Hoc tumoris genere etiam fœmina ad porticum Hamburgensem, & alij laborarunt. Estq; propter ejus frequentiam mulierculis nostris hodie, tonsoribusq; notum. Ut propterea diutius ijs immorari non sit necesse. Quapropter unica, quæ hanc subsequitur historia, de hoc tumore ac macularum, quæ cum hoc morbo incidunt

gene-

*Curatio tumo-
ris purpurei ac
nigri in cruri-
bus.*

*Historia labo-
rantis tumore
purpureo ac ni-
gro.*

genere contenti, præsentem libellum
claudemus.

Observatio LXXII.

DIvini verbi apud Gallos minister
senex septuagenarius, ex alvo
strictiore in hunc morbum incidit,
Nam cum aliàs decies, & nonnunquam
duodecies alvus solvi illi per diem
consuevisset, eaque consuetudo ali-
quam diu intermisisset. & solito strictior
alvus stetisset, (habet enim hic mor-
bus, alijs alvum laxiorem, & contra a-
lijs strictiorem quòd faciat) ecce plu-
ribus maculis nigris & purpureis cru-
ra ei defœdantur, gingivis mollescen-
tibus, & à dentibus abscedentibus.

Hunc sic affectum duo ejus conter-
ranei Medici Gallici visitabant, viri
perhumani & docti. Quibus ascitus
collega curationis, à Domino Anto-
nio Chevallero Hebraicæ linguæ
Professore, viro optimo & doctissi-
mo, ac nostri amantissimo fui. Post-
quam aliquandiu curationem hanc
priores Medici, nullo valetudinis com-
modo. ob morbi ignorantiam tracta-
rent: utpote qui ijs in locis nigro cy-

gno rarior est & penè inauditus, atque mihi statim agnitus ex nigris & purpureis maculis suis, quas in cruribus demonstrabat, nec nou laxis ac mollescentibus gingivis: Siquidem his signis apud nos etiam lippis & tonsoribus hic morbus cognitus est.

Quare ilico ut morbum cognovi, jussi ægrotum bono animo esse, & de valetudine bene sperare. Promisi quoque, cum Medicis suis prima occasione hac de re me collocuturum. Qui, ad lectum ejus adhuc nobis sedentibus, & piis colloquiis tempus extrahentibus, præter ægroti expectationem, supervenerunt. Quibus de more cum assurgerem, post salutationem & porrectas utrinque in amicitiae signum manus, rursus simul ad ægroti lectum confedimus, de morbo ejusque causa inter nos collaturi.

De quo cum prius orationem auspicaretur, cui primum commendata curatio fuerat, ad eò doctè & eleganter de eo disseruit, ut nihil quod desideraremus, superesset, nisi quod morbum non satis de nomine cognosceret, & propterea de specifica hac putrefactione sanguinis, quò

quò ad curationem, non satis (quod bona pace ejus dixerim) esset instructus. Ideoque de eo interrogatus, non habuit quod responderet. Sed cum diutius hic hæret, subjeci eum vernaculum ac patrium morbum apud meos conterraneos esse, atque illum eum esse morbum, quem sub sceletyrbe ac stomachace Plinius, & sub scorbuto nuper celeberrimus nostri temporis Medicus, Joannes Weierus descripsisset.

Quo audito statim consenserunt, læti de morbi, quem nunquam viderant, cognitione. Quòd ijs in terris rarus hic morbus sit, & perpaucis ibi visus. Sed qui hac temporum injuria, hodie latè pomœria sua distendit, ad ignotas etiam regiones pervolans, ut ante annos centum plus minus morbus gallicus. Qui etiam ante ista tempora suo circulo inclusus, nostris terris planè ignotus erat, sicut ante hæc tempora Gallia & Germania sceletyrbe. Qui etiam nostro tempore grassari in Anglia cœpit, maxime circa maritima loca, & etiam Londini. Paucis quoque Medicis etiam nunc ibi notus, sicut ex oculari

nostra inspectione, cum ijs in locis, & Londini, frequentissime Angliæ Emporio, praxim faceremus, non semel cognovimus, & hodie quotidie ex nautis discimus, qui mercimonia Anglorum huc ad nos advehunt,

Curatio pro-
stuvij scor-
butici, ma-
cularum, &
mollitiei gin-
ivarum.

Missio itaque ad uncias tres ex sinistro brachio sanguine, exhibita illi ad hunc morbum remedia sunt, alvo ad consuetudinem rursus reducta. Quibus iterum pristina valetudini hic restitutus fuit, qui doctissimi ac pijsimi viri Domini Chevallerii iudicio, certæ morti destinatus erat. Fuerat hic semper Domini Chevallerii testimo- nio, fidelis verbi Minister, & mode- stus, cui (ut solet sæpe pijs) non satis ex sententia fortè omnia evenere. Qui nunc haud dubiè præmium consecutus est, quod tum venabatur, brabium dico, quod fidelibus vineæ suæ opera- rijs Deus promittit. Sicut credibile propter ætatem ejus grandævam est, qua tum premebatur, & intervenien- tes ab eo tempore annos, qui nunc octodecim plus minus sunt, Ut inde du- bium non sit, eum in cœlestia loca sur- sum receptum esse.

Quò nos quoque post hanc vitam
per-

& Em-
mel
ex
An-
ini-
liad
o ad
Qui-
re-
fini
er-
hic
mo-
ode-
is ex
Qui
ecu-
lum
era-
ibile
est,
ien-
co-
du-
sur-
iram
per-

perducatur benignus & multum miseri-
cors Deus per Christum nobis recon-
ciliatus, ut certum nunc in omnibus
nostris adversitatibus ad eum acces-
sum haberemus, & patrem eum appel-
lare possimus. Cui soli cum Filio &
Spiritu sancto laus & gloria, Amen,

De maculis hisce ac gingivarum pu-
trefactione, quibus cuilibet ex plebe
hodie hic morbus cognitus est, nihil
opus pluribus exemplis est. De cæteris
symptomatibus & signis, non nisi ex-
ercitatis, noris cum ad declarationem
eorum, quæ scripta nobis in universa-
li hujus morbi enarratione sunt, duas
ferè ubique observationes ad minus
adscripserimus. ex quibus non difficile
de similibus iudicium lectori, quod
opinor, erit: restat nunc libellum hunc
claudamus, ne quam rei utilitas neces-
sitasque ac frequens hujus in vita usus
gratiam ei conciliarit, sua prolixitate
perdat & amittat.

FINIS.



INDEX PRIMVS SEU

CATALOGUS REGU-
larum diagnosticarum generalium, &
specialium, prognosticorum, & cano-
num Therapeuticorum gene-
ralium & specia-
lium.

I. REGULÆ DIAGNO- sticæ generales.

Regula diagnostica genera-
lissima, seu methodus inter-
rogandi agros pro investiga-
tione scorbuti pag. 45. 295.

Regula diagnostica generalis prima ex
diuturniore mœstitia cum victu crassi-
ore pag. 3. 284. 293. 300.

Regula diagnostica generalis secunda ex
ijs, quæ in gingivis & cruribus efflore-
scunt: pag. 6. & 8.

Gg 4

Tertia

Tertia ex
42.
Quarta
168.
Quinta ex
87. &
Sexta ex
rum
Septima
23.
Ostava
Nona ex
Decima
dis
Undecim
bidis
Duodec
46.
Tertia
327.
Quarta
391.
Quinta
abs
Sexta
vag
Decima
rum
win

INDEX

Tertia ex anxietate circa precordia pag. 11.

42. 232. &c.

Quarta ex livore faciei pag. 15. Vide 103.

268.

Quinta ex pulsu pag. 15. 41. 60. 74. 76.

87. &c.

Sexta ex continuo agri languore seu crurum gravitate 16. 24.

Septima ex vomitu aut conatu vomendi 22.

23. 391.

Octava ex siti nulla aut exigua 33. 39. 40.

Nona ex urinis crassis & rubris 34.

Decima ex urinis crassis, albis & turbidis pag. 34. 45. 285.

Undecima ex urinis crassis, nigris & turbidis 36.

Duodecima ex successu in curatione pag. 18.

46. 213.

Tertia decima à facili lipothymia 75. 326.

327. 420.

Quarta decima ex dolore crurum 77. 341.

391.

Quinta decima ex dolore surarum tensorum absq; inflammatione 91. 334. 358.

Sexta decima ex arthritide Scorbutica vaga pag. 137.

Decima septima ex lancinatione membrarum, crurum, & aliarum partium 214. 215. 361.

Octava

INDEX

- Octava decima ex urinarum commutatione in genere* 60. 91. 234. 357. 377. 381.
- Nona decima ex urinarum conturbatione à catharticiis* 235. 237.
- Vicesima ex morbi frequentia* 295.
- Vigesima prima ex dentis relaxatione & spontanea confirmatione* 332.
- Vigesima secunda ex facili doloris de loco in locum translatione* 195. 333.
- Vigesima tertia ex tumoris & inflammationis specie facile de parte in partem commigrante* 352.
- Vigesima quarta ex tumore & inflatione facile emergente & facile evanescente* 388..
- Vigesima quinta ex maculis, quæ mutatis vicibus facile erumpunt, & facile evanescent* 394.
- Vicesima sexta ex eo, quod nullis dejectionibus aut vomitibus morbus levatur. pag.* 439.
- Vicesima septima ex pulsu in deliquio majore, quam tempore morbi reliquo* 440.

INDEX
REGULÆ DIAGNO-
sticæ speciales.

- Prima, seu nota discernentes respiratio-
nis difficultatem scorbuticam à vulga-
ri* pag. 10. 15. 16. 17.
- Secunda, quomodo difficultas scorbutica
etiam continua à communi discerni
possit.* pag. 13.
- Tertia, sive signa & nota discernentes vo-
mitum scorbuticum à communi* pag. 22.
23. 24. 25. 343.
- Quarta, discernens alvi profluvium scor-
buticum à lienteria & diarrhæa commu-
ni.* pag. 28. 323.
- Quinta, discernens febrim scorbuticam à
communi* pag. 53. 57. 58. 360. 368.
- Sexta, seu signum febrium scorbuticarum
continuarum* pag. 70.
- Septima, seu signa febres veterum conti-
nuas à scorbuticis continuis discernen-
tia* 70. 71.
- Octava, dolorem scorbuticum à Gallico
discernens.* 78.
- Nona, pleuritidem scorbuticam seu fal-
sam à pleuritide veterum tam vera, quam
notha distinguens* 83. 85.
86. 335.

Deci-

INDEX

- Decima, discernens dolorem ventris scorbuticum à communi 87. 335.
 Undecima, dolorem crurum scorbuticum à vulgari discernens. pag. 90. 91. 341.
 Duodecima, tubercula scorbutica à Gallicis discernens. pag. 93.
 Tertia decima, de resolutione crurum scorbutica dignoscenda pag. 95. 96.
 Quarta decima, in paralyfi lateris dimidij scorbutico pag. 102. 103.
 Quinta decima, in nervorum omnium debilitate pag. 112.
 Sexta decima, in epilepsia scorbutica 120.
 Septima decima, in convulsione 130.
 Decima octava, in arthritide scorbutica. 135.
 Decima nona in hydrope scorbutico, continens notam hujus primam; 145.
 secundam: 146.
 tertiam: 147.
 Vicesima, in hydrope vesicali 155.
 Vicesima prima, in atrophia scorbutica 160.
 Vicesima secunda, in febris scorbuticis pestilentialibus, earumque tumoribus 180.
 Vicesima tertia, in erysipellate scorbutico pag. 193.

Vice-

INDEX

- Vicesima quarta in scorbutico delirio &
lesione memoria 197.
Quinta & vicesima, in sputatione conti-
nua 206.
Vicesima sexta, in languore Scorbutico
209.
Septima & vicesima, in sudore copioso
213.
Octava & vigesima, jactatione membro-
rum 215.
Nona & vicesima, discernens ulcera sicca
Scorbutica à Gallicis 223.
Trigesima, in lincinationibus crurum
304.
Trigesima prima, in anxietate scorbuti-
ca. pag. 183. 256.

II. PRO-

INDEX.

II. PROGNOSTICA,

- I De Ulceribus crurum pag. 8.
2. & 3. de respirationis difficultate p. 9. 10.
4. De eadem pag. 19
5. De respirationis difficultate in hydrope, sæpius ac fortius purgatione adhibita. 19
6. De vomitu scorbutico. 22
7. De urinis tennibus intensæ rubedinis, subfuscis, neglectis. 31
8. De iisdem neglectis. 33
9. De oris siccitate perseverante. 35
10. De urinis albis, crassis & turbidis 45
Confer cum 7. & 8.
11. De urinis rubris cum rubro sedimento 56
12. De febribus scorbuticis, tertianis primum, mox quotidie invadentibus, cum urinis crassis & turbidis: sæpe etiam variis. 62
13. De febribus scorbuticis intermittentibus. 66
14. De accidentibus, quæ iisdem superveniunt 66. 362. 383
15. De febribus scorbuticis continuis, fortiori purgatione aut alia ratione ne

INDEX

	<i>ne exasperatis</i>	71.
17.	<i>De usu theriacæ in ijsdem</i>	73
18.	<i>De eadem re in naturis fortioribus ,</i> <i>73.</i>	
19.	<i>De pleuritide falsa scorbutica</i>	84.
20.	<i>De paralyfi scorbutica</i>	98.
21.	<i>De curatione paralyseos ijs in locis ,</i> <i>in quibus aer crassior est.</i>	99.
22.	<i>De paralyfi arthriticis doloribus su-</i> <i>perveniente.</i>	99.
23.	<i>De tumoribus quavis corporis parte</i> <i>emergentibus, facile evanescenti-</i> <i>bus, & initio statim levem inducen-</i> <i>tibus paralyfin.</i>	103.
24.	<i>De contractione nervorum præst reso-</i> <i>lutionem</i>	104.
25.	<i>De scorbuto confirmato</i>	108
26.	<i>De arthritide scorbutica correptis ,</i> <i>& initio statim fortiter purgatis ,</i> <i>135.</i>	
27.	<i>De doloribus arthritidis scorbuticæ</i> <i>recte curatis</i>	138.
28.	<i>De ijsdem diutius neglectis</i>	139
29.	<i>De diuturna arthritide scorbutica</i> <i>140.</i>	
30.	<i>De hydrope scorbutico vulgariter cu-</i> <i>rato.</i>	145.
31.	<i>De purgationibus in hydrope scorbu-</i> <i>tico</i>	148.
	32. De	

INDEX

32.	De hydropē vesicali, vulgi sententia	153
33.	De atrophīa diuturna	169
34.	De eadem	169
35.	De ulceribus scorbuticis	177
36.	De urinis tenuibus cum morbi incremento, vel crassis cum morbo perseverante.	191
37.	De sputatione continua	206
38.	De siccitate oris in languore diu durante	209
39.	De eadem ulterius perseverante	210
40.	De languore scorbutico	210
41.	De eodem in mulieribus	211
42.	De copioso sudore	212
43.	De penis exulceratione	221
44.	De validis purgationibus, & largiore sanguinis missione 26. III. 233. 249.	
45.	De humoribus aqueis & crudis fortioribus catharticis agitatis. 243 244.	
46.	De menstruis suppressis morbo neglecto non ciendis	247
47.	De animi deliquio	326. 420
48.	De feb. scorbut. diuturnis. 348. 349	
49.	De febrib. scorbuticis omnibus	383
50.	De nigro & crustoso ulcere	406
	III. CA.	

INDEX. III.
C A N O N E S

Therapeutici.

I. GENERALES.

<i>Primus</i>	pag. 4.
<i>Secundus</i>	pag. 17. 111
<i>Tertius</i>	pag. 20.
<i>Quartus</i>	21.
<i>Quintus</i>	25.
<i>Sextus</i>	26
<i>Septimus</i>	26.
<i>Octavus</i>	26
<i>Nonus</i>	27
<i>Decimus</i>	37
<i>Undecimus</i>	41
<i>Duodecimus</i>	49
<i>Decimus tertius</i>	108. 356.
<i>Decimus quartus</i>	113
<i>Decimus quintus</i>	126
<i>Decimus sextus</i>	138
<i>Decimus septimus</i>	138
<i>Octavus & decimus</i>	138
<i>Nonus & decimus</i>	218
<i>Vicesimus</i>	247
<i>Vicesimus primus</i>	287

II. SPECIALES.

- I. In difficultate respirationis primus
18.

se

INDEX.

	Secundus	18
	Tertius	19
	Quartus	20
2.	In vomitu scorbutico.	25
3.	In scorbuto cum febris, siti & ob- structionibus viscerum.	25. 348.
4.	In dysenteria mendaci primus	30
	& in alvi profluvio generatim secun- dus	30
5.	In febris scorbuticis intermittentibus	
	Primus	63
	Secundus	63
	Tertius	64
	Quartus	64
	Quintus	64
	Sextus	65
	Septimus	65
	Octavus	65
	Nonus	65
	Decimus	66
	Undecimus	67
	Duodecimus	68
	Decimus tertius	68
	Quartus decimus	69
6.	In febris scorbuticis continuis	
	Primus	72
	Secundus	72
7.	In dolore dentium	80
8.	In paralyfi scorbutica	107. 296
		9. 12

INDEX.

9.	In contractionē primus.	109
	Secundus	110
10.	In apoplexia scorbutica	124
11.	In convulsione primus	131
	Secundus	132
	Tertius	133
12.	In doloribus arthriticis primus	140
	Secundus	142
	Tertius	142
	Quartus	254
	Quintus	254
13.	In hydrope scorbutico primus	148
	Secundus	148
	Tertius	149
	Quartus	149
	Quintus	149
	Sextus	150
	Septimus	150
	Octavus	150
	Nonus	151
14.	In hydrope vesicali primus	157
	Secundus	158
15.	In atrophia scorbutica primus	166
	Secundus	168
	Tertius	168
	Quartus	168
	Quintus	168
	Sextus	169
	Septimus	169

H h

Octa-

INDEX.

	<i>Octavus</i>	169
16.	<i>In ulcere crustoso & nigro</i>	178
17.	<i>In febris pestilentialibus scorbuticis primus</i>	190
	<i>Secundus</i>	190
	<i>Tertius</i>	191
18.	<i>In mortificatione primus</i>	192
	<i>Secundus</i>	192
19.	<i>In erysipellate scorbutico primus</i>	196
	355	
	<i>Secundus</i>	356
20.	<i>In scorbutico delirio & læsione memoriæ</i>	196
21.	<i>In carō</i>	202
22.	<i>In sputatione continua</i>	206
23.	<i>In languore scorbutico primus</i>	210
	<i>Secundus</i>	210
34.	<i>In sudore copioso primus</i>	213
	<i>Secundus</i>	213
25.	<i>In jactatione membrorum primus</i>	
	215	
	<i>Secundus</i>	218
26.	<i>In tremore membrorum</i>	220
27.	<i>In ulceribus siccis</i>	224
28.	<i>In tuberculis scorbuticis</i>	281
29.	<i>In anxietate & deliquio</i>	441

INDEX SECUNDUS

S E U

Catalogus affectuum, quorum fit
mentio in observatio-
nibus.

1. *Morphæa alba, lenta febris, cum re-
spirationis difficultate & per in-
tervalla anxietatibus* 232
2. *Horripilationes continuæ cum inten-
sissimo sinistri hypochondrij dolore
per vices, & perpetuis ructibus,
nausea, anxietatibus* 233
3. *Sinistri hypochondrij & crurum do-
lor obtusus, cordis palpitatio, oris
siccitas* 235
4. *Lassitudo spontanea & obtusus cru-
rum dolor* 238
5. *Lassitudo spontanea, obtusus crurum
dolor, facilis lipothymia, oris sic-
citas, surarum dolor* 240
6. *Anxietas gravis sub diaphragmate,
circa ventriculi regionem, cum or-
thopnæa citra thoracis affectionem*
243.
7. *Angustia & respirationis difficultas*
246
8. *Angustia & anxietas per intervalla
sub diaphragmate cum labiis ge-
nisq;*

INDEX.

- nisque & superioribus oculorum pal-
pebris sublurido colore media æstate
tinctis, occasione suppressorum men-
struorum. 247
9. *Levis febricula initio absque multa siti
& calore molesto: anxietates gra-
ves.* 248
10. *Respiratio difficilis neglecta aliquandiu:
cui successit dolor articularis scorbu-
ticus.* 251
11. *Dolor dentium & articularum vagus
cum levi earum resolutione.* 253
12. *Articulares dolores minus mobiles cum
anxietatibus gravibus* 254
13. *Coxendicis dolor graviss.* 256
14. *Coxendicis dolor* 258
15. *Coxendicis dolor* 259
16. *Tali versus poplitem retractio* 260
17. *Dolor genu & momentanea ejus resolu-
tio* 262
18. *Livescens facies, anxietas: tumor cru-
rum primum: mox viscerum: tum
denique abdominis* 263
19. *Angustia seu respiratio difficilis &
anxietas cum tumore crurum hydro-
pico* 271
20. *Ventris & crurum tumor cum tuberibus,
seu hydrops vesicalis cum anxietatibus
& animi deliquio.* 275

INDEX.

21.	Paralysis pedum post usum ligni	282
22.	Paralysis utriusq ³ cruris scorbutica	284
23.	Paralysis alterius cruris	285
24.	Paralysis utriusque cruris	288
25.	Paralytit utriusque cruris	288
26.	Paralysis crurum	290
27.	Paralysis lateris dimidij	292
28.	Paralysis lateris demidij cum febris	297
29.	Paralysis lateris dimidii	299
30.	Ventris & membranarū, musculorū crurum & abdominis lancements	301
31.	Crurum lancements per intervalla infestantes	303
32.	Vomitus & frequentes alvi dejectiones, cum febris angustia	304
33.	Pleuritis notha scorbutica	308
34.	Anxietas in atrophiam scorbuticam desinens	311
35.	Atrophia scorbutica, frequens vomendi conatus, cum ventris lancements, languore continuo, ac levi membrorum omnium, præsertim brachiorum resolutione	313
36.	Atrophia post diuturna crurum ulcera cum modica siti, & omnimoda appetitus dejectione, totius corporis lassitudine & animi deliquio	320
37.	Dejectiones variae: angustia: oculi densa caligine suffusi, febris continua	321
		38 De ^a

INDEX.

38. Dejectiones frequentes, sed magis com-
compactæ cum maximis ventris tor-
sionibus & angustia 323
39. Respirationis difficultas: dejectiones va-
ria, vomitus, epilepsia 328
40. Macies, angustia: capitis dolor circa ver-
ticem; mox in musculis temporum,
maxilla & dentibus: dentis relaxatio
& spontanea confirmatio. 331
41. Oesophagi totius obstructio: dolor suræ
crurum, & imbecillitas inter eun-
dam 333
42. Paralysis & imbecillitas digitorum prio-
rum & crurum 336
43. Vomitus molestus, parum & non nisi
aqueum quid educens 337
44. Vomendi conatus assiduus, & obtusus
cruris dolor 340
45. Vomitus & vomendi conatus 342
46. Atrophia & totius corporis languor:
crurum debilitas, & post motum
graviorum respirationis difficultas:
anxietas post vomitus 344
47. Lassitudo totius: febris gravis, procli-
vitas ad deliquium animi: ex pur-
gatione angustia summa: sitis inten-
sa: oris siccitas perpetua, dentium
vacillatio 346
48. Horrores febriles, bis aut ter quotidie
cum

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57

58.

INDEX.

- cum dolore infestantes: tumor pedum
oedematodes, de loco in locum mi-
grans: languor & crurum manuumq;
impotentia: faciei manuum & pedum
laxus tumor 349
49. Erysipelas pedum quotannis saepius in-
fectaus 353
50. Tristitia prater rationem: levis mem-
brorum omnium resolutio: jactatio
eorundem mirifica, ex resolutione
& convulsione mixta affectio 356
51. Tertianæ scorbuticæ cum lancinationibus
crurum gravissimis 360
52. Febris tertiana scorbutica cum levi deli-
rio & profundo somno 366
53. Febris tertiana cum convulsivis moti-
bus 370
54. Tertianæ scorbuticæ cum convulsivis
motibus & caro 372
55. Tertianæ scorbuticæ 374
56. Quartanæ scorbuticæ 376
57. Febris quotidiana scorbutica cum frogore
diuturno, siti intensa, deliquio animi,
linguæ & faucium asperitate, subse-
quente tumore faciei 384
58. Febris quotidiana scorbutica post inor-
dinatas febrium accessiones, cum
torminibus. continuo ferè vomitus
conatu & anxietatibus 390
59. Febris

INDEX

59. *Febris mixta ex continua & tertiana cum torminibus gravissimis, maculis circa pectus & faciem, angustia summa, crebo vomendi conatu, odore corporis gravi, delirio momentaneo, pesti similis* 393
60. *Febris scorbutica pestilentialis mitior cum tumoribus. & ulcere nigro ac crustoso* 405
61. *Febris scorbutica pestilentialis cum continuo vomendi conatu, anxietate, & tumore duro dolente ac rubente circa inguina* 411
62. *Febris continua : anxietas : alvi laxitas : oris siccitas : linguae & palati exulceratio* 415
63. *Febris continua scorbutica cum pulsu admodum parvo deliquium animi minante* 419
Ubi etiã febris continua cū gravissima totius corporis cōvulsione 421
64. *Febris continua cum fissura linguae facile coalescente, & delirio momentaneo* 424
65. *Febris ex intermittente continua & lenta cum delirio, & capitis conquassatione* 426
66. *Falsa pleuritidis species* 427
67. *Febris continua cū continua sputatione,*

INDEX

- tione, & faucium propter Galli-*
cum morbum exulceratione 431
68. *Sputatio continua, & sputum san-*
guinis 434
69. *Febris scorbutica ex tertiana conti-*
nua, cum vomitu & frequenti-
bus alvi dejectionibus, tormini-
bus, anxietatibus summis, de-
liquio diuturno 439
70. *Tormina & anxietates: evapora-*
tiones ad caput: unde corporis di-
stentiones, capitis pulsationes,
vigiliae: febris lenta sub noctem:
appetitus dejectus: atrophia, &
ex intermisso medicamentorum
usu recidiva cum vomitibus &
dejectionibus 443
71. *Tumor deformis purpureus ac niger*
crura defædans 448
72. *Alvus ex laxiore strictior: maculae*
curum nigrae & purpureae: gin-
givarum molities 449

IN



INDEX TER- TIUS RERUM, QUÆ in Eugaleni libro con- tinentur, Alphabeti- cus.

A

A Bsinthium	pag. 110
Ab una eademq ³ causa sepe varia mor- borum differentie existunt propter corpo- rum diversitatem.	pag. 5
Accidens scorbuti peculiare	253
Accidentia rara in febris scorbuticis con- tingentia	58
Acetosæ & becabungæ succus in febris scorbuticis	65
Adstringentia in alio proflavio scorbutico nihil proficiunt.	417
Aeris mutatio mutat medicamenta in scor- buto	20
Ægineta	114
Affectus languori similis	211
Alin	

INDEX

<i>Alvi fluor & constipatio</i>	28
<i>Alvi profluvia scorbutica adstringentia non profunt</i>	417
<i>Alvus in scorbuto aliis clauditur : aliis la- xatur</i>	416.449
<i>Anderuoci laus</i>	39
<i>Angustia pectoris</i>	246
<i>Angustiam plerumque sequitur hydrops</i>	246.
<i>Angustia & hydropis scorbutici curatio</i>	274.
<i>Animi deliquium</i>	419.420
<i>Ani venæ turgidæ quid notent</i>	339
<i>Anxietas pestilens ut à scorbutica discerna- tur</i>	183
<i>Anxietas scorbutica diversa ab anxietate ex pituita gravante, &c.</i>	256
<i>Aphorismus Hippocratis ex 2. prognost. 27. quem Gal. 3. aph. comment. 71. citat. explicatus</i>	56
<i>Apoplexia scorbutica</i>	122
<i>Apoplexia scorbutica auctori nunquam visa</i>	122
<i>Aquæ cruda nervis nocent</i>	220
<i>Arenularum & sanguinis recrementorum discrimen</i>	354
<i>Arthritis scorbutica</i>	135
<i>Arthritis scorbuticæ causa.</i>	135
<i>Arthritidis scorbutica dolor semper cum levi</i>	

INDEX

<i>levi resolutione conjunctus</i>	137
<i>Arthritidis scorbutica vage remedia</i>	142,
254.	
<i>Atrophia scorbutica</i>	159.311.313
<i>Atrophiae scorbutica caussa</i>	159
<i>Atrophiae scorbutica generatio</i>	165
<i>Atrophiae scorbutica signa</i>	313.314.317
<i>Autor cur ediderit hunc librum</i>	227

B.

B <i>Acchianalia</i>	309
<i>Bilis vigilias excitare solet</i>	367

C.

C <i>Anones therapeutici peculiari cata-</i> <i>logo enumerantur</i>	
<i>Caprae ut nutrienda pro atrophia scorbutica</i> <i>laborantibus</i>	170
<i>Cari caussa in scorbuto</i>	199
<i>Cari in febris scorbuticis caussa</i>	368
<i>Carus & sopor profundus</i>	199
<i>Catarrhi etiam in sputatione continua ha-</i> <i>benda ratio</i>	206
<i>Caussa convulsionis externa</i>	129
<i>Caussa convulsionis potius est vapor, quam</i> <i>humor</i>	128
<i>Caussa convulsivorum motuum in ferbi scor-</i> <i>butica</i>	370
<i>Caus-</i>	

INDEX.

*Causa dejectionis frequentioris, sed magis
compectarum excretionum in profluvio
scorbutico* 29

Crusæ editi hujus tractatus 227

*Causa cur epilepsia scorbutica aliàs in alios
affectus transeat* 120. 121

*Causa cur febris scorbutica ex inordinata
facta sit quotidiana.* 392

Causa lancinationis erurum in scorbuto.
363.

Causa lipothymie facilis in scorbuto
75.

*Causa cur medicina apud nos vilescere coepe-
rit* 54. 381. 382

*Causa palpitationis cordis ex sententia Fer-
nelij* 236

Causa paralyseos scorbutica 107

*Causa cur paralyfis veterum semper sui simi-
lis sit usq; ad solutionem; scorbutica varias
habeat vices* 96

*Causa, cur plures saepe in eadem familia simul
scorbuto corripiantur* 184. 398

*Causa cur pulsus in deliquio scorbutico major,
quàm extra illud* 440

Causæ scorbuti & sceletyrbes 3. 293.
297. 300.

Caus-

INDEX

<i>Causa scorbuti interna & generatio ipsius</i>	4
<i>Causa cur scorbutus hodie latè grassetur. & frequenter occurrat</i>	284. 300
<i>Causa cur sitis in scorbuto notis putredinis non respondeat</i>	40
<i>Cerevisia in Scorbuto convenientes</i>	38
<i>Cerevisia Embecensis</i>	38
<i>Cochlearia succi vis contra convulsivos motus</i>	68
<i>Cochlearia succi vis, ut in scorbuto generatim, ita in respiratione difficili scorbutica.</i>	18
<i>Colica passio in epilepsiam aut paralyfin desinens</i>	114
<i>Convulsio</i>	117
<i>Convulsionis causa externa</i>	129
<i>Convulsionis causa potius vapor, quam humor.</i>	128
<i>Convulsio cum febre fere interpolatas habet accessiones</i>	118
<i>In convulsione interpolata caput per consensum afficitur</i>	119
<i>Convulsivi motus universales ferè semper cum febre sunt.</i>	129
<i>Convulsivorum motuum febrim continuam comitantium curatio</i>	423
<i>Convulsio particularis aliquando sine, aliquando cum febre accidit</i>	128. 129
	Don-

INDEX.

ipſa	Convulſio paulatim ſiens continua, & fere	
4	ſine febrī	118
Tetur.	Convulſio ſcorbuto magis conſentanea.	107
300		117.
adins	Convulſio totius & partis ut generetur	
40		128. 129.
38	Coxendicis dolor	257. 258. 259
38	Coxendicis dolor continuus in ſcorbuto, ejusq̃	
ſſros	exemplum ſeu hiſtoria	141
68	Crurum paralyſis ſcorbutica ut differat à	
gene-	veterum paralyſi	95
Cor-	Curatio anguſtiæ & hidropis ſcorbutici	
18		274.
ſſſus	Curatio convulſivorum motuum febrim con-	
114	tinuam comitantium	423
117	Curatio febris ſcorbutica mixtæ	425
129	Curatio in febribus ſcorbuticis interdum	
quām	periculofa	62.
128	Curatio hydropis veſicalis	275
habet	Curatio obſtructionis œſophagi & dolois	
118	ſuræ crurum.	334
inſen-	Curatio peſtis & ſcorbuti diverſa, ſicut &	
119	ſcorbuti ac morbi Gallici	186
imper	Curatio pleuritidis falſæ ſcorbuticæ	429
129	Curatio ſcorbuti potius internis, quàm exter-	
quām	nis perficitur	111
423	Curatio vomitus ſcorbutici	338
ali-	Curationes caterorum affectuum ſcorbu-	
129	tico-	
Don-		

INDEX

... tiorum require in catalago canonum therapeuti-
corum specialium.

D.

D Ecoctum absynhii utile in contra-
ctis 110

Dei beneficentia ex subpullulantium quotidie
morborum caussis & curationibus detec-
tis 127

Dejectiones in scorbuto frequentes, sed non
ita copiosae ut in Diarrhoea 323

Dejectiones scorbuticae frequentes, sed ma-
gis compactae cum maximis ventris tor-
sionibus 324

Dejectiones frequentes, sed copiosae & va-
riorum colorum 329

Dejectionis frequentioris & magis com-
pactarum excretionum in profluvio
scorbutico causa 29

In deliquio Scorbutico pulsus major, quam
extra illud, & cur 440. 441

Delirium scorbuticum & laesio memoriae 196.
197.

Dentium dolor scorbuticus alios continuò ;
alios per intervalla infestat. 80

Dentium vacillationem non esse accidens
scorbuti 8

Dieta in scorbuto cum febre 38

Dolor brachiorum 83

Dolor capitis 83

Dolor

INDEX

Dolor coxendicis , Vide coxendicis dolor.

Dolor crurum 77

Dolor dentium cum dimidij & alterius lateris

maxilla doloribus 79

Dolor dimidii lateris 81

Dolor dorsi 81

Dolor dorsi sæpe febres scorbuticas conci-

tat 363

Dolor genu & momentanea ejus resolutio

262

Dolor hypochondrij sinistri 233

Dolor lateris dimidij. 81

Dolor juxta manus & digitorum extre-

ma 78.335

Dolor nuchæ 79

Dolor partium corporis variarum 79.

253. 332. 430.

Dolor & ardor renum 82

Dolores scorbutici varij, & vario tempore

infeſtantes 332.333

Dolor variarum corporis partium 79

253. 332. 430.

Dysenteria mendax 30

E.

E *Leſtuarium Empirici cujusdam ad con-*

contractionem 109

Embda caro plures pereunt 202

Embdanorum chirurgorum arrogantia.

270.

Ii.

Embda

INDEX

Embdæ convulsio pueris & infantibus familiaris

119

Embdæ, quàm Hamburgi, scorbutus pertinacior
58.

*Embdani magistratus negligentia in co-
ercendis chirurgis & aliis Empriricis*

271

Empiricorum in civitate Embdana licentia.

83

*Empiricorum in febribus scorbuticis continuis
thericam exhibentium error perniciosus*

73.180

Epilepsia scorbutica

119

*Epilepsia scorbutica in alios atq; alios affectus
transit*

120.121

Epilepsia occasione capitis à radiis solis calefacti

330

*Errores & suos & alienos in scorbuti cu-
ratione commissos cur detegat autor*

111

Erysipelas

192

Erysipelas pedum quotannis infestans

353

Ab erysipelate præservatio

354

Erysipelatis curatio

140.355.356

F.

F*ebrium scorbuticarum curatio interdum
periculosa*

62

Febres scorbuticæ inordinatæ

42

Febre s

INDEX.

<i>Febres intermittentes</i>	50
<i>Febres continuæ</i>	70
<i>Febrium scorbuticarum curatio</i>	63
<i>Febrium scorbuticarum symptomata, & eorum remedia</i>	67
<i>Febrium scorbuticarum accidentia rara.</i>	
57	
<i>Febris continua cum fissura linguæ facile coalescente</i>	424
<i>Febris continua scorbutica cum pulsu admodum parvo, deliquium animi minante</i>	
419	
<i>Febris continua scorbutica cum gravissima totius corporis convulsione</i>	421
<i>Febris continua cum continua sputatione, & faucium propter morbum Gallicum exulceratione</i>	431
<i>Febris mixta ex continua & tertiana cum torminibus gravissimis, &c.</i>	393
<i>Febres pestilenciales, & earum tumores</i>	
180	
<i>Febres scorbuticæ pestilenciales cur cum verè pestilentibus conveniant</i>	185
186	
<i>Febris scorbutica pestilencialis cum continuo vomendi conatu, anxietate, & tumore duro dolente ac rubente circa inguina</i>	
411	
<i>Febris pestilencialis mitior cum tumoribus</i>	
11 2	bus

INDEX

<i>bus, & ulcere nigro ac crustoso</i>	405
<i>Febris scorbutica mixtæ curatio</i>	395.396
<i>Febris ex inordinata facta quotidiana</i>	392
<i>Febris quotidiana scorbutica cum frigore diurno, siti intensa, deliquio animi, linguæ & faucium asperitate, subsequente tumore faciei</i>	385
<i>Febris quotidiana scorbutica materia</i>	391.
<i>Febris tertiana scorbutica</i>	375
<i>Febris tertiana cum levi delirio & profundo somno</i>	366.
<i>Febris tertiana cum convulsivis motibus</i>	370.
<i>Febris quartana scorbutica</i>	376
<i>Febres tertianæ typum initio representantes, postea quotidie infestantes, cum urinis crassis & herbidis, sæpe etiam variis</i>	62
<i>Febris ob pulsus parvitatem in scorbutico non est negligenda</i>	41
<i>Febres veterum quomodo cum nostris conveniant, & ab ijs discrepent.</i>	357
<i>Felix curationis successus</i>	213
<i>Fernelii sententia de causis palpitationis cordis</i>	236
<i>Fimus vaccinus bis quotidie affecta parti appli-</i>	

INDEX

*applicatus mortificationem ejus feliciter
tollit* 192

*Fomento dolores hypochondrii sinistri mitigari
possunt.* 234

*Formæ ac temperamenta humanorum corporum
pro calis, aquarum & alimentorum diversi-
tate mutantur.* 1

G.

G *Aleni locus de urinis variis* 60. 234. 358.
377

Galenus locus ex 4. aph. comm. 71. explicatus
56

Galeno malancholia humor pessimus 185
397

Gesneri experimentum in tumoribus carneis
380

H.

H *Erba capris objicienda pro alteratione
lactis in atrophia scorbutica* 170

*Hipocratis aphorismus 27. lib 2. prognostic. ex-
plicatus* 56

Hippocratis laus 409

Historia apoplexia scorbutica laborantis Vidua
123

*Historia arthriticis doloribus per intervalla
correpta foemina Holsatæ* 140

Ii 4

His

INDEX

Historie alie arthritide scorbutica vaga laborantium	254
Historia articularum omnium dolore & resolutione laborantis	261
Historia eorum, qui ex arthriticis doloribus in paralyfin aut atrophiam inciderunt.	113
Historia atrophia ex inflammatione testis consumti	161
Historia atrophia scorbutica exstinctorum	164
Historia caro scorbutico laborantium	200
Historia à caro scorbutico subito excitati pueri usu succi nasturtii	204
Historia colica in paralyfin desinente laborantis	115
Historia convulsione scorbutica laborantium	118
Historia convulsione correpti infantis & nutricis permutatione sanati	118
Historia convulsione particulari laborantium	129.130
Historia doloris coxendicis in scorbuto	141.
Historia dolore crurum scorbutico laborantium	77.78.89.90
Historia dolore dentium & lateris dimidii laborantium	80.81
	Histo-

INDEX

- Historia laborantium dolore dorsi* 81.82
Histoiæ à deliquio & periculo suffocatio-
nus liberatorum 71.72
Historia dolore ventris scorbutico labo-
rantium 87.88
Vide infra de lancinationibus.
Historia epilepsia scorbutica laborantium
 120.121.
Historiæ erysipelate laborantium 355
Historiæ faciem lividam habentium 15
Historiæ facili lipothymia laborantium
 321.
Historiæ à febris scorbuticis brevi li-
beratorum 362
Historia febris scorbutica gravi laboran-
tium 346.347.348.349
Historia conjugis Doctoris febris tertiana
scorbutica cum angustia & lancinatio-
ne crurum laborantis. 364
Historiæ febris intermittente cum caro la-
borantium 67
Historiæ febris intermittente scorbutica
laborantium cum motibus convulsivis
 67
Historiæ febris tertiana scorbutica cum ca-
ro laborantium 368
Historiæ febris tertiana scorbutica cum
lancinationibus crurum, aut harum
Ii 4 loco

INDEX.

- loco, dorsi doloribus laborantium* 361
 362.363.364.
Historiæ quartana scorbutica laboranti-
um 378.379.380.
Historia memorabilis febris quartana scor-
butica laborantis infantis bimuli 51.
 52
Historia de quartanis tribus intra decem
dies curatis. 61
Historiæ febris quotidiana scorbutica la-
borantium 388.389.390.
Historiæ febribus pestilentialibus scorbu-
ticis & eorum tumoribus laborantium
 182.187.188.
Historia mulieris ab hydropo vesicali cu-
ratæ 158
Historia chirurgi Embdani in hydropo
scorbutico curati 269
Historiæ hydropo vesicali laborantium
 277
Historiæ laborantium jactatione mem-
brorum 356.359.
Historiæ ischiade continua laborantium
 141.258.260.261.
Historiæ lancinatione partium, accessio-
num febrilium initio laborantium.
 214
Historia lancinationibus ventris laboran-
tium 2.86.87.88.
 Histo-

INDEX.

*Historia lancinationibus ventris, crurum
& musculorum abdominis laborantis
fæminæ* 139.214

*Historia macula nigra cum tumore ad e-
lephantiasin accedente, laborantis fæ-
minæ.*

*Historia Notarii Embdani & aliorum, in
quibus post arthriticos dolores loca an-
te juncturas itidem affecta sunt* 140
141

*Historia oculorum caligine cum aliis sym-
ptomatis per intervalla laborantis* 11

*Historia paralyfi unius crûris per inter-
valla correptæ fæminæ* 116

*Historiæ paralyfi crurum scorbutica labo-
rantium* 95.97

*Historiæ paralyfi dimidii lateris laboran-
tium* 102. 108

*Historiæ eorum, quibus paralyfis scorbuti-
ca in convulsionem desit* 107

Historiæ pleuritide falsa laborantium 83.
84.85.335.427.428.429.

Historiæ penis exulceratione laborantium
221.222

*Historiæ de iis, qui plures in eadem fami-
lia simul scorbuti sunt correpti* 339

Historiæ profluvio laborantium 31

Historiæ pulsus admodum parvi 314
315.316.

INDEX.

*Historiæ sputatione continua laboranti-
um* 205.431.434.437.438

*Historiæ sudoris copiosi atrophiam præce-
dentis* 212

*Historiæ tuberculis extra hydropem in
corpore extuberantibus laborantium*
278.279

Historiæ tumoris epatis & lienis 143
144

*Historiæ tumoribus duris toto corpore
laborantium* 92.264.269

*Historia ulcere scorbutico in facie labo-
rantis* 176

Historiæ ulceribus crurum laborantium
7.8.

*Historia ulcere & gangræna digitorum
pedis scorbutica correpti* 172

*Historia eorum qui vulgari gangræna
correpti sunt* 174.175

Historiæ laborantium ulceribus siccis 222
223

*Historiæ laborantium vomitu & dejecti-
onibus cum febris & angustia* 305.307

*Historiæ scorbuticorum in quibus urinæ
post crassas & rubras reddebantur te-
nues & spicæ cum vomitu* 46

Historiæ urinarum commutationis 48
49

Histo-

INDE X.

<i>Historia scorbuticorum cum urinis albis, crassis & turbidis.</i>	46
<i>Horrores febriles, bis aut ter quotidie cum do- lore infestantes</i>	350
<i>Humor melancholicus, Rondeletio teste, magis nervos contrahere, quam resolvere aptus natus.</i>	107
<i>Hydrops scorbuticus</i>	143
<i>Hydropis scorbutici generatio</i>	144
<i>Hydrops scorbutici curatio</i>	274
<i>Hydrops vesicalis</i>	153
<i>Hydropis vesicalis curatio</i>	157.158.26
	276
<i>Hyeme difficiliores dolorum scorbuticorum cu- rationes.</i>	90

I.

I <i>Actatio membrorum</i>	215.356.359
<i>Illustri loco nati ad sumenda medicamenta ferè difficiliores</i>	387
<i>Indicationes à febre sumta saepe autorem dece- perunt.</i>	133.404
<i>Institutum auctoris in hoc libro</i>	109.227
<i>Interrogare eadem sapius Medicis licet, ut Mer- catores calculum repetere non piget ex Ron- deletio</i>	47
<i>Ischiadis scorbutica remedium</i>	257
<i>D. Iodocus Lemnius</i>	162
	La-

INDEX

L.

- L** Actis caprini in atrophia scorbutica
 usus 169.170
 Lactis & lacticiniorum usus sæpe prodest
 in febribus scorbuticis 62.63
 Lancinationes crurum per intervalla in-
 festantes 303
 Lancinationis crurum in scorbuto caussa
 363.364
 Lancinationes membranarum, crurum
 aliarumq; partium initio accessionum
 febrilium 214
 Lancinationes ventris & membranarum
 muscutorum crurum & abdominis 301
 Ex lancinationibus ventris ruptum peri-
 toneum 286
 Languor sine caussa 209
 Languori similis affectus 211
 Lipothymia facilis in scorbuto caussa
 75
 Liquor stillatitius & decoctum lenticulae
 in tuberibus hydropis vesicalis 281
 Liquor perlarum 282

M.

- M** Arcelli Virgilii locus de carcinoma-
 te 176.177
 Materiam scorbuti etiam in maioribus
 vasis putrescere 70
 Me-

INDEX.

- Medici industriam ex fluxiorum alvi curatione posse cognosci* 417
- Medici, qui quotidie nova medicamenta præscribunt, fugiendi* 49. 50
- Medicis eadem sæpius interrogare licet, ut mercatores calculum repetere non piget.* 47
- Medicina apud nos vilescere cur cæperit* 54. 381. 382
- Medicamenta scorbuto appropriata qualia & quæ* 25
- Medicamenta scorbutica frigida, calorem febrilem contemperantia & mitigantia* 37. 38. 65
- Medicamenta scorbutica obstructions referantia* 18. 25. 132. 167. 425
- Medicamenta scorbutica temperatè calida humorem melancholicum incidentia & attenuantia* 37. 38. 66. 167 425
- Medicamenta scorbutica crudos humores concoquentia, attenuantia & incidentia* 18. 19. 25. 37. 38. 66. 111. 132. 167
- Medicamenta proprietate sua humorem melancholicum educentia* 149
- Medicamenta discutientia* 158
- Me-*

INDEX

Melancholia cur Galeno humor pessimus
185.397.

Methodus interrogandi & tractandi æ-
gri ad investigationem scorbuti 47

Morbi regionum quarundam proprij 1

Mortificatio cum & sine ulcere crustoso
& nigro 192

Mortificationis scorbuticæ remedium 192

N.

N *Asturtii aquatici efficacia in caro*
ex Rondelitii contra Fernelium sen-
tentia 67.203

Nautæ genus hominum miserrimum
284

Nervosi generis totius debilitas 112

Nomina scorbuti. 2

O.

O *Bstructio ventriculi seu œsophagi ad*
fauces usq; 253.333.413

Oesophagi usq; ad fauces obstructio, vide
obstructio.

Oris siccitate in languore scorbutico labo-
rantes modica humidi rejectione ju-
vantur; largiore ejus usu offenduntur.
209.

Pa-

INDEX

P.

- P** Alati exulceratione perforatii reme-
dium 309
- Palpitationis cordis caussa ex Fernelij
sententia 236
- Paralysis crurum scorbutica ut differat à
veterum paralyfi 95.96.97.
- Paralysis cruris alterius 285
286
- Paralysis cruris utriusque 284.288.
289
- Paralysis cruris utriusque in adolescente
studiofo annorum 15. Empiricè non si-
ne periculo curata 289
- Paralysis & imbecillitas digitorum prio-
rum & crurum 336
- Paralysis scorbutica cur in convulsionem
abeat 107
- Paralysis lateris dimidij scorbutica 101
292.297.299
- Paralysis pedum post usum ligni 283
- Paralysis scorbutica non tam paralysis,
quàm passio paralytica dicenda 98
- Paralyseos scorbuticæ caussa 107
- Paralyseos scorbuticæ curatio 108.296
298
- Paralysis scorbutica doloribus arthritidis
sc-

INDEX.

- sæpe succedit* 99
- Paralysis scorbutica Embdæ tardius & difficilius curatur, & aliis in locis, littori maris septentrionalis propinquo-ribus* 99
- Paralysis scorbutica facilius curatur, quàm veterum paralysis.* 98.99
- Paralysis scorbutica non est propria & primaria nervorum affectio, magisq; à vaporibus, quam ab humorum affluxu excitatur* 98.117
- Paralysis veterum cur sui semper similis sit; scorbutica verò varias habeat vi-ces* 96
- Parsimonia parentum præpostera, liberis noxia* 435.436
- Penis exulceratio, ejusq; generatio.* 221
- Pestis materia seu generatio ex Rondeletij sententia* 185.186.397
- Pestis & scorbutus cur signis & sympto-matis colludant.* 186
- Pestis & scorbuti, sicut & scorbuti ac morbi Gallici curatio diversa.* 186
- Pleuritis falsa* 82.308.427.429
430.
- Pleuritidis falsæ curatio* 429
- Plinij narratio de militibus Cæsaris Sto-macace correptis* 113.294.296.37
Pli-

INDEX.

Pliris sarchontici species 19
Potus quotidianus in febris scorbuticis

72

Præservatio ab Erysipelate 354.355

Præservatio à scorbuto 300.301

Providentiæ divinæ opus admirandum

224

*Pulsus in deliquio scorbutico major, quàm
 extra illud* 440

Pulsus in scorbuto qualis 41.74

Pulsus parvi ac debilis in scorbuto causa.

75.76.

Purgantia valida scorbutici non ferunt

17.233.243.248

*Purgatio hydropi occasionem præbet, &
 cur* 243.244

Q.

Q*uartanæ veterum cum nostris quo
 modo convenient, quo modo di-
 screpent. 58. vide in litera F. de febrim
 bus*

*Quantitates exquisitè in medicina deter-
 minare difficile est ex Gal. 1. ad Glauco.*

323

R.

R*ara quædam accidentia scorbuto
 magis, quàm pesti, convenientia*
 183.

K k

Rha-

INDEX.

<i>Rhazæ prognosticum in hydropse</i>	272.273
<i>Recidiva ex intermisso medicamentorum usu</i>	403.443
<i>Remedium arthriticorum dolorum</i>	142
<i>Remedium arthritidis scorbuticæ vagæ</i>	254.
<i>Remedium ischiadis scorbuticæ</i>	257
<i>Remedium palati exulceratione perforati</i>	433.434
<i>Remedium scorbuti</i>	331
<i>Remedium scorbuti cum febre</i>	306
<i>Renum dolor & ardor</i>	82
<i>Respirationis difficultas à thorace orta cur continua</i>	13
<i>Respirationis difficultas scorbutica cur aliquando continua</i>	13
<i>Respirationis difficultas scorbutica cur morbo sæviente major; mitiore remissior</i>	14
<i>Roborantia ventriculum vulgaria cur in scorbuto noxia</i>	58
<i>Rondeletij contra Fernelium de vi nasturtij disputatio</i>	67.203
<i>Rondeletii de pestis materia opinio</i>	107
	186.397.
<i>Rusticum hominum genus, ut celerem, sic validam curationem amat.</i>	240.
	San=

INDEX.

S.

- S**anguinis missionem largiorem cur re-
spuat scorbutus 111. 151
- Sanguis quibus, quantum, ubi mittendus
in scorbuto 150. 151
- Sanguis quibus in locis non facile mitten-
dus in scorbuto 151
- Sanguinis per hæmorrhoides vacuatio
150. 151. 328. 330.
- Sanguis plumbeus ac viridis ex venasecta
scorbuti index. 70
- Scorbutum cognovisse maturè quid pro-
sit 15. 227
- Scorbuti causæ 3. 292. 293. 297. 300.
- Scorbuti causæ interna, & generatio i-
psius 4
- Scorbutus cur hodie frequens 227. 284. 300
- Scorbutus hodie latè pomæria sua disten-
dit. 451
- Scorbuticæ putrefactionis virulentia 221
222. 224. 423. 441. 442.
- Scorbutica virulentia maximè nervos &
nervosas partes infestat 423
- Scorbutus variè medicinæ artifices falla-
ci morborum specie ludit. 116. 369
- Scorbutum cur variè fallaci morborum
specie nos ludere permittat Deus 369
- Scorbuti & morbi Gallici convenientia 5.
78.

INDEX

Tubercula scorbutica hydropis vesicalis
156. 276.

*Tuberculorum hydropis vesicalis topica
remedia* 158

*Tubercula varia quinque extra hydro-
pem in corpore protuberantia: eorum-
que causæ, signa & curatio* 278. 279.

Tumor epatis & lienis manifestus 143

Tumoris epatis & lienis curatio 148. 269

Tumor faciei, ejusque remedium 369.

*Tumores febrium scorbuticarum pestilen-
tialium* 180. & seqq.

*Tumorum in febribus scorbuticis pestilen-
tialibus remedium* 190. 408

*Tumor deformis, purpureus ac niger,
crura defœdans.* 448

V.

V *Ariarum corporis partium dolor* 79.

*Victus ratio calefaciens, attenuans
& incidens* 167. 168

*Victus ratio curandi modus in morbi
ignorantia tutissimus* 63

Victus ratio in scorbuto 345

*In vigore etiam febrium medicamenta
contra febrim & scorbutum facientia
necessitate urgente exhibenda* 64

*Unguentū emolliens, confortans, ac dige-
rens in tumore hypochondriorum.* 269.

Unguentum fidum valeriolæ 109

INDEX

*Universalis non sufficiunt, Galeno teste
ad exactā cognitionē, nisi accedat eti-
am exercitatio in particularibus* 288.

Ulcus & gangræna digitorum pedis 172

*Ulceras scorbutica variarum corporis
partium* 175

Ulceras sicca, eorumque generatio 225

*Ulcera nigrorum & crustosorum reme-
dium topicum* 178

Ulcera siccorum curatio 223.

Vomitus & vomendi conatus 22.337.
338.340.342.

Vomitus scorbutici remedium 338

*In vomitu lactis & lacticiniorum usus sa-
lutaris* 34E

Vomitus scorbutici remedium 338

*In vomitu lactis & lacticiniorum usus
salutaris* 34E

*Vomitus & frequentes aliæ dejectiones :
horumque affectuum curatio* 305.306

*Urinæ crassæ, albæ & turbidæ quid sig-
nificent* 34.35.45.54.236.239

*Urinæ crassæ & conturbatæ cū obscura
nigredine virescentes scorbutū notant, si
extra hydropem & febrim malignam
in morbo longo tales reddantur* 247

*Urinæ crassæ, nigræ & turbidæ, item ni-
græ cum obscura albedine* 36

Urinæ

I N D E X.

- Urinæ crassæ & rubræ manifesta livi-*
ditate insignes, seu subfuscæ 33.34.54
Urinæ conturbatæ à catbarticis 235.237
Urinæ in doloribus arthriticis 139
Urinarum in febris scorbuticis exacti-
or consideratio. 54.55. & c.
Urinæ morbi initio quales; quales morbo
crescente 32.33
Urinæ post crassas & rubeas tenues &
spiceæ, & cur 46
Urina laudabilis cum morbi incremento
& perseverantia, certum signum est
medicamina esse mitiora, quam pro
morbi causa conveniat 134
Urinarum permutatio facilis & frequens
quid notet 134
Urinæ in scorbuto variæ & cur 32.33
Urinæ in tertiana scorbutica quales 40
Urinæ in quartanis veterum & nostris
quo modo conveniant & discrepent 58
Urina in quotidianis scorbuticis qualis 59
Urinæ variæ quid notent 60.234.358.377
Vulgi opinio somnum profundiorē esse
causam efficientem scorbuti 202
Uvulæ partes absumptæ restitui non pos-
sunt 433

Finis indicis tertij.


DE
SCORBUTO
TRACTATUS

DUO

Authore

BALTHAZARO
BRUNERO

Doctore Medico celeberrimo.



HAGÆ COMITIS.

Ex Typographia ADRIANI VLACQ,
M. DC. LVIII.



DE SCORBUTO

Tractatus prior.

Ropriè hic morbus est affectio lienis, in quo acervato & levitur putrefacto humore melancholico, qui à sanguine separatus ad lienem transmittitur, pars tenuior, ceu effervescens, effertur sursum & obsidet gingivas, tanquam tenerrimas oris partes, & putredini maxime obnoxias, easque inficit & erodit, imo etiam emollit: crassior decumbit ad crura, & primum cutem horum defœdat maculis, sub initium exiguis, ac pulicum morsus imitantibus, mox amplioribus & sparsis, plumbeis, lividis, purpureis, violæ purpuram obscuro colore referentibus: quæ, si malum inveterascit, aut in totas tibias inferiores ad pedes usque se diffundunt

dunt cum tumore ad elephantiasin accedente, aut, quod rarius tamen accidit, erosa cute & carne in ulcera foetida, maligna, gangrænosa, & cicatricem ægrè ducentia degenerant, adeo ut sensu abolito crura immissum ferrum non sentiant, ut in elephantiasi & alphis seu morphæa accidit. Si vero penitus affideat, & radices agat hoc malum in liene & vicinis partibus, humorque melancholicus quasi refusus ad epar, aut non probè inde expurgatus sanguini permisceatur, tunc aut in totum distributus corpus *καχεξία* melancholicam infert, quæ ducit ad elephantiasin: quod tamen rarò fit: aut cummulatus ad epar & lienem, intemperiem efficit, vitiosi humoris copia, naturalem spiritum & calorem obtundentem. Unde, etsi alimenti copia suppetit, & venæ multo humore turgent: corpus tamen non alitur, sed extabescit, humore, qui caloris & substantiæ bonitate fibris destituitur, non abhærescente, neque conrescente: quo *ἀργοφία* differt à cachexia, in qua corpus intumescit, quod sanguis, etsi vitiosus est, concrescit tamen, & parti nutriendæ adhærescit.

Si

Si verò retineatur idem humor ad epar,
& exitu patefacto effundatur ad abdo-
men, atrophix conjungitur hydrops, ac
sæpe ad hoc malum lenta & occulta fe-
bris accidit.

Hæc morbi ratio est, qui, an
fuerit notus veteribus, variè disputatur
à recentioribus: aliis id affirmantibus,
sed conjecturis & argumentis diversis:
aliis negantibus. Non conveniunt
enim sententiis, qui cognitum veteri-
bus asseverant. Aliqui sub magnis
lienibus Scorbutum compræhendunt,
quorum meminerunt Hippocrates 2.
prædict. 2. Prognost. & in 2. de morbis
internis: Celsus lib. 2. c. 3. & lib. 4.
c. 9. Cælius lib. 3. chron. c. 4. Sed
hi omnes lienes magnos ita describunt,
ut cum his gingivas affici, & os fœ-
tere, aut sanguinem àliqua ex parte
erumpere, & si nihil horum evenerit,
in cruribus oboriri ulcera, aut omnino
non sanescentia, aut certè vix cicatri-
cem ducentia tradant. Celsus etiam
addit intenta ambulatione cursuris
dolorem & quandam accidere difficul-
tatem. Concurrunt autem hæc & simul
concurrunt in Scorbuto, nec perpetuò
maculæ ad exulcerationem veniunt
quarum

quarum Hipp. non meminit. Non ergo Scorbutus referri ad magnos lienes potest.

Nec cum hæmatite volvulo, ut aliqui putârunt, congruit, cujus meminit Hipp. tertio loco inter species Ileï seu Volvuli in lib. de morbis internis. In ea descriptione etsi hæc Scorbuto convenire possunt, quod ægri ex ore malè oleant: quod gingivæ à dentibus abscedant, à naribus sanguis profluat. tamen differunt, quæ sequuntur, & maximè quod ægri ad laborandum & deambulandum sint prompti. Vix enim è multis millibus unum reperiās sceletyrbe laborantem, qui promptè expeditèque incedat.

Ab ictero nigro verò longius differt, quem in 2. de morbis Hipp. ad eum modum describit, ut colorem circa faciem nigrescere, & maximè circa partes velut in umbram occultatas, & oculos cum virore pallere, itemque linguam infernè, & venas sub lingua atras & caussas apparere statuatur. Etsi enim hæc quæ de lingua Hipp. tradit, nonnunquam in scorbuto accidere possunt: tamen non perpetuò accidunt, & discrepant reliqua.

Paulus


DE SCORBUTO.

Paulus symptomata similia etiam ad perseverantes obstructions & duritiem lienis consequi annotat, scilicet os foetidum, & ulcera in cruribus cicatricem non ducentia: sed non meminit ullahum macularum, quæ sunt perpetuum & individuum symptoma scorbuti, nec semper in ulcera desinunt.

Sunt qui oscedinem à Marcello appellatam esse putent nomine generali prorsus, ab oris & ginginarum erosione. Sed cur huic malo, quàm reliquis jam descriptis, magis congruat, nulla ratione doceri potest. Cum ergo nulli ex iis morbis, qui à veteribus descripti sunt, notis suis exactè congruat, jure dubitatur an cognitus veteribus fuerit.

Nos cum aliis quibusdam familiarem & ἐνδήμιον stutuimus iis, quas nominavimus, gentibus, ex natura regionum, quæ palustres sunt, maritimæ & uliginosæ, & ex melancholica victus ratione, sicut dicemus de causis. Affligit autem aliquos cum febre, sed lenta: multos sine febre, si levis sit & modicè ebulliens putredo. Wierus, qui omnium optimè de Scorbuto scripsit,

scripsit, veteribus notum fuisse negat, Nemo veterum omnium, macularum meminit, quæ sunt indicium infallibile Scorbuti, quæ quando apparent in cruribus, medicus jam non dubitat de Scorbuto. Accedunt deinde multa alia etiam signa, pro ratione viscerum affectorum & temporum: & variant symptomata. Multis crura marcescunt: quibusdam intumescunt.



DE CAUSIS.

CAussæ evidentes hujus mali præcipuè sunt in aëre ex regionis natura, & victus ratione. Propterea rectè inter eos morbos refertur, qui ab Hippocrate propriè ἐνδημιον seu indigenæ & populares vocantur, & ex putredine contagii aliquid adipiscitur, quo inficit alios suo halitu & afflatu oris seu contactu, ut in osculis ejusdem poculi. Etenim ex ore vinum vel cerevisia in poculum polluta refluit, quam qui hauriunt, idem vitium contrahunt. Putredo enim, quæ occupat

& infestat gingivas contagium gignit, quod in analogis corporibus ad easdem partes adhærescit. Aer si sit impurus & inquinatus, crassis, lutulentis, uliginosis, putridis aut putredini obnoxiiis halitibus, corpora, in quæ abscorbutia, implet & inficit. Talis est autem in locis & regionibus palustribus, maritimis, uliginosis ad aquas stagnantes ab exundationibus aquarum seu propter incrementa fluminum, seu propter maris æstus. Et augetur hæc aeris constitutio austrino & pluvioso cælo, tum alio quocunque anni tempore, tum autumno & hyeme maximè. Epatidas enim & splenitidas Hipp. expressè palustribus locis tribuit, in lib. de aere, aquis, & locis. Sed non minus facit ad hunc morbum victus ratio melancholica, qualis est nautica, constans cibis aridis, duris, crassis, terreis, è quibus humoris crassi, melancholici & sæculenti copia procreatur. Tali victu utuntur illæ regiones, quibus hic morbus familiaris est, nimirum carnibus aut piscibus natura seu pituitosis seu melancholicis, quales sunt porcine

porcinæ, bubulæ, grandiorum piscium. panis biscoctus, ater, furfuraceus: aut insuper sale maceratis, ad solem exsiccatis, fumo induratis.

Fortasse confert aliquid perpetua stagnantium aquarum aut palustrium putredo, quod cum longius absint à via solis hæ regiones, & minus percoquantur aquæ, & quod superfluum est, minus consumitur, quam in locis calidioribus. Augentur autem in corporibus vitiosi humores, si accedant immodicæ aut intempestivæ vigiliæ corpore repleto, affectus animi, curæ, mœstitia, sollicitudines: si consuetæ evacuationes hæmorrhoidum aut mensium supprimantur.

Contrahitur vero idem morbi genus à primo exortu à parentibus ex semine vitioso, & deinceps, ut dixi, ex contagio.

Internæ causæ sunt exuberantia humoris melancholici, vel solius, vel cum crassa pituita mixti congestique ad lienem, vel simul ad epa, & in spaciis interjectis: tum corporis constitutio atque aptitudo, & vitium epatis atque lienis ex intemperie atque imbecillitate: quo fit, ut gignatur copia humo-

humoris melancholici, nec rite expurgetur à sanguine, nec rejiciatur à corpore.

Continētis causſæ rationem habet ille idem humor, qui ex obſtructione leviter putreſcens putridos halitus ad ventriculum, & inde ad os exſpirat: Unde gingivæ inficiuntur, & concepta putredine molleſcunt, ulcurantur, foētent, abſcedunt à dentibus & maxillis. Craſſior ejuſdem humoris pars ſubſidet in pedes. Hodie, poſtquam gentes illæ cæperunt multo vino uti, minus graviter tentantur, & ferè magis infeſtantur, qui victui priſtino indulgent, & ad victum melancholicum addunt cereviſiam frigidam, abſtinent à vino, nec comedunt acria, quibus emandatur, quod ex ratione victus contrahitur.

SIGNA Αποδεικνύει.

Incipiente morbo ſentitur toto corpore gravitas & laſſitudo ſpontanea, circa præcordia anguſtia, crurum imbecillitas, levis rigor cum dolore obſcuro: gingivæ pruriunt dolentque, & colorem à naturali rubedine mutant: facies

Wierus in obſervat.

*Initium ſeu prima diſſe-
rentia morbi.*

facies ex pallore vergit ad fuscenedinem.

*Augmentum
seu secunda
differentia.*

Augescente eodem humor laxus & sanguine manans cum putredine & foetore gingivas occupat, quarum caro quandoque ad dentium radices usque consumitur: dentes utrobique vacillant. In cruribus emergunt maculae, initio rubescentes, quales ad morsus publicum exurgunt: majores tamen, quae nonnunquam in femoribus & toto corpore sparsim ex levi fervore tenuioris sanguinis scaturiunt. Sed ferè maculae pedum fiunt amplae, plumbeae, lividae, purpureae, nigris violis obscuriores, ex faece sanguinis, quae eò decumbit, natae. Ideo minus alibi, quam in cruribus apparent, & quoties apparent, certissimum Scorbuti praesentis sunt indicium. Quod si & fauces livor occuparit, non procul mortem abesse denunciat, quia humore totum corpus jam occupante calor extinguatur. Ingravescens morbus affert ambulandi impotentiam, nervorum contractionem, anhelitus difficultatem: maximè ubi aeger movetur aut erigitur aut sudat, & tum nonnunquam animo linquitur, halitibus melan-

*Differentia.
tertia seu status
morbi.*

lancholicis spiritum naturalem opprimentibus : nec inusitata sunt animi deliquia in aliis affectionibus melancholicis. Decumbens autem respirat facilius , appetitus cibi in aliquibus languet , in nonnullis manet , prout humor vitiosus est & putredine affectus , qui in stomachum eructat , & nitrosa qualitate eum imbuit. Si acidus , potius appetitum excitat. Exacerbatur etiam veluti per circuitus & periodos in multis die quarto aut quinto ; in plerisque tertio ; in paucis singulis diebus , sine tamen manifesta febre : et si aliqui simul lentè febricitant : Quorum exacerbationum causam puto humoris puri aut cum aliis permisti diversitatem. Pituita enim admista singulis diebus : bilis verò quovis tertio : si ipse puris sit humor melancholicus , quarto commovetur. Sæpè febres præcedunt ardentes , malignæ , duplices Tertianæ : nonnunquam si non rectè curatur æger desinit in quarantanam. Alvus aliis siccescit : aliis fluit. Livor crurum verò quandoque in totas inferiores tibias ad pedes usque se diffundit , ut in Elephantiasi & cachexia. Aliis rursus crura sic attenuantur

nuantur, ut ossa videantur sola cute tegi, accedente Atrophia. Aliquibus maculæ in squamulas resolvuntur, quemadmodum in Erysipelate, quando humor est tenuior & siccior: aliis contra læves & æquales permanent ac splendent, vestigio etiam relicto, si digito comprimantur, quando materia fuerit crassior & humilior. Nonnullis crura varicibus extuberant, & venæ sub lingua in labio inferiori nigricant & tument, aut maculæ degenerant in ulcera maligna, foetida, gangrænosa, qualia sunt Telephia, & quod vocatur malum mortuum. Pulsus, ut in Quartana, varius, exilis, durus, frequens, debilis pro morbi tempore & virium ratione, urina rubicunda, turbida, crassa, fœculenta admodum, vini rubri recentis colore, odore gravis. Fœtor in urina signum est putredinis: etsi ea non tanta est ut Febrim, ut Quartanam efficiat: longa tamen est & obscura febris. Hæc signa initium, incrementum & statum significant. Ulcera non perpetuò oboriuntur, sed tunc demum, cum tanta est copia & malignitas humoris ut occupet habitum carnosum & ulcera efficiat,

Προγνωστικά.

I.

Scorbutus Vere & Autumno maximè infestat. Senibus gravior est & adultis, puerperis: in ratione victus negligentioribus frequentior. Pueris *συνακακή* crebrius; *σκελετύρβη* rarius accidit. Non gignitur enim talis copia humoris melancholici in pueris, cum natura sint humidiores.

2. Scorbutus, qui hæreditarius est & propagatur à parentibus & contrahitur, contagio totas sæpè familias invadit & inficit.

3. Scorbutum & antecedunt & consequuntur febres: quandoq; antecedunt ardentes, malignæ, duplices tertianæ & quartanæ. Consequuntur febres quartanæ, sic ut & febres quartanæ terminentur in scorbutum, & vicissim Scorbuto superveniant aut complicantur febres.

4. Scorbutus frequentissimè in Atrophiam & Tabem, quandoq; in cachexiam melancholicam aut hydrophem, interdum in dysenteriam desinit.

5. Ul-

5. Ulcera ex maculis Scorbuti nata quandoque ad eam deveniunt malignitatem, ut partibus corruptis sensum aboleant: quemadmodum in malo mortuo, alho seu vitiligine.

6. Interdum illæsis gingivis sola crura affliguntur, si quibus sanguis ex ore & naribus uberius effunditur.

7. Livor faucium in Scorbuto signum lethale. Nam caloris nativi extinctionem significat.

8. Morientibus ex hoc malo maculæ conduntur & evanescunt: nonnullis verò à morte rursus erumpunt.

Θεράπειαι.

Aër in hoc morbo sit calidus, siccus & purus atque lucidus. Victus ratio instituatur ex cibis coctu facilibus & boni succi, moderatè calefacientibus, incidentibus, attenuantibus, & detergentibus. Qui metuunt sibi in aere Saxonico ab hoc morbo, iutuntur plurimo sinapi crudo & diluto cum succo. Didicerunt enim experientia hoc genus feminis acredine & subtilitate partium incidendo

dendo prohibere, ne fiant & colligan-
tur obstructions melancholicæ) ita ta-
men ut admisceantur quæ leniter ad-
stringunt. Potus sit cerevisia pura benè
defæcata, absynthio condita. Com-
mendatur etiam vinum absinthites, &
chamædrytes. & serum lactis, aut lac
ipsum, aut caprinum aut vaccinum re-
cens, in quo decocta sint Sisymbrium,
cardamine, vel nasturtium hortense, vel
cochlearia.

Vera Curatio, ubi præcesserit leni-
tio ventris vel communium viarum,
incipiatur à venæsectione. Secentur
autem splenetica (Salvatella) brachii
sinistri, aut Epatica brachii dextri, aut
utraque, si sit opus, pro alterutrius
aut utriusque visceris affectione, &
sanguis educatur pro ratione humo-
ris vitiosi. Si ater, crassus, impurus
fluxerit sanguis, majori copia mitta-
tur; parcius contra, si purus & ruber.
Habeatur etiam ratio ætatis ac viri-
um, anni temporis, constitutionis cor-
poris. Plurimum confert provocatio
hæmorrhoidum. utrumvis viscus affe-
ctum fuerit. Nec impedit φλεβολομίαν

macularum eruptio. eò quod illa viscera allevat, & humorem vitiosum in his & nervis ipsis redundantem exhaurit, cujus parte aliqua per phlebotomiam absumpta, reliquam educere facilius est.

In præparatione & expurgatione humoris melancholici, apertioneque obstructionum servantur & leges & usurpentur remedia, quæ in humore & obstructionibus splenis adhiberi solent. Adhibeantur topica eadem, si usus requirat.

Purgato autem corpore experientia docuit provocationem sudoris matutinis & pomeridianis horis ante coenam morbum efficaciter sanare. Utuntur autem ad eam rem acribus & incidentibus: sed præ aliis ab usu & experientia commendantur cochlearia, Nasturtii species, sisymbrium, cardamine, becabunga, quam putant speciem esse Anagallidis aquaticæ, Dracunculus aquaticus, Scordium, quod habet vim splenetica, sempervivum minus, gustu acerrimum, id est Vermicularis, & Splenetica omnia calida, quæ aperiunt, incidunt, detergunt, maximè cortices Rad. Capparum, Ta-

Tamarisci, Fraxini, Cuscutæ, Asarum, Scolopendria, Caterach, Polypodium, Thymus, Epithymum, Chamædrys, flores Genistæ, Adiantum & similia. Commendantur autem succi expressi ex prædictis plantis præcipuè ex Cochlearia, Nasturtiis, Bacabunga, Sifymbrio, aut decoctiones earundem in lacte caprino aut vaccino, cui admiscant aliqui utiliter absinthium, fumariam chamædryn, & alia similia.

Gingivæ vindicentur à putredine ac restituantur oris collutionibus, quæ fiant ex corticibus & foliis oxycanthæ vulgaris & rosis integris nondum maturis simul excoctis in aqua chalybiata, addito Sale & Alumine. Item ex malicorio, Symach, balauistiis, passulis decoctis in aqua fluviali, & colaturæ additis melle rosato colato & alumine. Laudatur & linimentum ex pulveribus bistortæ, & tormentillæ, sale, diamoron, aut ex alumine, pyrethro, mirrha cum melle crudo aut salvia & olibano. Caro in gingivis si luxuriet, Scalpro aut Volsella eximatur, aut coërceatur unguento Ægyptiaco, vel alumine usto applicatoq; cum melle rosato, aut oleo vitrioli. Si putredo

gingivarum carnem exedat, commendatur aqua ex decocto arsenici sublimati & aluminis usti in aqua plantaginis, si scilicet Spongia in hanc aquam intracta gingivis applicetur.

Maculae eluuntur decocto grano juniperi, Sisymbrii utriusq; Nasturtii, cochleariae, fl. chamæmeli, melissæ, roris marini, thymi, hyssopi, absinthii, & similium. Eodem ceu fomento & rigor nervorum corrigatur, & post fotum jungantur nervi adipe anserino vel anatino, vel pinguedine Taxi. Ulcera mūdificantur ex succis cochleariae, apii, & absinthii cum melle coctis ad consistentiam, cui si postulārit putredo, aspergatur aliquid de pulvere Aristolochiae rotundæ, vel aluminis usti, vel præcipitati. Confert etiam unguentum Diachalciteos apud Galenum, & ad cicatricem ducendo Emplastrum de minia vel de Thutia. Plura lege apud Wierum & alios.



TRACTATUS

Posterior.

I.

Ausæ Scprbutum gignentis.

1. Aër putridus auram contagiosam spirans. 2. Alimenta, nempe cibi crassi & melancholici ex carnibus fumo induratis, & aquæ putridæ atque ex illis coctæ cerevisiæ. 3. Retenta, humor melancholicus in splene & vicinis partibus putrefactus, mesaræum totum & ventriculum inferciens, sæpè totam sanguinis massam corumpens & invadens.

2. Adjuvantes. 1. Temperamenta, id est, ex traduce à parentibus sæpe producitur. 2. Regio, in qua talis est victus ratio, Aquæ item putridæ, de quibus Hippocrates lib. de Lienibus magnis.

3. Foventes. Lien, qui non benè expurgat succum melancholicum, sed propter crassitiem eundem retinet, & in sese

putrescere finit. Unde & vicinæ partes & replentur & similiter afficiuntur. Atque hæ causæ sunt vel externæ, vel internæ & conjunctæ.

Differentiæ. Wierus tres commemorat differentias, quæ scilicet magis & minus se habent. Prima est, quando gravitas, spontanea lassitudo, angustia præcordiorum adest: Ut supra de signis, &c.

Curatio.

DE lenientibus non est magna quæstio. Possunt esse Elect. lenitivum, pulvis Senæ, decoctio senæ talis, qua ego summo cum successu utor. ℞. Fol. Sen. ʒiij. Epithym. creti: ʒ ij. infundantur hor. 3. in decoctione infra scripta. ℞. Passularum ʒss. poly-pod. querc: ʒ iß. jujuba: sebest. ananum: ij. Coq. in s. q. aq. pro ʒ viij. quibus infunde horis 3. fol. senæ, Ubi ebullierint quater facta colatura ℞. ʒ vj. in quibus iterum parum coquantur Turpeth alb. & gumm: Elleb, nigri styr. ana ʒß. Zinzib. cariophyl. ana ʒj. Exprimantur fortiter & adde Mannæ ʒ vj. fiat Potio, quæ suaviter evacu-
at.

at. Etsi autem alicui hæc paulo fortior videri queat: tamen ultra 3. sedes operari non animadverti. Quod si nimis vereare electiva adjicere, sine illis parato. Dant nonnulli alia, sed cuique constat sua ratio. Ego hanc usurpans, semper felicem deprehendi successum. Notabis autem à validis medicamentis abstinendum, quod facilè cor in hac affectione afficiatur, & animi deliquium creetur. Pulvis hic est. ℞. Fol. Senæ ʒj. Epithymi Tartari alb. ana ʒss. cinamomi, cariophyl. galangsemi: Anisi ana ʒj. diagrid. ʒj. fiat pulvis. Potest & ʒss. in sero caprino infusa dari.

Regula.

Pinguia nulla foris abhibenda prius, quàm maculæ perfectè prodierint. Exasperatur enim dolor, quia pinguia cum sint facilè inflammabilia, materia autem scorbuti partim calida, partim frigida, doloris materiam facilè augent.

DE PRÆPARANTIBUS.

DEbent hæc accommodari humori melancholico peccanti, ita tamen, ut diligenter provideas Temperamento ægrotantis, modo ad sanguinem, modo biliosam, nonnunquam ad pituitosam naturam accedentis. Pro conditionibus igitur hisce singula miscebis. Multi accipiunt Syrup. de Fumaria, de Epithymo, de Lupulis ana ʒss. aq. fumariz, lupul, borrag, ana ʒj. & exhibent ex his haustum per dies sex. Interim venam fecant. Alii ex extracto hellebori nigri, rad. fragariæ & polypod. cum aqua fragar: borrag: aut cuscutz aut similibus digerunt simul & subducunt, præsertim si lienis tumor adsit: Deinde ad decoctiones longas ex helleboro nigro, Turbith & Myrobalanis pergunt. Tandem ad Eradicativa veniunt. Recurre ad superiora. Summa est ut aperias, incidas & detergas.

PUR-

P V R G A T I O

electiva.

Modo dixi à validis abstinendum. Multi tamen, non sine commo- do & laude exhibuerunt confectio- nem Hamech, à qua tamen doctissi- mi viri non sine causa abhorrent. E- go in substantia non exhibui, sed in decoctione hoc modo. ℞. Infusi Se- næ superioris sine Elleboro & Tur- bith ℥ss. confect. Hamech. Diaphæ- niconis ana ℥iiij. rosati Mes. 3℔. Bul- liant ad absumptionem 3j. aut pau- lo plus. Post colatis adde mannæ calab. 3vj. fiat potio, quæ suaviter & sine torminibus est operata. Ac- commodata autem est ad humores melancholicos & pituitosos adustos, ad cujus imitationem poteris 3ij. confect. Hamech, aut alia similiter exhibere.

Wierus probat pilulas de fumaria ac Diasenæ: damnat eas, quæ ex lap. Lazuli exhibentur. Alii pro evacuati- one hunc pulverem exhibent à 3j. ad 3ij: ita ut si sit robustæ constitutionis 3ij. vel 3i℔. ex vino oligophoro sumat

b 5

℞. Aga.

℞. Agarici albi s. croci, Epithymi cretici, fol. Senæ ana ʒ ij. pulverisentur singula. Atque hoc pulvere ad lictus Balthicum utuntur. Circumfertur & alius pulvis, quo frequenter se uti scripsit quidam Magister in Saxonia medicinam faciens in toto curationis decursu, cui ego non admodum fido, cum eo artificio, quo conveniebat, non compositus esse videatur; salvo tamen aliorum iudicio. Ego potius crasso humori pituitoso adusto aut cum pauca melancholia mixto competere arbitror, quam melancholico humori per se corruptio, ut apparet. Ut tamen sciscitari ex aliis possis, adscribere volui. ℞. Turbith. el. ʒ j. Zinzib. ʒ ss. Rhab. el. ʒ ij. spicæ gr. iv. Hermodact ʒ ss. Anisi Diagrid. ana ʒ j. Epith. fol. Senæ, croci orient. ana ʒ ij. pulverisentur subtiliter, detur ʒ j. vel ʒ iss. mane hora quarta ex haustu cerevisiæ cum custodia. Priorem ego pluris facio, quamvis neque hic omninò sit negligendus, si à perito medico usurpetur. Similes formæ poterunt ab uno quoque fieri infinitæ, pro conditione ægrotantis.

*Appropriatorum, Detergentium,
Attenuantium & Inci-
dentium usus.*

HIs ritè succedentibus aggredere morbum ipsum, in quo ego cum Wiero efficaciss. expertus sum sequentia, ℞. ꝑ. iv. succorum seqq. & adjecto momento aq. cinamo, & sacchari candi fiat potio, usurpanda ad dies octo: Ego malim quatuordecim; singulis diebus bis manè, scilicet horam circiter 5. vel 6. & superdormiendo atque sudando horam dimidiam. Succi tales sunt, ℞. succi cochleariæ, sisymbrii, cardami: nasturtii aquat: ana ꝑ. j. Anagall. aquat. ꝑ. j. succi verò vel simpliciter exprimantur, vel herbæ in sero caprino decoquantur, vel in lacte austero infusæ tundantur & exprimantur. Sed præstat succorum per se usus; ego loco nasturtii aut sisymbrii extracto scordii, aut chamædryos, aut vermicularis, vel dracunculisucco utor. Notabis autem Anagallidem aquaticam cæterorum caliditatem attemperare. Quocirca ejus Dosin pro eo atque videbitur augere vel minuere poteris, pro ratione

ratione scilicet calidorum vel frigidorum humorum & symptomatum concurrentium. Si enim conjungatur cum spasmo, cum Paralyfi aut similibus: intentione ad humorem & causam habita admiscere poteris alia. Hinc fit ut quidam talem exhibeant potionem. ℞. Seri Caprini ꝑ v. succi acetos. Cardam: Sifymb. ana ꝑ ij. misce, & bis tepidè bibat sudetque. Brambachius ℞. pulv. succini alb. cum theriaca, dissolve in aq. flor. Sambuci & acetosæ cum paucò croco. Johan: Nævius accipiebat rad. Armoraciæ alb. lb j. scindebat in frusta & infundebat in lb x. vini optimi. De ista infusione bibere jubebat ægrum bis de die ꝑ iv. Ex eaquæ sæpè lavare jubebat dentes. Item ℞. summit. absinthii, fol. acetosæ, fumariæ ana. q. ℥. ex his confice succos, quorum ℞. ꝑ i lb. lactis caprini ꝑ iv. Bibat sero & mane, & vespatur, si fieri potest, carnibus capreolorum.

Alius hujusmodi pulverem se exhibuisse scripsit ad D. Salamonem Wittebergensem, quem tamen genuinè descriptum dubito propter opium; cujus usum in hoc morbo non suspi-
cari


cari possum ullum. ℞. cinam. el. nucis
moschat. Rhabarb: elect. ana ʒ i ʒ. cro-
ci orient. opii ana ʒ ʒ. Redigantur in
pulverem subtilissimum, qui in ix.
partes dividatur, quarum quælibet
infundatur in aq. vel succ: acetos. suc.
nasturtii, aq. aut succi Becabungæ à
cochlearibus 3. Succu absinthii, vini
bastarti ana cochlearii. Datur autem
una Dosis ægro in Balneo ut primum
incaluit. De balneis autem infra si-
gillatim. Notandum autem est, ple-
rosque succos aut potiones sudorem
cientes exhiberi à prandio aut manè
hora una vel dimidia ante balneum.
Ego hujusmodi pulverem exhibeo per
14. dies. ℞. Cinamo. interioris, Ma-
ceris, Nucis Moschat. ana ʒ ʒ. sem.
Nasturt: ʒ iij. croci ʒ iij. misce, fiat
pulvis. Exhibeo autem ʒ j. cum aq.
fumi terræ & fœniculi cum Syrup. de
fumaria dulcoratis, alternis diebus,
ita ut manè hora quinta propinem
pulverem. Post depositis excrementis
corporis ingredi jubeo balneum hora
septima paratum ex ignitis recrementis
cupri. Ex balneo jubeo ingredi lectum
& commorari in eo per horam. Alte-
ro die labrum seu balneum ex herbis

respicientibus humorem melancholicum Lienem præcipio ad dies 14. continuos. Sint qui immediate ante balneum exhibeant hunc Syrupum. ℞. Succi absinth. domest. sylvest. centuarii minoris, nasturtii aquat. ana. Contundantur & cum lacte caprino exprimantur per pannum, & priusquam balneum sudatorium supra fellam, cujus infra meminero, ingrediatur, ebibat, sed ita ut priusquam lavet, sub initum semel saltem bibat Syrupum, postea bis, manè scilicet & vesperi. Sæpè etiam huiusmodi herbas cum lacte mixtas ore teneat & expuat. Plura remedia commemorantur à Wiero, quæ ex ipsius tractatu discere potes.

Roborantia.

DUm hæc fiunt ex conserva cochleariæ & aliis, potes exhibere opiatam roborantem, aut conservas, aut confectionem aromat. rofat. Diarrh: Abbat. Diatrionfant. aut Dianisi pro conditione ægrotantis. ℞. conserv. cochl. ℥ iß. Chamaedryos, Scordii ana ℥ j. rad. borag. bugloss. conditarum ana ℥ ß. ℥ ij. Elenii con-

condit. ꝯß. cum syrup. acetos. vel Borag. vel de succo scordii aut Chamæd. fiat conditum. Poteris admiscere spec. cordiales, capitales, aut alia, de quibus iudicium tuum consule & conditionem morbi, ægrotantis, symptomatum, ætatis, temporis. Rotulas sæpe adhibui accommodatas modò ad Lienem, modò ad Epar, pro eo atque hoc, vel illud viscus magis fuit affectum, æger etiam ferre potuit vim medicamentorum. Ne obliviscere stante curatione singulis diebus 5. vel 6. semel purgatione opus esse.



SYMPTOMATVM CURATIO.

I. MACULARUM

in cruribus aut toto corpore.



I maculæ apparuerint, factis prius faciendis balnea apparare oportet: quæ qualia

qualia esse debeant, ex superioribus animadverti potest, nempe resolventia, discutientia & emollientia: quibus roborantia juncturas addes. V. C.

℞. Baccarum juniperi leviter confusarum, Sisymbrii, cardaminis utriusque, nasturtii hyematis, cochleariæ ana M. ij. florum Chamæmeli M. iij. artemisiæ, melissæ absinthii, roris marini. majoranæ, thymi. hyssopi an. M. j. coq. in s. q. aq. & super caliditatem hujus decoctionis foveantur crura. Poteris & spongas ex hoc decocto madefacere, exprimere, & partibus tibiæ inferioribus applicare, & sic maculæ delitescens manifestè erumpent, sicque scorbuti signa apertè se prodent.

Fomentatio alia. ℞. nasturt. aquat. fedi minoris, fol. malvæ majoris, flor. Chamæm. straminis hordei, aut hordei depilati ana ℥ ij. Lapatii acuti, radicis lappæ majoris an. ℥ ij. Concissa singula coq. in s. q. aq. & super vaporem fomententur pedes bis de die, duabus scilicet horis ante prandium, & duabus ante cœnam, & simul continuetur usus potionis ex lactè caprino & succis. Alii

Alii hisce utuntur. ℞. malvæ majoris floribus albis cum radicis, fol. pruni sylvestris cum radicibus, straminis hordei, nasturtii aq. cum radicibus lappæ majoris cum radicibus, fumaricæ cum radice, Chelidonii minoris cum radice, utricæ majoris cum radicibus ana M. j. Coq. in aheno in s. q. aquæ. Post subdatur ahenum sellæ, & excipiatur vapor universo corpore probè pannis tecto ad usque collum, ne quid ad caput expiret. Usurpari autem debet quotidie per horam Syrupo ex absinthio, fumarica, &c. prius bibito. Alii *ευναδισμα* per novem dies usurpandum præscribunt ex malva, Chamæmelo, artemisia, matrisylvia, foliis quernis & radicibus helenii.

Crura etiam inungenda sequentibus linimentis: ℞. butyri Majalis ℥ iiss. Baccharum Juniperi contusarum ℥ vi. Vini puri ℥ ii. Coq. in fictili ad consumt. vini. Coletur cum expressione vehementi, & inungantur crura mane & vespere.

Vel ℞. butyrositatis ex lacte, q. s. si. simb. nasturt. hyemalis, becab. absinth.

*Wierus in ob-
serv.*

baccarum jnniperi ana p. æ. Decoq. & facta forti expressione inungantur crura dolentia. Si verò cum caliditate p. n. q. febrili conjungatur, sequens modus observetur.

II. CALORIS præter naturam.

FIt & nonnunquam ut calor appareat præter naturam, feбри non absimilis, qui plurimos Medicos non indotatos fefellit. Is noctu plerumq; invadit sine rigore aut horrore vel frigore, & durat usque ad tempus matutinum, sed distinguitur à febrili, tum quod sine rigore aut horrore aut frigore accedat, tum quod certa intervalla more cotidianæ servet, nec tamen proprietates quotidianæ habeat. Cum is conjungitur malo, augenda est dosis becabungæ, dosi herbarum calefacientium contracta.

*Wierus in ob-
servat.*

Coagulum etiam lactis ebutyrati, vel lac ebutyratum recens concretum apponitur. Alii si calor conjunctus sit cum scorbuto, accipiunt lac mulieris lactantis puerum, & exhibent: Vel capiunt polypodium & grana iuniperi.

niperi, contundunt, & aqua coquant, defundunt & addunt saccharum, & mane, item circiter meridiem & sub noctem bibenda exhibent. Alii exhibent ꝑ. i. pul. penis tauri coeuntis, & exhibent ex lacte caprino, ad sedandum calorem.

Hypochondriorum peculiaris habeatur ratio. Illinatur igitur sinistrum spleneticis : dextrum verò oleo absynthite, quibus etiam succus herbarum aperientium admisceri poterit : quo in casu utere unguento de succis aperitino Lusitani. Et si calor sit magnus parare poteris unguentum ex butyro ovillo.

III. GINGIVARVM

Laxarum & putridarum.

Gingivæ etiam fiunt laxæ & putridæ : ideoque confirmando & exsiccando illis occures. Accipe v. g. cort. berberis, Cochleariæ, Sifymb. Cardam. nasturtii hyemalis, ros. rub. q. s. coquantur in aq. ferrata. In aqua colata dissolve pauxillum aluminis, ac

ne ingrato sit sapore, abstergatque, adde mel crudum vel rosatum. Quod si gingivæ laxiores fuerint, & fervor aliquis adfuerit, adde Diamoront. Nonnulli accipiunt folia oleastri, cortices pruni sylvestris, vel ℥. Aq. ℞. i. salis, aluminis ana ℥ ii. Bulliant simul.

Vel ℥. Cort. granat. Samach, balauft. ana ℥ ℞; Passul. ℥ i. Aq. fluvialis lib. iiii. F. decoctio ad medietatem. Colaturæ adde mellis rosati ℥ ii. Aluminis ℥ ii. Potest etiam fieri decoctum ex rad. Bistortæ.

Poteris etiam ex radicibus enulæ, hyssopo, ambrosiana & Betonica incotis lib. ii. aquæ, & addita aluminis ℥ ℞. & cum melle fervefactis despumatisque facere collutionem: Vel ℥. aceti cerevisiarii lib. ii. boli armen ℥ ℞. aluminis ℥ ii. mellis ℥ ii. Bulliant simul. Poteris addere Sabinam.

D. Sal. Alb.

Alius quidam talem collutionem facit, quam multoties se expertum scribit optimam. ℥. fol. Sifymbrii, menthæ, salviæ, rosarum rub. immat. ana. M. ℞. sem. aquilegiæ ℥ ii. balauft ℥ ℞. Coq. in aq. ferrata in colaturæ

ra ʒ viii. dissolve aluminis ʒ ii. mellis ro-
fati colati ʒ ʒ. F. gargarisma.

L I N I M E N T A

Pro gingivis.

Magnæ efficaciz expertum est hoc,
quod desiccat, desolvit, deterget
& adstringit.

℞. Florum rubrorum malvæ ar-
borefcentis, fol. salviæ min. exarefact;
aquilegiæ an. ʒ ʒ. myrrhæ, nucis mo-
schat. Theriacæ opt: ʒ ii. alum. usti ʒ ii.
Pulverisata accuratè cum melle Li-
tuanico subigantur in modum unguen-
ti.

Aliud. ℞. fol. aquilegiæ, menthæ,
salviæ, nucis moschatæ ana ʒ ii. alu-
minis usti ʒ x. myrrhæ rub. ʒ ii. Te-
rantur terenda, & mixta excipian-
tur ʒ iii ʒ. mellis rosati col. & re-
digantur in formam unguenti :
Quod alias hoc modo paratur : Re-
cipe mellis opt. ʒ ii. Aceti vini ʒ i.
floris æris ʒ i. alum. ʒ i. Bulli-
ant donec rubefiant. Deinde adde
pul. salviæ, nucis muscatæ. C. C.

præparati ana. ʒ. ʒ. Misce, f. linimentum quod videtur magis convenire jam putrescentibus gingivis.

Aliud. ℞. succi rad. bistortæ, nasturtii ana. ʒ i. Mellis rosati ʒ iii. Coq. ad succorum consumptionem, & adde alum. usti ʒ ii. myrrhæ rub. nuc. mosc. testarum de ostreis præpar. & pulverisatis an ʒ i. Misce.

Aliud. ℞. mellis opt. ʒ iii ʒ. Aceti vini ʒ ii. Viridis æris ʒ i. Bulliant dum rubefiant, post adde myrrhæ, C. C. usti ana ʒ j. Nuc. mosch. sabinae, salviae an. ʒ ʒ. Misce. Sunt qui accipiant ovum assatum. Addunt æruginis, aluminis. an. ʒ j. contundunt, & expresso gingivas inungunt.

Ubi non solum confirmatione & exsiccatione, sed etiam resolutione opus est, tale fiat unguentum: ℞ Theriacæ opt. ʒ ʒ. Mellis rosati ʒ ʒ. Mellis crudi ʒ i. alum. usti ʒ iii. Misce. Vel ℞. succi bistortæ, mellis rosati ʒ iii. Coq. ad absorptionem succi. Postea adde alum. usti ʒ i. f. linimentum.

Vel ℞. Bistortæ ʒ ʒ. salis ʒ i. Misce cum Diamoro ad consistentiam conditi, & inungantur gingivæ. Poteris etiam miscere pyrethrum & alumen cum melle

le crudo, & addere pul. salviæ & oli-
bani.

Quod si gingivæ multo madefiant
sanguine & flaccida sint, non abs re
fuerit hoc uti. ℞. salis usti ʒ ss. balauft.
ʒ i ss. Misce, pulverisa, & frica gingi-
vas. Vel ℞. cineris sarmentorum, te-
starum ostrearum, vel mitularum u-
starum an. partus æq. Frica cum pulvere
gingivas. Saniem etiam exugere o-
pertet.

Si excrescet caro gingivarum, for-
cipe aufer, & inunge unguento ægy-
ptiaco, vel alumine usto cum melle
rosaceo mixto, vel coërceto oleo vi-
trioli.

Vehementi gingivarum putredini
Wierus talem dat aquam: ℞. arsenici
sublimati ʒ ii. aluminis usti ʒ i i ss. Pul-
verisentur, & in aq. plantag. lib. i. bul-
liant ad horam in vase duplici. Postea
spongiola madefacta ad gingivas appo-
natur. Cautè autem hac aqua est uten-
dum propter arsenicum.

IV. TVMORVM durorum.

Solent etiam tumores duri accidere in scorbuto. Iis sic obviamit Wierus : facit cataplasma ex lacte : incoquit rad. consolidæ majoris , Absynth. Chelidon. minus & majus , radices Bryoniæ , medullam panis , farinam fabarum vel hordeaceam aut lupinorum pro partis affectæ constitutione & calore.

V. DOLORIS.

Ego usu artis , Dei beneficio , & cum magna laude observavi dolores ingentes in cruribus antecedere scorbutum , & tandem subsequi primum maculas & gingivarum putredinem. Dolor circa talos , juncturas , tibias & in plantis pedum est eximius cum calore manifesto. Dolor est pungitivus , ut ego opinor propter flatus partim acres , partim crassos. Nam cum materia scorbuti sit humor melancholicus putridus , perinde ut in febris quartana dolorem in dorso , concitat juxta spi-

spinam : sic hîc intra carnem & cutim propter latitantem isthîc materiam sese prodit , tunc scilicet , cum resolvitur in flatus. Cum enim materia melancholica flatulenta sit : hîc etiam flatus generat, Sed cum sit putrida , & cum bile permixta : ideo mordicat , urit , & ratione tenuitatis q. penetrare & permeare particulas sentitur, das es gar darinnen sehusst vnd fûtht.

Quando hujusmodi dolor deprehenditur diuturnus , qui nullis medicamentis cedit ; à pinguibus & oleosis exacerbatur : tum certissimum est indicium scorbuti , præsertim si noctu magis exacerbatur. Notandum tamen dolorem istum non in juncturis , sed intra carnem & cutem tam circa juncturas , quàm reliquas partes pedum & corporis sentiri. Didici hoc ex observatione similium dolorum , qui in quavis corporis parte præter faciem sæpe per tridium ægrotantibus molesti sunt , non aliter ac si digitis comprimantur, Post triduum apparent vestigia sugillatorum vel violacea vel nigra & subviridia , vel ex livore flava : ideoque appellare solent noctur-

nocturnam præhensionem, den nachgriff. Ego mallem fugillationem propter vestigia digitorum, quibus quasi fugillati & præhensi esse videntur. Sæpe enim quatuor, sæpe 5. digitorum per longitudinem ventris, femoris aut brachiorum ductorum vestigia apparent.

Colore sunt pro conditione ægrotantis vel sanguinei, vel melancholici aut biliosi rubeo, citrino, aut viridi, aut fusco, aut violaceo.

Dum morbus hoc modo invadens augetur, intolerabiles cruciatus in femoribus, cruribus, circa talos & in plantis pedum fiunt, qui non prius desinunt, quam maculæ, quæ sæpe dimidium femur occupant, maxima autem ex parte amplitudinem unius manus æquant, prorumpant. Atque tum cessat dolor.

Hic in curatione notandum, dolorem mitigandum esse anodynis & solventibus per sudorem. Qua in re ego usus sum fomentatione ex decocto malvæ, althææ, fol. borag. fumariæ, abrotani, pulegii, rutæ, hyssopi, florum malvæ majoris, scordii, pulegii, salviæ, rorismarini, nasturtii aqua-
tici

tici, fol., lauri, baccarum juniperi & floribus Chamæmeli. Jussi hujusmodi herbas incoquere aq. & vapore calidis. hujus decocti sudorem in partibus dictis ciere, & res Dei beneficio cum magna laude & q. miraculo mihi (Christo sit laus) successit. Nam sic non solum mirigatus est dolor, sed etiam maculæ discussæ & resoluta materia citius prodierunt. Tam salubris fuit usus hujus vaporarii, ut in ipso actu caliditatis (quamvis urinæ essent summè ruffæ & obscuræ) dolor mitigaretur. Verum à vapore coeperunt nonnunquam recrudesce dolores, quod partes frigidaæ & crassæ non exquisitè essent resolutæ: ideoq; post vaporem refrigeratæ coeperunt malum denuo exacerbare. Et quia propter partes calidas & biliosas simul etiam propter calorem ex vapore introductum crura & membra vapore excalesacta caliditatis dolorem & punctionis sensum percipiebant, coactus fui ad utramq; causam curationem convertere. Atqui cum primum inciperem unguentis, oleis & pinguibus loca dolentia, antequam prodirent maculæ, fovere, dolorem auxi. Idcirco didici pinguibus

bus dolorem, priusquam maculae perfecte prorumperent, exasperari. Feci igitur cataplasma ex modo commemoratis herbis, & recte successit. Iussi etiam particulas dolentes spongia in decocto vaporarii madefacta fovere, nec successu defraudatus sum. Verum cum nulla pax stabilis foret, coepi tandem ex cremore lactis (vom Quare) floribus Chamæmeli, herbis nasturtii aquat. & bacis juniperi in lacte decoctis cataplasma facere, & calidum imponere, & Dei beneficio visus sum mihi panaceam mitigantem omnium dolorem invenisse. Ita enim dolores mitigabantur, ut quieti esse & dormire vicissim possent. Hoc etiam notandum, quod in plantis pedum & extremitatibus digitorum pedum sæpe oriatur dolor non absimilis erysipelati, excepto eo, quod non tingatur rubore. Hic nullis medicamentis facile cedit. Hoc tamen resolvente sensibilibiter mitigatus est: ℞. florū sambuci M. ii. coq. ex vino, & additis saponis ʒ ii. f. q. lixivium, quo pannus imbutus & applicatus dolorem potenter mitigavit.

VI. CONTRAC- tionis membrorum

SI nervi & ligamenta rigida & ad motum inepta facta fuerint ex imbibita materię crassę copia, foveat Wierus & inungit anserino anatinove adipe, vel pinguedine taxi. Faciunt alii hoc unguentum, quo inungunt partes ad ignem, & postea superponunt sequeus cataplasma: ℞. rad. enulę contusarum ℥ii. lumbricorum terrestrium ℥i℥. coq. in vino malvatica ad formam pultis, ē quo exprimatur succus: Cui adde ol. liliorum, costini, an. ℥i. hyperici ℥℥. unguenti de bdellio ℥iii. Terebinth. cum aq. enulę lotę ℥ii. Bulliant sufficienter, adjectis in fine cerę novę ℥ii. F. linimentum molle. Cataplasma tale est: ℞. rad. althęę. lil. alb. hermodactyl. ad ℥℥. caricarum pinguium numero vii. meliloti, charmem. parietarię an. M. i℥. fol. althęę M. i. rosarum rub. ℥iii. vermium terrest. præpar. ℥i℥. farinę tritici purgatę a furfuribus ℥ii. hordei ℥i℥. orobi, lentium, fabarum an. ℥℥. Medullę panis triticei ℥i. Terenda terantur, & aquę incoquantur ad pulvis speciem; cui deinde adde olei

lei lil. alb. Cham, anethini, rosatian. ʒ i.
 Cassiæ rec. tractæ ʒ ʒ. Medullæ bubulæ
 ʒ ii. adipis gallinacei ʒ iij. suilli ʒ ʒ. boli
 armenia ʒ i. croci orientalis ʒ ʒ. omnibus
 diligenter mixtis, f. cataplasma.

VII ULCERUM tiliarum.

SItibiæ exulcerentur, ea quæ ulceri-
 bus conveniunt, usurpabis.

Abstergendis autem & mundifican-
 dis ulceribus parabis tale linimentum :
 ℞. succi cochlear, apii, absinthii, mellis
 an. q. s. coq. ad justam consistentiam. Si
 putredo magna adfuerit, admisce aliquid
 pul. aristolochiæ rotundæ, vel aluminis
 usti, vel præcipitati. Consolidationi
 idoneum est emplastrum Diachalciteos.
 Item emplastrum de minio, unguentum
 de Thutia.

N. N. SCORBUTICUS.

N N. V. I. D. omnium membro-
 rum lassitudinem sentiens, uri-
 namque mingens tenuem ex ruffo co-
 lore obscure fuscantem cum circulo
 ferè plumbeo, & de dentium dolore
 conquerens accersivit Medicum, qui
 ex urinis simpliciter vaticinium Pro-
 phe-

pheticum ferens de magno calore in visceribus latitante declamitare incipiens curationem per medicamenta refrigerantia, ut in febrtium sanatione moris est, instituit. Gargarismum etiam ex attinuantibus, resolventibus, exsiccantibus, & gingivas confirman- tibus & catarrhi affluxum inhibenti- bus subinde præscripsit. Verum per quinque hebdomadas post multarum potionum & reiteratarum purgatio- num usum id obtinuit, ut malum non modò non mitisceret, sed potius ma- gis magisq; augeretur. Accersitus ego ex urinis de scorbutò suspicari cœpi, præsertim cùm nullus calor febrilis manifestus deprehenderetur, gingivæ etiam livescere, & proinde dentes va- cillare inciperent. Medicus iste etsi clam me sugillare, & calorem internum accusare, curationem ad frigidum in- stituendam esse non desisteret affirma- re: coactus est tamen intra quatridduum cum summo rubore coram adstantib. omnibus meam sententiam nolens vo- lens approbare. Nam cum uxorem æ- grotantis rogarem, an etiam maculæ in cruribus, tibiis, dorso, brachiis vel femoribus apparerent: forte factum est

est, ut cum ex præscripto Medici illius cucurbitulæ pro catarrhi ad dentes diversione scapulis admoventur: morsuum pulicum vestigia per dorsum apparuerint. Sequenti verò die, cum diligentius omnia scrutaremur, & maculæ violaceæ integram manum latæ prodirent, gingivæ foetere & putredine corrumpi inceperunt: accersitus est me consulente etiam barbitonsor, ut oris curam haberet, qui nobis absentibus palam Scorbutum esse affirmavit. Curationem igitur invito Collega aggressi per medicamenta, leniter humorem melancholicum purgantia cum bile exhibuimus: qualis est subsequens portio.

℞. rad. polypod. asparagi. Borag. cort. Tamarisci, fraxini, capparum ana ʒi. sem. dauci, aquilegiæ an. ʒss. melonum ʒi. Herbarum fumariz, Iupuli, ceterach an. p. iʒ. veronicæ, cardui benedicti an. p. i. herbarum Cichorii, Endiviæ an. p. iʒ. fol. senæ ʒvi. epithymi ʒiʒ. coq. pro ʒiiʒ. quibus ebulliant confect. Hamech. ʒii.

In colatura dissolve mannæ ʒv. Misce. f. haustus reiterandus bis. Quamvis autem similes portiones ex Rhabarb.

&

& fol. senæ & agaritio exhibebantur: tamen nulla felix sese ostendebat operatio. Post hanc potionem quæ octies operata fuerat, exhibui succum nasturtii aquat. cum lacte caprino bis de die ad 3 vi. Sudare iussi & cœperunt maculæ quam plurimæ prodire longæ & latæ, universum femur à posteriori parte occupantes: quæ priusquam prodirent, maximum dolorem moverunt in femore. Tertio die vel quarto post maculæ apparuerunt, atque tum sedatus est dolor, quem vaporibus factis tanquam infallibili thelæterio demulsi. Fiebat autem vapor ex herbis malvæ, althææ, floribus chamæmeli, meliloti, borag. buglossæ, fumariz an. M. i. nasturtii aquat. rorismar. pulegii, origani, baccis juniperi, fol. lauri (posset etiam addi abrotani) an. M. i. Statim atque vapore hoc usus est, dolor etiam cœpit mitigari.

Post triduum iterum cœpit exasperari, ideoq; admovi cremorem lactis, pulverem florem chamæmeli, herbarum absinthij an. M. ʒ. Incoxi lacti, & forma cataplasmatidis admovi juncturis & cruribus, & cessaverunt etiam isti dolores.

Cum sic ad dies XII. pergerem tandem cœperunt signa coctionis sese ostendere in urinis, color ex ruffo, fuscus vicissim ad flaviusculum mutari cum eneoremate albescente.

Accidit hic aliquando etiam error, qui dolorem in crure sinistro vehementer exasperabat. Nam cum juberem femur sinistrum inungere butyro recente, in quo grana juniperi & vinum bullissent, causa discussionis materiæ violaceas maculas producentis: barbiton for etiam crura & partes dolentes, in quibus maculæ nondum perfecte prodierant, inunxit: ideoque secutus est dolor tantus, quantus cum antea non affligerat. Hinc ad vaporarium redire, & cataplasmate uti jussi, & statim cessavit dolor. Manifestum est igitur in scorbuti curatione antequam maculæ prodierunt pingua & oleosa vitanda esse, quod dolorem augeant.

FINIS.


DE
SCORBUTO
PROPOSITIONES,

De quibus disputatum est publicè
ROSTOCHII

Sub Viro Clarissimo

HENRICO BRUCÆO

Philosophiæ & Medicinæ
Doctore & Professore.



HAGÆ-COMITIS

Apud ADRIANVM VLACQ.

M. DC. LVIII.

RECORDATO

PROPOSITIONIS

De quibus diffinitionibus publicis

IN OTTO CHIL

per Vno C. C. C. C.

IN RICO BNUC EO

Philosophie & Medicinæ

Doctor & Professor

in

in

in

in

in

in

in

in

in

in



Theſis I.

MOrborum alii ſporades vel ſporadici, hoc eſt, ſparſi: alii κοινοὶ vel πάγκοινοι, id eſt, communes dicuntur.

2. Sunt ſporadici Morbi varii, qui ſparſim privatimq; invadunt, ex propria cujuſq; vitæ ratione plerumq; nati, non ex communi aliqua cauſa orti, ut cum hic pleuritide, ille pthiſi, alius nephritide, aut alio morbi genere laborat.

3. Πάγκοινοι verò ſunt ejuſdem generis Morbi, qui eodem tempore plures homines invadunt, natura & vitæ genere differentes, Horum alii ἐνδήμιοι ſeu ἐπιχώριοι: alii πανδήμιοι ſimplices: alii ἐπιδήμιοι dicti ſunt. Simples πανδήμιοι ex cibi potiſvè aut loci vitio, ſed quod non ſit perpetuum oriuntur, ut Diarthææ, Febres, Anginæ, Dyſenteria, & alii plurimi morbi, quos aquarum,

§4 HENRICVS BRVCÆVS.

rum, frugum vita nec non ciborum cacochymicorum usus potissimum inferunt.

4. Epidemii sunt, qui in una regione aut pluribus insolentes, multos eodem tempore adoriuntur, ex aëris potissimum vitio, nec eo vernaculo, verum adscititio, ducentes originem. Ex his perniciosissimi, qui plurimos è medio tollunt, λοιμῶδεις, hoc est, pestilentes appellantur.

5. Ενδήμιοι, quos patrios dixeris, morbi sunt certis regionibus perpetuo & quavis anni tempestate infesti, qui ex proprio regionis situ, aere, aqua, alimentis ortum ducunt, Ægyptiis Elephantiasis, Pthisis Lusitanis, βρογχονή-λιν Alpinis.

6. In Endemiorum genere Scorbutus, de quo nunc agimus, numerandus est, maris Balthici, Finnici & Bochnici sinus accolis, iisque qui Germanico Oceano adjacent, Saxonibus, Phrysiis Battavis totiq; Scaniæ sive Scandinaviæ, quæ Danos, Nortwegos, Suecos complectitur, familiaris.

7. Adfert Scorbutus corporis gravitatem, difficilem respirationem, suræ tendinumq; qui in calcaneum & popli-tem

tem feruntur, tensionem, quam in motu dolor gravissimus ut plurimum comitatur. In multis crura quasi divelli videntur, unde sceletyrbes appellatio orta est. Pluribus gingivæ laxæ & levi confictu sanguinolentæ apparent; non paucis eroduntur & computrescunt laxanturq; dentium compagines, dentesq; vacillant. Multis sinistrum hypochondrium, aliis dextrum, nonnullis utrūq; dolore afficitur cum gravitate. Sunt quibus ingravescente adfectione venter intumescit & doloribus tentatur, & appetitus planè prostermitur. Est ubi crura femoraq; veluti resoluta apparent, servato tamen sensu, in pueris præsertim & quibus mollis est corporis habitus. Maculæ verò & lituræ apparentes in crure in plerisque corporis partibus, inprimis verò in cruribus, lividæ, nigræ, puniceæ, flavæ, nonnunquam subvirides certissimæ scorbuti notæ habentur.

8. Scorbuti autem appellatio vel à Saxonum *Schorbuck*/ quod ventristor-
mnia, aut Danorum *Schorbeck*/ quod
oris depravationem indicat, indita
est. Plinius lib. 25, cap. 3. ab oris
d 4 affectione

affectione Stomacacen nominat, ut Sceletyrben alii à crurum dolorifico affectu, in quo partes quasi distrahi sentiuntur.

9. Cum autem color in cute appa-rens, humoris peccantis sit index, il-que non unius semper generis conspi-ciatur, non unum fuerit cacochymia in Scorbuto genus, sed varium & mul-tiplex.

10. Hæc cacochymia, quæ Scor-butum profert, cum Scorbutus quo-vis tempore, cujusvis ætatis & sexus homines invadat, ad communes cau-sas, aërem, aquam, loci situm, ejus-demq; generis cibis & potus, quibus quam plurimi utuntur, referenda e-rit: Hinc nonnulli abortu contrahunt, ex matre Scorbuto laborante geniti, quod ex sanguine cacochymo in ute-ro materno nutriantur. Et multæ hanc ob causam fœtus mortuos edidere, a-liquæ verò abortierunt. Potissimum verò ad aquas & cibos potumq; refer-ri debet, quæ cacochymiam magna ex parte pariunt. Aër enim humidus situque obsitus, loci situs & ignavum otium, coadjuvantes fuerint causæ, qua-
tenus

tenuis calorem nativum languidiorem reddant, & ob id concoctiones & nutritiones, excrementorumque secretiones fiant deteriores, quam ob causam mulieres magis sunt obnoxiae quàm viri, & inter viros minus ij, qui corporis exercitio utuntur. Hinc rustici minus, quàm urbani scorbutu laborant:&, qui diu decubuerunt, facilè in Scorbutum incidunt.

11. Est eorum, qui hoc morbo tentantur, victus ratio crassa, carnibus piscibusque constans, fumo, Sole vel frigore exiccatis, aut sale multo conditis, quæ sæpenumero vetustate rancida, mucidavè, aut ob malam conservationem alio vitio affecta sunt. Cerevisia crassa ex aquis crudis & stagnantibus decocta, quæ gravis sunt odoris & saporis ingrati, præsertim æstate non sine putredinis nota, in quibus & alimenta decoquuntur & juscula parantur.

12. Hujus generis alimenta & aquæ initio non imbecillitate virtutis concoctricis aut Epatis aliorumvè viscerum

viscerum malo (quanquam hæc conjungi nihil vetat) sed suo vitio in tales succos convertuntur, qui ob diversitatem alimentorum & naturarum varietatem non simplex cacochymia genus producant.

13. In plerisq; tamen succus Melancholico similis colore abundat, quod crassa sint alimenta, ex quibus ater humor commodissimè gigni queat, qui ob copiam humidi (sunt enim septentrionales populi bibuli & edaces) humorem frigidum humidumque asciscit, laxoque tumore partes afficit. Ob alimenta autem variis modis corrupta aut parata, aut aliorum ciborum permixtionem & naturarum diversitatem, præsertim verò hepatis temperamentum, contingit huic humori bilem flavam, nonnunquam viridem, aut sanguinem vitiosum, aut pituitosam materiam permisceri.

14. Ex hoc vitioso alimento Pulmo, Epar, Lien, Ventriculus, venæ Mesaraicæ vitium concipiunt, coacervato in hypochondriis humore. Inprimis autem Epar, dum pravum alimentum in sanguinem vertere laborat (Agens enim omne in agendo repatitur) & angustis
 ipsius

ipsius venis diutius hæret, vitium contrahere par est.

15. Hic humor in venis mesaraicis contentus, dum uritur aut etiam putrescit, cum Scorbuto Melancholicam hypochondriacam, quæ in hoc Balthico littore frequentissima est, inducit. Ea manifesta signa de se edit, latente sæpe scorbuto) maculæ enim illæ, quarum supra meminimus, quæ sunt Scorbuti certissima signa, sæpenumero latent.

16. Porro humor ex pravis alimentis natus, in habitum corporis vi secretrice pellitur. cutem coloribus qui talem cacochymiam sequuntur, inficit, cumque crassus gravisque sit, in imas corporis partes, tibias pedesque potissimum decumbit. Et si copia major affluit, in alias quoque partes spargitur, ut in genas oculosque nonnunquam derivetur, in hominibus præsertim biliosis & ætate florentibus, bilioso humore ut existimo, dilutus. Qui si ex prima generatione aut ex putredine acrior evasit, gingivas erodit, putrefacitque, & dentes putrefactis relaxatisque gingivis, laxat, ulceraq; , licet rarò, in tibiis generat.

17. Vitiosus autem succus ex pravo alimento in Epate genitus & à Liene attractus, successu temporis Hepar Lienemque inquinat vitioso succo Viscerum substantia persusa, & similem sui affectionem imprimit, ad putrefactionem Viscera disponens aut etiam putrefaciens, ut alimenta etiam bona à Visceribus corrumpantur, vitiosumq; sanguinem Scorbuti genitorem producant, non secus quam in vasis minimè sinceris vitium contrahere humorem in his reconditum animadvertimus. Ob quam viscerum affectionem, ut malum semel vires cœpit, vix radicitus evelli potest: Semina enim quædam reliquuntur, quæ scorbutum singulis annis aut pluribus interlabentibus pro pravi victus ratione, aut mali magnitudine, in Visceribus relictæ, renovant.

18. Neque arbitrandum est ex Lienis obstructione aut magnitudine, aut scirrho omnem Scorbutum nasci, cum multi laborent nullo dolore, nulla gravitate aut tumore in sinistro hypochondrio subsistente; verum humor hic ex vitiosis genitus alimentis Lienis morbos (si quando cum Scorbuto

buto conjungantur) afferre solet: qui cum crassus aterq; sit, nihil mirum Lienem aliquando obstrui, aut in tumorem attolli, aut scirrhum contrahere.

19. Describamus itaque hunc in modum Scorbutum, quod morbus sit Endemius, Scandinaviæ iisq; regionibus, quæ mari Germanico, & Balthico Finnicoq; sinibus adjacent, familiaris, ortus ex Cacochymia, quæ cutem maculis nigris, flavis, viridibus, puniceis inficit, gingivas relaxat, erodit, putrefacit, tibiæ tumorem ut plurimum cedematosum inducit, in quo dictæ maculæ conspiciuntur, & tendinum suræ poplitisq; tensio deprehenditur, quam aquæ & cibi potissimum prodixerunt, quæ hepar lienemvè imprimis contaminant cum utriusq; Visceris, & sæpius lienis obstructione, tumore, rarius scirrho.

20. Ex hac cacochymia symptomatum omnium causæ peti possunt. Corporis gravitas humoris vires animales prementis est index, macularum in cute apparentium Cacochymia in cutem propulsa autor est. Idem in suræ musculos & tendinem tam
muscu

mulculorum suræ, quam eorum, qui tibiam movent, dilapsus, tensionem, quam sequitur motus difficultas & in motu dolor, profert. In Gingivas, ubi profluxit, eas laxat, hinc dentes vacillant, quod si acrior evasit, eas erodit & putrescens corrumpit, & ob putredinem contagio gingivas afficit. Ubi materia repit in pedes, gingivæ non rarò liberæ sunt: Et gingivis laborantibus minus afficiuntur tibiæ; sæpè tamen tam gingivas, quàm tibiæ infestat. Crassities cum accedit, calor exiccans scirrhum efficit. Obstructionem Viscerum & venarum mesaraicarum atrophia comitatur, quæ tamen & sanguinis vitio ob cacochymiam incidere potest. Difficultas Respirationis à materia pulmonem obsidente oritur, quæ si putrescat Peripneumoniam adfert.

21. Coniunguntur Scorbuto nonnunquam aliæ affectiones non leves, Hydrops, Atrophia, copiosus alvi fluxus, isq; ut plurimum biliosus. Febris lenta continua, aliquando Tertiana intermittens. Putrescentem Scorbuti materiam, præsertim circa Viscera, Febris sequitur, in hac, Hepate inflammato,

mato, Bilis copia generatur, quam alvi fluxus sequitur. Et Epar dum biliosa atravè aut alia colluvie scatet, ab eaq; naturalis calor labefactatur, ut utilis sanguis nutritioni commodus minimè gignatur, atrophiam parere potest. Cum idem viscus obruitur vitiosa materia & imprimis pituitosa Melancholicaq;, à qua Hepar refrigeratur, nativus calor premitur, hydrops nascitur.

22. Victus ratio sit boni succi: *Curatio.* panis triticeus benè coctus, & qui fermentum accipit. Cremor ptisanæ saccharo dulcoratus. Ipsa quoq; ptisana, cui aliquid hyssopi aut anethi incoxerit. Juscula pullorum, gallorum gallinaceorum, columbarum, carnis bubulæ, cui aliquid hyssopi, satireiæ, thymi, agrioraphani aut ejusdem facultatis herbæ incoctæ sint, præsertim ubi maculæ nigræ in tibiis & œdematosa crura apparent. Ubi enim subflavæ, rubræ, subvirides conspiciuntur, minus calefaicentibus & mellitis utendum: id enim animadversum est, facile iis dulcia in bilem converti: Nam & hisce plerumque Febris adest, nonnun-

nunquam difficili Peripneumonia laborant.

Carnibus vescuntur volatiliū (exceptis palustribus) agninis, vitulinis benè nutritis, qui ætatem habeant, iuvenorum, vervecum, avicularum, columbarum, pullorum, perdicum, leporum. Salsa, fumo exiccata, crassa, viscida, rancida, dura, difficilis concoctionis, vetustate exucca, malè cocta omnia vitentur, quibus enumerandis hoc loco brevitatis gratia superse-
demus.. Primas verò partes lactis caprini usus sibi vendicat; Est enim lac boni succi & facile à natura vincitur, ut multi longo ejus solius usu cū Becabungam incoxissent, aut nasturtium aquaticum, aut cochleariam, fuerint restituti. Confert autem imprimis iis, qui atrophia laborant, neq; ullam evacuationem ferunt, quod facile exolvantur. Bellaria sint uvæ passæ, amygdala, pistacia; si acetariis delectentur, consent nasturtio, acetosa, floribus Boraginis. Condimentorum loco usurpetur sinapi, cappares, acetum, cui aliquid piperis vel zinziberis sit permixtum, aut agrioraphanus contusus. Potus sit vinum Rhe-

nanum

nanum maturum absynthites . si eo delectentur , aut cerevisia clara benè à fecibus repurgata , quæque absinthium sapiat , qua & vino absinthite potissimum utimur in ventriculi prostratione . Et hæc fuerit Victus ratio .

23. Venæ autem sectio instituetur in corporibus , in quibus venæ multo humore turgent , non tamen copiosa , sed quæ vires onere pressas subleuet . Ante venæ sectionem Diacatholici ꝑ vij. exhibeantur , aut Electuarii lentivi ꝑ j. quæ intestina fecibus liberent & è primis venis aliquid subducant , quibus utendum quoq; est quamvis venæ sectio non instituatur . Tum his , quæ crassa attenuent , viscida incidant , lenta abstergant , utendum : Inter plurima verò , quæ his viribus prædita sunt , hæc potissimum , quæ commemorabuntur , in hoc morbi generi præstare , usus & experientia comprobant : Sume cochleariæ , becabungæ , nasturtii aquatici , fumi terræ an. partes æquales , radicum agri Raphani ꝑ i ss. hæc omnia contundito in mortario ligneo vel lapideo
e vel

vel ferreo & ejus generis pistillo, tantumq; lactis caprini offundito, ut omniacum lacte benè permisceantur. Hæc horis duodecim macerato, tum in vase duplici horæ semisse bulliant, alioqui sufficeret horæ quadrante coxisse, deinde colato & fortiter exprimito. Hujus liquoris cum lacte expressi ℥ v. vel vi. exhibeto summo mane & vesperi hora quarta vel quinta.

24. Quod si ventriculo sunt imbecilliore & appetitus planè sit prostratus, addenda absinthii coma aut mentha crispata. Sic aliquos novi absinthii & Symsimbrii cardamines seu nasturtii aquatici succis, quos bis de die hauriebant, fuisse restitutos. Rursus si calidioris sit naturæ æger, si Febris adjuncta, rectè adjicitur acetosa, fumus terræ. Ubi respiratio difficilior, Pulmone ab hac materia obfesso, radices helenij addantur cum hyssopo.

25. Ipsa cochlearia hujus morbi censetur alexipharmacum; sumitur succi expressi & lactis caprini par quantitas, aut lactis, minor portio, bis de die hauriuntur ℥ v. vel vi. succorum quoque cochleariæ, fumi terræ, nasturtij aquatici, becabungæ exhibito ad ℥ xv.
pluri-

plurimum confert, si manè & vesperi hauriantur, Rectè autem aliquo aromate, utpote zinzibere, vel cinamomo, aut nuce muscata condiuntur, adjecto, si ægro videatur, faccaro.

26. Illud autem animadvertendum in frigidioribus naturis, in quibus œdematosum corpus aut nigris maculis fœdatum conspicitur, rectius ejus generis succos cum vino expressos & saccharo dulcoratos cum paucocinamomo assumi: Aut herbarum commemoratarum singulos manipulos contusos cum zinziberis ℥iij. in vini Rhenani ℔ iij. in vase duplici decoquito vase benè obturato. Rectè singulis libris decocti ℥j. cròci additur. Sunt qui vino Rhenano, in quo Raphanus in orbiculos concisus aut contusus fuerit maceratus, usi, multum se levare sentiant.

27. Hic quoque pulvis plurimis in hac affectione fuit salutaris, qui recipit cubearum, macis, granorum paradisi ana 3℔. Seminis Sinapis albi ℥iv. croci orientalis 3ij. Datur 3j. manè & vesperi in lactis caprini ℥iij.

28. Hoc quoq; saluti pluribus fuit, quod recipit gentianæ 3ij. calami

aromatici, piperis, zinziberis 3ß. myrrhæ rub. 3ß. croci gr. 15. Datur 3j. ingredienti laconicum & tantundem egressuro cum hoc liquore: fumitur becabungæ, sisymbrij cardamines, fumi terræ, acetosæ ana M. j. contundantur in mortario lapideo pistillo ligneo vel ferreo, & cum vini boni Rhenani lib. 1. exprimitur succus, cum hujus expressi succi 3iij. diluitur pulveris 3j & hauritur modo jam dicto.

29. Porro dum medicatis potionibus utimur, utile fuerit, Laconico sudores quotidie movere: Alij candentis ferri crudi vel excocti calore quod cupæ imponitur & vino aspergitur, sudores cient. Alij becabungam, sisymbrium, artemisiā, absinthium, levisticum, camomillam, in aqua decoquunt, cacabum cum herbis calentibus cupæ impo-
nunt, ut ejus vapore sudores moveant: agitant ex intervallo & lapides ignitos injiciunt, ut diutius calor conservetur: Et quo sudores rectius promoveantur, aliquid prædictarum potio-

tionum medicatarum in ipso laconico præbent.

30. Interim dum his medicatis portionibus utimur, ut alvus laxa sit laborabis: lenibus medicamentis movebis, ut folijs Senæ Alexandrinæ ℥iij. maceratis in sero lactis aut in herbarum prædictorum expresso cum lacte succo, cum cinamomi ℥j. Aut Rhabarbari ℥j. vel ℥iij. vel aloës ℥ij. aut tribus, sive pilulis pestilentialibus. hisdem medicamentis utendum ad purgationem; fortioribus enim facile exolvuntur: aut istius pulveris cum lacte caprino dato drachmam, qui recipit Croci orientalis, Agarici candidi & friabilis, Epithymi, foliorum Senæ ana ℥j. Aloës puræ ℥ij. Rhabarbari electi ℥ss. In robustioribus augere dosin licet, & pilulis de fumo terræ aut diasenæ electuario uti. Sunt qui præscripti pulveris quotidie cum lacte caprino drachmam exhibent, dum tota hæc compositio absumatur, eaq; ratione Scorbutum curant, servata victus ratione præscripta. Verum si quotidiano usu hujus medicamenti purgantis vires deicerentur, alternis

tantum diebus assumet, aut plures intermittat. Id enim universale: Virium habendam esse rationem.

31. Cum autem Scorbuti materia videatur saepenumero propelli in cutem, non meliore ratione, quam sudoribus discutitur. Medicamentis humor, qui circa viscera residet, expurgabitur.

32. Haec dum agimus partes corroborabimus tam intus assumtis quam extrinsecus admotis: Conserva florum absinthij serviet Ventriculo: Quae ex fumo terrae paratur Lien. Radices cicchorij conditae, aut florum ejusdem conserva Epatis corroborationi serviet. Omnibus admisceri poterit cochleariae conditum. Trochisci quoque saccharei specierum diarhodon Abbatum plurimum commendantur. Et si calor adfit Trochisci diatrion fantalion: Radices helenij conditae affecto Pulmone.

33. Extrinsecus inungatur Epar oleo absinthite, mastichino. Lien si afficiatur, oleo de capparibus aut nunguento splenico inungatur, quod recipit olei communis ℥iij medullae crurum bovis ℥j. butyri recentis ℥ss, fuc-

fucci brioniae, fucci cyclaminis ana ℥ij. Bulliant ad lentum ignem ad consumptionem propè fucci, & coletur: colaturæ adde Ceræ ʒviij. pulveris cererach, corticum capparis, tamarisci, feminis agni casti ana ʒiiij. misce pro unguento.

34. Ventriculus oleo macis aut de nuce Muschata: Nervi & tendines rigidi, unguento dialthæas, aut resumptivo, aut anserina pinguedine, vel medulla cervina, aut butyro infuso majali inunguntur. Subiguntur autem succo cochleariæ aut Syfimbrij cardamines, vel in duplici vase æquis partibus decoquuntur ad fucci propè consumptionem. Fomentis quoque utimur in nervorum tendinumque tensionibus & doloribus. Decoquuntur ad fomentum radices althææ, malva, becabunga, absinthium, artemisia, baccæ juniperi, nasturtium aquaticum, cochlearia.

35. Gingivæ laxæ sanguinolentæ muria colymbadum tolluntur: aut eo quod recipit salviæ nobilis hyssopi M.j. Cochleariæ M.j. sempervivi majoris folia xv. ficus num: x. aluminis ʒß. mellis cochleare, quæ in aquæ fluentis

entis ℥iv. decoquuntur ut relinquatur
℥ ss. Hoc decocto colluitur os ter fin-
gulis diebus & post ablutionem melle
rosaceo, aut diamoro gingivæ illinun-
tur. In primis autem probantur quæ
ex radice bistortæ parantur. De qui-
bus & aliis modis vide Wierum,
Hanc enim Britannicam esse arbitran-
tur: sic dictam quod dentes tueatur, à
nomine Germanico *Frystant*. Quod
in gingivis computruit, aufertur, &
quod reliquum est ægyptiaco aut alu-
mide usto, quod melle rosaceo excipi-
tur, absumendum.

39. Quod si in Gingivis ulcus sit
serpens & depascens, fume aluminis
usti & in vino rubro austero extincti
℥ss. mastice, thuris radice cyperi ana
℥iij. fiat pulvis, quo gingivæ perfricen-
tur, aut melle rosato excipe, & gingi-
vas illine. Vel bombacem aut linteo-
lum circumvolutum bacillo, imbu-
tum oleo chaleanthi sive vitrioli ad-
move gingivis toties, donec exæquen-
tur & albescant.

F I N I S.

ruir
fin-
elle
un-
uæ
ui-
n ;
an-
r, à
nod
, &
lu-
pi-

fit
inis
cti
ana
en-
gi-
co-
bu-
ad-
en-

