

Praxis Barbettiana.

Contributors

Barbette, Paul, -1666?

Publication/Creation

Amstelaedami : Apud Jacobum Lescaille, in plateâ vulgò dicta de Middeldam, Anno 1665.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/bf2zrtdd>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>













SUPPL. A 60935/A

Coll. 1908





PRAXIS
BARBETTIANA.



AMSTELÆDAMI,
Apud *Jacobum Lescaille*, in plateâ
vulgò dicta de *Middeldam*.
ANNO 1665.

P R A X I S

B A R B E T T I A N A



A M S T E R D A M

At the Jacobson Agency, in place
of the old one
A. N. 2. 0. 1. 6. 5.

NOBILISSIMO,
AMPLISSIMO
ET PROBITATE
INCOMPARABILI VIRO,

D. GERARDO
SCHAEF,
CORTEHOEVII
TOPARCHÆ,

REIPUBLICÆ
AMSTELÆDAMENSIS
PRUDENTISSIMO

CONSVLI,

ACADEMIÆ
LVGDVNENSIS
FIDELISSIMO

CVRATORI,

ET
AD SERENISSIMOS
DANIÆ, SVECIAEQUE
REGES
MAGNI AB OMNIBVS
FACTO
EXLEGATO &c. &c.

HANCCE SVAM PRAXIN,
SEQVE IPSVM

OFFERT
PAVLVS BARBETTE,
MEDICVS.

PRÆ-

P R Æ F A T I O.

INGENIOSE LECTOR,

PAUCIS tibi multa do, quæ multis fortè non placebunt, quos non multi fortè faciam. Hæc compendiosè scripsi doctioribus, à quibus doctiora sperans, multis interim profectura spero, multis enim profecisse scio. Deficit morborum contagiosorum cura, sed & illam brevi, Deo dante, dabo. Ex centum, quos consului, auctoribus, nihil ferè exscripsi, proprio ubique usus sensu & iudicio. Mirari noli quod Pituitam vulgarem sæpius Lympham crassam vocem; examinent illam Anatomici & Practici accuratiores, reperient vera me scripsisse; sed in ventriculo & intestinis limitatione eget. Fruere tu hisce, & ama, si sic tibi visum fuerit,

Tuum totum

PAULUM BARBETTE, M. D.

EXCELLENTISSIMO
MEDICO
PAVLO BARBETTE,

P R A X I N suam perspicue & compendiose edenti.

Illustrat Medicam Doctor Barbettius *Artem*,
Succinctamque docet methodum, qua pellere morbos,

*Noscere morborum causas, Symptomata, signa
Nunc poterunt Medici: quare properare Medentes,
Qui capitis vestris aegris adhibere levamen.*

*Porrigit hic vobis dextram, Praxinique fidelem
Expertus Medicus Paulus Barbette, Medentum
Amstelidum prægrande decus, verusque Machaon.
Consulte illius Praxin, quæ mystica multa
Continet in sese medicamina sæpe probata:
Authorique huius justas persolvite grates.*

*Perge tuum, Barbette, decus, nomenque per orbem
Spargere terrarum, miserisque occurrere, scriptis:
Perge tuis studiis Medicinam extendere, Paule,
Historiasque simul morborum scribere doctas.
Vive diu, ut morbos ex corpore pellere possis:
Sic Barbettiadum laus stabit in orbe perennis,
Præstantesque tuos semper referemus honores.*

Amicitia ergò posuit

T H E O D O R V S W Y N A N T S,

Reipubl. Amstelod. Med. ordin.

INDEX CAPITVM.

LIB. I.

De Capitis affectionibus.

CAP. I.	D E Epilepsia.	pag. 1
II.	De Apoplexia.	8
III.	De Paralyfi, Caro, Comate Vigili & somnolento, Catalepsi, Incubo, Lethargo, Epistotomo, Emprostotomo, Opistotomo, &c.	13
IV.	De Catharris, eosque comitante vario capitis & partium totius corporis dolore.	15

LIB. II.

De affectibus Colli.

CAP. I.	De Angina.	20
II.	De Scrophulis.	26
III.	De Aneurismate.	29

LIB. III.

De affectionibus Thoracis.

CAP. I.	De Pleuritide.	31
II.	De Phthisi.	36
III.	De Febris.	43

LIB.

LIB. IV.

De affectibus infimi ventris.

CAP. I. De nimia ciborum Appetentia.

51

II. De Vomitu.

52

III. De Scorbuto.

58

IV. De Hydrope.

63

V. De Dysenteria.

67

VI. De fluxu Hepatico.

71

VII. De Ileo.

72

VIII. De dolore Nephritico.

76

IX. De Vteri suffocatione.

82

X. De Hernia Vterina.

82

XI. De mensium suppressione.

83

XII. De partu difficili.

89

XIII. De mensium nimio fluxu.

92



F

P R A X E O S
B A R B E T T I A N Æ

L I B. I.

De Capitis Affectionibus.

C A P. I. *De Epilepsia.*

I. **D**efinitio. Epilepsia est Convulsio, vel motus partium corporis plerarumque præternaturalis, cum mentis & sensuum pro tempore plerumque læsione.

II. *Pars affecta* primaria est *Cerebrum* & consequenter *nervi*, nullatenus vero membranæ.

III. *Differentiæ.* *Idiopathica* est vel *sympathetica*. *Fortis*, vel *levis*. *Periodica* vel *inordinata*. *Hereditaria* vel proprio vitio & *dieta* acquisita.

IV. *Causa proxima* est *Lympha* in cerebro vitata & acredine sua nervos vellicans. *Remotæ* in glandulis lacteis, corde, utero aliisque partibus sunt quærendæ. Quicquid enim, siue bilis sit, siue pituita, siue succus pancreaticus, vel semen sanguisve menstruus, Lympham reddere potens acriorem, Epilepsiam

A

pſiam facile cauſat cerebro male ſeſe habente. Vapores non admitto.

V. *Signa Diagnostica.* Caput dolens eſt, grave, vertiginolum. Pallet facies, extrema frigent tremuntque. Linguae motus inordinatus. Meticulofus æger atque triftis. Subito interdum corruit. Nunc quædam, nunc multæ convelluntur corporis partes. Hic manus habet clauſas, ille in gyrum agitur; hic curſitat, ille ſedet. Plerique actorum ſunt ignari; quidam ſenſibus utuntur tam externis quam internis, hocque rarò, nec ſatis, puto, aptè. Quidam vociferantur, aliis ſupervenit dentium ſtridor, ſtertor, ſpuma oris; urinæ, fœcum, ſeminis involuntary excretio.

VI. *Prognostica.* Idiopathica curatu difficilima; ſympathetica ſæpè, in infantibus facile curatur, hæreditaria nunquam.

VII. *Indicationes.* Caput expurgandum, roborandum. Lympha temperanda; cauſæ remotæ tollendæ.

VIII. *Curatio.* In *Paroxyſmo* profunt frictiones, ligaturæ membrorum, punctiones, clamores, vellicationes, cucurbitulæ, clyſmata, ſuppoſitoria; oris apertio, partium externarum in rectum extenſio; illinitiones temporum, carporum, naris, cranii circà futuras, præcipuè coronalem; ſuffitus. Narcoticorum uſus utilis eſt & noxius, benè diſtinguere:

guere experti est Doctoris. De Venæsectione idem dico.

Extra Paroxysmum temperamentorum, causæ proximæ & remotarum summa est habenda ratio. Inspice oculos, faciem, linguam; explora pulsum, tange ventriculum & Hypochondria, utpote in quibus sympatheticæ Epilepsiæ causâ plerumque hæret; considerentur Lymphæ gratia partes externæ, pedes volo atque manus. Præparentur hisce consideratis humores vel primò, vel educantur statim pro re nata. Corroborantur partes præparantibus unâ eâdemque fideiâ; Cumque malum Chronicum sit, tam præparantia quam purgantia sæpius reiteranda. Venæsectio raro usu venit; Vomitoria interdum, sed præscripta cautè.

Medicamenta Antepileptica.

Radices Acori veri, Angelicæ, Aristolochiæ, Arthemisiæ, Cardanæ, Bryoniæ, Dentariæ, eryngii, fraxinellæ, hyperici, pœoniæ, scyllæ, succisæ, tormentillæ, valerianæ sylv. vincetoxici. Anagallis, betonica, ruta sylvestris, polium, verbena, pœonia. Flores liliorum convallium, pœoniæ, stœchados, tiliæ. Semina aquilegiæ, atriplicis, pœoniæ, feseleos, cardamomum, cerasa nigra. Ligna baxi, tiliæ, quercus. Agaricus. Succinum. Castoreum. Coagulum leporis; cor ciconiæ,

hirundinis, leporis, vulpis, vulturis. Cornu
 alcis, bovis, cervi, hirci, monocerotis. Cra-
 nium asini, humanum, cuculus ustus. Fel
 agni, catuli nigri, ursi, vulturis. Fimus vaccæ
 nigræ, hepar asini, capri, ranarum viridiū,
 turdi, ursi. Hirundo. Lac asininum, capri-
 num, equinum. Pulli hirundinis. Lien equi.
 Lumbrici terrestres. Mustelæ piscis caro,
 sanguis & spina; ossa lacertæ viridis. Officu-
 lum cranii triangulare seu cruciforme lucii
 piscis. Pica. Penna pavonis usta, pulli corvo-
 rum combusti. Sanguis catti maris, men-
 struum juvenicularum, humanus calidè assum-
 ptus, testudinis marinæ. Stercus ciconiæ,
 coturnicis, pavonis, talpæ cor & hepar, tes-
 ticuli equi, galli. Turdur femina. Vesica
 apri. Ungula alcis, asini. Unicornu. Marga-
 ritæ. Hydromel, Aqua, Spiritus, Vinum, Eli-
 xir, Syrupus Antidotus Cephalica Querce-
 tani. Aqua Anhaltina; Hartmanni, Langii,
 Minsichtii, Hirundinum usitata & Kobrente-
 ri, picarum, ex fecibus humanis Mathioli,
 theriacalis. Spiritus Ant'epilepticus Basilii,
 Paracelsi, Hartmanni: Cerebri humani,
 C. Cervi. Vitrioli viridis, volatilis, Tartari
 vitriolati, Salis Dulcis. Tinctura Solis Glau-
 beri, Lunæ, Antimonii. Essentia & Tinctu-
 ra Castorei, Elixir Crollii, Cratonis, Myn-
 sichtii. Syrupus pœoniæ, stœchados, cina-
 momi. Ol. camphoræ, castorei, cranii hu-

manii,

De Epilepsia.

5

mani, heracleotici ligni; majoranæ, roris-
marini, citri, rutæ, lavendulæ, succini, ungu-
læ alcis, zedoariæ, ligni rhodii. Conserva
flor. Anthos, lil. convall. flor. Aurantiorum,
pœoniæ. Electuar. Heve. Saxonæ, Monta-
gnanæ, Theriaca Smaragdorum. Extractum
Deodati, cerasorum, vitrioli narcotici, Lau-
danum Antep. Hartmanni. Bassanus ruta suc-
cini, Antapoplecticus. Pulvis Lecundinæ,
marchionis, species dialunæ, bezoardicum
minerale, lunare, salia ferè omnia tam fixa
quam volatilia. Tabulæ Hartmanni, Lan-
gii, Pil. Antep. Plateri. Sapo Hispani-
cus, &c.

Formula Medicamentorum Purgantium.

℞. Elect. è succo rosar. unc. j.
Pulveris Ialappæ drach. j.
Spir. Salis rectificat. scrup. j.
Ol. rorismarin. gut. viij.

MS. F. Conditum molle, de quo su-
mat æger nucis moschatæ ma-
gnitudinem, ter quaterve in heb-
domade.

Vel

℞. Extract. rhei
Aloës lucid.
Resinæ Ialapp. an. gr. vj.
Sal. succin. gr. iij.

A 3

Ol.

De Epilepsia.

Ol. lavendul. g. ij.

MS. F. Pil. N^o. iij. deaurentur pro
una dosi.

Vel

℞. Crem. Tartar.

Oc. Cancr. præparat.

Sal. Succin.

Diagrid. an. gr. vj.

MS. F. Pulvis in Vino vel cerevisia
sacharatis assumendus.

Formula Medicamentorum Præparantium.

℞. Liquor. Tartar. unc. f.

Sal. Ammoniac.

Succin. an. scrup. f.

MS. sumat in Vino 10 pluresve guttas qua-
ter de die,

Vel

℞. Sal. prunell. Ammoniac. an. drach. f.

Oc. cancr. crud. contus. scrup. ij.

Rasur. cranii human. scrup. iij.

MS. F. Pulvis dividendus in 6 par-
tes æq. sumat eorum bis de die,
hunc jejuno stomacho, illum ve-
speri ante cœnam.

Vel

℞. Sal. succin. volat.

Corn. cerv. an. scrup. j.

Castor. drach. ij.

Infundantur horis 24 in f. q. Spir. Vina.
rectif.

rectif. & Tincturæ extractæ Adde
Aq. prophylacticæ,
Iulap. rosac. an. unc. j. f.
Syr. cinamom. unc. f.

MS. bibat ter quaterve de die
cochleare unum atque alterum.

IX. Observationes. 1. Nicolaus Hazard 26
annorum juvenis, Cerebro humidiori, cæterà
plethoricus, ter, sæpe quinquies de die, idque
singulis septimanis Paroxysmos patiebatur
fortissimos, interdum horâ integrâ, interdum
per bihorium, cum spuma oris, clamore, sen-
suumque omnium læsione, subsequente diu-
turno & profundo sopore. Præter Venæse-
ctionem, peculiare ob rationes, non Epilep-
siam, institutam, nullo alio usus sum medi-
camento, quam Condito superscripto pur-
gante; sed non nisi septimo mense curatus
est. Observabat autem exactissimè diætam.
Decimo nunc anno à morbo liberatus vivit
hilariter Amstelædami, vultuque sereno ob-
viam mihi factus me salutat.

2. Filia Simonis Gomes de Pas annos circi-
ter viginti nata, integrum per annum labo-
raverat motibus Epilepticis, non quidem ve-
hementibus, sed à septimâ matutinâ in ho-
ram nonam vespertinam durantibus, cum
spumâ oris, sine loquela, sensuumque mani-
festo usu. Menstrua nihilominus justo tem-
pore & modo fluebant, noctuque comede-

bat, loquebatur, bibebatque, sed parcè. Præscripsi ipsi hæc pilulas unica pro vice.

℞. Castor. Sal. Arthemis. an. gr. iiij.

Resinæ Ialapp. gr. vj.

Aloës succotrin. gr. ix.

Ol. majoran. g. ij.

MS. F. Pil. N^o. v. deaurentur.

Pro voto illis purgata, usa est bis quotidie haustulo sequenti,

℞. Saponis Hispanic. albiss. drach. f.

Coq. ex lacte Vaccino & Colat. unc. iiij.

Dentur usui.

Miratu dignum erat hoc remedio assumpto Paroxysmum indies gradatim, deque hora in horam ita ivisse imminutum, ut trigesimo die plenissimè curata exiverit, manseritque restituta. Venæsectionem Phlegmaticæ nullus institui.

C A P. II. De Apoplexia.

I. **A** Poplexia est mentis consternatio cum sensuum externorum & motus abolitione.

II. *Pars affecta* est Cerebrum cum suis nervis.

III. *Differentiæ*. Idiopathica est vel sympathetica; fortis vel levis; vera vel notha.

IV. *Causa* est Lympha crassior magna ex parte nervos obstruens.

5. *Signa*

5. *Signa Diagnostica.* Homo, ante scilicet sanus, plerumque subitò, interdum sensim concidit, cum sensus, motus & vocis ablatione nunc imminuta nunc totali, sola respiratione eaque difficili, remanente. Dormit profundè, imò stertit. Membra laxa elevata concidunt suo pondere instar mortuorum. Oculi suspensi sunt vel clausi; pulsus interim fortis est & plenus, quod multos in Prognostico, imò antehac me ipsum decepit. Resolvitur ani & vesicæ Sphincter.

6. *Prognostica.* Apoplexia malum curatu est difficile, sed facilius curatu alterantibus, quam purgantibus vel venæsectione. Si à difficili respiratione sudor superveniat, præsertim frigidus, lethale. Febris acuta melior lentâ vel mediocri. Solvitur sæpè, motu sc. Critico, in Paralyfin: interdum per salivationem, Lymphâ nempe crassiore sic purgatâ excretâque vi naturæ.

7. *Indicationes.* Lympha qualitate peccans temperanda & crassitiem propter incidenda; quantitate noxia evacuanda: sic majori copiâ spiritus animales generabuntur, faciliusque in partes sensibus motuique dicatas fluent.

8. *Curatio.* Membra, pedes puta atque manus, ob Lympham ad Cor fluentem fricentur moderatè. Tempora oleis destillatis inungantur, ut & nucha, medullaque spinalis.

Cucurbitulas non nisi rarissimè probo, ut nec venæsectionem. Clysteres, Epicarpia, supplantalia, suppositoria concedo, licet non nisi per accidens juvare possint; Purgantia vero summè necessaria abundantibus turgentibusque humoribus; ut & alterantia peccantibus iisdem qualitate. Somnus arcendus, ideoque narcotica omnia noxia.

Medicamenta Anti Apoplectica.

Rad. Angelicæ, Imperatoriæ, Ireos nostrat. & Florent. Galangæ, Pyrethri. Lavendula, rosmarinus, hyssopus, Iva Arthetica, ruta, spica, salvia, origanum, majorana, diureticaque & cephalica dicta omnia. Flores liliorum, lavendulæ, arantiorum, spicæ, stœchados. Baccæ juniperi. Grana kermes. Cubebæ, cardamomum. Semina carui, sinapios. Nux moschata. Garyophyllum, cinamomum, zinziber, piper. Balsamum Peruvianum, zibethum, moschus, castoreum, Opobalsamum. Aqua lil. convall. juniperi, petroselin. salviæ, Apoplectica Anhaltina, Crollii, Mynsichtii, Riverii, Quercetani. Spir. cerasorum nigrorum, formicarum, cranii humani, sanguinis hum. lilior. convallium. Essentia ambræ, castorei, succini. Elixir Pœoniæ Mynsichtii. Syr. florum Anthos. Ol. succini, lavendulæ, salviæ, spicæ, garyophyllorum, ligni heracleotici. Conserval. arantiorum, anthos,

De Apoplexia.

11

anthos, menthæ. Confectio Anacardina. Balsamus Apoplecticus, cephalique omnes. Magisterium cranii humani, succini; sal Apoplecticum Minsichtii, ejusdemque Rotulæ smaragdinae &c. Elix. Vitæ nostr. descriptionis.

Medicamentorum Præparantium Formulæ.

℞. Aq. Antiparalyt.

Prophylactic. an. unc. j. f.

Betonic. unc. ij. f.

Syr. de stœchad. drach. x.

M. bibat cochleatim.

Vel

℞. Elix. vitæ nostr. description. drach. j.

Bibat in Vino cerevisiave quater de die guttis 6 vel 8.

Vel

℞. Sal. Cranii human. scrup. j.

Detur in Vino, bis de die.

Spiritus salis dulcis ritè præparatus magnæ est efficaciam, continuò in Vino potuve assueto ad guttas x vel xv assumptus.

Medicamentorum Purgantium Formulæ.

℞. Resinæ Agarici,

Extract. catholic. an. gr. vij.

Sal. Tart. vitriolat. gr. iiij.

Ol. rorismarin. gutt. ij.

MS. F. Pil. N^o. iiij. deaurent.

Vel

Vel

- ℞. Rad. Ireos nostrat.
 Fol. fenn. mund. an. drach. ij.
 Agaric. leviss. drach. f.
 Sem. pœon. scrup. j. Coq. ex aq. be-
 tonic. in Colat. unc. ij. f. dissolve.
 El. diacartham. drach. ij. f.
 Ol. rorismarin. g. j.
 MS. F. Haustus.
- ℞. Sal. Tart. vitriolat. gr. vj.
 Scordii scrup. j.
 Resinæ agaric. gr. viij.
 Sachar. perlat. drach. f.
 MS. F. Pulvis tenuis in Vino Galli-
 co vel Rhenano assumendus.

IX. *Observationes.* 1. Iohannes Abeels Vir quadraginta plus annorum, plethoricus, obesus sed robustus, horâ decimâ nocturnâ, mediocriter coenatus, inter nicotianæ usum subito in Apoplexiam cadens, dormiebat altum. Consilio me magis vicini Medici vena ipsi secta erat antequam ipsi potuerim adesse. Præscripsi externa medicamenta & interna, sed horâ primâ ejusdem noctis cessit fatis.

2. Michaël Calvo Hispanus sexagenarius, phlegmaticus, magnæ notæ vir, institutâ bis consilio Medici Hebræi, venæsectione, brevi post lumine cassus est.

3. Anus sexaginta quinque annos nata, fit post vertiginem Apoplectica. Volebant ad-
 stantes

stantes ut ipsi statim ab experto Chirurgo Augusto Meyero secaretur vena, quam vocatus ego ut & ille improbavimus. Vsa est mixtura & purgantibus superscriptis, iisque paucos intra dies convaluit.

C A P. III. De Paralyfi, Caro, Comate
Vigili & somnolento, Catalepsi, Incubo,
Lethargo &c. Epistothomo, Emprostotomo, Epistotomo.

I. **H**isce de Affectibus non est quod multa dicam; tantam enim cum Apoplexia habent affinitatem, ut qui morbos istos ex hac nesciat curare, pauci iudicii sit oportet: neque enim essentialiter, sed gradibus saltem differunt, eandemque agnoscunt partem affectam causamque. Hoc ut Lector, rerum non verborum, amans melius concipiat, has illi meas communico.

II. *Observationes.* Mater D. Iohannis Vincent Diaconi & Mercatoris Amstelædamentis, brachium dextrum impotens movere, periculosè decumbebat anno ætatis suæ quinquagesimo octavo; ergò erat *Paralytica*: interdum dormiebat profundè, ergo laborabat *Comate somnolento Carove*; interdum vigilabat, ergò debuit tunc ejus morbus *Coma Vigil* nominari; interdum stertebat nullamque edebat

bat vocem, quicquid vociferarentur adstantes; ergo erat *Apoplectica*; febricitabat continuo, supervenientibus Aphtis, ergo aderat *Lethargus*. Omnes hi morbi, quibus extincta, promiscuè illam affligebant 15 intra dies. Quorsum ergò nunc *Entium Noxia Multiplicatio*? Quantum sapimus verba dando!

2. Vxor D. Ludovici Serrarii Vertiginosa, Paralytica, Comatosa, Nephritica, Hysterica &c. ore tortuoso vix poterat vocato mihi loqui. Præscripsi illi pilulas hasce purgantes:

℞. Resinæ Ialapp.

Agaric.

Aloës lucid. an. gr. iiij.

Sal. succin. gr. vj.

Ol. menthæ g. ij.

MS. F. Pil. No. v. deaurent.

Optimè inde purgata longè habuit melius. Altero die assumpsit mixturam sequentem cochleatim:

℞. Aq. prophylact. nostr. unc. j. f.

Antiparalyt. unc. f.

Antinephritic. unc. j.

meliss. unc. iiij.

Syr. de stœchad. unc. j.

MS. in Phiala.

Hacce usa conquerebatur de nimiâ ejus acredine, dulcorem autem non admittebat passio hysterica; sed aquæ liliorum convallium unciâ unâ cum semissi temperatam suppra-

praescriptam mixturam optimè ægra tulit, & optimè novem imò septem intra dies est curata; nebat enim quarto die proba hæc & familiæ summam curam habens Martha.

C A P. IV. *De Catharris, eosque comitante vario Capitis & partium totius corporis dolore.*

I. **C**atharrus est defluxio humorum in omnes corporis partes.

II. *Partes affectæ sunt glandulæ totius corporis ut & Cerebrum, quod Warthonus non veretur glandulam sui generis vocare: addo membranas, tendines, nervos.*

III. *Causa est nunc Lympha acrior cui sepe sæpe intermiscet bilis, unde inflammationes & dolores intensiores omnes; Ophthalmiæ, Anginæ, Erysypelata, Herpetes, Arthritis, Tussis &c. nunc Lympha crassior, unde dolores gravativi, Lassitudo spontanea, Melancholia, Scorbutus &c.*

IV. *Differentiæ ex causis patent. Legat, qui plura volet, prolixum & doctissimum Sneiderum.*

V. *Signa Diagnostica ægris ipsis & adstantibus tam manifesta sunt, ut doctis illa præscribere parum sit necesse.*

VI. *Prognostica. Catharri & dolores interdum*

terdum facilimè, interdum difficulter curantur; evenit ut subito ægri, imò cætera sani illis pereant, hosque catharros, suffocativos, nominare solent. Causa hæret in orificio ventriculi, vel in ipsis pulmonibus ob impeditam à Lympha crassâ Sanguinis circulationem.

VII. *Indicationes curativas ut & Curationem ipsam* petere potes ex Capite 1. & 2. de Epilepsia & Apoplexia; invenies illic ferè omnia huc pertinentia: pauca saltem longo mihi usu comprobata illis hiccejungo.

In aurium ex acriori Lympha dolore.

℞. Lactis Vaccin. q. s.

Laud. opiat. gr. iij.

MS.

Inde auribus guttas tres quatuorve & exterius applica mivam panis ex forno novissimè allatam; id est calidam. In dolore ex Lympha crassiore profunt Olea destillata calida omnia.

In Ophthalmia ex Lympha crassiore.

℞. Ovum Gallinaceum integrum; Coq. ad mediocrem duritiem, demptâque testâ & vitello cavitati ejus indantur

Sachar. Saturni gr. vj.

Camphoræ gr. ij.

Vitriol. alb. gr. viij.

Mell. rosat. unc. s.

Fiat expressio fortis, & expressus liquor

quor instilletur guttatim oculis bis vel
ter de die.

Aliud omni laude majus.

℞. Aq. Euphrasæ,
Fœnicul. an. lib. j.
Salis communis drach. vj.
Tutiæ præparat.
Vitriol. alb. an. unc. f.

Ebulliant parum & Colatura detur
guttatim usui.

MS.

In Ophthalmia ex Lympha acriore hocce
melius huc usque nondum sum expertus :

℞. Florum Cinci scrup. j. f.
Aq. rosac. q. f.

MS. & guttatim inde oculis.

Cincum est species puto stanni, licet alii
sentiant aliter; optimum ex Angliâ huc de-
fertur : præparatur Chymicè quarto ignis
gradu; videtur aliquid Mercurii in se con-
tinere.

In principio doloris Arthritici ex Lympha
acriore :

℞. Minii,
Cerussæ,
Sapon. Venetæ an. unc. x.
Ol. olivar. lib. ij.
Axungia porcinae unc. j.

Coq. ex arte in formam Emplastri.

B

Magni

Magni quæso facias hoc Emplastrum, ingeniose Lector.

In declinatione, ut & in Artuum doloribus ex dislocatione, Contusione &c.

℞. Minii lib. f.

Ol. Tartar. foetid. unc. j. f.

Olivarum lib. j.

Castor.

Lumbricor. an. unc. iij.

Opii crud. drach. j. f.

Ceræ albæ & Labdani q. f.

MS. F. f. a. Emplastrum.

In dolore Arthritico ex Lympha crassiore magnæ semper sum expertus esse efficaciam hoc Emplastrum :

℞. Emplastr. stiptici Crollii unc. j. f.

Ol. philosophor. drach. ij.

Opii crudii scrup. f.

MS. F. Emplastrum extendendum super aluta.

I. *Observationes.* Pia & charissima mihi uxor, sæpius, præcipuè gravitatis tempore, laboravit catharris & vario corporis partium dolore; non putem illam 20 intra annos ter medicamento purgante usam esse; sed naribus attrahebat consilio meo simplex suffimigium pulveris mastiches electi, idque sexies de die; à quo semper & tam subito melius habebat, ut postmodum facta quasi Vice-Medicus (liceat mihi sic loqui joci ergo) illa me

me infcio sibi ipsi illud postea præscripserit
sæpissimè.

I I. Catharris ex Lymphâ crassiore oriun-
dis laborantes tot curavi simplici suffitu vel
vapore aceti, ferro ignito aspersi, ut nemi-
nem hic nominare cogar.

I I I. In Catharris biliosis itidem multa ob-
servavi; exempli loco sit honesta Matrona
Lydia de Rovers; quæ optimè semper, pur-
gata prius, habuit ab hujus mixturæ, quam
cochleatim assumebat, usu.

℞. Aq. prophylactic. nostr. vel ejus in de-
fectu aceti rectificat. unc. j. f.

Menthæ,

Meliss. an. unc. ij.

Syr. papaver. errat. unc. j.

Oc. Cancr. crud. contus. scrup. j. f.


Laud. opiat. gr. j.

MS.

LIBER SECVNDVS.

De Affectibus Colli.

CAP. I. De Angina.

I.  Angina est faucium inflammatio.

II. *Partes affectæ* sunt Tonsillæ, fauces, Vvula, musculi Laryngis & Oesophagæi, imo palatum.

III. *Causa* est Sanguis, abundantia quidem sæpe sua peccans, quâ tamen non eousque noceret, nisi Lympha acriori vitaretur.

IV. *Differentiæ*. Dividitur ab omnibus melioris notæ auctoribus in tres species; quos hic non sequi, temerarium foret. 1. Vocatur Cynanche; 2. Synanche. 3. Parasynanche. Dividitur porro in Veram & Spuriam; sed hæc pauci sunt momenti.

V. *Signa Diagnostica*. Instantis Anginæ signa sunt, cum patiens collum more solito non movere, difficilius respirare, nec aptè potest deglutire, ardoremque & dolorem senserit in faucibus.

Præsentis Anginæ signa diagnostica sunt respiratio suffocationi proxima; sic impedita deglutitio, ut & potus liquidaque omnia rejiciantur.

jiciantur per nares ; summus adest dolor, rubedo, tumor, febris ; lingua arida, vocis languor &c.

V I. *Prognostica.* Angina nulla tuta ; quantum minus tumoris ; tantum periculi magis. Cynanche præcipuè ubi musculi Laryngis inflammati omni videntur carere tumore. Minus periculosa est Angina dicta Synanche ; adhuc minus Parasynanche, ut & tonsillarum inflammatio.

V I I. *Indicationes Curativæ.* Lympha atque bilis in sanguine ipso temperandæ, hincque revellendus, derivandusque citissimè.

V I I I. *Curatio.* Instituatur igitur quamprimum Venæsectio, vel in corpore non Plethorico, in brachio dextro ; reïtereturque pro necessitate ; postea malo id postulante aperiantur venæ sublinguales raninæ. Profunt Cucurbitulæ, Vesicatoria, Enemata, Gargarismata, Topica.

Medicamenta contra Anginam.

Radices ; althææ, liquiritiæ, Ireos. Herbæ ; Consolida, Myrtus, Prunella, Taraxacum, Plantago, Scabiosa, Sempervivum majus, Salvia, Hedera terrestris, Violaria. Flores ; Balauftiorum, rosarum rubrarum. Crocus semina 4 frigida majora, minora, papaveris. Cortex & succus granatorum, præcipuè acidorum. Ficus. Album Græcum. Hirun-

dines ustæ, illarumque nidus. Alumen ustum.
Syrupus Berberorum, Capillorum Veneris,
Violarum, Portulacæ, Iujubinus, Scabiosæ,
Tussilaginis. Mel rosarum, Rob Sambuci,
Diamori.

Repellens Gargarisma morbi in principio.

℞. Flor. ros. rubr. balauftior. an. P. j. f.

Cortic. granator. unc. f.

Fol. quercus M. j.

Alumin. ust. scrup. j.

Coq. ex aq. ferratâ & Colat. lib. j. f.

Adde

Rob diamor. unc. ij.

MS.

Aliud efficacius.

℞. Fol. Taraxici M. j. f.

Hederæ terrestr.

Violar. an. M. f.

Coq. ex aq. hordei in Colatur. unc. xx.

Dissolve

Mellis rosat. colat. unc. j. f.

Addendo

Spir. vitriol. gutt. xv.

MS.

Discutiens in morbi declinatione Garga-
risma.

℞. Rad. liquiritiæ,

Corticum granator. an. drach. ij.

Flor. balauftior. P. j.

Iujubar. N°. xij.

Ficuum

Ficum N^o. iij.

Passular. minor. drach. iij.

Coq. ex aq. hordei in Colat.
unc. xx.

Dissolve

Syr. capillor. Ven. Mell. ros. col. an.
unc. j.

MS.

Aliud

R. Rad. Ebuli unc. f.

Ireos nostrat.

Liquiritiæ an. drach. ij.

Flor. Chamomillæ P. j. f.

rosar. rubrar.

Hyslop. an. drach. ij.

Dactylor. N^o. iij.

Ficum N^o. vj.

Alb. græc. drach. j.

Sem. Fœnugræc. drach. ij.

Coq. ex decocto raparum in Cola-
turæ lib. ij. dissolve

Syr. Capillor. Vener. unc. f.

Iujubin.

Althææ Fernel. an. drach. vj.

MS.

Externa Medicamenta contra Anginam.

Ol. nucum, lil. albor. amygdalarum, cha-
momillæ, anethi. Axungia caponis, porci.
Vnguent. althææ. Emplastrum de Mucilagi-
nibus.

nibus. Stercus canis, columbarum. Nidus;
hirundinis.

℞. Rad. althææ,

Lilior. alb. an. unc. j.

Nid. hirundinis N°. j.

Ficum,

Dactylor. an. N°. iiij.

Alb. græc unc. f.

Cæpar. drach. vj.

Coq. ex aq. hordei vel Cerevisia & Cola-
tur. f. q. Adde

Farinæ Tritici,

Semin. lini an. unc. j.

Fœnugræc.

Althææ an. unc. ij. f.

Vitell. Ovi N°. ij.

Croc. Oriental. drach. ij.

Ol. Chamomill. unc. ij.

MS. F. Cataplasma,

Vel

℞. Succ. cæpar. unc. ij.

Ol. lilior. alb.

Irin. an. unc. j. f.

Coq. parum, Addendo

Nid. hirundin. drach. ij.

Picis & Ceræ q. f.

MS. F. f. a. Emplastrum.

Cataplasma Maturans,

℞. Rad. Althææ unc. j.

Lil. albor.

Rad.

Rad. Liquirit.

Ireos nostr. an. drach. ij.

Cæparum unc. f.

Passular. enucleatar, unc. j.

Ficum N^o. vj.

Sem. lini,

Fœnugræci an. drach. ij.

Fol. Malvæ, brassicæ an. M. f.

Coq. ex Vino albo Gallico in formam Cataplasmatidis.

MS.

IX. *Observationes.* 1. Æsculapii quidam filius, plethoricus, obesus, laborabat synanche, sibi que statim jussit venam secare, statimque post poterat deglutire, & ideo assumpsit purgans à quo benè habuit & per multas horas quievit. Sequenti die recidivam passus iterum instituit venæsectionem, iterumque habuit melius, & ambulando loquebatur libere, dicens se varia in proprio morbo observasse; altero mane dum se putaret sanum, intra bihorium suffocatus periit.

2. Vxor Librarii Lescaille plethorica intensissimos faucium patiebatur dolores, tonsillæ ita erant tumefactæ ut ne guttulam potuerit deglutire, assumptaque omnia rejiceret per nares. Institui Venæsectionem, ususque sum Cataplasmatibus & Gargarismatibus superscriptis, quartoque morbi die malum bacillo exploraturus, abscessum vidi suppu-

ratum; placuit mihi inhumanius cum illa agere, eodem bacillo abscessum rupi; unde cum statim melius haberet, risit & laudavit probam fraudem.

C A P. II. De Scrophulis.

I. **S** *Crophulæ* sunt tumores præternaturales glandularum colli, propriâ tunicâ contenti.

II. *Partes affectæ* sunt glandulæ conglomeratæ colli, salivales hodiè dictæ.

III. *Causa*. Glandularum totius corporis munus, (quod certissimum esse puto) est Lympham transcolare; necesse ergo est Lympham crassiorem hujus affectus esse causam, unde illarum primo durities postea sensim accrescens pertinaxque tumor.

IV. *Differentiæ*. Interdum mobiles sunt; interdum ossibus adhærent. Interdum glandula salivalis inferior, interdum & superior afficitur. Interdum hæreditariæ sunt; interdum Epidemicæ.

V. *Signa Diagnostica*. Tumor durus & rotundus vel oblongus est; dolorificus rarissimè.

VI. *Prognostica*. Quo mobiliores eò curatu faciliores, curatu tamen semper difficilimè. Ossibus adhærentes ferè incurabiles: in hisce non utor nisi curâ palliativâ, ut & in

in illis quæ in cancrum vergunt atque dolent.

VII. *Indicationes Curativæ.* Lympha crassa incidenda, temperanda, evacuanda. Glandulæ emolliendæ; humor, si potest, discutiendus, vel maturandus & tandem escharoticis, ubi aliter fieri nequit, absumendus.

VIII. *Curatio.* Purgetur corpus Medicamentis Pituitæ huc usque dicatis. Vitetur Venæsectio. Prodest sudor, & acida intus assumpta omnia, ut & salia volatilia. Topica Chirurgiæ debentur.

Medicamenta contra Scrophulas.

Rad. Aristolochiæ rotundæ, bryoniæ, cyclaminis, filipendulæ, morsus diaboli, iridis, pimpinellæ, pyrethri, scillæ, verbenæ, scrophulariæ. Folia cupressi, apiastri, rutæ, satyrejæ. Flores genistæ. Cancri Combusti. Testæ ovorum ustæ. Sal Gemmæ. Spongia quæ maximè laudatur à Practicis.

℞. Cineris spongiæ marin.

Offis sepia,

Piperis longi,

Cinamom.

Salis Gemmæ,

Pyrethri,

Nucum cupressi,

Gallarum,

Corticum Quercus,

Flor.

Flor. ros. rubr. an. unc. f.

MS. F. Pulvis tenuis.

Dosis scrup. ij. vel drach. j.

Vel

℞. Lapid. Spongiæ drach. iij.

Sal. Gemmæ drach. ij.

Tartar. vitriolat. drach. j.

MS. F. Pulvis. Dosis scrup. j. f. vel scrup. ij.

Localia Chirurgis committo, inter quos novi qui magni faciunt Medicamentum hoc, quod in Epist. suis Medicin. describit Langius, cujus reverà felicissimos vidi successus.

℞. Olei philosophorum laterini lib. f.

Thuris, Masticis, Gummi Arabici,

Therbentinæ an. drach. iij. Pistata si-

mul per Alembicum destillentur; tan-

dem distillationi addatur salis ex cine-

re ceni, & iterum distilla, & quod di-

stillaverit in vitro serva.

Sale ceni quia caremus, supponi potest cinis spongiæ.

Observationes. Virgo nobilis, biliosa, macra, scrophulis multiplicibus vexata fatis cessit, febre continua continuò illam emaciante, id est, hectica. Aperto cadavere reperimus mille ultra glandulas minores, majores, à faucibus ad os pubis usque. Eiusdem erant coloris, flavi scilicet, quem apertâ cute oculis nostris objiciebant scrophulæ in collo. Medicamenta cautè licet applicata non addo infelicem ob successum.

C A P.

CAP. III. De Aneurismate.

I. **A**neurisma est Tumor præternaturalis digitis illum comprimentibus facile cedens, illisque ablatis statim crediens, cum forti pulsu.

II. *Pars affecta* sæpissimè, imò ferè semper ob Arterias Carotides, Collum est; observari tamen illud in gubus & brachiis.

III. *Causa* est humor acris, serosus, biliofus, internam arteriarum tunicam erodens, imò & externam crassiolem, imò & viciniora sibi ossa.

IV. *Differentie*. Nunc magnum est, nunc parvum; nunc collo adhæret, nunc artubus.

V. *Signa Diagnostica* petere potes ex suprâ scriptâ Aneurismatis definitione.

VI. *Prognostica*. Parva curatu difficilima, magna incurabilia: nec curatum in collo vel unicum vidi. Palliativâ curâ diu vivere possunt. Chirurghi artis propriæ ignari abscessum judicant; eoque aperto scalpello, moriuntur ægri illicò illorum in præsentia.

VII. VIII. *Indicationes Curativæ & Curatio*. Tumor ab initio statim comprimendus, humorque acris repellendus: utrumque commodè fit per tenuem laminam plumbeam. Quidam volunt ut sanguis affluens intercipiatur arteriam suprâ & infrâ Aneurisma

risma ligando ; illudque postmodum excidendo curare. Sed hoc remedii genus dolorificum nec tutum est ; mallem ego vitæ conservandæ ergo brachium vel pedem amputare.

IX. Observationes. 1. Pauperrimi cujusdam viri (cujus nomen mihi excidit) Aneurismate extincti, cadaver dissecuimus. Videbamus sanguinem copiosum tam serosum quam grumosum ; tunicas arteriarum utrasque erosas, & claviculam sinistram maximâ ex parte carie exesam. Cl. Sylvius ejus erat Anatomicus.

2. Alium pauperem superscripto modo per laminam plumbeam ita palliativè curavi, ut decimo quinto post anno mihi sanus fuerit loquutus. Tumor erat suprâ genu dextrum, ovi gallinacei magnitudine.

LIBER TERTIVS.

De Affectibus Thoracis.

CAP. I. De Pleuritide.

I. **P**leuritis est Inflammatio interioris Thoracis duplicatæ Tunicæ, dicta Pleura.

II. *Pars affecta* est Membrana Pleura; plerumque etiam patitur Pulmo, Mediastinum, Pericardium, Diaphragma.

III. *Causa* est humor serosus, biliosus, acris, cum sanguine arterioso sese præternaturaliter effundens in Membranam pleuram, plerumque per anastomosin, interdum diæresin, rarò diapedesin.

IV. *Differentiæ.* Vera est vel Notha. Vera provenit ex sanguine arterioso acriori; in Nothâ sanguini sese miscet Lympha crassior. Quidam scriptores dolorem musculorum Pleuritidem Notham vocant, quod illis non concedo; hoc malum Catharris debetur.

V. *Signa Diagnostica* sunt, 1. Dolor lateris punctorius, 2. Tussis, 3. Difficilis respiratio, 4. Febris continua, 5. Pulsus durus. Hæc signa nisi omnia concurrant non est Pleuritis. Interdum Pleura inflammatur in dorso

dorso circa diaphragma , & ab incautis summo ægrorum damno , pro dolore nephritico habetur.

VI. *Prognostica.* Quò citiùs materia peccans suppuratur ; quò sputa magis albicantia & leviora , eò citius curatur æger. A copioso scretu tussis & respirationis difficultas velle aucta, vel non imminuta, malum.

VII. *Indicationes Curativæ.* Fluxus humorum ab initio statim quantum fieri potest cohibendus ; humor ipse revellendus , derivandus ; postea suppurandus , pars tandem ejus reliqua discutienda, partesque roborandæ.

VIII. *Curatio.* Venæsectio primo morbi die bis terve, cæteris paribus, reiterata maximo ægris est auxilio. Sunt qui illam in totum rejiciunt , sed cum illis non sentio. Institueda est in brachio lateris affecti , quicquid Theoretici contradicant , eaque interdum largiter. Postmodum humoribus turgentibus corpus purgandum; sudor movendus, expectorantia præscribenda.

Medicamenta contrà Pleuritidem.

Rad. Aristolochiæ , bardanæ , millefolii. Herbæ, Taraxicum, Anagallis, brassica, Card. bened. Cerefolium. Consolida regalis , hippoglossum, pulmonaria, scabiosa. Flores buxi , papaver. erratici , stœchad. citri , violar. femina Card. ben. fraxini , Malvæ , urticæ ,
aqui-

aquilegiæ. Thus. Cor Cervi. Dens apri.
 Lapis Carpionum, percarum; mandibulæ
 lucii piscis. Oc. Cancr. Ossa lupi. Priapus
 Cervi, Tauri. Sperma Ceti. Vnicornu. Sal.
 prunellæ, Corallorum. Succus Taraxici, be-
 tulæ, stercoreis equini. Aqua bardanæ, Card.
 bened. Scabiosæ, Theriacalis, Prophylacti-
 ca nostra. Spiritus tartari. Liquor diaphore-
 ticus Mynsichti. Syr. Card. bened. papaver.
 rheados, diacodii. Ol. myrtillor. rosaceum,
 amygdalinum. Vnguentum pectorale, Al-
 thææ. Emplastrum Ireos, de Cumino. Pul-
 vis antipleuriticus Mynsichti. Haly. Tragea
 antipleuritica Hartmanni, Quercetani. An-
 tim. Diaphoretic. bezoard. minerale; Flores
 Sulphuris.

In principio morbi :

℞. Succu Taraxici depurat. unc. j.

Aq. plantagin.

Rosac. an. unc. ij.

Prophylactic. nostr. unc. f.

Oc. Cancr. crudor. contusor. drach. f.

Syr. papaver. errat. unc. j. f.

MS. in Phiala.

Sumat æger hac de mixturâ singulis horæ
 quadrantibus cochleare unum alterumve, mi-
 raberis ejus effectum.

Vel

℞. Syr. althææ Fernel. unc. j.

Diacodii,

C

Papa-

Papaver. errat. an. drach. vj.

Oc. Cancr. præparat. drach. j.

Bezoardic. mineral. scrup. j.

MS. F. Linctus continuò assumendus.

Secundo, tertiove die :

℞. Rad. Althææ unc. j.

Liquiritiæ rasæ drach. ij.

Fol. Malvæ M. j. Senn. unc. f.

Oc. Cancr. crudor. contusorum & im-
petia ligatorum drach. vj.

Rhei electi drach. iij.

Tamarindor. unc. f.

Iujubar. No. x.

Sem. urtic. Roman. unc. j. f.

Coq. ex aq. hordei in Colaturæ unc. xxiv.

Dissolve

Syr. Diacnicu unc. j. f.

Salis prunellæ scrup. ij.

MS.

Bibat Patiens hujus Apozematis Vncias v.
bis terve de die , prout alvus laxa fuerit vel
adstricta.

Medicamenta Topica.

Efficaciora hisce , quantumvis communia,
nulla sum expertus.

℞. Vngt. Althææ Compos.

Pectoralis an. unc. f.

Ol. Sem. papaver.

Lilior. albor. an. drach. iij.

Ol.

Ol. Myrtillor.

Rosac. an. drach. vj.

MS. in fictili.

Hocce Linimento utor in morbi principio, & materiâ suppuratâ Emplastro de *Cumino*, vel Emplastro *Ireos* in affectibus pectoris summâ laude digno.

IX. *Observationes.* 1. Dominus N. de Bas Sponsus, conquerebatur mihi de punctorio lateris sinistri dolore, quem Pleuriticum vocabat. Statim refutavi ejus opinionem; hærebat enim malum in musculis intercostalibus, quod, ut suprà scripsi, quidam Auctores Pleuritidem notham vocant. Respirabat difficulter, & conquerebatur se non posse ob dolorem brachiis amplecti charissimam sibi sponsam. Iussi imponatur affecto lateri Emplastrum *Ireos*, & inde unica nocte curatus, tertio post die nuptias celebravit sine ulla Sponsæ querela.

2. Laurentius Hommers Mercator, qui paucis ante morbum diebus joci ergò mihi dixerat, sibi in toto mundo omnia perinde esse, modo uxor sua non fieret vidua, Pleuritide corripitur exquisita in latere sinistro. Detraxi ipsi sanguinem ter intrà biduum ex brachio & manu lateris affecti, ususque est medicamenti suprascriptis. Tam benè inde habuit ut quarto die me inscio exiverit, comederitque halecem & superbiberit Pintas

duas Cerevisiæ crassæ Roterodamensis. Altero die, imò illâ ipsâ nocte, incidit in Pleuritidem lateris oppositi, id est dextri. Summo mane vocatus dolebam Amicum, cum viderem vires tanto oneri non fore ferendo, cui etiam tertio post die succubuit.

3. Illo eodemque tempore Gertruda Everss sanguinea pituitosa Virgo, vigesimo secundo ætatis anno ex Pleuritide decumbit. Menstrua pro voto fluxerant decem antè diebus. Iussi illi sanguinem è brachio affecti lateris ad Venas octo bis detrahere frustraneo eventu. Non permittebant prostratæ vires tertio morbi die, ut amplius de Venæsectione ausus fuero cogitare, nihil enim nisi mortem expectabam. Præscripsi ipsi mixturam superscriptam ex succo Taraxici, &c. Et paucas intra horas cessavit dolor, paucisque post diebus totus morbus.

De *Peripneumonia* nihil scribo, quia nihil in cura differt à cura Pleuritidis. Consulere qui plura scire volet, hoc de affectu, ut & de *Paraphrenitide*, auctores, nam & hanc eodem modo curari posse scio.

C A P. II. De Phthisi.

- I. **P**hthisis est *Consumptio* humoris nutritii.
- II. *Pars affecta* interdum quidem Pulmo est, sed non eo quo vulgo putatur.

tatur modo, ut ex causis patebit. Primariò plerumque patiuntur Ventriculus, Pancreas, Glandulæ lacteæ &c. Pulmo per Consensum.

III. *Causa* est 1. Ventriculus malè Chylum digerens. 2. Succus pancreaticus malè sese miscens bili: unde 3. Chylus crassior malè transcolatur per glandulas mesenterii lacteas: evenit inde 4. quod crassior chyli pars in glandulis lacteis hæreat, non transcolatur, illas induret, sic ut non nisi serosior illius pars per ductum Thoracicum perveniat ad Cor. Interim vesiculæ tam orbiculares quam sinuosæ pulmonis noviter à Cl. Malpighio inventæ, ex legibus circulationis sanguinis, replentur lymphâ, quæ in illis crassior fit, anhelationem causat atque tussim, vapores adscendentes angustias intermittentes. Ulcus Pulmonis Tabem esse non admitto; nisi longo temporis tractu degeneraverit, vel in Vomitam, vel Empyema; dissectione enim semper contrarium reperi in cadaveribus hoc malo extinctis.

IV. *Differentiæ*. Practicus Tabem in tres species divido. Prima, eaque præcipua, est illa quæ provenit ex glandulis mesenterii lacteis Lymphâ crassâ, vel, ut alii loquuntur, pituitâ obsessis; quæ sic in causa sunt, ut minima assumptorum ciborum pars perveniat ad Cor, Corporisque partes reliquas; maxima vero illorum pars pereat per alvum. Se-

cunda est quæ propter sanguinem, & in illo Lympham serosiorē, Tussim excitat continuam, dum per pulmones circulatur cum succo nutritio ad Cor. Tertia species illa est, quam antiqui ulcus pulmonum vocaverunt. Procedit ex Lymphâ crassâ in Vesiculis pulmonum supradictis diutius hærente, & Circulationem sanguinis impediēte. Sputa primum albicant & levia sunt, postmodum crassiora fiunt, tandem aliquo modo foetent & sic putrescunt. Hæc quoad qualitatem; quantitate si peccaverit hæc Lympha, Vomica Pulmonum observabis, vel Empyema.

V. *Signa Diagnostica* incipientis Phthisis sunt Inflatio Ventriculi tumorque totius abdominis; anxietas cordis & interdum palpitatio, tussis sicca, appetitus prostratus, macredo, febricula continua. Consummata Tabis signa sunt, appetitus major sed vagus; (provenit ille puto, ex febre aucta & majore; quam non solum continuam observavi, sed in plerisque indies suam exacerbationem habentem; hancque febrem voco duplicem Tertianam continuam; an illa ex Pulmonibus trahere possit ortum, judicet judicio pollens Medicus) Tussis continua, respiratio difficilima, Marcor, cutis arida nigricansque, sputum viride, crassum & aquæ puræ immersum, matulæ fundum petens.

VI. *Prognostica.* Phthisin Infantum, imò adu-

adulorum in principio facilè curaveris, si abdominis majorem habueris curam, quam pulmonis, hicce enim tunc non peccat nisi per accidens. Consummata ferè semper incurabilis; sed Vomicâ pulmonis laborantes curatos vidi varios, ut & alii mecum Practici.

VII. *Indicationes curativæ.* Lympha crassa incidenda, abundans leniter & per epicrasin evacuanda. Diæta sit exquisita; reficiatur tamen sæpè Stomachus.

VIII. *Curatio.* Intelligenti sufficient Indicationes Curativæ. Hoc saltem addo, me contra omnium fortè Scriptorum Practicorum sententiam acidis temperatis felicissimè usum. Ratio patet ex præscriptis. Dulcia acidis non temperata, cum multis aliis observavi, ægris semper, ad minimum plerumque, obfuisse.

Medicamenta Anti-Phthifica.

Radices Chinæ, Salsæparillæ, Polipodii, Hellenii, Symphyti majoris, Ireos. Fol. Capill. Ven. Consolid. Hedera terrestr. Hyssopus, Iacea, Millefolium, Pilosella, Pimpinella, Taraxicum, Plantago, Prunella, Pulmonaria, Sanicula, Scabiosa, Veronica. Flores Hyperici, rosarum, Violarum, Aurantiorum. Semina althææ, malvæ, papaveris, 4. frigid. majora & minora, (Amygdalas non amo)

Pistacia. Santalum citrinum. Sulphur vivum
 præparatumque. Aq. Antiphthifica Mynsichti,
 Quercetani, Rolfincii. Spir. Sulphur.
 per Campanam, salis dulcis. Balsamus Sul-
 phuris simplex, vel anisatus. Elix. Proprie-
 tatis. Syr. papaveris tam erratici quam albi,
 diacodii, Althææ, de Symphyto Fernelii. Loch-
 de pulmone vulpis, Antiphthific. Mynsichti.
 Antidotus major Querc. Pulvis Haly, resecti-
 vus Myns. Spec. Diatragacant. Frig. Oc.
 Cancr. Tragea antiphthifica Q. Coffi, Succo-
 lata. Antimonium diaphoret. Bez. minera-
 le, flores Sulphuris ejusque lac. Pil. proprie-
 tatis Myns.

℞. Oc. Cancr. crudor. contusor. drach. j.
 Spec. Diatragacant. frig.
 Pulv. Haly an. drach. f.
 Sal. prunell. scrup. j.
 Tartar. vitriolat. gr. vj.
 Confect. Alchermes incompletæ
 Sachar. perlat. unc. f.
 Althææ unc. ij.

MS. F. f. a. Trochisci omnibus diei
 horis assumendi.

℞. Syr. Althææ Fernel. unc. ij.
 Diacodii unc. j.
 Bezoardic. miner.
 Salis prunell.
 Oc. Cancr. præparat. an. scrup. j.
 MS. F. Linctus.

Si Materia abundantia suâ peccans est evacuanda :

℞. Rad. Althææ unc. j.

Ireos unc. f.

Fol. Malvæ M. j.

Senn. mundat. unc. f.

Rhei elect. drach. iiij.

Tamarindor. drach. vj.

Sebesten N^o. viij.

Oc. Cancr. crudor. contusor, & in
petiâ ligator. unc. f.

Sem. aquileg. drach. j. urtic. Rom.
drach. f.

Coq. ex aq. hordei. in Colaturæ unc. xxv.

Diffolve

Syr. diacnic. unc. ij.

Sal. nitri scrup. ij.

MS. F. Apozema.

Bibat patiens semel vel bis de die, prout operabitur vel ejus feret constitutio, Vncias quinque. Spiritus salis dulcis, ut & simplex liquor Tartari, incomparabilis sunt efficaciam, guttatim in cerevisia, juscule vel vino assumpti.

I X. *Observationes.* I. D. Hasenbroeck, Ovium Dei Pastor, Melancholicus, Macer, Tussiens, Febricitans, nec noctu, nec de die ferè poterat dormire; dolebat caput, appetitus ut & totius corporis vires erant prostratæ. Juvenis est 30 circiter annorum. Præscripsi illi primò

decoctum suprascriptum laxans ; deinde hanc
mixturam cochleatim assumendam :

℞. Aq. Scabios.

Card. benedict. an. unc. ij.

Prophylactic. unc. f.

Oc. Cancr. præparat. scrup. j. f.

Syr. papaveris errat. unc. j.

Laud. opiat. gr. j.

MS. F. Mixture cochleatim sin-
gulis horis assumenda.

Optimè inde habuit. Tandem usus sum spi-
ritu salis dulcis. Nunc eo usque benè habet
ut hilaris sit Athleta , bisque interdum de die
doctissimè summaque cum Auditorum laude
concionari possit.

2. Anna Sweers sanguinea & novendecim
annorum virgo, tussiebat & febricitabat con-
tinuè. Macrior inde facta , usa est ope fœ-
minæ cujusdam circumforaneæ , quæ ipsi per
continuas purgationes novem intrà dies pol-
licebatur optatissimam sanitatem. Sed suc-
cessus eo usque fuit infelix , ut vocatus ego
nihil ipsi potuerim præter corroborantia
præscribere ; brevi autem post periit. Tam
noxia sunt hoc in morbo fortiter purgantia.

3. Infantes Tabe laborantes plerosque sic
feliciter curavi. Iubebam illis inungeretur
bis de die venter hocce Linimento :

℞. Vngt. Althææ Comp.

Arthanitæ an. unc. f.

Ol.

Ol. Mucagin. unc. j.

MS.

Interdum, id est, ter quaterve singulis hebdomadibus, illos purgo Syrupo Diacnicu. Interim utuntur Liquore Tartari in ordinario illis potu.

C A P. III. *De Febribus.*

I. **F**ebbris est aucta Circulatio Sanguinis per Pulmones, Cor, Cerebrum, totiusque Corporis partes.

II. *Partes affectæ* sunt Ventriculus, Intestinum duodenum, Hepar, Pancreas, Glandulæ mesenterii, & interdum Artus, &c.

III. *Causa* Interna vel Externa est. Internam eamque præcipuam puto, quod postquam Ventriculus non benè cibos concoxerit, Succus Pancreatitus non bene sese misceat cum bile Chylóque; sic bilis præternaturaliter regurgitat per Venam Cavam ad Cor totumque corpus. Pancreas interim Lymphâ crassâ obfessum officium suum male agit, unde febres intermittentes omnes.

Externa causa est Contusio frigulve partium externarum, quæ Circulationem tam sanguinis quàm Lymphæ (quam veri Anatomici mecum circulari, certò putant sciuntve) impedit, sicque febrem causat. Si ad omnia, quæ hic brevi describuntur, attendere volueris,

ris, reperies fortè omnia tot voluminibus de tanto morbo descripta. De Febris malignis & contagiosis nihil hic dico, cum in Præfatione promiserim me speciatim de morbis contagiosis verba facturum.

I V. *Differentiæ.* Febres hisce in regionibus raro ob Lympham crassam sunt continuæ, sine nova exacerbatione. Plerumque sunt Tertianæ simplices vel duplices; vel Quartanæ simplices, duplices, triplicesve; Quotidianæ enim mihi in rerum natura non dantur, omnes enim tales vel duplices Tertianæ, vel Triplices Quartanæ sunt.

V. *Signa Diagnostica.* Pulsus semper est celerior, sæpissimè oppressus. Dolor Capitis vel punctorius est vel gravativus. Conqueruntur ægri de Cordis & præcordiorum anxietate; quam antiqui optimè Cardialgiam vocavere; reverà enim non provenit ex corde, sed Ventriculo ipsiusque præsertim orificio. Interdum adest rigor horrorve, interdum non. Vomunt multi in principio, postmodum sunt inquieti, tandem sudant, & sic terminatur pro illo tempore febris intermittens tam simplex, quam duplex Tertiana, ut & Quartana.

VI. *Prognostica.* Continua vel acuta Febris nulla tuta; sæpissimè enim aliquid subest, quod nescimus. Quartana Medicorum vocatur opprobrium: curantur tamen sæpè brevi,

brevi, exactissimè diætam observantes ægri. Febres Tertianas duplices semper continuas observavi, & idè periculosas, multosque, nisi leniter tractentur, è medio tollunt. Tertianæ simplices facilè curantur ab expertis.

VII. *Indicationes Curativæ.* Ventriculi, Pancreatis, Hepatis, Glandularumque Mesenterii major habenda ratio quam Cordis vel Cerebri: artus autem nequaquam negligendi; caleant necesse est. Bilis acrior temperanda; bilis crassior (quod sæpe evenit) incidenda. Humores abundantes leniter evacuandi in tenellioribus; fortiora purgantia non nisi rusticis conveniunt. Sudorifera vehementiora obsunt omnia semperque; natura enim ducenda non cogenda. Omnia sponte fluant, absit violentia rebus.

VIII. *Curatio.* Hippocratis ex lege humores primo præparandi, nisi materia turgat, quod rarè (hisce præsertim in regionibus) evenire solet. Non tamen improbo primam vulgo dictam regionem leniter evacuantia. In Febris continuis Venæsectio cautè instituta convenit: ut & in febre Tertiana simplici, tertium post Paroxysmum. Quartanariis plerumque nocet; hisce profunt frequentes Clysteres, & interdum purgationes; semper vero sudorifera, præcipuè salia; eaque febricitantibus omnibus.

Medi-

Medicamenta Febrifuga.

Radic. Contratservæ, Imperatoriæ, Plantaginis, Taraxici. Cortex Chinæ Chinæ Indorum. Fol. Absinthii, Card. benedict. Centaurii, Fumariæ, Acetosæ, Verbena, Ruta, Serpillum. Semina milii Solis, nigellæ. Nux moschata, Garyophyllum. piper. Camphora. Cornu Cervi. Sal Ammoniaci, Prunellæ, Card. bened. Scordii, Absinthii, Tart. vitriolati. Aq. febrifuga Mynsichti, Quercetani, Hartmanni. Bezoardicum minerale. Sal febrifugum Mynsichti, Riverii, Crollii. Spir. Salis dulcis vitrioli. Extractum Catholicum. Pilulæ Cholagogæ. Aloës, Rheum, Iulappa. Emplastrum febrifugum Strobelbergeri.

In Febris continuis.

℞. Sal. prunell. gr. xv.

Tart. vitriolat. gr. vj.

Oc. Cancr. præparat. scrup. f.

Sachar. perl. drach. f.

MS. F. Pulvis.

Detur bis de die in Iusculo: interim in cerevisia, potuve assueto (consueta enim longo tempore inconsuetis minus molesta esse solent) utatur guttis 14 vel 15 Spir. Salis dulcis pro temperamento & ætate. Potest & hac Corroborante, humoresque præparante

te uti mixturâ, eaque cochleatim singulis diei
horis.

℞. Aq. prophylactic. unc. j. f.

Borrag.

Card. bened. an. unc. ij.

Iulap. rosac. unc. j. f.

Sachar. perlat. drach. ij.

MS.

Descriptio Aquæ Prophylacticæ quæ Ce-
leberrimis Viris Dom. Fr. Sylvio, Fr. Verscha-
gen, mihiq̃ue debetur :

℞. Rad. Angelicæ,

Zedoariæ an. unc. j.

Petasitidis unc. ij.

Fol. Rutæ unc. iiij.

Melissæ,

Scabiosæ,

Flor. Calendulæ an. unc. ij.

Nucum Jugland.

Immaturarum concisarum lib. ij.

Pom. citr. recent. concis. lib. j.

Contundantur omnia simul, deinde affunde

Aceti vini optimi ad tres quartas par-
tes ex arena in cucurbitâ vitreâ per se
destill. lib. xij.

Digerantur per noctem, deinde destillen-
tur igne cinerum lento ad siccitatem, idque
sine uestione; & hoc acetum usui serua.

Vbi humores præparati evacuandi, præ-
scribo medicamenta leniora, Auctoribus
la-

laxantia dicta. Proprie vocata purgantia vel Cathartica, raro mihi usu venire, saepius illas observavi noxia.

Tertiana duplex eodem modo curatur.

In Quartana & Tertiana Intermittente.

℞. Sal. absinth.

Card. bened. an. gr. xv.

Tart. vitriolat. gr. vj.

Sachar. perlat. drach. f.

MS. F. Pulvis immediatè antè paroxysmum assumendus.

Cortex Indicus China China dictus multos curavit, sed nec tam tutò, nec tam citò, nec tam jucundè quam suprà dicta salia; interim magno constat pretio.

Vbi Purgandum

℞. El. Diacartham.

Diaprun. solut. an. unc. f.

Tart. vitriolat. scrup. j.

Ialapp. drach. j.

MS. F. Conditum.

Sumat hujus Conditì ægrotans Intermiffionis die jejuno stomacho nucis avellanæ magnitudinem.

Vel

℞. Cremor. Tartar.

Sal. Scordii an. gr. ix.

Tartar. vitriolat.

Diagrid. an. gr. vj.

MS. F. Pulvis intermissionis die.

Notan-

Notandum Quartanarios fortiora ferre purgantia Tertianâ, vel Continuâ quacunque laborantibus.

IX. *Observationes.* Nobilis Virgo Margaretha van den Heuvel, decimo septimo ætatis anno corripitur febre Quartanâ cum menstruorum suppressione. Vsa est per tres integras septimanas quotidie hisce Rotulis :

℞. Sal. Arthemif.

Prunell. an. scrup. j.

Tart. vitr. gr. xxv.

Chalyb. præparat. gr. xv.

Oc. Cancr. crudor. contusorum drach. j.

Sachar. perlat. unc. ij. f.

MS. F. f. a. Trochisci.

Melius hisce habens, rediit illi, mihi minus citò, prostratus antea appetitus; ideoque illam hoc pulvere purgavi :

℞. Salis Succin. scrup. j.

Tart. vitr.

Diagrid. an. gr. vj.

MS. F. Pulvis.

Hocce pro voto suo meoque purgata, rediit menstruorum fluxus, & valedixit ipsi febris. Venæsectionem Plethoricæ non institui.

Nobilissimus Vir Iuvenis P. S. viginti octo annos natus, & febre Quartana per menses aliquot vexatus, meam imploravit opem. Præ-

D

scripsi

scripsi illi hunc pulverem præcisè in Vino
Rhenano assumendum antè paroxysmum :

℞. Sal. Card. benedict.

Absinth.

Prunell. an. scrup. f.

Bezoardic. min. gr. v.

Sachari perlarum scrup. ij.

MS. F. Pulvis.

Ter eò usus convaluit sine recidivâ. Plu-
res tales observationes scribere hic possem ,
nisi metuerem quod mutato nomine unum
idemque sim dicturus.

LIBER QVARTVS.

De Affectibus Infimi Ventris.

CAP. I. De Nimia Ciborum
Appetentia.

I. **N**imia ciborum Appetentia est Fermentatio aucta in Ventriculo.

II. Pars affecta est Ventriculus & Pancreas.

III. Causa vel Interna vel Externa est. Interna est succus Pancreaticus acidior. Externa causa est assumptio ciborum vel medicamentorum acidorum nimia nec satis temperata. Motus nimius. Vinum Generosum, Aromata acriora omnia.

IV. Differentia ferè nulla est, quam quod gradibus suis distinguatur.

V. Signa Diagnostica. In vomitum valdè proni sunt, & nihil interim ejiciunt præter humoris acidi & pituitosi paucissimam quantitatem. In aliis contrarium evenit, qui voracitate & aviditate nimia assumpta statim evomunt & reliqua excernunt per alvum. Ruëtibus vexantur & anxietate cordis.

VI. Prognostica. Obesi interdum fiunt, non enim nisi subtilior pars chyli transit propter vomitum ad Cor, illicque in sanguinem

52 *De nimia ciborum Appetentia.*

convertitur ; sed hoc malum valde est & fervile & sumptuosum : Coguntur enim vel noctu etiam hyberno tempore bis terve surgere, & sic aëris intemperiei esse obnoxii. Aliorum vitæ finis hydrops est vel tabes.

VII. *Indicationes Curativæ.* Humor acidus temperandus & quantitate peccans evacuan-
dus, per Medicamenta dicta laxantia.

VIII. *Curatio.* Omnia pingua & dulcia temperata illis profunt, ut & leniter purgantia. Nec Vomitus probo nec Venæsectionem. Præcipua Cura in Diætâ est quærenda, de qua consulantur Auctores. Interdum Narcotica, sed non nisi leniora profunt.

IX. *Observatio.* Celeberrimus quidam summusque mihi amicus Vir, valdè conque-
rebatur de affectus hujus molestia. Præscripsi illi diætam convenientem, jussique bibat Cerevisiam Roterodamensem, Vinique, cui assuetus erat, tantillum. Nullo alio usus sum medicamento, quam Syr. de Cichoreo cum Rheo & Syr. Diacnicu quem quotidie assu-
mebat ; nunc pugilicè vivit atque sobriè.

C A P. II. *De Vomitu.*

I. **V**omitus est motus Ventriculi præternaturalis.

II. *Pars affecta* ferè semper est Stoma-

Stomachus, interdum per consensum Inflammatum Hepar, interdum Diaphragma, interdum Pancreas, quod exactissimè Anatomicus observavi.

III. *Causæ* hic valdè differentes sunt, & exactissimi iudicii Medicum requirunt. Peccat sæpissimè pituita tenax rugis ventriculi adhærens, interdum bilis, interdum succus Pancreaticus. Rugæ sæpè nimis laxæ, orificium ventriculi non claudunt, interdum excoriantur. Pancreas aliquando patitur abscessum, imo & ipse Stomachus, licet rarissimè; interdum inflammatur Hepar vel Diaphragma.

IV. *Differentiæ*. Vomitus aut Idiopathicus est aut Sympatheticus; ex morbo oriundus vel ex causis externis. Criticus vel Symptomaticus.

V. *Signa Diagnostica* per se patent. Causarum signa ex Auctoribus sunt petenda, ipsisve suprà infraque descriptis vel describendis morbis. Hæc saltem addo, excoriationem, ulcusve semper comitem habere singultum; idem fit si Hepar inflammetur. Rugæ laxæ appetitum totum dejiciunt, ventriculusque inde frigidior calidiora amat ferè omnia. Bilis suâ se prodit amaritudine, succus Pancreaticus, aciditate.

VI. *Prognostica*. Vomitus criticus bonus, ut & ille qui fit à repletionem. Symptomaticus semper malus; præsertim qui causatur à

partium vicinarum inflammatione, venenis, excoriatione, ulcere.

VII. *Indicationes Curativæ.* Vomitus criticus non est compescendus; Symptomaticus quamprimum fieri potest. Pituita tenax incidenda, reliqui humores evacuandi, idque leniter.

VIII. *Curatio.* Vomitus nimio conveniunt purgantia, & revellentia, Clysteres, puta, suppositoria, artuum frictiones, ut & calefactiones. Ventriculo ipso Topica imponantur. Venæsectio in partium inflammatione necessario instituenda; cætera nocet.

Medicamenta Stomachica.

Rad. Cyperi, Calam. arom. Galangæ, Chinæ, Zedoariæ, Cichorii. Fol. abſinth. Calamenthæ, Lauri, Majoranæ, melissæ, menthæ, salviæ; Acetosæ, portulacæ, Taraxici. Flor. rosar. balauftior. Sem. anethi, anisi, fœniculi, cumini, levistici, cardamomi, coriandri, citri, frigida 4 majora & minora. Garryophylli, cinnamomum, piper, zinziber. Lignum Guajacum, sassafras. Aloë. Vina omnis generis & nominis, & ex illis præparati Spiritus & aceta. Aq. Anhaltina, Imperialis, Quercetani, Sennerti. Elix. citr. Aq. vitæ Mathioli, Anisi &c. Syr. cinamomi; Rob. berberorum Ribiumque, Caro Cydoneorum. Ol. destillata menthæ, majoranæ, rorismarini,

rini, succini. Conserva Menthæ, ros. rubra-
rum. Antidotus Stomachica Querc. Diascor-
dium. Sal. absinthii, Tart. vitriolat. Spec.
aromatic. rosat. diatrion pipereon, diarrho-
donis. Pil. Aloëphanginæ, Mastichinæ, Asai-
rel Avicennæ, Cochix.

Formulæ Medicamentorum Purgantium
in Pituita crassa :

℞. Resinæ Agaric. gr. iiij.
Extract. catholic. gr. xij.
Tartar. vitriolat. gr. iij.
Ol. rorismarin. g. ij.

MS. F. Pilulæ No. iiij. De-
rent.

Vel

℞. Sal. absinth. scrup. j.
Tart. vitriolat. gr. vj.
Troch. alhand. gr. j.
Sachar. alb. scrup. ij.

MS. F. Pulvis.

In Inflammationibus & acredine humo-
rum :

℞. Succı taraxic. depurat.
Syr. de Cichor. cum Rheo,
Ros. sol. cum fenn. an. unc. j.
Crem. Tart. scrup. j.
Aq. borrag. q. f.

MS. F. Haustus.

Vel

℞. Mannæ Calabrinæ unc. j. f.

D 4

Crem.

Crem. Tartar. drach. f.

MS. & dissolvantur in Iusculo vel
Cerevisia calidè.

Formulæ Medicamentorum Præparan-
tium in Pituita crassa.

℞. Sal. Ammoniac. scrup. j.

Card. bened. scrup. f.

Tart. vitr. gr. v.

MS. F. Pulvis.

Vel

℞. Spir. Salis dulcis unc. f.

Detur in Phiala.

Utatur quotiescunque bibit guttas 8 vel
10 in potu assueto.

In excoriatione tunicæ interioris Ventricu-
li vel Inflammationibus partium singultuque.

℞. Mucilag. semin. psyllii,

Cydoneor.

Gumm. Tragac. aq. ros. extr.
an. unc. f.

Syr. Violar.

Rosar. fol. simpl. an. unc. j.

MS. F. Linctus.

Vrgente dolore :

℞. Specier. aromat. ros. gr. viij.

Laud. opiat. gr. j.

MS. F. Pulvis. detur bis de die in
Iusculo.

Emulsiones vulgares hic benè quoque au-
diunt.

Medi-

Medicamenta Topica.

℞. Specier. aromaticar. rosat.

Mastiches elect.

Ol. nucist. express. an. drach. j.

macis stillatit.

Citr. an. scrup. f.

Gummi Carannæ q. f.

MS. F. f. a. Emplastrum stomacho
imponendum.

Vel

℞. Ol. menthæ drach. f.

Carui destillat. scrup. j.

Nucistæ express. drach. ij.

MS.

Inungatur hisce oleis bis de die Ventri-
culus.

I X. *Observationes.* 1. David de Potter, Mer-
cator & Antistes, quinquagenarius assumpserat
loco balsami Sulphuris, Oleum vitrioli. Vnde
Oesophagus & Ventriculus cum suo orificio
excoriatus in causa fuit, ut dies noctesque
vexaretur molestissimo singultu. Perfectissi-
mè tamen, idque brevi est curatus suprascri-
ptis medicamentis, tam laxantibus, quam al-
terantibus. Optimè quoque habuit ab hac
mixturâ :

℞. Succu semperviv. maj. depurat. unc. j.

Aq. rosac. plantag. an. unc. ij.

Vitell. Ovi No. j.

D 5

Syr.

Syr. de portulac. unc. j.

Laud. opiat. gr. ij.

MS. bibat cochleatim.

2. Sartor quidam in plateâ dicta regia, nihil retinebat assumptorum ciborum potuumve, evomebat vero continuò pituitam vel Lympham quandam crassam. Vñsus sum propter affectus violentiam urgentemque necessitatem omnis generis medicamentis, tam internis, quam externis; sed evanido eventu, brevi enim periit. Aperto cadavere reperi Pancreas totum corruptum, imò Sphacelatum.

C A P. III. *De Scorbuto & Affectione Hypochondriaca, malè vulgò dicta Hysterica.*

I. **S** Corbutus & prava totius corporis nutritio, ejusque mater affectio Hypochondriaca.

II. *Pars affecta* non est Lien, imò nec propriè, in consensum licet tractum Hepar; sed Ventriculus, & Glandulæ mesenterii tam conglobatæ lactææ, quam conglomerata Pancreatica.

III. Causa est Pituita vel Lympha crassa Ventriculum & modo dictas glandulas obfident. Succus item Pancreaticus, unde Chylus indies depravatur.

IV. *Diffe-*

IV. *Differentiæ.* Scorbuti quidem ab Auctoribus variæ dantur differentiæ, quarum præcipua, quod hunc calidum, illum vocent frigidum. Sed reverà omnis provenit ab unica causa, Lympha vel pituita nempe crassa; propter quam chylus glandulas lacteas non nisi serosiore sua parte potest transire; hinc tot Symptomata, pro temperamentorum & locorum diversitate. Bilem tamen, sed itidem crassiozem, si quis addere voluerit, illi non contradicam.

V. *Signa Diagnostica* benè multa sunt, sed nunquam illa omnia vidi concurrere in uno eodemque corpore. Conqueruntur Scorbutici de dolore interdum punctorio, plerumque gravativo capitis; de cordis palpitatione, angustia; inflatione ventriculi, tensione ventris, præcipuè in latere sinistro; Tussunt, putant se interdum suffocari, difficulter respirant, vomunt, febricitant; Appetitum prostratum excitatum vellent. Singultu, Ructibus, Flatibus, convulsionibus vexantur. Tremunt, lassi sunt artus, maculisque rubris vel purpureis aspersi. Valdè sunt melancholici.

VI. *Prognostica.* Curatur quidem difficulter; difficilis enim morbus est, curatur tamen indies. Hisce regionibus adeò familiaris est, ut nullus ferè reperiatur morbus cui non aliquid scorbutici subfit. Pulsus debilis non æquè, ac in aliis quibusdam affectibus, periculosus

culosus est; simplices enim vapores flatusve illum causant. Exactissima diæta Medicamentis præstat, sine qua sensim fiunt incurabiles. Dysenteriâ rarissimè laborant, plerumque Diarrhæâ vel Lienteriâ, quæ difficulter curantur, & longo temporis tractu ægros necat, sequitur enim illas vel Hydrops vel Tabes. Respiratio difficilis non tam periculosum malum est quam vulgò putatur, æquè enim ac palpitatio cordis provenit non nisi à vaporibus. Maculas non multi facio, nisi degeneraverint in ulcera, vel elevatæ sint. Tumores partium externarum paralyfin minantur, proveniuntque à circulatione Lymphæ impedita.

V I. *Indicationes curativæ.* Partium læsarum minor habenda ratio, quam peccantium humorum; hisce enim plus gravantur quam supprimuntur. Humores crassi incidendi & postea iteratis vicibus evacuandi.

V II. *Curatio.* Venæsectio non prodest, hæmorrhoides interdum; quæ si assuetis supprimantur sunt aperiendæ. Purgantia fortiora hisce ægris semper noxia observavimus; sufficient suo tempore leniora. Præparandi verò humores incidentibus, inter quæ salia volatilia quæcunque primarium obtinent locum. Enemata conveniunt interdum.

Medicamenta Anti-Scorbutica.

Radic. Raphani, Armoraciæ, 5 aperitivæ,
Petasitidis, Scorzonæræ. Fol. becabungæ,
Nasturtii aquatici, Trifolii, Cochleariæ,
Acetosæ, Virgæ aureæ, Scordii. Malum
Arantiorum acidorum, Poma Citri. Bacca
Juniperi. Gummi Ammoniacum. Cremor
Tartari; Chalybs præparat. Aqua Anti-Scor-
butica Mynsichti. Spirit. Cochleariæ per se
præparat. Salis rectificati, dulcis &c. Sul-
phuris, Tartari, vitrioli, Vrinæ, Ammoniaci.
Electuarium Anti-Scorb. Schrœderi.

Formulæ Medicamentorum Purgantium.

℞. Extr. rhei,

Catholic. an. gr. v.

Refinæ Ialapp.

Agaric. an. gr. iij.

Sal. Ammoniac. gr. iiij.

Ol. Succin. g. j.

MS. F. Pil. N^o. v. deaurentur.

Vel

℞. Crem. Tart.

Sal. prunellæ,

Absinth. an. scrup. f.

Tart. vitr.

Diagrid. an. gr. vj.

MS. F. Pulvis.

Formulæ Medicamentorū Præparantium.

℞. Oc. Cancr. præparat. drach. j.

Tart.

Tart. vitr.

Sal. prunellæ drach. f.

Conf. Alkermes incompletæ drach. j. f.

Sachar. alb. unc. ij.

MS. F. f. a. Trochisci.

Vel

℞. Rad. Raphan. drach. iij.

Filicis unc. j.

Fol. Becabung.

Nasturt. aq.

Cochlear. an. P. j.

Tamarindor. unc. j.

Sem. apii drach. j. f.

Coq. ex Aq. hordei vel Vino Rhenano in
Colaturæ unc. xxiv.

Dissolve

Syr. 5. radic. unc. ij. Addendo

Spir. Vitriol. gutt. viij.

MS. F. Apozema.

Spiritus Salis dulcis, Ammoniaci, Cochleariæ, omnibus reliquis præstant Medicamentis.

IX. Observationes. 1. Jonathan Syndorp, Juvenis triginta plus annorum, nec per cubiculum meare, nec pedibus incedere valens, simplici hoc utitur medicamento:

℞. Rad. Armoraciæ unc. iij.

Coq. ex fero lactis,

Colaturæ lib. ij. dentur usui.

MS.

Septimo post die , pro suavi cura , in ædi-
bus meis gratas mihi egit gratias.

2. H. V. B. Mercator dives , urbanus ,
pius , maculas lividas copiosè videns in bra-
chiis & pedibus , auxilium meum implorat ,
sibi metuens à nescio qua malignitate. Istæ
maculæ valdè erant elatæ, imò pustulis proxi-
mæ. Spiritu Salis Ammoniaci paucas intra
septimanas perfectissimè curatus est ; obser-
vabat autem exactam diætam.

C A P. I V. De Hydrope.

I. **H**ydrops est Collectio Præternatura-
lis Lymphæ serosioris.

II. *Pars affecta* est Abdomen
& sæpe totum Corpus , omnesque ejus par-
tes.

III. *Causa proxima* est Lympha serosior,
quæ tenellula sua vasa erodens, & sic extrava-
sata gravissimum hunc morbum ægris infert.
Remotæ causæ variæ sunt , ut apud auctores
est videre.

IV. *Differentiæ*. Optimè ab Auctoribus
dividitur Hydrops in tres species ; 1. *Ascitem*
in qua totus venter , interdum & pedes tu-
ment : 2. *Tympanitidem* flatuosam : 3. *Ana-
sarcam*, ubi totum corpus tumet.

V. *Signa Diagnostica*. Tumet vel venter ,
vel pedes , vel facies tunc pallida , vel totum
cor-

corpus : in foeminis Ventr̃is Tumor accuratē distinguendus & examinandus.

V I. *Prognostica.* Ab initio facillē curatur, & non observatā diætā facillē redit. Cachectici rarissimē perfectam adipiscuntur sanitatem. Infantes Anasarcā laborantes sæpē facillē negotio curavi.

V II. *Indicationes Curativæ.* Venæsectiōnem hydropicis omnibus noxiam expertus dico. Lympha ferosior temperanda ; quod fieri non potest nisi pituita viscidior incidatur. Postmodum per Epicrasin evacuandus. Sudores movendi pro viribus. Posset Vomitus hic fortē convenire, sed metuo ejus violentiam ; non etenim solum assumpto Medicamento ventriculum turbat, ægrumque reddit anxium ; sed & illum, scilicet ventriculum, ita debilitat ut nunquam postea cibos pro voto ægri concoquat, quod sæpius observavi. Utatur quisque hic suo sensu, ego illum nec amo nec instituo.

V III. *Curatio.* Quotquot Hydropicorum sunt curati, plerumque factum tribus hisce medicamentis, observatā scilicet diætā, 1. Per Epicrasin purgantibus, quibus necessario misceri debent corroborantia. 2. Sudoriferis. 3. Paracentesi, novo quod in Chirurgia me descripsi instrumento, instituendā.

Medicamenta contrà Hydropem.

Rad. Ireos nostrat. ʒ. aperitivæ, Vincetoxici. Fol. Genistæ, Imperatoriæ, Agrimonix. Gummi Gotte. Asarum. Flores Cortexque medius Sambuci. Lixivium benedictum & diureticum Mynsichti, ejusdemque Aqua anti-hydropica. Spiritus aperitivus Penoti. Decoctum Chinæ, Salsæ, Guajaci. Essentia Martis aperitiva. Spiritus Salis, Sulphuris. Fœculæ Aronis. Sal. absinthii, saliaque omnia volatilia. Cineres bufonum; concharum Ostrearum, Pulvis mandibularum lucii piscis.

Purgans :

℞. Rad. Ireos nostrat. unc. j. ʒ.

Petroselin. unc. ʒ.

Fol. Agrimon. M. j.

Sennæ mund. unc. j.

Rhei elect. unc. ʒ.

Agaric. leviss. drach. iij.

Cinamom. acut. drach. ij.

Garyophyllor. drach. j.

MS. F. Nodulus infundendus in
Vini Gallici vel Rhenani genero-
fioris lib. iiij.

Bibat ejus singulis manè frigidè Vncias
quinque vel sex. Gratum est Medicamentum,
gratiusque reddi potest Sacharo.

Sudoriferum :

℞. Rad. Ireos Florentin. unc. j.

E

Rad.

Rad. Salsæ parillæ,

Chinæ an. unc. iij.

Lign. Guajac. lib. j. f.

Infusa tepidè in f. q. aq. communis horis
24 coquantur parum, & Colatura evaporetur
lento igne ad unc. iij. quæ rursus dissolvam-
tur in

Aq. petroselin. unc. xvj.

Elix. citr. ex descript. Ang. Salæ lib. jj

Filtrentur per Manicam Hippocratis

Addendo Colaturæ

Iulapii rosacei q. f. ad mediocrem edul-
corationem.

MS.

Dosis bis de die unc. f. frigidè.

Paracentesis, prout illam institutam volco
typis Belgicis descripta est in mea Chirurgia

IX. *Observationes.* 1. Pauperrimæ cujus-
dam feminæ plusquam quinquagenariæ cap-
daver hydropicum dissecuri præsentibus ma-
gno Anatomico Fr. Sylvio, Fr. Verschageer
felici Practico, variisque Chirurgis. Incum-
dum mihi erat in abdomine videre primò
Lympham tenuem & fluidam, deinde gelatili-
nam, tertio concretam, tandem duram &
Steatomaticam. Licebat enim mihi certius
judicare de Hydropis vera causa. Plures ta-
les tibi describere possum observationes; uni-
ca enim nec mihi nec tibi sufficit, sed illas
alibi.

2. Oenoco-

2. Oenopola Iohannes la Four Hydropicus, postquam multis usus fuisset medicamentis & se morituum prævideret, ultimum tentari voluit remedium, puta paracentesin. Instituímus illam nostro modo, & per multos dies inde levatus, se ferè putabat sanum, sed nihilominus obiit. Non licuit nobis abdomen aperire; quod dolebam: procul dubio enim crassior Lymphæ pars ibi relicta mortis ejus fuit causa. Multi curari possent, si citius Paracentesin admitterent.

Hoc modo omnes morbos Hepatis & Lienis curabiles ex causâ frigidâ oriundos poteris curare; de causâ calida supra scripsi.

C A P. V. De Dysenteria.

I. **D**ysenteria est cruentus & interdum purulentus alvi fluxus, cum tunica vel tunicarum intestinalium erosione.

II. *Partes affectæ* sunt intestina tam tenuia quam crassa. Ventriculus sæpè in consensum trahitur, imò fluxui ansam dat.

III. *Causæ* sunt bilis acrior, & succus Pancreaticus acidior.

IV. *Differentiæ*. Interdum unica saltem tunica est erosa, interdum omnes. Interdum sanguis purus effluit, interdum concretus vel purulentus; sed hic dantur gradus.

V. *Signa Diagnostica* ex differentiis pendenda.

VI. *Prognostica*. Ulcus profundum difficilimè curatur, curabile tamen est. Interioris tunicæ simplex erosio, cæteris paribus, ferè semper & facilimè admittit curam.

VII. *Indicationes Curativæ*. Dysenteria, quæ Dysenteria, Venæsectionem nunquam indicat. Humor peccans temperandus & evacuandus; sic optimè roborantur partes.

VIII. *Curatio*. In tanto hoc morbo vix pluribus, quam tribus utor medicamentis; purgantibus, alterantibus, Topicis, illisque in parvâ quantitate; copiam enim vel potus, vel ciborum, vel medicamentorum vix unquam tales ferunt ægri.

Medicamenta Anti-Dysenterica.

Radices bistortæ, tormentillæ, plantaginis, verbasci, symphyti majoris. Folia bursæ pastoris, Equiseti, Myrti, Quercus, Saniculæ. Flor. balaustræ, flor. ros. rubrarum. Semina papaveris; sophiæ Chirurgorum; Baccæ myrti. Mespila. Nuces cupressi, moschata. Lignum santalum. Acacia, Hypocyttis; Sanguis draconis, ejusque imprimis Lachrymæ, Mastyx, Tragacantha. Coagulum sanguinis leporini. Cornu Cervi. Cochleæ ostrearum calcinata; Ossa bovina itidem calcinata. Bolus Armena, Corallia, Margaritæ. Lapis hæma-

hæmatites, Terra figillata. Succus agrestæ, granatorum, cydoniorum. Vinum rubrum stipticum, sed non dulce. Syrupus cinamomi, de mentha, myrtinus, granatorum. Miva Cydoniorum. Narcotica omnia.

℞. Lachrymarum Sanguinis draconis, gr. xxv.

Aq. menthæ unc. j.

Plantagin. unc. ij. f.

Cinamom. unc. f.

Syr. de Symphyt. Fern. unc. j.

Laudan. opiat. gr. ij.

MS. bibat cochleatim.

Vel

℞. Conserv. rosar. rubrar.

Menthæ an. unc. j.

Cortic. Arant. condit. drach. vj.

Off. bovinor. calcinator. drach. j. f.

Corall. rubr. præparat. drach. j.

Diafscord. Frac. drach. ij.

Succi Acaciæ scrup. ij.

Syr. myrtin. par.

MS. F. Conditum molle.

Sumat ejus æger sæpè drach. j.

Vel

℞. Laud. opiat. gr. iij.

F. Pilulæ N^o. vj.

Deaurentur.

Vnicâ singulis utatur horis, donec cesset fluxus.

Topica.

- ℞. Therebinth. Argentinensis cum Vitello
 ovi dissolutæ drach. ij.
 Pulv. rosar. rubr. scrup. j.
 Diascord. Fracast. drach. j. f.
 Lactis Vaccini unc. viij.

MS. F. Enema ; ter interdum de
 die reïterandum.

- ℞. Ol. nucist. express. drach. j. f.
 Macis stillatit. scrup. j.
 Sem. papaver.
 Hyoscyam.
 Myrtillor. an. unc. f.

MS. F. Linimentum Epigastrico
 inungendum.

Vbi purgandum :

- ℞. Pulv. rhei elect. scrup. ij. vel drach. j.
 Notum quidem , sed optimum tutum
 que hisce in oris est Medicamentum.
 Regionibus calidioribus minus faret.

Vel

- ℞. Extract. Rhei gr. xvj.
 Laud. op. gr. j.
 Ol. menthæ g. j.
 MS. F. Pilulæ N°. iiij.

Deaurentur.

IX. *Observationes.* 1. Obstetrix charæ mihi
 uxoris quinquagenaria non usa est nisi semeel
 pulvere rhabarbari ; sæpe verò pilulis ex lau-
 dano opiato, ut & Enemate suprascripto. In-

trah

trà dies 14 perfectissimè curata est. Febricitabat interim continuò , & plus quam vigesies quotidie dejiciebat tam pus , quam sanguinem. Sanguinea autem est & erat.

2. Ancilla Capitanei N. N. Plethorica , sexaginta quotidie habebat sedes cruentas. Vsa est iisdem Medicamentis , & duodecimo post die sana rerum domesticarum habuit curam.

3. Filius viduæ van Asperen, assuetus bibere Spiritum vini, patiebatur dysenteriam summo cum dolore : rejiciebat sanguinem concretum pulcherrimi coloris, id est arteriosum, eumque sæpè ad librarum duarum pondus. Aperto cadavere reperi intestina tenuia hæc illac sphacela , tunicas erosas & in 4. locis perforatas.

C A P. V I. *De fluxu Hepatico.*

I. **F**luxum Hepaticum vix nomino , quia falsus est, deceptique, prout illum describere , veteres. Nihil enim aliud est quam apertio arteriarum splenicarum , id est mihi, hæmorrhoidalium superiorum.

II. In regionibus frigidis rarò periculosus, in calidis semper.

III. *Curatur* medicamentis Anti-Dysentericis.

IV. *Observatio.* D. Iohannes Provoost, vir
E 4 probus

probus & honestus, nunc Mercator, antea Machaonis filius, patiebatur sanguinis copiosum fluxum; dolebat illi regio umbilicalis aliquo modo. Præscripti ipsi mixturam narcoticam; deinde haustulum hunc laxantem:

℞. Rhei elect. drach. ij. f.

Sem. anis. scrup. j.

Coq. ex aq. borrag. in Col. unc. ij. ff.

Dissolve

Syr. ros. sol. cum Senna unc. j.

MS. F. Haustus.

Tres intra dies melius habuit, & multis abhinc annis alacriter vixit vivitque.

C A P. V I I. De Ileo.

I. **I**leos est retentio Chyli & fæcum in intestinis tam tenuibus quam crassis.

II. *Partes affectas dixi.*

III. *Causa* ferè semper bilis est, quæ nunc acrior dolorem causat atque inflammationem motumque intestinorum inversum; nunc crassior alvum non movet, unde fæces induratæ.

IV. *Differentiæ.* Hic provenit ab Inflammatione; ille à fæcibus induratis; tertius à motu intestinorum inverso.

V. *Signa Diagnostica.* Inflammationis signa sunt febris continua, Vomitus, Calor circæ umbilicum, dejectio nulla: *Excrementorum induratorum*; Ventris dolor gravativus; vo-

mitus

mitus minus frequens, præsertim ab initio; anxietas præcordiorum; febris mitior, excretio nulla. *Motus intestinorum inversi*; Vomitus continuus assumptorum ciborum, potuum, medicamentorum, imò Enematum, suppositoriorum, fæcum.

V I. Omnis Ileos periculosus morbus est, sed à fæcibus causatus induratis, reliquis curatu facilior.

V II. *Indicationes Curativæ.* Dolor mitigandus, sed narcoticis nequaquam; nisi forte in inflammatione, quæ melius corrigitur refrigerantibus & sudoriferis. Intestina inversa pristino loco restituenda. Fæces induratæ emolliendæ, & quamprimum fieri potest educendæ.

V III. *Curatio.* In inflammatione prodest Venæsectio, cæterà summè nocet. In fæcibus induratis vix novi morbum qui fortiora fert purgantia. Profunt inunctiones, balnea. In motu intestinorum inverso hæc eadem conveniunt medicamenta. Cucurbitulæ magnæ non scarificatæ umbilico impositæ quibusdam dicuntur profecisse. Non audeo hic de sectione, quæ multos forsitan salvaret, loqui. Clysteres ubique profunt.

Intestinis inflammatis :

℞. Fol. Semperviv. major.

Taraxici an. P. ij.

Tartar. rhenan. drach. v.

E 5

Tama-

Tamarindor. unc. j.
Sem. melon. drach. iij.

Coq. ex aq. hord. in Colatur. lib. j. f.

Dissolve

Syr. ros. fol. simpl. unc. ij. f.

MS.

Vel

℞. Aq. prophylactic. unc. j. f. rosac. unc. f.
Card. bened. unc. iij. f.

Succ. semperviv. maj. depurat. unc. j.

Bezoardic. miner. scrup. j.

Syr. de portulac. drach. xij.

MS. bibat cochleatim, sudetque.

Fæcibus induratis :

℞. Trochiscor. alhand. gr. iij.

Diagrid. gr. xv.

Tart. vitriolat. gr. vj.

Sal. prunell.

Crem. Tart. an. scrup. j.

MS. F. Pulvis pro una dosi.

Vel

℞. Rad. Althææ unc. j.

Fol. Malvæ M. j.

Sennæ drach. x.

Agaric. trochiscat.

Rhei elect. an. unc. f.

Tamarindor.

Tartar. crud. an. drach. vj.

Sem. lini drach. ij.

Coq. ex aq. hordei, in Colaturæ unc. xxv.

Dif-

Dissolve

Syr. Diacnic. unc. j. f.

El. è succo rosar. drach. vj.

MS. F. Apozema.

Bibat æger singulis bihoriis Vncias sex, donec alvus responderit. Interim assumat jura pingua, inungaturque venter Vnguentis vel oleis emollientibus; Althææ scilicet, de mucilaginibus, &c.

Pilulæ Iliacæ Rhafis, quarum descriptio ex Valerio Cordo & Dodonæo legere est, magnæ hic sunt efficacisë.

Iisdem medicamentis curatur Volvulus, id est, motus intestinorum inversus; præterquam globuli plumbei, argentei, aurei, laborantibus ore deglutiendi exhibentur.

IX. *Observationes.* Honeſta Matrona N. le Roux sanguinea, & plus quam quinquaginta annos nata, Groeningam inter & Amſtelodamum procellis agitata, ſeptem integris diebus nihil dejecerat. Domum reverſa petiit à me purgans, quod præſcripſi, præeunte Clyſtere; ſed vomitu rejecit purgans, nihilque effecit enema. Altero, octavo nempe die ſubſequentibusque, varia aſſumpſit medicamenta per Epicraſin purgantia, eaque fortiora; ſed trifti eventu. Morbi vigefimo primo die, dicebat inteſtinum aliquod crepaſſe, mens nihilominus optimè conſtabat. Vigefimo ſecundo fatiſ ceſſit. Vigefimo tertio diſſecui cadaver,

daver, nec quicquam vel circà ventriculum vel in intestinis tenuibus poteram reperire,, quod morbi causam indicaret, & mirabar. Cum obstetricis præsens ergo uterum voverim explorare, vidi intestinum colon non procul ab intestino recto sphacelatum tunicasque disruptas.

2. Pauperrimus quidam Walo morbo hoc. Miserere mei dicto, summo cum dolore perijt. Aperto cadavere septem diversis in locis intestinum ileon vidimus ita convolutum, ut cibis, potui, fæcibus, omnis necesse fuerit denegari transitus.

3. Vxor Mercatoris N. Muys à fæcibus induratis undecim continuis diebus alvum habebat adstrictam; purgavi illam supra dicto Apozemate, & illo ipso die est curata. Idem evenit virgini cuidam, quæ frustula aliquot panni deglutiverat. Laborabat menstruorum suppressione.

C A P. VIII. De dolore Nephritico.

I. **D**olor Nephriticus est solutio continui renum membranarum.

II. *Partes affectæ* sunt membranæ in consensum trahentes totam substantiam renum, tubercula, pelvim, ureteres & vesicam, imò ventriculum & intestina.

III. *Causa* est Lympha acrior & serosior, inter-

interdum crassior, exque illâ causatus sæpè calculus: nihil enim in tota rerum natura facilius concrescit, quam materia serosa, id est, salina.

IV. *Differentiæ.* Nunc provenit à Lymphâ acriore, nunc à calculo.

V. *Signa Diagnostica.* Calculum à Lymphâ distinguere vel experientissimo Practico difficile est, signa enim sibi valdè sunt similia. Conqueruntur de lumborum dolore & ardore, vomunt crassa & biliosa si ventriculus male sit constitutus; si benè, nauseam patiuntur & inanes evomendi conatus, quod notandum. Plerumque illum comitatur Colica Passio, quam Galli *Colique Gravelense* vocant. Sæpè mingunt urinam cruentam, æstate præsertim, vel post motum vehementiorem: quidam non nisi guttatim mingunt, quibusdam urina est suppressa.

VI. *Prognostica.* Dolor nephriticus à calculo difficilior est curatu, quam qui provenit à Lymphâ acriori. Urinam cruentam si mingant, timent quidem sibi & debilitantur, sed levantur. Urina crassa melior est tenui. Hæreditarius vix curatur; in senibus difficulter, in infantibus faciliè curationem admittit ille, qui ulcere renum caret.

VII. *Indicationes Curativæ.* Dolor mitigandus; Lymphâ serosior temperanda; crassior incidenda; calculus si sit friabilis, comminuen-

minuendus est & expellendus ; magnus norm
movendus.

VIII. *Curatio.* Corpus cacochymicum
purgetur. Venæsectio in dolore à Lymphaa
acriore oriundo mirè convenit , præsertim in
Plethoricis. Alterantibus & narcoticis plus
profeci quam ullis aliis medicamentis. Cly
steres optimè hic audiunt. Diæta sit exacta.

Medicamenta Anti-Nephritica.

Rad. Ireos , Eringii , graminis , liquiritiæ
ononidis , petroselini , filipendulæ , Althææ
Fol. Malvæ, Capillorum Ven. Cerefolii, pet
troselini , Chamædreos , Chamæpiteos, levii
stici , nasturtii , saxifragiæ , Sabinæ , Virgæ
aureæ. Schœnantum , Spica. Flores Sam
buci. Lupulus. Semina 4 frigida majora
papaveris , milii solis , anisi , fœniculi , dauci
ci , carui , seseleos. Fructus Alkekengi. Fra
ga. Ficus. Hordeum. Lignum Heracleotis
cum , Nephriticum , Guajacum , Sassafras
Cassia lignea , Cinamomum. Therebinthi
na. Balsamus Sulphuris , simplex & anisat
tus vel juniperinus. Copayvæ. Serum lactis
Dens apri. Lumbrici terrestres. Tartarum
ex illoque composita omnia. Aquæ thermæ
les. Oculi cancri. Aquæ ex herbis supradictis
destillatæ. Spiritus salis dulcis, ut & rectificat
ti, Vitrioli, Sulphuris, Tartari , Ammoniacci
Tinctura Nephritica Mynsichti. Syr. althææ

Ferr

Fernel. papaveris albi & erratici, diacodii, by-
zantinus, 5 radicum. Oxy-mel diureticum
Querc. Oleum amygdalarum dulcium, anisi
succini, therebinthinæ. Antidota Nephritica
Querc. Electuarium Montagnanæ. Mandibu-
læ lucii piscis. Conchæ ostrearum calcinatæ.
Sal. Succini, fraxini, stipitum fabarum, testa-
rum ovorum.

In causa temperamentisque Calidis.

℞. Rad. althææ unc. j.

Liquiritiæ drach. ij.

Fol. malvæ M. j.

Sem. melon. unc. f.

Coq. ex aq. hordei in Colat. lib. ij.

Dissolve

Syr. papaver. errat. unc. ij.

Oc. Cancr. crud. contus. drach. j.

MS. bibat ter quaterve de die Vn-
cias sex.

Vel

℞. Aq. fragariæ,

Portulacæ,

Rosacæ an. unc. j.

Prophylact.

Cinam. an. unc. f.

Oc. Cancr. crud. contus. scrup. j.

Laud. op. gr. ij.

Syr. Althææ Fernel. unc. j.

MS. bibat cochleatim.

In causa temperamentisq[ue] frigidis.

Nihil præstantius est Spiritu nostro Antinephritico, cujus tibi hancce descriptionem:

℞. Radic. Ononid.

Saxifrag. alb. an. unc. j.

Liquirit. unc. f.

Sang. hirci drach. vj.

Oc. Cancr. contusor.

Nucis moschatae,

Cinamom. an. unc. j.

Croc. Oriental. drach. iij.

Garyophyllor. drach. ij.

Therebinth. Argentinensis unc. xvj.

Spiritus Vini Malvatici lib. v.

Concisa & Contusa stent in infusione per 14 dies; postea per B. M. destillantur.

Dosis cochleare unum vel alterum jejuno stomacho bis terve de die pro necessitate.

Delicioribus temperatur Aq. petroselinii vel graminis, additurque saccharum.

In omnimoda urinæ suppressione testæ ovarum calcinatae ad scrup. ij. vel drach. j. assumptæ omnia reliqua medicamenta præcedunt. Cochenilia Tinctorum, ex India Occidentali, in Vino Rhenano assumpta ad scrup. j. mite quidem & suave est medicamentum, sed magnæ efficaciae.

IX. *Observationes.* Iohannes Dailly, Mercator & Ecclesiæ Gallicanæ Amstelodamen-

fiss

ſ. Antistes , vir probitate ſuâ omnibus notus
charuſque , minxerat per aliquot menſes no-
ctu diuque urinam cruentam , purulentam ,
foetidiffimam. Calculos varios quos ejece-
rat , ſervabat ſibi. Non potêrat tanto tem-
poris ſpatio per quadrantem horæ dormire.
Cum vocarer alvus ipſi biduo adſtricta erat.
Præſcripſi illi hoc lene laxans :

℞. Syr. de Cichor. cum Rheo;
Roſ. ſol. cum Senna,
Diacnic. an. unc. j.
Oc. Cancr. præparat. ſcrup. j.
Aq. graminis q. ſ.
MS. F. Hauſtus.

Quater inde dejecit cum euphoria. Altero
die , pluribuſque ſequentibus uſus eſt ſummo
cum ſucceſſu Decocto Malvæ ſupraſcripto ,
ut & mixturâ anti-nephriticâ ex laudano
opiato. Tandem bis quotidie aſſumebat Bal-
ſamum Sulphuris aniſatum ad gutt. 8; & ple-
niſſimè curatus eſt.

2. Mr. Gaillard moribundus iiſdem medi-
camentis convaluit , poſtquam à circumfora-
neis quibuſdam miſerrimè vexatus , nihil niſi
foetidum pus per urinam ejeciſſet.

3. Pauperrimus quidam Vir triginta per
annos, ut ex ipſius ore hauſimus , laboraverat
dolore nephritico & dyſuriâ. Obiit. Diſſe-
cui cadaver , reperique renis ſiniſtri ſubſtan-
tiam totam conſumptam , ita ut præter mem-
branam

branam nihil superfuerit, sed solito, ut solet longè fuit crassior.

Dolor Colicus tam ex præcedenti, quam hoc ex capite curari potest, ideoque illum nunc, aliàs hoc forsitan facturum, non describo; nam mihi nunc tempus frustra terere videbor.

C A P. IX. *De Vteri suffocatione.*

VTeri suffocatio, falsò hoc nomine insignita, curatur anti-scorbuticis; legatur Caput suprà scriptum de Scorbuto, doctissimusque Higmoreus, ut & caput brevi sequens de Mensium suppressione.

C A P. X. *De Hernia Vterina.*

Herniam Vterinam methodo mihi usitata describere non possum, quia falsissimè ab antiquis est descripta, quod non lubens scribo; interim bono publico est consulendum. Hoc errore illos notare cogor vel invitus, quod Herniam Vteri iudicaverint, quæ hernia uteri nunquam fuit: hoc enim ferè nunquam, rarissimè certè accidit, quod antehac in Chirurgia mea monui. Hernia vulgò vocata uterina, nihil aliud est quam relaxatio anterioris Vulvæ tunicæ. Rugosa est hæc tunica non solum ut penem amplectatur,

tur , & melius semen deferat ad uterum ; sed etiam ut partus tempore , onere suo citius liberet infantem, quod apprimè notandum.

Facile ab initio curatur adstringentibus, & Gangræna si metuatur , excindi potest sine vitæ periculo,metuve hæmorrhagiæ. En paucis totam ejus curam.

Aliud hic notatu dignissimum est observandum, quod à Rusticis Belgicis , suis trimestribus totus uterus excindatur , facta apertione in latere sinistro , & ligatis venis arteriisque eodem modo ut solemus nos canibus eximere lienem. Iucundum est videre quod canes exempto splene statim currant , vulnus lambant, bibantque lac vel quam illis præponimus aquam. Sex illorum huc usque dissecuimus , sed non nisi primus mortuus est , idque nostrâ imperitiâ ; reliqui æquè voraces sunt curruntque , ac si liene non carerent. Quod de suis supra dixi , plus quam semel vidi. Faciunt id rustici ne concipiant & sic obefiores fiant. Sic felibus aliisque bestiis eximuntur testes.

C A P. X I. *De mensium suppressione.*

I. **M**ensium suppressio est fluxus menstruorum impeditus.

II. *Pars affecta* quidem uterus est , Ventriculus autem non solum in consen-

sum trahitur, sed quantum ego observavi, primaria defectus illarum origo.

III. *Causa* est humor crassus viscidusque à Ventriculo ad partes vasaque teneriora delatus, & sic naturalem fluxum suppressens. Possunt & menstrua suppressi ab inanitione & defectu sanguinis; sed & hic defectus provenit à viscido illo tenacique humore, Chylificationem & sanguificationem depravante. suppressuntur itidem ab uteri clausura.

IV. *Differentia*. Hæc provenit à vasorum angustia; illa ab humore crasso; tertia à sanguinis defectu; quarta ab uteri clausura.

V. *Signa Diagnostica*. Sanguis inordinato motu vagatur per arterias, seseque sæpè exonerat per oculos, aures, nares, os. Nauseam patiuntur atque vomitum, & picam. Pallent, febricitant. Multæ laborant diarrhœâ, quædam fluxu albo. Sæpe videntur suffocari, baculumque in gula & œsophago se habere dicunt putantque. Signum lactis mammarum Hippocrati certum esse nego. Dolent renes; convelluntur.

VI. *Prognostica*. Mensium suppressio ab uteri clausura periculo vacat, modo indicetur, quod vidi scioque. Quæ ab humore viscido provenit, curatu difficilima est; ut & illa quæ provenit à sanguinis defectu, eandem enim agnoscit causam. Vasorum angustias non magni

gni facio; sæpius enim aperiuntur per se, præcipuè æstivo tempore.

VII. *Indicationes Curativæ.* Humor crassus incidendus & postea educendus per alvum; vomitum enim contra sententiam multorum non probo. Sanguificatio promovenda: viarum angustia aperienda, ut & Vteri clausura.

VIII. *Curatio.* Medicamenta menses moventia primum hic obtinent locum. Sequuntur purgantia, in pituitosis fortiora. Plethoricis Vena est secanda, sed non nisi in talis. Cingulo constringantur Hypochondria. Suffumigia foetida valde profunt, Enemata interdum. Coïtus non multum ad curationem facere videtur, sunt enim qui inde pejus habent. Suaveolentia pudendis adhibenda, Cucurbitulae & ligaturae cruribus.

Medicamenta Anti-hysterica.

Radices Angelicae, Bryoniae, Gentianae, Imperatoriae, Mei, pentasitidis, Zedoariae, Galangae. Folia Sabinæ, Melissæ, Arthemisiae, Pulegii, menthae, rutæ, Majoranae, Salviae. Semina dauci, levistici. Baccæ lauri, Juniperi, Asa foetida, Castoreum, Myrrha, Succinum, Bitumen, Pix. Ungula alcis. Pennæ perdicum. Aqua hirundinum, Anhaltina, Mynsichti, Sennerti, Crollii. Tinctura castorei, baccarum Juniperi, croci, lunæ, antimonii.

Camphora. Ol. menthæ, succini, rutæ, Tartari foetidum. Balsamus Sulphuris, Vterinus Schröderi. Tragæa hysterica Querc. Fæculæ bryoniæ, Aronis. Trochisci de myrrha pro suffitu. Emplastrum de Galbano, matricale, &c.

℞. Castorei unc. f.

Sal. Ammoniac.

Succini volat. an. drach. ij.

Spiritus Vini rectificat. unc. iij.

Vini Rhenani Falerni unc. vj.

Infundantur per noctem Colaturæ

unc. f. detur pro una dosi.

Vel

℞. Sal. Arthemisiæ,

Succin.

Tart. vitriolat. an. gr. iij.

Aloës lucidæ gr. xv.

Ol. menthæ g. j.

MS. F. Pil. N^o. v. deaurentur. Pro
unica dosi sæpius reiteranda.

Vel

℞. Gumm. Ammoniac. cum aceto præ-
parat. drach. f.

Castorei el.

Myrrhæ rubr. an. scrup. j.

Sal. Arthemif.

Succin. an. scrup. f.

Tartar. vitr. gr. viij.

Extract. catholic, drach. j.

Tro-

De mensium suppressione.

87

Trochiscor. alhandal. gr. xij.

Ol. menthæ gutt. vj.

MS. F. Pil. N^o. L. deaurentur.

Sumat ægra quotidie jejuno stomacho tres quatuorve. Si loco pilularum ægræ magis arrideat pulvis :

℞. Sal. Arthemisiæ, fraxini,

Succini an. gr. xij.

Tart. vitriolati gr. vj.

MS. pro unâ dosi.

Summæ est efficacisë.

Vel

℞. Rad. Calamenthæ unc. j.

Fol. Sabinæ drach. x.

Menthæ P. j.

Sennæ drach. vj.

Agaric. trochiscat. drach. iij.

Turbith. elect. drach. v.

Oc. Cancr. crudor. contusor. unc. f.

Garyophyllor. drach. j.

Sem. dauci drach. ij.

Coq. ex aq. hordei, in Colaturæ
unc. xxx.

Dissolve

Syr. diacnic. unc. ij.

Salis Ammoniac. drach. j.

MS.

Bibat singulis mane uncias 6.

Interim utatur suffumigiis ex Trochiscis de Myrrha, pennis perdicum, &c.

F 4

Vel

88 *De mensium suppressione.*

Vel

℞. Castorei drach. j.
Asæ foetid. drach. s.
Caphuræ scrup. j.
MS. F. Nodulus.

Vina medicata ex ingredientibus suprà scriptis in temperamento pituitoso optimè hic audiunt.

IX. Observationes. Virgo viginti quinque annorum decem ultra menses suppressionem menstruorum passa, pallida, nauseabunda, valdè conquerebatur de dolore hypochondrii, ut plerumque omnes solent, sinistri. Supervenêre illi, ut aliis multis, convulsiones, quæ longè differunt ab illis, quæ propriè sic vocantur. Lipothymiam postmodum passa est. Purgavi illam ter hisce pilulis :

℞. Massæ pilul. Aloëphangin.
major. scrup. j.

Sal. Succini,

Ammoniac. an. gr. iiij.

Resinæ Ialappæ gr. vj.

Ol. majoran. g. j.

MS. F. Pil. N^o. vj. deaurentur.

Hisce assumptis brevi tempore curata est.

2. Alia Virgo per multos annos laboraverat mensium suppressione & febre hectica, quæ illam extinxit. Aperto cadavere reperimus in Mesenterio steatomata varia, à Lymphâ crassâ oriunda, & in sinistro latere

ma-

magnum velut saccum , repletum materia turbida , pituitosa , majori verò ex parte cruenta.

C A P. XII. *De partu difficili.*

I. **P** *Artus difficilis est interclusus foetui exitus.*

II. *Partes affectæ sunt uterus laxior adstrictiorve , membranæ foetus crassiores , Vagina angustior , os pubis , Ischion exsiccum , & idèd minus cedens.*

III. *Causæ variæ sunt. Sæpè evenit quod mulieres delicatulæ sibi metuant à dolore , & tunc magis dolent , pariuntque serius. Angustia viarum multum causant difficultatis. Foetus debiliior non adjuvat matrem. Lympha nutritia (nutritur enim infans, ex mea opinione , tam per os , quam per arterias umbilicales) paucior , partes foetui transeundas non satis reddit lubricas. Ex omnibus hisce causis deficiunt parturiendi conatus.*

IV. *Differentias vides ex præscriptis.*

V. *Signa Diagnostica ex obstetrice sunt quaerenda.*

VI. *Prognostica.* Viarum angustia sunt periculosissimæ , præsertim ubi foetus solito major est , & humeros habet latiores. Laxitas rugarum vaginæ hac ex parte multum nocet , rugæ enim valdè inserviunt educendo foetui ,

ut & semini masculo attrahendo. Fœtus supra os pubis situatus exitum invenire nequit, nisi reprimatur; antequam hoc factum sit, omnes conatus parturientis sunt inutiles, & anti-hysterica omnia noxia.

VII. *Indicationes Curativæ.* Insufficientes parturientis conatus promovendi. Mater & infans roborandus. Viarum angustia dilatanda. Situs infantis vitiosus corrigendus.

VIII. *Curatio.* Situs infantis vitiosus, sicubi obstetricis manu corrigi non potest, corrigatur manu Chirurghi, mortuusque fœtus hamis extrahatur, prout in Chirurgia mea scripsi. Parturiendi conatus promoventur medicamentis infra scribendis. Angustia viarum dilatantur oleis laxantibus. Erecta stans ægra, sæpè parit facilius; sed hoc remedii genus non facile concedo. Reliqua obstetricia committenda.

Medicamenta generalia partum difficilem promovendi ferè omnia sunt anti-hysterica, quæ legi possunt in Capite præcedenti.

℞. Aq. anti-hystericæ unc. j. f.

Pulegii,

Melissæ an. unc. ij.

MS. bibat cochleatim.

Communi & notissimo omnibus hoc medicamento tot liberavi, conatum in defectu, parturientes; idque tam citò, ut non facile cre-

credideris. Rationem humanioribus dare paratissimus, nunc mihi servo.

Vel

℞. Fol. Sabinæ,

Majoranæ an. P. j.

Schoenanthi,

Spicæ nardi Indicæ an. drach. ij.

Coquantur ex Vino vel potu cui ægra magis est adsueta : in Colaturæ unc. xx.

Dissolve

Boracis Venetæ drach. j.

Sachar. albi parum.

MS. dosis unc. v.

Commendo tibi picem navalem & pulverem secundinæ. Dosis scrup. ij.

Observationes. 1. Vxor (non libenter hisce in affectibus quandam homino) vicini mei, diutisque mercatoris, per biduum patiebatur parturiendi conatus, unde delicatula eo usque debilitata est, ut adstantes illam judicaverint morti proximam. Vsa est mixtura suprâ scripta & me præsentem, illicò gemellos est enixa, optimeque postmodum habuit & habet.

2. De Viarum angustis nihil aliud possum scribere, quam quod multas viderim (fœtu nempè mortuo) Chirurgi manu ita liberatas, ut postmodum feliciter conceperint. Interim tamen multæ pereunt, quæ nimis serò quærunt auxilium, quod plerumque obstetricum culpâ solet evenire.

C A P.

C A P. XIII. De mensium
nimio fluxu.

I. **M**ensium fluxus immodicus est apertio
vasorum tam sanguineorum, quam
Lymphaticorum præternaturalis..

II. *Pars affecta* primaria est Ventriculus;
secundaria Renes; ultima Vterus, quam antea
hac, & fortè nuncdum, multi, non ego, prii-
mam dicunt.

III. *Causa* est sanguis vel ferofior, vel
Lympha acrior, sed imprimis crassa.

IV. *Differentiæ*. Hic albus est, ille ruber;
cæterà non differunt nisi gradibus.

V. *Signa Diagnostica* tibi indicabit ægra.

VI. *Prognostica*. Fluxus albus & cruentus
ubi fuerit frequens vel continuus, multas ne-
cat; defectu enim nutrimenti incidunt in he-
cticam. Vterque valdè est molestus & gravi-
ditatem impedit.

VII. *Indicationes Curativæ*. Ventriculi præ-
cipua habenda ratio. Humor crassus educen-
dus, ferofus acriorque temperandus.

VIII. *Curatio*. Ventriculum nisi purga-
veris & liberaveris ab humore suo crasso, non
curabis ægram. Venæsectio Symptomatibuss
occurrit, & ideò sæpè prodest, sed nihil facit
ad causam. Cucurbitulas mammis appositass
noxias esse puto: magis mihi placent ligaturæ
bra-

brachiorum, ubi symptomatibus urgentibus est revellendum. Enematibus non utor nisi in alvo adstrictiore. Adstringentia ubique ferè præscribuntur, sed non potui observare illa prodesse, nisi corpore benè purgato, tuncque summè necessaria.

*Medicamenta fluxum muliebrem tam album
quam sanguineum sistentia.*

Radices plantaginis, nymphææ, Ireos nostratis. Fol. menthæ, quercus, millefolii, cynoglossæ, Vermicularis. Flor. balauftiorum, rosarum rubrarum, Verbasci. Sem. agni casti majoris, coriandri, cannabis, papaveris albi, rutæ. Thus, Mastyx, Terebinthina, Succinum, Camphora. Guajacum; Cortices granatorum, quercus. Corn. Cervi vel rasum vel philosophicè præparatum. Ossa sepia, Spodium, Acacia, Corallia, Margaritæ, Lapis hæmathites, Lachrymæ sanguinis Draconis, Unicornu fossile. Ol. camphoræ, Terebinthinæ. Tinctura martis, Corallorum. Pilulæ mastichinæ. Rheum in substantia. Stercus asininum.

℞. Resinæ Ialappæ, Agarici.

Extract. Rhei an. gr. v.

Ol. menthæ g. ij.

MS. F. Pil. N^o. iiij. deaurentur.

Pro unâ dosi.

Vel

Vel

℞. Sal. Succini,
Sang. draconis an. scrup. f.
Diagrid. gr. vj.

MS. F. Pulvis pro una dosi.

Pulvis rhei ad drach. j. exhibitus benè agitur.

℞. Cretæ albæ vulgaris scrup. j.
Mastiches elect. drach. j.

Succi acaciæ,

Lachrym. sang. dracon.

Mumiæ, Rhei elect.

Corall. rubr. præparat.

Oc. Cancr. crudor. an. drach. f.

Therebinthinæ Venet. lotæ, sed nullatenus coctæ, q. f.

MS. F. f. a. Pil. magnitudine pisi minoris & aspergantur pulvere cinamomi.

Sumat ægra singulis manè quinque.

Vel

℞. Lachrym. sang. drac.

Oc. cancr. præparat.

Cretæ alb. vulg. an. gr. viij.

Chalyb. præparat.

Lapid. prunell. an. gr. vj.

MS. F. Pulvis pro una dosi quotidie assumenda.

IX. *Observationes.* 1. Vxor Guilhelmi ab Ottinga ægerrimè per aliquot dies decubuerat nimio mensium fluxu, ita ut macra, debilis,

bilis, pallida, jam jam videretur velle mori. Dulcia paucissimæ ferunt hystericæ, optimè tamen habuit ab hoc medicamento, à quo fluxus statim cessans, pristinæ sanitati ægram se restituere sivit:

℞. Mannæ Calabrin. unc. ij.

Crem. Tart. scrup. ij.

MS. sumat in jusculo.

2. Vxor amicissimi cujusdam mihi mercatoris fluxum patiebatur album. Vfus fueram medicamentis superscriptis & sat benè se habebat. Sed tota erat Venerea, & comedebat omnia gustui ipsius grata, Ostrea scilicet, acetaria, &c. inde pejus habens, auxilium cujusdam circumforanei imploravit, qui illi, nescio quo medicamento, tantam excitavit salivationem, ut post multos dolores sit extincta.

De Affectibus externis in Chirurgia & Anatomia mea Practica, satis largè me scripsisse puto.

F I N I S.

De ...

... pallida ...
... ...
... ...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

