De rachitide, sive morbo puerili, tractatus / Opera primo ac potissimum Francisci Glissonii ...; adscitis in operis societatem Georgio Bate et Ahasuero Regemortero.

Contributors

Glisson, Francis, 1597-1677 Bate, George, 1608-1669 Regemorter, Assuerus, 1614-1650

Publication/Creation

Lugduni Batavorum : Ex officina Cornelii Driehuysen & Felicis Lopez, 1671.

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/xzcuumr7

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org











/ V/ ~.


MEDICAL SOCIETY OF LONDON




ACCESSION NUMBER


PRESS MARK

GLISSON, F.



65378/A





GLISSONIUS De RACHITIDE

G.W. Sculp

Lugd. Ex Officina Felicis Lopex de Haro
BATAV. Ex Officina Cornelli Driehuysen,671

R.

MC

FRA

AH A Med

Editio ;

tore

A. S. S.

QE:

DE RACHITIDE. MORBO PUERILI, TRACTATUS;

Opera primo ac Potissimum

FRANCISCI GLISSONII Doctoris, & publici Professoris Medicinæ in Alma Cantabrigia Academia, & Socii Collegii Medicorum Londinensium, conscriptus:

> Adscitis in operis Societatem GEORGIOBATE,

AHASUERO REGEMORTERO,

Medicinæ quoque Doctoribus, & pariter Sociis Collegii Medicorum Londinensium.

Editio tertia, priori adcuratior longe, & emendatior.



CORNELII DRIEHUYSEN. FELICIS LOPEZ. 1671.

TRACTATUS A MELSON CLASSONIC DOCK alcum, a Socia College Media quoque Do Bonbas, & conter Socies ogn Hadacount Louise from

quo

lemi

COM

ulte

huj

ftra

fum

revo

ului

hoc

ra i

1%

pla Tr

Nte quinquennium, (Lector benevole) nonnulla, hunc affectum spectantia, in privatis conventibus (quos aliquot Medici, exercitationis in Artis operibus gratia, interdum habere folemus) mutuo invicem scriptis chartis communicavimus. Quum ea viam ad ulteriorem conditionis, tum curationis hujus morbi indaginem, quoddammodo stravissent; operæ pretium postea visum fuit chartas illas ad incudem denuo revocare, & (excerptis ex iis, quæ huic usui essent accommodata) integrum de hocaffectu Tractatum concinnare. Cura ista communi suffragio concredita fuit Doctori Glissonio, Doctori Bate, & Doctori Regemortero; quibus primo placuit negotium hoc, secundum futuri Tractatus partes, inter se dividere, singulisque

eft (

cum

qua

tis

toti

CZ

cere

001

exa

red

four

in i

ven

poli

que

gan

tan

gulisque proprium suum pensum afsignare. Sed cum Doctor Glissonius suam partem (quæ investigationem Essentiæ hujus Morbi comprehendebat) accurate utriusque judicio contexuisset, atque in ea multa à communibus Medicorum placitis (licet forte minus à veritate) aliena in medium attulisset; mutavimus consilium, primaque totius operis stamina ipsi soli pertexenda commisimus, ne partes nimium heterogeneæ, sibique difformes, tandem exsurgerent. Accepit conditionem ea tamen lege, ut, dum in hac Sparta ornanda occupatus esset, cæteri duo sæpius cum ipso convenirent, & symbola sua, ex propriis circa hunc affectum observationibus, in subtegmen conferrent, quæque illius studio delineata & constructa proferrentur, horum examen, tum judicium, mox ut sub manibus nascebantur, subirent. Atque ita tandem hoc, qualecunque, opus ad umbilicum perductum est; idque jam in publicum producimus, nequaquam impulsi scribendi prurigine: (quod Epidemicum hujus ævi

af-

16

et,

di-

ve-

III-

-90

ni.

22,

nt.

ut,

tus

on-

TUS

us,

IUS

er-

ım,

ibi-

m.

um

ici.

orle

zvi

eft

est Cacoëthes) sed eo tantum fine; ut, cum nobis solis nati non simus, hæc qualiacunque, quæ cum ad tenellæ ætatis (in qua magna ex parte præsens, totum vero futurum genus humanum conclusum est) salutem, tum Reipublicæ literariæ incrementum utcunque facere possent, communia redderemus; quo etiam aliorum doctissimorum ingenia ad similes in Essentias morborum eorumque causas inquisitiones faciendas, & nostras hasce Lucubrationes examinandas perfectioresque aliquando reddendas invitaremus. Cæterum obscura hujus Affectus essentia, & nostrum in hoc novo stadio percurrendo ausum, veniam (vel tacentibus nobis) apud te postulant, & ut defectus, lapsus, errores que horum conatuum mitiori perstringantur censura, jure meritoque efflagitant. Denique noli à nobis hic expectare pictum sermonem, & Rhetorum flosculis conspersum;

> Nobis non licet esse tam disertis, Qui Musas colimus severiores.

> > * 2

Neque

Neque etiam materiæ conditio patitur ejusmodi fucum: isto modo

Ornari res ipsa negat, contenta doceri.

Vale, (Amice Lector) atque eo animo hæc evolve, quo Tibi damus; hoc est, candido & benevolo.

F. G.

G. B.

A. R.

Nomina corum Doctorum, qui scriptis chartis Observationes suas in prima nostra super hoc affectu Exercitatione contulerunt.

Dr. F. Glisson, Dr. T. Sheaf, Dr. G. Bate, Dr. A Regemorter, Dr. 7 Wright, defunctus, Dr. N. Paget, Dr. 7 Goddard, Dr. E. Trench: Collegii Medicorum Londinensium Socii.

Elen-

Ele

Elenchus Capitum, brevisque Synopsis Articulorum præcipuorum in singulis contentorum.

CAP. I.

00

ne

G.

um

en-

A. carried to feeting a protective our barter. In I to there
Ntiquitas & prima origo hujus morbi, nomen ejuf-
dem, huju/que derivatio. Pag. I.
Morbum hunc esse novum. ibid.
Primus ejus locus natalis.
Nomen vulgare. ibid.
Nomen huic morbo apposite quadrans.
CAP. II.
Anatomica Observationes, collecta ex inspectione & dis-
sectione corporum hoc mo-bo extinctorum. 7.8
Observata, quæ citra dissectionem, denudato defun-
cto, exterius occurrunt.
Quæ aperto Abdomine.
Quæ aperto Thorace.
Quæ aperto Capite observantur.
CAP. III.
Ad faciliorem inventionem Essentiæ morbi, supposita
quædam proponuntur. Primum, de Essentia sanitatis.
Secundum, de Essentia morbi. Tertium. de triplici di-
visione sanitatis & morbi. Explicatio tertiæ divisionis,
ususque ejus dem Descriptio constitutionis naturalis,
ejus dem exaltatio. Quartum suppositum de combina-
tione trium constitutionum intisdem partibus, 16. & seq.
Divisio constitutionis, in qua consistit Essentia sanita-
tis & morbi, in naturalem, vitalem, & animalem,
hujusque divisionis explicatio. 17. & seq.
Descriptio constitutionis naturalis. 23
CAP. IV.
Essentiam hujus morbi non consistere in constitutione Ani-
mali, nec Vitali: sed Naturali; non qua Organica, sed
qua Similari.
Limitationes tres proponuntur.
* 3 Pri-

Elenchus Capitum.	
Primam ac radicalem hujus morbi essentiam,	confi-
ftere in frioida ac humida intemperie, cum d	erectu
ac torpore spirituum insitorum concurrentib	us, in
constitutione insita partium primo affectarum	1. 35
CAP. V.	
Examinatio sententia proposita per partes. i. M.	lorbum
olle intemperiem frioidam Object. & Kelp. 2. 1	che pu-
midam. 3. Consistere in spirituum inopia. Obje	ect. 5
Refn. A. In Spirituum torpore,	37
Plura concurrere ad temperamentum calidum i	ositum
constituendum, quam folum spiritum insitur	n. 43
CAP. VI.	
Pars primo in hoc morbo affecta.	47
Non Cor, aut Cerebrum.	48
An Hepar sit subjectum primæ Essentiæ hujus s	nordir
	ibid.
Argumentorum, quæ Affirmativ. suadeant, solu	110.49
Negativa afferitur.	53 huins
An Pulmones sint subjectum primæ Essentiæ	56
morbi?	A TOTAL CO.
Negativa afferitur.	calva-
Partes primo affectas esse spinalem medullam,	Infos:
riam egressam; Nervos omnes ab eadem prod denique omnes partes membranosas, ac sib	rofas .
denique omnes partes membranoras, ac mo	58
ad quas nervi isti deferuntur.	50
An offainter eas accenfenda?	ibid.
Negatur. CAP. VII.	
Secundaria hujus morbi Esentia.	62
Tonus Partium in quo confiltat.	63
Tonum Partium in hoc affectu esse vitiatum:	& effe
quidem	1
x. Nimis laxum.	64
2. Nimis flaccidum.	65
3. Nimis mollem.	ibid.
Nimis Inhricum interne.	66
Dari internam, & similarem quandam in cor	poribus
	natu-

nat terr

Eam la Jam Partes

Tonu
Neque
Sed m
Et qui
Oux
eff
Maggi

Subje

Sed!

Vitial id

Vitial Vitial Circu

De i Ejus

Elenchus Capitum.	
naturalibus lubricitatem, etsi ea è Philosophis pr	
C LIIIII III	56
Eam lubricitatem esse vel Oleofam, seu pinguem, Aqu	
	28
Partes primo affectas interna lubricitate aquosa, pra	æ-
	9
Tonum partium, in hoc affectu vitiatum, non es	400
	I
	72
	73
Et quidem partem totius affectus. 74,7	
Quæ à primaria affectûs Essentia dependet, adeografie partem Essentiæ secundariæ.	
esse partem Essentiæ secundariæ. ibi Magnam esse dependentiam toni vitiati à prima huj	
morbi Essentia.	17
CAP. VIII.	1
Essentia secundaria hujus morbi in constitutione vitali.	80
Divisio Constitutionis vitalis, in Originalem, & Pa	IF-
ticipatam.	2
Subjectum Constitutionis vitalis originalis non C	2.00
	81
Sed spiritum vitalem. ibi	d.
CAP. IX.	
Vitiata generatio spirituum vitalium in hoc morbo; &, 2	An
	84
and recommendate CAP. X.	
Vitiata distributio vitalium spirituum in hoc affectu; &	an
sit pars essentia ejus secundaria.	90
	id.
Circuitum fanguinis non esse difficilem in hoc me	
	id.
Duz causse przecipue celeritatis cirtuitus sanguinis:	
Quatuor caussa impellentes sanguinem, & qualiter	id.
	00
	02
	03
parties, or cutation.	

tu in 35

37 m

47 48 bit id 49 13 us 56 17 va- 105; 18 19 bid 62 63 fee

atu-

Elenchus Capitum.	
Deficere irritationem pulsus in hoc Affectu.	104
CAP. XI.	1
Inæqualitas distributionis in hoc affectu.	106
Ea probatur.	107
Et Phænomenis quibusdam ulterius consirmatu CAP·XII.	L terr
Vitia Constitutionis vitalis participatæ in hoc affect	Etu.112
In quibus consistat constitutio vitæ participatæ	. 113
Explicatio primæ ejus partis, quæ est unio san arteriosi cum substantia partium solidarum.	guinis
Explicatio secundæ ejus partis, quæ est calor	vitalis
in partibus folidis excitatus.	
Conditionis caloris vitalis fecundum naturam	
bentis.	118
bentis. Explicatio tertiæ parris constitutionis vitæ part	ticipa-
tæ, quæ est vivificatio, & exaltatio constitu	tionis
naturalis.	
Quænam sit adæquata caussa, & subjectum on	
naturalium facultatum.	122
Vitia facultatum naturalium in hoc affectu.ibid.	& 123
CAP. XIII,	illo.
Vitia Organica constitutionis insita in hoc affectu.	124
Quinque summa capita vitiorum Organicorum	in hoc
morbo.	ibid.
Communem corum omnium caussam fere esse	ahoyo.
τροφίαν, seu improportionatam nutritionen	
tium.	125
Duæ caussæ hujus Alogotrophiæ designantur.	ibid
Cur partes primario affectæ hic extenuentur.	. 126
Cur Caput præsertim cerebrum, & Hepar nimi	um in
hoc affectu augeantur.	. 127
Protuberantiæ offium in hoc affectu caussæ.	129
Offa in multis cum Parench. viscerum conven	ire. ib
Ossa non omnino Arteriis destitui.	130
Medullam non effe offium alimentum; fed que	oddam
eorum excrementum seu secrementum. 131.	.& 132
Vitiatorum Dentium in hoc affectu caussæ.	137
	Curvi-

Carvita

Inflexio

Angust

Efentia mali Delecti

opin Descrip

Vitia Cur i

Rachita Duo fi An,& o Morbo did Utran Curin

Cari

gra Laum

I. Qua Par 1. Ad

> ejul 3. Ad Hujo

4.Ad

fur II. V

Elenchus Capitum. thos ameters, same \$39 Curvitatis offium caussæ. Inflexionis Articulorum caussæ. Attended of the design of the Hatties Inflexionis Spinæ caussæ. Angustiæ & Acuminationis Pectoris caussæ. CAP. XIV. Essentia secundaria hujus morbi in constitutione Ani-Descriptio constitutionis animalis, magis conformis opinioni veterum de facultate animali. 166 Descriptio ejusdem secundum aliquorum Neotericorum opinionem de facultate animali. Vitia constitutionis animalis in hoc affectu. 169 Cur sensus non æque hic lædatur, ac motus. 171 CAP. XV. Rachitidis Causa: & 1, quæ ad Parentes attinet. 174 Duo summa caussarum hujus morbi genera. ibid. An,& quatenus, morbus hic dici possit hæreditar. 155 Morbum hæreditarium esse proprie, vel improprie, sic dictum. Utrumque rursum duplicem esse. Cur infantes rarissime hunc affectum ante partum in-Cur ii, qui ante partum hoe morbo correpti fuerunt, gravius, ac periculosius laborent. Enumeratio caussarum, quæ, ex parte Parentum, hunc morbum producunt. I. Quæ, ante conceptionem, à vitio totins corporis Parentum, procedunt, ad 4 Classes reducta: bid. r. Ad intemperiem frigidam & humidam materiæ,ex qua semen generatur, ejusque caussæ. ibid. 2. Ad inopiam spirituum insitorum in ista materia, ejusque causlæ. 183 3. Ad Torporem materiæ istius. Hujus Caussæ. 4. Ad vitiosas dispositiones Parentum, qui ipsi forte in fua pueritia hoc morbo laboraverint. 185

II. Vitia, in ipsis partibus genitalibus Parentum resi-

101

Elenchus Capitum. dentia, quatenus possint esse caussa, ante conceptionem. Caussa, ex parte Matris, hunc morbum, post conceptionem, producentes. ibid. CAP. XVI. Caussa hujus morbi Pueris post partum incidentes. 189 An morbus hic fit contagiofus? Negativa afferitur. ibid. Quid potissimum requiratur ad morbum proprie contagiofum constituendum. Caussa, post Partum hunc morbum invehentes, ad duas Classes reductæ. 192 De Aëre, & extrinsecus occurrentibus, quatenus posfint esse causse hujus morbi. De Cibo, & Potu, intusque assumptis. 196 De Motu, Quiete, Actionibus, & Exercitiis. 198 De Somno, & Vigiliis. 199 De Excretis, & retentis, præter naturam 200 Plures dari species Excretorum, quam vulgo statui folet. Singulas tamen Excretorum species nondum nobis effe fatis notas. 202 Caussæ internæ hujus morbi. 203 Quomodo Bilis possit esse hujus morbi caussa. Quomodo Melanch.hujus morbi caussa esse possit.205 Quomodo Pituita hujus morbi caussa esse possit. 207 Quomodo Sudor excedens, vel deficiens, ut & indebita transpiratio, hujus morbi caussa esle possit. 208 CAP. XVII. Morbi antecedanei, qui hujus morbi caussa esse possut. 209 ibid. Tria horum morborum genera. Qui morbi huic fint affines, & congeneres. 210 Quomodo morbi emaciantes, corpufque quovis modo extenuantes, possint esse hujus morbi caussa. 212 Tria genera morborum corpus extenuantium. Pueros rarissime à soporosis affectibus in hunc morbum incidere: & cur? 215 Qui

Quimor

morbo

Cur etas obnox

tos, o

guin Differre abill

Qua a fect Car In Lac ma

Cur Int dies Error ! veft

fanti Cur m

gat. An æt dan Affirm Hiftor

Obser bor Cur in

> nac Qui n

Elenchus Capitum. Qui morbi sint, qui frequentius solent torporem huic morbo proprium invehere. CAP. XVIII. Cur ætate grandiores, non æque ac pueri, huic morbo sint obnox11? Juniores pueros frigidiori temperamento esse præditos, quam seniores: & cur? Plura requiri ad constitutionem temperamenti calidi, quam spiritum insitum, & calorem insitum. ibid. Differre revera intempenem humidam, quæ pueris, abilla, quæ senibus contingit; & quomodo. Quæ ætas juniorum rarius, quæ frequentius huic affectui sit obnoxia Cur Infantes recens nati rarissime afficiantur. Lac muliebre saluberrimum Infantibus alimentu. 226 Exceptis certis cafibus. Cur Infantes à nono mense ad sesquiannum ætatis indies hoc morbo frequentius infestentur. Error Nutricum, quæ debiliores Infantes præmature vestibus induunt, notatur. Et, quando Fasciæ Infantibus sint exuendæ, ostenditur. Cur morbus hic frequentissime pueros post sesquiannum ætatis usque ad secundum cum dimidio affli-An ætate grandiores unquam in hunc affectum incidant? 230 Affirmativa afferitur sub certis limitationibus. ibid. Historia morbi, adultis apud nos interdum contingentis, huic puerili morbo multum adfimilis. Observatio Trigenarii morbo huic perquam simili la-CAP. XIX. borantis. 233. Cur in Anglia frequentius hic morbus occurrat, quam in aliis regionibus: &, Ansit Anglis vernaculus? Quatuor conditiones, ut morbi dicantur proprie ver-238 naculi. Qui morbi improprie dicantur vernaculi. 239 Morbus proprie dictus vernaculus quotuplex. 24 X

An-

198

200

10-

10

bis

101

185

105

de-

108

109 1d.

IO

10

212

113

00-

119

Qui

Elenchus Capitum.

Ejus in l Quisqui Signa ac Signa, nem

Signa, Signa, Signa,

Signa di Signa Signa Signa Signa Signar Ient. fis, 1

Alioru

Signa

Metho Quid Quid Quid Cogno Colla Adqu

> Diffe Duo

Tria

Grat

Lientinus Capetum.
Angliæ temperies frigida & humida.
Anglia regio admodum prolifera. 246
Diuturna pax occasio est effæminationis corporum
Incolarum.
Morbus hic longius latiusque extenditur, quam vulgo
credi folet. 249
Mollior vitæ ratio tractu temporis familias enervare
folet. 250
Morbus hic non proprie dici potest Anglis vernacu-
CAP. XX.
Differentiæ morbi Rachitidis. 253
1. Differenriæ, ratione plurium, vel pauciorum par-
tium essentiæ secundariæ hujus morbi. ibid.
Quæ partes essentiæ secundariæ sint inseparabiles à
primaria essentia hujus morbi.
Quo ordine Organica vitia huic morbo fuperveniant.
ibid. & 256
2. Differentiæ à magnitudine. 258
3. Differentia à vehementia morbi. ibid.
4. Differentiæ à viribus ægrotantis. 259
5. Differentiæ à Temporibus morbi. ibid.
Approbatio divisionis Temporum morbi secundum
Galenum, & ejusdem desectus notatus. 260
Nova Augmenti divisio. 261
Duplex declinatio morbi. ibid.
Differentiæ hujus morbi secundum tempora propo-
fita. 262
Differentiæ respectu caussarum. 264
Differentiæ à morbis complicatis. 265
Qui morbi quandam dependentiam ab hoc morbo
ejusve causiis, habeant. ibid.
Morborum horum caussæ. 266, 267. & seq.
CAP. XXI.
Signa morbi Rachitidis: & 1. Diagnostica. 269
Signum Pathognomonicum latius extenditur, quam
vulgo folet. 1bid.
Ejus

Elenchus Capitum.

acu-

251

253 parbid. 255 ant. 256 258 bid.

259 bid.

dam 260

26I bid.

ieq.

269 min bid.

Ejus

Elenchus Capitum.	
Ejus in hoc sensu definitio. 270,	271.
Quinque Fontes signorum Diagnost. hujus Morbi	
Signa ad actiones Animales spectantia.	ibid.
Signa, quæ spectant ad irregularem partium nut	ritio-
nem. 1 val camen a mark at the valence	276
Signa, quæ respiciunt Respirationem.	281
Signa, quæ spectant ad vitalem influxum.	282
Signa quædam vaga.	283
CAP. XXII.	SALE.
Signa differentiarum Rachitidis five Diacritica.	284
Signa præfentis Rachitidis in principio adhuc	exi-
ftentis.	286
Signa reliquorum Temporum hujus morbi.	287
Signa morbi nativi improprie sic dicti.	289
Signa hujus morbi ex integro post partu contract	1.290
Signa morborum, qui cum hoc affectu complica	
lent, & quandam dependentiam ab eo, ejusve	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
fis, habent.	291
Aliorum morborum complicatorum figna. ibid. 8	x 292
CAP. XXIII.	
Signa Prognostica in morbo Rachitide.	295
CAP. XXIV.	
Methodus ad Praxin, tum Indicationes in genere.	302
Quid Experientia, quid Ratio?	ibid.
Quid Indicatio?	303
Quid Indicans?	304
Quid Indicatum?	306
Cognatio officii medici cum actione Indicata.	308
Collatio utriusque cum Scopis medicis.	309
Ad quam intellectus operationem Indicatio per	
	317.
Differentiæ Indicationum.	322
Duo Indicata abstracta generalissima: viz. Con	ferva-
	& feq.
Tria generalia Indicantia.	328
CAP. XXV.	Assert.
Curativæ Indicationes.	328
SAME TO SECURE A SECURE ASSESSMENT OF THE SECU	AP

Elenchus Capitum. CAP. XXVI.

Fasciaro Ocrearo

Materia Remedi

Enema Cautio Emetio Cautio Qualia Formu Catha Eorus

Prapa

Que p Que p Viarur

Przpa Condi Per E

Simp

Enges

Quæ Rhab

Purga

Alter. Eoru

Oppo Quæ Apoz Juscu

The state of the s	
Indicationes Præservativæ.	332
CAP. XXVII.	8-230°
Indicatio Conservativa, seu Vitalis.	336
Indicatione Vital. esse in plures species divisibil	e. 338
Esse quoque divisibilem in partes	339
CAP. XXVIII.	100 A
Usus, rectaq; administratio Indicationum prædictas	ru 343
Quæ comprehendantur sub usu Indicationum.	344
De Comental et Danier,	ibid.
Circumstantiarum actionum Indicataru invent	10.346
An morbus, vel ejus caussa, prius à Medico inv	adide-
beat? 349. 8	£ 350.
CAP. XXIX.	1
Materia Medica, propositis Indicationibus respo	
Et primo zuesezun.	ibid.
De Aurium scarificatione.	
Conjectura nostra, cur concha Auris, præ cæter	
partibus, in hoc affectu scarificetur.	355
Utilitas scarificationis Aurium in hoc assectu.	356
Fonticuli utilitas in hoc affectu.	357
Ad hoc remedium non adscendendum, nisi nec	
	& 358 li 268
Modus commodus Fontic. ad nucham excitano	117 350
Hirudinű usus plus nocere, quam prodesse videt	nt no-
Cucurbitulæ cum scarificatione improbantur,	ibid.
xiæ: sine scarificatione, ut inutiles.	
Nisi alterutras efflagitet alius aliquis complica	360
fectus.	ibid.
Vesicatoria interdum utiliter hic adhibentur.	361
Horum commoda in hoc cafu.	362
Et incommoda.	
Locus commodissimus applicationis Vesicatori	ibid.
affectu.	363
Ligaturarum usus in hoc morbo curando.	ibid.
Cautiones observandæ in harum usu.	ibid.
Ad quid ex conferant.	Fascia-
	-

Elenchus Capitum. Fasciarum nsus, & modus eas concinnandi. ibid. Ocrearum fibulatarum cum Ferulis Constructio. 365, 366, 367. CAP. XXX. Materia Quenausonni, Et 1. Eluentia primas vias, 368 Remediorum Pharmaceuticorum divisio. ibid. Enematum usus, eorumque Formulæ quædam. 369 Cautio in eorum præscriptione observanda. ibid. Emeticorum utilitas. 370 Cautiones circa horum usum observanda. 372 Qualia Vomitoria illic conveniant. ibid. Formulæ quædam Emeticorum, 373 CatharcticaLenitiva, & cautiones circa coru usum. 374 Eorum divisio. 375 XXXI. Præparantia, eorumque usus. ibid. Horum genera. Quæ evacuatio magis, quæ minus præparat. exigat.ib. Quæ præparatio quibus humoribus debeatur. ibid. 378 Viarum præparatio. Præparatio respectu Partium. 378 Conditiones Præparantium in hoc affectu. ibid. Per Epicrasin humores esse in hoc affectu exigend. 379 380,381 Simplicia Præparantia. ibid. Composira. CAP. XXXII. Evacuantia Elective. 383 ibid. Quæ sint rejicienda, Rhabarbari in hoc affectu excellens utilitas. 384 Purgantia elective Simplicia. 385 ibid. ibid. Composita quædam. XXXIII. CAP. 388 Alterantia Specifica. 362 ibid. Eorum Definitio, & Divisio. hoc Oppositio inter morborum & hæc Specifica. 389 ibid. Quæ ex Specificis sint nobiliora 392 363 bid. Apozemata Specifica, & Cerevisia Medicata. 393 Juscula & Panatellæ. 395 Pul fc12.

336

339

343

id.

346

de-

ens.

ejus

355

356

357

litas

358

358

359

10-

ibid.

15 af-

360

361

Elenchus Capitum.	
Pulveres & Electuaria. 396	
CAP. XXXIV.	
Corrigentia Symptomata. 398	
Fluxûs Alvi curatio. 399	
Sudor immodicus, 401	
Cautio in ejus restrictione. ibid.	
Sudoris immodici curatio. 402,403	
Cantiones circa Chalybis usum in hoc affectu. 404	
Dentitionis laboriofæ, & Dentium doloris, curatio. 400	5
CAP. XXXV.	
Remedia externa.	•
Exercitii modi, feu genera. ibid	1
Forum divisio.	
Varii Decubitûs mores, & in quibus casibus singul	1
novii vel utiles (int. 101a. oc 4)	,
Decubitûs, præ cæteris exercitiis, in certis calibus	3
prærogativa. 410,411	a
Cunarum agitationis usus.	
Gestationis in ulnis; & limilium, ulus.	
Lufuum sedentariorum ulus. 413	œ.
Exercitia mascula.	•
Incefsûs ufus.	
Artificialis corporis suspensionis usus. 41	ec.
Frictionis usus.	
Contrectationis Abdominis usus. 417,418	
Frequentis Adnascentiæ Hepatis in noc affectu Caul	-
f2.	•
CAP. XXXVI.	
Extrinsecus applicanda.	
Horum divisio, & variæ Formæ.	
Liquores.	
Unguent.in hoc affectu componediratio, & Form. 42	2
Remedia externa Hypochondriis appropriata. 4-	5
Remedia externa Pulmonibus dicata.	
Spinæ remedia externa.	
CAI	,

five pe tribua

nume affecti Infant teribu fantiu

at, n condi enim videa

macio ratan



CAP. 1.

Antiquitas & prima origo hujus morbi, nomen ejusdem bujusque derivatio.



409 guli

413

416

418

420

42E

423

425 416

AP.

Ovos nonnullos morbos veteribus plane ignotos, varios Europæ tractus paucis abhine retro feculis invalifle certiflimum est; (sive id vicissitudini rerum,

five peccatis hominum & corruptis moribus tribuamus) ut Luem Veneream, scorbutum, Plicam Polonicam & fimiles; quorum numero hunc ipsum, de quo acturi sumus, Morbum affectum accensere licet. Etenim si omnes huncesse Infantium & Puerorum morbos cum a Ve- novum. teribus tum Neotericis in libris suis de infantium Morbis descriptos examinare libeat, nullum inveniemus qui hujus idæam & conditionem satis exacte exprimat. Licet enim aliquid commercii & affinitatis habere videatur cum febre lenta, cum tabe, cum macie Infantium, & hydrocephalo, revera tamen plane diversus specie est ab his affectus

fed &

treque

mora

jus att

plant,

plane

TIDUS

moru

fcrip

(quan

In occ

mitat

citer 1

paula

TIV ata

Orm

Occid

nalibi

morb

niter

Ca

apod

thift

DODI

9420

ошпе

Sec

Etus. Multos quippe reperias hoc morbo graviter afflictos absque febrili intemperie, aut ulla causa suspicionis ejusdem : similiter etsi tabes frequenter ante obitum huic morbo superveniat, rarissime tamen primam ejus invasionem comitatur. Quod ad maciem attinet, licet partes nonullæ in hoc affectu extenuatæ perpetuo observentur, non tamen id omnibus ex æquo, perinde, ut in vera macie accidit, sed partes circa caput & faciem floridæ, & bene pastæ ad extremum fere vitæ diem cernuntur. Denique hydrocephalus fæpe quidem cum hoc affectu complicatur; nonnullos tamen ab hoc morbo extinctos diffecuimus, quibus cerebrum fatis firmum fuit, neque superfluo sero irriguum. Conjectarunt aliqui morbum hunc propaginem quandam esse seu fructum Luis Venereæ aut scorbuti à parentibus ad liberos propagatum. Non equidem negamus quin parentes Lue Venerea aut scorbuto laborantes, possint prolem non modo Lue Venerea aut scorbuto, sed & hoc etiam morbo simul affectam edere, atque hoc nonnunquam contigisse observatum est; ut plurimum tamen morbus hic nihil habet in propria sua essentia cognationis aut familiaritatis cum istis morbis, neque similem curationem postulat, strumolam quoque affectionem cum hac aliquoties complicatam observavimus:

sed & hanc quoque ab illa & illam ab hac

frequentius bene distinctam vidimus.

Sed quorsum huic inquisitioni diutius immoramur? cum qui velit attentius signa hujus affectionis suo loco proponenda contemplari, facilime fibi perfuadeat, morbum effe plane novum, neque unquam fuisse à veteribus aut neotericis in libris suis practicis de morbis Infantium hactenus divulgatis de-

scriptum.

rbo

ne,

iter

101-

ne.

lem

du

ta.

ve.

12-

IM 10-

morbo

012-

III-

unc

Luis

eros quin

ran-

erea

mul

nam

nta-102

cum

po-

com

ins:

fed

Innotuit autem primum hic morbus Antiqui-(quantum quidem ex aliorum relatione, di- tas ejus, ligenti facto examine, colligere potuinus) primusq: in occidentalibus Angliæ tractibus, in Co- talis. mitatu scil. Dorset & Somerset, triginta circiter retro ab hinc annis. Ab eo tempore paulatim ejus notitia ad alia quoque loca derivata est, Londinum puta, Cantabrigiam, Oxoniam immo omnes pene Australes & Occidentales Angliæ partes: In Septentionalibus autem Comitatibus multo rarius hic morbus occurrit, & vixdum vulgo communiter innotuit.

Cæterum nomen morbi vulgo receptum Nomen apud eos, quibus is familiaris, est, the Michets: Quis vero primus morbum hoc nomine donaverit valde est incertum, ut & qua occasione id factum, casuve an consilio.

Utcunque nomen impositum sit, apud omnes obtinuit, ut in tanta varietate loco-

rum,

rum, nondum alio nomine appellatum fuifse, aut etiamnum appellari intellexerimus.

Admiratione autem dignum est, quod cum morbus recens sit, & non ita pridem nomine donatus, neque in locis adeo diffitis autinaccessis vigens, nemo hactenus inveniri potuerit, qui sciret aut ostenderet, vel primum nominis autorem, vel ægrotum cui primum nomen morbi accommodatum fuit vellocum peculiarem, ubi id factum vel modum etiam quo inde in vulgus dispersum fuit. Populus nomen morbi nactus quasi re naviter gesta acquiescit, neque ulterius se solicitum vult de nominis autore aut re ipsa.

Quandoquidem autem Latinæ Græcæ que Linguæ periti exspectant sorte à nobis nomen, cujus aliqualis ratio reddi possit, varia nos huic morbo coaptavimus, quæ tamen singula recensere non erit forsan operæ Regula pretium; regulas tamen quas in nomine detæ in no- fignando nobis ipsis propoluimus, commeva hujus morare non erit forte inutile. Prima ergo edenomi- rat ut nomen morbi notabilem aliquam ejus natione. conditionem comprehenderet. Secunda, ut id satis esset distinctum ab aliorum morborum & symptomatum nominibus. Tertia, ut esset satis familiare, pronunciatu facile,

memorie quoque accommodatum, non nimis longum, neque operofius decomposi-

tum.

Dum

aliqui: dit qu arribt

abhor

lis, it

dorfi

mo

hoce

milia

Bomil

fenfu

barie

nome deduc

Tatio

prom

quand

III.

(the i

ne rus

ne co aut fa

parte

1 300 terel

te not

od

vel

cui

uit

um

re

se

ofa.

202

bis

ta-

era

de.

ne-

000

ejus

2, ut

00-

rtia,

ile,

ni-

poli-

Juna 1

Dum hisceregulis satisfacere satagimus, huic aliquis nostrum casu quodam in nomen inci- morbo dit quod sibi & cæteris quoque postmodum apposite arrisit. Fuit autem voo @ paxins, vel etiam jazims (fiquidem illa terminatio non plane abhorret à communi genere) morbus spinalis, item voco The paxeus, morbus spinæ dorsi. Est enim spina dorsi inter partes primo hoc morbo affectas princeps. Deinde nullus alius morbus aut symptoma nomen hoc ei præripuit: Præterea nomen hoc familiare est ac facile. Denique videmur hoc nomine Anglicum nomen tanto populi confensu receptum, viz. the Mickets / à barbarie liberare. Absque enim torsione vocis nomen Michets à voce paxins paxins deduci prompte potest, modo habeatur ratio mutationis quæ propter vulgarem pronunciationem accidere folet vocabulis quando ab una ad aliam linguam transferuntur.

Objectio,

Dicas eos qui primo nomen Anglicum (the Bickets) imposuerunt suisse forte plane rudes & Linguæ Græcæ imperitos, aut ne cogitasse quidem de Græca voce paxims aut saltem non intellexisse spinam dorsi esse Respons. partem priucipem inter primo affectas in hoc morbo. Respondemus nostranihil interesse sive rndes suerint, sive de Græca voce non cogitarint, siye non intellexerint quæ

fit pars princeps inter primo affectas aut secus : gratis tamen hæc afferuntur. Multos enim novimus tunc temporis, cum morbus hic primoraffulfit nomenque accepit, doctos fame Græcæque Linguæ peritos in illis locis exstitisse quibus etiam non adeo difficile erat observare insignem spinæ in hoc affectu debilitatem, indeque nomen ei assignare, licet forte vulgus nomen id datum nonnihil errore pronunciationis, ut folet, perverteret, idque voce jam recepta, the Michers exprimeret. Verum hoc nos non solicitos habet, five hocita sit, sive secus, perinde esto. Si itase res habeat, nomen propositum omnio (ut pater) congruum erit, sin aliter fortasse non minus apposite quadrabit. Etenim finge te incidere in nomen quoddam, non tam confilio quam casu receptum, ita tamen aptum ut vix excogitari possit ipso consilio aliud nomen commodius, aut rationi magis consonum.

Quid ageres? vocem receptam extirpares, ut novam nihilo meliorem substitueres? Injurjus certe fores erga morem loquendi; verba usu valent, neque temere sunt innovanda quin potius nomen receptum confirmares, sed tanquam novum, & ab eo tempore à nova origine deducendum. Id enim foret saltem quasi surculus asscititius novæ Stirpi insertus, qui ob affinitatem cum radice haud

handd

placea

fingere

Nome

the B

ter ho

Heis

CIETIO

foles

morb.

modo

gener

bus S

voce

ya R

the f

сипо

the fi

haud difficulter coalesceret. Vel si hoc non placeat, suppone, si libet, nos jam de nova fingere Anglicum hujus morbi nomen, idq: deducere à voce Græca paxims vel paxims: Nomen sane Anglicum hinc resultans foret, the Machites. Quantillum jam interest inter hoc nomen & prius receptum, the Itic= fters ? certe tantillum, ut vulgaris pronunciatio de tam exigua differentia non multum soleat esse solicita. Sed tædet diutius immorari in hisce trivialibus. Esto ergo Græcum morbi nomen voo @ paxins uel paxims (fi modo vox hæc admittatur, esse communis generis) vel ms paxews; Latinum, Morbus Spinalis, vel Spinæ Dorsi: item sicta voce Latina Substantiva ex Græca Adjectiva Rachitis - idis Anglicum ulitatum, the Hickets, refineatur, vel ejus loco in curiosorum gratiam substituatur, si libet, the Machites. Atque hæc de nomine.

te-

is

tos ndc

oli-

bit.

od-

um, iplo

t10-

rpa-

eres?

000-

nfir-

temenim

1072

adice

hand

CAP. II.

Anatomicæ observationes collectæ ex inspectione & dissectione corporum hoc morbo extinctorum.

Priusquam auspicamur indaginem de natura hujus morbi ejusque caussis, vi-

fum est nonulla certa & indubiata, utpote sensibus obvia, præmittere, quæ tum realem existentiam ipsius morbi demonstrent, tum fundamenti loco esse possint, cui sententia nostra & judicium nostrum de novo hoc morbo superstruatur. Neque enim quenquam existimare volumus, nos de morbo aliquo imaginario seu fictitio hic tractare, multo minus exspectare ut opinio nostra gratis & absque examine recipiatur. Quin potius id agimus ut materia discursus nostri sit, quantum quidem fieri potest, in ipso limine nota & comperta, ut illa quæ proposuerimus per hæc quæ sensui obvia sunt, prout occasio tulerit, confirmemus, lectorque his instructus fiat competens nostri ratiocinii arbiter, suumque de singulis judicium interponere valeat facilius. Testamur itaque plures nostrum variis corporum hoc morbo occumbentium dissectionibus interfuisse, eaque quæ longa experientia frequentique dissectione hactenus observavimus, quæ nempe propriis oculis vidimus, manibusque tractavimus summatim ac fideliter hoc capite narraturos.

Interea tamen duo hic præmonenda sunt.
Prius est, ut in memoria habeat lector, defunctos quos dissecuimus gravissime ante obitum hoc morbo afflictos suisse, siquidem
ipsi magnitudini morbi maxima ex parte suc-

2. Pra-

cubuit

2 115 00

fectis

tis,ean

tum q

1115 20

diesn

morb

chro

plicat

corpo

præte

nece

lium

enten

to A

non

nibe

fpect

catus

quo

alter

time

tuo.

indi

OCCU

m

-10

tra

un

ftri

olo

10-

nt,

-10

ati-

um

112+

hoc

CE

en-

MS,

200

iter

unt.

de-

eo-

dem

fuc-

Cil-

cubuisse supponuntur : ne igitur exspectet in aliis corporibus ad huc vivis five recens affectis five saltem ad anun nondum provectis, eammorbi magnitudinem aut symptomatum quæ hic depingitur. Morbus enim omnis ad statum usque intenditur & tum quoq: fuccumbente demum natura in deterius indies ruit, Posterius est ut animadvertat lector, morbos fere omnes tractutemporisalios diverligeneris sibi adsciscere, ideoque morbos chronicos plerumque ante obitum esse complicatos. Ne ergo putet quicquid in defunctis corporibus etiam ab hoc morbo extinctis præternaturale reperitur, ad hunc affectum necessario pertinere; sorte etiam magis id alium morbum huic ante mortem supervenientem quam hunc ipsum respiciat. Et profec- Frequens to Anatomici frequenter ad hanc cautionem Anatonon satis attenti, graviter in suis observatio- micorum nibus lapsi sunt, dum quæ ad alium morbum spectant, alteri eum quo ante obitum complicatus erat adseripserunt. Hunc ergo errorem quo præcaveamus non temere ex unius aut alterius corporis inspectione pronunciandum est, at multiplici seduloque sacto experimento distiguendum prius est, quæ perpetuo, quæ plerumq: quæ frequenter, quæ raro in dissectis ab eodem morbo occumbentibus occurrant. Enimyero sciendum est quicquid non perpetuo adest in corporibus apertis eodem

dem morbo exstinctis, ad primam id, intimamque ejus essentiam spectare non posse, uti etiam neque illud quod in variis corporibus reperitur, quibus morbus abest Neque enim morbus ipse exsistere potest separatus à sua essentia, neque essentia à morbo. Verum de his satis. Progrediamur jam ad ipsas observationes.

Observata hæc nostra Anatomica distinguuntur in ea quæ extrinsecus, nondum aperto corpore occurrunt; & ea quæ non nisi dissecto prius corpore se offerunt.

I. Prioris generis sunt hac, qua statim denu-

dato de functo exterius occurrunt.

proportio. Caput nempe justo majus, faciesque habitior respectu reliquarum partium:
Atque hoc quidem in omnibus hoc morbo
extinctis quos hactenus vidimus apparuit,
unico tantum excepto, qui simul cum hoc affectu suppuratos habuit pulmones, Phthisique confectus est. Hic vero habuit etiam
per totum ferme morbi decursum caput majusculum, faciemque pleniorem; atqui per
quatuordecim circiter dies ante obitum subito collapsæ sunt partes carnosæ circa caput.
faciesque Hippocratica reddita est, non sine
omnium assistentium propter subitam mutationem admiratione.

2 Membra externa, musculique totius

cor-

corpor

vel tab

(quant

TITES

brana

pen.

ret,

prac

pron

mo

ton

Observationum Anatomicarum hunc morbum spectantiam duo

genera,

corporis graciles & emaciati, quasi atrophia vel tabe absumti cermuntur. Atque hoc (quantum quidem scimus) perpetuo observatur in iis qui ab hoc affectu intereunt.

3. Cutis universa, tum vera, tum membrana carnosa & adiposa, slaccida & quasi pendula, laxæque instar chirothecæ apparet, ita ut multo plus carnium eas continere

posse putes.

oti-

ori.

que

itus

Veplas

tin-

na-

Chil-

IUM

faci-

im:

ruit,

hifi-

lam

m2-

put.

line

uta-

cor=

4. Circa articulos, præsertim in carpis & talis protuberantiæ quædam exstant, quæ si aperiantur, non in partibus carnosis aut membranosis sed in ipsis ossium extremis, præcipue in eorum epiphysibus radicari deprehenduntur. Quod si sorte has ossium prominentias lima radas, facile percipies eas esse ejusdem similaris substantiæ cum cæteris ossium partibus.

ternarum partium minus firmi ac rigidi, minus inflexibiles sunt, quam alias solent observari in desunctis, & speciatim collum post mortem vix riget à frigore, aut saltem mul-

to minus quam in aliis cadaveribus.

6. Pectus exterius macrum, & valde angustum, præsertim sub alis, & à lateribus quasi compressum conspicitur, sternum vero nonnihil acuminatum, instar carinæ navis, aut pectoris gallinæ.

7. Costarum extrema quibus cum carti-

laginibus sterni committuntur nodosa sunt, quemadmodum de articulis carpi & tali diximus.

aliquan

Arum!

til cert

temm

ction

hoer

6.

adfue

cont

utfu

na ac

M.

TAYUN

pleur

tame

hojust morb

8. Abdomen exterius quidem respectu nempe partium continentium macrum est, interius vero respectu contentarum nonnihil prominens, tumidiusculum sentitur. Atque hæc observavimus nondum reseratis ventribus.

II. Aperto abdomine hac porro notavimus.

I. Hepar in omnibus à nobis dissectis justo majus, alias autem non male coloratum, neque valde induratum aliove aliquo vitio notabili contaminatum. Excipienda hic volumus nonnulla corpora in quibus ante obitum alii morbi cum hoc implicati suerunt, quemadmodum in hydropico & extreme tabido meminimus.

2. Lienem ut plurimum (quantum nempe hactenus nobis vidisse licuit) non contemnendum, sive magnitudinem, sive colorem & substantiam ejus spectes, quamvis propter complicationem cum aliis morbis aliter accidere possenon negemus.

3. Aquam serosam in cavitatem abdominis elapsam aliquoties vidimus, sed neque frequenter neque eam valde copiosam.

4. Ventriculum & intestina nonnihil ultra morem sanorum statibus repleta, quæ ex parte caussa esse potest tensionis hypochondriorum supra memoratæ.

5. Me-

5. Mesenterium aliquando inculpature aliquando glandibus justo majoribus, si non Arumis affectum. Cæterum de pancreate nihil certi hic pronunciamus; suspicamur tantummodo posse hic nonnunquam obstructiones, si non scirrhum, accidere. Sed aliis

hoc relinquimus inquirendum.

chi ch,

At-

atis

別以

ais

M2-

quo

nda

anue.

ex-

npe

m-

lo-

nvis

rbis

mi-

gue

ul-

eex 011-

Me-

6. Renes, ureteres, vesicam, nisii alius adfuerit morbus, satis sanos. Notamus in genere de visceribus omnibus in hoc ventre contentis, quod licet partes ea continentes, ut supra monuimus, multum extenuatæ & emaciatæ occurrant, ipla tamen æque magna ac plena, si non majora & pleniora, ut de hepate dictum, quam in sanis deprehendun-

III. Detracto sterno in thorace hac sefe oftentarunt.

1. Adnascentia quædam pulmonum cum pleura quæ in omnibus quos hactenus diffecuimus plus minusve adfuit. Arbitramur tamen contingere posse hunc affectum sine hujusmodi coalescentia, licet ea in progressu morbi plerumque ante obitum superveniat.

2. Pulmonum infarctus non minus frequentes, præsertim inipsis partibus adnascentibus: Tumores item eorum duri à sanguine crassiori, viscidiori, & nonnihil nigricante nati, modo in uno, modo pluribus pulmonum lobis, non tamen hi semper

conspiciuntur, frequenter quoque absces-

mente

niftru

monu

BUS 1

1011

alis

arctas

tre,

tari p

inipl

Honn

patet

comp

tis firm

Lin

ties i

arot

fus, & empyemata.

3, Aliquis noltrum testatur se semel vidisseglandulas strumosas, tam numerosas, ut viderentur æquare, si non superare magnitudinem ipsorum pulmonum: sitæ autem suremunt utrinque inter pulmones & mediastinum, & à thymo usque ad diaphragma protensæ.

4. In cavitate thoracis vidimus aliquando aquas serosas collectas & frequentius quidem quam in cavitate abdominis, non ta-

men in omnibus.

5. Vidit & aliquis nostrum affectum hune complicatum cum magno empyemate, simulque phthisi: Amoto sterno, pulmones sinistri lateris toti abscessu occupati sunt, atque undique pleuræ adnati compresso leviter tumore, pus copiosum, subslavum, crassum, & fætidum per tracheam arteriam in ipfum os effluxit. Forum membrana exterior qua firmiter pleuræ adnati sunt, crassior apparuit solito, eaque mediante lobi istius lateris ita coaluerunt, ut vix in lobos distinguere potuisses: eadem etiam membrana tum pulmones, tum ipfum abscessum involvit, qua aperta in conspectum venit magnitudo abscessus, qui adstantium æstimatione continuit ad minimum lb.ii. puris: tantum abscessium in tantillo corpore merito

merito quis miretur? sed is totum ferme sinistrum latus occupavit, parenchyma pulmonum istius lateris corruptum erat, semiputridum, & pure quasi intertextum.

6. Thymus in puerili ætate semper magnus solet deprehendi, & sorte adhuc ma-

jor in iis qui ex hoc morbo intereunt.

IV. Cranio orbiculatim serra circumscisso, ejusque operculo sublato, hac observavimus.

pluribus locis quam solet in adultis, cranio adhæsisse: forte idem observari potest in aliis pueris hoc morbo non affectis, licet, ut opinamur, non tantopere; siquidem certum est in recens-natis multas esse, & arctas connexiones pericranii cum dura matre, quæ, postea abrumpuntur vix que notari possunt.

2. Inter duram & piam matrem, atque in ipsis ventriculis cerebri, serosas aquas in uonnullis à nobis dissectis reperimus; unde patet assectum hunc cum hydrocephalo

complicari posse.

ref.

lvi.

las,

nag-

tem

2012-

gma

uan-

ולונוג

1ta-

mut

nate,

mo-

unt,

016=

um,

arte-

nem.

dnati

nedi-

ZIV 5

tiam

nab-

tum

tium

. pu-

pore

erito

3. Cerebrum in aliis à nobis dissectis fatis firmum & inculpabile neque illuvie sero-

sa inundatum deprehendimus.

4. Et ultimo observavimus jam aliquoties in corporibus novissime à nobis apertis, carotides justa proportione ampliores suisse,

fimi-

similiter quoque venas jugulares; arterias vero venasque ad exteriores partes delatas

multo exiliores debito exstitisse.

An vero hoc perpetuum sit in hoc affectu nondum, ut nculati testes asserere possumus: suspicamur quidem ita se rem habere perpetuo, sed non venerat nobis in mentem id antea ab initio nostræ Anatomicæ circa hoc subjectum indaginis scrutari.

effenti

plicit

tions

net,

totiu

tione.

13 CON

quere

totiu

teritu

conft

fundar respect essenti tia; aldeficie

tius f

namp

ne to

nemb

His jam præmissis ad morbi hujus essen-

tiam investigandam properamus.

CAP. III.

Ad faciliorem inventionem essentiæ morbi, supposita quædam proponuntur. Primum de essentia sanitatis. Secundum de essentia morbi. Tertium de triplici divisione sanitatis & morborum. Explicatio tertiæ divisionis ususque ejusdem. Descriptio constitutionis naturalis, ejusdem exaltatio. Quartum suppositum de combinatione trium constitutionum in iis dem partibus.

U O clarius in hujus affectus essentia investiganda procedamus, supposita sesequentia utiliter præmitti posse duximus.

1. Essentiam sanitatis consistere in aliqua Primum.

constitutione corporis secundum naturam.

148

Con

US:

100

·13

tie

le-

Hæc autem cum duplex sit genere, altera tatis. essentialis & necessaria, respiciens to esse simpliciter, quæ durante vita sub variis affectionibus immobilis & immutabilis permanet, consistens in indivisibili; altera accidentalis, respiciens to bene esse, que respectu totius animalis mobilis & mutabilis est, magnamque latitudinem habet, & adesse atque abesse potest sine totius interitu; non consistit sanitas in priori, sed posteriori constitutione.

II. Essentiam morbi sinmiliter non consistere Secunin constitutione essentiali. Sic enim mox se- dum. De queretur interitus totius; sed in accidentali effentia morbi. constitutione, tali videlicet, que respectu totius addesse vel abesse potest sine ejus interitu. Diximus (non fine ratione) hanc constitutionem, in qua sanitas & morbus fundantur, esse mobilem & accidentalem respectu totius; potest enim hæc ipsa esse essentialis respectu alicujus partis, verbi gratia; abscisso digito oritur morbus in numero " " deficiente partium, qui quidem respectu totius fundatur in constitutione accidentali, nam potest vel adesse ille digitus vel abesse silenta ne totius interitu; at vero respectu ipsius nosta membri amissi fundatur in constitutione es-

De effen tia fani-

ien-

sentiali; posito quippe hoc morbo interit

fimpli

XUM P

CTTAT

polt II

quali

& du

DUS 2

ventu

trada

enite:

gradu

BUS (2

queq

lipoth ad ult

fonte

rat.

MT NO

Hac

perfit

ID OF

spirat est, a

ones

fecur

tiam

POD2

afe

essentia istius digiti.

rum.

mum mem-

brum.

III. Constitutionem, in qua consistit essentia Tertium. Detripli-tum (anitatis tum morbi, triplicem modum divione sani-sionis seu distinctionis in disciplina methodo admittere. Primus est paulo crassior & resolvitur in partes plane concretas, procedit morbonempe κατα τόπες secundum partium divisionem à capite ad calcem. Secundus pure abstractus est & rimatur omnia elementa constitutionis mobilis, unde morbi dividuntur in similares, organicas & communes; deinde varie subdividuntur in intemperies, vitia figuræ, superficiei, cavitatum & meatuum, magnitudinis, numeri, situs & continuitatis. Tertius modus quasi medius est, & licet hactenus neglectus sit, suum tamen ufum non contemnendum habere posse in

Explica-morborum tractatione, causarumque mortio tertiæ divisio- bificarum investigatione spondere audemus; est que in constitutionem naturalem, vitalem

er animalem.

Prima est propria & insita cujusvis partis, ei Ejus pricompetens absolute & sine dependentia ab aliis partibus quoad esse simpliciter: Hæc post mortem aliquandiu adhue superest donec per putredinem, ambustionem, simplicem exsiccationem, mummificationem, petrificationem, similesque violentas caussas dissolvitur. Constitutio hæc quoad suum esse fimsimpliciter, non dependet à membris influxum præstantibus; at quoad suum tum conservari tum operari ab iis dependet : Nam post mortem cessante influxu vitali (qui ejus quasi sal & condimentum est) brevi perit, & dum vivit animal, varie hac ab influxibus afficitur, unde ejus actiones vel promo-

ventur vel impediuntur.

in

US;

177

,0

Lis

01-

per

ex-

rifi-

41-

me

Secunda est constitutio vitalis, que per con- Secuntinuum illum influxum à corde per arterias in dum memuniversi corporis partes producitur. Hæc etsi brum. gradus admittat & secundum magis & minus sæpenumero variet, & interdum quoque quandam eclipsin pati videatur, ut in lipothymia, syncope, &c. à primo tamen ad ultimum vitæ terminum (faltem in fuo fonte & aliis nonnullis partibus) perseverat.

Tertia est constitutio animalis que à cerebro Tertium per nervos in organa sensus & motus derivatur. mem-Hæc fæpe in variis partibus plane deest superstite illarum vita; quinimo posset simul in omnibus partibus diu deficere, nistrespiratio, quæ ad vitam absolute necessaria est, ab ea dependeret. Hæ ergo constitutiones eam connexionem inter se servant, ut fecunda prioris, & tertia secundæ existentiam femper & continue in parte præsupponat, non autem viceversa ita absolute inter se dependent; quin (ut modo diximus)

prior

nervo

rum II

trovis

liquar

tive e

tem

ditur

nima

tutio

tend

& et

fanit alter

aut a

fueri

tur;

parte

Cun

XII C

& a

vel

res

prior aliquandiu sine secunda, & secunda fere omnino sine tertia subsistere queat. Atque hæ tres constitutiones in plerisque corporis partibus manifeste percipi possunt ; non tamen in omnibus eas inveniri dicimus. Naturalis quidem & vitalis nulli parti deeft; Animalis autem in offibus (licet de dentibus ambigi possit) cartilaginibus, forte ligamentis, & nonnullis parenchymatis, ut Hepatis, Lienis, &c. deficit. Quibus ergo facultas naturalis, vitalis, animalis communicatur, iis omnibus triplicem hanc constitutionem inesse asserimus. Etenim quamvis dictæ facultates quoad actum primum dicantur ab anima dependere (quæ relatio non spectat ad artem medicam) quoad actum tamen secundum necessario radicantur in aliqua materiali constitutione partium ad quas pertinent. Nam quod dicunt aliqui facultatem vitalem à corde, animalem à cerebro ad cæteras partes derivari, non id ita accipiendum est, quasi ipsæ facultates vago modo transeant à parte ad partes (à nullo quippe intellectu concipi potest accidentis de subjecto in subjectum migratio) sed quod cum & in spiritu vitali facultas vitalis à corde ad partes derivetur, aut saltem ex aliquo motu cordis & arteriarum in partibus ipsis excitetur, & similiter facultas animalis vel in, & cum spiritu animali per nervos

t;

ti-

go

1110

ti-

m-

at10

12-

20-

arti-

it a-

non

ates

5(2

icci-

tio)

STI-

ltem

par-

i per

nervos descendat, vel motu aliquo nervorum in cerebro in partibus producatur. Utrovis modo id fiat, necesse est fateamur aliquam alterationem sive ex spiritibus dictis, sive ex motibus in ipsam partem recipientem imprimi. Quæ alteratio ut hic conceditur esseradix facultatis, seu vitalis, seu animalis in respectivis partibus, ita est constitutio mobilis; siquidem varie immutari, intendi & remitti potest sine totius interitu; & est constitutio in qua consistere potest vel sanitas vel morbus, quandoquidem ubi illa alteratio partibus quibus debetur defecerit, aut alio modo quam oportet administrata fuerit, actio exinde læsa necessario sequetur; fin recte perficiatur, integra sanitas ex parte istius constitutionis adesse dicitur. Cum ergo præter constitutionem naturalem & insitum duo genera alterationum, alterum ab influxu cordis, alterum ab influxu cerebri in plurimis partibus inveniantur; & cum dictæ alterationes, quatenus ipíæ vel perfectiores vel imperfectiores sunt, facultates in respectivis partibus (saltem quoad actum fecundum) constituant perfectiores vel imperfectiores, adeoque actiones exinde læsæ vel integræ edantur, necesse est triplicem hanc constitutionem plurimis partibus inesse, dictaque genera alterationum esse constitutiones medicas

teriz

eorun

tamq

organ

fecun fpice.

imu

tution

nica

maxi

Ulus dictæ divifionis.

in quibus sanitas & morbus fundari possit. Quod dicta divisio seu distinctio non sit plane inutilis ex eo liquet quod Practici in suis methodis recte moneant, in morbis obscurioribus diligentius observandas esse facultates quarum actiones læfæ deprehenduntur, ut inde quasi manu ducamur ad originem morbi inveniendam; si vero tanti momenti sit impeditas in morbis facultates annotaffe, certe non minoris erit ipfas constitutiones à quibus dicta facultates immediate dependent, accurate considerasse.

Non co-

Sed ne quis putet hanc tertiam divisiocum pri. nem propemodum coincidere cum fecunda, observare poterit, si diligenter rem perpendere velit, quodvis membrum hujus divisionis quodam modo includere omnia membra proxime præcedentis: nempe constitutionem naturalem continere primario quidem constitutionem similarem, secundario autem & in ordine ad totum animal comprehendere quodam modo conformationem & continuitatem; fimiliter constitutionem vitalem & animalem suo modo participare de omnibus membris divisionis dictæ clarius est quam ut egeat probatione. Monendum tantum (quod & modo innuimus) naturalem constitutionem primario & præcipue respicere temperamentum qualitates communes (quas aliqui vocant modos materia) teriæ) & spirituum copiam peculiaremque corum dispositionem (quæ ad formam totamque substantiam à nonnullis referuntur) organizationem vero & continuitatem quafi fecundario & in ordine ad totum animal respicere, vixque aliter ab his lædi. Non dissimulandum tamen vitiari interdum constitutionem naturalem, quatenus mere organica est, ut in obstructionibus meatuum naturalium; exempligratia, ubi calculusin meatu ureteris aut urethræ impactus est, similibusque casibus. Atqui hoc accidit ei, maxime quatenus meatus ordinatur in ufum totius; ut plurimum autem vitia organica in conftitutione naturali minoris notæ funt quam vitia fimilaria.

Atque hac de triplici hac constitutione in genere confiderata sufficiant. Pauca nune

& paucis in specie de iis dicamus.

rio

0-

0-

15)

 $|x\rangle$

Constitutio naturalis que propria & insita, Descricujusque partis est, describi potest quod sit ptio conmodus quidem essendi naturalis, partibus nis natuinfitus, iis competens, quatenus suis tem- ralis. peramento & qualitatibus communibus, fua sufficienti portione ac convenienti dispositionespirituum insitorum, suaque justa conformatione & continuitate constituuntur aptæ ad actiones naturales concurrente una influxu vitali (& forte animali) perfectas edendas. Itaque ubi adfuit in parte aliqua justum

justum temperamentum, convenientes qualitates communes, justa proportio ac dispositio spirituum insitorum, demum justa ejus conformatio & unitas, atque naturalis ejus actio, nihilominus læditur, concludere licet eam non lædi ex parte constitutionis naturalis, sed ratione caussæ concurrentis, scilicet influxus seu vitalis, seu animalis seu utriusque. Enimyero naturales actiones in animalibus propter vitæ conjugium ad eminentiorem conditionem (quam alias per folam naturalem constitutionem attingerent) evehuntur. Atque hinc contingit, quod etsi constitutio naturalis in mactatis animalibus aliquandiu post mortem illæsa permanet, attractio tamen, retentio, coctio alimenti, & expulfio excrementi plane cessent. Et in morbis quoque sæpe illæsa primo constitutione naturali, actio tamen naturalis læsa editur ob solum defectum concursus influxus vitalis debiti: similiter aliquando constitutione naturali & vitali integris, læditur tamen actio aliqua naturalis ob defectum concursus alicujus animalis debiti; sed hoc fere accidit in solis partibus nervosis, sibrosis & membranosis, præfertim ubi cavitatem formant, non vero in partium parenchymatis. Ut in paralyli frequenter excrementa indebite retinentur cateris constitutionibus sanis ex solo stupore

III-

intelli

rim,q

dude

feviti

dzelt

radix

HET

feren

VILIAN

natu

us de

quis

guinis

inter

us pa

aut 1

non

fed fo

perie

dix

Tali

tipe

lis I

dote

Parte

tes

ac Ita

lis

re

nis

115,

In

Der

nt,

2ela

-02

ne

ela

ter

US

in

re-

intestinorum Itaq; in hisce casibus non starim, quod actio aliqua naturalis læsa sit, concludendum est constitutionem naturalem else vitialem primo, sed diligenter investiganda est ipsa constitutio primo læsa, quæ mali radix seu prima essentia æstimanda est; similiter læsa actione aliqua vitali non statim inferendum, constitutionem vitalem primario vitiari; siquidem interdum à constitutione naturali, aut forte animali prima origo rectius deducetur. Exempli gratia, Digitus aliquis ex intenso frigore sphacelo correptus esto: in hoc casu quidem verum est vitalissanguinis influxum plane intercipi; origo tamen interceptionis in naturali constitutione ipsius partis ita refrigeratæ quærenda est; similiter in convulsione forte nonnihil impeditur aut turbatur circuitus sanguinis: at prima læsio adscribenda est constitutioni animali non vitali, E contra in febre caput petitur, fed fons mali forte in constitutione vitali reperietur: Item eliquantur forte carnes omnesque vires naturales dejiciuntur; sed radix mali in constitutione vitali non in naturali invenietur: Adeo ut quælibet constitu- Quartio ex tribus dictis possit esse in aliis atque a- Trium liis morbis modo prima, modo fecunda, mo- constido tertia actionum læsarum caussa.

- IV. Non modo plurimas alias corporis convenir partes (imo simpliciter omnes sensibiles) iisdem

qua partibus

partes

omne

lapro

reper

prob

fum

perio

hit;

COD

MUS

ani

nece firm

DETY

feau

que !

qual

Don

dis

que influxum non præstant, neque ei deferendo inferviunt, sed præterea & cor ipfum & arterias omnes & cerebrum & nervos omnes triplicem hanc constitutionem naturaliter admittere, ita ut cerebrum (præter vitium in naturali sua constitutione) à Spiritu vitali qui per arterias venafque defertur, bene affecto juvari, male affecto lædi possit : Cor similiter ab influxiv animali per nervum recurrentem fexti paris; arteriæ quoque ab influxu animali per nervos modo forte hactenus in comperto; denique nervi à Spiritu vitali per arterias de-

CAP. IV.

Essentiam bujus morbi non consistere in constitutione Animali nec Vitali, sed Naturali, non qua Organica, sed qua similari : limitationes tres proponuntur.

Prima conclutio. Effentiam hure in con stitutiomali.

Is jam præfuppositis inquirendum est I in qua constitutione partium prima radix seu essentia hujus affectus statuenda sit. confifte- Sit ergo prima conclusio.

Prima radix hujus affectus non est in constine ani- tutione animali, seu illa que à cerebri influxu in pa7partes dependet. Equidem fatemur nervos omnes qui extra calvariam è spinali medulla procedunt, laxos & debiles in hoc affectu reperiri; non tamen id videtur hic primario à defectu influxus cerebri oriri; quod sic probamus, 1. Laxitas & debilitas nervorum primario à cerebro proveniens, semper fere somnolentiam comitem secum trahit; Atqui in hoc affectu symptoma hoc non solet observari nisi raro & per accidens contingens. 2. Nunquam quod meminimus, Paralysin, aut Apoplexiam huic affectui supervenisse novimus; deberet autem necessario, sæpius (saltem in morbo confirmato) evenire, si laxitas & debilitas hæc nervorum à defectu influxus cerebri originem duceret. 3. In multis post mortem diffectis cerebrum fatis firmum, & inculpabile deprehendimus. 4. Ut plurimum hoc affectu laborantes ingeniosi sunt pro ratione ætatis, quod Cerebri vim & vigorem luculenter atteftatur.

XU

144

eft

12-

fit.

mfri-

W III

141-

Secunda conclusio. Prima radix hujus af- Secunda. fectus non est in constitutione vitali, seu illa vitali. que à cordis influxu in partes dependet. Inæqualis quidem distributio sanguinis fere (si non omnino) perpetua in hoc affectu ob-Iervari potest; at prima tamen ratio hujus inæqualitatis non inæqualitati influxus cordis vel arteriarum, sed inæquali receptioni & apti-

& aptitudini ad recipiendum in partibus ipsis adscribenda est : Etenim Cor & Arteriæ ex parte sui indiscriminatim sanguinem cum spiritibus in partes quaquaversum diffundunt. Quod si contingat arteriam alicujus partis ob torporem istius partis, aut partium vicinarum impediri in actione sua, necessum est eo diminute sanguinem transmittat, adeoque inæqualiter respectu cæterarum partium expedite sanguinem recipientem. Itaque in hoc casu inæqualitas hæc distributionis primo & per se dependet à præexistente vitio extra arteriam ad naturalem constitutionem partium pertinere.

Objectio,

Sed objiciat aliquis : Licet forte inaqualitas pradicta non dependeat à Corde, accidere tamen posse ut debilis pultus sufficiat distributioni sanguinis per circulos minores in partibus interioribus, dum non aque sufficiat isti minori obeundo per circulos majores in partibus exterioribus longius à corde caloris

tonte remotis.

-ings va

Respons. Respondemus, tanti momenti penes aliquem è nobis fuisse olim hanc objectionem ut talem inæqualitatem influxus vitalis ad primam hujus morbi essentiam pertinere, existimaverit, primorumque adeo symptomatum rationem ab ea conatus fuerit deducere. Post secundas yero cogitationes, re

peni-

penin

æqu2

nam,

ferre.

2mus

affe8

mzq

& cal

DSICI

cula

tate

ini

(29)

penitius examinata, visum est ipsi, hancinæqualitatem influxus vitalis non ad primariam, sed secundariam morbi essentiam referre. Sed ad Argumentum solvendum redeamus. Et primo quidem concedimus in hoc affectu distributionem sanguinis vitalis esse inæqualem; atque in partibus interioribus, & capite esse liberaliorem, in exterioribus parciorem. Concedimus secundo posse circulationem sanguinis in interioribus partibus servari, nullo etiam apparente pulsu in partibus exterioribus; sed hoc contingit solum in extrema virium vitalium vel debilitate vel oppressione, ut in lipothymia, & validiori paroxysmo hysterico, in quo affe-Etu nonnullæ pro mortuis habitæ revixisse denuo visæ sunt. Concedimus tertio circulationem sanguinis liberaliorem esse posse in internis quam externis partibus, quin & in una aliqua externa parte præcæteris, ut in inflamatione alicujus externi membri accidit.

17.55 III-

oris

ali-

ere,

to-

ni-

His jam concessis, asserimus, in casuprimo inæqualitatem distributionis sanguinis, non primo dependere à debilitate virtutis pulsificæ quatenus cor spectat: Atque in promptu ratio est. Cor quippe, ut supra diximus, ex se indiscriminatim unoque tenore sanguinem in Aortam protrudit, etiam tum quando ejus pulsus maxime debilis est. Aorta quæ recepit exonerat se qua potest expedi-

tissime, atq; hinc sit quod sanguinis dissussion inæqualiter peragatur, prout facilius sanguis ex uno ramo & dissicilius ex alio impellitur. Inæqualitas tamen hæc non cordi primo, & per se, sed partibus recipientibus, arterissione particularibus transmittentibus adscribenda est. Assectus enim quivis in corde primarius necessario universalis est, & omnibus corporis partibus communicatus: quapropter etsi hanc inæqualitatem circulationis sanguinis in secundaria hujus morbi essentia concedamus, à primaria tamen excludimus.

Porro in casu secundo proposito dicimus magnam esse disparitatem inter casus extremæ necessitatis, & casus ordinarios; neque profecto scimus an in dictis casibus circuitus in interioribus, ut ut detur, sit alicujus momenti. Et quod ad præsens negotium attinet, negamus in hoc affectu eam esse cordis debilitatem, ut pulsus in externis deficiat; imo nondum observavimus quenquam hoc morbo laborantem facile in ecstasin aut lipothymiam incidisse, quod promte contingeret, si radix morbi in ipsius cordis debilitate stabiliretur. Præterea cum viderimus ægros in tenellula ætate, fine laplu virium ferre interdum liberalem sanguinis è fectis aurium venulis eductionem, imo & nonnunquam repetitis vicibus id actum com e

gation

rent 1

dix vi

pollit

prima

nis et

nz,

tuou

venti

quo c

tutio

doo

TAGS

Airus

10 0

men

net

Con

pros

fun

ergi

cum emolumento : Denique cum & purgationes, pro ratione ætatis, optime tolerent, non nobis liquet qui prima morbi radix vitalis constitutionis debilitati attribui

poffit.

Tandem in casu tertio evidenter patet. primam radicem inæqualis circuitus fanguinis esse dispositionem aliquam partis externæ, ut in membro inflammato, laborante nimirum privato morbo, plenior & impetuofior accidit pulfus ob calorem arteriæ adventitium, à parte scilicet externa plus æ-

quo calefacta impressum.

Quandoquidem ergo essentia hujus affe- Tertia? Etus neque in animali neque in vitali consti- re in natutione partium primario fundetur (ut mo- turali. do ostendimus) sequitur (quæ Tertia Conclusio esto) Essentiam primariam sive primam radicem hujus affectus consistere in constitutione propria, sive insita partium. Cum vero constitutio naturalis (ut supra diximus) partim in communibus qualitatibus & temperamento, partim in justa copia & dispositione spirituum insitorum, partimin organica constructione & continuitate consistat, proximum est, ut in qua, è dictis, constitutione, & an in una aliqua, an pluribus vel simul omnibus fundetur, investigemus. Sit constituergo Quarta conclufio.

Affectus hic non radicatur in organica par- turali

tione natium ganica.

115 20

impro

minus

nutri

przf

Hente

dixin

organ nica i

Quod plerur illas n cluder ficent di poi nata

dean

ctam

dequi deriv ction affect facie

hydr vitia

& no

temporis ipsa organa secundum suam confirmationem, quantitatem & situm variis
modis afficiantur, ut satis liquet ex aucta capitis hepatis, &c. mole, ex tumoribus ossium ad carpos, talos & extremitatis costarum; ex obstructionibus variis, externarumque partium extenuatione; cum tamen
hæc omnia ab altiori adhuc origine dependeant, ut ut in morbo confirmato varieque jam decomposito necessario hæc etiam
admittamus; in originali tamen essentia, ob sequentes rationes, censemus rejicienda.

Primo quod pradicta lasiones organica non statim in initio morbi appareant, sed postea paulatim succrescant; & licet forte horum non-nulla ab initio radicem in corpore posuisse dicantur; nondum tamen vel sensu immediate percipi possunt, vel ullas actiones manifeste lædunt, adeoque ad primam morbi

essentiam nequeunt pertinere.

Secundo, quod pradicta vitia organica non sint pracipuorum symptomatum qua ab initio in hoc affectu elucescunt caussa sed effectus potius. Etenim aucta moles capitis, hepatis, &c. protuberantiæ ossium, maciesque partium externarum, rectius ad inæqualitatem nutritionis, ut earum caussam referuntur, quam ut è contra inæqualitates nutritionis

actu

.0n-

ariis

Ca-

01-

Ata-

ma-

men

de-

yari-

ham

len-

-318

t Hone

p411-

1011-

iffe

mê-

m2-

orbi

4 1001

th in

tills.

&C.

tiom 100-

ntur, jonis illis illis adscribi possit. Nam ubi pars aliqua nimio opere excrescit, aliaque debito incremento defraudatur, necesse est ut non modo adsit, sed & præexistat inæqualis atque improportionata nutritio, qua illa plus, hæc minus justo alatur. Cum autem inæqualis nutritio sit actio læsa, adeoque symptoma præsupponens morbum aliquem præéxistentem, ipsa tamen (quemadmodum jam diximus) præcedat, ut caussa, dicta vitia organica, manifestum est dicta vitia organica non esse primam radicem hujus morbi. Quod attinet ad obstructiones, quæ revera plerumque cum hoc morbo conjunguntur, illas nihilominus à prima essentia morbi excludere par est, quod neque morbum specificent, nec ab illis ratio symptomatum reddi possit, neque certam aliquam determinatamque partem nobilem perpetuo obsideant. Conjiciat forte aliquis, qui ad au-Ccam magnitudinem jecoris respexerit, id perpetuo in hoc affectu esse obstructum, indeque vitiata sanguificatione cætera mala derivari; sed si tumor hic hepatis ex obstructione ejus semper contingeret, necessario affectum hunc comitaretur perpetuo pallor faciei, cachexia, & tractu temporis ipse hydrops, quinetiam color hepatis semper vitiatus deprehenderetur, tumoresque duri & nodi in ejus substantia, præsertim in mor-

bo inveterato, illoque qui ægrum interemit per diffectionem observarentur; at cum hæc non ita frequenter (nedum semper) in defunctis occurrant, aucta ejus moles ad irregularem nutritionem potius referenda est. Porro non dissimulamus in iis quos affectus hic è medio sustulit, ut plurimum, nos per anatomen observasse obstructiones, tumores varios, nodosque in pulmonibus; sed attestamur quoque infantes aliquos puerofque nos vidisse levius hoc morbo affectos, in quibus nulla suspitio suit vitiatorum pulmonum; nulla quippe tustis adfuit, nulla respirationis læsio, quæ necessario individua obstructionis in pulmonibus comes eft.

Tertio quod sufficiens ratio omnium symptomatum huic morbo propriorum, ex aliis fontibus clarius faciliusque derivari pos-

fit; ut mox videbimus.

Atque ita satis probavimus affectum hunc quoad primam sui essentiam non consistere in organica partium naturalium constitutione. Eadem argumenta essicacius evincant (pluraque accumulare liceret, si necesse id foret) assectum hunc non sundari in naturalium partium continuitate, ut pluribus verbis non opus sit id comprobare.

Conclusio quinta. Affectus hic fundatur primario in similari constitutione partium natu-

ralium,

CONT.

morbs fimila

ft, fe

reries

1200

qualit

qualit.

gis ar

certa

fpirit

le mo

cilen

frigida norpor infita

lente

mitte

Sit

被市

वेस !

terio

n,ut

disa

labor.

as ton

cera

valium, adeoque quoad radicalem effentiam morbus est similaris. Cum autem morbus fimilaris, qua talis, non perpetuo fimplex fit, sed aliquando varie compositus (intemperies nempe vel simplex vel composita, & hæc quidem talis fit non solum ex primis qualitatibus inter se, sed forte adjunctis una qualitatibus occultis, aut, quod nobis magis arridet præsertim in præsenti negotio, certa quadam proportione & modificatione spirituum insitorum) compositum hunc esfe morbum judicamus, primamque ac radicalem ejus essentiam consistere asserimus in frigida ac humida intemperie cum defectu & torpore spirituum insitorum in constitutione infita partium primo affectarum concurrentibus. Sed priusquam ad ulteriorem hujus fententiæ explicationem procedamus, præmittendæ sunt aliquot ejus limitationes.

Sit prima. Esse quasdam corporis partes ab Limitahoc morbo primario, esse alias secundario affe- ues. 1. ctas: & videntur quidem nobis partes exteriores prius affici quam cerebrum & viscera, ut fusius diducemus ubi de partibus affe-

ctis acturi fumus.

de-

re-ft.

tus

per

fed rof-

05,

ul-

1112

iyi-

nes

um

ex oof-

unc

ere

t10=

ant id

112-

161-

4197

Will,

Sit secunda. Solas partes primario affectas laborare notabili frigida intemperie cum mopia ac torpore spirituum : Nam cerebrum & viscera moderate sorte caleant, satisque spiritibus abundent ob copiosum vitalem influ-

xum;

xum; atque excedere in iis possit humiditas ob nimium alimentum assusum: reliquæ autem externæ frigida ac humida intemperie ac torpore spiritus naturalis, &c. semper assiciuntur, unde eas primario hic assici solasque esse sedem primæ hujus morbi essentiæ asserimus.

Sit tertia. Non omnes partes externas & primo affectas ex aquo laborare intemperie frigida & humida, vel inopia ac torpore (pirituum, &c. Etenim ligamenta, tendines & nervi, ex natura sua frigidiora sunt minusque humida, partes musculosæ sive carnosæ humidiores potius funt, at minus frigidæ; partes cutaneæ fere medio modo se habent, omnes tamen dictæ partes plus minus à naturali temperie versus frigidam & humidam recedunt. Et similiter licet aliæ partes è dictis majorem spirituum copiam & activitatem postulent quam aliæ, omnes tamen, habita justa proportione ad copiam & activitatem singulis respective debitani deficiunt, justaque proportione destituun-

CAP. V.

Examinatio sententia proposita per partes, 1. Morbumesse intem-

CEN

Upro

tempe

ta parti

gendac

mount

equo i

in tare

ex ave

ne. N

que co

infrie

polito

Confi

pe m

polt in inte

lates

(37)

periem frigidam. Object. & Respons. 2. Esse humidam. 3. Consistere in Spirituum inopia: Object, Resp. 4. In spirituum torpore.

Sed propius jam examinemus essentiam Morbum esse inpropositam, & per partes asseramus.

Laborare partes primo assectas in- em trigitemperie frigida probatur: 1. Ex imminu- dam.

rigi-

KIN,

ervi,

par.

natu-

idam è di-

Wita-

nen,

X 30

de.

uun-

pe.

ta partium dictarum nutritione. Ut enim calor insitus ad justitiam intensus plurimum conducit ad promovendam coctionem & appositionem alimenti; ita si is remissior æquo sit, eandem facile remoratur ac imminuit. 2. Evincitur eadem intemperies ex tarditate & ineptitudine ad motum: tuni ex aversatione motus quietisque affectatione. Nam quemadmodum activitas agilitalque corporis calori ita tarditas ejus ac ignavia frigori magna ex parte adscribitur; supposito nimirum, ut prius, non ab animalis influxus vitio hanc ignaviam dependere. 3. Confirmatur ulterius quod hic morbus sæpe morbos acutos sequatur, qui non raro (post absumptum caloris insiti subjectum) in intemperiem frigidam terminantur: præterea & morbos chronicos corpus extenuantes sæpius excipiat, & ejusmodi qui quo-

C 3 vi

vis modointemperiem frigidam post se relinquere proni sunt, ut obstructiones pertinaces, cachexiam, fcorbutum, &c. Adhæc quod intempestivam impetiginis aut scabici suppressionem sequatur, ut frequenter observavimus, quando rursus erumpentescabie atque pruritu excitato, indeque aucto in externis membris calore tales pueros facile restitutos vidimus; quod denique sæpe eveniat, post assiduum usum ciborum frigidorum, crafforum, viscidorum, crapulam, otium, similesque caussas evidentes, calorem insitum seu imminuentes seu obruentes. 4. Confirmatur quod auxilia quæ calorem in externis partibus excitant augent & fovent, ut variæ corporis agitationes, frictiones, illitiones, &c. non minimam partem curationis hujus affectus præstent. Hisce omnibus in cumulum conjectis fatis conspicuum sit, in morbi hujus primaria essentia frigidam intemperiem constitutionis insitæ partium primo affectarum contineri.

Objectio.

Objectio hic speciosa occurrit. Febriculam, prasertim lentam aut erraticam frequenter conjungi cum boc affectu qua non videtur consistere posse simul tempore cum intemperie frigida: Censetur enim ab omnibus febris omnis calida intemperies é diametro essentia dicta opposita.

Re-

Rel

bris int

przien

feinter

filtit ha

fita,

calore

Febris

elt, le

Se cui

ve all

prate tam a

monu

primo

tantu

pene

pote

temp

influe

direct

talist

quin

mane

Stual

qua lice

calio

fed fi

eg19.

erti.

Ad-

aut

uen.

pen-

e 201-

eros

e 2.

Mum

C12-

den-

s feu

IXIII2

itant

tati-

mi-

ectus

con-

nijus

nemi

ecta-

TICH-

Wen-

(00)-

fri-

ments

ditte

Re-

Respondemus (ne quid hic de essentia fe- Responsa bris interponamus) largimur, quantum ad præsentem quæstionem spectat, sebrem esse intemperiem calidam: non tamen confistit hac primo in constitutione partium insita, sed in constitutione vitali, nempe in calore influente præternaturaliter affecto. Febris enim non privatus aliquis morbus est, sed universalis & à corde per arterias in & cum spiritu vitali sive nimium accenso sive aliter vitiato diffunditur. Neque respicit præternaturalis hic calor intemperiem infitam aliter, quam ut caussa potens eam varie immutare, sed sensim & paullatim. Nam primo calor influens manifeste est calor actualis, at vero calor constitutionis insitæ tantum potentialis: quare asserimus intemperiem frigidam respectu caloris insiti & potentialis consistere simul posse cum intemperie calida respectu caloris actualis & influentis. Enimvero calor actualis non ita directe adversatur frigidæ intemperiei, quæ talis dicitur ob defectum caloris potentialis, quin satis diu cum ea consistere possit permanente caussa. Exempli gratia, calor a-Etualis consistit in calfacta aqua simplici, aqua hordei, in Julapiis variis & fimilibus, licet tum etiam potentia, frigidis. Adeo ut calida actu, & calida potentia non gradu, sed specie inter se differant, neque sint ita è dire-C 4

directo contraria ut statim se mutuo è subjecto exterminent. Porro secundo intemperies influens calida non tam corrigit insitam intemperiem frigidam, quam
per accidens auget, dissipando scilicet ac
absumendo spiritus insitos, in quibus potissimum calor insitus & potentialis residet: Ad eum plane modum quo calor actualis ab igne prosectus potentialem vini calorem imminuit. Unde febris cujusvis generis huic morbo superveniens plus
damni quam emolumenti ægris adserre
solet.

Asserimus in partibus primario assectis simul adesse intemperiem humidam; hoc patet ex laxitate & mollitie dictarum partium: atque signum hoc eo sortius rem evincit quod dictæ partes extenuatæ sint, ut nisi redundaret in iis humiditas, rigiditas quædem & asperitas tactum serirent; deinde rarissime intemperies frigida sive humida diu persistit: demum juvantia & lædentia idem attestantur, siccantibus quippe juvantur, humectantibus læduntur.

Asserimus partibus primo assectis inesse spirituum insitorum inopiam. Probatur hoc primo iisdem serme argumentis quibus supra intemperiem frigidam adstruximns. Nam primo inæqualis & imminuta nutrit

inopia

enim

retur,

jungi

pecca

fectu

temp

DIVIS

pertn

TT2 2

tempo

peries

di .

infito

facile

fenti

poffi

pacta

affect

& pli

que h

gineo

man

da

quan

mali

litor

m

-12 co

2-

-ivi

ILS

ell

tis

100

um

tus

atæ

135,

eri-

191-

111:

211-

12-

10-

004-

qui-

uta

III-

nutritio in partibus primo affectis non modo temperamenti frigiditatem, sed & una inopiam spirituum insitorum arguit; aliter enim defectus hic nutritionis facile corrigeretur. Etenim frigiditas cum qua non conjungitur spirituum desectus, aut humor peccans impactus, ejus causa facile excutitur, citiusque quam in præsenti solet affectu, ut videre est in partibus hyberno tempore perfrigeratis; verbi gratia, ex nivium contrectatione; partes quippe sic perfrigeratæ, modo rite tractentur, intra aliquot horas ad pristinum redeunt temperamentum; Ubi vero adest intemperies cum materia ejus causa conjuncta, aut simul adest defectus spirituum infitorum, taiis sane intemperies haud ita facile aut cito removetur. Verum in præsenti affectu non semper saltem caussari possumus materiam conjunctam aut impactam alicujus notæ in partibus primo affectis, cum ex flaccidiores, inaniores & plus æquo extenuatæ observentur, cumque hic affectus longe distet à morbo virgineo & cachexia, in quibus ut plurimum, noninopia spirituum, sed conjun-Cta materia frigidam intemperiem fovet: quare recte inferre licet pertinaciam hujus mali maxime dependere à spirituum insitorum desectu. 2. Idem eodem modo

probatur secundo argumento supra allato pro intemperie frigida, nempe ab ignavia & aversatione motus. Activitas enim non tantum à temperie, sed vel maxime à copia spirituum dependet : Ut videre licet in viris robustis & sanis, spiritibus refertis, qui hyberno tempore rigente gelu promptiores longe & alacriores ad violenta exercitia conspiciuntur, quam æstate, quando spiritus insiti nonnihil exsoluti esse solent. 3. Febres morbique longi & extenuantes, ut intemperiem frigidam sæpe inserunt, ita & evidenter minuunt dissipantque spiritus insitos. Hisce mediis addimus illud argumentum à constitutione parentum deductum. Firmiores (experientia teste) ac solidiores parentes laboribufque assueti raro proferunt liberos huic morbo obnoxios: debiliores è contra, cachectici, aut aliter valetudinarii. otiofi, molles, delicati, Veneri nimiæ, præmaturæ aut decrepitæ indulgentes, gonorrhæa laborantes, &c. plerumque liberos in hoc malum propensos generant : nimirum, quod seminalia principia minus ju-Ha spirituum copia imbuta sint. Procedendum jam foret ad affertionem quartam, nife quod hic occurrat remora removenda.

Objiciat quippe aliquis insitam intemperiem frigidam subordinari spirituum inopiæ, non vero contradistingui, ut hic supponi-

tur.

tur. detu

live

relp

run

cto

revi

tus,

lime

infit

alim

cific

25 Q1

non

fevi

Objett.

tur. Nam paucitas spirituum ipsa caussa videtur frigidæ intemperiei, insitusque calor five intenfior, five remissior fequi videtur respective proportionem spirituum insito. rum; quippe qui in iisdem ut primo subjecto radicari creditur.

Respondemus primo, Calorem insitum Resp. revera fundari atque primo subjectari in spiritibus infitis. Porro ut calor infitus in duas partes distinguitur, calorem scilicet nativum & acquisititium; ita & spiritus insitus duplex est concipiendus, primogenius five feminalis in spermate à parentibus derivatus, & acquisititius ex perfecte assimilato alimento contractus. Prior spiritus, caloris insiti nativi est basis, posterior, caloris insiti acquisititii. Non hosce calores spiritusve inter se esse specie plane distinctos volumus; sed origine tantum ac perfectionis gradu, quod, ut variam fortiantur appellationem, sufficit. nam in nutritione assimilatio alimenti procedit usque ad identitatem specificam, non individualem, quanquam alias quoque gradum perfectionis originalis non attingat. Propterea nobis hic fatis fuifse visum est nominasse calorem insitum & spiritum insitum fine ulteriore distinctione; ideoque concedimus calorem insitum fundari & subjectari primo in spiritibus, eundemque nihil aliud esse quam modificatio-

è :i,

11ifi

涩,

W.

figi

mm

tere

Hech

comp

tuum

irigi

que

cella

titas

men

am

fitz

luo

tum

t12,

nem quandam dictorum spirituum qua à calore vitali irradiati placide nituntur se diffundere atque ampliare ditiones suas attrahendo, retinendo, assimilando similia sibi alimenta, excernendo excrementa, disponendo denique acquisita in sedes debitas. Dicimus quoque nixum hunc (in quo caloris essentiam ponimus) cum sit dissussivus, nonnihil dissipare atque absumere spiritus insitos, qui hujus essectus caussa vulgo nomine humidi radicalis à calore continue de-

patti appellantur.

Atque huc usque argumento cedimus. Verum 2 loco afferimus calorem insitum à calido temperamento infito differre; quod nimirum calor insitus sit tantum una pars calidi temperamenti insiti. Non enim solus spiritus, sed & sulphur & sal aut bilis forte, suum calorem contribuunt ad constitutionem totius calidi temperamenti infiti, cujus calor infitus est una tantum pars. Quaproter falso in argumento proposito suggeritur solam caussam calidæ intemperiei esse copiam spirituum, frigidæ eorundem paucitatem. Nam lb j. carnium infantis plures continet spiritus insitos quam lb. j. carnium juvenis: notissimum tamen est temperamentum juvenis longe calidius esse quam infantuli. Calidum ergo temperamentum non dependere potest à sola copia spirituum, nec frigidum à sola eorum inopia. Quin etiam in multis morbis calida imtemperies consistere potest cum paucitate spirituum, ut in Hectica tertis gradus; similiter frigida cum competenti alias spirituum copia, ut in

morbo Virgineo.

Dicimus tertio ut copia vel inopia spirituum non perpetuo sufficiens caussa est determinationis temperamenti ad calidum aut frigidum; ita vicissim, neque calidum, neque frigidum temperamentum certo & necessario demonstrat copiam vel inopiam spirituum quemadmodum ex instantiis datis liquet: ita ut nec temperamentum certum sit sig num quantitatis spirituum, nec quantitas spirituum certum signum temperamenti; & propterea deindustria non sine justa caussa separatim hæc ut contradistincta consideranda & examinanda veniunt, si certam & inconsusam horum notitiam assequi libet.

Respondemus quarto quod etsi, ut concessum, calor insitus in spiritibus insitis subjectetur, non tamen secundum solam copiam vel inopiam spirituum intenditur is vel remittitur: Spiritus enim ut ut satis copiosi, si tamen nimis sixi sint, torpidi, & quasi gelu quodam constricti, nullum calorem insitum alicujus notæ proserunt. Exempli gratia, albumen ovi spiritibus copiosis turget,

tor-

COD

ria i

in fl

Dis, 11

torp

tran

tum

conti

Jus.

quo

torpo

in co

can,

tatem

Cerev Simil

expri

nens facta

fo fe

Spiritt ration

lor inde tam exiguus est, ut non aggrediatur pulli formationem, priusquam vel per incubationem vel alium consimilem calorem excitetur. Licet ergo certo concludere considerationem inopia spirituum satis distinctam esse à temperamenti frigidi insiti consideratione, contra quam videtur ab objecto Argumento insinuatum. Porro ex hoc quarto responsi articulo resultat quarta assertio de essentia proposita, videlicet,

Præter intemperiem & inopiam spirituum addendum esse torporem quendam eorum ut distinctam quoque partem essentiæ morbi. Torpor hic insitorum spirituum maxime elucescit ex imminuta nutritione & aversatione motus non proveniente primo ex defectuinfluxus cerebri, ut supra probatum est. Item ex eo manifeste cernitur, quod ea omnia quæ torporem spiritumm insitorum excutiunt, nec tamen eos plane discutiunt, plurimum conferunt ad hujus morbi curationem : Ut exercitia cujusvis generis gradatim aucta, frictiones, inunctiones, &c. Et interius calefacientia, purgantia, incidentia, aperientia benigna. Quod autem torpor hic fatis sit distinctus ab inopia spirituum, præter id quod supra in tertio responsi Articulo diximus, satis ex eo liquet, quod sæpe cum inopia spirituum conconjungatur nimia excitatio torpori contraria: ut frequenter accidit in febre hectica,
in fluxibus colliquantibus & similibus morbis, in quibus ut ut adsit spirituum penuria,
torpor tamen nullus comitatur, quin contra nimia illa excitatio & propensitas ad motum coercenda est.

E contra copiosi spiritus cum torpore consistere possunt, ut in tritico aut farina ejus. Nam etsi parum spirituosum videatur, quod ejus spiritus adhuc in sua sixatione ac torpore delitescant, re ipsa tamen abundant in eo spiritus & simplici fermentatione evocari, atque ad suam manifestandam activitatem excitari possint: quemadmodum cerevisiæ fortiores ex eo consectæ declarant. Similiter ex uvis immaturis succus recenter expressus satis mitis & blandus est, continens interim spiritus copiosos, qui postea, sacta debita fermentatione, in vino generoso se produnt.

Concludamus ergo torporem quoque spirituum in hoc affectu distinctam conside-

rationem demereri.

US

na.

110

00

on-

CAP. IV.

Pars prima in hoc morbo affecta.

Proposuimus supra primam hujus more bi essentiam; inquirendum jam restat

guiner HOUGH

Yant.

non

dum a

alique

fituti

bueno

ment

cos,

hepat

existin

A2 211

conce

quenti

fam (

Duun

Conc

effe of

TO OTT

oneh

MO 2

Emen

cochio

Extite

Cund

etian

ami

in primum subjectum in quo ea radicatur.

Cor & Cerebrum videntur hic recte ex-Non Cor cludi ob rationes supra adductas, quas brevi-& Cerebrum. tatis studio repetere omittimus.

Hepar & Pulmones nondum ab omni suspitione hujus vitii exempti sunt. Examinabimus ergo seorsim hæc viscera, & primo quidem quærimus.

An hepar fit subjectum prima effentia hujus

An hepar Etum primæ effentix hujus quæ atdeant,

morbi? Præcipuum pro affirmativa argumentum sit subje- est, quod morbus hic videatur provenire ex læsa sanguificatione, cujus officina (saltem probabiliter) jecur existimatur, læsam autem sanguificationem esse primam hujus morbi Rationes originem multis indiciis manifestum reddi videtur. I. quod hic morbus plerumque vam sua- subsequatur ejusmodi alios morbos magnos, five acutos five chronicos, qui utcunque vim sanguisicam hepatis multum prius labefactarunt. 2. quod morbus hic non modo ab externis, sed & ab internis caussis dependeat, ab humoribus nempe vitiosis. autem vitiosi humores in & cum massa sanguinis in hepate generentur, videtur prima morbi essentia huc referenda. 3. Observatur hepar perpetuo in hoc affectu majus debito, quod manifeste hepar esse affectum testatur. 4. Medicamenta interna quæ sanguiguinem depurare apta nata sunt, ad curationem requiruntur, & exhibita multum juvant. 5. Missio sanguinis è venis aurium (non infirmum ad morbum hunc debellandum auxilium) satis superque arguit vitium aliquod sanguinis adesse, quod hepatis constitutioni, qua sanguisicat, videtur esse tribuendum. Argumenta hæc tanti sunt momenti penes nonnullos celeberrimos medicos, ut primam essentiam hujus morbi soli hepati adscripserint.

Nos vero satis ad hæc responderi posse Earum existimamus, si prius quidem quæ recte dicta aut ulterius in hanc rem dici possunt, concesserimus, deinde quæ invalida conse-

quentia inferuntur, restrinxerimus.

em

di di

105,

que

De-

odo

en-

um

211-

ma

TV2-

de-

nte-

211-

gui-

fam sanguinis vitiatam esse, indeque continuum somitem huic morbo subministrari. Concedimus quoque in præsentiarum hepar esse officinam sanguisicationis: negamus vero omnia vitia sanguisica dependere. Nam primo sanguis vitiari potest à vitios ingestis alimentis, jecore alias integro; similiter si coctio prima in ventriculo ex quavis causa extiterit impersecta, non plene ea per secundam coctionem corrigi potest in hepate etiam quam maxime sano. Præterea, etiams generatio vitiosi sanguinis soli hepati

adscribenda esset, ad ejusdem tamen generati conservationem aliæ partes necessario concurrerent, puta Renes, Lien, Pancreas, Uterus, &c. Imo & videtur negari non posse omnes partes, quas sanguis suo circuitu perluit eum varie alterare, dum qualitates suas ei pro capacitatesubjecti imprimunt: nam ea agentia naturalia funt, quæ agunt ex necessitate & continue sine interveniente otio, quantum quidem possint : si ergo hæ male sint affecta, sanguinem eas permeantem magis vel minus inquinant, ut videre licet in contagio ex contactu externo ad partes internas communicato. Quinetiam magna pollutio interdum à partibus cæteris morbolis infinuatur sanguini, hepate interim falvo, ut nonnunquam in hydropicis post mortem dissectis observatum est, in quibus hepar fatis fanum integrumque deprehensum est. Porro concedimus vitia fanguinis frequenter à læsa constitutione fanguifica hepatis originem ducere, illamque læsam constitutionem esse morbum hepatis; negamus vero hunc esse morbum de quo agimus, cum tota specie ab ea differat. Eadem enim læsa constitutio hepatis æque adultis ac pueris & infantibus communis eft; hic vero morbus solis infantibus & pueris proprius est. Tandem concedimus vitiosam constitutionem hepatis generando vitiosum fan-

metem h ne: nega de quo v mz esse ducere

laguint

effe de priam ean morbi, folum; ofa con

adultis, que hæc demus

metho

pe fequences.

fanguifi partes e frigidas facile o fornites

dane p

tum di intern

n quod

ario

cre-

non cui-

lita-

un;

unt

ente

sho

ean-

dere o ad

tiam

teris

ntepicis

in,

de-

vitia

one

2111-

nhe-

n de

rat.

eque

seft;

ueris

ofam

lum

201

fanguinem posse caussam communem & fomitem huic morbo aliquando fubministrare: negamus vero eam esse morbum ipsum de quo verba facimus, aut ullam partem primæ essentiæ ejusdem. Aliud enim est producere caussam morbi communem, aliud esse de prima morbi essentia : negamus etiam eam esse continentem caussam hujus morbi, aut esse caussam sufficientem per se folum, aut esse semper caussam: Nam vitiosa constitutio hepatis, qualiscunque ea supponatur, non producit hunc affectum in adultis, neque forte semper in puerulis. Atque hæc in genere ad argumentum respondemus: ad confirmationes ejusdem simili methodo jam procedimus.

- pe sequi alios morbos sive acutos, sive chronicos. Sed non tam quod constitutionem sanguisicam hæpatis læsissent, quam quod partes externas, spiritibus insitis exhaustis, frigidas & torpidas reliquissent: quamvis sacile quoque admittamus læsum hepar somitem mali ex vitiosa sanguisicatione præstare posse.
- 2. Concedimus hunc affectum non tantum dependere à causis externis, sed & ab internis, vitiis nempe ipsius sanguinis: quod vero vitia illa omnia in hepate origi-

D 2

nem

arum!

mare d

cere, D

tisexte

ternis (

tan cu

tamen

lentian

factum.

nem h

jam n

mediu

I,

mat; a

is qua

[pecific

olos it

tos, q

tur, c

tionis.

teneræ fio fan

potest ultis;

morbi do hic

quam

citur

durat.

nem ducant, plane negamus ob rationes modo allatas.

3. Concedimus in hoc morbo auctam esse molem he patis; atqui eam esse primam morbi essentiam negamus ob rationes supra notatas, ubi vitia organica à prima hujus morbi essentia rejecimus. Admittimus tamen hunc similesque morbos in secundaria hujus assectus essentia, ut postea videbimus.

4. Concedimus medicamenta interna tum alterare tum depurare posse sanguinem, verum in præsenti affectu eo nomine potissimum ad curationem conducunt, quod facilitent distributionem sanguinis ad membra externa, attenuando ejus partes crassiores & incidendo viscidiores, quodque simul copioso & benigno spiritu sanguinem imprægnent, unde fit, ut insiti partium prius languentium spiritus foveantur, augeantur, & exsuscitentur. Interim agnoscimus generalebeneficium, quod toti corpori accedit ex depuratione fanguinis sive per secessium, vomitum, mictionem, sive alios qualescunque evacuationis modos. Tantum id est quod asserimus, magis specificam partem curationis à medicamentis prædictis præstari per viam alterationis, quemadmodum dictum eft.

5. Et ultimo concedimus sectionem ve-

ones marum in auribus sanguinem nonnihil attenuare & ad ejusdem renovationem conducere, nec non ad ejus distributionem ad partes externas, & avocationem à partibus internis ejus copia oppressis, adeoque ad totain curationem multum facere: Negamus tamen recte ex eo inferri primam morbi elsentiam in hepate radicari. Atque ita satisfactum putamus rationibus in confirmationem hujus sententiæ adductis. Argumenta jam nonnulla quæ contrarium suadeant in

medium proferamus.

mam

tu-

rima

mtti-

terna

nem,

tiffi-

faci-

mbra

101es

1 CO.

præ-

s lan-

1,8

nera-

ditex

, VO-

cun-

d eft

rtem

pra-

Dania

n ve-

arum

1. Prima essentia morbi morbum speci- Negativa ficat; atqui læsa constitutio sanguisica (qualis qualis ea concipiatur) morbum hunc non specificat. Enimyero cum morbus hic ad folos infantes & pueros pertineat, oportet cos, qui contrariam sententiam amplectuntur, certum aliquem modum læsæ constitutionis sanguisicæ hepatis designare, qui soli teneræ ætati sit proprius : Atqui nulla læfio fanguificæ constitutionis hepatis fingi potest, quæ non sit quoque communis adultis; quare si in ea consisteret prima hujus morbi estentia, observaretur saltem aliquando hic morbus in adultis, quod tamen nunquam à quopiam factum.

2. Subjectum primæ essentiæ morbi afficitur, tamdiu illa essentia quamdiu affectus durat. Neque enim morbus existere potest

abl-

medio

mole

fum

non to

morb

tizh

da &

tuum

enum

CIUS

timo

hic

um 1

62

absque sua prima essentia, neque potest illa essentia de parte in partem migrare. Si ergo hepar sit subjectum primæ essentiæ hujus morbi, per totum ejus decursum afficeretur; quod tamen non credibile videtur, cum in desunctis ex hoc morbo & dissectis, jecur, excepta ejus aucta mole, sæpe secundum cæteras conditiones inculpabile deprehendatur.

3. Si hepar sit subjectum primæ essentiæ hujus morbi, necesse est, ut indies aucto morbo gravius & evidentius affligatur, & certe ante obitum manifestis stigmatibus notetur. Quandoquidem enim omnis morbus naturæ partis, quam oblidet, contrarius sit, eam quotidie magis magisque atterit damnisque novis auget: & licet principia morborum sæpe satis sint obscura, progressu tamen temporis, (& maxime fi ad extremum vitæ diem perennent) evidentissima vestigia partibus primario obsessis imprimunt; adeo ut vix fieri possit quin in dissectis primo intuitu deprehendantur: Quamvis etiam ubi in morbum aliquem chronicum per dissectionem corporis ex eo defun-Eti inquisitio instituitur, sæpe ejus investigatio difficilis reddatur ob alios morbos ante obitum spervenientes vel alias complicatos; pars tamen primo affecta nunquam non graviter & manifeste læsa observari solet.

illa

ergo

ujus

tur;

nin

cur,

um

nen-

ntiz

uâo

&

ibus

nor-

irius

terit ipia effu

tre-

im2

pri-

ifle-

am•

oni-

tun-

efti-

311-

lica-

uam ifo-

let.

let. Cum ergo in iis, quos hic morbus è medio sustulit, sæpe satis sirmum, excepta mole aucta, vel certe non insigniter læ-sum deprehendatur, sacile erit inserre, non id esse subjectum primæ essentiæ hujus morbi.

4. Si hepar esset subjectum primæ essentiæ hujus morbi, laboraret intemperie frigida & humida, tum inopia & torpore spirituum insitorum ut ex supra-dictis satis liquet. Atqui in præsenti assectu hepar non semper laborat intemperie frigida, ut nec inopia ac torpore spirituum insitorum. Etenim in hoc affectu cum sanguis vitalis parcius ad membra externa distribuatur, fit, ut uberius, quam par est, ad viscera, præsertim cerebrum, & hepar, affundatur; & cum hic fanguis, qui per viscera tam propinqua Cordi circulatur, sit valde calidus & spirituosus, utpote è foco & sonte spirituum vitalium jam jam profectus, fieri non potest ut frigidam intemperiem aut desectum spirituum in partibus, quas tam copioso affluxu alluit, permittat.

faciei satis floridum genasque rubentes, quod in frigida hepatis intemperie aliquan-

diu durante contingere vix potest.

6. A læsa constitutione hepatis sanguisica reddi non potest sufficiens ratio sympto-

D4

ma-

diffict

tto pt

durina

primo

morb

ellen

affect

um pa

3. T

yarne

morb

mmis

contin

freque

bus is

dum

tam r

prim

duri p

trum

fableo

diverti

int.

Dam D

folet

coqui

parte

pac in

matum huic morbo propriorum. Cacotrophia quidem, seu vitiosa nutritio, & atrophia seu diminuta nutritio forte non injuria hepatis culpæ sæpius attribuuntur; alogotrophia vero, seu improportionata nutritio, ad hepar immediate referri non potest. Hepar etenim universis partibus æqualiter & sine discrimine sanguinem conficit, neque uni parti uberius, alteri parcius eum dispensat. Porro debilitas omnium musculorum, aversatio motus, assectatio quietis, cum hepate nihil commercii habere videntur; quare neque hepar primam hujus morbi sedem agnoscimus.

7. Hic morbus in robustioribus pueris curatur aliquando solo exercitio, lusu, jactatione & frictione corporis; quibus excitatur in externis partibus calor, spiritus novi suscitatur, excutitur eorum torpor, & alimentum uberius ad membra externa attrahitur, quæ certe beneficia magis proprie ad partes externas quam ad hepar accommodantur.

An pulmones fint subjectum primæ essentiæ hujus morbi.

Atque hac quæstione sic soluta, pergimus ad alteram; Utrum viz. Pulmones sint subjectum prima essentia hujus morbi?

Symptomata, quæ affirmativam suadere videntur, sunt angustia pectoris frequens, diffi-

difficultas spirandi, asthma, tussis, inslammatio pulmonum, eorum tubercula, tumores duri, apostemata, denique phthisis. Verum primo angustia pectoris non statim abinitio morbi oritur, & propterea nequit de prima essentia hujus morbi testari. Similiter difficultas spirandi & asthma non perpetuo hunc affectum comitantur, ideoque ab iis indicium partis primo affectæ defumi non potest. 3. Tuffis modo adelt, modo abelt, sæpiusq; varie intenditur & remittitur, dum essentia morbi in eodem statu persistit; quod & plurimis ex prædictis quoque symptomatibus contingit. 4. Inflammatio pulmonum non frequenter hic adest; atq; ubi accidit, morbus is acutus est, non chronicus, quemadmodum hic, de quo agimus; ut à symptomate tam raro & tam fugaci nihil certi de parte primo affecta concludere liceat.5. Tumores duri pulmonum, tubercula, apostemata, ut & strumæ possunt præcedere, concomitari & subsequi hunc affectum; sed morbi hi plane diversi sunt generis ab eo, de quo sermo est; quin & adultis æque ac puerulis communes funt. Tandem pthisis non nisi post diuturnam morbi hujus durationem supervenire solet, remota esse maniseste appareat, adeoque parum aut nihil conferre possit ad partem primo affectam detegendam. Ad hæc inseparabilia illa & cunctis notissima lym-

TIS

mas d

trin a

ergo

partil

debe

tis pt

poso

item

à pri

[pon

offin

tudin

Diorb

morb

elleo

ad ef

9000

morb

iftere

quali prima

tem i

105 II

plica

CIIDO

den

1020

Ca DII

fymptomata hujus morbi, puta impotentia partium externarum ad motum, & inæqualitas nutritionis, nulla ratione à pulmonibus affectis deduci possunt: quare viscus hoc pro prima hujus morbi sede admittere non possumus. Atque ita tandem ad partes primo affectas indigitandas devenimus.

Partes primo affectæ quæ.

Primum locum méreri videtur spinalis medulla calvariam egressa: secundum, nervi omnes ab eadem producti; tertium, omnes partes membranofæ ac fibrofæ ad quas nervi isti deferuntur. Et in hisce partibus primam hujus morbi essentiam radicari. statuimus, neque alias partes his associare opus esse existimamus. Enimvero mollities, laxitas, atque atonia totius spinæ extra calvariam, omnium nervorum inde ortorum, omnium fibrarum universi corporis, adeoque impotentia ad motum, segnities quietisque affectatio, quæ à primis etiam hujus morbi initiis se produnt, satis superque evincunt partes hasce frigiditate, desectu actorpore spirituum esse affectas; atque hinc contingit extenuari eas minusque quam par est, ali. Etenim torporem suum extremitatibus arteriarum nonnihil communicant, unde affluxus sanguinis qui ad eas di-Aribuitur, imminuitur; & quia frigidiores sunt defect:uque spirituum laborant, affusum sanguinem imperfectius coquunt, ut eas mi-

nus debito, minusque cæteris partibus nutriri adeoque extenuari necesse sit. Primam ergo hujus morbi essentiam jure meritoque

partibus hisce solis adscribimus.

on

alis

er.

ad

ar-C2-

cia-

ili-

ctra

rto. TIS,

ties

1am

-130

efe-

tque

uam

tre-

uni-

s di-

10165

dam

sml-THE

Dubitari tamen hic potest, annon ossa intereas etiam inter partes primo affectas numerari accendebeant, cum tumores offium variis in lo-fenda. cis præsertim in epiphysibus offium ad carpos & in extremitatibus costarum, ubi cum sterni cartilaginibus committuntur, statim à prima invasione morbi observentur? Respondemus negari quidem non posse dictos offium tumores cum ratione auctæ magnitudinis, tum ratione figuræ vitiatæ revera morbos esse, adeoque ossa vel ad essentiam morbi primariam vel fecundariam referenda esse concedimus: At vero ea non pertinere ad essentiam morbi primariam ex eo liquet, quod dicti offium tumores à prima hujus morbi essentia dependeant, camque præexiltere supponant. Oriuntur enim ab inæquali partium nutritione quæ symptoma est primæ essentiæ hujus morbi. Quomodo autem inæqualis nutritio ab essentia prima hujus morbi dependeat, suo loco plenius explicandum; ubi nempe ratio essentiæ secundariæ reddenda est. Hic tantum ostendemus illos offium tumores recte deduci ab inæqualitate nutritionis, quando videlicet ca nimium est aucta in partibus tumentibus

dem

DHADA

iam funt

ftun

multi

tuber

mate

form

tur qu

legiti

T12 1

milin

quoli

natur

man

fital

ma a

felte

Itt 2

quod

gene

12 2

DUS

nere

ptun

mila

respectu caterarum. Id hoc argumento probatur, quod partes offium protuberantes qua similares ejusdem plane sint speciei cum cæteris offium partibus; quare necesse est, ut per eandem viam generationis proveniant, qua cæteræ augentur & crescunt. Quandoquidem ergo reliqua ossa augeantur nutritione, id est, per intus assumtum alimentum sibique assimilatum, pari certe quoque ratione & hæc offa incrementum suum (etsi ἀλογ @ & præter modum mensuramque) acquirere judicandum est. Dicas tumores fere ex vitiofo fucco non alimentario & legitimo folere generari. Fatemur quidem id plerumque verum esse, sed plerumque tantum. Nam & quidam tumores ex legitimo & alimentario succo proveniunt, ut carunculæ, fungi & strumæ forte nonnullæ; sed & hi quoque tumores multum differunt à præsenti ossium protuberantia. Etenim tumores isti, quos excrescentias appellare consuevimus, aliquid extra habitum partis, & quid toto genere præter naturam præ se ferunt : hi tumores non excrescunt extra habitum partis, neque aliud præter naturam includunt quam solam magnitudinem improportionate auctam, vitiatamque inde figuram affectarum partium. Nam alias non essent hæ protuberantiæ ejusdem

dem speciei cum reliquo osse, eui continuantur, quod sensuum experientiæ re-

pugnat.

ex

1111

ne aft

am

2M

EIR

Si igitur dentur tumores nonnulli (etiam inter istos qui plane præter naturam funt & extra habitum partium consistunt) ex succis alimentariis geniti, certe multo minus intellectu difficile est, protuberantias hasce offium è legitima offium materia à facultate insita nutritiva generari formarique. Atque hoc clare eo confirmatur quod offa secundum naturam similarem legitime nequaquam producantur ex materia illegitima, hoc est, indisposita & dissimili materiæ aliorum offium fimilarium. Ex quolibet ligno non fit Mercurius. Agens naturale disponit materiam priusquam formam introducere potest. Materia sic disposita legitima quoque necessario est. Materia autem offium protuberantium manifeste est disposita; aliter enim non reciperet actu formam offis specificam. Porro quod à facultate nutritiva hi offium tumores generentur, etiam evidens est, quod nulla alia in corpore nostro detur vis ossifica præter illam nutritivam facultatem offibus ipsis insitam, & quod tumores hi generentur & augeantur per intus assumptum alimentum, & ab ipsis ossibus assimilatum ; licet forte respectu totius offis hæc

hæc alimenti receptio sit inæqualis, caussaque sufficiens erroris nutritivæ sacultatis, quo ex una parte plenius atque in tumorem, ex alia parcius ista ossa augeantur.

tates (

Super

tellig

næ,

fueve

quod

gantu

Clant

laxita

fing

turge

ZVIL

fingul

mera

profe

fula

ter fe

fultar

filiti

Certas

Inter

recel

rutro

trarin

Parti

in ho

CAP. VII.

Secundaria bujus morbi essentia.

Bfolutis tum prima ac radicali hujus morbi essentia, tum partibus primo affectis, examinanda jam porro venit essentia, si quæ sit secundaria, quæ nempe morbum hunc immediate consequitur. Atque hic in memoriam revocanda est triplex constitutio superius asserta, Naturalis, Vitalis, Animalis, & per se hasce singulas constitutiones procedet examen. Et primo quidem consideremus naturalem constitutionem. Hanc supra consistere docuimus in Temperamento, qualitatibus communibus, copia & dispositione spirituum insitorum, in organizatione, & continuitate: Et quidem in temperamento & copia ac dispositione spirituum insitorum primam morbi essentiam fundari adstruximus: reliquæ autem partes hujus constitutionis, puta, qualitates

tates communes, organizatio, & continuitas

superfunt adhuc percurrendæ.

Per qualitates communes easdem prope in- Qualitatelligimus quas alii nonnulli modos mate- tes comriæ, alii qualitates secundas appellare confueverunt. Vocamus autem has communes, quod nulli soli elemento aut formæ adstringantur, sed quodammodo expatientur per omnia corpora eaque fere plus minusve afficiant. Ejusmodi sunt, Densitas, raritas; consistentia, fluiditas, tenacitas, friabilitas; laxitas, tensio; (seu potius tensitas, ut distinguatur habitus ab actione) flacciditas, turgescentia & rigiditas; mollities, durities; lævitas, asperitas. Sed animus non est singulas qualitates communes exacte enumerare, neque etiam jam citatas ulterius profequi, nisi quatenus præsens occasio postulaverit.

E qualitatibus nonnullis communibus in- Tonus ter se complexis videtur Tonus partium re- partium sultare. Tonus enim partium proprie con- confifist in debito tenore sive mediocritate inter stat. certas communes qualitates oppositas, ut inter densitatem & raritatem, &c. Quodsi recessus fiat à justa mediocritate versus alterutrum extremorum, tonum plus minus vitiari necesse est. Duo ergo hic circa Tonum partium inquirenda videntur: primum, An in hoc affectu tonus partium sit ullo modo

vitiatus: deinde an Toni vitia pertineant ad

tim F

compr

OCCULT

bilign

tiz five

aliarun

HOTUN

11

Tono

tem ha

tra mer uz enir

ce part

maniti

ctarum

Cunt

opus.

III

primo

mollit

coinci

lities

aut fo

ties d

affect.

secundariam hujus morbi essentiam.

Quod ad primum attinet, non opus erit singulas partes toni sigillatim percurrere; satis erit eas saltem examinasse, quæ criminis

suspectæ videntur.

Laxitas Toni.

I. Ergo occurrit evidens Laxitas Toni in hoc affectu, differt autem hæc Laxitas tum ab infirma cohærentia partium, tum à Paralytica refolutione. Nam infirma cohærentia sive labefactata tenacitas partis facile quidem sit occasio laxitatis, cum partem tendi vix ferat; at vero potest pars simul & laxa & satis esse tenax, ut in fidium chordis videre est, quæ remissæ laxantur, servata interim tenacitate suæ substantiæ. Et frequenter in dissectis observavimus partes ipsas laxas satis suisse tenaces, idque aliquoties in hoc ipso morbo. Quare distincta qualitas est hæc laxitas à vitiata partis tenacitate. Neque etiam minus differt ab illa resolutione partium quæ occurrit in membris Paralyticis. Etenim Paralysis consistit primoin læsa constitutione animali: hæc vero laxitas radicatur in constitutione naturali. Neque enim hic adest vera Paralysis sive respectu motus, sive respectu sensus partium; neque etiam cerebrum primario hic affectum est, ut supra demonstravimus. Porro quod in hoc affectu adfit laxitas nimia partium

tium primo affectarum adeo manifestum est, ut supervacaneum ducamus id ulterius comprobare. Nam & ipsis sensibus obvia occurrit, & propterea eam infra inter morbi signa retulimus. Sive enim sit pars essentiæ sive secus, modo in sensum maniseste occurrat, rationem signi induit respectu aliarum partium essentiæ à sensu remotiorum.

II. In hoc affectu non tantum laxitas in Flacci-Tono adest sed & flacciditas. Qualitas au-ditas tem hæc aliquid amplius comprehendit ultra meram & simplicem laxitatem: connotat enim insuper inanitionem quamdam unde partes in se quasi subsidunt. Talis autem inanitio & subsidentia partium primo affectarum in hoc morbo sensu quoque dignoscuntur, ut ulteriori probatione non sit

opus.

tad

ent la-

mis

un

tum

212-

en-

cile

en-

1 12-

rdis

Vata

tre-

rtes

100-

002-

ota-

116-

bris

pn-

rero

rali.

ene.

um;

affe-

OTTO

p21-

1UM

III. Mollities quoque in Tono partium Mollitiprimo affectarum in hoc morbo nominari es Tonipotest. Equidem contingit interdum ut mollities cum prædictis qualitatibus non coincidat; sed quid aliud includat aut excludat, ut in Tumore suppurato adest mollities, sed absque laxitate toni, inanitione aut subsidentia. In dato etenim casu mollities dependet maxime à terminationis modo & læsa tenacitate partium. Ast in hoc affectu fere coincidit cum laxitate ac Hac-

flacciditate antememoratis, ut non opus sit eam accuratius quam nomine tenus distin-

8 29 Subject

mtro-

nitent

labric

Quo

fimila

mens Eteni

funt

perh

ttanti

tout milar

qualit

hac i

mim

liter oble

totan

que ir

matu

pleru

quale

YENIT

librio

poru

grad

conc

facco

guere.

Lubrici-

IV. Accidit insuper & aliud vitium in tas inter- Tono partium primo hoc morbo affectarum, & est nimia Lubricitas interna. Miretur forte aliquis quid sibi velint illa verba, Lubricitas interna. Fatemur equidem nos defectu vocabulorum coactos effe hanc appellationem fingere. Enimyero cum in natura ejulmodi qualitas re vera existat quæ hactenus & à Philosophis & à Grammaticis neglecta nomine caruit, eam nos nobis libertatem lumplimus, ut propter magnam affinitatem, quam cum superficiali corporum lubricitate habet, nomen idem cum distinctivo interna Epitheto adscriberemus. Duplicem ergo in corporibus naturalibus, agnoscimus lubricitatem; Alteram externam & superficialem, quæ quidem consistit in lævore & æqualitate superficiei, cujus ratione subjectum ejus alia corpora, quæ contingit facile, sine multa attritione ac renitentia præterlabitur. Atque huic lubricitati contraria est asperitas superficialis. Sed hæ dux qualitates huc non spectant, cum sint organicæ, neque ullo modo ad Tonum partium pertineant. Altera lubricitas, cujus mentionem facere occœpimus, consistit in interno illo, profundo, & similari lævore she

111-

IC-

tba,

ap-

D2.

quæ ati-

obis

nam

PO-

'um

nus,

ous,

73,483

t in

rati-

con-

eni-

stati

the

fint

nun

(11-

fiftit

ore

8

& æqualitate corporis, cujus ratione tota subjecti ejus substantia facile alia corpora intro-lubeuntia fine multa attritione ac renitentia præterlabuntur. Et huic quoque Inbricitati datur interna asperitas contraria. Quod autem detur talis lubricitas interna & Afferitur similaris, ut & asperitas ei opposita innu- lubricimeris fere instantiis facile monstrari potest, tas. Etenim mucilagines pene omnes lubricæ funt, idque non tantum quoad extimam fuperficiem, sed & intus & universam substantiam in qualibet earundem particula; adeo ut, secundum definitionem corporis similaris, quælibet particula ratione hujus qualitatis sit similis toti, ideoque qualitas hæc interna est & similaris, perque totam intimam subjecti substantiam diffusa. Similiter asperitas ejusmodi similaris & interna observari potest in fructibus immaturis, per totam nempe eorum substantiam carnemque internam protensa. Adepta vero justa maturitate in locum jam dictæ asperitatis plerumque succedere solet lubricitas talis qualem modo descripsimus. Notandum hic venit, corpora hæc interne seu similariter lubrica, si forte illinantur superficiebus corporum alias asperis, lubricitatis quendam gradum, quamdiu adhærent, iis eatenus conciliare; similiter eadem intus assumta ut fuccos, lubricos, mucilaginem althæz,&c. lu-

lite ary

rum no

tatem

agimus

Atq

na feu

POTTO

morbo

te aqu

ciantu

verill

in par

mum

per far

conju

maliu

nima

gis el

junio

C25.

tur bu

am e

feltum

ale ce

libric

adbox

hilce

tur n trahu

U cu

Inbricitatem quandam internis corporis meatibus communicare; quin non tantum meatibus cavitates internas spectantibus, sed plus minusve ipsi substantiæ partium corporis similari, quam ipsam quoque sanguis lubrico isto succo imprægnatus perluit.

Ea multiplex est

Est autem hæc interna lubricitas multiplex. Oleosa seu pinguis, Aquosa, Spirituosa, Salina & forte terrestris. Oleosa maxime conspicua est in pinguedine animalium, imprimis juniorum, & in oleis multis expressis, præsertim humidioribus & frigidioribus, ut & temperatis; quemadmodum cernere licet in oleis semin. papav. semin. pepon. 4. femin, frigid. maj. amygd. dulc. lini. & fimilium. Aquosa nonnihil reperitur in ipia aquasimplici, licet ob fluiditatem minus emineat: item evidentissime observatur hæc lubricitas in mucilaginibus, &c. Spirituosa forte nunquam fola occurrit, atqui cum aquosa mixta frequentissime, ut in spermatibus omnium fere animalium, & fructibus maturis. Salina quoque simplex rara est, quamvis eam fali tartari inesse quis contendat. Salina autem mixta frequens obvia est, ut in sapore & sale tartari cum aqueis & oleosis soluto. Terrestris (etiam mixta) vix observatu digna est, nisi quatenus concurrit ad aliqualem fluidorum inspissationem, ut in

luto argillaceo & terra fullonum soluta. Ve- Talem rum nos hic maxime respicimus ad lubrici- tatem in tatem aquosamut quæ sola in affectu, de quo hocaffe-

agimus, criminis rea esse potest.

ne.

16-

fed

an-

et-

lti-

0/4

onpri-

fis,

, ut

li-

4.

22-

s e-

TEC

w/a

112-

211-

bus

eft,

en-

)V12

158

VIX

mit

um

uto

Atque hæc in genere de lubricitate interna seu similari sufficiant. Inquirendum jam porro restat, utrum partes primo in hoc morbo affectæ interna seu similari lubricitate aquosa ultra debitam proportionem afficiantur, Et primo quidem videtur omnino verisimile adesse talem nimiam lubricitatem in partibus dictis, quod humiditas in iis nimium abundet, quæ lubricitati dictæ semper favet, five cum calore five cum trigore conjungatur. Norunt omnes spermata animalium quanto magis humida funt quam animalia ex iis producta, tanto quoque magis esse lubrica: similiter carnes animalium juniorum quam seniorum magis este lubricas. Cum itaque adeo intime connectantur humiditas atque hujus generis lubricitas; cum etiam in partibus primo affectis manifestum sit nimiam adesse humiditatem, facile certe concedi potest in iisdem partibus lubricitatem una nimium abundare. Atque ad hoc non parum facit torpor spirituum in hisce partibus. Etenim spiritus ubi exaltantur nonnihil acrimoniæ & asperitatis contrahunt, ut cernere licet, ex collatione musti eum vino vinoso veteri aut cum spiritu vi-

E 3

currere.

ni vel aqua vitæ. Musti quippe spiritus vere dici possunt torpidi ac sopiti, si conferantur cum spiritibus vini veteris; & quanto sunt torpidiores, tanto quoque plus lubricitatis, tantoque minus acrimoniæ ac asperitatis in se continent. Unde patet torporem illum spirituum in partibus primo affectis favere etiam nimiæ lubricitati: Torpor enim spirituum in diccis partibus ejusdem fere gradus est cum torpore spitituum in musto. Et quia in partibus primo affectis spiritus deficiunt, patet hanc lubricitatem esse nimis aqueam lubricitatem. Porro laxitas, flacciditas, & mollities, huc insuper conspirare videntur. Nam fructus immaturi ut duri funt, ita dum maturescunt, molliores evadunt, simulque lubricitatem internam acquirunt, similiter relaxantibus balneis laxantur partes, & una magis lubricæ evadunt. Item lubrica intus assumta, ut mucilago althæ, &c. non laxant modo partes, sed & meatus lubricant, unde in calculo cum successu propinantur. Præterea hæc partium primo affectarum lubricitas multum confirmari videtur eo quod in hisce post mortem dissectis manifesta lubricitas intus tactu deprehendatur, atque ex iis compressis mucilagineus quidam cruor intus eas oblinens digitis emungatur. Tacemus quod cutis externa ut plurimum in hoc affectu lubrica, raro aspe-

La

11 2d t2

terius a

plus das adferre

rem qu

tum II

yentila

An

PATSE

re viti

(2, YE

que hi

tus,

pnin2

fitum

que

nim (

iplis p

iffin

Hing

US Cal

prop!

more

Cit,

Dun

pars effen

ra ad tactum occurrat. Notatu saltem dignum est, nimis lubrica medicamenta seu exterius admoveantur, seu interius assumantur plus damni quam emolumenti in hoc affectu adferre solere. Atque ita absolvimus prio- Eam esse rein quæstionem de modo, quo tonus par- partem tium in hoc affectu vitiatur. Sequitur altera effentize ventilanda.

morbi.

An Tonus eo modo quo dictum fuit vitiatus sit

pars essentia hujus morbi?

unt

ere

Ta.

Et

lefi-

\$2-

vi-

unt,

, li-

, fi-

tes,

-וזטו

XC.

lu-

pro-

of-

vi-

ctis

nda-

neus

ISP-

na ut

De-

12

Supponimus hic quod quicquid in corpore vitiatum reperitur, sit vel caussa morbisica, vel symptoma, vel morbus ipse; adeoque hic morbus vel simplex, vel compositus, vel compositi pars aliqua, eaque vel

primaria vel secundaria.

I. Dicimus tonum vitiatum supra propo- Non situm non esse proprie morbi caussam. At- caussam. que hoc vix indiget probatione. Tonus enim dictus est constitutio præter naturam in ipsis partibus radicata, qua ratione evidentissime à caussa morbifica proprie dicta distinguitur. Licet enim morbus alius alterius caussa esse possit, non tamen vel tunc, proprie appellatur caussa morbifica, sed morbus primarius, alterque, quem producit, secundarius. At vero ubi uterque in unum morbum totalem coalescit, prior erit pars essentiæ primaria, posterior vero pars essentiæ secundaria.

E 4

· II. Af-

Non iympto-

II. Asserimus tonum partium descriptum non esse merum symptoma. Neque enim is sub excretis & retentis, neque sub actione læsa, neque sub qualitate aliqua mutata non lædente actionem comprehendi potest. I. Tonum vitiatum non contineri fub excretis & retentis, vel fub actione læsa, eadem opera probari potest hac ratione, quodilla fymptomatum genera ne constitutiones quidem corporis fint; at dictus tonus vitiatus extra controversiam est constitutio præter naturam mutata, quemadmodum fupra liquido demonstravimus. 2. Quod tonus dicto modo vitiatus non contineatur sub qualitate mutata non lædente actionem adeo evidens est, ut probatione non egeat. Nam laxitas & flacciditas motum partium lædit, & lubricitas nimia debitæ irritationi vitalium spirituum impedimento est, ut postea patebit.

Objici potest quasdam nudas qualitates mutatas, quæ in genere symptomatum continentur, posse etiam actiones lædere; ut color mutatus in cuticula ingratum aspectum intuenti præbet, adeoque deformitatem & defectum debitæ pulchritu-

dinis parit.

Respondemus, colorem mutatum cuticulæ quatenus pulchritudinem ejus (quæ propria cuticulæ actio est) vitiat, in rigore fub

fub noti dere. tantum or mut ulque ir

bidefin que in classe n conting ladere

nea eve morbo cundari lumdig

tratus a non per ptomat

appella III. nec cal

men (morbu manife

mm tor turam, mmed

petitde fit cor eo quo Quod

diri-

eque

ie fub

liqua

hendi

tineri

nelz.

tione.

littu-

tonus

m lu-

od to-

ir fub

nad-

geat.

tum

ations

t, ut

ita.

oma-

3 2-

1912-

ede-

ritu-

cuti.

QUE

gore

(ub

fub notione morbi (in lata acceptione) cadere. Verum cum actio hæe cuticulæ fit tantum objectiva & ad extra, & cum is color mutatus nullam actionem internam istiusque individui lædat, medici, qui in morbi definitione ad actiones internas ejusdemque individui tantum respiciunt, eum è classe morborum solent excludere. Vel si contingat colorem partis vitiatum alicubi lædere actioneminternam(quodinfola cornea evenire compertum) omnino eum pro morbo cordationes habent, licet forte fecundario. Quare, ut in viam, à qua paullutum digreffi fumus, redeamus, cum tonus vitiatus lædat, ut diximus, actiones internas, non pertinet proprie ad istam speciem symptomatis, quæ qualitatis mutatæ nomine appellari folet.

III. Dicimus tonum hunc vitiatum, cum nec caussa sit morbifica, nec symptoma, & tamen sit quid præter naturam, necessario esse morbum ipsum. Porro idem confirmatur maniseste ex ipsa morbi definitione. Est enim tonus hic vitiatus constitutio præter naturam, actionem internam lædens primo seu immediate; est ergo morbus. Cui enim competit definitio, ei & competit definitu. Quod sit constitutio præter naturam, liquet eo eo quod solidis corporis partibus inhæreat. Quod idem quoque actionem internam

ES

lædat, ex eo patet, quod datis sola laxitate, flacciditate, & lubricitate partium ultra modum, mox nulla alia accedente caussa debilitetur agilitas, vigorque corporis respectu motus, segnities que quædam in spirituum vitalium irritatione emergat. In agilitate res est manisesta, cum corpora sirma atque tensa cæteris paribus agiliora sint & è contra; in segnitie quoq; irritationis idem evniere, postea suo loco videbimus, si quidem impresentiarum nihil aliud allaboramus probare, quam tonum vitiatum in hoc assectu esse morbum.

IV. Dicimus Tonum hunc vitiatum in præsenti affectu non esse morbum quendam simplicem, seorsim & per se existentem, sed ita esse cum essentia primaria in iisdem partibus conjunctum atque compositum, ut tota essentia morbi (de quo agimus) ex pluribus morbis (in se quidem si feparatim considerentur, simplicibus) unitis dicatur conflari, adeoque tonum vitiatum esse tantum partem totius affectus. Atque hoc non alia indiget probatione, quam quod in issdem plane partibus essentia prima superius proposita, dictusque tonus vitiatus comperiantur. Morbus enim compositus is proprie dicitur, qui ex pluribus simplicibus in eadem parte conjuctis conflatur.

V. Asserimus Tonum vitiatum non modo

effe

ale pa

tem qu

t12,200

fitions

tenda

Co

tortec

diate v

præle

tus la

licet,

tum ai

partis

tum,

DUS D

neutr

ferre

conft

bitot

面片

qui qu

cund

rolur

Yeat

XIta

poft

tem

esse parté totius essentiæ, sed talem esse partem quæ nonnihil depedet à primaria essentia, adeoque esse partem essentiæ secundariæ.

Priusquam procedamus ad hujus propositionis probationem duo concessa præmit-

tenda funt.

18

m

m

112

do

fle

Concedimus I Tonum dictum in aliis forte casibus ab aliis etiam caussis & immediate vitiari posse, licet id non eveniat in præsenti morbo. Nam tonus partium insitus laxari potest primario in constitutione animali, idquesubito, ut in Paralysi videre licet. Tensitas enim naturalis (& non tantum animalis) membri paralytici laxatur, & quidem subito citraque notabilem alicujus partis primariæ essentiæ prædictæ interventum. Similiter in Lipothymia laxitas omnibus partibus & languor subito contingit. In neutro casu possumus laxitatis caussam referre ad frigidam ac humidam intemperiem constitutionis insitæ, cum illa non adeo subito tam infigniter immutari possit. Quod illi (ut hoc obiter moneamus) considerent, qui qualitates hasce communes semper secundas & à solis primis dependentes esse volunt. Immo è contra in isto casu observent frigidam ac humidam intemperiem laxitatem eam subito introductam paullatim postea consequi. Porro quod ad flacciditatem partium attinet (quæ subsidentiam re-Ipispicit qua differt flacciditas à laxitate, ut latius supra ostendimus) ea immediate produci potest à largis evacuationibus, ut sluxu alvi, sudoribus, similibusque supra modum prosuss, nondum insigniter immutato temperamento, quamvis non dissiteamur hoc sacile & ut plurimum consequi. Tandem lubricitas interna maniseste à frigiditate separari potest, licet difficulter ab humiditate.

Concedimus II in præsenti morbo ne quedem omnimode Tonum vitiatum dependere ab essentia prima data, nequé omni ex parte eidem subordinari. Nam I. qualitates toni hic vitiati nonnihil etiam debent communibus caussis, scilicet tum sibi, tum primæ essentiæ datæ communibus. Nam humectantia nimium, una eademque opera & humiditatem nimiam, & laxitatem producere apta nata sunt. Similiter ab evacuationibus nimiis inopia spirituum & simul flacciditas emergunt. Item à nimium lubricis seu extra applicatis seu intro assumtis, aut utrisque, interna lubricitas simul cum intemperie humida intenditur. Tanta enim concatenatio est totius essentiæ hactenus propolitæ cum communibus causis, ut vix quidquam intendat primam effentiam morbi, quin simul plus minus influat in tonum vitiatum.

His

His

præler

tiam

morbi

hic re

tonun

tiam !

putet

dari i

elle pe

las (U

IS MOS

dinaf

volve

effed

morb

lacipi

dem

daci,

nem

to pr

臨る

men

nec

eam

quide

His concessis, dicimus nihilominus in præsenti affectu maximam esse dependentiam toni vitiati ab essentia prima hujus morbi superius data; quo solo respectu, tonum vitiatum ad effentiam secundariam hic retulimus. Si cui placeat contendere tonum dictum alio respectu clarius ad essentiam secundariam esse rejiciendum, quod putet primariam essentiam cujusvis morbi similarem necessario & semper sundari in solis primis qualitatibus; aut quod opinetur qualitates in quibus tonus consistit esse perpetuo secundas, easque primas solas (ut umbra solet solem) consequi; sciat is nos hic de industria quæstiones hasce declinasse, ne in enormem digressionem devolveremur.

ter

de-

112-

ent

IM

era

-01

112-

oul

ori-

aut

Im

nus

VIX

His

Restat igitur solum probandum magnam esse dependentiam toni vitiati à prima hujus dentia morbi essentia; Idque per partes satagemus. toni vi-Incipiemus à laxitate. Concessimus equi-prima dem laxitatem interdum subito posse pro- hujus morbi esduci, atque in eo casu humidam intempe- sentiariem sæpius eam consequi, nempe ubi laxitas primario dependet à vitio constitutionis aut animalis aut vitalis; in præsentitamen affectu cum nec constitutio animalis nec vitalis primo afficiantur, necesse est eam ab aliis caussis promanare. Porro, ea quidem est conditio laxitatis ac tensitatis,

ut subitis alterationibus obnoxiæsint. Fila enim barbiti in momento fere tendi, iterumque laxari possunt; idem quoque sibris partium à nonnullis caussis accidit. Verum in hoc morbo laxitas gradatim ac sensim obrepit; oportet itaque hic eam à causa aliqua sensim ac gradatim aucta oriri, regi, ac modificari. Etsi ergo modo concessium fuerit laxitatem nonnihil debere communibus morbi causis; regitur tamen ac modificatur ejus augmentum potissimum à primaria hujus affectus essentia. Nam humectantia licet una laxent, vix tamen amplius laxant quam humectant, siquidem maxima ex parte humectando laxant. Cum itaque communes caussæ hujus morbi potissimum mediante essentia morbi prima in Tonum influant, & cum neque constitutio animalis neque vitalis hic causæ vicem sustineant, re-Ete inferre licet laxitatem toni maxime dependere a prima essentia hujus morbi. ulterius confirmatur, quod in humida intemperie ex se insit tendentia quædam corporis ad diffluendum, adeoque ab ea necesse est laxari fibras partium; præterea defectus spirituum eorundemque torpor vigorem partis minuendo ejus tonum remissiorem efficiunt. Concludamus ergo in hoc affectu laxitatem morbosam maxime dependere à primaria morbi estentia. Quod ad flacciditatem

tatem

tatem

t25 :

quand depen

fitoru celce

um. fubfid

tione

hilce

nifefti

obser

nem e

morb

ta,

curfe

Eten

rantes

adhu

greff

com

fari

Diam

tinge

Onu

que

grada

tatem attinet, quatenus comprehendit laxitatem, ab iisdem causis oritur quibus laxitas: quatenus vero ulterius subsidentiam
quandam & inanitionem includit, evidenter
dependet à desectu & torpore spirituum insitorum; quorum copia & vigore auctis slaccescens membrum facile redditur turgidulum. Interim non negamus quin simul ista
subsidentia ex parte dependeat ab extenuatione & atrophia partium.

Denique quomodo lubricitas à caussis hisce proveniat satis ex superius dictis ma-

nifestum redditur.

ila

ite-

2110

um

ali-

ac

DE-

DUS

tur

in-

ant

al-

m-

ne-

111-

alis

116-

de-

Id

10-

-100

effe

cons

rem

nef-

ectu

cidi-

atem

Ut tandem huic rei finem imponamus, observare licet in ulteriorem confirmationem eorum quæ jam diximus, eam esse toni morbosi dependentiam ab essentia prima data, ut pari fere passu per totum morbi decursum simul intendantur ac remittantur. Etenim in principio Pueri hoc morbo laborantes, tantum tardius incedunt dum parum adhuc laxatus est partium tonus; in progressu vix pedibus aut segniter admodum se committunt; deinde sedentes solum aut gestati ludunt; postea vix erecti sedent, demum morbo jam ad fummum gradum pertingente debile collum vix fustinet capitis onus, ut sæpe ante obitum cernere licet; quæ omnia ut effentiam morbi primariam gradatim auctam, ita & una toni vitia pari paflu passu intensa attestantur. Atque ita hisce omnibus recte perpensis, referimus tonum vitiatum ad essentiam hujus morbi, non primariam sed secundariam, & per consequens concludimus, quod quidem erat in quæstione, tonum illum morbosum esse partem essentie hujus morbi secundariam.

CAP. VIII.

Essentia secundaria hujus morbi in constitutione vitali.

Supra proposuimus illam partem essentiæ Secundariæ hujus morbi quæ sundatur in constitutione naturali insita, quatenus comprehendit qualitates communes: adhuc restant ejusdem vitia organica, ut & continuitatis, si quæ talia reperiantur, examinanda. Verum cum nulla vitia continuitatis propria in hoc assectu occurrant, & cum vitia organica partim ab essentia supra data, partim à vitali constitutione læsa dependeant, videtur jam proximo loco accedendum ad ipsa vitia constitutionis vitalis.

Constitutio vitalis commode dirimitur in originalem seu illam quæ influit, & participatam seu illam quæ influxu producitur.

Constitutionis vitalis divisio.

Con-

CON

funt 1

tati-

hujus C

bet .

rias I

furdu

fe pru

cend

le qui

chum

fed cu

aum

ei in

quan

perh

ntu y

ftant

parti

libus

ens,

Hoc

101

Cord

One

quan

Constitutionis vitalis originalis subjectum Prima sunt ipsi spiritus in sanguine arterioso exci- ejus spetati. Dices cor potius videri esse subjectum jusque hujus constitutionis. Atqui aliter se res ha- sum. bet. Ipsum enim cor per arterias coronarias recipit vitales spiritus cum sanguine arterioso e sinistro suo ventriculo delatos, abfurdum autem est statuere cordis parietes esse primum subjectum caloris vitalis, & interim illas eundem ab arteriis accipere. Dicendum ergo solidam substantiam cordis esse quidem primum præcipuumque subjectum suæ constitutionis naturalis & insitæ; sed cum ipsa recipiat vitales spiritus (ut dictum) non potest censeri subjectum primum constitutionis vitalis, quæ per istos spiritus ei imprimitur, dintiusque non permanet quam cordis substantia spiritibus vitalibus perfunditur. Neque enim ullibi absque spiritu vitali subfistere potest vita. Quare substantia cordis eatenus de vitali constitutione participat, quatenus alluitur spiritibus vitalibus; & per consequens constitutio illa in cordis substantia non est originalis & influens, sed participata seu ex influxu producta. Hoc etiam eo confirmatur, quod vitalis calor fanguinis in cavitatibus seu ventriculis cordis (qui calor pars faltem est constitutionis vitalis, longe intensior ac major est quam in ipsis parietibus cordis; ur quivis in VIVIS

in

re-

ui-

da.

ro-itia

11-

nt, ad

in

vivis animalium dissectionibus vulnerato cordis ventriculo immissoque mox digito observare potest. Longe enim auctiorem calorem sentiet in sanguine, quam in ipsa ventriculi substantia quomodocunque tractata. Adhæc constitutio vitalis quid tranfiens est, & in ipso motu ac fieri consistit; in spiritibus ergo mobilibus & evanescentibus (quales funt vitales in sanguine arterioso contenti) radicatur. Etenim abscisso aliquo membro in momento fere extinguitur vita, & per consequens vitalis constitutio; naturalisautem (ut supra monuimus) aliquandiu (licet non ita exaltata quemadmodum ubi vitalis superest) post mortem permanet. Et tollitur quidem subito vita vitalisque constitutio in prædicto casu non à caussa aliqua positiva contraria sed à pura puta privatione caussa conservantis ac continentis. Hoc confirmatur evidentissime, quod subito intendatur, remittatur, & alteretur constitutio vitalis in omnibus partibus pro modulo constitutionis vitalis excitatæ in ventriculis cordis. Sic in Lypothymia, deficiente corde, subito vita partium languet; ast ubi per spiritum aliquem cardiacum ventriculi cordis spiritibus aliquantum refecti funt, mox vitalem constitutionem in omnibus partibus subito nonnihil reparari cernimus. In suppressione anhelitus subita

mors

mors

langu

lum.

guins

ntuun

Cum

partil

cum ê

vitali

trum

bus 1

Veru

minif

bus in

lum e

corpo

cord

(VIta

caufa

guine

PELIDI

tionis

mus.

Clark

& par

fpin

dam.

RT2

Ito

m

it;

10-

12-

i.

tu-

ad-

em

non

ura

OD.

me,

te-

bus

2111

efi-

et;

en-

ecti

nni-

TIII-

bita

1015

mors fequitur intercepto torrente vitalis languinis à dextro ad finistrum ventriculum. In venæ sectione aut alia aliqua sanguinis nimia profusione ex solo defectu spirituum vitalium Lipothymia contingit. Cum itaque constitutio vitalis in quibulvis partibus solidis sit transiens & sugitiva, & cum ea dependeat à proportione spirituum vitalium in eas è ventriculis cordis influentium, recte inferre licet eam in solidis partibus non esle originalem sed participatam. Verum in ipsis spiritibus vitalibus, quorum ministerio vitalis constitutio universis partibus impertitur, oportet sit originalis : nullum enim aliud originale ejus subjectum in corpore invenire eft.

Concedimus tamen solidam substantiam cordis per suam constitutionem naturalem (vitali præsertim irrigatam) esse adjuvantem causam excitationis vitaliū spirituum in sanguine ventriculis suis concluso, licet non sit primum subjectum ejusdem vitalis constitutionis, quemadmodū modo abunde probavimus. Atq; hec impræsentiarū in genere sussiciant de utraq; vitali constitutione, originali &participata, &ad probandum illam proprie spiritibus vitalibus, hāc solidis partibusut immediatis subjectis inhærentiæ esse attribuendam. Examinanda jam restant tria vitiorū genera ad hanc constitutione pertinentia: quo-

rum

the eff

Nam

morb

perfe

vitali

ni m fuber

mode

quan coct

culos

tegra perfe

pure

Feb

les

prin

ex

torp

rum duo priora spectant originalem, tertium spectat participatam. Primum vitium ad generationem vitalium spirituum; secundum ad eorum distributionem; tertium ad participationem constitutionis vitalis pertinet. De quibus ordine proposito inquiremus.

CAP. IX.

Vitiata generatio spirituum vitalium in hoc morbo; & an id vitium sit pars ejus essentiæ secundariæ?

VItales spiritus primo excitantur seu generantur intra ventriculos cordis, nempe in ipsa massa sanguinis, & proprie sanguinem arteriosum à venoso discriminant. Foventur autem & conservantur jam geniti intra cavitates arteriarum, dum in habitum partium distribuuntur. Immo non tantum in arteriis soventur, verum & in illis recte dispositis forte nonnulli novi (quamvis minus essicaciter quam in corde ipso) excitantur.

Hoc Præmonito.

Statuimus primo in ipfa substantia cordis nullum occurrere vitium generationi spirituum tuum vitalium repugnans quod proprie pars sit essentiæ vel secundariæ hujus morbi. Nam cor ipsum ex parte sui recte in hoc morbo suo officio sungitur, & si quid imperfectum accidat in generatione spirituum vitalium, non cordi proprie, sed ineptitudini materiæ ad formam spirituum vitalium subeundam adscribendum est. Quemadmodum nempe ingestus cibus, si crudior sit quam par est, frustrare potest perfectionem coctionis, sano alioqui existente ventriculo, ita & ineptus sanguis ad cordis ventriculos delatus actionem cordis ut ut ex se integram, quoad effectum tamen & opus imperfectam reddere potest; in quo casu vitium non cordi ipsi, at materiæ indispositioni jure meritoque attribuere solemus. Dicas, Febrim cum hoc morbo aliquando complicari; & tum quidem ipsum cor inepte vitales spiritus generare. Verum febris illa morbus est diversi generis, nulloque modo aut totum aut pars essentiæ hujus.

ge-

dis,

prie

am

nin

non

nil-

novi

orde

ordis fpiri-

IIII

II. Dicimus Arterias minores in partes primario affectas insertas, re ipsa nonnihil ex vicinia & contactu ab iis refrigerari & torpore affici, adeoque spiritus vitales in se contentos inepte conservare, unde eorum constitutio vitalis nonnihil imperfecta redditur priusquam in partes ipsas effunduntur. Atque hoc Arteriolarum vitium bono jure

ad vitalium spirituum generationem adscribi videtur. Etsi enim non sit arteriarum munus spiritus vitales secundum primariam vocis sensum generare; eo ipso tamen quod jam genitos conservare teneantur, tali nimirum conservatione quæ continuatam quandam eorundem generationem quodammodo includit, earum vitia hoc respectuad vitalium spitituum generationem recte referri possunt. Nam vitalis constitutio (ut supra ostendimus) affectio quædam transiens est, quæ, dum durat, est quodammodo in continuo fieri, quæque instar flammæ, ubi continua ejus reparatio suppressa est, subito extinguitur. Propterea sunt Arteriæ quali cor continuatum omnibus corporis partibus, quibus spiritus contentos effundunt; & quæcunque spirituem vitia ante eorum in habitum partium effusionem accidunt, cum ea necessario ad originalem constitutionem vitalem spectent, neque alioquin ad spirituum distributionem adscribi possint, ad ipsam eorundem generationem referenda funt, generationem scilicet quasi continuatam in arteriis, qua continue à momentanea extinctione præservantur.

Porro hoc vitium vitalium spirituum est constitutio vitalis & originalis læsa, & cum sit quid præter naturam, actionem primo lædens, à quo emanat constitutio participa#fimil

partibu

cundar

III.

um, V

natura

untem

pontil talis fr

eft far

da, pe

laborat

liquali

dum.

hil in

quoq

funt in dam e

efect

Vior e

quam

tarum

tracti

long

ad fir

trum

ta similiter læsa, cumque dependeat mere ab essentia primaria superius dicta & in iisdem partibus complicetur, pars erit essentiæ se-

cundariæ hujus morbi.

III. Dicimus materiam vitalium spirituum, viz. sanguinem venosum suis spiritibus naturalibus imprægnatum in circuitu redeuntem à partibus primo affectis versus cor, nonnihil ab iis ineptum reddi ad formam vitalis spiritus admittendam. Etenim necesse est sanguinem dum partes intemperie frigida, penuria ac torpore spirituum insitorum laborantes transit, afficiatur quoque inde aliquali frigiditate, torpore, & forte crassitie ac visciditate ultra debitum naturæ gradum. Nam quemadmodum fanguis suas qualitates partibus, quas permeat, nonnihil imprimit; ita vice versa partes ipse suas quoque sanguini transfluenti quantum posfunt impertiunt. Sed & hic una concedendum est impressam hanc à partibus primo affectis indispositionem (præsertim ubi levior est) in reditu ad partes internas, priusquam cordis ventriculos attingat, à calore earum multum corrigi, & interdum omnino superari; vel si quid supersit istiusmodi contracti vitii, aboletur id sere semper in totum longitudine itineris ante sanguinis reditum ad sinistrum cordis ventriculu, dum per dextrum & parenchyma Pulmonum delabitur. Hoc F 4

Hoc etiam vel hinc confirmatur, quod fi perlisteret indispositio ista donec sanguis ad finistrum ventriculum rediret, tota massa fanguinis arteriofi crudior & imperfectior foret; & cum ab Aorta ad omnes partes fanguis hic imperfectis spiritibus vitalibus refertus transmitteretur, omnes partes corporis plus minus afficeret, quod rarissime in hoc morbo observatum. Caput enim, multaque viscera, utcunque ex his aliqua solito majora reperiantur spiritu tamen vitali integro irrigari videntur. Sed etfi, ut diximus, levior sanguinis indispositio corrigatur ante reditum in dextrum ventriculum, ubi tamen gravius vitium ei inuritur, non plane ex omni parte superari potest, unde Pulmones in hoc morbo sæpius gravissimis malis affliguntur: Enimyero, cum sanguis minus spirituosus adeoque minus permeabilis, frigidiorque ac craffior aut viscidior continue per Pulmones trajicitur, vix fieri potest, quin is tractu temporis debiliores Pulmonum partes plus minus inficiat & obstruat, unde deficilis respiratio, tussis pertinax, tumores duri, inflammationes, abiceffus, phthisis, proveniunt; sebres quoque tum erraticæ tum hecticæ hinc ortum fuum ducere possunt. Verum cum labes ista à partibus primo affectis repente introducatur, credibile est eam (etsi pulmones sæpe ut diximus

ad venti que sup cur capt spiciant

ralis ne fasit, c ventric istumo

tra pui rent no antequ

Por um spin fanguin tinet o

jus m

est co Pulmo det pla ria data

cordis nomer His

one hu miscer nec p

liquea cus ve ximus ab ea afficiantur) antequam fanguis ad ventriculum sinistrum pertingat plerumque superari. Atque hinc ratio reddi potest cur caput partesque vicinæ satis sloridæ conspiciantur, quod nempe in illis neque naturalis neque vitalis constitutio sensibiliter læsasit, cum spiritus vitales persecti in sinistro ventriculo geniti & ab eo distributi floridum istum colorem in facie excitent; cum è contra pulmones sæpe supradictis vitiis laborent nondum superato sanguinis vitio quod antequam dextrum ventriculum & venam arteriosam subeat, secum attulit.

Porro imperfecta hæc productio vitalium spirituum in dextro ventriculo cordis ob sanguinis venosi affluentis crudelitatem pertinet omnino ad essentiam secundariam hujus morbi, ejusque pars est censenda. Nam est constitutio vitalis vitiata, à qua in Pulmonibus actiones læduntur, & dependet plane ac omnimodo ab essentia primaria data, neque interim subsistit in solida cordis substantia, ut eo nomine novi morbi

nomen mereatur.

101

re-

-00

山山

ote

10

us,

nte

ta.

ane

alis

DUS

hi-

nue

no.

uat,

IUS,

m

du-

041-

tIII,

Hic obiter notamus, Practicos in curatione hujus affectus semper remediis suis admiscere illa quæ Pulmonibus prospiciant; nec præter rationem; cum è modo dictis liqueat quanto in periculo continue id viscus versetur. Atque hæc sufficiant de vitiis

FS

in generatione vitalium spirituum; sequuntur jam vitia distributionis eorundem.

CAP. X.

Vitiata distributio vitalium spirituum in hoc affectu; & an sit pars essentiæ ejus secundariæ?

ffributi -

I Itiata hac distributio videtur in tribus consistere; nempe in ejus Imminutione, onis tria, tarditate, & inaqualitate. Distributio sanguinis & spirituum imminuta, ut & tarda, in una aliqua parte (& forte in omnibus primo affectis) deprehendi potest; inaqualitas vero in una aliqua observari minime potest, cum ea resultet ex collatione variæ velocitatis ac tarditatis, magnitudinis ac parvitatis torrentis sanguinis respectu aliarum atque aliarum partium. Imminutio ac tarditas distributionis, cum ab iisdem sere caussis in præsenti morbo dependeant, simul tractari possunt, & cum istæ disserentiæ simpliciores tum san- sint inæqualitate, earum tractatio merito præmittenda videtur.

Circuiguinis non effe

difficibo.

Primo autem concedendum est transihoc mor- tum fanguinis per partes primo affectas non admodum difficilem esse in hoc affectu.

Itet

a tor

arita brich

facili

endar inftitu

Veru

lam tr.

MINVE

in co

His De

bage

are h

15,]

MITT:

bec

Mon

Dates.

ia ma

m

He2

172

111-

iri-

ars

TOUS

10He,

ngui-

una o af-

vero

cum

tis ac

s tot-

ribu-

efen-

pol-

tores

erito

ranti-

s non

factu. Li-

Licet enim frigida intemperies, inopia ac torpor spirituum, videantur difficulter admittere sanguinis transitum per partes iltis qualitatibus affectas; revera tamen aliæ qualitates conjunctæ; puta humiditas, laxitas, flacciditas, mollities ac interna lubricitas, tantum ad minimum possunt ad facilitandam quantum prædictæ ad impediendam ejus permeationem. Immo, si justa instituatur æstimatio, forte plus possunt. Verum id hic non asserimus, majorem solum transitus difficultatem pernegamus. Enimvero, si libeat componere corpora mollia cum duris, laxa cum strictis, humida cum siccis, lubrica cum asperis, facile in illis percipere licet circulationem sanguinis longe esse expeditiorem quam in istis. Atque hoc manifestum est in junioribus animalibus in quibus priores dominantur qualitates. In recens-natis licet cor tenellum sit, arteriæ minus firmæ, virtus pulsifica adhuc imbecillis, circuitus nihilominus sanguinis prompte & facile exercetur; quæ in senioribus non fine validiori pulsu nixuque cordis & arteriarum peragitur. Deinde, Hippocratis & Galeni sententia, puerorum corpora maxime sunt permeabilia, ob humiditatem scilicet, laxitatem & mollitiem. Præterea, si attendamus ad formationem pulli intra ovum, res reddetur oppido manifelta.

Post

Post paucos ab incubatione dies, cor pulli evidenter pulsare cernitur, sanguinisque sui circuitum inchoare. Quod si tunc temporis consideremus fragilitatem ipsius cordis, & quam infirme ejus partes inter se cohæreant dum interim circulationem fanguinis suo modo peragit, necesse est concedamus in ista informi massa humiditatem, mollitiem, internamque lubricitatem motum istum facilitare. Objiciat forte aliquis in modo citatis casibus libertatem & promptitudinem circulationis sanguinis non tam ab humiditate, mollitie & lubricitate, quam à spirituum insitorum copia dependere. Nam in cachexia, morbo virgineo, hydrope, carnes satis molles sunt, humidæ & forte lubricæ, cum interim circuitus sanguinis satis difficilis sit. Respondemus, revera illa corpora quæ ex copia spirituum insitorum tenera & mollia redduntur, aptius cæteris paribus circulationem sanguinis admittere. Verum non simpliciter verum est, corpora magis spirituosa semper faciliorem circuitum sanguinis obtinere. In Piscibus enim sanguis longe facilius circuitum suum obit quam in animalibus terrestribus, ut liquet ex tenera & fragili constitutione eorum cordis & arteriarum; Ii tamen minori copia spirituum insitorum gaudent. At quia perpetuo in aquis degunt, humidiores ac magis

es lubri dentiffir tum fan citas & cachex concer

ficilem rituum Atructii Quare

frigida rituum unt, m litie ac ad just

latio fi menti molli tum,

tes aff da. R guinis

vitati mul ta Verun cultan fi cin

dum in pa fangu ılli

fui

oris

8

ant

1110

in

êm,

fa-

oci-

nem

nidi-

piri-

min

C21-

bri-

fatis

-100

mte-

is pa-

tere,

pora

ircui-

enim

obit

iquet

0 00:

copia

per-

ma-

015

gis lubricæ sunt eorum carnes. Unde evidentissime patet quanti momenti ad circuitum sanguinis facilitandum sit interna lubricitas & humiditas. Porro quod attinet ad cachexia & morbo virgineo laborantes. concedimus quidem in iis circuitum esse difficilem; non tamen solum ob desectum spirituum insitorum, sed & ob pertinaces obstructiones in universo corpore existentes. Quare concludendum videtur non obstante frigida intemperie, inopia, ac torpore spirituum, quæ ad difficultatem circuitus faciunt, modum tamen ei ab humiditate, mollitie ac lubricitate interna adeo imponi, ut ad justam, si non nimiam, facilitatem circulatio sanguinis reducatur. Sed si tanti momenti fint humiditas, interna lubricitas & mollities ad facilitandum fanguinis circuitum, videtur certe distributio ejus per partes affectas celerior non tardior exspectanda. Respondetur facilitatem transitus sanguinis non opponi tarditati motus, aut parvitati ductus: Potest enim motus facilis simul tardus esse, & in ductu quoque parvo. Verum facilitas hic directe opponitur difficultati, sive luctæ & labori qui in hoc casu, si circuitus esset difficilis, accideret arteriæ, dum sanguis permeat. Quod autem arteriæ in partes primo affectas parum laboris in sui languinis circuitu exequendo subeant, Paulo

15cmi

Duz cauffæ celeritaitus fanguinis.

lo post demonstrabitur ; hic tantum asserimus facilitatem transitus sanguinis non satis arguere vel motus celeritatem, vel ductus amplitudinem. Enimvero duæ potissimum caussæ concurrunt ad accelerandum decurtis ctrcu- sum sanguinis per habitum partium. Altera est aptitudo partis recipientis, sive ejus per quam fanguis permeare debet, atque hæc caussa mere passiva est & ignavia; altera est impulsus tum cordis & arteriæ, tum ipsius sanguinis arteriosi se expandere annitentis. Hæc caussa activa est ac vegeta; cessante quippe hoc impulsu, distributio sanguinis mox omnino cessaverit, utcunque alias supponatur transitus facillimus. Patet ergo impulsum hunc esse principem atque activam caussam tum celeritatis ac tarditatis, tum quantitatis distributionis sanguinis. propter caussa illæ que impulsum hunc quoyis modo aut promovere aut retundere queunt, accuratius hic veniunt examinandæ: ab his enim dignoscere licebit utrum reipsa distributio sanguinis in partibus primo affectis sit parcior aut tardior debito.

Quatuor cauffæ impellentes languinem,

Ad incitationem impulsus dicti hæ causlæ potissimum concurrunt. 1. Copia & activitas vitalium spirituum in sanguine contentorum. 2. Cordis integra virtus. 3. Arteriarum robur, calor, & magnitudo debita. 4. Irritatio tum cordis tum arteriarum five extrinsecus sive

n qual notesca

Sittle

morbo

perfec

ergo : butus

eft di

fpiriti

Deind

mont

primo

ittir,

partes

comp

morb

III

defect

are,

Banif

ETTZ I

cellari

mio

III.

mo a

en r

palit

intrinsecus facta. Has ordine percurremus, ut qualiter se in præsenti assectu habeant innotescat.

I. Quod ad copiam & activitatem vitalium Prima spirituum, attinet, supra monstravimus in hoc morbo frequeter excitari spiritus vitales imperfectos in dextro ventriculo cordis: cum ergo sanguis hisce imperfectis spiritibus imbutus in pulmones impellendus sit, necesse est distributio illic ob desectum activitatis spirituum aliquantu ignavior ac parcior sit. Deinde cum sanguis vitalis, ut supra quoque monstravimus, in arteriis, quæ in partibus primo assectis terminantur, nonnihil resrigeretur, necesse est transitum ejus per dictas partes segniore quoq; esse & diminutiorem.

II. Virtus cordis, nisi forte per accidens ex secuncomplicatione alius morbi, vix solet in hoc da.

morbo observari læsa.

eri-

atis

tus

um

II.

tera

per

hac

SUL

1113,

inte

inis

lup-

m-

am

em

102-

10-

ue-

:ab

di-

edis

auf-

atti-

nto-

4110

fire

171-

defectum notabilem in earum robore accufare. Atquiin calore tum magnitudine earum
manifeste occurrit vitium. 1 in calore. Arteriæ in partes primo affectas insertæ, necessario ab illarum intemperie frigida, simili quoque intemperie nonnihil afficiuntur. Nam cum intemperies partium primo affectarum activa sit diuque permanens,
sieri non potest quin plus minus conformem
qualitatem in partes adeo vicine connexas
in-

introducat. Etenim agentia naturalia corpora, quæque intra sphæram suæ activitatis posita maximeque illa quæ proxima sunt, assimilare satagunt. Si quis autem ambigat an ista arteriarum frigiditas retardare ac imminuere possit sanguinis per partes primo affectas decursum, consideret frigiditatem ex se inimicam esse cuivis motui. Frigoris quippe sua natura est sedare impetus, denfare, ignaviam, fomnolentiam, stuporem ac immobilitatem inferre, atque ubi intenfior est, congelare ac mortificare partes. Necesse est ergo remoram injiciat torrenti sa nguinis per partes ea qualitate affectas transeunti. Præterea observavimus sæpius in venæ sectione frigente membro sanguinem tardius ac pareius effluxisse; calefacto vero eo, aut frictione alioque motu aut medio excitato pulsu sanguinem liberalius egressum esse. Adhæc frigida admota manifeste conferunt ad fistendum sanguinem è quacunque parte præternaturaliter erumpentem, ut è contra calida eundem proritant.

Objici potest ab externo frigore sæpe intendi pulsum; ut ex contrectatione nivium videmus non modo pulsum, sed & calorem auctum in manibus tractantium.

Respondemus frigida per se semper morari transitum sanguinis per habitum parti-

um;

15;0

pocent

narum

poffec

Verun

contin

circuit

mmu

Is & 6

fus ex

mus,

aus q

dictis

tas no

crede

in me

nas &

n nor

vala.

tialer

tius d

tz ver

riden

mas o

pora

ut ar

-100

tatis

unt,

igat

Ilm.

TIMO

atem

goris

den-

meno

tenfi-

Ne-

fan-

anfe-

n ve-

mem

0137

nedio

egrelnfelte

qua-

npen-

pron+

pe in-

ivium

alorem

er mo-

parti-

um;

um; ex accidente vero si quæ tandem provocent (quod indicto casu contingit) arteriarum pulsus ad fortiores ictus instituendos, posse circuitum sanguinis eatenus intendere. Verum in præsenti morbo id nullatenus contingit. Quippe, (ut supra ostendimus) circuitus sanguinis in hoc affectu, utcunque imminuatur aut retardetur, manet satis facilis & expedita, neque inde ulla irritatio pulsus exsurgit, aut paullo post clarius videbimus. II. In magnitudine arteriarum defe-Etus quidam notatur. Nam cum ex modo dictis liqueat arterias ad partes affectas delatas nonnihil frigidiores fieri debito, facile credere licet eas simul graciliores reddi; sic in membro quovis refrigerato cernimus venas & arterias solito esse exiliores: & negari non potest actuale frigus semper coarctare vala. Sed & plus quam probabile est potentialem quoque frigiditatem (qualis forte potius dicatur esse illa quæ est intemperiei insitæ venas & arterias exiliores reddere. Sic videmus frigidas complexiones, tum frigidas & humidas, minores venas ac arterias obtinere quam calidas. Obefa corpora, fœminæ, pueri strictiora vasa quam macilenta, viri, adulti, possident. Præterea calor ipse expansiva qualitas est, ut ampliora, frigus contractiva est, ut augustiora vasa præstat. Denique observavit c no=

frendu

Dr Hay

mundal

ndine Reditt

ligatur

Verep

ligatur

cidere

dum a

teendu

tos in

dam ,

tem tri

ut fatis

prima

enter

· IV

cordes

cauffa

num

20ters

daur.

curfe

Tent

gene

natu

le ve

queo

è nobis aliquis in hoc ipso affectu se aliquoties deprehendisse, in dissectis post mortem, venas ac arterias ad partes quidem primo affectas tendentes graciliores debito; verum arterias carotides & venas jugulares improportionate ampliatas: & credibile est hoc perpetuo observari potuisse, si in mentem diffecantium hoc ipfum attentius contemplari venisset. Sed hoc non præfracte asserimus, ast ulteriori inquisitioni relinquimus. Interim cum ex dictis satis pateat circuitum sanguinis in partibus primo affectis esse imminutum, consentaneum quoque rationi est vasa quoque earum esse angustiora. Et cum sinister ventriculus cordis in Aortam tantam effundat quantitatem quæ omnibus partibus sufficiat, cumque tot partes primo affectæ diminute istum sanguinem absorbeant, credibile est per alias partes & nomination per caput ac hepar liberalius lolito eum distribui, adeoque vasa harum partium nonnihil dilatari & ampliari : Circa fanguinis in hoc affectu imminutum circuitum, hoc unicum experimentum addimus. Injecta ligatura five in brachio, five in cruribus puelli hoc morbo graviter afflicti, non ita expedite venæ ultra ligaturam intumuerunt, neque habitus partis sanguine satur ita turgidulus & coloratus illic apparuit ac in sanis solet sieri. Unde maniseste liquet inteor-pri-

to;

21.63 eeft

en-

:0D:

19 - E- E-

edis

-613

ora,

-10f

om-

rtes

nem

25 &

slo-

par-

lica.

cul-

mus.

CIU-

non

nue.

Ir Ita

2011

111-

tea

ferendum esse sanguinis transitum per istas partes esse ignaviorem ac minorem debito. Ut fluvius aggere stipatus citius aut serius inundat ripam provaria velocitate ac magnitudine torrentis; ita hic quoq; contingit. Reditus fanguinis per venas ad interiora vi ligaturæ fistitur; quod fris rapidus esset, brevi repleret venas & habitum partium ultra ligaturam, quemadmodum alias in sanis accidere videmus : cum autem segniter admodum ac tarde eas repleat in hoc affectu, statuendum est omnino circulationem sanguinis in istis partibus imminutam esse ac tardam, arteriasque in dictas partes insertas tum frigidiores tum graciliores esse debito, ut satis superque evicerimus arterias partium primario affectarum laborare vitio in deficientemagnitudine.

IV. Quod tandem attinet ad irritationem Quarta. cordis & Arteriarum (que forte præcipua caussa est multarum in pulsibus differentiarum) manifelte hæc languida & inefficax in arteriis partium primo affectarum deprehenditur. Non animus est impræsentiarum discursum instituere de natura, caussis, disserentiis, & effectis irritationis in pulsibus: in genere tantum notamus eam esse posse vel naturalem, vel violentam, & utramque efse vel universalem vel particularem, simulque oriri posse vel ab extra vel ab intra; denique G 2

etuit

fat, H

dane i

ndequ

fmulq

pro an

incale

&mont

guine

rente

contr

mor i

plas la

geem

Nam 6

tenz

tur:

mimo

torum

arum

triz

whib

00, 2

desc

2000

tem

Contr

De irri-

nique esse vel nimiam vel deficientem. In præsentis affectus tractatione satis erit si pulsuum. nonnulla delibemus de irritatione particulari arteriarum, eaque deinde ad præsens nagotium accommodemus. Asserimus itaque 1 Arterias cum nixu quodam fanguinem protrudere in substantiam seu habitum partium; partes vero istum sanguinem recipientes nonnihil contraniti; propter hunc autem renixum arterias ad fortiores nixus seu pulsus instituendos proritari: tantique momenti esse istum renixum ad fortiorem reddendum pulsum, ut ubi renixus languidus est, vix fieri possit ut pulsus sit fortis; ubi yero renixus plusculum intenditur, ita tamen ut nixum arteriarum non plane vincat, pulfus robustior reddatur, modo aliunde non intervenerit impedimentum. Atque hoc variis instantiis illustrare possemus ;paucas annotabimus. Hyberno tempore pulsus pleniores, duriores, robustiores, & constantiores sunt quam astate. Certum autem est tum temporis partes corporis externas frigore constrictas firmiores & minus permeabiles esse, adeoque sanguini in sua circulatione earum substantiam permeare contendenti, fortius quam alias eas reniti; unde arteriæ, ubi nihil aliud interveniens prohibet, necesse habent fortius se movere, fortiusque sanguinem impellere, si suo officio in CII- t fi

ula-

na-

que

nem

parcipi-

feu

mo-

red-

idus

ubi

a ta-

inde

tque

pall-

ulfus

tann est

s fri-

mealati-

tenunde

robi-

otti-

CII-

circuitu sanguinis perficiendo defuncturæ fint. Hinc tum irritantur arteriæ istæ nisi plane supprimantur, aut aliunde sopiantur, indeque paullatim fortiores ictus instituunt; fimulque à spirituoso sanguine coarctato & pro ampliore loco colluctante plusculum incalescunt, atque aliquantum ampliantur, &nonnuquam victa nonnihil renitentia sanguinem in partes uberiore ac rapidiore torrente quam prius effundunt. Hoc amplius confirmatur adaucto. Licet enim initio mox frigeant manus, paullo post tamen plus satis incalescunt, simulque sanguine, quem intensus rubor indicat, suffunduntur. Nam ex contactu nivis primo partes densantur, ac fortius circuitui sanguinis resistut, arteriæ quoq; tunc in illis partibus contrahuntur: Atqui, nisi prævaleat frigus usque ad omimodam spirituum in istis arteriis contentorum suppressionem, & adipsarum arteriarum stuporem, aut saltem torporem, arteriæ istæ paullatim irritantur, sanguilque cohibitus fortius luctatur pro majori loco, adeoque demum ex lucta utriusque incalescunt arteriæ simulque ampliantur, & aucto pulsu sanguinem copiosius in partem prius perfrigeratam extrudunt. E contra, æstate, vbi minor occurrit in fanguinis transitu renitentia, pulsus flaccidior, languidior, ac mollior contingit. Unde Unde patet defectum debitæ irritationis à languida partium sanguinem ab arteriis recipientium renitentia profectum, pulsuum

vigorem imminuere.

II. Idem adhuc evidentius cernitur in aucto pulsu à motu corporis; nam in motu violentiore omnes fere musculi tensi sunt, unde transitui sanguinis plusculum renituntur; hinc arteriæ ad luctam irritantur, earum calor intenditur, adeoque pulsus frequentiores, fortiores ac pleniores eduntur.

III. Inflammatio alicujus partis ut manifeste irritat ejus arterias, ita & vehementiorem pulsationem & liberaliorem sanguinis affluxum in eadem promovet. Idem quo-

que de dolore dicendum.

IV. Huc etiam referenda contulio alicujus partis. Nam pars contusa difficilius affluentem fanguinem admittit : hinc irritantur arteriæ, fortius pulsant, partemque contulam iis contranitentem in tumorem attollunt. Plurimis aliis exemplis idem demonstrari posset, nisi hæc abunde viderentur sufficere.

De renixu contra pullum.

Notandum porro est renixum partium in sanguinis ab arteriis receptione factum, satis magnum esse posse, neque tamen satis efficaciter arterias irritare: in quo casu retundit ac remittit potius impetum torrentis

ian-

inguini

Bus yer

icusin

ejulder

aliam

flingue irritat

tat. D

latz,

Erg

tentem

tis, qu

pitra (

citral

tralig

nitus

exin

celoc

Schire

matis

EX CON

gau

title

mis

lione

qua

sanguinis quam intendit. Etenim renixus iste per se retundit aut impedit decursum sanguinis per substantiam partium; quatenus vero una proritat arterias ad fortiores ictus instituendos, per accidens torrentem ejusdem promovet. Quare cogimur hic in aliam digreffionem vel inviti delabi, distinguendo inter renixum partium qui irritat, & eum qui non, vel parum irritat. De priori sufficiant instantiæ modo allatæ, de posteriori paucas in medium adducemus.

I in

otu

unt,

tun-

63.

fre-

dun-

ma-

nen-

igui-

quo-

licu-

s af-

itan-

con-

11 at-

de-

eren-

min

, fa-fatis

He-

entis

120-

Ergo, datur renixus plane supprimens tor- Species rentem sanguinis. Talem efficit ligatura for- Prima, tis, quæ plane intercipit pulsum in partibus ultra consistentibus, neque tamen arterias citra le irritat, quod omneni vim arteriæ ultra ligaturam superet, actionemque ejus penitus abrumpat. Idem cernitur in partibus ex frigore demortuis, aliisve de caussis sphacelo corruptis; quin forte in contracturis & schirrhis nonnullisque cicatricibus confirmatis.

II. Occurrit renixus comprimens arterias vel secundaex compressione arteriarum. Hic accidit in ligatura mediocri. Item in compressione arteriæ à tumore in partibus vicinis aut proximis ut à tuberculo crudo; item in compressione à qualicunque externa caussa. Multa quæ spectant ad morem decubitus dextri præ-G 4

præsertim & sinistri huc referantur; sic in tumoribus dextrum latus spectantibus sinister decubitus sæpeægrius toleraturob compressionem partium sanarum à tumentibus, &c. Atque hæc compressio, ut ut circuitui sanguinis resistit, non tamen videtur magnopere arterias irritare, quod non minus vim ipsam pulsificam intercipiat quam ejusdem actionem minuat. Quamvis sorte in pulmonibus nonnnnquam irritet ob calorem eorumalias eminentem, non secus ac sieri solet in partibus dolentibus aut instammatis.

Tertia.

III. Datur renixus ex parte reprimens circuitum sanguinis, sed absque compressione arteriarum, neque tamen in totum eum supprimens,
neque admodum arteriam irritans. Talis occurrit in obstructionibus ab humoribus lentis, frigidis, crassis, humidis, qui, etsi nonnihil liberum sanguinis transitum impedire
possint, parum tamen arterias irritant, quod
una torporem quendam, aut saltem frigidam
intemperiem iis inferant, ut & sanguini in
iis contento. Idem fere dicendum est de
membris paralyticis, nisi quod in his evidentius torpor arteriis eorum introducatur, sanguinisque transitus minus in iis retardetur-

Defectus irritationis in hoc morbo.

Porro asserimus II. Partes primo assectas non satis in hoc morbo irritare arterias, quibus sanguis per eas distribuitur. Nam etsi in hisce partibus, cum ob earum soliditatem,

tum

remixu

nisqi 2

Partibu

es hun

lemcu

inlito

nilque

parte

quæ a

ac mo

le reci

eas ob fortite

nem u

fpirit

laxa

pulfa fabito

redde

lubrio

admo

Tia |

miz

Dis

CITC

eft a

tui

100 HS H

in

em

(11-

Tte-

OC-

en-

mi-

tire

por

am

in

de

en-

an-

Azs

qui-

Gin

em,

m

tum ob frigiditatem, concedamus aliqualem renixum, debilis tamen admodum est is fegnisq; atque parum irritans. 1. Quod in istis partibus cum frigida conjungatur intemperies humida, que per se temperat ac lenit qualemcunq; irritationem. 2. Quod adsit inopia insitorum spirituum, qui alioquin, ubi suppetunt, dare& fovere solent arteriarum sanguinisque in iis contenti vigorem. 3. Quod istæ partes torpeant, ut hac ratione ineptæ fint quæ arterias excitét. 4. Quod laxæ, flaccidæ, ac molles fint, adeoq; magis pronæ fint facile recipere quod arteriæ immittunt, quam eas obnitendo lacessere. Atque arterias non fortiter & cum notabili robore sanguinem in hasce partes protrudere, vel hoc indicio manifesto est, quod ex post influxum spirituum & sanguinis, permaneant adhuc laxæ, molles & flaccidæ, cum è contra pulsus fortes soleant partes alias flaccidas subito plenas, turgidulas ac rigidiusculas 5. Quod partes primo affectæ lubricitatem similarem possideant. Quemadmodum enim externa seu superficiaria lubricitas quodvis præterlabi finit fine attritione; ita quoque interna seu similaris lubricitas per meationem fanguinis facilitat, ut cum minima lucta ejus circuitus obeatur. Concludendum ergo est arteriarum irritationem in hoc affectu elic esse desicientem, adeoque segniter admodum & inessicaciter excitari arterias ad pulsum validum essiciendum.

Tandem perpensis omnibus quæ adduximus de caussis activis & impellentibus sanguinem in circuitu suo, satis elucescit sanguinis circuitum in hoc affectu, licet satis facilis & expeditus sit, esse tamen diminutum & segnem per partes primo affectas, tum ob ignaviam sanguini, arteriosi in dictarum partium arteriis contenti, tum ob deficientem calorem atque exilitatem istarum arteriarum, tum denique ob earundem inefficacem irritationem. Atque hæc dicta sunto de duobus prioribus vitiis pertinentibus ad distributionem sanguinis in hoc affectu, diminutione scilicet ac tarditate distributionis; restat jam ut breviter expendamus inæqualitatem ejusdem.

CAP. XI.

Inæqualitas distributionis sanguinis in hoc affectu.

I Naqualitas hæc æstimanda est ex collatione magnitudinis ac velocitatis torrentis sanguinis sacta in diversis partibus. Si enim circuitus sanguinis secundum geometri-

cain

tardus

illeex

dus ett

& tare

qualis

Atqui

OHIS.

guini

dum p

flat co

periot

funda

fertin

exfe

COT I

jung

taten

in Ac

prim

elth

plet

cam proportionem sit vel æque diminutus & tardus, vel æque magnus & velox, æqualis ille ex scopo presentis inquisitionis reputandus est: E contra, si in aliis partibus minor & tardior, in aliis major & velocior sit, inæqualis & improportionatus cenfendus est. Atque hic esto status præsentis disquisitionis.

Ex supra-dictis liquet distributionem sanguinis per partes primo affectas esse admodum parcam & tardam. Tantum ergo restat considerandum an per cæteras partes u-

beriore ac concitatiore motu feratur.

Asseruimus antearadicem hujus mali non Inrquafundari in ipso corde, neque cor ipsum præ- finds alsertim quo ad sinistrum suum ventriculum onisproex se primo male affici. Credibile est ergo cor ipsum (nisi forte alius morbus vel conjungatur vel superveniat) recte suo officio defungi, sufficientem que sanguinis quantitatem pro una vice per quemlibet ictum in Aortam expellere. Cum ergo diminute (ut supra probatum est) sanguis ad partes primo affectas ab Aorta dispensetur, necesse est superflua portio ad alias partes non sic affectas distribuatur. Nam alias Aorta non satis se expediret, nec sanguinem à corde receptum satis exoneraret, sed à copia ejus infarciretur, & opprimeretur, hæcque repletio levi occasione ad sinistrum usque ven-

ati-

6-

ventriculum cordis redundaret, febrimque accenderet: & agnoscimus quidem ob hanc ipsam caussam, inter alias, febrim in hoc affectu, frequenter, ac facile accendi. Verum cum illa febris sit alius morbus conjunctus, & ab hoc diversus ac separabilis, & cum, fæpius morbus hic fine febre occurrat; necessario concedendum est sanguinem, quo diminutius ad partes primo affectas distribuitur, eo copiosius ad partes cæteras affundi, saltem tunc, ubi febris abest. Nam cum ea quantitatis sanguinis, ut modo diximus, in Aortam excludatur quæ toti corpori sufficiat, & cum tota ea in varias partes distribuenda sit; sequitur planissime, quo minus in unam partem eo uberius in aliam dispensari.

Atque ita ex dictis percipere licet inæqualitatem distributionis sanguinis ex sola ejusdem diminutione in partibus primo affectis supra asserta (saltem probabiliter inferri. Ex diminuto nempe ac tardo decursu sanguinis per partes primo assectas, assum ejusdem tum uberiorem & concitatiorem ad partes interiores non sic assectas recte colligi. Videamus jam an cætera phænomena huc spectantia huic ratiocinio respondeant.

1. Manisestum videtur ex supra-allatis, Caput, Cerebrum, Hepar, cæteraque visce-

ra, non ista frigida intemperie, neque illo

tor-

prpo

me,

az.

runt

teris

tes,

rate

vilu

tur,

CUIT

rate

coqu

ent,

MUU

deq

perq

aut i

gida

ceffe

tes d

21 C2

tun

ritu

tove

que

que

anc

100

Ve.

In-

8

Tat;

quo

DU-

ndi,

n ea

,in

fici-

bu-

sin

ari.

nz-

fol2

affe-

fer-

ırlu

11-

itio-

sre-

12.

re-

atis,

tor.

torpore ac inopia spirituum insitorum laborare, quibus premuntur partes primo assedica. Nam viscera & partes dica non recipiunt nervos suos à spinali medulla extra calvariam, ut in eadem conditione cum cæteris partibus involvantur. Porro ista partes, quantum ex tactu judicare licet, moderate exterius saltem calent; & quantum ex visu, colore naturali ac slorido conspiciuntur. Præterea pleniores ac habitiores oc-

currunt quam partes primo affectæ.

Adhæc, Pueri hoc morbo afflicti moderate appetunt, ingesta alimenta non male coquunt, & circa caput sensus obtinent satis acutos; vident, audiunt, gustant, olfaciunt, non hebetius quam alii, & quoad ingenium, sæpe coætaneos superant, nisi aliunde quid obstet. Que omnia collecta satis superq; attestantur in istis partibus, aut non, aut saltem paru admodum dominari vel frigida intemperiem, vel torporem & inopiam spirituum instorum. His jam concessis necesse est liberaliorem sanguinis ad dictas partes distributionem una concedamus. Quod n. ad calorem attinet, supra monstravimus eum tum ampliare, tum proritare arterias ad fortiorem pulsationem edendam; & copiam spirituum supra quoque monuimus non modo fovere vim pulsificam arteriarum, vigoremque sanguinis in iis contenti conservare, fed fed & nonnihil concitare ac irritare utrumque, idque eo efficacius, quo minus spiritus

institi torpore affecti funt.

2. Nisi istæ partes pleniore circuitu sanguinis irrigarentur, molliores, laxiores, ac flaccidiores quam reipfa funt, occurrerent, non secus ac partes primo affectæ observantur. Etenim deficiente aut languente in quavis parte pulsu, pars statim redditur laxa ac flaccida, ut omnibus partibus in Lipothymia contingit. E contra, ubi pulsus fortis est, pars, ad quam pertinet, rigidiuscula ac turgi lula deprehenditur. Pulsus enim plenior, statim partes prius præ inanitione concidentes replet ac infarcit, ut soluta Lipothymia restitutoq; pulsu, partes corporis prius languidæ laxæque, non modo bene coloratæ, sed & vegetæ ac turgidulæ redduntur. Cum ergoistæ partes, illa mollitie, laxitate & flacciditate non affectæ fint, dicendum est eas pleniori pulsu pertundi.

3. Ipfa magnitudo harum partium au-Eta præ partibus primo in hoc morbo affe-Etis testatur eas liberalius alimento suo, nempe fanguine (qui commune ac ultimum partium alimentum cenfetur) irrigari. Etenim vix alias ulla ratio sufficiens fingi potest, cur, cum partes primo affectæ emaciatæ fint, hæ pleniusculæ & habitiores (præsertim cere-

brum

drum

confi

Pulfo

nihil

deced

mz (

ceret

amp

mo 2 deli

liter

orani

rit or

morb

rare a

tes in effur

T45 0

iftan

dastr un

arum

ut&

Dofc

ctan

Var

rant

902

11=

tus

an-

In

Of-

ula

one

Li-

oris

ene

ed-

101-

ta

201-

affe-

en-

par-

min

CHT,

t, hæ

rum

brum & hepar) inveniantur. Idem & confirmat floridus harum partium color. Pulsu enim in quavis parte languente, nonnihil de nitore coloris in itta parte mox decedit.

- 4. Observatæ sunt in hoc affectu Arteriæ Carotides, tum venæ jugulares quæ ad cerebrum & partes circa caput pertinent, ampliores; quæ autem vafa ad partes primo affectas feruntur, exiliores debito: unde liquido inferre licet fanguinem inæqualiter ad istas partes dispensari. Atque hic oramus atque obtestamur eos quibus occurrit opportunitas diffecandi corpora ex hoc morbo defuncta, ut accuratius velint explorare an arteriæ in partes offium protuberantes infertæ liberalius quoque & commodius effundant sanguinem in istas, quam in cæteras offium partes parcius nutritas, & annon istarum partium arteriæ paulo ampliores sint quam harum. Licet equidem hoc scrutinium, cum ob exilitatem dictarum arteriarum, tum earum insertionis obscuritatem, ut & offium duritiem, difficillimum effe agnoicamus.
- 5. Juvantia & lædentia huc quoque spectant. Nam frictionibus motu & agitatione varia corporis, atque exercitiis, corroborantibus illitionibus, similibusque mediis quæ calorem in dextris membris cæterisque

partibus primo affectis suscitant, pulsusque irritant ac quocunque modo augent, unde distributio sanguinis propius ad æqualicatem reducatur, manifeste juyantur pueri hoc morbo afflicti; contrariis læduntur. Similiter medicamenta intus assumpta quæ distributionem sanguinis ad partes primo affectas promovent (qualia funt moderate calida, benigna & naturæ familiaria, atque ita attenuantia, incidentia & deobstruentia, ut simul spiritus nequaquam dissipent sed soveant augeantque) conferunt multum ad hujus morbi curationem; contraria vero eundem aut gignunt aut genitum intendunt. Hisce omnibus consideratis, concludendum est distributionem sanguinis in hoc affectu esse irregularem & inæqualem. Atque ita tandem absolvimus disquisitionem de vitiis in distributione vitalis sanguinis: restant jam si quæ sint vitia constitutionis vitalis participatæ in hoc morbo examinanda.

CAP. XII.

Vitia constitutionis vitalis participatæ in hoc affectu.

Diximus supra originem constitutionis vitalis in sanguine arterioso, & præsersertim in spirituosa ejusdem parte sundari: sed quoniam partes solidæ quoque nonnihil de natura vitæ vere participant, iis vitam participatam, five constitutionem vitalem participatam merito adscribimus.

Confistit autem hæc constitutio vita parti-

cipata in tribus.

tem

hoc

nili-

Mi.

affe.

cali.

eita

a, ut

tove-

hu-

cun-

unt.

dum

fectu e ita

effant

tionis

ler.

I. In Unione quadam sanguinis arteriosi stitutio cum substantia solidarum partium quas permeat. ticipata.

2. In calore vitali in istis partibus excitato.

3. In vivificatione & exaltatione constitutionis naturalis, omniumque facultatum natu-

ralium istarum partium.

1. Quod ad Unionem illam sanguinis arte- ma pars. riosi attinet, jure ea prima pars vitæ participatæ reputanda est. Ideo enim partes solidæ de natura vitæ, sive de constitutione vitali participare dicuntur, quod in se vitales spiritus contineant. Neque etenim abique spiritu vitali consistere potest vita. Quando ergo vitalis spiritus in & cum sanguine arteriofo ad partes folidas per arterias distribuitur, atque hæ partes istum sanguinem in suam substantiam imbibunt, sit, ut partes dictæ cum spiritibus vitalibus uniantur, sicque eæ de natura vitæ participent.

Porro cum hæc unio non sit permanens fed transiens & in motu consistat, videtur ea in ipso congressu & mutuo amplexu spivicus infiti naturalis & influentis vitalis con-

Н

In quibus confiftat con

liltere.

filtere. Conditiones autem quæ requiruntur ut hic congressus sit naturalis, sunt,

I. Ut sit utrinque moderatus, non impe-

after 2

Mam C

rolupt

tales VI

gorolis

dam b

exem

tanqu

damm

quafi :

les sp

vigore

loinfit

minos

acrelu

eos ex in luô

ceplo

cettat

tus con

tum di

partiu

true

at vi

majo

tuolus.

2. Ut sit utrinque validus, non langui-

dus aut torpidus.

3. Ut sit utrinque amicus & gratus, non hostilis & insensus; ut sit tranquillus, non tumultuarius; nec nimis sit lubricus, neque

nimis alper.

4. Ut non desinat in dissipationem omnimodam spirituum, quin magis in eorundem sedationem aptamque dispositionem pro reditu per venas. Forte plures istiusmoipintu. di conditiones addi possunt; sed cum ad hunc affectum maxima ex parte parum pertineant, ab ulteriori earum examine hic supersedemus. Notamus tantum in hoc affectu congressum mutuum & unionem vitalis & insitæ constitutionis per spiritus suos non contingere cum eo vigore, activitate, & oblectamento utrinque, quibus alias perfici solet in sanis. Atque hoc vix eget ulla pervao probatione, cum ex supra dictis pateat non tantum constitutionem insitam partium primo affectarum laborare frigida & humida intemperie, inopia & torpore spirituum, sed & sanguinem ipsum vitalem nonnihil refrigerari ac torpidiorem reddi in extremitatibus arteriarum, priusquam in partes primoaffe-

affectas effundatur; ut necessum sit unionem illam cum sufficienti neque vigore, neque voluptate peragi. Enimvero, ubi spiritus vitales vigorosi cum spiritibus insitis pariter vigorosis congrediuntur, non sine lucta quadam blanda & delectante uniuntur. Sive, ut exemplo hoc rem illustremus, spiritus insiti, tanquam sponsa, simul & alliciunt & quodammodo repellunt spiritus vitales qui hic quasi sponsi personam agunt : verum vitales spiritus calore suo stimulati & pulsuum vigore impulsi, audacius confidentius paullo insitos invadunt, eorumque fines ac terminos penetrant subeuntque, dum interim spiritus insiti (ut ut modelte quasi renitentes ac reluctantes) non sine voluptate quadam eos excipiunt. Ipía enim voluptas corporea in lucta quadam amatoria fundatur, princepsque pars ipsius vitæ in istiusmodi concertatione de unione mutua utriusque spiritus consistit. Eo enim fine tum generantur, tum distribuuntut vitales spiritus, ut demum pervadant constitutionem insitam solidarum partium easque sua vitali virtute profunde imbuant : atqui cum non possint hiita penetrare fine nixu & renixu, necessario accidit, ut vigor istus luctæ sive nixus & renixus major minorve fit pro copia, calore, & activitate spirituum inter se concertantium. Quoniam igitur spiritus naturales, tum vi-H '2 tales

ſmo.

His &

not

e, å

tell

n pn amid m, se refi

ring

五

PETE

evinci

nearte

dam to fuloli

potet

partit caulia

inarui

V12D fenti

torm trinfe

loris

raret

mon Org

cum

nece facti

hice

plure

men

prov

lego

ten

tru

dur

fun

Der

tales in hoe affectu nonnihil frigidiores, pauciores, minusque activi sunt, necesse est eorum congressum & unionem ignaviorem, minusque debito esse delectantem. Ad hæc notandum est in hoc affectu (quod & supra latius ostendimus) transitum sanguinis arteriosi per partes primario affectas nimis facilem esse & lubricum, unde hac etiam ratione congressus iste & unio spirituum in istis partibus ignavior redditur, minusque jucundus. Præterea exhalationes calidæ, licet revera parcius ut plurimum in hoc affectu excitentur, excitatæ tamen, ob mollitiem, laxitatem, internamque lubricitatem partium primo affectarum citius quam par est exspirant, unde istas partes magis frigidas & flaccidas relinquunt.

participaiz.

II. Quod attinet ad calorem vitalem solipars vitæ dis partibus communicatum (qui secunda pars est constitutionis vitalis participatæ) partim dependet is ab unione prædicta five incorporatione sanguinis arteriosi cum solidis partibus, partim vero consistit in motu seu nixu quodam expansivo (consimili isti nixui expansivo qui est ipsius sanguinis arteriosi) excitato in ipsis solidis partibus. Primum admodum manifestum est, necesse enim est fanguinem arteriofum calore vitali imprægnatum, ubi intra folidas partes recipitur, iis cum substantia suum calorem quoque imperti120

Dra

nte-

tio-

14

icet

â

em,

par-

eft

das

Coli-

pars

rtim

-100

par-

111-

IXII

ofi)

n eft

prz-

im.

pertire. Secundum etiam non difficulter evincitur. Etenim si calor vitalis in sanguine arterioso radicatus consistat in motu quodam seu nixuistius sanguinis uniformiter diffuso simulque nonnihil cohibito, fieri non potest quin consimilem nixum in solidis partibus, quas pervadit, excitet, cum caussæ naturales semper agant ad extremum suarum virium, & quantum fieri potest, per viam assimilationis. Si quis dubitet an essentia vitalis caloris consistat in tali nixu uniformi diffusivo, moderate cohibito & intrinsecus proveniente, sciat essentiam caloris in genere consistere in motu vel nixu rarefactivo nonnihil cohibito, ut clare demonstrat Viee-Comes Verulamius in novo suo Organo. Hoc autem dato, calor vitalis, cum in se veram naturam caloris contineat, necessario quoque erit talis, nixus rarefactivus nonnihil cohibitus. Verum ut hic calor in genere restringatur ad vitalem, plures conditiones addendæ funt ; quas tamen hic; ne in enormem digressionem provehamur, neque enumerare neque prosequi accuratius possumus. Interim ut materiam & modum habeamus inquirendi, utrum calor vitalis in hoc affectu sit secundum naturam modificatus; necne? vifum est sequentes conditiones paucis proponere.

H 3

g, Quo

àput

ppro

diam.

formi

ntra I

telt,

emu

bent

Enin

MXII I

tum

juxta

enti

ata gr

afte p

none

yeat

con

xizq

tiore

men

calo

iple

COL

tio nes caloris

1. Quo calor vitalis dicatur naturalis seu secundum naturam, requiritur ut ejus origo vitalisse- sit interna, nempe in ipso sanguine arteriocundum so, & per implantationem ac unionem ese haben jusdem, ut superius dictum, ad partes solidas derivetur. Ut enim quid dicatur naturale, necesse est id sit ab interno principio: licet quoque quæcunque fovent, augent, vel excitant moderate internum principium posse eo respectu hanc appellationem subire concedamus.

2. Requiritur, ut calor iste sit moderatus, non remissior aut intensior æquo, sed

gradu apto partibus dispensatus.

3. Requiritur, ut sit quodammodo uniformis suique similis in partibus eadem constitutione similari gaudentibus, modo æque distent à fonte caloris, pariterque ab aliis caussis concurrentibus & vicinis affectæ sint. Verum in partibus longius à fonte caloris distantibus, pariter tamen alias, quemadmodum dictum, affectis, ut uniformiter diminutior sit: similiter in partibus quoad constitutionem insitam frigidioribus, ut sit proportionaliter quoque remissior. Denique in partibus ab aliis caussis diversimode affectis, ita ut una multo intenfius caleat quam altera, requiritur, ut inter partem calidiorem & frigidiorem calor paullatim feu gradatim, & quali uniformiter remissior (fi à pars

s len rigo

n eslo-

ipio:

ent, cipim fu-

iera-, sed

uni-

con-

eque aliis

fint, aloris

nad-

niter

uoad

ut lit

eni-

node

aleat

rtem

or (fi

bata

à parte calidiore versus frigidiorem palpando procedas) deprehendatur: & eo usque etiam uniformitas quædam vel in hac difformitate seu disparitate caloris, dummodo intra naturæ limites manserit, observari potest, Partes enim proximæ sive immediate se mutuo tangentes, non naturaliter se habent, ubi altera præ altera impense calet. Enimvero cum calor hic vitalis confistat in nixu rarefactivo nonnihil cohibito, si is multum inæqualis & difformis sit in partibus juxta se se positis, fiet, ut pars illa quæ violentius nititur, conetur una se divellere ab ista quæ minus nititur, eritque adeo nixus iste præter naturalis dolorem inferens. Confistit enim dolor in solutione continuitatis nondum facta, sed in fieri.

4. Ut hic calor non actuet aut promoveat actionem alius cujusvis qualitatis noxize conjuncta. Quamvis enim in hoc causa noxia qualitats conjuncta przcipue peccet, potioremque partem culpz mereatur, calor tamen in totum excusari non pocest. Nam calor acris & malignus connotant alias qualitates conjunctas przeter nudum calorem, ipse tamen calor vitalis quantenus intendit ac stimulat activitatem istarum qualitatum conjunctarum quo potentius lzdant, ex parte reus est censendus eorundem noxize actionis.

H 4

5. Ex

man

1000

grad

cum

bore

ofte

priu

non

fior

tur.

dec

dia

tion

THU

Hi

III

COL

Cita

1100

buu

VIV

5. Ex parte renixus requiritur quoque moderamen, tum ratione sedationis spirituum vitalium exuscitatorum, tum ratione permeationis sanguinis arteriosi cum ratione transpirationis exhalationum non sedatarum.

6 Est proportio quædam observanda inter nixum vitalis caloris expansivum & renixum eum coercentem. Non modo igitur excessus alterutrius in se vitium est, sed & si alter alteri sit improportionatus, eo ipso

quoque vitiosus est censendus.

7. Rhythmus & ordo quidam tum in nixu tum in renixu est observabilis. Neque enim eodem continuo tenore procedunt; at micando quasi modo intenduntur, modo remittuntur: & intenduntur quidem maxime in diastole arteriarum, ubi sanguis suis cancellis angustioribus non contentus, de ampliore loco luctatur, adeoque arterias distendit donec competens ejus portio in habitum partium excidat & inibi digeratur, tunc quippe locus non adeo in angultias fanguinem cogit, quin per tantillam temporis morulam ab impetuolo suo motu supersedeat. Atque inter caussas pulsationis hæc micatio sanguinis arteriosi non insimæ est notæ Ut hæc jam ad præsens negotium applicemus, è conditionibus modo propositis secunda sola in præsenti affectu videtur ma que

one

110-

ata-

10-

itur

& fi ipfo

ni-

eque l; at

000

axifuis

de

erias

o in

tur,

ftias

1P0-

Der-

hæc e eft

nappoli-

etur

ma-

manifeste desiderari. Calor enim vitalis non moderatus hic, sed desiciens, remissiorque gradu naturali & justo deprehenditur. Nam cum partes primo affectæ frigida ac humida intemperie, inopia ac torpore spitituum laborent, necesse est eas (ut supra quoque ostendimus) calorem sanguinis arteriosi prius quam in earum substantiam essunditur, nonnihil retundere; unde partes istæ remissiorem vitalis caloris gradum, quam iis debetur, participant. Atque hæc dixisse sufficiat de calore vitali partibus communicato.

III. Quod ad ultimam partem vitæ par- Tertia ticipatæ attinet, quæ quidem dependet à pars. duabus prioribus, quæque prima est intentione nature, licet ultima executione, dicimus eam finem quodammodo esse tum constitutionis vitalis, tum distributionis ejusdem, ut & unionis prædictæ calorisque partibus communicati. Non enim sua sola gratia excitantur in sanguine arterioso vitales spiritus, neq; suo tantum commodo in partes distribuuntur, iisque uniuntur; ast maxime, ut vivificent & nobilitent insitam solidaru partium constitutionem earumq; adeo facultates actuent & exaltent. Quemadmodum enim color per se tantum potentia est visibilis, nifilumine irradietur ; ita & facultates illæ infitæ attrahendi, retinendi, coquendi excernendi, & formandi, quali mortua funt &

mere

mere potentiales, quando affluxu vitali non actuantur & vivificantur. Hoc clarissime videri est in lipothymia; nam deficiente vitali influxu, subito labascunt ac languent

omnes istæ facultates.

Verum cum facultates omnes fundentur in aliqua constitutione, quæ earum & caussa & subjectum est, quæri posset, in qua constitutione partium prædictæ facultates fundentur; Respondemus quoad potentialem naturam eas radicari in constitutione insita quam prius descripsimus; verum quoad actuatam & jam vivam factam essentiam dependere eas quoque ab influxu vitali. Atque in genere pronunciamns constitutionem vitalem participatam, quam prius in tribus consistere asseruimus, cum constitutione insita conjunctam, esse integram & adæquatam tum caussam tum subjectum omnium istarum facultatum. Operosior autem digressio foret, quam nostrum institutum patitur, inquirere in specialem modum, quo istæ constitutiones hanc vel illam facultatem in specie determinatam producant. Impræsentiarum tantum breviter percurremus vitia prædictarum facultatum quæ in hoc affectu occurrunt.

1. Vis Formatrix hic errat ob inæqualem affusionem vitalis sanguinis in diversis partibus, de qua supra disseruimus. Hinc ca-

put

727 &

partes

extren

do, 91

2.

partib

perien fpirita vitali

bilen

dentu

reced

eff de

tann

citatio

tion

Con

đa fo

tions

nonn

tatis

bi m

on

ne

In-

112-

Ш,

Az

nin

enitia

au

Tis

Ca-

put & Hepar in nimiam molem excrescunt; partes primo affecte extenuantur; ossium extrema protuberant, quin etiam aliquando, quæ alias recta forent, ossa incurvantur.

2. Coctrix debilis est in hoc morbo in partibus primo affectis, ob insitam intemperiem frigidam, ob inopiam & torporem spirituum, ob lubricam unionem spirituum vitalium cum constitutione insita, & ob debilem calorem vitalem impressum.

3. Attractrix, retentrix, & expultrix videntur haud multum à naturali conditione recedere: attractrix tamen aliquanto segnior est debito; retentrix ob internam subricitatem nonnihil infirmior; expultrix vero con-

citatior justo ob eandem caussam.

Atque ita tandem absolvimus examen vitiorum constitutionis vitalis in hoc assectu. Constitutio animalis jam proxime consideranda soret, nisi quod nonnulla vitia constitutionis insitæ, nempe ejus vitia organica, quæ nonnihil dependent à vitiis quibusdam recitatis constitutionis vitalis, hunc locum, ut sibi magis proprium, vindicarent.

frequencing against of home milities of cities, may

CAP. XIII.

Vitia Organica constitutionis insitæ in hoc affectu.

Quinq; capita vitiorum fitam, immediate quidem ea post vitia simicorum in liaria ejus dem constitutionis justa methodo
hoc mortractanda forent: verum, ut supra monuimus, quod eorum ratio & caussa maxime à
vitiis constitutionis vitalis modo notatis petenda sit, eoacti suimus præmittere horum
tractatum, illorumque adeo considerationem in hunc locum reservare.

Vitia Organica in hoc morbo reducuntur

commode ad hac capita.

naciem, videlicet partium primo affectarum.

2. Ad aliaram partium magnitudinem praterrationem auctam, ut cerebri, totius capitis, & Hepatis.

3. Ad protuberantias sive tumores certorum ossium, ut ossium ad carpos, ad talos, & extre-

mitates costarum.

4. Ad certorum ossum incurvationem, ut frequentius accidit ossibus cubiti & tibia, nonnunquam ossibus femoris & humeri.

5. Ad

dem

quo

rum

ne

tum

Qu

pra

rati

fun

fecu

ant

Tec

&

&i

tion

5. Ad pectoris acuminationem & angu-

fliam.

et

In.

ni-

odo

ni-

ne à

pe.

um

t10+

tur

0

1720

its,

TINE!

cife-

雅

mil-

M

Atquæ hæc vitia infra inter fymptomata & figna hujus morbi memorantur, non quidem quod reipsa mera sint symptomata, sed quod in sensus incurrant, adeoque signorum vicem commode suppleant; tum ratione partium essentiæ morbi altius latentium, tum ratione caussarum ejus abditarum. Quicquid enim ipsum sensu percipitur, & præter se aliquid obscuri menti repræsentat, rationem habet signi. Revera enim hæc vitia sunt partes essentiæ ipsius morbi & quidem secundariæ, cum sint vitiosæ constitutiones organorum actionem lædentes, & dependeant ab aliis partibus essentiæ morbi.

Communis caussa fere omnium modo commurecitatorum affectum videtur esse inaqualis nis eo-& improportionata nutritio, sive αλογολεοφία ia. partium. Hæc autem in hoc morbo à duabus præsertim caussis dependet. Prior est dispar & inæqualis constitutio insita partium irritationaliter nutritorum. Disparitas inter constitutiones insitas partium primo affectarum, & capitis ac viscerum ex supra-dictis nullo negotio colligi potest, ut non mereatur ulteriorem inculcationem. Posterior caussa,

quæ certe non minoris est momenti, est

ipsa inæqualis distributio sanguinis arteriosi

ad partes, ut dictum, inæqualiter nutritas. Quod

Quod sanguis in hoc affectu inæqualiter distribuatur supra monstravimus: hic tantum inferimus inde sequi necessario inæqualem nutritionem partium. Omnia animalia quo pleniore victu utuntur (nisi aliud interveniat impedimentum) eo habitiora & pinguiora cernuntur: subtracta vero debiti alimenti quantitate decrescunt, atque indies extenuantur. Cur non idem animalium partibus accidere judicemus? Sanguis, aut saltem aliquid in sanguine contentum pro ultimo alimento partium omnium agnoscitur. Ubi ergo id liberalius uni parti & alteri parcius dispensatur, minime certè mirum est, si una pars in justo majorem molem excrescat, dum altera interim extenuatur. Sed hæc in genere dixisse sufficiat. In specie,

I. Asserimus in hoc affectu partes primo affectas indies macrescere & emaciari. Neque exspectanda est hujus assertionis probatio, cum quotidiana experientia idem oculis attestetur. Verum cur ita extenuentur istæ

partes, rationes exigamus.

Cut extenuanintemperie frigida nempe, à penuria & ignates in hoc via spirituum insitorum in prædictis partiaffectu! bus. Hinc enim attractrix, retentrix, & coctrix suo munere parum efficaciter in illis defunguntur.

2. Ducitur à laxitate, mollitie, & inter-

mall

early

(DILS

lang

alim

qua

pari

de

na lubricitate earundem partium: hinc enim earum expultrix concitatior est debito, transfeiratio nimis facilis ac dissipativa, circuitus sanguinis nimis lubricus, retentrix debilis alimentum citius & facilius elabi patitur quam par est; atque hic idem pene hisce partibus accidit quod intestinis in Lienteria. Ut ut sit, impense excedunt vectigalia, & per consequens iste partes extenuantur.

3. Ducitur ab inæquali distributione, & quidem diminuta in partibus primo affectis,

de qua satis superque supra dictum est.

110

tæ

ab

ti-

6-

er-

na

11. Afferimus in hoc affectu magnitudinem capitis & præsertim cerebri, ut & magnitudinem Hepatis esse præter rationem auctam. Aliquando coujungitur Hydrocephalus, quem tamen nullam hujus morbi partem, ast diversi generis existimamus : licet nonnunquam hunc affectum posse occasionem ministrare hydrocephalo supervenienti concedamus. Porro vidimus aliquando, supervenienti huic morbo tabe, eaque diu continuata, faciem partesque circa caput nonnihil ante obitum fuisse extenuatas. Non samen id evenisse à morbo de quo agimus; ast à Tabe huic accidente. Interim ut ratio reddatur magnitudinis supra modum auctæ in prædictis partibus, notemus.

r. Partes ad caput & viscera sere omnia pertinentes, nervos ab illa parte spinalis medullæ quæ intra calyam concluditur, recipere, & propterea non necesse esse hasce
partes infelici conditioni partium primo afsectarum subjici. Quare nulla ratio nos cogit asserere, hasce auctas partes vel intemperie frigida vel penuria & torpore spirituum
assici, vel attractricem, retenticem, aut coctricem sacultatem inde vitiatam obtinere;
& per consequens, partes hæ eximuntur
omnino à prima caussa modo recitata extenuationis in reliquis partibus primo assectis.

2. Notemus neque laxitatem, flacciditatem, mollitiem aut internam lubricitatem in dictis partibus supra modum auctis dominari, neque has qualitates (quemadmodum accidit partibus primo affectis) expultricem debito concitatiorem præstare, adeoque metuendum esse exportationem superare importationem, quod in partibus extenuatis

contingere docuimus.

3. Notemus sanguinem in circuitu suo quo parcius ad partes primo affectas distribuitur, eo liberalius hasce auctas partes rigare. Hoc superius probavimus, neque pluribus hic in eam remopus. His ergo notatis, evidens occurrit ratio, cur prædictæ partes irregulariter augeantur: Etenim si in iis attractrix, retentrix & coctrix non debilitentur secundum primam annotationem, & expultrix non sit justo concitatior sec. se-

cundam, atque interim copiosius alimentum iis affundatur sec. tertiam, necesse est earum molem improportionate excrescere. Nam ubi abundat alimentum, neque suo officio desunt facultates, fieri non potest quin

plenior partium nutritio subsequatur.

ic.

afe af-

0-

ope-

muu

tco-

ere; ntur

atedis,

idi-

tem

)mi-

dum

em

me-

m-

atis

fuo

Atri-

es ri-

eque

100idz

fiin

de-

nem, c. 60.

CIII!

III. Asserimus, protuberantias sive tumores offium in carpis, talis, & extremitatibus costarum duplici nomine vitiatum organum efficere, ratione scilicet tum magnitudinis, tum figuræ. Partes utroque modo viriatæ oculisobviæ sunt, ut frustra alia sit exspectanda probatio. Sed cur ossa ad istum modum, in istis locis, sic protuberant? Arduum certe est hujus rationem reddere, neque forte audemus polliceri nos omni ex parte curiosis satisfacturos. Itaque loco refponsionis sequentes observationes non plane inutiles in medium proferimus.

r. Ossa in multis cum Parenchymatis viscerum conveniunt. Nam 1. constant ex Protubemateria quadam similari à sanguine perla- ossumin bente secreta, nec laboriosa assimilatione o- hoc affepus habente, & omnino facilem nutritio- (x. nem, donec ad anunv incrementi pervenenerit, videntur admittere; nutriri porro usque dum ad extremam forte siccitatem per ætatem perducantur, & extenuationi notabili vix videntur esse obnoxia: ita & parenchymata similaria sunt per secretionem à

4000 din

ermat

pt (ma her dur

longio

am di

guas d rioltic

um VI

10THI mela b

extim

digni

atter

tineal

tertu

EXCIE

nequ

poter

Conce cellu

ment

inuti

Aliq fiun

cum

litar

Offa

sanguine sere solam congesta, facile crescunt, ægre raroque extenuantur. 2. Oisa simili fere modo, quo parenchymata, aluntur. Per arterias recipiunt sanguinem, per venas superfluam portionem amandant, ac loco vasorum tertii generis, quibus exterminantur excrementa; cavitatibus & cellulis donantur. Dubitet forte aliquis de arteriis offium, cum tam dura & rigida pars inepta videatur intra quam pulsent arteriæ. Concedimus quidem minus apta esse ossa pro arteriarum pulsatione ob duritiem suam & rigiditatem, adeoque agnoscimus ea non aliquam notabilem arteriarum ramificationem in se admittere; verum si quis inde inferre velit nullas plane introadmitti arterias, næ is sibi nos omnino repugnantes habebit. Sunt etenim partes vivæ, nutriuntur, crefcunt, facultatibus attractrice, retentrice, codestini. Etrice gaudent. Deinde sanguinem ea intra se recipere quem non possunt nisi per arterias, patet ex corum cruentatione five fracta fint, sive rasa, aut alio quovis modo divisa in vivis adhuc animalibus. In junioribus animalibus, spongiosa otsium substantia ipsaque medulla, sanguine suffusa cernitur, & maxima pars cavitatum earum non tam medulla, quam sanguine referta est. In majoridus animalibus observare licet venas & arterias per membranas ipsam medullam involven-

Offa non omnino Arteriis

ventes distributas : quæ omnia satis arguunt Of distributionem sanguinis ad ipsa ossa. Vealun rum natura sagax (quæ in omnium partium formatione commodissime omnia concinnat) prospiciens hic arterias venasque propter duritiem offium non posse convenienter de longiori ramificatione per substantiam offiante um disseminari, numerosas eas, at valde exiine guas & plerumque capillares mediante pe-Con rioftio hinc inde sparfim in foraminula offiwar um vix conspicua ejaculatur. Immo in ma-& it jorum animalium diu elixatis offibus foraminula hæc infertionis vaforum fatis facile in extima superficie detracto periostio cerni queunt. Sed hæc sufficiant dicta de venis arterifque offium, cum res hæc minus pertineat ad nostrum scopum. Quod ad vasa tertii generis attinet, quandoquidem offium excrementa non plane inutilia erant futura, neque commode extra corpus exterminari poterant, natura, loco vasis tertii generis conceptacula quædam (cavitates nempe, & cellulas) construxit, in quæ offium excrementa, partem scilicet pinguem quæ plane inutilis est ad ossa nutrienda, reponeret. Aliqui quidem medullam effe proximum of- Medulsium alimentum existimant; sed perperam, lam non esse ossi. cum hæc, ut modo diximus, plane inepta um alisit ad offium generationem & nutritionem. mentum. Ossa enim non tantum durissima & solidissi-

arte-

fracta

15 2111-

ipla-

tur, &

m me-

najori-

ven-

quan.

OC III minuf

consp

offall

VIX CO

to bu

minu iplan

tione

QUO I

ment dentil

rum o

fina

mil

renc

luas

Ranti

bent

mult

Q12 fire

tes dia

gen

parc.

ma atque ex se albioris coloris sunt, sed & constant ex substantia quadam terrestri satis tenaciter cohærente; quæ conditiones longe absunt à medulla. Hæc quippe in igne tota conflagrat & in flammas abit; offa vero, nisi ratione medullæ, vix flammam concipiunt, sed in terrestrem substantiam fere tota calcinantur. Deinde nulla arte ad illam firmitudinem, quam in offibus cernimus, perduci potest medulla. Porro medulla ad moderatum ignis calorem liquescit & dissolvitur; osla vero ardentissimas ignis flammas sine ulla eliquatione fustinent. Præterea ossa per diuturnam elixationem non in medullarem substantiam, sed gelatinam quandam resolvuntur. Tandem ossa in pulverem comminui possunt: non sic medulla. Certum ergo est medullam non esse ossium rum ex- alimentum, sed quoddam eorum excrementum sive potius secrementum, utile id quidem, suisque adeo conceptaculis asservanmenum. dum. Offa enim natura sua alioquin sicciora, frigidiora, & asperiora, minus apta forent motui, nisi medullæ seu exudationibus seu exhaletionibus humectarentur & lubrica redderentur, blandoque ejus calore foverentur. Hæc omnia uno fere sequenti experimento confirmantur. In animalibus junioribus æstimata magnitudine ossium, minus medullæ inest ossibus, plus sanguinis, quain

Sed quoddam cocremenfecreed& quam in grandioribus. In fœtu nondum edito. vixdum vestigia medullæ à sanguine distinctæ observantur, post partum vero indies medullaris substantia augetur, & minus minusque sanguine suffusa eique permista conspicitur: in ætate demum consistente ossa medulla fere pura & sincera, sanguine vix conspersa, replentur; in senectutis vero progressu credibile est ossa indies nunus minusque irrigari sanguinis circuitu, & sorte ipsam medullam tandem cessant fere nutritione offium potius imminui quam augeri: quo respectu limitandum forte est experimentum propositum. 3. Ossa(exceptis forte dentibus) nervis carere & vel non, vel parum certe, neque aliter quam ratione periostii aut fibrarum ejus in ossium foramina immissarum sentire creduntur. Similiter Parenchymata viscerum videntur potius per suas membranas & vasa quam per suam substantiam sensum illum, quem obtusum habent obtinere.

William .

ite ad

ern-

dulla

cit &

ignis

.Frz-

nonin

tinam

pul-

dulla,

lium

emen-

d qui-

rvan-

10010-

ota fo-

nibus

lubri-

re fo-

nti ex-

DUS TE-

, mi-

quam

Ex his colligimus offa in hoc affectu non multum aliter affici respectu nutritionis quam parenchymata viscerum. Supra monstravimus ossa non esse numeranda inter partes primo affectas, ut neque parenchymata dicta: hic modo ulterius afferimus offium genus five offa universa simul sumpta non parcius fortein hoc morbo ali, quam alias in

II.

10060

mq

milare

tx part

ex par

fas.

Hi

DOD 6

virtut alia o

IV

quali

putrit

00000

queh

perquaffect

lis &

locis

quis page

licet

mus.

mag

ræe

liore

post

tum

sanis solent. Si enim per modum congestioni fimilem ut parenchymata, atque adeo facile alantur si possideant arterias & venas ad ea deductas, & cellulas ac cavitates ad fanguinem recipiendam, si non sint in numero & conditione partium primo affectarum, neque nervos à spinali medulla recipiant; credibile omnino est non male ea posse alimentum suum recipere, retinere, ac coquere. Porro si consulere libet experientiam, Pueri hoc morbo laborantes habita ratione ætatis ac magnitudinis partium aliis fere ponderosiores sunt; ut aliquoties observavimus, quod certe ex parte adscribendum videtur offium magnitudini. Quamvis hic magis frequentes, certas, & diligentius expensas optemus observationes, quas alii occasionem nacti sibi poterunt subministrare: interim opinamur osla in genere non admodum parce in hoc morbo nutriri. Dicat aliquis, quæ hactenus dicta funt spectare offium nutritionem in genere, non vero ex iis reddi rationem eorum protuberantiæ. Non id dissimulamus: atqui, cum vitia hæc offium dependeant ab eorum inæquali nutritione, ut supra probavimus, non inutile hic proponere duximus aliqualem rationem nutritionis eorum in genere. Pergimus jam propius ad prædictos offium tumores. Atque observamus. II. TuII. Tumores istos ossium non esse heterogenei generis respectu cæterarum partium ejusdem ossis, sed esse partes planesimilares & cum cæteris homogeneas, neque ex parte constitutionis similaris, sed tantum ex parte magnitudinis & siguræ esse vitiosas.

Hinc sequitur III. Has protuberantias non ex materia ossium illegitima, aut per virtutem aliam, quam è qua & per quam

alia ossa, generari.

elli-

ecta-

-91

10 62

ere,

habi-

tium

oties

dleri-

uam-

dili-

nes, t lub-

enere

itnin.

t spe-

non

tube-

cum

ing.

non,

m 12-

Per.

mu-

Tu

IV. Tumores dicti producuntur ex inæquali nutritione offium, puta ex liberaliore nutritione protuberantium partium & parciore cæterarum partium ejusdem offis. Atque has tres ultimas observationes satis superque probavimus supra, ubi de partibus affectis actum.

V. Observamus Epiphyses ossium in talis & carpis, forte etiam in nonnullis aliis locis, molliores ac spongiosiores esse reliquis partibus eorundem ossium. Quin forte majores arterias & venas in se recipiunt, licet hoc nondum satis exploratum habeamus. Extremitates etiam costarum multo magis spongiose sunt & molles quam cæteræ earum partes. Unde inferre licet molliores istas & spongiosiores ossium partes posse facilius ac liberalius sanguinis circuitum admittere, adeoque plenius nutriri

que

1120

mor

hoc

tran

um

cep

one:

12:

cap

CUS

apti

affi

nib

id

CHI

abl

fiz

effe

que

pe

00

(O)

pa

tes

quam cæteras earum partes. Dicas, istarum partium mollitiem & spongiositatem non minus in pueris sanis quam hoc morbo afflictis reperiri. Concedimus id quidem, sed necesse interim est partes, quarum substantia compactior est, quæque difficilius sanguinis circuitum admittunt, leviori de caussa affici atque obstrui, quam eas partes quæ facilius recipiunt & apertiores sunt. Sanguis autem in hoc affectu frigidior, viscidior, paulloque crassior debito, externis partibus affunditur; quæ ergo partes ineptiores funt ad ejus transitum admittendum, ex prompte nonnihil obstrui parciusque nutriri polfunt. Sed cur in sanis dictæ partes molliores spongiosiores non item liberalius nutriantur cum largius quoque vel in fanis, ut dictum est, sanguinem recipiant? Respondemus, quia in sanitate ut istæ partes liberalius per arterias sanguinem percipiunt, ita & liberalius per venas eundem remittunt, quod certe modum ponit nimio earum alioquin futuro incremento. In hoc affectu vero eædem partes, ob frigiditatem, crassitiem, ac visciditatem affusi sanguinis, parcius forte aut tardius eum remittunt quam iis affunditur, adeoque ex sanguinis copia plusculum excrescuntistæ partes, dum cæteræ offium partes ob angustiam cavitatis arteriæ, forte vix satis copiose sanguine rigantur quo ex æquo

um

100 Hi-

fed

an-

an-ulia

quz guis

aul-

is af-

unt

mppol.

ores

tan-

di-

000-

,ita

unt,

alio.

vero

11, 20

torte

undi-

olon

fium

forte

o ex

equo

æquo debitoque nutriantur & crescant. Atque hinc (faltem probabiliter) deducimus inæqualitatem nutritionis ossium in hoc morbo. Conditio autem sanguinis qua in hoc morbo apta est ullas partes per quas transit obstruere, videtur peculiariter oseum genus respicere. Namin visceribus, exceptis pulmonibus, rarius sanguis obstructiones parit, ut neque in partibus primo affe-Etis; cujus rei forte interna lubricitas est caufa: Ut ut fit, offeum genus; five quod incapax fit internæ lubricitatis; five quod fuccus nutritius in massa sanguinea peculiariter aptus fit in partibus tantopere fixis concrescere; sive quod idem sit natura sua ossibus affinis; offeum (dicimus) genus obstructionibus facile in hoc affectu infestatur, indeq; id inæqualiter nutriri contingit.

Dentitionis vitia huc etiam referenda sunt, Vitiatocum ea quoque maxime dependere videntur tium in ab hac inæquali offium nutritione. Etenim hoc affesi æqualiter dentes nutrirentur, uniformes du causessent substantiæ, neque frustulatim, ut frequenter hic accidit, exciderent. Partes quippe similares, quando æqualiter nutriuntur, non adeo interruptam atque inæqualem consistentiam acquirunt, ut facile frustulatim comminuantur. Quare cum dentes fint partes substantia similari naturaliter gaudentes, si æqualiter nutrirentur, uniformen

& x-

& æqualem consistentiam haberent, & vel integri in alveolis suis persisterent vel integri exciderent ; vixque alia ratio sufficiens videtur reddi posse; quamobrem ex una parte magis quam ex alia frangerentur & per frusta exciderent. Concedimus quidem friabilitatem huc multum conducere, sed & istam friabilitatem magna ex parte à prædicta inæquali nutritione dependere arbitramur. Solent enim alias dentes satis firmam, solidam, ac sibi cohærentem consistentiam obtinere; & certe ex materia satis viscida præsertim in hoc affectu videntur confici; siquidem hæc massa sanguinis justo viscidior & crassior sere deprehenditur, ut sacile non sit hanc friabilitatem dentium desectui visciditatis materiæ, at multo probabilus inæqualitati nutritionis adscribere. Concludimus ergo, protuberantias offium, tum vitia dentium oriri ab inæquali nutritione istarum partium, proveniente à peculiari dispositione sanguinis obstructiva, ossa præsertim respiciente. Procedimus jam ad ossium incurvationem in hoc morbo.

IV. In hoc affectu frequenter solent ossa nonnihil incurvari, præsertim Tibiæ & Fibulæ; stem ossa Humeri & Femoris; Articuli etiam nonnulli inclinantur, nunc introrsum, nunc extrosum; tota spina etiam sæpe inflectitur, interdum in modum lite125

parti

lum;

COTU

nella

Hex

cede

dua

CBS

ped

fimi

dun

poli

fria

affe

rea

aen

hoc

in in

THE D

mi

po

Па

fran

ræ S. introquetur, partim scilicet antorsum, partim retrorsum, aut etiam partim dextor-

sum, partim sinistrorsum.

Curvitatem hanc oßium aliqui adscribunt curvitaeorum flexibilitati. Aiunt enim in tam tetis offinella ætate offa ipsa ex se non esse adeo inmetate adeo inse silia rigidaque, ut provecta; itaque accedente hoc affectu forte plane flexilia gradu aliquo reddi: Invehuntur ergo in nutrices, quæ infantes puerosque præmature suis
pedibus committunt, existimantes eorum
offa ab onere sustentati corporis slecti. Alii
similiter imperitum nutricum sasciandi modum accusant.

Verum his ex omni parte assentiri non possumus. Et primo quidem ossa in Pueris hoc modo afflictis magis flexilia minusque friabilia & rigida esse quam in aliis plane negamus. probavimus enim supra ossa in hoc affectu quoad similarem naturam non differre ab offibus fanorum. Præterea, nemo hactenus fide dignus testatus est se vidisse in hoc morbo offa flexilia. Adhæc, si daremus in tam tenella ætate offa forte nonnihil inflecti posse, non tamen manerent slexa ut plumbum aut cera, sed suæ libertati permissa redirent denuo ad propriam partium positionem. Non enim constant ex materia ductili, adeoque vel inter flectendum frangerentur, vel certe niterentur repetere pri-

ım

ti.

23

1000

prend lus D

titud

2 (11

cune

plius


angu

fpe

ma


pristinum partium situm. Quod ad nutricum vel imperitiam vel incuriam attinet,
licet eam ex omni parte non excusemus, vix
tamen merito hanc curvitatem iis imputare
possumus. Videmus pauperum liberos minori cura tractari, pedibusque citius committi quam generosorum; illorum tamen liberi rarius hoc vitio infestantur quam horum. Præterea nutrices novimus, quæ, summa etiam adhibita diligentia, tum in fasciandis, tum in alio quo vis modo tractandis infantulis quos lactarent, non tamen potuere
hanc ossium curvitatem præcavere. Nobis igitur alia hujus curvitatis caussa exquirenda est.

Comparemus ergo ossa, quibus curvitas accidere solet, columna; & certe satis apposite, cum, si erigantur, columnam quodammodo referant: atque inde demonstrationem rem hanc explicantem & illustrantem deducimus. Esto ergo columna ex tri-



bus lapidibus A B C sibi invicem impositis exstructa. Supponimus talem quæ ob omni latere perpendiculariter sic erecta, ejusdemque altitudinis. Si ergo à dextro
latere immiseris cuneum inter lapides A B per
line-

lineam FD necessario caput columnæ, supremus nempe lapis A inclinabitur versus D angulumque in D consiciet, & altitudo columnæ à dextris erit elatior quam
à sinistris. Similiter si alterum impuleris
cuneum per GE inter lapides BC amplius adhuc incurvabitur columna, sietque
angulus in E. Stat ergo jam columna in-



ul-

25

10-

Ta-


10-

n-

taereituerro
eum
per
ne-

clinata ad lævam in hunc modum ABC FG DE. Quo autem ex pluribus lapidibus columna exftruitur, fi inter quosvis duos, ut dictum, cuneus ab uno solo latere interponatur, non columnæ

speciem, at portionem arcus referet; quemadmodum in seq. sigura AB sit conspicuum.



Ut ergo hæc ad præsens negotium accommodemus; si ossa prædicta ab altero latere plenius alantur, adeoque secundum oppositum; necesse sit illa eo ipso incurvari. Nam hic eodem modo se habet plenior istius lateris nutritio ad incurvandum os, quo fe habet cuneus ita immissus ad columnam incurvandam, nisi quod cuneus certis tantum locis lateris columnæ infigatur, plenior vero nutritio lateris offis fiat ex æquo fere fecundum totam ejus longitudinem. Etenim alimentum intra os aflumtum qua parte liberalius admittitur, ea id suffarciendo, ad modum cunei columnæ intrusi in longitudinem auctiorem protendit; qua parte vero parcius, ea id minus protendit, unde necessario accidit os incurvari versus latus quod pari passu cum altero non elongatur.

Por-

pon a ejuld

tun

figur ro fi latus

tur, infle

cult fimi affect

nela

long

dun

exip

tiste

210

late

triti

quar

gist

opp

mag

Ita (

OI

Ad

ter

CUIT

Sol

Porro si productio unius lateris columnæ non accidat tantum in uno vel duobis locis ejusdem, ast in pluribus, ut in tertia figura, tum eo proprius ejus inclinatio accedit ad figuram portionis circuli, seu arcus. At vero si secundum totam longitudinem dictum latus ex aquo ultra oppositum produceretur, ex æquo certe versus oppositum latus inflecteretur, atque exacte segmentum circuli seu arcus sine ullis angulis effingeret ; fimili plane modo incurvatio offium in hoc affectu oritur, à majore nempe elongatione lateris plenius nutriti: cum enim illa elongatio per intus affumtum alimeutu fecundum omnes partes istius lateris accidat, non exspectanda est angulosa figura, aut ex multis rectis angulatim connexis composita, ast arcuata, in qua convexa pars conflituitur à latere plenius, concava à latere parcius nu-Quando autem contingit unam alitrito. quam partem lateris convexi offis curvi magis improportionate nutriri respectu lateris oppositi, ex illa certe parte os convexum magis quam ex cæteris prominebit. Atque ita ex inæqualitate nutritionis, rationem curvitatis offium in hoc affectu reddidimus. Addamus, coronidis loco, in hujus rei ulteriorem confirmationem observationem à curatione hujus curvitatis offium deductam. Solent medicastræ nostræ fricare quotidie late-

115

latera offium cava, non convexa, illamque frictionem multum conducere ajunt ad curationem, hanc verò potius nocere. Certum autem est frictionem liberalius evocare fuccum in massa sanguinea nutritum ad partem sic fricatam. Quando ergo partem cavam, quæ parcius debito alitur, fricueris, non mirum est si id profuerit, cum eo alimentum copiosius alliciatur, & calor partis quoque excitetur atque augeatur; neque è contra mirum si ofsis pars gibba frictione amplius lædatur, cum ea alimentum ad partem, prius nimiopere nutritam, plenius attrahatur. Præterea unguenta quæ possunt fovere calorem insitum & nutritias facultates roborare post frictionem, parti ossis cavæ adhibita magis conveniunt, parti vero convexæ ligatura strictior & reprimens nonnihil ossis prominentiam utiliter solet adaptari: ea nempe potissimum ratione, quod à tali ligatura arteriæ capillares, quæ ad illud offis latus fanguineum seu succum nutritium advehunt, constringantur, ejusque adeo nutritio imminuatur. Atque hæc sufficiant dicta de offium, in hoc affectu, curvitate.

Infle-Otionis Articulotum caufæ,

Huic insuper Titulo adjicimus opportune Inflexionem articulorum nonnullarum, ut genuum & talorum, quæ frequenter in hoc affectu occurrit, modo introrsum modo extrorsum trorsum sacta. Atque hæc inslexio quoque videtur interdum non incommode referri ad inæqualitatem nutritionis. Etenim si ex in-

ue one

IUS

unt

ca-


ors 011idauod ad

nu-

CUI-

por-, ut hoc

oexfum



K

æquali

CEUCIDUS

appalitar

Foulam

Porto

titudin

ounque e

Tibiæ, puta exterius, præ altero ita elongetur ut nonnihil attollat exteriorem sinum
epiphyseos offis Tibiæ præ sinu interiore,
necesse est articulum genu exterius slecti;
& è contra elato sinu interiore & depresso
exteriore, eundem articulum, interius slecti: Ut per sequentes siguras redditur con-

In articulo genu A B, sinus appendicis tibiæ B, in priori sigurarum pari, elatior est sinu altero ejusdem appendicis; unde os

femoris C interius nutat, & similiter os tibiæ D; articulus vero A B exterius non nihil truditur. In secundo vero sigurarum pari omnia contraria observantur. Articulus A B interius slectetur, quod sinus appendi-

cis tibiæ A elatior sit sinu ejusdem B; unde necessario attollit interius & inferius capi tulum ossis semoris, adeoque os semoris ex

Idem in Talis quoque, necnon in verte bris dorsi contingere potest, si ossa articula connexa ab altero latere altiorasint quam en adverso. In Talis verò, cum illic præte os Tibiæ Fibula quoque per Articulum committatur, sieri potest, ut Fibula inserius longior extet Tibia, sicque articulum Tali exterius slectat; & è contra si accida antes, or Tibiam Fibula esse longiorem, interius se anni sin

cti articulum necesse est. Quamvis hic concedemus non adeo frequenter ejusmodi inæqualitatem longitudinis inter Tibiam & Fibulam evenire.

Porro existimamus præter naturalem spi- Inflexio. næ inflexionem rarius accidere ab inæquali nis spinæ altitudine laterum offium vertebrarum, frequentius vero ab alia causa, quam jam prosequemur. Diximus supra totam spinam in hoc affectu esse debiliorem, puerosque hoc malo afflictos non modo ad motum, sed & ad infiftendum pedibus, immo & ad erigendam spinam ob debilitatem esse ineptiores. Quando ergo corpus ipsis quomodocunque erigitur, quærunt sustentaculum, spinamque modo antrorsum, modo retrorsum, modo dextrorsum, modo finistrorsum flecti permittunt, quo onus corporis rebus ambientibus pro levamine incumbat. Hinc sæpe fit, ut ligamenta vertebrarum spinæ à parte lateris frequentius prominentis laxentur atque elongentur, à parte vero opposita contrahantur; ita ut tractu temporis secundum rectam & naturalem lineam spina erigi non possit. Atque hinc Incuria lane nutricum negligentiam & incuriam mi- nutricum nime excusare possumus, quod non satis attente observent in quam potius partem inantes, quos lactant, corpus suum inclinare oroni fint, quo in oppositam id sedulo diri-

gere satagant. Similiter etiam quando nutrices præmature infantes debiliores, & fine debita cura pedibus committunt, fieri potest, ut, cum motus tonicus musculorum sit no priori impar sustentationi corporis, pueri sive genu five talum ad alterutrum latus inflecti fi- Mete ag nant; unde ligamenta articuli ab externa autinterna ejusdem parte extenduntur, & per consequens ligamenta lateris advers contrahuntur, quo necesse est articulum aut de Ho extrorsum aut introrsum flecti. Quamvis in trud ergo supra negavimus curvitatem offium for for hinc dependere, concedimus tamen articulorum distortionem in infantibus debilioribus ex tali nutricum incuria accidere posse Concedimus insuper ex constanti inepta fasciatione offa, quæ alias forent recta, posse incurvari: hanc tamen causam rariorem ir præsenti affectu esse existimamus, ut fusius supra declaravimus. Procedimus jam ad angustiam & acuminationem pectoris in hoc morbo.


Angutionis Pecaul æ.

Notamus hanc angustiam & acuminatio. flix & A. nem pectoris non statim ab initio morbi apcumina- parere, fed confirmato demum morbo fupervenire, paullatimque intendi, donec diu perseverante morbo evidens ea & insignis observetur, quando pectus antrorsum refert carinam navis, aut pectus Gallinæ, Hujus vitiatæ figuræ pectoris, quod alias fecundum

lum naturam latum, non à lateribus coar-Statum, & antrorsum planum non acuminatum foret, ad 4 causas reducimus; quarum res priores minus efficaciæ huc contribuee, ultimam vero totum fere negotium abolvere agnoscimus. Cum tamen tres prioes aliquid saltem huc contribuant, eas quoque hic ordine recitabimus.

Sit 1. In hoc affectu os sterni ex aucta 10le Hepatis nonnihil elevatur five antrorun truditur, unde nonnulla portio dictæ itiatæ figuræ constituitur; atque insuper k eadem elevatione offis sterni nonnulla ontractio costarum versus spinam inferir, qua altara pars confit istius vitiosæ figu-

e. Hanc contractionem constarum sic de-



terna


1, &

poffe

monstramus. Sit circulus ABCD. Supponitur is confici ex materia flexili, sed non æque extensibili, verbi gratia, ex offe Ceti. Quando ergo distenduntur latera A C ab invicem, ita ut

rea distantiæ inter A C producatur in lonm, pari tunc fere passu latera D B istius culi necessario contrahuntur, & eadem Hojus pera linea lateralis distantiæ à D ad B abeviatur; ex circulo enim formatur fidum

gura ovalis, ut qui experiri velit deprehendet. Mutabitur quippe figura in eum fere modum quem sequens figura



exprimit, in qua linea di-Stantiæ inter A & C protenfa repræsentatur, simulque linea D B abbreviata apparet, circulusque redditur ovalis; neque pluribus ad hoc probandum est opus. Sciendum jam est costarum paria oppofita, præsertim superio-

ra quæ maxime pectus efformant, mediante, à parte postica, spina; à parte anterio. re, Iterno, rudem quandam figuram circularem exprimere. Neque quemquam mo vere debet, quod non constituant circulur exactum & perfectum, cum demonstratio nostra non minus procedat in circulari figura ut imperfecta quam in perfectissima, mo. do ejus partes undique cohæreant, non sin intortæ, fint flexiles, sed non facile exten siles; quæ conditiones abunde conspiciun tur in figura modo proposita costarum.

Si ergo in hoc affecturos sterni antrorsa nonnihil elevetur, quo cedat hepatis mo li, necesse est costas propius ad se invicer versus spinam adduci, quo necesse est pe Etus lateraliter coarctetur, minuta ejus la maes

titudine.

Dici

ceret ad

quando

Actus t

tum el

accidit

110765

tius qua

Ref

ticular

umco

re ad

rum v

plenitu

xime d

que ett

tiata

lumm

fic pro

bgurz

lemns,

driaple

ganta

Hepati infimo

guand

deniqu

Dicat aliquis; si elevatio osis sterni condu-object.

ceret ad coarctandam latitudinem Pectoris, id

potissimum prastaret circa costas inferiores,
quandoquidem ab inferiore parte elevatio hac

sterni incipiat; verum contra evenire omper
tum est, si quidem coarctatio pectoris maxime

accidit circa alias & mox infra claviculas, infe
riores vero costa videntur ad latera expandi po-

tius quam constringi.

ntism invite eaff Respondemus inseriores 5 costas non ar- Resp. ticulari cum sterno, neque integrum circulum conficere, adeoque nullo modo spectare ad demonstrationem propositam: illarum vero distentionem aliunde, nempe à plenitudine hypochondriorum, de qua pro-xime dicemus, dependere. Notandum quoque est nos hanc non præcipuam causam vitiatæ siguræ statuere, immo tantillum solummodo eo conferre existimamus. Atque sic procedimus ad secundam causam hujus siguræ vitiatæ, quam etiam leviusculam censemus.

Sit II Causa. In hoc affectu hypochondria plena & tensa perpetuo sere deprehenduntur, nimirum tum ob magnitudinem Hepatis, tum quod omnia sere viscera in insimo ventre contenta satis ampla sint, quandoquidem in iis, ut ante dictum, prima essentia hujus morbi non radicatur; tum denique quod intestina & ventriculus plus K 4 minus fere flatibus distendantur. Jam vero ex illa plenitudine & tensitate hypochondriorum colligere æquum est costas in hoc affectu plusculum quam par est, deorsum trahi. Nam maxima tensitas hic observatur in musculis obliquis qui hypochondriis subtenduntur: Musculus autem oblique descendens habet capita dentata 6 7 8 & 9 costis affixa, & pars quoque tendinis lati obliqui ascendentis implantatur cartilaginibus costæ 9 10 & 11. Quare cum dicti musculi perpetuo fere nimium tensi in hoc affectu deprehendantur, necesse est eos nonnihil deorfum trahere dictas costas; & cum omnes costæ firmiter inter se per musculos intercostales connectantur, accidit omnes costas in hoc affectu plusculum deorsum trahi. Jam vero quod costæ ita detractæ nonnihil coarctent pectus ex seq. figura demonstratur.

vero rum ectu rahi.

nuf-

iun-

nxa,

cen-


t29

erpepreleormnes nteroftas rahi,

onni-

mon-

Sit



Sit A B spina dorsi. C D E costa. F. os sterni: supponimus hic quod cuilibet in sceleto cernere datum est, Costas non committi cum spina secundum angulum rectum, sed angulum infra costam esse paullo recto minorem, adeo ut si costa paullulum sursum trahatur, ejus articulatio cum spina propius ad lineam rectam accedat. Supponimus

nimus etiam articulationem costæ ipsius sive cum spina, sive cum sterno manere stabilem, & non trahi fursum (ne quis erret) sed medias tantum costæ partes inter articulationes dictas. Dicimus ergo è contra, quo magis deorsum trahitur costa, eo acutiorem cum spina angulum conficere. Quapropter pars costæ maximæ à spina dorsi A B distans (nempe D in singulis figuris) ut deorsum tracta acutiorem angulum cum spina constituit, ita quoque minus quam antea à spina distat, & latitudinem Pectoris angustiorem reddit. Namlatera pectoris tunc quidem latissima erunt, quando costæ maxime eriguntur super spinam secundum lineam rectam. Nam pars costæ D tunc maxime distabit à spina dorsi A B, quemadmodum cernere licet, si conferantur 1 & 2 figura cum tertia, siquidem in figura 3 exprimitur costa erecta ad angulum rectum cum spina, & tunc pars costæ D evidenter magis dittat à spina dorsi A B, quam in prima vel secunda figura; ut intuenti sit conspicuum: in 2 vero figura costa cum spina supponitur valde acutum angulum conficere, & pro proportione pars ejus D (ut videtis) minus distat à spina, quam eadem pars D in prima figura, cujus angulus minus acutus supponitur: & adhue multo minus ea distat à spina quam in tertia tertia figura, cujus articulatio ad angulum rectum erigitur. Inferimus ergo costas, quando sursum trahuntur, ampliare non-nihil pectus lateraliter; quando vero deorsum trahuntur, idem à lateribus coarctare.

Hoc ipsum ulterius confirmatur eo, quod quo tempore pectus dilatatur, nempe ubi inspiratio peragitur, costæ nonnihil sursum, vi musculorum intercostalium, trahuntur; & quo tempore pectus contrahitur, nempe ubi exspiratio peragitur, eædem costæ nonnihil deorsum, ope musculorum obliquorum abdominis, retrahuntur. Id quivis in se ipso aliove experiri potest præsertim in magnis inspirationibus & exspirantibus. Percipiet enim liquido in magna inspiratione costas simul elevari nonnihil sursum, unaque ampliare latitudinem pectoris; in magna vero exspiratione costas nonnihil deorsum, eademque opera introrsum contrahi. Neutrum horum contingere posset, nisi talis esset costarum positus, ut ex inferias respectu spinæ conficerent acutum angulum, magnisque depressæ adhuc acutiorem, & per consequens magis tunc coar-Ctarent pectus; & è contra sursum motæ propius accederent ad angulum rectum cum spinu, adeoque pectoris latera extenderent. Concludimus ergo ex plenitudine & tensitate hypocondriorum in hoc affectu costas non-

do

le-

ta

В,

m-

in

110

12

B,

m-

0-

m-

215

113,

IUS

ad

tia

nonnihil deorsum trahi, pectusque à lateribus coarctare; licet concedamus, ut supra monuimus, causam hanc non tantum valere, ut ei magnam hujus vitii partem tribuamus.


Sit III Causa hujus vitatæ figuræ pectoris Adnascentia lateralis Pulmonum cum Pleura, quæ in hoc morbo confirmato frequentissime observatur. Certe ejusmodi Adnascentia nonnihil restringit atque impedit motum costarum extrorsum, quo pectus lateraliter dilataretur. Etenim si costa, ubi adnascentia subest, conaretur se à centro Pectoris fortius dimovere, periculum esset ne quodammodo aut adnascentes Pulmones, aut Pleuram iplam à costis dolorifice divelleret. Quamvis autem Pulmones ad ingreffum aëris facilem fecundum omnes sui partes extensionem admittant, ubi tamen ii subsidunt vel crassis humoribus infarciuntur (quod frequentissime in hoc casu accidit) vix notabilem distentionem sine aut vasis alicujus, aut membranæ, aut ipsius parenchymatis foluta unitate admittunt. Porro dum confideramus pulmones in fanis rarissime Pleuræ lateraliter adnecti; & non nisi in istis partibus Thoracis quæ minus crant motui ad considerabilem distantiam exponendæ, nempe dorso, sterno, mediastino, & forte media parte diaphragmatis,

tis, &c. existimamus sane id non inconsulto à provida natura factum, ne scilicet eorum connexiones vel dilatationi Pectoris officerent, vel pulmones ipsos istiusmodi calamitatibus obnoxios redderent. Ut sit, concipi vix potest, quin præternaturalis illa Pulmonum coalescentia cum pleura plus minus impediat ac remoretur veram costarum expansionem versus latera, adeoque aliquantillum saltem conducat ad angustiam

Pectoris promovendam.


Sit IV. Causa figuræ vitiatæ prædictæ, Inequalis nutritio certarum partium costarum pra aliis. Atque hanc quidem causam longe cæteris tribus efficaciorem ad hoc symptoma efficiendum dicimus. Quod ut monstremus, Afterimus I septem costas superiores potissimum, si non solas, hanc Pectoris siguram constituere. Etenim quinque inferiores, ut non immediate cum sterno committuntur, ita neque possunt sternum ullo modo acuminare aut elevare. Adde quod, cum in integros circulos (ut supra monuimus). non coëant, facile mobilis est earum figura ut plus minus cedat plenitudini hypochondriorum. At vero septem costæ superiores per suas cartilagines cum offibus sterni articulantur, unde fieri forte potest, eas ossa sterni, quæ tangunt, nonnihil antrorsum attollere, quando quinque inferiores contactu

tactu sterni privatæ id efficere non possint. 2 Afferimus costas omnes & non tantum 5 in feriores, sed & 7 superiores inæqualem in hoc affectu nutritionem admittere, atque ab una parte uberius ali, adeoque ab illa magis sec. longitudinem produci quam ab altera parcius nutrita: & quidem amplius crescere ea parte qua cum sterni cartilaginibus committuntur altera vero parte nempe versus capitulum, quo sinubus dorsi conjunguntur, minus tardiusque elongari. Ratio est, quod anterior pars cujusvis costæ mollior ac spongiosior sit quam ejusdem posterior, ut in quovis animali cuilibet licitum est experiri. Cum ergo (ut è supradictis elucescit) partes offium molliores in hoc affectu facilius recipiant alimentum & augeantur quam partes duriores & solidiores, sequitur anteriores costarum partes quod molliores sint, magis produci, quam posteriores. 3 Asserimus in corpore figura circularisive annulari donato (qualem paria costarum 7 superiorum sibi mutuo oppositarum mediante osse sterni & spina dorsi, suo modo, licet impersecte, constituunt) si una pars annuli magis prolongetur quam altera, necesse est vel reliquas partes ejusdem huicincremento cedere, velillam partem sic inæqualiter elongatam aut exterius prominere, vel interitus plicari, aut fursum vel deorsum, & sive aliquo, sive pluribus ex his modis inflecti. Hoc sic demon-




Atramus. Sit circulus vel annulus A B.
Supponantur partes
c ejus anteriores ab A
ad B elongari, reliquæ autem ejusdem
partes nempe C D E
manere in situ suo

neque omnino cedere elongationi dictæ. His positis, necesse est portionem circuli elongatam, nempe A B vel antrorsum elevari, vel introrsum deprimi, vel sursum, vel deorsum, vel varie inflecti. Nam alias distantia inter terminos chordæ F non tufficeret ad istam portionem circuli jam elongatam immutata arcus figura continendam. Etenim termini istitantum sufficiebant prius, elongato ergo arcu, & non elongata chorda, aut terminis & extremitatibus chordæ, fieri non potest, ut arcus eodem modo se habeat ad chordeam quo prius. Mutabitur itaque facta flexione vel antrorsum, vel introrsum, vel sursum, vel deorsum, vel pluribus ex his modis, quemadmodum per figuras seqq. videre licet. Prima figura Arcum extrorsum prominentem refert. 2 introrsum. 3 varie inflexum sive plicatum & intortum. Et prima quidem admodum







modum apposite figuram Pectoris in hoc affectu vitiatam exprimit. Etenim monuimus supra costas cum fterno & spina annulum articulatas imperfequendam ctum conficere, eafdemque in hoc affectu celerius ali & elongari à parte anteriori quam à posteriori; ergo quoad caufam plane & plene convenit hoc fymptomacum figura illa primo descripta. Præterea, supposuimus partes circuli CD E manere stabiles, id quo-

dci po

partes

65 ac

dum a

ejulde

res,

rales

staren

mllo

fum

denit

am p

iore:

tani

pioro

tus

null

dere

que in hoc affectu accommodari potest laterialibus & posterioribus partibus costarum. Cum enim hæ multo minus crescant quam anteriores, certe plane stabiles æstimandæ sunt, habito respectu ad merum excessum incrementi in parte anteriori. Nisi quis sorte dicat, vel costarum latera & partes posteriores expandendo se, vel articulos earum, quibus cum vertebris dorsi committun14:

0.

125

102

m

rfe.

eaf-

ffe-

6 64

ite-

10-

21-

ene

to-

pri-

ter-

par-

ma-

110-

12-

Ata-

cant

elti-

ex-

Nifi

par-

ICU.

OIII-

mittuntur, permittendo costas retrorsum flecti, augmentationi isti excedenti nonnihil cedere. Verum neutrum horum vere dici potest. 1. Enim laterales & posteriores partes cujulvis costa ut duriores ac solidiores ac robustiores sunt anterioribus; absurdum autem est existimare partes debeliores ejusdem costæ posse slectere partes firmiores, aut partes minus flexiles cedere partibus facilius flexilibus. Quare partes laterales & posteriores costarum non ita flecti possunt ut cedant partibus earundem anterioribus elongatis. 2. Quod ad articulos costarum attinet, certe ille articulus, quo committitur costa cum vertebra thoracis, nullo modo pati potest costam sic retrorfum flecti, quo cedat ejusdem elongationi; idque non tantum quod is duplex sit, nempe cum finu vertebræ & processu ejusdem transverso, adeoque ad motum retrorfum permittendum maxime ineptus; sed vel maxime quod decuplo fortior sit anteriore articulo, quo eadem costa cum osse sterni committitur. Articulus autem decuplo robustior, simulque duplex, atque ita duplex formatus, ut plane ineptus redditus fit ad motum retrorfum patiendum, nullo modo concipi potest retrorsum cedere, ne articulus decuplo debilior nonnihil antrorsum flecteretur. Concludendum

ergo partes costarum laterales & posteriores non cedere earum inæquali productioni
quæ anterius contingit, & per consequens
eas hoc respectu stabiles esse habendas,
adeoque necesse esse illam elongationem inæqualem immutare earum siguram à parte
anteriore, idque eas illic inslectendo aut sursum vel deorsum, aut introssum, vel extrorsum seu antrorsum, aut multifariam.

elon figu elev plan

&

qu

ne

dea

gu

ne

tro

DU

m

Non potest sieri hic slexio Costarum surfum vel deorsum, quod costæ propter suam latitudinem ineptæ sint ut alterutro modo inslectantur. Adde quod musculis intercostalibus sirmiter in suo situ cohibeantur ut sine vi istis musculis illata vix aut ne vix quidem possint vel sursum vel deorsum in-

curvari.

Quod illa elongatio non possit vel certe agerrime possit plicare costam introssum, eo evincitur, quod magnitudo Hepatis tali motui repugnet. Probavimus enim supra ejus magnitudinem nonnihil attollere os sterni extrorsum seu antrorsum. Deinde ipsa sigura costa circularis plicationi introssum facienda evidenter obluctatur. Denique quod ista elongatio non multisariam slectat costas, etiam hinc inferri potest, quod ejusmodi inflexio siguram compositam inferret, aliquamque simplicium sigurarum ante rejectarum necessario contineret.

Quapropter concludimus necesse esse inæqualem illam costarum à parte anteriori elongationem immutare earum naturalem figuram antrorsum seu extrorsum, os sterni elevando & pectoris figuram (alioquin sere planam) anterius acuminando. Modum ex-

primunt fequentia schemata.

110-

mon

ens

15,

In-

arte

in-

-101

fur-

11AM

nodo

ntet-

ur ut

e VIX

n In-

certe

lum,

s tali

fupra

ere os

einde

tror-

Deni-

ariam

otest,

mpolf-


joura-

peret. Qua-

Sit A os sterni: B vertebræ dorsi, C & D binæ costæ oppositæ, quas annulum quendam, ut hic cernitur, constituere diximus. Si ergo partes costarum anteriores, nempeinter C & A & inter D & A elongentur, neque tamen partes inter C B & D B quidquam huic elongationi respondeant vel eicedant, necesse est anterius figuram annuli mutari. Cum ergo, ut supra monstravimus, costa inepta sit ad flexionem sursum, deorsum vel introrsum, necesse est eam prominere extrorsum seu antrorsum, ut exprimitur in 2 figura, ubi sternum A propter elongationem partis costæ CA & DA antrorfum propulsum & acuminatum exhibetur; quæ ipsa est figura vitiata pectoris in hoc morbo.

Præter causas angustiæ pectoris hactenus memoratas, addere hic possumus imminutum incrementum costarum inter C & B tum inter D & B. Debita enim Pectoris latitudo à justo istarum partium costarum incremento & elongatione maxime depender.

1 2



cere, tes e ralis B,

ftaru

cent ctus

coft


vis a

min

qui

E

F



Si enimistæ partes costarum ad justam longitudinem accrescant, sieri non potest quin pectus ad latera justa sere proportione dilatent,

latent, subducto tantum tantillo angustiæ quod priores causæ solæ ei poterant inducere. Nam quo magis istæ costarum partes elongantur, eo etiam magis pars lateralis costæ D & pars C distabit à spina dorsi B, pectusque adeo latius reddetur. E contra ubi reliquo corpore aucto ista partes costarum vel parum vel non æque augentur, necesse est eas lateraliter minus distare à centro pectoris quam par est, ideoque pectus ad latera angustare. Siquidem latera costæ C & D eo minus distant à spina dorsi & centro pectoris, quo minus elongantur costarum partes inter CB & DB, ut cuivis attendenti patet. Atque hæc sufficiant dicta de causis Angustiæ pectoris & Acuminationis ejusdem in hoc affectu; quibus etiam tandem finem imponimus huic difquisitioni de vitiis Organicis in hoc affectu evenientibus.

CAP. XIV.

Essentia secundaria bujus morbi in constitutione animali.

Finito jam examine constitutionis naturalis & vitalis in hoc affectu læsæ, restat ut inquiramus in constitutionem animalem.

L 3

Et supra quidem asseruimus nullum hic occurrere vitium primarium, & quod pars sit essentiæ primariæ hujus morbi. An vero in ea adsit aliquod vitium secundarium, nunc

venit dispiciendum.

Quandoquidem autem tum veteres tum neoterici qui de Facultate Animali scripserunt, ne mentionem quidem fecerunt constitutionis animalis, nedum ejusdem descriptionem tradere aggressi sunt; jure meritoque ea à nobis illam agnoscentibus exspectabitur. Et cum aliqui viri cordati nonnihil dissentiant ab ista descriptione quæ deduci potest à veterum & communi sententia de facultate animali, remque illam secus explicantes aliani descriptionem paullo diversam substituant, utramque hic in medium proferre visum est.

Secundum priorem five veterum vulgoptio con- que receptam opinionem & descriptionem facultatis animalis, constitutio animalis est Affectio illa corporis qua in generatione & motu confor- debito spirituum animalium consistit. Per momis opi- tum autem debitum spirituum animalium mioni veintelligi volunt excursum eorum à cerebro per nervos instar fulminis, atque iterum eorum ad cerebrum recursum, quo ei renuncient quid ab externorum sensuum or-

ganis percipiatur.

Descri-

Stitutio-

nis ani-

malis

magis

terum.

Alii vero, ut diximus, rem hanc aliter

ex-

100

älti

Mun

(pirit

nerv

mat

faru

dan

ter

61

114

often

que

dan

VI I

iffis

ret

ub

ter

ter

tat

ro

18-

ex-

de-

en-

CUS

di-

116-

go-

nem eft

Hote

mo-

mun

ord

rum

116-

100

iter

ex-

explicant. Concedunt quidem constitutio-juidem nem animalem includere generationem & constitudistributionem spirituum animalium; ast scriptio. illum pernicem motum fluxus & refluxus spirituum animalium, fulminis instar, in nervis ajunt esse inconceptibilem, &, si non inutilem, saltem tamen esse minime necesfarium ad facultatem animalem stabiliendam. In ejus autem locum substituunt inter vigilandum motum quendam contractivum & tonicum, five nixum motivum ipfius substantia cerebri, spinalis medulla, nervorum inde ortorum, partiumque in quas distribuuntur. Atque hunc motum five nixum tensitatem quandam in partibus prædictis producere dicunt, vi cujus alterationes ab objectis quibusvis istis partibus impressæ communicantur cerebro. Quemadmodum enim in Cithara, ubi fides, sunt debito modo tensæ, si in alterutra extremitate quam levissime plectro percutiantur, motus ille in momento, saltem Physico, excurrit ad alteram extremitatem; ita quoque asserunt moto aliquo nervo extra cerebrum debite tenfo, motum istum ob continuitatem & tensitatem dictarum partium ad cerebrum iplum extendi, ibidemque impressionem quandam suæ causæ conformem signare. Inter dormiendum vero existimant cerebrum, spinalem medullam, & plerosque nervos nonnihil laxari.

10200

mit

Aitu

LQ

attır

aller

diro

tus a

1003

enin

ter

neq

hoc

frie

ea

rap

DIS

que

mô

bu

Pal

Dec

laxari. Et quidem, simpliciter semperque ajunt anteriores connexiones spinalis medullæ cum cerebro durante fomno laxas manere; concedunt vero connexiones posteriores cum cerebello aliquando tensas esse, ut in Noctambulonibus, atque ita externa objecta quodammodo percipere, sed non per sensum communem judicata, sed tanquam à memoria ad phantasiam reflexa. Neque etiam necesse esse arbitrantur inferiores omnes partes spinalis medullæ adeoque nervos inde ortos perpetuo inter dormiendum laxari; cum aves plurimæ pedibus insistentes dormiant; cum respiratio per somnum aliquorum nervorum tensitatem supponat; denique, cum, ubi primum obrepit fomnus, superiores nervi ferme laxentur prius quam inferiores. Insomnia autem quod attinet, opinantur ea oriri ex varia & fortuita agitatione & mixtione diversorum figillorum seu impressionum in memoria reconditarum, quæ jam denuo percipiuntur ob retentam aliquam tensitatem in nonnullis cerebri partibus.' Ubi vero in profundiore somno nulla observantur insomnia, totum quoque cerebrum laxari affirmant.

Sive jam prior sententia, sive hæc posterior veritati magis consentanea sit, nihil nos impræsentiarum moramur; neque hanc litem THE

ne-

145

exfed

fed

14. nfe-

000

01edi-

per

em

ob-

en-

tem

28

m

16-

itti

100

-010

m-

ffr.

ofte-

2DC

em

litem suscipimus hic determinandam, cum utrovis modo facultas animalis functionem suam exerceat, ab iisdem causis, & fere similiter vitium secundarium in animali constitutione per hunc morbum eveniat. Nam I. Quod ad generationem spirituum animalium attinct, five prior five posterior sententia asseratur, perinde erit; quod in cerebro, in quo utraque opinio supponit generari spiritus animales, nihil vitii (nisi forte alius conjungatur morbus) deprehendamus. Supra enim oftendimus ipsum caput non esse inter partes primo affectas annumerandum, neque ejus actiones internas & proprias in hoc affectu vitari. Deinde II. quod ad distributionem spirituum animalium attinet, sive ea perficiatur prorsum & retrorsum eoque rapido illo motuinstar coruscationis sulminis, sive motu tantum prorsum sacto, eoque paullatino & placida, idem vitium in hoc affectu occurrit.

Etenim I. cum suppositus ille rapidus vitia motus spirituum animalium fiat transitu per constitupartes primo affectas, viz. per spinalem me- nimalis. dullam extra calvariam, per nervos inde ortos, & per partes in quas ii nervi distribuuntur; & cum hæ omnes partes in hoc affeccu laborent intemperie frigida, tum paucitate ac ignavia spirituum insitorum; necesse est debitamistius motus velocitatem

nonnihil retardari. Frigida enim intemperies, ut & torpor ac inopia spirituum, cuivis motui (excepto constrictivo) repugnant. Dicat aliquis sententiam priori loco propositam supponere eximiam activitatem & fubtilitatem spirituum animalium, quibus hanc repugnantiam facile possunt superare. Verum, ut ita sit, cum partes, quas permeant, reagant, suamque frigiditatem & torporem iis communicare fatagant, necesse est eas activitatem illam spirituum nonnihil retundere, subtilitatem minnere, expeditumque illum transitum aliquantum remorari. Quare supposita hac sententia ut vera, vitiabitur in hoc affectu constitutio animalis ex parte motus rapidi spirituum diminuti, idque secundario, cum motus hic non retardetur vitio primario spirituum animalium, ast vitio partium primo affectarum, quemadmodum dictum. Similiter in modo posterius proposito, in quo motus spirituum supponitur placidus & tranquillus, necesse est eas, dum tardiuscule per partes primo affectas transmittuntur, labem aliquam à vitiata constitutione insita istarum partium contrahant, ob easdem rationes proxime præcedenti articulo allatas. Erit ergo secundum hanc quoque opinionem vitium secundarium in distributione spirituum animalium.

Tan-

14 (2)

MAR

in 90

ponit

bite t

T200

ad qu

Eten

debit

& 1

quib

tur c

eune

dicta

nent

rum

pro

mo

qua

tater

cere

flux

De V

dat

Cal

per

fito

tum

Bat

ope-

pu-

000

tem

qui-

rtes, gidi-

fatalpi-

tem

tum

a hac

fectu

apidi

cum

ario

pri-

tum,

in

idus

diaf-

ttun-

ione

eaf.

iculo

ribu-

Tan-

Tandem quod ad tensitatem ipsius substantia cerebri, spinalis medulla nervorum & nervosarum partium inter vigilandum attinet, quæ in posteriori sententia ante proposita supponitur, necesse est defectum aliquem debite tensitatis in spinali medulla extra calvam, in nervis inde ortis, tum in partibus ad quas distribuuntur in hoc morbo adesse. Etenim 1. Intemperies frigida & humida debitæ isti tensitati adversatur. Ita quoque & torpor ac inopia spirituum insitorum; quibus certe partes affectæ inertes redduntur minusque aptæ ad animales actiones obeundas; contra quam evenit, quando prædictæ partes debitam suam tensitatem obtinent. 2. Ex supra dictis liquet Tonum harum partium in hoc affectu nonnihil vitiari propter nimiam laxitatem, flacciditatem, mollitiem, & internam lubricitatem, quæ qualitates justam earundem partium tensitatem evidenti labifactant. Quamvis ergo cerebrum in hoc affectu debitum forte influxum ex parte sua prebeat, vix tamen, & ne vix quidem fieri potest, ut sufficienti gradu tensitatem suam spinali medullæ extra calvam nervisque inde ortis, &c. ob intemperiem, torporem & inopiam spirituum infitorum, tum tonum earum partium vitiatum, ut dictum, communicet. 3. Symptomata in hoc morbo animalem facultatem

spectantia idem luculentissime confirmant. Etenim pueri hoc morbo afflicti ab ipso ejus principio minus robuste (si cum aliis coætaneis conferantur) se movent exercent, minusque delectantur lusibus masculis; aft in progressu morbi motum fere omnem concitationem aversantur, pedibus insistentes vacillant, quæruntque sustentaculo, vix aliter incedentes erecti, neque ludere delectantur nisi sedentes aut recumbentes, vel brachiis molliter gestati; denique spina debilis emaciato corpori erecto, vel oneri grandiusculi capitis vix sufficit sustentando. Quæ omnia satis superque demonstrant tensitatem partium motui inservientium esse minus in hoc affectu rigidam quam inter vigilandum ex æquo requiritur. Si ergo ista debita inter vigilandum tensitas sit pars constitutionis animalis, quod hic supposuimus, eadem certe vitiata constituit necessario morbosam affectionem in constitutione animali: & cum hoc vitium non primario ab iplo cerebro, led ab infita constitutione partium primo affectarum dependeat, secundarium vitium respectu animalis constitutionis jure merito censendum est.

Cur fenfus non æque hic

Occurrit tamen hic scrupulus: Quæret aliquis cur sensus quoque in hoc affectu non pariter lædantur ac vis motiva? In promptu acmotus. est ratio. Longe major tensitas, robur, &

vigor

標

日田田

MI.

PUCI

dam

emi lensa

que o

13 1

Para

rerli

iplaco potel afficia tanen tan

mus mat præ

lant.

ejus

.300

ent,

; aft

con-

entes

VIX

e de-

s, vel

lade-

oneri

ando,

tten-

effe

T VI-

ifta

con-

mus,

flario

ani-

io ab

epar-

ında-

10015

uzret u mon

mptu , &

rigor

vigor nervorum ad facultatem motivam quam sensitivam exercendam requiritur. Ad fensationem enim levissimus fere motus tonicus nervorum sufficit, non item ad motum. Sic observare licet in motu cujusvis articuli musculos eum moventes admodum duros, tensos, ac rigidos esse; verum remissa illa duritie, rigiditate ac tensitate fensationem nihilominus facile peragi. Neque obstat, quod aliquando in Paralysi senfus nonnihil stupeat permanente motu; Paralysis enim affectus est ab hoc plane diversus. In ea quippe vitium primarium in ipsa constitutione animali residet; fieri ergo potest, ut non minus sensum quam motum afficiat. Præterea quando forte nervus cutaneus debito cerebri influxu caret, is vero qui ad musculos istius partis fertur, eo fruitur, fieri potest, ut hac etiam de causa tollatur sensus manente motu; licet casus hic non tam frequens sit, sæpiusque motus aboleatur constante sensu. Sed de hacre satissuperque diximus. Atque ita tandem deprompsimus ea quæ de integra essentia hujus morbi tum primaria tum secundaria meditati sumus, idque qua potuimus perspicuitate in materia difficili & ab aliis ante non tractata præstitimus. Proximum est ut ad causarum hujus affectus examen nos accingamus.

CAP. X.

Paxind cause, & I. que ad Parentes attinet.

Ssentiam hujus morbi primariam atque Letiam secundariam superius fuse explicuimus: & quidem dependentiam effentia secundaria à primaria ibidem satis demonstravimus. Non ergo hic exspectandum est, ut denuo ex professo & speciation de causis essentiæ secundariæ quas nempe ante retulimus, tractemus. Sufficiet causas essentia primariæ investigasse. Si qua tamen occurrat causa quæ una influat cum in primariam, tum fecundariam morbi effentiam, eam hic quoque obiter annotare non gravabimur.

fumma hujus morbi genera.

Omissa vero omni axestea circa varia causarum genera, ad duo solummodo cacausarum pita discursum hune nostrum contrahere vifum est. Prius continet infirmitates, morbosasque parentum dispositiones, quæ forte eatenus in liberos influent, ut saltem proclivitatem aliquam & aptitudinem ad incidendum in hune affectum (fi non actu ab ipfo ortu in eum delapsi sint) inferant. Posterius comprehendit causas hujus morbi accessorias; cas nempe, quæ pueris post partum accidunt.

De

hiju

mus

in pr

mor

per

alter

deri

pro

(12

tent

quo

alte

tio

bun

YIS

Ety

uto

CZC

fun gig prin fee fte tui

spe eju

De primi generis causis occurrit in ipso An& limine quæstio, utrum & quatenus morbus quatenus hie dici possit hareditarius? Quo selicius in hiedici hujus quæstionis determinatione proceda- possit mus, distinguendus est morbus hæreditarius tarius. in proprie & improprie sic dictum. Et quidem Morbus morbus hæreditarius proprie sic dictus sem- nus est per supponitur præextitisse in utroque vel velproalterutro parente, indeque in prolemesse prie, vel derivatus. Morbus vero hæreditarius im- priesic proprie dictus non supponitur in eadem specie præextitisse in utroque vel alterutro parente; præcessisse tamen necesse est vitium quoddam (forte diversi plane generis) in altero saltem eorum, cujus virtute dispositio quædam proli impressa est, qua in morbum hune improprie hæreditarium proclivis redditur.

atque expli-

fentie.

oftra-

n eft,

caufis

retu-

Tentiz.

OCCHT-

rima-

tiam,

n gra-

a varia

do ca-

ere vi-

100704-

eate-

oslivi-

ciden-

abiplo

Herizs

Gerias;

idunt.

Do

Porro morbus hæreditarius proprie di- Vierque Etus adhuc duplex est: vel in conformatione, duplex. ut quando mancus mancum, furdus furdum, cæcus cæcum generat; vel in constitutione similari, ut quando podagricus podagricum gignit. Notandum est in priori genere à primis effictis formationis staminibus actu fœtui inesse vitium hæreditarium; in posteriori vero non necesse est actu inesse fœtui à prima formatione morbum ejusdem speciei cum morbo parentum; sed sufficit ejulinodi dispositio à parente altero vel utroque

que impressa, quæ tractu temporis ex concurfu aliorum incidentium caufarum in eundemactuari possit. Adhæc morbus quoque improprie dictus hareditarius similiter duplex esse potest, nempe vel in conformatione, vel in constitutione similari. In formatione, ut quando neuter parens cæcus, luscus, balbus, claudus, &c. prolem tamen cæcam, luscam, balbam, 'aut claudam ex ipfo vitio formationis in utero in lucem producit. Etenim in casibus propositis, id ipsum vitium quod in prole cernitur, ab aliquo vitio parentum, licet forte diversi generis, profluxit, adeoque morbus hæreditarius, etsi improprie, nuncupari potest. Similiter in constitutione similari prolis morbus improprie hæreditarius residere potest, ut quando melancolicus, & sedentarius, vel etiam intemperans prolem generant cachexiæ aut podagræ obnoxium, licet forte parens neque cachexia neque podagra unquam laboraverit.

Quaffiodicta sokuio.

Hisce præmissis ad quæstionis solutionis pra- nem propius accedimus. Et dicimus 1 hunc morbum non contineri, sub priori specie morbi hæreditarii proprie dicti. Illa enim in formatione confistit; hic vero morbus secundum essentiam suam primariam est morbus similaris, ut supra de monstravimus, & rarissime à primo ortu, nedum abipsa

prima

parti

tione

II.

redit

coni

ut o

mus, 2111

mate

rent

biler

coru

hoc

hun bil

poli

effer

dam

fecu

free

din

alte

pre

con.

cun-

oque

dil-

mc,

, ut

ID45,

cam,

atio-

m in

quod

aren-

UXII,

pro-

onsti-

hæ.

me-

tem-

poda-

eque

ora-

ut10-

bunc

pecie

enim

rbus

n eft

inus,

ıma

prima conceptione & formatione se prodit.

Atque ob easdem rationes asserimus etiam hunc affectum non pertinere ad priorem speciem morborum hæreditariorum improprie dictorum, qui similiter in formatione partium consistunt, & mox à prima formatione inchoantur.

dere sub secunda specie proposita morbi hæreditarii proprie dicti, nempe illa quæ in constitutione similari consistit. Hoc tamen ut certum & exploratum statuere nequimus, cum pueri quas hactenus hoc morbo assistem pervenerint qua liberos generent, ideoque non aliter quam per probabilem conjecturam opinari nobis licet, an eorum progenies hæreditario jure quondam hoc morbo contaminata sit sutura, necne.

hunc cadere directe sub secunda specie morbi hæreditarii improprie dicti superius propositi. Etenim secundum ejus primariam essentiam est morbus similaris, & licet nondum satis diu nobis innotuerit, ut quid in secunda progenie essiciat definire valeamus, frequenter tamen in presenti progenie rudimenta quædam hujus morbi in multis ab altero vel utroque parente derivata suisse deprehendimus. Adeo ut licet neuter parens hoc morbo in infantia vel pueritia laboraverit, apparatus tamen aliquis & pronitas in hunc affectum statim in eorum infantulis apparuerit, præsertim in iis quorum parentes ob vitium aliquod corporis, vel errores vitæ dispositi ante coitum suerunt ad hanc labem sætui inurendam. Quæ autem affectiones, parentum eos ad liberos huic morbo sacile obnoxios generandos disponant, mox ordine enumerabuntur; ex quibus etiam ulterior consirmatio assertionis

hujus liquebit.

IV. Dicimus, licet affectiones Parentum frequenter in fœtibus dispositionem quandam ad hunc morbum incurrendum imprimant, adeoque in secunda acceptione morbi hæreditarii improprie dicti affectus hie censendus sit, ut modo dictum, rarissime tamen accidere ut hic morbus in actum erumpat ante sœtus partum. Testatur aliquis nostrum se semel, & semel tantum, vidisse puerum recens natum hoc morbo afflictum. Atque in eo spina dorsi & collum adeo erant debilia, ut nulla ratione valerent grandiulculum caput sustinere. Obiit hic intra tres menses post partum. Quibus patet eum gravissime fuisse affectum. Videtur ex modo dictis conspicuum, infantes, ut frequenter dispositionem ad hunc morbum à parentibus mutuentur, rarissime tamen in eum ante

加

Quo fectu gida dem partis gidi

men

iplio

tion

ctas.

uter

CON

quo de:

Den

Cor

per

200

per

que

gar

Dora

mitas

Dtu-

n pa-

161-

at ad

intem huic

ifpo-

qui-

ionis

otum

uan-

npri-

nor-

hic

ime

me-

iquis idiffe

tum.

erant

disf-

tres

grayodo

enter

enti-

ante

Dal .

tum incurrere, ubi vero in eum tam præmarure incurrunt, gravissine assligi. Cujus utriusque eventus ratio quæri possit. Quod ad priorem attinet, dicimus hunc affectum ex parte consistere in intemperie frigida partium primo affectarum, & quidem inæquali, frigidiori scilicet in dictis partibus habito respectu ad temperiem capitis & viscerum; hancque inæqualem frigiditatem istarum partium magni esse momenti in hoc morbo, idque etiam ratione ipfius inæqualitatis: hæc enim multum contribuit inæquali illi & imminutæ distributioni vitalis sanguinis ad partes primo affectas. Cum ergo eo tempore, quo fœtus in utero gestatur, inæqualitas hæc temperamenti partium primo affectarum plurimum corrigatur, & avertatur ab æquali calore, quo uterus corpus Embryonis undique arcte amplectitur & fovet, sequitur gestationem non parum huc morbum arcere, atque ejus invasionem ad minimum retardare. Corpus enim uteri æquali calore undique perfusum omnesque partes Embryonis ex æquo complectens ac fovens haud facile permitit unam partem præ alia algere, adeoque imminuto sanguinis vitalis affluxu irrigari. Quapropter cum illa ipfa inæqualitas caloris ac irrigationis fint partes effentiæ hujus morbi, & fine quibus morbus hic confiftere

sistere non potest, minime mirandum est uterum hasce morbi partes strenue impugnantem ejus invasionem, durante saltem imprægnatione plerumque protrahere.

Quod ad posteriorem partem quæstionis viusac fius laborent.

qui ante propositæ attinet, cur nempe Infantes, qui hoc mor- ante partum hoc morbo correpti fuerunt, bo corre- gravius ac periculosius laborent, dicimus secundum illud Hippoer. sect. 2. aph 34. morbum, qui cum ægrotantis conditione mipericulo- nus cognatus fuerit, periculosiorem esse eo qui secus ; ut sebris seni quam juveni majus minatur periculum, hyemeque quam æstate. Morbus enim qui ægrotantis conditioni conformis est, leviorem postulat causam prosui introductione; is vero qui illi contrarius est magnitudinem caus arguit, quæ non obstante fræno effectum suum proferat. In præsenti ergo affectu siæqualis uteri calor non possit coërcere propensitatem Embryonis ad hunc morbum, quin eum incurrat, necesse est causam à Parentibus impressam esse vehementem, ipsoque principia seminalia esse insigniter labefactata. Spes itaque in angusto est ubi sœtus hoc morbo laborans nascitur, neque prudens medicus curationem absque ingentis periculi prognostico aggredietur. Porro corollarii vice aliam regulam priori affinem, licet forte nondum certam & comprobatam, sub-

texamus.

loc m

tens (

gant

DUITI tenti

haze profite selpide tero a selpide

texamus. Pueros nempe, quo citius à partu hoc morbo corripiuntur, eo difficilius (cæteris daribus) ab eo liberari. Sed hæc fuffi-

ciant de proposita quastione.

um eft

impu-

altem

tionis

es, qui

erunt,

icimus

· mor-

ne mi-

m effe

nima-

quam

condi-

at cau-

ui illi

guit,

m pro-

is ute-

itatem

ım in-

ous im-

prin-

ctata.

is hoc

rudens

is peri-

corol-

n, licet

amus,

Jam nos accingamus ad divisionem & e- Enumenumerationem causarum quæ ex parte Pa- causarum rentum hune morbum producunt. Vitia que ex hæc parentum alia respicient generationem parte Paiplius spermatis, è quo fœtus constant; alia hunc respicient Embryonem jam conceptum & in u-morbum produ-tero adhuc gestatum. Vitia generationis se-cunt. minis five in mare, sive in scemina, vel à toto 1. Ante corpore, vel à partibus generationi dicatis pro- ptionem. cedunt. Vitia parentum à toto corpore de- Vitia Papendentia eo maxime in fœtum influent, rentum à quod materiam generationi seminis minus pore 6e+ aptam ad partes huic muneri dicatas trans- pendenmittant. Non animus est singula materiæ feminis vitia hic recenfere, aft ea folummodo quæ ad hoc malum proli inferendum conspirant. Hæc ad 4 Classes reducimus.

I. Classis continet intemperiem frigidam .: Intembumidam materia, ex qua semen generatur. frigida & Hoc præcipue provenit ab intemperie frigida humida & humida parentum, ad quam etiam referi- materix ex qua mus cacochymiam, præsertim pituitosam & semen serosam; item cachexiam, hydropem & forte generamorbum virgineum, quem febrim albam vo- que caucant, non satis ante conceptionem eradi-sa. catum; qui omnes affectus manifeste fa-

CHILL.

112, 9

amand

Spiritu

præpa

neque

tis fpi

minim

penuri

non po

feilice

dam d

mis fu

daspo

III.

TETTS TH

quale

partes

humo

funt o

(zpius

dis,

MITTE

tation

mon

activ

med

rum

Profe

ciunt ad materiam aquofam, frigidam, humidam partibus genitalibus suppeditandam; qualis non modo in genere minus apta est ad spermatis generationem, sed & specialiter inclinat ad conditionem hujus morbi, cujus pars essentiæ primariæ in ipsa intemperie frigida & humida consistit, ut supra monstravimus. Porro ad hunc titulum revocare forte licet scorbutum, strumosam affe-&ionem , Luem veneream , Icterumque , in quibus sanguis quoque sordibus & excrementiriis humoribus, ichoribusque malis inquinatur, ut non facile in semen probum ac laudabile commutari possit.

caulæ.

cile in 2. Inopia II. Classis continet Inopiam spirituum insispirituum torum in materia e qua semengeneratur. Ex in mate- hujusmodi enim materia semen spirituoria dicta, sum confici non potest. Causæ quæ talem materiam partibus genitalibus suppeditant funt corpora generantium exsucca, extenuata, emaciata, sive à longa inedia, sive ab evacuatione aliqua nimia, ut à diu continuatis vomitu, diarrhæa, dysenteria, lientaria, fluxu hepatico, ab hamorrhagia profusiore ex quacunque parte, à sudoribus nimiis, à diuturno aliquo morbo viribus necdum ante coitum reparatis; à febre, aut alio gravi aliquo morbo presente; præcipue Tabe, febre hectica, atrophia ex quacunque causa, denique ab imminuta alimenti ultimi, ob cujusvis partis vitium, conco. ctione,

etione. Etenim in istiusmodi casibus, materia, quæ ad partes generationi inservientes amandatur, competente copia insitorum spirituum destituta est, unde partes semen præparantes ac coquentes defectum hunc nequeunt integre corrigere, semenque satis spirituosum ejaculari. Cum ergo non minima pars primæ essentiæ hujus morbi in penuria spirituum insitorum consistat, fieri non potest, quin fœtus ex tali semine parum scilicet spirituoso genitus, innatam quandam dispositionem ad hunc affectum in primis suis rudimentis impressam contineat, quæ postea, concurrentibus aliis causis, tacile in actum deducatur.

eft ia-ibi,

em-ipra ire-ire-qui-nen-qui-mar

神田

ituo alen

litan

nat!

evs (

place flace

4430

tripa taa

III. Classis continet Torporem seu stupo- 3. Torpor rem materia transmissa ad partes genitales, è materia qua semen producitur. Etenim non modo dicta. partes solidæ, sed & tota massa sanguinis, humoresque in ea contenti torpori ejusmodi funt obnoxii. Atque hinc est quod Medici fæpius dicant in morborum causis reddendis, humores, tum etiam sanguinem esse nimis fluxiles & mobiles, debitoque concitatiores, interdum è contra esse ineptos ad motum, minus fluxiles effe, minusque æquo activos; atque hujus quoque rei respectu mediocritas quædam est saluberrima. Verum plura huc spectantia videantur supra. Prosequemur hic tantummodo vitia paren-M 4 111223

ics.

nera

talib

her

for for

fum à v

CI:

pri

qu

utr

16

Ejus cau'x. tum à quibus hic defectus vigoris & activitatis in seminis materia oritur. Sunt hæc ergo, i ipsa constitutio parentis alterutrius vel utriusque mollis, laxa, & effeminata, ad actiones robustiores ac viriles indispolita, 2 Dieta humidior, & plenior, Epicurea, frequentibus cruditatibus obnoxia. 3 Vita genus delicatum, mollitiei ac voluptatihus deditum, ignavum, laboribus periculis & curis rarius affuetum. Huc referas quoque exercitii fortioris omnimodum defectum, somnum immoderatum, prafertim mox post cibum, & somnolentiam qualemcunque, vitam sedentariam, speculativam , scientiis , & mollioribus artibus , puta poetica, Musica, Cosmetica & similibus solum intentam. Huc etiam reducimus Comadiarum & Spectaculorum scenicorum quoridianam frequentationem, Fabularum & Historiarum Commentitiarum aßiduam Lectionem, locoque mafculi exercitii lu sus pictarum chartarum aut alearum frequentiores. Huc pertinent etiam Pacis diuturnioris ac opulentia folemnes fructus, fecuritas, incuria, negligentia & similes. Omnia jam hæc enumerata vitia ad mollitiem & torporem partibus inferendum manifeste faciunt. Cum ergo fanguis, una cum cum humoribus in eo contentis, in circuitu suo perluat omnes partes sic torpidas redditas, fieri non potest, quin in transitu suo aliquam alterationem eodem spectantem subeat; & cum portio

(185)

ivi-

120

11113

13-

ita,

-371

CHW

MR,

5 8-

7130-

era-

ten-

pecti-

twis.

elam

计算器

ife-

0111-

1114-

alea-

Pacu

CHT)-

ajam

rpo-

unt.

ribus

:0111-

1 po-

100-

cum

ortio

portio sanguinis transeuntis torpore nonnullo, ut dictum, affecti, transmissa ad partes genitales evadat ipsa materia ex quageneratur semen, facile inferri potest sætum ex
talibus principiis oriundum intra se contrahere proclivitatem saltem aliquam ad torporem & ignaviam nativæ suæ materiæ conformem, illamque proclivitatem post partum
summota præservatione abæquali uteri sotu,
à variis causis non difficulter in actum deduci: Quapropter cum torpor ejusmodi sit pars
primæ essentiæ hujus morbi, sequitur in talibus seminalibus principiis dispositionem
quandam ad hunc affectum ab altero aut
utroque parente derivatam delitescere.

IV. Classis continet vitiosas dispositiones 4. Vitiosa (si qui tales occurrunt) Parenium qui ipsi in disposipueritia sua hoc morbolaboraverint. Hæ siqui- parentu dem morbi hæreditarii proprie dicti notam qui ipsi liberis inurerent. Veru, quia, ut supra dictum, sone in nondum liquet an Parentes hoc morbo in tiahoc Pueritia afflicti prolem eo affectam genituri morbo sint; præterea, quæ Parentum vitia vel ad ali- rint. quam unam trium prædictarum classium, vel ad plures, vel simul omnes commode referri possint, non erit operæ-pretium iis hic pluribus insistere. Quare enumeratis jam vitiis à toto corpore parentum dependentibus, proximo loco accedimns ad ea vitia que in ipsis partibus genitalibus resident. Vitte

Vitia in Vitia hac partium genitalium sunt interdum ipsis par-intemperies frigida; interdum humida, quan-nitalibus do præ nimia humiditate laxantur & ener-zesidentia yantur, unde sperma vel plane insæcundum

vel in hunc morbum procliva excernunt. Adhæc, interdum istæ partes Gonorrhæasive virulenta, sive biliosa, sive aquea infestantur, 1emenque minus elaboratum ejaculantur; idem dicendum est de fluore albo & rubro in mulieribus. Tandem nonnulla extrinsecus partibus genitalibus admota huc quoque spe-Ctant; ut unguenta ex cicuta aliisve narcoticis præsertim frequentius iis illita; similiter unguenta, plumbum album, vel rubrum, cerussam, calcem plumbi, lithargyrum, saccharum saturni & similia recipientia, assidue diuque istis partibus applicata. Ejusmodi enim activitatem spirituum insitorum in istis partibus retundunt, torporemque quendam iis inserunt, qui semini in illis consecto communicatus prolem ad hunc affectum disponunt.

Absolvimus demum institutam enumeraexpane tionem causarum, si non omnium, saltem
matris
hunc præcipuarum, majorisque notæ, que ante conmorbium ceptionem circa generationem seminis prolifici ocpost concurrunt, & ad hunc affectum invehendum saceptionem pro- ciunt. Sequuntur jam vitia & errores matris
ducentes tempore gestationis satus in utero, quæ etiam inter hujus affectus causas ante partum reputandæ sunt.

1.0c-

rdum

uan-

ner.

dum

unt.

afive

tur,

IUI;

TO IN

s Cecus

Spe-

Cott-

liter

166+

172階

que icti-

arti-

m iis

om-

po-

era-

tem

COM-

100-

ofa-

STIS

in-

Oc.

psius uteri, quæ (ut cuivis, vel nobis ta-peries trigida & centibus, facile manisestum est) ex assiduo humida contactu Embryoni promptissime commu-ipsius unicari potest.

2. Loco se offerunt ea omnia que succos 2. Quzcrudos parumque defacatos, excrementitiis hu-faciunt moribus aut ichoribus refertos, vice probiali- ad immenti, Embryoni suppeditant. Huo spectat im- probum primis insalubris gravidarum diata, præser-embryotim ad humiditatem & frigiditatem crudita. ni suppeditandu. tesque accumulandas inclinans. Porro idem faciunt coctiones earundem seu prima seu secunda imperfecta & deficientes, maxime ubi neque vomitu, neque alia evacuatione cruditates inde provenientes excernuntur, sed ex cum sanguine materna ad fœtum tandem pro alimento derivantur. Præterea si gravidam post conceptionem invadat morbus humidus frigidusque, ut intemperies cum materia frigida & humida, cachexia, hydrops, &c. facile inde evenire potest, ut impurum quoque alimentum, quodque hujus morbi seminia tum serat tum soveat, Embryoni dispenfetur, the sittering are lagers

3. Loco censenda sunt ea omnia que quo- 3. Que cumque modo Embryonem debito alimento de- Embryo fraudant; ut evacuatio quevis justo profusior, nem imprimis hamorrhagia longior ex ulla parte; modo item vene sectio vel temere, vel justo largior ad- debito hibita.

lore

part

MI

ter

dif

act

fig

no

alimen-to de- hibita. Huc etiam refertur nimius veneris usus fraudant. tempore gestationis. Alterius quoque Infantis lactatio divertere potest sufficientis alimenti affluxum ab utero versus mammas. Huc spe-Ctat diuturna inedia, ut & atrophia quacunque matris gravida, aut appetitus cibi plane deje-Etus, vel defectus coctionis. Febris tandem acuto pragnanti accidens, præter alia incommoda, defraudare quoque potest sœtum sufficienti alimento; febrisita hectica, Hac omnia non modo virium vitalium dejectionem & imminutam nutritionem foetui inserunt, verum & insuper penuriam spirituum insitorum Etenim absque nutritione eliquantur ac dissipantur spiritus insiti, tum necessaria etiam reparatione destituuntur. Cum ergo pars essentiæ hujus morbiin defectu spirituum insirorum confistat, necesse est à prædictis causis dispositionem aliquam ad hunc affectum sœtui impertiries colvoquorei

4. Ni mium gravida-

4. Et ultimo, Nimia gravidarum somnolentia, ignavia, mollities, aversatio laboris & zu otium. exercitii post conceptionem huc etiam nonnihil contribuunt. Licet enim violentiores motus actionesque cujusvis generis gravidis interdicantur, moderati tamen labores, vigiliæ, & exercitia quæ nullam vim utero inferunt aut abortum provocant, non modo ad sanitatem matris faciunt, sed & nonnihil torporem Embryonis excutiunt, ejusque calorem,

lorem, vigorem, & activitatem excitant atque adaugent. Atque ita finem imponimus huic capiti primo de causis hujus morbi ante partum Restant examinandæ ea qua post partum incidunt.

CAP. XVI.

Causa hujus morbi Pueris post partum incidentes.

Notavimus præcedenti capite infantes ab ipso ortu rarius hoc morbo affligi, nativa vero dispositione ad eundem frequenter ob causas illic memoratas affici. Prosequemur jam causas qua vel nativam illam dispositionem post partum actuare apta sunt, vel de novo & integro hunc morbum producere. Sciendum autem est, easdem causas quæ dispositionem nativam ad hunc morbum actuent, eundem posse de novo producere, si gradu satis intensæ sint. Ideoque satemur pueros à nativitate in hunc affectum pronos, facilius, id est, à causis gradu remissioribus affici; alios vero ab omni nativa labe immunes non nisi à causis potentioribus in eundem incidere; interim caufæ istæ ejusdem sunt generis & gradu solo distincta. Quare non opus fuerit de his distincte & separatim agere;

agere; suffecerit has simul & indiferiminastim propoluifle in alliuloque and

16

Ecla

MOL

Ver

in fi

pro

TICE

impi haja

hun

fpir

corp

pert

mili

dari

fin

org

den

Mills

pro

tos

211

mu

non

que

An morbus hic fit contagiolus ?

In ipso limine occurrit Quastio discutienda; utrum nempe Contagium inter causas hujus morbi annumerandum sit, adeoque utrum morbus hic proprio sensu morbus sit contagiosus? Certe qui considerat morbum hunc veteribus incognitum hoc ultimo feculo occidentales Angliæ tractus primum invadentem, intra paucos annos per totam fere Angliam dispersum este, facile prima fronte opinetur eum esse vere contagiolum, & per contagium tam longe lateque disseminari. Sed pressius attendenti aliter se res habere videbitur. Licet enim morbus hic aliquo forsan modo nitatur sibi similem affectionem aliis corporibus imprimere; vix tamen eo usque procedit, ut morbum ejusdem speciei de integro producat. Forte equidem nonnullam leviusculam inclinationem alteri corpori possit imprimere, immo interdum ipsam sorte morbi invasionem in corpore infigniter ad eum prædispofito acceleret aut promoveat, neque tamen propterea nomen morbi proprie contagioli Quid po- mereatur. Omnes enim morbi corpora sibi proxime immutare sibique assimilare satagunt; non tamen id sufficit, ut omnes morbi contagiosi denominentur. Ad morbum contagi- enim contagiosum proprie sic dictum constituen-

Negativa afferi-MIT.

tiffimum requiratur ad morbum proprie

M2-

CII-

211-

100-

not-

erat

cul-

chus

per acile

nta-

ate.

iali-

nor-i fi-pri-

100

icat,

in-

ere,

Sio-

00-

nen ioli

filia

ata-

101-

III

00-

en-

stituendum requiritur ulterius, ut propaget osum à se fermentum quoddam seminale sui, quod constitue se clam infinuans in alia corpora, paullatim morbum ejusdem speciei in ea introducat. Verum hic morbus nullum tale fermentum in sua essentia continet, neque clanculum propagatur emisso prius à se seminio quod vicinis corporibus morbum ejusdem speciei imprimat. Diximus enim supra, essentiam hujus morbi primam consistere in frigida & humida intemperie, in torpore & inopia spirituum insitorum; quæ affectiones si quæ corpora propinqua assimilare conentur aperto marte, cum vero ex infidiis & clandestinis prius immissis id aggrediuntur. Similiter si respicias ad essentiam ejus secundariam, neque tonus vitiatus, neque constitutio seu vitalis seu animalis læsa, neque organorum depravationes aptæ deprehendentur in alia corpora seinsinuare, speciemque suam propagare. Denique si velimus ipsam experientiam hic consulere, id extra dubium oppido statuetur. Etenim observamus frequenter pueros seu coataneos, seu prope coætaneos in iisdem ædibus enutritos, quorum unus aut alter hoc morbo forte afflictus fuerit, dum alius aut plures eorum minime laborent. Immo novimus pueros non tantum communibus ædibus, assiduoque mutua societate gaudentes, sed & quo-

tidie communi mensa & lecto utentes, quorum alter hoc malo affectus focium convi-Etus & concubitus nullo modo infecerit: quod fane vix videtur contingere potuisse in morbo proprie contagioso. Quapropter excluso contagio è numero causarum hujus morbi, ad alias veriores investigandas nosmetiplos accingamus. Causas post partum hanc morbum invehentes in duas classes dipost par- stribuimus. Prior continet errores hoc facientes in usu 6 rerum non-naturalium: Posterior complectitur morbos diversi generis pracedentes, qui post se aptitudinem aliquam ad hunc

rum.

Gaulæ

hujus

morbi

affectum relinquere sapius solent.

Quod ad priorem classem attinet de abusu 6 rerum non naturalium, quatenus hunc affectum respiciunt, cum pueri rarius vehementioribus animi paßionibus commoveantur, vixque inde hunc morbum incurrant; deinde cum etiam veneris usus ad eos non pertineat; ad 5 capita sequentia causas has revocabimus. Ad Aerem, tum ea quacunque extrinsecus corpori occurrunt aut applicantur; ad Cibum & Potum seu que intus assumuntar; ad motum & quietum, vita genus, actiones & exercitia, ad somnum & vigilias; denique ad ea que retinentur in corpore preter naturam, aut excernuntur. Quæ singula ordine proposito, qua possumus brevitate, examinabimus.

1/2

min

cond

inter

caim

DILLI

cauta

hunc

pona violi

Hin brib

vel

gui

ripa pilc

tur.

pot

ref

94

Gin

quo-

onvierit:

uisse

pter

dujus nof-

STEEN STEEN

5 di-

ACUEN-

erior

eden-

DENC

eabu-

hunc

s ve-

-omn

IBCUT-

ad eos

a call-

a que-

appli-

11154-

genal,

144;

preter

ordi-

De

De Aere & extrinsecus occurrentibus.

Aer humidus & frigidus multum huc serhucontribuere potest. Etenim cum is facilius midus & occurrat partibus externis & in hoc morbo primo affectis, quam visceribus intus reconditis, directe facit ad inæqualem illam intemperiem, frigidam nempe & humidam (quæ pars est primæ essentiæ hujus morbi) istis partibus imprimendam. Hujusmodi Aëris constitutio circa veris principium maxime viget, quo idcirco tempore cautas decet esse nutrices, ne infantes ad hunc morbum propensos nimium Aëri exponant; ut & ubi Aër nebulosus, crassus, pluviosus, vaporibusque scatens observatur. Hinc loci maritimi, paludinosi & pluviis imbribulque frequentioribus obnoxii, immo vel numerofis aquarum scaturiginibus irrigui, cæteris paribus, in hunc morbum fœcundiores esse solent. Similiter ædes juxta ripas fluminum majorum, juxta stagna, piscinasque exstructæ hoc nomine culpantur. Præterea Balnea frequentia, ablutione sque Balnea cum aqua dulci, licet actu calide adhibitæ, cum frequenpotentia sint frigidæ ac humidæ, huc etiam tia ablureferantur; nam intemperiem suam partibus que cune queis adhibentur, ex parte communicant, aquadut-& manifeste toni mollitiem ac laxitatem, sanguinisque circuitum nimis lubricum &

ignavum in istis partibus plus minus efficiunt.

is, 0

gnant ac |di folyu

fertin

falter

ficiar

exhal

70,

flen

Aive

quart

nean

nulle

tano

cidif

berne

tus II

ter o

Simi

mul

latis

hæc

bm

funt

Linimenta frigida & humida aut lalubricantia. Lintea cata.

Huc etiam annumeremus linimenta frigida & humida, ut & laxantia & lubricantia in tenella ætate diutius continuata, præsertim circa spinam aut origines nervorum. xantia & Denique lintea molliora, tum non probe siccata hujus morbiradices fovent. Ob hanc causam, inter alias, accidit pauperum infantuitem non los minus huic malo obnoxios esse, quod probesie nempe plerumque asperioribus linteis, aut forte laneis integumentis involvantur. Quæ utraque tum fricando partes, tum eas titillando calorem insitum excitant & adaugent, vitalisque sanguinis affluxum copiofiorem ad habitum corporis irritant, adeoque magni funt momenti ad hunc morbum arcendum. Lintea vero molliora neque irritant calorem in externis partibus, neque enim probe fovent. Etenim si forte per tantillum temporis spatium à partium contactu amoveantur, calorem suum protinus exuunt, proximoque contactu sensum frigiditatis partibus inferunt. Quare ejulmodi lintea cum sint inter ea quæ extrinsecus applicantur, & cum sola frigiditate ac mollitie hic noxia fint, ad hanc primam caufarum classem, ejusque partem primam quæ humida & frigida extrinsecus occurrentia complectitur, retulimus. 2 Loco

13 cff.

a frigi-

rafer-

vorum.

e ficcata

JC Call-

nfantu-

quod

as, aut

Que

as titil-

adau-

copio-

adeo-

orbuin

queir-

neque

er tan-

conta-

rotinus

m frigi-ulmodi

cus ap-

ularum

uz hu-

2 COM-

Loco

2. Loco Aer speciali quodam inquinamento Aer noz. infectus, ut noxiis exhalationibus metalli- namentis cis, quæ ut plurimum, venenosa quadam infectus. malignitate spiritus insitos partium oppugnant, eofque vel extinguunt, vel fugant ac diffipant, tonumque partium fimul exfolvunt vimque pulsificam, in partibus præfertim externis, quibus primum occurrunt, faltem minuunt, si non etiam languore afficiant & enervent. Huc imprimis faciunt exhalationes è plumbo, antimonio, argento vivo, similibusque elevata. Porro unguenta ex Liniiisdem confecta, si frequentius aut intempe- menta ex stive partibus primo affectis illinantur, idem mercurio præstant; quamvis hæc etiam nonnihil ad busque quartum hujus classis titulum forte perti- parata. neant. Observavimus autem pueros non- observanullos unquentis mercurialibus illitos ad ne- tio. candam scabiem in hunc postea morbum incidiffe.

3. Loco Aer impense calidus, subtilis, ve- Aer imhementer attenuans ac diffolvens, quod spiri- pensecatus insitos dissipet, evocet, ac absumat inter causas hujus morbi annumerari debet. Similiter linimenta calidiora & præsertim simul discussiva, olea chymice distillata & non Linisatis correcta temperatorum admixtione : calidiora, hæc enim in tam tenera constitutione partum facile eliquant & in tenues auras resolvunt spiritus insitos, adeoque inopiam spi-

rituum insitorum inferunt. Huc etiam refe-Balnea calidiora, renda balnea acria, salina, calida & discusiva, immo & intempestive aut ultra modum & quæ nimium justamque mensuram adhibita. Nam hæc, ficcant similiter ut priora, spiritus eliquant arque & difcutiunt. ablumunt.

Aer narcoticis exhalationibus icatens nea, fomentuiones, & cis contecta.

4. Et ultimo, Aer exhalationibus vapori- pullo busve narcoticis refertus, & balnea, fomenta- respect tiones & linimenta ex soporiferis, seu narcoti- brem cis, cicuta, hyoscyamo, opio, solano, ut & fi- finte tum bal- milibus confecta, atque extrinsecus adhibi- tunda ta, ad hanc classem etiam commode accen- nerolo Nam torporem partibus primo aflinimen- fectis, in quas primum vim fuam exerunt, mid narcoti- facile inferunt ; qui torpor non modo ipse tens pars est primæ essentiæ hujus morbi, sed & felle facile obtundit ac minuit vitalem inflexum fimile in islis partibus, adeoque etiam causa est isti-mm us partis essentiæ morbi secundariæ, quæ in intern constitutione vitali consistit, quam rem su-partes pra fusius explicuimus. Atque hæc de ex-den trinsecus occurentibus.

II. De Cibo & Potu, introque assumptis.

Alimenta nimis humida

TENED BY TO

Ad hunc titulum pertinent primo Alimenta cujusvis generis nimis humida & frigida. & fiigida Quippe quæ fovent manifeste intemperiem, fun in qua pars essentiæ hujus morbi consistit. Huc ergo referimus pisces plurimos, cibosque

CYH

TWEN

mrefe- erudos & coctione non fatis praparatos: item ea omnia quacunque faciunt ad defectum coctionis in ventriculo. Itaque novorum ciborum ngestio, priusquam alii ante assumpti conarque cocti fint, in pueris ad hunc affectum difpositis, valde noxia est; & omnino diæta rapin-paullo plenior potius quam parcior hoc respectu improbanda est; obruit enim ca-Month lorem, crudosque humores accumulat. Et Most forte hæc una inter causas speciales repuadhibi-tanda est, cur morbus hic frequentius geeacen nerosorum quam rusticorum cunas intemoal stet. Similiter medicamenta frigida & hu- Medicaexerunt, mida intus assumpta, item laxantia atque in- interna odoiple terna lubricitate donata, huc quoque mani-frigida & led & feste spectant. Hæc enim non modo con-humida, flexum similem intemperiem inferunt, sed & to- xantia,& aelili-num partium relaxant, easque lubricitate lubricanque interna afficiunt, sanguinisque decursum per ". rem la partes primo affectas nimis lubricum ac facdea-cilem reddunt.

Alimenta nimis crassa, viscida & ob-Alimenta
struentia huc etiam faciunt, maxime quod crassa & viscida.

Aquali distributioni sanguinis officiant. Huc referimus carnes sumo induratas, multaque sale conditas, similiter pisces salitos, caseum cujus vis sere generis liberalius comestum, panem e surno recenter extractum, adhucque calentia tem. Item dulcia sere omnia saccharo condita, intosau nisi simul vinosa, aut incedentia & atte-

dom

de OTT

motul

Torpo facit,

infitus

penes

humlo

debital

effæn

intern

arteria

ritantu

tes tui

fident

CUITUS

ditur,

Quz

C

tum

Si ta

eode

tus.

Yatio

र्गंड न

Similia nuantia fuerint. Medicamenta etiam cujusvis medica- generis obstruentia huc pertinet, quibus ultementa, rius addere licet narcotica, & quacunque torpo-

narcotica rem partibus inducunt propinata.

3. Alimenta admodum calidadepradantia, Alimentaadmo- aeria, corrosiva, ut vina vetera & fortiora, præsertim jejuno stomacho hausta, cibi muldim calida, & to pipere aliisve aromatibus conditi, inter alacria. sumpta hujus affectus causas annumeranda. Hæc enim in tam tenera partium consistentia facile eliquant aut depascuntur spiritus insitos. Idem faciunt & medicamenta immoderate calida & discussiva, immo hæc longe medicapotentius nocere possunt, quod & citius & validius spiritus insitos depopulentur, quam alimenta prædicta.

> III. De Motu, quiete, Actionibus & Exercitiis.

Excessus
motus pus puelli in profusiorum sudorem solpossibilis
sed rarior vunt, unaque spiritus insitos partum non
causa. nihil dissipant ac immunuunt, adeoque hac
ratione possunt ad hunc morbum invehendum conspirare; licet rarissime contingere putemus, pueros hinc affectum, de

Desecus quo agimus, incurrere. At desectus motus
motus & exercitiorum frequentissime atque essicaexerciti
orum fre- cissune facit ad hunc morbum producendum.

(199)

a frie

orpo-

mia,

1014,

mul-

s af-

iten-

ricus

福福4-

longe

quan

, cor-

n nos

ue has

ehen

ontin

m, de

motus

effica

ducer

dum. Etenim spinalis medulla nervique in-quentisde orti, cæteræque partes primo affectæ, fima caumotui atque exercitiis maxime inserviunt. Torpor ergo & segnities istarum partium facit, ut neque satis foveatur earum calor infitus, neque is stimuletur, neque intemperies frigida obrepens arceatur, neque humiditates excrementitiæ & superfluæ per debitam transpirationem excutiantur, quin effœminata quadam mollitie, laxitate, & interna lubricitate eas affici permittit, unde arteriæ quoque ad eas distributæ parum irritantur, ignavos pulsus edunt, neque partes turgidulas reddunt, ast flaccidas & subsidentes relinquunt. Quibus de causis circuitus sanguinis tardus, & imminutus redditur, nimisque quam par est lubricus, tum calor vitalis debilis necessario producitur. Quæ omnia satis evincunt hanc esse admodum efficacem hujus affectus caufam.

IV. De Somno & Vigiliis.

Concedimus Somnum tum frequentiorem & vigilia tum productiorem pueris quam viris deberi. eodem se modohasis tamen is vel in pueritia modum excedat, bent ad eodem res redit ac in desectu excitii ac mohunc astus. Somnus enim quies quædam est & prifectum provevatio vigiliarum sive exercitii sensuum seen hendum sis us o varo mis exencitii sensuum seen hendum sis us o varo mis exensionomis. Vigilia quoquies motus.

autem iniplo sensuum exercitio consistunt, teste Arist. de Somno & Vigil. Quare quæ ex desectu motus & exercitii oriri mala descripsimus, eadem quoque ex somno nimio contingere necesse est. E contra immoderate vigilia in tam tenella ætate valde quoque noxiæ sunt. Nam non modo alimentorum coctionem impediunt, ast insuper acrimoniam quandam sanguini inurunt, dissipantque adeo principia constitutionis insitæ partium primo assectarum, & insitorum spirituum desectum invehunt.

V. De excretis & retentis prater naturam.

Causæ internæ morborum sorte non incommode ad hunc titulum omnes reduci possent. Etenim quælibet contenta in corpore præternaturaliter alterata, quatenus sunt præternaturalia, suam ablationem indicant, & inter præternaturaliter retenta excernenda eatenus reputentur. An vero concedimus rectius omnes causas internas in duo genera distingui posse; quorum alterum continet retenta & excreta præter naturam, alterum contenta in corpore præter naturam alterum contenta in corpore præter naturam alterata. Nam hæc posteriora non tantum per excretionem tolli, sed & per alterationem ad convenientem naturæ modum reduci possunt. Ut ut sat, magna est affinitas inter humo-

18

III C

alte

taci

CI

Cla

del

pri

liu

em

m

Int,

que

de-

17010

Tate

oque

MUDT

1110-

Maint.

par-

pin-

W.

nin-

educi

ncor-

tenus

indi-

aex-

COD-

n duo

con-

alte-

nalte-

m per

mad

pof-

mo-

TES

res alteratione vitiatos, & excrementitios retentos. Etenim tot funt in corpore, tamque varii excretionis modi, ut vix humor ullus per alterationem productus fingi possit, qui non facultatem secretricem & excretricem alicujus visceris, aliusve partis proprie respiciat, & ab ea secernendus & evacuandus destinetur. Ideoque, licet errores coctionis Errores primæ vix corrigantur in secunda aut tertia coctionis per alterationem; per motum tamen localem, licet vix siue excretionem alicubi in corpore factam, tur in seseparatis partibus inutilibus, iisque rejectis, cunda emendari possunt. Similiter alterata aliquo modo præter naturam massa sanguinis, aut rationem humore quovis inquinata, materia pec- possunt cans, quæ alias per alterationem domari non potest, excretione forte ab aliqua parte aut localem viscere facta (nisi una facultas ejus secretrix aut expultrix impedita fuerit) brevi exterminatur. Magni igitur momenti sit oportet medicum scire, qui humores in specie in quovis morbo dominentur', & per quas vias determinatas ex naturæ instituto proprie excernendi fint.

Etenim tot sunt forte excretorum species Plures insime, quot sunt distincta Parenchymata cies exaliaque partes ad ejusmodi munus in corpore cretorum destinate. Credibile namque est, aliud ex- quam vulgo cernere Hepar, aliud Renes, aliud Pancreas, statui soaliud Lienem, aliud Ventriculum, & Intestina, let.

corriganper motu

N 5

aliud

aliud Pulmones, aliud Cerebrum, aliud Testiculos, Uterum, Renes succeenturiatos, Thymum, Glandulas Laryngis, Gutturis, & Facium, alind Cuticulam, & Cutim. Siquidem vix admittendum videtur, naturam sibi fabricasse diversæ speciei organa, diversis sive uti ad unum idemque munus obeundum. Quando ergo contingit cujusvis dictarum partium excretionem cohiberi, peculiaris quædam impuritas inde in massam sanguinis redundabit; adeoque tot erunt præter naturam retentorum differentiæ, quot funt genera partium excretioni speciali inservientium; & similiter tot erunt genera vitiosæ excre-tionis sive nimiæ, sive imminutæ, sive depravatæ, quot sunt diversæ viæ per quas ex-cretio siat.

Singulæ ipette.

Si quis quærat an fingula excretorum geexcreto- nera nobis sint satis nota & perspecta; Recies non- spondemus, desiderari adhuc exactam notidum no- tiam specialis humoris per vas novum Panfatis no- creatis excernendi; delude quid excernant ta & per- Renes succenturiati, quid Thymus, quid Glandula Laryngis, immo forte vix dum fatis constat quid rejiciat Lien. Ob hanc ergo causam, inter alias, visum est ab ulteriori aut accurationi disquisitione de retentis & exfpectant, sive in ordine ad præsentem affectum, hic supersedere, potiusque insiftere effi-

ind

di-

20

2D.

Um

am

un-

lera

m;

CTP-

de-

ex-

26.

Re-

oti-

All-

ant

411-

on-

aut

ex-

juas naf-

ere

ftere quadripartitæ Galenum humorum divisioni in bilem, pituitam, sanguinem & melancholiam, addita solummodo transpiratione indebita & sudore. Licet enim dubitemus, an hæc divisio deducat humores ad species infimas, quod (ut supra notavimus) evidenter plures quam quatuor partes sint specie distinctæ humorum excretioni dicatæ; cum tamen hæc divisio humorum non modo omnibus medicis classicis arrideat, sed & in se omnino utilis sit, & saltem reducat humores ad certa capita seu genera (ut forte quodlibet genus plures sub se species complectatur) ei impræsentiarum insistere decrevimus; eoque magis, quod optime sub generali notione conjungat & complectatur tum alterata præter naturam intus contenta, tum excernenda nondum excreta, eoque respectu levaverit ex parte onus nostrum, opusque contraxerit. Siquidem dum hoc modo procedimus, non opus erit aliud peculiare caput instituere deistis hujus morbi causis, videlicet de contentis præter naturam alteratis, quandoquidem sub hoc titulo, ut diximus, comprehendantur.

Causas ergo internas hujus morbi (sive Causa internas sint humores excrementitii retenti, sive al-hujus teratione vitiati) reducibus vel ad bilem, vel morbi. melaneholiam, vel pituitam & serosum humomelaneholiam, vel pituitam & serosum humomem, vel indebitam transpirationem & sudorem.

Sanguis enim proprie dictus vix reus in hoc

affectu deprehenditur.

Object. Objicias Practicos in hoc affectu fere semper vena sectionem in concha Aurium prascribere, eamque evacuationem utilem observare, quod vix admitteretur, nisi aliquo modo

sanguis hic peccaret.

Refp.

Resp. Respondemus valere hoc remedium non ratione universalis plenitudinis sanguinis, sed ratione peculiaris plenitudinis ipsius capitis. Supra enim monstravimus in hoc affectu sanguinem inæqualiter partibus corporis dispensari, & quidem diminute partibus primo affectis, capiti vero nimis copiose. Licet ergo non adsit univerfalis sanguinis redundantia in hoc morbo, respectu tamen particularis plenitudinis ipsius capitis, utiliter forte sectisillis extimis & minutis aurium venis particularis ejusmodi depletio instituitur. Dicas nos hoc responto plethoram universalem quidem declinare, ast particularem capitis (quæ non minus causa morbifica censenda) plane concedere. Respondemus nos fuse supra explicuisse hoc vitium sanguinis, ubi egimus de inæquali distributione ejusdem, ad quem locum propriæ spectat, cum sit causa essentiæ secundariæ non primariæ hujus morbi;ideoque hic non exspectanda est inanis ejusdem rei repetitio. Pergendum ergo jam est in

pro-

proposita disquisitione de prædictis humori-

bus, tum transpiratione.

1. Bilis (five intelligas hoc nomine humorem excrementitium in vesicula & poro biliario, five calidiorem, sicciorem, acriorem,
amaramque partem massa sanguinis; sive nidorosum illum humorem, qui oleum rancidum
sapore suo refert, ex corrupto cibo prasertim
pinguiori, adusto, vel salso, in ventriculo genitum & fluitantem, sive ichores quosvis acres
& corrosivos è sanguine corrupto in corpore productos) potest, si forte in corpore redundet
aut ferociat ac dominetur, esse hujus morbi causa.

Etenim, licet videatur potius posse im-Quomopugnare frigidam atque humidam intempepossities riem, quæ pars essentiæ primæ hujus morbi hujus
est; eo ipso tamen quod apta est nutritionem partium sive irritando nimium excretricem, sive attenuando alimentum, nonnihil impedire, & ipsam constitutionem insitam partium extenuare aut eliquare, spiritusque adeo insitos absumere & dissipare,
inter causas hujus affectus recte statuetur.

Notum enim est biliosos, sere macros, &
extenuati habitus esse ob rationes modo assignatas.

II, Melancholicus humor (sive intelligas terrestriorem sanguinis portionem; sive salinam illam & tartaream materiam in & cum urina

na

als

fin

jus

tai

tio

fri

arina excretam, Gin arenulas, ubirefrixerit urina, ut plurimum concrescentem; sive acidum humorem in ventriculum à Liene forsitan (licet non per vas breve venofum, ut veteres crediderunt) refusum; sive terrestres illas alimenti assumpti partes, qua cum facibus alvi per sedem deponuntur) quemvis horum intelligas, fi redundet hic humor, neque debito modo expurgetur, culpari potelt ut causa hujus affectus. Nam 1. humor ille qui terrestrior pars sanguinis est, si excedat justam proportionem in massa sanguinis eum lancholi- minus aptum reddit ad nutriendas partes mor hu- præsertim primo affectas. Partes enim primo jus mor- affectæ nobiliores sunt texturæ quam pareneffe possit chymata viscerum, aut osseum genus; ideoque supra monuimus parenchymata & ossa facilem admittere nutritionem, & per modum congestioni similem; verum illæ partes priores longe accurationem secretionem & operofiorem affimilationem postulant. Arque hinc est quod carnes viscerum animalium inter impuriora & craffiora alimenta recte reputentur; nimirum quod minus felecto sanguine, minusque anteunionem elaborato alantur. 2. Salina similiter, & tartarea materia nimium accumulata nutritioni inimica est, & potius dissipativa est ac depascens quam augmentationi favens. 3. Humor acidus ventriculi totus edax est ac fame-

famelicus, & forte ubi redundat ipli fanguini consimilem deprædantem qualitatem facile impertiat. 4. Et ultimo terrestriores alvi faces importune retenta chyluminquinare possunt, eumque minus idoneum ad alendum reddere. Denique concedimus singula melancholiæ proposita genera superflue coacervata aut præternaturaliter retenta, non primo ac per se & directe ad hujus affectus productionem facere; indirecte tamen modoque proposito ad ejus genera-

tionem nonnihil posse contribuere.

3. Pituita (five sumatur pro humidore & frigidiore parte massa sanguinis; fixe proserosa parte ejusdem; sive pro lento humore ventriculi & intestinorum; sive pro saliva & sputo; five pro muco narium aut faucium; five pro peculiari humore, quem forte novum Pancreatis vas expurgare solet) quomodolibet sumatur, si retineatur ac in corpore redundet, magis directe hunc affectum respicit, ejusque causam magis proprie & per se dici meretur. Est enim hic humor frigidus, humi- Quomodus, lentus, crassus, torpidus, parum spiri- do Pittituosus, mollis, & interna lubricitate affe- morbi ctus; quæ omnia ad amussim quadrant cum essentia primaria & secundaria hujus morbi propositi. Quocirca humor hic superflue accumulatus, cum in hujus morbi productionem univoce conspiret, causa

20

propria & agens per se merito æstimanda est.

Præter hos humores etiam indebita transpiratio, ut & sudor sive nimius, sive desiciens inter causas hujus affectus nonnunquam re-

censeri poslunt.

excedens vel defi-& indebita tran-Ipiratio hujus morbi causa esse poffit.

Etenim sudor immoderatus, ut & nimia do sudor transpiratio, dissipat vires, & una eliquat partes, imprimis externas in hoc morbo ciens, ut primario affectas, atque discussis spiritibus insitis facile post se intemperiem frigidam relinquit. Sed & transpiratio alio modo insuper, nimirum ubi nimis lubrica est, hunc affectum promovet. Requiritur enim ad justam caloris partium excitationem & confervationem debita quædam lucta exhalatio-. num inter transpirandum. Quæ si deficiat, calor actualis quoque qui ex parte in ipsa hac lucta confiltit) valde debilis ac languidus evadit, partesque frigidæ intemperiei facile exponuntur. Sed de hac re superius plura. E contra sudor præter rationem cohibitus, ut & imminuta transpiratio, facile febrilem calorem accendit, adeoque vires insitas frangit partesque dissolvit, easque frigidæ intemperiei postmodum facile obnoxias reddit.

> Denique, ut reliqua verbo complectamur, humor, quivis præter modum ac rationem excretus, colliquationem partium

> > ipi-

atque deb

to day in

nan.

4%-

nens

iquat iorbo

tibus

idam loin-

hunc adju-

conatio-

iciat,

ipla

ngui-

репет

perius

m co-

o, fa-

alque

e ob-

lecta-

acta-

[pi=

spirituumque insitorum dissipationem facile insert, adeoque corpus ad hunc assectum disponit. Atque hæc dixisse sufficiat de rebus non naturalibus causssque morbi inde ortis.

CAP. XVII.

Morbi antecedanei, qui hujus morbi causa esse possunt.

Morbos hos reducimus ad tria genera seu capita.

I. Ad morbos huic affines seu ex parte congeneres.

II Ad morbos corpus extenuantes seu ema-

III. Ad morbos ignaviam & torporem partibus primo affectis inducentes.

De

De I. Genere.

Qui morbi huic fins

Morbos huic affines seu congeneres vocamus eos qui ex parte saltem consistunt in affines & eadem natura cum essentia hujus morbi. congene Hujus generis sunt intemperies quavis frigida, intemperies quavis humida; item quavis frigida & humida. Nam pars primæ essentiæ hujus morbi includit intemperiem frigidam, ut & humidam, adeoque ista intemperies cum hoc affectu ex parte conveniunt. Huc etiam spectant cacochymia, pituitosa, melancholica & mixta; obstructio ab istiu (modi humoribus facta, cachexia, hydrops. Imo huc etiam referre poslumus, propter affinitatem, morbos illos in quibus spiritus insiti nonnihil absumuntur; quippe pars essentiæ hujus morbi consistit in penuria eorundem spirituum; alias vero commodius referuntur ad genus secundum; similiter morbi in quibus partes primo affecta torpore afficiuntur, ratione affinitatis suæ huc possunt pertinere, licet tertium genus morborum enumeratorum magis proprie spectent. Porro morbi, in quibus laxatur, & flaccessit tonus partium, huc respiciunt; quippe qui partem hujus morbi includunt, eam videlicet, quæ confistit in laxitate, flacciditate, interna lubricitate & mollitie toni supra descriptis. Asserunt Philosophi Elementa, quæ in symbolicis, ut

VO.

TX 21 th le

morb

venit

ong.

cum

dem

gravi

ies,

tari.

te pa

zque

morb

parte

que

CODY

gida figu

cong

tum o midit gidita hinco accum

tam

hum

VOCa-

int in

norbi.

jigida,

nifi-

lentiz

gidam,

peries

Huc

melan-

odi bu-

no huc

finita-

nonni-

hujos a spiri-

ntur ad quibus

atione

, licet

torum

in qui-

ucre-

morbi

Affit in

tated

nt Phi-

is, ut

VO:

vocant, qualitatibus conveniunt, facile inter se transmutari; pari profecto ratione morbi, qui ex parte in eadem essentia conveniunt, facile reciprocum transitum ab uno ad alterum admittunt. Sic videmus Ephemeram, quæ in præternaturali calore cum putrida conventi, levi de causa in eandem degenerare. Notandum hic tamen, graviores morbos nonita prompte in leviores, atque leviores in graviores commutari. Præterea neque omnes morbi qui forte pariter de eadem essentia participant, æque facile inter se permutantur. Alii enim morbi promptius in alios, cum quibus ex parte conveniunt, quam alii transeunt, idque propter alias rationes præter dictain convenientiam. Ut ut sit, si intemperies frigida & ficca puello accideret, facile ea in frigidam & humidam laberetur, tum ob congruentiam utriusque morbi in frigiditate, tum ob peculiarem tenellæ ætatis versus humiditatem inclinationem. Etenim ob frigiditatem coctiones imperfectæ fierent, hincque cruditates seu crudæ humiditates accumularentur, quas facile & proxime in tam tenera ætate sequeretur intemperies humida. Porro intemperies frigida & humida, ratione frigiditatis tardiorem pulfum, ratione humiditatis magis lubricum minusque obluctantem efficeret, unde imminuto

ter re

(112

(tz)

Meogt

maxim

ficile

Bunc

pe ma

primo confec

minuto vitali calore, paullatim spiritibus insitis torpor obreperet; denique, ob labilem illam retentionem ortam ab interna partium lubricitate, & ob debilem coctionem, spiritus insiti partium primo assectarum sensim quoque minuerentur, adeoque gradatim hoc modo introducetur integra hujus morbi essentia. Sed de hoc genere hæc dicta sufficiunt.

De II. Genere.

Morbi plurimi emaciantes & quovis modo corpus extenuantes, licet forte ipsi nullo modo de essentia hujus morbi (quemadmodum morbi primi generis) participent, corpus tamen ad hujus morbi invasionem disponere, eundemque post se relinquere queunt. Etenim omnes morbi graviores & diuturniores, tractu temporis, atterunt & extenuant habitum partium, spiritus insi- u. H tos abfumunt, tonumque partium folvunt; im He atque hæc attritio, & extenuatio partium potissimum respicit partes in hoc morbo primo affectas. Nam, ut supra asseruimus, Re parenchymata viscerum non ita facile subjiciuntur colliquationi aut dissipationi; Quin u in cadaveribus eorum, qui à longis morbis extincti sunt, dissectis, viscera nihilo em ferme minora, immo forte majora frequenter

ter reperiuntur, quando externæ partes (quæ in hoc morbo solent esse primo affetem (tæ) vi morbi plurimum emaciatæ sunt. Ideoque cum morbi extenuantes vim suam maxime in partes primo affectas exerant, facile contingit, ut ii in pueris ad morbum hunc invehendum faciant. Absumptis quipgente pe magna ex parte spiritibus insitis partium primo affectarum, vix fieri potest, quin consequatur intemperies frigida, quam ob ruditatem excipit) ut supra monuimus) numida, simulque torpor; cum calor, activitas, & vigor partuim maxime dependeant llomo- à spiritum insitorum copia. Atque ita exnadmo nibuimus moduin, quo hic morbus insitit vestigiis aliorum præcedentium hujus emdil generis; quod jam ulterius in tres classes inquere ubdistinguimus.

Prima comprehendit morbos per insensiles Tria geerunt & rias habitum partium extenuantes & absumen- mera morboru tus infi- es. Huc spectant febres fere omnes, præser- corpus solvents im Hectica, Tabes, Vlcus Pulmonum cum fe- extenupartium re putrida: Item febris qualibet continua viomorbo entior, febris ardens, maligna, pestilentiaeruinus, is, Pleuritis, Peripneumonia; Item variola & de norbilli, ubi gravius afflixerint. Similiter fequi res, intermittentes diuturniores: Denique os por vorbi omnes chronici graviterque affligentes ahio lem præstant. Secunda Classis continet frequent vorbos per vias manifestas colliquantes & soli-

dam substantiam partium evacuantes. Huc referas immoderatam vomitionem, lienteriam, dysenteriam, diarrhæam, sluxum hepaticum, diabetem, hamorrhagiam quamlibet prosusio-rem, sudorem nimium, ulcus in quavis parte magnum, prosundam, multamque materiam indies excernens. Hi enim affectus omnes evidenter habitum partium extenuant, & ad hunc morbum introducendum faciunt.

Tertia tandem complectitur morbos, qui quidem non directe, ast ex consequentia quadam substantiam partium dicuntur extenuare; ut omnes morbi impedientes alimentorum vel coctionem vel distributionem. Siquidem hi partium à vitali calore continue depastarum reparationem prohibent. Hinc morbi varii Ventriculi, Intestinorum, Mesenterii, Pancreatis, Lienis, Hepatis immo morbi in ore, faucibus, vel gula impedientes tantum aflumptionem aut deglutitionem cibi inter causas hujus morbi hoc respectu annumerentur. Ut intemperies, tumor, nausea appetitus dejectus ventriculi; item intemperies, tumor , obstructio & scirrhus mesenterii , pancreatis , pepatis, lienis , similesve affectus alicujus dietarum partium, quibus debita alimentorum coctio vel distributio quovis modo frustratur, partesque inde desectu alimenti extenuantur.

Mo

centes

ctus p

fopiti

inten & hun

quitur bricita

parte

tur,

quep

ut ab

nente

lareq

CATR

viden

fis in

raro.

rit hi

origin

tioner

0013

affec

piun

natur mo in

De III. Genere.

-910 riam,

am,

fufio-

PATIE

71478

mnes

t, &

int.

s, qui Ladam

it om-

coctio-

rtium

epara-

Ven

ncrea-

nore,

um al

inte

nume

4 4994

1185, 18

morti

ujus A

ItOFU fulty

tiest

Morbi torporem partibus primo affectis inducentes, peculiari quoque jure ad hujus affectus productionem conspirant. Etenim calor infitus istarum partium nonnihil abillis sopitur, minusque efficax redditur; unde intemperies frigida sensim obrepit, quam & humida (ut modo dictum) facile confequitur, mollitiefque etiam, tum interna lubricitas. Adhæc pulsus arteriarum ad istas partes delatarum paullatim enervatur, distributio sanguinis calorisque vitalis minuitur, partes ipsæ parcius aluntur, tandemque penuria spirituum insitorum supervenit; ut ab hac etiam radice, aliquandiu permanente, essencia hujus morbi demum pullulare queat. Apoplexia, Paralysis, Lethargus, Puerira-Carus, simile sque affectus huc maxime spectare rissime à videntur. Rarissime tamen pueri his de cau- soporosis sis in affectum hune incident, atque adeo bus in raro, ut nondum nobis observare contige-hunc rit hunc morbum ab istiusmodi affectibus incidunt, originem duxisse. Siquis hujus raritati s ra- & cur. tionem exigat, dicimus puerorum corpora, ob raritatem ac permeabilitatem, rarius istis affectibus subjici; ubi vero forte iis corripiuntur, morbus ipse non constitutionem naturalem aut vitalem, ast animalem primo impetit; adeoque animalis facultatis depriva-

privationem aliquamdiu invehit, priusquam naturalem vel vitalem interturbet. Torpor vero, de quo hic loquimur, ad constitutionem naturalem pertinet, in quam non statim transferri potest. Porro, ob transpirationis facilitatem in corporibus puerorum, si forte isti affectus mitius ea invadant, facile ac cito excutiuntur; sin sævius irruant, æque terme cito, ob constitutionis debilitatem, interimunt; quippe qui natura sua gravissisimi sint affectus. Utrovis autem modo accidant, vix tamdiu protrahuntur, ut fatis efficaciter torporem hunc insitæ partium constitutioni imprimant. Concedimus tamen hos affectus si forte diutius cum vita persistant, posse, tractu temporis, constitutionem insitam eo torpore afficere, ut morbus hic inde subsequatur, licet nondum id nostra observatione sit compertum.

Qui morbi fint, qui frequentius folent torporem huic morbo proprium

Cæterum morbi, qui frequentius hunc torporem constitutioni insitæ partium primo affectarum invehunt, funt illi ipsi, qui pueros quovis modo ab actionibus & excercitiis debitis, prasertim ab usu pedum impediunt; ut luxatio, aut fractura, vulnusve aliquod pedis, cruris, femoris, spina dorsi; item tumores aut invehere. dolores, similesve affectus, sive ii affligant partes jam dictas, sive alias, modo id efficiant, ut pueri inde ambulare, aut pedibus insistentes ludere, masculisve exercitiis uti recusent.

Hinc

H

PIN

MO

au

7107

pro

ter

rei

COI

VIO

COD

fiat

pu

cun

&

95 95

reg

lam

por tio-

ta.

Ma-

m, acile

em,

204

latis

lum

ta.

vita

Itu-

nor-

pri+

qui

otis

; ut edis,

5 AND

pariant, ften-

lent. Line Hinc enim torpet paullatim vigor calorque externarum partium quæ in hoc morbo primo sunt affectæ, atque inde catenatim succedunt cæteræ partes essentiæ hujus affectus, quemadmodum superius declaravimus.

Absolvimus jam enumerationem causarum hujus affectus, & ad differentias ejusdem proxime foret procedendum, nisi hic se interponerent. Difficultates duæ, quæ proprie resultant ex causarum propositarum ulteriori consideratione. Etenim causa modo allatæ videntur omnes tum pueris, tum adultis communes; unde jure quæri possit. Qui fiat quod ætate grandiores non æque ac pueri hoc modo infestentur? Deinde cum causæ propositæ fere omnes communes sint cum Angliæ, tum multis aliis regionibus; & earum nonnullæ omnibus terrarum plagis. Hinc insuper quæri possit, cur in Anglia morbus hic frequentior quam in aliis regionibus occurrat? Has quæstiones ordine examinabimus, nostrumque de his judicium in medium proferemus,

DS CAP.

CAP. XVIII.

Quastio prior.

"Ur atate grandiores non aque ac pueri huic morbo sint obnoxii? Quastionis termini videntur infinuare affectum hunc posse quidem, licet admodum raro, adultis etiam accidere : sed hujus dubii solutionem in calcem præsentis determinationis reservamus. Interea primo opponenda, & ex adverso pensitandæ sunt constitutiones seu dispositiones tum puerorum huic morbo maxime obnoxiorum, tum grandiorum rarius ei obnoxiorum; necnon juvenum, virorum, & senum, idque in ordine & relatione ad hunc affectum. Quæstio enim ipsa non absoluta sed comparativa est, primaque i deo ratio determinationis ejusdem petenda est ex mutua collatione diversarum dispositionum dictorum subjectorum, quatenus ex aut facilius aut difficilius impressiones propositarum causarum admittunt. Deinde etiam expendendæ veniunt accidentales quædam peculiaresque conditiones juniorum puerorum sub certa aliqua ætate, ob quas sub uuaætatemagis, sub alia minus huic affectui redduntur obnoxii.

Quo priorem collationem felicius expe- Diffindiamus, ex adverso sistemus, hinc quidem minum pueros semestres, hornotinos bimulos, tri- respectu mulos, quadrimulos; illinc vero quinquen- atatis in juniores nes, & ultra ætate provectos, jnvenes, vi- & fenioros, tum senes; illosque generali termino res. juniorum, hos seniorum seu ætate grandiorum complectemur, nisi forte res ulteriorem grandiorum distinccionem postulaverit. Hisce ergo præmissis collationem insti-

tutam aggredimur.

ers

STEE STEE

Inc

ltis

10-

DIS

8

nes

Odi 12-

VI-

la.

pla

na-

Dt-

11-

ref.

di-

ali-

įs, ob-

110

I. Juniores pueri frigidiori temperamen- Iuniores to præditi funt senioribus. Calor enim tem- puen friperamenti à primo ortu ad virilem usque gidiori ætatem intenditur, quo tempore in statu mento quodam consistit longe intensior illo pue- praditi rorum; verum hine sensim declinat ad ex-seniores, tremam usque senectutem, paulloque ante & cur. hunc extremum terminum ad gradum istum, quo in pueritia occepit, relabitur; ante vero hunc terminum supremæ senectutis, temperamentum ipsorum senum calidius est illo puerorum. Licet enim revera juniores pueri uberiore calore insito, spirituque insito abundent, non tamen propterea necesse est Plura recalidiore temperamento fruantur. Siqui-quirundem ad constitutionem temperamenti ca- tur ad lidi, præter spiritus insitos & calorem insi- constitutum, plura requiruntur concurrentia, ver- temperabi gratia, amplior portio humoris biliofi, menti una-

GIRRID Spiritus

unaque vel maxime vitalis facultatis valiinsiti, & dior nixus, nempe tum in pulsibus, tum in calor in- spiritibus vitalibus in circuitu suo. Cum ergo juniores pueri frigidiores fint, haud mirum, si morbis frigidis, qualis hic est, magis sint obnoxii. Quod ad senes attinet, præsertim in provectiore senectute; concedimus illos quoque & frigidiores esse, & frigidis morbis levi de aula subjici. Quapropter, hinc, videlicet à frigiditate temperamenti, nullam differentiam inter pueros juniores & hosce senes, respectu aptitudinis ad hunc morbum incurrendum, deducimus.

2. Juniores pueri humidiores sunt ætate grandioribus. Senescere enim, si sano sensu sumatur, est siccessere. Quamvis enim senes suo modo etiam humidis affectibus, ut catarrhis, obstructionibus, cachexiæ, hydropi, paralysi, lethargo, laxitati nervorum tremorique & similibus malis obnoxii fint, re ipsa tamen nonnulla est differentia inter intemperiem humidam, quæ pueris, & illam quæ senibus contingit. Nam in pueris adventitia humiditas intemperiem constituens. non tantum intimam sozis ab illa lidarum partium substantiam perfundit, sed. qua seni- & eidem penitus incorporatur: ast in senitingit & bus solida partium substantia, veltum quanquomo- do intemperie humida imbuitur, non vide-

Differt. temperies huquæ puezur exuere suam terrestreitatem, sed quodammodo componi ex natura sua terrestri, & fucco quodam adventitio humido crudoque, aut etiam excrementitio, vel in poros, vel in substantiam partium imbibito, non tamen satis incorporato sive unito Quemadmodum enim arena, multa aqua perfusa, totam terrestrem suam substantiam utcunque nonnihil madidam sibi retinet) ita & senum corpora, ut ut crudis vel excrementitiis humoribus madescant, non deponunt tamen terrenam illam fubstantiam, live partem illam, quæ capitis mortui nomine à chymicis designatur, quam sibi in dies à primo ortu accumularunt. Est ergo hæc senum intemperies spuria, non genuina; cruda, non in substantiam partium plene digesta. Ideoque licet concedamus senes etiam posse suo modo, quo dictum est, laborare intemperie humida; liquet tamen una ex iis quæ diximus, quantum discriminis intersit inter hanc senum & illam juniorum puerorum. Porro quod hæc humida fenum iniemperies minus sit præsentimorbo conformis, quam illa puerorum ex eo manifestum esse potest, quod in senibus non eam mollitiem ac teneritudinem partium, quam in pueris deprehendimus, producat : neque eos æque disponat ad dissipationem aut colliquationem spirituum insitorum, aut lubrilubricam permeationem sive sanguinis sive exhalationum, quæ in hoc affectu supponuntur; quin potius obstructionibus cæterisque malis supra recitatis, eos obnoxios reddit. Facta ergo collatione interintemperiem humidam, quæ pueris junioribus, & illam quæ senes afficere solet, non levis resultat ratio, cur senes in hunc affectum saltem ægrius quam pueri incidant.

3. Pueri juniores, licet spiritibus insitis naturaliter abundent, ob corporis tamen perspirabilitatem, ob laxitatem & teneritudinem (ut dictum) minusque sirmam partium cohærentiam, facilius quam seniores dessipationi & colliquationi spirituum insitorum subjiciuntur; & per consequensleviori, de causa in eorundem inopiam incidunt.

4. Pueri juniores ob eandem infirmam partium confistentiam, torpori etiam redduntur magis obnoxii quam grandiores. Etenim ad vigorem & activitatem partium, præter justam spirituum copiam requiritur imprimis sirmitas earum cohærentiæ & confistentiæ.

7. De Tono partium non opus est ut quidquam addamus; cum ejus debilitatem in junioribus pueris præ grandioribus toties jam insinuaverimus, & cuivis liceat, observare, ut tonus crescente ætate magis magisque sirmetur.

6. Quod

100

rib

qu

pro

ren

pe

tine

ftat

ne

Pli

pue

riu

Dun

Jun

CIII

OCC

6. Quod ad diminutam distributionem fanguinis ad partes primo affectas attinet (quam notabilem esse partem essentiæ hujus morbi secundariæ supra probavimus) dicimus, grandiores ætate pueros tum validioribus tum frequentioribus exercitiis uti, quam juniores; & proptereain illis fortius proritari pulsus externarum partium, nempe primo affectarum, caloremque majorem in iis excitari & foveri, ideoque frigidam intemperiem potentius ab iis arceri.

itis

ti-

21-

res

11-

le-

nt.

am

ed-

es.

m,

tur

011-

ut

em

ties

let-

eile

10d

7. Quod ad vitia organica, auctam nempe magnitudinem Capitis, Hepatis, vaforumque eorundem, similesque affectus attinet, notum est proportionem partium in grandioribus magis esse confirmatam, & stabilem in junioribus è contra facilius moveri atque alterari; cessante vero accretione, non nisi gravissimis de causis eam amplius immutari. Ut vel hinc etiam juniores pueri in hunc morbum maxime proni fint.

Concludamus ergo hanc partem quæ- Iuniores stionis, juniores pueros, respectu peculia- pueri quo rium suarum, constitutionum & dispositio- respectu num naturalium esse magis huic malo ob- gis huic noxios quam grandiores, eoque magis, quo morbo juniores.

Verum non prætereunda, quæ hic oc- tategrancurrit, objectio, quæ opportune quoque occasionem subministrat transeundi ad alte-

obnoxii quam æ-

60

infa

COL

inc

ner

fua

ad

mi

qu

ani

Objett.

ram collationem, videlicet juniorum puerorum inter se. Si enim juniores pueri (ut ex dictis liquet) magis sint ex naturali sua constitutione & dispositione proclives ad hunc morbum, & quo juniores, eo magis; qui fit, quod pueri rarius ante semestrem ætatem & paullo ultra in hunc affectum incidunt? Etenim, secundam sententiam di-Etam, pueri mox à partu viderentur huic morbo maxime obnoxii; quod tamen experientia non comprobat, quin potius contra testatur, pueros nempe ante nonum ætatis mensem vix ant quam rarissime in hunc affectum incurrere. Hic ergo aggredi nobis opus est alteram collationem puerorum juniorum inter se. Siquidem heri non potest, ut ita constanter morbus hic pueris ad eundem maxime dispositis parceret, minusque dispositos frequentissime invaderet; nisi aliquid interveniret discriminis, quod illas ætates deversimode respicit, quodque morbi invasionem ante completum ferme primum ætatis annum remoratur, non obstante propensitate naturæ, & tamen postea, vel non omnino, vel non adeo potenter pueros ab hoc morbo tueatur. Hic ergo investiganda est ipsa ratio discriminis inter has ætates. Quam ut promptius assequamur, non erit forte abs re obi--ter annotare specialius, quæ ætates frequentius,

tius, quæ rarius, duce experientia hoc morbo affici observentur.

世

ad

an

d-

nic

ex-

On-

um

e in

25-

nem

iem

bus

par-

ime

Cri-

16-

ante

nre-

atu-

vel orbo

ratio

romeobi-

entius,

Asserimus ergo morbum hunc rarissime Qua xinfantes mox à partu, aut ante semestrem tasjunioætatem (immo forte ante nonum mensem) rius, quæ corripere. Ab illo tempore vero paullatim frequenincipere frequentius indies graffari ufque obnoxia. nempe ad primum ætatis annum completum cum dimidio. Inde frequentiam, quasi anunu suam attingere, & in eadem quasi consistere ad finem usque secundi ætatis anni cum dimidio; ita ut tempus frequenter invalionis sit annus ille integer, qui mox primum sesquiannum à partu sequitur. Exacto secundo anno cum dimidio morbus indies minus frequenter invadere incipit, ob rationes scilicet supra allatas. Verum rationes, ob quas Infantes recens nati rarissime, & ob quas à nono mense ad sesquiannum frequentius, curque postea per integrum annum frequentissime afficiantur, hic ordine exigendæ funt.

I. Rationes, ob quas pueri recens nati ra- cur Inrissime afficiuntur, hæ possunt assignari.

Prima est, quod fætus in utero ab aquali ca- nati ralore & amplexu uteri strenue muniatur adversus ristime hunc morbum, ut supra declaravimus, &, per tur. consequens, idem in lucem recens editus aliquid munimenti contracti ab æquali illo uteri fotu aliquandiu retineat, ut statim à partu non ita facile in eum incidat.

Secunda est, quod obstetrices & nutrices ea arte recens natos tractent, ut eorum conditio quam proxime accedat ad illam quam nuper in utero habuerant. Uno enim continuo involucro totum corpus, excepto capite, undique involvunt: unde partes corporis exteriores & primo affectæ in hoc morbo ab injuriis externi frigoris muniuntur, calidæque exhalationes à quacunque parte corporis erumpentes isto involucro forte duplicato aut triplicato, fasciisque circumducto, exæquo retinentur, omnibusque partibus corporis æqualiter communicantur, ut quasi in communi hypocausto æquali calore foveantur. Cuin ergo prima pars effentiæ hujus morbi in inæquali frigida intemperie consistat, non mirum si munimenta hæc corporis eam ad tempus faltem avertant.

Tertia ratio forte esse potest salubritas liebresa- Diata. Lac enim muliebre tam tenellæ ætati saluberrimum alimentum est, præsertim fantibus è mammis exfuctum. Est quippe cibus simalimenta plex & uniformis, multum alens, coctufacilis, & constitutioni infantum amicus & familiaris. Quamdiu ergo hoc alimento commode aluntur, pauciores diætæ errores incurrunt, minusque huic morbo red-Exceptis duntur obnoxii. Notandum tamen, si lac certis ca- nutricis nonsit in se probum, vel alias non

ties

ditio

7 11

VO.

un-

CX-

020

dz.

-100

du-

ndu-

Dar-

W,

162-

ef.

10-

mi-

em

TITAL

ta-

tim

m.

ıfa-

8

nto

TO-

ed-

1/20

100

16-

respondeat constitutioni infantis, rationem, hanc locum non habere. Quando igitur nutrix gravida est, aut immoderatius veneri dedita, quando ea cacochymica, valetudinaria, aut alias ægra, quando ea temulentiæ aut crapulæ aut insalubri diætæ dedita est, tutius est, nisi commodior nutrix

in promptu sit, ablactare infantulum.

Quarta & ultima ratio est, tarditas motus hujus morbi in sua prima invasione. Adeo enim lente sensimque obrepit, ut ad plures menles vix sui manisesta vestigia prodat, nisi forte à vehementissimis causis ejus progressus promoveatur, ut à morbo violentiore aut colliquante, seu antecedente, seu superveniente. Cum ergo tam lente morbus hic natura fua primas radices agat, cumque pueri, ut prius monstravimus, nascantur fere ab eodem immunes : vix contingit eum Cur Inante sextum mensem, immo raro ante no- fantes à num, evidenter in actum prorumpere. At- 9 mense que adeo rationes reddidimus, ob quas in- annum fantes modo nati, non obstante constitutio- ataris in nis debilitate, ad plures menses ab hoc afte- morbo ctu defendantur.

frequentius infe-

II. Causæ, cur pueri à nono mense ad sesquiannum atatis indies hoc morbo frequentius infestentur, funt hæ.

1. Quod causa prima, modo proposita, recens-natis hunc affectum arcens indies remit-

tat

tat & ante nonum mensem plane evanescat.

2. Similiter causa propulsiva secunda supra

tur. 4. Tarditas motus hujus morbi ron impe-

dit quin post nonum mensem in actum prorumpat. Etenim motus, præ tarditate imper-

ceptibilis, tractu aliquot mensium, manifesta sua vestigia profert. Ultimo dentitionis mala huc etiam non parum contribuunt.

Incipit enim dentitio fere circa septimum

fert

fect

feti

du

hoc

me

ner

hur

tiu hu

felo

eru

1107

len felo

S. 600. 173

27

is

men-

data ante hanc atatem indies inefficacior redditur. Etenim infantum manus, post menses aliquot, si non prius, à communi involucro liberari solent; & sorte ante semestrem ætatem pedes quoque interdiu, licet noctu Errornu-iterum fascientur. Interdiu ergo saltem membra externa communi hoc fomentu destituuntur. Sæpe etiam errant nutrices, dum infantes debiliores præmature vestibus inture ve- duunt. Perperam quippe numero mensium hibusin tempus vestiendi definiunt, cum potius ex activitate ac robore motus pedum & ma-Quando nuum id æstimare deberent. Ubi enim motus & exercitium istarum partium plus consint exu- ferat ad excitandum & fovendum earum calorem, pulsusque proritandos, quam fotus fasciarum, proculdubio maturum tum tempus est pueros è fasciis liberandi. Poro 3. Post nonum mensem pueri fere varias sorbitiones, prater lac mammarum, admittunt, & ex varia dieta facilius in victus errores labun-

tricum, quæ debiliores infantes præmaduunt. notatur. fasciæ in. tantibus vendx.

mensem, variaque symptomata secum adfert, quæ facile tenella corpora ad hune affectum disponant.

III. Causa cur morbus hic post sesqui- curmorannum atatis inter cunas frequentissime graf- bus hic

fetur, funt;

074

di-

es

em

âu

em de-

un

111=

um

CI

112-

110-

on-

ca.

otus

em-

) 3.

701-

,0

Min-

me.

Will-

-190 201

1110·

1000

IIII

en+

I. Quod recitatæ prius causa propellentes pueros hunc affectum in junioribus, sub hac atate pla- post sefne sublate sint, vel saltem inefficaciter admo- num atadum agant.

2. Dentitionis mala, licet, quoad sympto- dum mata immediata quæ proferunt forte ante cum dihoc tempus evanuerint; ut plurimum ta-fligas. men in partibus primo affectis dispositionem quandam post se relinquunt, quæ clam se in illis occultans, post aliquot menses hunc, morbum proferat. Eruptio vero dentium caninorum five ocularium dictorum hue maxime spectat; cum hi paullo ante sesquiannum ætatis erumpant, eorumque eruptio laboriosissima esse soleat.

3. Accidentia que eveniunt causa ablactationis huc etiam faciunt. Etenim tempus folemne ablactationis non longe antecedit sesquiannum ætatis: atque isto tempore magna mutatio circa diætam, pueris contingit, quam ægre ferre solent. Quippe hinc irascuntur, plorant, cibum præ animi motu aversantur, haud facile placantur, neque satis placide dormiunt. Quæ omnia præviam fal-

tiffime tis ulque ad fecun.

frequen-

faltem difpolitionem ad hunc morbum (licet forte multum postea actuandam) parti-

bus primo affectis facile imprimunt.

Atque ita tandem percurrimus hanc secundam etiam collationem, juniorum nempe puerorum inter se, causasque breviter explicuimus, cur isti pueri sub alia ætate magis, sub alia minus, huic malo exponantur.

Restat adhuc tertia pars quæstionis, quam Anatate grandio- nos reservasse diximus in calcem hujus disquam in putationis examinandam. viz. An forte atate grandiores aliquando (etsi rarisime) in hunc at-

incidant? hunc affectum incidant?

mibus.

Dicimus primo, Quod ad illam partem Affirmaritursub essentiæ hujus morbi attinet, quæ consistit certis li-in intemperie humida, aliqualem differentiam exspectandam esse inter illam intemperiem in junioribus pueris, & grandioribus, juvenibus, viris, maxime senibus. Etenim eadem differentia, quam supra posuimus inter intemperiem humidam juniorum puerorum & fenum, fecundum magis & minus observari potest inter ætates intermedias, magisque ideo cocta ac genuina erit humiditas juniorum, minus seniorum; ut ex eodem ratiocinio, mutatis mutandis, obvium est colligere.

Dicimus 2. Quod ad vitia organica attinet, necessario vasta occurrit differentia innu

cen

die

Tec

ten

gm

bus

CC du

tel

rit

m

ter hujusmodi morbos pueris & grandioribus ætate sorte incidentes. Ossum enim tumores in carpis & talis, ut & illa pectoris acuminatio, nec non capitis ac pectoris improportionate aucta moles, aut multo minus eminenter deprehendentur, vel plane aberunt, præsertim in adultis. Etenim crescente ætate partium sigura & proportio indies consirmatior, stabilior & immobilior redditur; neque sacile contingit unam partem præ altera taminsigniter per veram au-

gmentationem excrescere.

ET

ate

10-

am

11-

tte

175

em

flit

en-

em-

DIE,

nin

THIS

oue.

DUS

25,

ımi-

(80-

num

atti-

11n-

ter

Dicimus 3. Exceptis duabus conditionibus præmissis, idque eo modo, quo proponuntur, posse hunc affectum secundum cœteras ejus essentiæ partes (licet admodum raro, & non nisi gravissimis de causis) grandioribus pueris, juvenibus, viris, & fenibus accidere. Nam 1. Intemperies frigida procul omni dubio iis contingere potest, licet non æque facile ac puerulis. 2. Intemperies humida fimiliter, fed fub limitatione modo proposita. 3. Penuria spirituum insitorum, licet non nisi potentissimis de causis, iis etiam incidere potest. Etenim morbi longi simulque colliquantes habitum partium, aut eum in auras diffipantes, aut longiori inedia & atrophia conficientes, spirituum insitorum inopiani necessario post se reliquunt. Videmus partes

4

exter-

面4

reque

riente

Has in

debil

ta, 1

nequ Dun

fani l

miun

bush

non

puè

nibu

30.0

rato

quo

bilit

nt.

ato

tu

externas etiam in adultis ab ejulinodi causis extenuatas & absumptas enervari, languescere, flaccescere, & omnino sufficienti spirituositate destitui. Concedimus tamen in adultis evicto morbo emaciante, ob vigorem pulsuum cito reparari spiritus absumptos, hujusque morbi posita rudimenta intra unam vel alteram septimanam eradicari, & per consequens rarissime ea in adultis reperiri. Interim si forte contingat, ut absumptis spiritibus insitis impedimentum aliquod interveniat, quod retardet eorundem reparationem, fieri potest, hunc morbum, modo quo dictum est, succrescere. Torpor vero spirituum inopiam necessario consequitur. 4. Partes essentiæ secundariæ cum multum à vitiis primariis dependeant, ubi hæc diutius perseverant (exceptis tantum vitiis organicis) suo ordine supervenire queunt. Adeo ut non dubitemus quin morbus hic datis restrictionibus modo propositis & gravissimis urgentibus causis iisque diu persistentibus, cuivis ætati ultra pueritiam contingere posit.

Historia Apud Anglos morbus quidam senibus morbi a- aliisque extreme debilitatis nonnunquam pud nos accidit, qui huic morbo admodum similis interdum est, si non ejus dem plane speciei, salvis tancontingentis tummodo exceptionibus prædictis, vernahuic pue- cula lingua ita assectos bedridden, quasi dicas ili mor-

lecto affixos vocamus. Hi neque de dolore, bo mulneque alio alia alicujus momenti malo que- tum adfiruntur, nisi quod eorum partes motui inservientes, illæ ipfæ nempe quas primo affectas in hoc morbo vocamus, extreme fint debiles, molles, laxæ, flaccidæ, enervatæ, ita, ut vix sufficiant corporis oneri sustinendo, cum interim ex neque fint paralyticx, neque sensu aut motu penitus destituantur. Dum hi in lecto recumbunt, alacriter quasi sani loquuntur, surgere autem vel incedere neque possunt neque cupiunt. Non minus enim aversantur motum, quam ad eum obeundum inepti sunt. Edunt, bibunt, dormiunt, ferme instar sanorum. Videtur morbus hic multum saltem affinitatis habere (si non sit ejusdem familiæ) cum hoc affectu puerorum.

2-

0-

inc

re.

no

12

nt,

211-

nire

01-

oli-

diu

1200

DIIS

1211

milis

tan-

1772-

C25

(Ho

Porro testatur aliquis nostrum se sub ma- observa nibus habuisse curandum virum generosum tio Tri-30 circiter annos natum, qui ex immode- morbo rato vini & Tabaci usu quotidie sere per ali- huicperquot annos continuato, neglecta debita quam sicibi assumptione, in eam ventriculi de-borantis. bilitatem incidit, ut quotidie mane vomuerit, omnemque plane cibum aversatus sit, atque ubi eum invitus admitteret, vomitu rejecerit. Coactus tandem est pro sedanda ventriculi irritatione, ad quotidianum aquæ vitæ vulgaris ulum confugere: poltez

脏,

patton patton

E10(0)

tis 31

114111.

nign

bus !

valu

obar

defa

ftea !

paffu

èdi

pum

mus,

ven

man

agin vien

print five

tum

nife

part

eart

dita

evir

torp

postea autem ex hac & cerevisia lupulata veteri; adjecto saccharo, confecit sibi potum, quo solo per tres ferme menses vitam sustinuit. Interim omnes partes quas in hoc morbo primo affectas vocamus, extrema macie conficiebantur, simulque molles, laxæ, flaccidæ & languidæ reddebantur, adeo ut neque se in lecto vertere, neque surgere, neque incedere, auterectus stare potuerit; nullus tamen comitatus est dolor, neque ulla aut sensus aut motus privatio, non tulsis, non respiratio difficilis. Facies partelque circa caput floridæ, bene habitæ, beneque coloratæ conspiciebantur, ut ex solo vultus intuitu vix suspicareris hominem ægrotasse. In lecto decumbens sedate cum sociis fabulabatur, per vices peti fumum exsugens, potumque prædictum ebibens. Eventus morbi non quidem ad hunc locum pertinet; breviter tamen in eorum gratiam, qui eum scire expetunt, annectimus. Medicus advocatus, interdicta intemperantia, & præter alia remedia, exhibito præcipue gr. 13. Laudani Londinensis, compescuit nauseam, tum ventriculi tumultum, quam partem etiam internis tum externis roboravit; cibum probum facilisque coctionis præscripsit. Loco exercitii frictionibus matutinis calorem ad externas partes folicitavit, porrecta prius exigua quantitate elect.

rolata

po-

Itam

hoc

rema s, la-

adeo

rgere, merit;

neque

n tul-

artef-

e,be-

x folo

m 2-

cum

mum

bens.

ocum

gra-

mus.

eran-

prz-

mpe-

tum,

termis

octio-

onibus

s foli-

titate

clett.

elect, roborantis & aperientis cum tantilla portione chalybis consecti, & propinatis zij vini absynthio & mentha conditi, & cum croco in nodulo suspenso parum tincti, immixtis Ziij cerevisia tenuoris adjecto sacch. ad gratiam. Porro purgatus est per intervalla benignis medicamentis, & vesperi cordialibus refectus. Intra 20 dies in tantum convaluit, ut foras prodire, per horæ spatium obambulare, fcalas cum ascendere, tum descendere sine sustentaculo valuerit. Postea vero à simili intemperantia recidivam passus, absente medico defunctus est. Sed è diverticulo redeamns in viam, & ad scopum propositum fermonem nostrum dirigamus. Affectus ipfe jam confirmatus, qualis erat, cum medicus advocaretur, præter ventriculi mala, vifus est includere maximam partem essentiæ hujus morbi, de quo agimus. Etenim in partibus motui infervientibus, iis nempe quæ in hoc morbo primo affectæ sunt, intemperies frigida, five ob defectum motus, five ob imminutum vitalis sanguinis affluxum, tactu manifeste deprehendebatur. Deinde in iisdem partibus intemperiem humidam ostendebat earum mollities, lubricitas, laxitas, flacciditas. Inopiam spirituum insitorum satis evincebat extrema istarum partium macies, torporem ineptitudo ad motum, & affectatio

tio quietis. Inæqualem fanguinis distributionem arguebat habitus plenior & sloridior partium circa caput, dum cæteræ partes essent extenuatæ. Peculiaris autem causa hujus inæqualitatis in hoc ægro potuerit suisse frequens vomitio, qua uberior sanguinis assuus ad partes circa caput concitatus suit, cæteris eo propemodum destitutis.

Ex jam dictis facile est cuivis perspicere maximam saltem partem essentiæ hujus morbi in memorato affectu conclusam suisse. Unde tandem probabiliter inferre licet, possibile esse hunc affectum adultis etiam sub propositis limitationibus accidere; licet is rarissime in illas occurrat, quod gravissimas causas per longum tempus superstite vita continuatas ad sui introductionem postulet. Atque ita demum disquisitioni super hac priori quæstione terminum imponimus.

CAP.

Cur

bu

quenti

et. A

eafreq

vari p

bis no

gionib

DIN III

is traci

e mon

TEL PYO

臨

CAP. XIX.

DIJ4

ori-

21-

16.

011-

cere

ins ins

e li-

altis

ide-

uod

fu-

Sio-

uifi:

Quæstio posterior.

Cur in Anglia frequentius hic morbus occurrat, quam in aliis regionibus? &, An sit Anglis vernaculus.

Ari morbos Endemios sive vernaculos & patrios, qui nempe certæ alicujus regionis incolas ob communem causam, frequentius, quam aliorum locorum incolas infestent, communi medicorum consensu est. At cum relatio regionis ad morbos in ea frequentius grassantes diversimoda observari possit; & cum viri etiam cordati morbis nonnullis denominationem à certis regionibus improprie adscripserint; denique cum illi, qui hactenus de morbis vernaculis tractarunt, omnes morbos in quavis regione frequentiores indiscrimination (ac si de morbi vernaculi natura ex æquo participarent) vernaculos nuncuparint ; operæ pretium duximus nonnulla de horum morborum inter se differentiis præsenti disquisitione præmittere.

I. Ergo, morbi à regione denominantur vel proprie, vel minus proprie & abusive, vernaculi.

Morbi Morbi proprie vernaculi dicti 4 condi-

poterat

propria

İV.

aliqueno

MINISTER .

loci, qu

(apius

adventi

et, I

minet.

dam &

forte at

produce

quot vig

vernacu

dicendu

ca, tum

nibus re

proprie

cum car

fiftente

tem no

præfent

Mor

proprie

quentiu

n aliis

neterer

tiones, ut sie dicantur, postulant. conditiones, ut

I. Conditio est, ut sit morbus frequentior in illa regione, cui attribuitur ut vernaculus, vernacu- quam in ulla alia regione, cui non attribuitur ut talis. Etenim morbus vernaculus perpe tuo supponitur diversas regiones inæqualiter respicere; unamque magis (illam nempe cui adscribitur) aliam vero minus infestare.

> II. Est, ut dependeat morbus ab aliquali loci inclementia. Morbus enim proprie vernaculus quoddam crimen & vitium ipli loco imputat. Quando ergo locus ipse peculiaris cujuldam vitii non reus est, improprie certe, immo falso, atque injuste stigma tale ei inuritur.

Quatuor

morbi

dicantur

III. Conditio, ut regionis inclementia tanta sit, ut etiam cautiores eosque qui debitum sanitatis regimen locoque appropriatum diligenter observant, afficiat. Certis quippe regionibus peculiare quid in sanitatis regimine debetur. Ubi ergo populus, posthabita ejusinodi peculiari loci observatione, ex errore in 6 rerum non-naturalium usu, in morbum aliquem epidemicum inciderit, non is pro Endemio seu vernaculo habendus est, sed errori, imprudentiæ, aut incogitantiæ & negligentiæ incolarum adscribendus est. Morbus enim hic, quena supponimus, præcaveri potepoterat, modo regimen fanitatis loco ap-

propriatum fuisset rite observatum.

w, pe

am

000

lipe-

ote-

IV. Est, ut vitiosa ista regionis constitutio aliquandiu permanens & durabilis sit, aut ad minimum frequenter recurrens. Vitium enim loci, quod fugax est, neque diu durat, nec sæpius recurrit, ut extraneum quid & mere adventitium respectu regionis habendum est, ut morbum patrium proprie non denominet. Exempli causa, Si perniciosa quædam & infolita aura ex aliis regionibus huc forte afflaretur, morbumque communem produceret, eaque non ultra menses aliquot vigeret; certe morbus ille non proprie vernaculus, at fortuitus casuque eveniens dicendus esset. Quapropter Febris Ungarica, tum sudor Anglicus, licet ab istis regionibus respective nomen sortiti sint, minus proprie jam saltem vernaculi nuncupantur, cum careant durabili fomite in istis locis perfistente, & cum vel plane cessarint, vel saltem non magis hic aut illic, quam alibi impræsentiarum dominentur.

Morbi improprie vernaculi includunt qui quidem primam conditionem propositam morbi proprie sic dictorum? scilicet, Quod fre-prie diquentius in regione, cui adscribuntur, quam cantur in aliis occurrunt: (alias enim ne improprie quidem venaculorum appellationem mererentur.) Carent tamen 2. 3. vel 4. Vel

enim

pendeat

Mort

vicinam

bum Ga

vernacu

bum No

his fatis

Mort

MINE.

inhabita

neris for

Febris !

cant, I

celus par

Polos.

Mor

vus is el

fam de

ef. N

tio regio

BITATOR

NOV.atio

MEONOT

CALATHIN

enim carent fomite in regione radicata; vel tro hom fomes, quem habent, admodum debilis est, & inconsiderabilis, quique ex regimine diætæ loco appropriato superari potest; vel denique fomes non permanens & duraex pravi bilis est, neque frequenter recurrit. Per fomitem autem hic intelligimus aliquid redum A spectu sanitatis culpabile in ipsius regionis conditione fundatum. Quando ergo morbus aliquis communis & frequens oritur ex in Near abusu alcujus commoditatis regionis, ut si gens aliqua propter uberiorem frugum vel fructuum proventum similemve fertilitatem regionis, vel propter diuturnam ac feoriginali ram pacem intemperantiæ, socordiæ, aliisve vitiis se addiceret, indeque morbum aliquem communem incurreret, morbus is non proprie venaculus cenfendus est: Occasio enim istius morbi, quam suppeditavit patria, in se laudabile quid est, ideoque quodeunque ejus abusu accidit non patriæ, alt soli incolarum errori jure imputandum est. Similiter, si fomes morbi sit culpabilis, neque tamen is in ipsa constitutione regionis fundetur, verum in aliqua hominum actione, ut quando ex clade belli inhumata cadavera putredine sua aërem inquinant, indeque morbum Epidemicum producunt, non est hic morbus vernaculus dicendus cum ab arbitrio hominum, non proprio loci vitio, de-

pendeat.

elt, lize vel ura-Per

re-onis

ut li vel

lita-c fe-aliif-bum

ppe-eft; cidit jure

nor-ipía m,in

o ex redi-

mor-Ahic arbi-

trie

Morbus etiam nonnunquam per calumniam & abusive genti vel loco adscribitur, ex pravo & malevolo animo alicujus gentis vicinam defamare cupientis. In hunc modum Neapoliteni Luem Veneream morbum Gallicum vocant, quasi is Gallis effet vernaculus; è contra Galli calumniam illam in Neapolitanos retorquent, & eum morbum Neapolitanum nuncupant. Verum de his fatis.

Morbus proprie dictus vernaculus, vel Morbus originalis est & antiquus, vel adventitius & proprie novus Originalis is est, qui, prima loci vernacuinhabitatione; incolas infestavit : hujus ge- lus duneris forte est Bronchocele apud Alpinos:

Elt. Febris illa ardens, quam Calenturam vocant, sub Zona torrida; mortificatio sive sphacelus partium à frigore sub Zonis frigidis versus Polos.

Morbus vernaculus adventitius seu no- vernavus is est, qui ob communem aliquam cau- culus adfam de novo regioni supervenit. Hic triplex feu noest. Nam, vel provenit ab originali aliquo vi- vus rurtio regionis, tractu temporis, in incolarum sa- film trinitatem pravalente; vel ab alteratione seu innovatione aliqua ipsi Regioni accidente, vel ab incongruitate loci cum complexione novorum incolarum.

potest s

conftitu

corum a

quarum

ous vel

rum,

neraliu

fiderun

3. 1

potelt:

comple

accidun

de in ali

tutiones

admodu

cedunt,

nhabita

pochon

ibi in

wrabani

kcile.

Por

good al

regionis

netis vi

gore in

dinion

incleme

is gene

nos occ

1. Morbus vernaculus novus regioni fupervenit ab originali aliquo vitio, tractu temporis, prævalente. Fieri enim potest, ut firmiora corpora primorum incolarum alicujus loci influxui regionis valide infalubri resistant, & morbi vernaculi invasionem per multa fecula repellant, licet postea progenies illorum, traccu temporis, paullatim immutata in ista peculiari ratione complexionis, qua ante resistebant, in morbum aliquem vernaculum demum labantur. Etenim plica Polonica Sarmatis & Polonis, scorbutus incolis littoris maris Baltici morbi funt vernaculi, iidemque morbi novisunt, (ut omnes fatentur) veteribus plane incogniti. Jam vero nondum constat ullam notabilem aut insignem immutationem vel innovationem, istis regionibus accidisse ante illorum morborum eruptionem, cui possis novi morbi originem probabiliter adscribere. Quare dicendum potius videtur novos istos morbos ab antiquo & originali locorum vitio profluxisse, non tamen eos prius exortos ob peculiarem vim primorum incolarum iis resistendi. Nam & in hunc usque diem nonnullas familias in prædictis locis ab istis morbis immunes, regionumque injuriæ nec dum cedentes, perseverare credibile est.

2. Morbus vernaculus novus provenire potest

potest ab immutata vel innovata regionis constitutione. Hujusmodi innovationes locorum accidunt, aut ab inundationibus aquarum, aut terræ motibus, aut eruptionibus vel novarum scaturiginum pernitiofarum, vel novarum exhalationum forte mineralium è cavernis terræ, à maligno aliquo fiderum aspectu, similibusque causis.

100

MI-

Po-

orbi

bus

nu-

um

nti-

am

3. Morbus novus vernaculus provenire potest ab incongruitate loci cum incolarum complexione. Hujusmodi morbi maxime accidunt gentibus, quando ab una regione in aliam migrant, præsertim ubi constitutiones regionum, in quas seconferunt, admodum diversæ sunt abiis, à quibus recedunt. Sic Angli qui primum Virginiam inhabitarunt, tumore Abdominis & Hypochondriorum frequenter affligebantur; qui ubi in Angliam redierunt, haud difficulter curabantur: ast illic permanentes, non æque facile.

Porro morbi vernaculi inter se differunt, Alia quod alii ex toto dependeant ab inclementia vernacua regionis, alii ex parte tantum. Prioris ge-differenneris videtur sphacelus membrorum à frigore in septentrionalibus tractibus Polo vicinioribus: integra quippe morbi essentia inclementiæ loci adscribi potest. Posterioris generis videtur Lues venerea apud Indos occidentales. Putatur enim illic con-

trahi partim ex impuro concubitu, partim ex peculiari infalubritate loci. Similiter in Hybernia dominatur dysenteria, quæ partim dependet à constitutione loci, partim ab erroribus diætæ. Atque hæc in genere de morborum vernaculorum differentiis dicta fint. Proxime jam inquirendum, Cur in Anglia frequentius quam in aliis regionibus morbus hic occurrat? & obiter notandum an, & quatenus idem sit Anglia vernaculus ?

Anglia tempemida.

I. Sciendum est Angliam esse insulam, & nonnihil humiditatis à vicinia maris, tum da & hu- frigiditatem à distantia abæquatore mutuare; deinde eam innumeris prope fontibus ubivis fere locorum scaturientibus abundare; denique multis pluviis iisque frequentioribus quam plerasque alias regiones irrigari: Quæ omnia frigiditatem atque humiditatem loci satis attestantur. Cum ergo intemperies frigida & humida sit pars essentiæ hujus morbi, facile inferre licet corpora incolarum magis hic ad istas intemperies inclinari quam in aliis regionibus calidioribus & ficcioribus.

Si ergo quæras, an hic morbus, ex hac An, & quatenus saltem sui parte recte dicatur Anglis vernahic morculus ?

busdici Respondemus, eun quodammodo sic dici poliit vernacu- posse (licet forte non proprie) eatenus nimirum, quatenus aliis regionibus pariter

加拉一

hmidis observet ter. Sic disposita tempen ipla An

periem effentiz fe folam omnem

иняс п conceda miditati tamen

effe Ang Porto respectu Angha dia, Ze

quibus t ter grall non rec DIS VIE

nempe que An fam, o

Ad ha non eo

extra

humidis ac frigidis (etsi in iis forte nondum observetur) idem, ut vernaculus attribuitur. Siquidem illæ regiones etiam, æque dispositæ sunt ad frigidam & humidam inremperiem suis incolis imprimendam ac ipfa Anglia. Notandum autem est intemperiem frigidam & humidam esse partem essentiæ hujus morbi communem, & per fe solam eundem non specificare, neque omnem intemperiem frigidam & humidam hunc morbum inferre. Quapropter licet concedamus excessium frigiditatis, & humiditatis Angliæ vitio verti posse, negamus tamen inde recte inferri morbum integrum effe Anglis vernaculum.

en- Porro reperiantur forte regiones, qua, respectu tum frigiditatis, tum humiditatis Angliam longe excedant, ut Scotia, Hollandia, Zelandia, Hybernia, Dania, similesque, in quibus tamen nondum hic morbus frequenter grassari notatus est; si ergo hic morbus non recte imputetur his regionibus, in quibus viget communis illa causa, excessus nempe frigiditatis & humiditatis, certe neque Angliæ propter istam communem caufam, quæ hic levior est, jure imputetur. Ad hæc, frigiditas & humiditas Angliæ non eo usque à mediocritate recedunt, quin extra admotis, intus assumptis, exercitis ante & similibus, recto nempeusu 6 rerum nonmaturanaturalium fatis superque corrigantur, quo minus hæc imputatio ei altius inuratur. Quapropter si hæc ita se habeant, si nimirum intemperies frigida & humida fint tantum communis pars morbi, si aliæ regiones, in quibus nondum viget morbus, fint ad minimum æque obnoxiæ frigiditati & humiditati, si denique ista intemperies regimine diæræ loco appropriato præcaveri possint, certe ratio ab humiditate & frigiditate climatis desumpta, quam modo reddidimus, cur Angli frequentius hoc morbo tententur præ aliis, valde manca & insufficiens erit, ut nobis in hac sola acquiescere minime liceat; ideoque nihil aliud illam affignando voluimus, quam Angliam hine magis disponere incolarum corpora ad hunc affectum, quam calidiores ac sicciores regiones suorum incolarum corpora. Atque adeo ad alias hujus frequentiæ causas inveitigandas procedimus.

II. Loco annotare possumus Angliam esse admodum proliferam, & tum conceptiopolitera, ni tum gestationi satis savere, neque abortibus ita obnoxiam. Hinc autem evenit, ut non tantum viri robustiores validioresque, & integra sanitate præditi, sed & languidiores, debiliores, ac valetudinarii generent fæminæ que infirmæ, cachecticæ, czeochymicæ, immo & in Tabem pronæ

con-

concipiar legitimes

dum eft

quique 1

fuam det

nusque

ne prot

benigni

infirmit

Quema

inhuma

tulos,

phis fub

gore up

los, qu

fuccum

gens at

robust

mentu

cum 1

quand

flatam

quis ta

hac re

nos al

latost

altern

lem

rente bo f

concipiant, ad nonum mensem gestent, legitimeque pariant. Minime autem mirandum est, si fœtus è tali seminio genitus, quique soli fere clementiæ loci vitalitatem fuam debet, minus vegetus & vigens, minusque nervosus, & in hunc affectum plane pronus in lucem edatur. Etenim ipfa benignitas regionis hocrespectu nonnullius infirmitatis in genere occasio esse potest. Quemadmodum enim barbari olim populi inhumaniter tractando recens natos infantulos, eos nempe nudos præ gelidis lymphis sub dio immergendo, infirmiores frigore ipso enecarunt, robustiores vero solos, qui injuriæ ejusmodi tractationis non succumbebant, educarunt, unde universa gens ab ista inhumanitate valida tandem ac robusta evasit; ita quoque è contra ipsa clementia loci infirmiores fcetus promiscue una cum robustioribus præservando mixtam quandam gentem ex infirmis & validis conflatam proferendi occasionem ministrat. Ne quis tamen erret, non volumus omnes in hac regione pueros in hunc affectum pronos ab infirmis parentibus & valetudinariis satos fuisse. Licet enim parens uterque vel alteruter infirmus ut plurimum similem prolem edat, frequenter tamen videmus parentes satis validos etiam prolem huic morbo facile obnoxiam generare. Quare nee-

ie-

am

ad

res

At-

in-

2m

tio-

nor nit , ref-

20-

82,

0114

dum in hac secunda caussa acquiescimus, sed alia adhuc adinvenienda est, à qua sufficiens ratio frequentiæ hujus morbi apud nos deri-

vari poffit.

TOWN

Diuturna pax occasio eit effœnis corporum incolarum.

III. Ergo loco dicimus frequentiam hujus morbi in Anglia multum fuisse promotam à diuturna ac secura pace regionis priminatio main ejus eruptionem præcedente. Per hanc enim ditiores familiæ, quas primas hic morbus infestavit, & adhuc præ aliis infestat, otio seac delicatiori molliorique vitæ generi addixerant, indeque in constitutionem humidiorem, laxiorem, molliorem, effæminatam, & ab excrementitiis humoribus minus perpurgatam inciderant, adeoque liberos huic morbo facile obnoxios procrearant. Dicas, Scotiam ac septentrionales partes Angliæ ipsius, licet pari pace & securitate potitæ suerint, non pariter tamen, immo rarissime hoc affectu affligi obiervatas.

> Respondemus, revera Scotiam & septentrionales partes Angliæ quam australes & occidentales rarius ac mitius hoc morbo affici. Interim forte prima ejusdem vestigia & quasi rudimenta longe frequentiora sunt etiam in locis dictis, immo & nonnullis exteris regionibus, quibus vix dum morbus notus est, quam vulgo creditur. Etenim licet hic morbus australibus & occidentalibus

> > An-

Anglia

vulgoo

licet pt

que pa

conqu

immo

calon

fanato

corun

Cilius

teant

quos I

opem

fpicar

rem e

tum ir

mmo

bus h

CIS II

m me

Isemi

cerfer

los)

Utour

videm

cur A

VIUS

Scoti

Pax (

Angliæ, tractibus admodum familiaris sit, vulgoque satis notus, sæpe tamen videre licet pueros eo leviter affectos, de quibus neque parentes, neque alii ejus dem familiæ vel conqueruntur, vel quid mali suspicantur: immo multos novimus folo beneficio aucti caloris sive incremento ætatis sive exercitiis sanatos absque ope medica, quos nemo amicorum affectos putaverat. Quanto ergo facilius prima rudimenta hujus morbi illos lateant, quibus minus familiaris est, & apud quos rariffime ad eum gradum ascendit, ut opem medicam opus habeat implorare. Su- Morbus spicamur ergo hunc affectum frequentio- hiclonrem esse quam credi solet, tum in Scotia tiusque tum in septentrionalibus Angliæ partibus, extendiimmo & in nonnullis regionibus, in qui-vulgo bus hactenus ignoratur; verum in iis lo-credi focis mitius & remissiori gradu affligere, ut in medicorum manus non facile deveniat. Is enim mos vulgi est, medicum non accersere (præsertim ad infantes & puerulos) nisi morbus satis vehementer urgeat. Utcunque se res habeat, nondum quidem videmur satisfecisse propositæ objectioni, cur Angli occidentales & australes gravius & frequentius septentrionalibus & Scotis cum hoc morbo conflictentur, etsi pax & securitas utrique regioni par fuerit. Concedimus ergo ulteriorem adhue ratiorationem hujus differentiæ succenturiandam esse.

Australes IV. Itaque & ultimo dicimus hujus dif& occidentales
Angliz norum in australibus hisce & occidentalibus Anpartes glie partibus. Est enim hæc pars Angliæ
multo
funt fermulto florentissima opulentissima, feracissitiliores ma, voluptatis omnimodæ illecebris instruac opulentiores
quamse-minum vivendigenus mollescere, vires laptentiobescere, corporis robur & tonus exsolvi
nales.

cœperit. Versus septentrionem durius vi-

vitur, frequentius exercitium corporis obitur, luxui & voluptatibus minus indulgeMolior tur. Jam vero quod mollior ac delication
viteravite ravite ratio, tractu temporis, familias eneruo tractu

temporis vet, satis superque nobis historiæ testantur, familias ut alia probatione opus non sit. Observare solet. enim licet nobilissimas generosissimasque

familias ob hanc ipsam causam serius aut citius degenerasse, aut etiam extinctas suisse, eoque citius quo magis aversatæ suerint labores & mascula exercitia, seque mollitiei, otio, susibusque sæmininis addixerint. Neque unquam in majori periculo degenera-

tionis familiæ versantur, quam ubi bonis omnibus affluunt, & ob copiam securitatem-

que parentes ad mollitiem, otium, vitamque effreminatam, procul omni labore, cura,

effœminatam, procul omni labore, cura, & solicitudine, quam maxime invitantur.

Quis

Quis tion S

Reho

Innu

cum

yide

quet

atqu

aultr

valifi

næc

Ang

OTH

culpa

triam

Imp

atur

amo

Quis opulentior, securior, aut esfæminatior Solomone? filium hic post se reliquit Rehoboam degenerem. Henerici octavilinea extincta forte est ob similem causam. Innumera prope exempla in hanc rem accumulare, si opus esset liceret. Ut ut sit, videmus hunc morbum ditiores familias frequentius & gravius affligere quam pauperes; quare neque mirandum eum ditiores atque amœniores quoque partes Angliæ, australes nempe & occidentales prius invasisse quam septentrionales. Sed de hac re hæc dicta sufficiant. Restat tantum inquiramus an & quosque tres ultimo assignatæ causæ respiciant denominationem morbi vernaculi, & an propter illas morbus hic Angliæ attribui possit ut vernaculus.

Sciendum igitur est tres hasce causas in Morbus quantum à regione dependent, non esse hic non causas per se, neque ex natura sua mor- dicipobum hunc producere; verum esse tantum test Anoccasiones ob quas per accidens morbus hic naculus, oriri possit. Per se enim laudabiles regionis conditiones denotant, tantum quid culpandum in ea inferant. Quis enim patriam suam criminari possit, quod ea procreationi liberorum faveat, multo minus id improbare, quod longa securaque pace fruatur : denique minime omnium accusare amœnitatem regionis, fertilitatem, bonorumque

ue

uis

rumque omnium affluentiam. Hæ enim omnes ex se benedictiones sunt, conditionesque patriæ exoptandæ. Cum ergo supra monuerimus morbum proprie vernaculum notam aliquam constitutionis vitiosæ loco, cui adscribitur, inurere; fieri non potelt, ut propter regionis commoditatem, ei morbus aliquis, ut proprie vernaculus, attribuatur. Quapropter (ut verbo, quæ dicta funt fusius, complectamur) licet hic morbus ex parte frigiditatis & humiditatis fomitem in ipsa regionis constitutione habeat; licet etiam tres alias occasiones invadendi à regione mutuet, cum tamen, per debitam observationem regiminis sanitatis, loco appropriati, intemperies ista pracaveri posfint; & cum tres reliquæ occasionalis caufæ per se minime culpabiles ast exoptabiles fint, morbum hunc non esse proprie Angliæ vernaculum dicendum est. Atque ita finem imposuimus disquisitioni nostræ de causis hujus morbi.

Lorder & mentalling Laimoigouman CAP. 5

prad

ne at

3. R

coin

sept

CAP. XX.

Differentiæ morbi Rachitidis.

Plures sunt hujus morbi differentia ob variorum malorum concursum, quam quis facile putaret; quarum aliæ majoris, aliæ funt minoris notæ. Præcipuas hic breviter proponere decrevimus. Earum enim cognitio non modo ad figna prognostica definienda utilis est, quo varii morbi eventus distincte; secundum illas differentias. prædicentur; sed & insuper ea conducis tam ad paæcautionem, quam ad curationem morbi, viz. ut ex earum consideratione apposita & proportionata præsidia eligantur.

Desumuntur autem hæ differentiæ vel ab Divisio ipsa essentia morbi, vel ab ejus causis, vel deni-tiarum. que ab aliis morbis cum eo complicatis. Morbi essentia diversimode variare potest. Viz.

1. Ratione partium essentia secundaria prasentium vel absentium. 2. Ratione magnitudinis.

3. Ratione vehementia. 4. Ratione virium.

5. Ratione temporum.

Concedimus equidem nonnullas differentias hisce titulis subjectas aliquo modo coincidere: cum tamen formales earum conseptus distincti sint, diversas certe meren-

tur considerationes. Licet enim morbus eo ipso etiam respectu dicatur major, quod plures essentiæ secundariæ partes in eodem ægroto complectatur; diversa tamen & distincta est hæc consideratio ab illa magnitudinis. Etenim magnitudo proprie respicit gradum recessus à naturali statu, non naturam partis essentiæ præsentis vel absentis. Hinc quippe differentia plusquam gradualis resultat. Similiter nonnullæ reliquarum differentiarum idem forsan in concreto significant; at vero in abstracto & formaliter diversum quid & separatæ considerationis designant. Sed pergamus.

K. Diff

1. Differentia hujus morbi illa est, quæ oritur à præsentia plurium vel pauciorum partium essentiæ secundariæ ejusdem. Etenim licet omnes partes estentiæ primariæ perpetuo adfint præsente ipso morbo, non tamen necesse est omnes partes secundariæ essentiæ semper adesse. Siquidem hæ accessoriæ sunt essentiæ primæ, eique paullatim fuperveniunt: immo nonnullæ earum intervenientibus causis impedientibus ita plane intercipi possunt, ut omnino non appareant. Huc referas illam differentiam, quam in calce præcedentis disputationis proposuimus, quamque adultis possibile esse accidere, etsi rarissime, demonstravimus. Verum cum nostrum institutum sit de morbo, rit har

prater

tingit

dariæ

etiam

caulz

prior

poris

fimul

aliz a

Quz

enim

rabile

Par

partiu

equal

influx

tia sec

hach

JUS II

quoqu

percip

non

maria

quen

qua puerili, hic tantum tractare, suffecerit hanc disserentiam sic obiter notatam præterire. Sed & in ipsis etiam pueris contingit aliquando nonnullas essentiæ secundariæ partes, quæ cum essentiæ primaria etiam conjunctissimæ sunt, saltem ordine naturæ succedere. Primaria enim essentiæ causæ vicem sustinet, quæ semper natura prior est causato. Veruntamen ordine temporis nonnullæ partes essentiæ secundariæ simul quasi cum essentia primaria invadunt, aliæ autem tractu temporis superveniunt. Quæ hoc loco veniunt distinguendæ. Illæ enim plane inseparabiles sunt hæ vero separabiles ab hoc morbo.

Partes essentia secundaria inseparabiles reduci possunt ad hac capita. 1. Ad Tonum partium primo affectarum vitiatum. 2. Ad inaqualem & impersectam distributionem vitalis insluxus in partibus primo affectis. 4. Ad vitia secundaria constitutionis animalis. Vitia hac superius, ubi de essentia secundaria hujus morbi, egimus, satis explicantur; ubi quoque, propter arctam eorum connexionem cum essentia primaria, quivis facile percipere potest ea simul tempore (licet non sine causali dependentia ab essentia primaria) incipere.

Verum Organica vitia omnia supra quoque memorata, separabilia & nonnunquam actu separata ab hoc morbo deprehenduntur. Etenim magnitudo Capitis, macies artuum, iucurvationes sive Tibiæ sive ulnæ, inflexiones articulorum, pectoris angustia; non ftatim ab initio hunc affectum necessario concomitantur, sed tractu temporis paullatim morbo succrescunt. Et licet anoγοτεοφία partium, quæ quodammodo in jam dicta vitia influit, levissimo gradu dici possit adesse ab initio morbi; illa tamen ipsa ex se tantum symptoma est, & non morbus, neque mox à principio istos morbos magnitudinis, figuræ, & situs producere valet. Porro non necesse est, ut simul; & ex æquo vitia hæc organica Rachitide laborantem invadant. Concedimus quidem extenuationem partium 1. affectarum, ubi morbus aliquandiu durat, semper & necesfario ei succedere, neque postmodum perseverante morbo amoveri posse; esse præterea partem principem inter partes esfentiæ secundariæ separabiles; immo extenuationem fientem immediate consequi imminutam nutritionem partium primo affectarum, haud aliter ac imminuta nutritio fequitur immediate primam essentiam morbi in dictis partibus; Interim dicimus extenuationem factam, quæ secundaria morbi pars ipsa est, de qua loquimur, necessario præsupponere morbi motum ac tempus, atque

111

in pri

ttere !

in pa

nond

que

1110

91100

ctaru

liqua

ierva

para

ven

tione

Ctor

in primo momento existentiæ morbi exis stere non posse. Dicimus insuper medicos non agnoscere ullam mutationem factam in partibus sensui expositis, quæ sensui nondum compareat, & per consequens neque extenuationem factam in partibus primo affectis, donec ea sensibus obvia fiat, quod certe durationem aliqualem morbi necessario præ requirit. Improportionata vero Capitis magnitudo, simul fere incipit cum ista extenuatione partium primo affectarum; verum fieri potest, si Phthisis colliquativa cum hoc morbo forte complicetur, ut ejulmodi magnitudo capitis ante obitum evanescat, quemadmodum supra in observationibus Anatomicis exemplo uno probavimus. Magnitudo ergo capitis magis separabilis estjab hoc affectu quam extenuatio partium primo affectarum: hæc quippe amoveri non potest absque ipsius morbi curatione. Ossium protuberantiæ nunc citius nunc serius apparent, modoque magis, modo minus intra æquale tempus excrescunt: diu vero perseverante morbo rarissime (si unquam) abesse cernuntur. Angustia pectoris non, nisi post longum tempus, confirmato jam morbo, supervenit, & Phthiseos ferme prodromus est. Tandem curvitas Tibiæ & Ulnæ, ut & inflexio Articulorum, tum abesse potest per totum morbi decurlum,

IS

cursum, tum secundum magis & minus adesse, atque inter ea, quæ hunc morbum sequuntur, maxime est fortuitum. Concludimus ergo partes hasce organicas essentiæ secundariæ separabiles esse isto modo, quo jam diximus, & prout plures vel pauciores adfunt, morbi differentiam constitui, qua alius magis, alius minus est compositus.

2. Differentia hujus morbi desumitur à magnitu- magnitudine ejusdem. Magnitudo æstimatur ex majori vel minori ejus recessu à naturali statu. Vasta quidem occurrit differentia morbi hujus respectu magnitudinis. Alii enim adeo leviter eo afficiuntur, ut vix diceres eos omnino ægrotare: de nulla re queruntur; edunt, bibunt, dormiunt sanorum similes; tantum ludunt segnius, & nonnulla alia leviora morbi stigmata gerunt. Et solo sere naturæ beneficio absque arte convalescunt, neque parentes, nutrices, aut adstantes facile sibi persuaderi patiuntur eos hoc morbo detentos fuisse. E contra, alii tam atrociter affliguntur, ut etiam optimis præsidiis ab imminentis mortis periculo vindicari non possint.

3. Differentia est à morbi vehementia, 3. Diffe-Hæc autem æstimatur ex violentia motus morrentia à vehebi, & natura renitentia, tum ex magnitumentia. dine pugna harum inter se. Morbus licet alias

fatis

fatis II

VIXQUE

conjun

gnam

aliqua

elt;

Pueri

MATHYA

menti

Vitas, talis &

prout

ram le

morb

caula

rant,

Atqu

creto

quid

nece

Dun

ftatu

dico

satis magnus sit, tardi tamen motus est, vixque, nisi febris aliusve morbus urgens conjungatur, naturam ad violentiorem pugnam proritat. Utcunque tamen motus ejus aliquando concitatior, aliquando fegnior elt; unde morbus qualemcunque differentiam mutuatur.

4. Differentia est à viribus Infantis vel 4. Diffe-Pueri ægrotantis. Hæ æstimantur ex majore viribus, vel minore prasentia eorum qua sunt secundum naturam. Huc spectat conditio temperamenti, spirituum insitorum copia, & activitas, firmitas toni, vigor constitutionis vitalis & animalis organorum structura. Nam prout hæc magis vel minus fecundum naturam se habent, ita robustiores vel minus robustæ æstimandæ sunt vires, & sec. eas morbus vel periculofior vel minus periculosus judicandus est. Juniores pueri ob hanc causam cæteris paribus periculosius laborant, quam seniores.

5. Differentia est à morbitemporibus. Differen-Atque hæe differentia quodammodo in con-tia à creto includit omnes præcedentes. Quic-Tempoquid enim differentiæ cuivis morbo accidit, necesse est id in aliquo morbi tempore accidere. Quatuor morbi Tempora à Medicis numerari solent; Principium, augmentum, status, & declinatio. Sciendum vero est Medicos paullo crassius in temporibus rerum

dimus

Calater

14, PK

clinat

teritu

tum

ulque

gmen

atque

dius t

julmo

guere

Gira,

gmen

ASON

1836 ilto

tum

grich

dens,

mort

1ta 0

fint

2113

distinguendis procedere , quam Philosophos. Non enim restringunt principium morbi ad id punctum temporis, quo morbus incipit; sed extendunt id eo, quousque tanta alteratio morbi accidit, quanta certis ac sensui manifestis indiciis dignoscatura Etenim principium indivisibile non est tempus, quo actio medica perficiatur. Et quorsum utilis esset ea morbi temporum distinctio quæ in nulla ejus alteratione nobis nota fundaretur?

Appro-Vilionis Tempomoib. Galeni.

Recte ergo Galenus tempora febrium & batio di- inflammationum ex cognoscibili earum alteratione deduxit: principium nempe à cruiditate materiæ morbificæ; augmentum à manifesta ejusdem coctione; statum ab excretione; declinationem à reductione reliquiarum ad naturalem statum computavit. Atque hæc quidem tempora à cruditate & coccione, &c. discriminata febribus & in-Ziusdem flammationibus apprime quadrant. Verum distinctio hæc temporum in multis aliis morbis non æque feliciter succedit.

defectus

Natura enim in his non ita regulariter à cruditate ad coctionem, inde ad expulsionem, & demum ad reductionem progreditur, neque ex his morbi progressum certo & tuto dignoscere possumus. Aliæ igitur morborum horum alterationes clariores ac cognitu faciliores attendendæ sunt. Concedimus

dimus tamen hosce etiam morbos, abi ad salutem terminantur, quatuor ista tempora, principium, augmentum, statum & declinationem percurrere. Verum ubi ad interitum ægrotantium tendunt, vix ad statum perveniunt, sed indies ad extremum usque vitæ diem augentur. Quare in his augmentum maximam latitudinem admittit, atque ulteriorem discriminationem seu subdivisionem meretur. Cum vero mediocris Nova distatus morbi ejusdem generis sit quali me- visio Audius terminus inter principium & finem hu- gmenti. julmodi augmenti; commode inde distinguere poslumus augmentum in augmentum citra, seu infra, vel ultra seu suprastatum Augmentum citra statum appellare possumus augmentum citerius, seu inferius vel augmentum simpliciter, cum non differat ad ipsa re isto nomine communiter recepta. Augmentum ultra seu supra statum, vocamus augmentum excrescens, excedens, vel transcendens, item deploratum.

Porro duos modos declinationis morbi Duplex observare licet. Prior legitimus, quando declinamorbus simpliciter versus sanitatem declinat. Posterior nothus, quando morbus remittens migrat in alium diversi generis. Atque ita quamvis in convalescentibus 4 tantum fint morbi tempora, in aliis tamen duas aliæ differentiæ difcerni possunt. Notan-

M2TUF2

leni le

manife

difting

altera

bus di

discri

THIS A

nequ

tur, fe

live 1

& VE

bi ftat

Cto,

elt q

mun

gnon

5.

mata

MIN

tur,

lym

поу

dum tamen est hæc 6 tempora in eodem morbo & in eodem ægroto nunquam inveniri; ast ubi idem specie morbus est, in diversis subjectis. Hæc jam ad præsentem afDisseren-sectum applicemus. Dicimus ergo 6 occurtia hujus rere disserentias hujus morbi respectu ejus sectem-temporum. Est enim in principio, & dicapora protur incipiens; in augmento, & dicatur confostantes; in statu, & dicatur consistens, in augmento supra statum, & dicatur deploratus; in declinatione vera, & dicatur decli-

1. Morbus Rachites vocatur incipiens, quando prima morbi rudimenta & quasi vestigia, licet ea obscura, & quasi adhuc latentia observentur, nondum tamen manisesta partium primo assectarum extenuatio saca est.

nans simpliciter vel remittens; in declinatione notha, & dicatur migrans in alium mor-

do jam evidens & manisesta extenuatio partium primo affectarum sacta sensibus occurrit. Atque hic videt sector nos non distinguere hæc duo tempora ex cruditate & coctione, ast ex alia alteratione corporis, vizextenuatione in partibus primo affectis sacta. Etenim ex cruditate & coctione nullo modo discerni potest hujus morbi principium ab augmento. Alias autem, quantum

leni sequinur, & quemadmodum ille ex manisesta coctione augmentum à principio distinguit, ita quoque & nos ex manisesta alteratione, nimirum extenuatione in partibus dictis sacta, tempora hac in hoc assectu discriminamus.

3. Morbus hic in statu consistens, seu statum attingens, is est, qui, ad summum suum vigorem provectus, sistitur, & ad tempus neque sensibiliter augetur, neque imminui-

tur, sed sibi æqualis permanet.

4. Morbus hic excedens statum mediocrem, sive deploratus, is dicitur, qui magnitudine & vehementia superat ipsum ejusdem morbi statum in alio ægroto mediocriter affecto, simulque continue augetur, neque spes est quin indies auctus sit suturus ad extremum usque vitæ terminum. Ob quam causam conditio hæc morbi deplorata etiam cognominatur.

5. Morbus hic dicitur vere & legitime remittens seu declinans, quando essentia ejus sensim imminuitur, & signa ejus ac sympto-

mata indies mitiora fiunt.

6. Morbus hic illegitime declinans, seu migrans in alium morbum diversi generis dicitur, quando ita essentia ejus, signaque & symptomata minuuntur, ut in eorum locum nova & sorte graviora diversi generis subR 4 inde

inde surrogentur. Hoc modo morbus hie migrare solet in Tabem, in sebrem Hecticam, & sorte in lentam putridam; ut plurimum tamen idem morbus hos super-venientes ad interitum ægri usque concomitatur. Atque hæc dicta sint de disserentiis hujus morbi ab essentia deductis.

Marie

nut par

TILS.

Den

112S 20

wilm

exiped quibus cari,

folos

hujus Ex his

tiuste

dignar Pri

bris l

tem o

âus

dan.

têm a

Atqu Atqu

guin

celle

tem

tricu

mme-

Diff. à caulis.

Morbus hic fimiliter respectu causaram in partes quasi dirimitur, scilicet in morbum nativum, & adventitium, seu de novo contradum. Porro morbus hic dici potest nativus duplicisensu: priori proprie, quando æger hoc morbo actu eo affectus nascitur; posteriori improprie, quando æger non actu eo affectus in lucem prodit, sed dispositus folummodo à nativis principiis ad eum tacile incurrendum. Si libeat lectori in memoriam revocare ea quæ supra de causis hujus morbi ex parte parentum dicta funt, differentiæ hujus fundamenta ac rationem facile percipiet, ut ulteriori ejus explicatione opus non sit: solum addimus hanc differentiam maximi esse usus in prophylaxi, non tanti autem in therapeia. Morbus hic fimiliter mere adventitius est, qui, nulla nativa dispositione promotus, de integro, ieu de novo post partum contrahitur: atque hic quoque duplex est; vel enim alium morbum antecedentem consequitur, vel ex errore in 6 rerum non naturalium usu disseruimus, ubi de causis hujus morbi post partum egimus, quo lectorem remittimus.

Denique morbus hic nonnullas differen- Diff. 2 tias admittit ex parte aliorum morborum, cum morbis quibus in eodem subjecto complicatur. Non catis. exspectandum, ut omnes morbos, cum quibus possibile est hunc morbum complicari, impræsentiarum enumeremus? eos solos commemorabimus, qui frequentes hujus morbi comites solent deprehendi. Ex his alii dependentiam quandam ab hoc morbo ejusve causis habent; alii nullam vel perquam exiguam, vixque separata consideratione dignam.

Prioris generis sunt Hydrocephalus, dentitionis vitia, asthma. phthisis, febris hectica, fe-

bris lenta, erratica, ascites.

22

m

加

74-

YUS

ger

00-

chu

tus

12-

ne-

ulis

mt,

em

10

dif-

axi,

hic

na-

10,

at-

11-

vel

蚺

THE !

Hydrocephalus magnam obtinet affinitatem cum hoc affectu; cum hic etiam affectus molem capitis præternaturaliter auctam, affluxumque sanguinis debito uberiorem ad cerebrum ob arteriarum eo tendentium amplitudinem ut plurimum supponat. Atque hinc facile evenit, ut cerebrum sanguinis copia oppressum nonnunquam necesse habeat permittere serosiorem ejus partem (quippe maxime permeabilem) in ventriculos suos & cavitatem intra menynges R 5 exsuexsudare, adeoque cerebri hydropem producere. Verum non hoc perpetuo contin-

git, ut supra monuimus.

Motum enim est hoc morbo affectis laboriosam dentitionem plerumque contingere,
ipsosque dentes frustulatim excidere. Hoc
autem vitium supra ad inæqualem partium
nutritionem retulimus, ubi plura de eo videantur. Notandum interim est laboriosam
dentitionem posse etiam hunc affectum præcedere, & ejustem sebsequentis esse causam,
ut supra quoque ostendimus.

Asthma similiter huic morbo familiariter supervenit, quod sanguis in transitu suo per partes 1. affectas nonnihil refrigeratus, crassior, viscidior, torpidiorque redditus, non semper persecte corrigatur ante ejus reditum ad dextrum ventriculum cordis. Unde à dextro ventriculo per venam arteriosam in substantiam Pulmonum ineptior ad transitum resunditur, facileque eo nomine obstructiones illic frequenter, durosque tum ores, asthma, nonnunquam instammationes, abscessus, ulcera & phthisin, hydropem Pulmonum, febrim Hecticam, aut etiam lentam erraticam insert.

Ascites etiam huic morbo interdum comes est. An ex copioso assluxu sanguinis

20

of viscen

anto Ita

um fans

m & c

ME CIM

potius

deprehi

rofa ex

fed hoc

pe qui

mmus.

Poffi

nli ztat

dente, 8

Quin &

venire a

nis fan

fectus

praced

catis pr

Poft

parum

habent.

intus, ft

bo fur

plerun

præler

Tantu

ad visceta abdominis, nondum audemus. certo statuere. Certum tamen est affluxum fanguinis ad hunc ventrem fatis copiofum & concitatum esse in hoc morbo. Hepar enim magnum est, reliquaque viscera potius pleniora quam macilentiora debito deprehenduntur. Unde fieri potest, ut serosa exsudatio è visceribus plenitudine oppressis in cavitatem abdominis excitetur; fed hoc minus confidenter asserimus, quippe qui nondum in hac re nobis ipsis satisferimus, sh supingh lav , as basmos manyance

Possunt tamen hi memorati morbi puerili ætati accidere absque Rachitide præcedente, & caus esse ejusdem supervenientis. Quin & insuper possunt huic morbo supervenire ab aliis cansis, puta erroribus regiminis fanitatis: quamvis etiam in hoc casu affectus hic forte ex parte reus esle possit, si præcesserit. Atque hæc de morbis complicatis prioris generis.

Posteriores autem, qui nempe nihil aut parum saltem dependentiæ ab hoc affectu habent, sunt febris maligna, lues venerea, scor-

butus, struma

ejus rdis,

ITTEotior

10irol-

1m-

hy-

aut.

100-

I. Certum est febrim malignam huic morbo supervenire posse, quod ea à contagio plerumque producatur, à quo affectus hic præsens infantes immunes non præstat. Tantum addimus febrim hanc raro, aut nunbere.

complicetur, vel à nutricibus per contagium, vel à parentibus hæreditario jure derivatur. Est enim morbus ab hoc plane distinctus, nihilque prope commercii cum eodem habet.

3. Scorbutus cum hoc affectu interdum conjungitur. Est que vel bareditarius, vel forte etiam in tam tenella constitutione per contagium contractus, vel denique de novo ex malo regimine infantis, & imprimis ex inclementia aëris & loci, ubi educatur, productus. Vix enim majorem habet cum hoc affectu cognationem quam cum cæteris aliis morbis longioris durationis, in quibus similiter, tractu temporis, sanguis hoc peculiare inquinamentum ut plurimum contrahit. Id tamen concedendum est, propter aversationem motus & exercitii, affectum hunc pluseulum ad scorbutum disponere.

4. Et ultimo strumosa affectio aliquando huic associatur. Sed credibile est eam plus debere aliis causis sibi propriis, quam huic morbo præcedenti. Quamvis non dissiteamur hunc aliquam invadendi occasionem posse ei subministrare, quatenus hic crassio-

res ac viscidiores humores reddit.

Nonnulli forte alii morbi cum hoc inter-

terimus tiarum (

fire, & 1

tionem

Signa

Sign:
Scap
que info

differen differen diferepa

agendu Sign

dentur quamr

matoyi insepar

sure,

dum

dum complicantur; verum cum ii rarissimi sint, & vixdum in certam nostram observationem venerint, eos impræsentiarum præsterimus, & ad signa morbi, tum disserentiarum proximo loco progredimur.

CAP. XXI.

Signa morbi Rachitidis & primo Diagnostica.

0 en

ectu

01-

In-

luf-

ndo

plus

nuiç

tea-

em

110-

ter-

IIII

Signa hujus morbi distinguimus in tria Scapita. Primum Continet ea signa, que ipsius affectus presentiam demonstrant. & appellantur Appubsina. Secundum continet ea que distinguunt inter se morbi disterentias, & vocantur Appellina, sive discrepantia. Tertium complectitur signa, que presegunt morbi eventum, dicunturque megyusina. Hoc capite de diagnosticis agendum.

Signa Αμγωςικὰ dividimus in παθογνωμονικὰ & συνεδεέυον α. Atque hic videntur Autores medici paullo strictius,
quam necessitas naturæ rei requirit, signum
παθογνωμονικὸν definire. Volunt enim esse Pathoinseparabile & proprium quarto modo conve-gnomositre, scilicet omni, soli, & semper. Equitius exdem omnino concedendum est, signum ita tenditur.

insepa-

inseparabile, five proprium quarto modo, esse secundum maxime proprium sensum, fignum pathognomonicum. Nam five præfens id, five absens sit, semper demonstrative significat: præsens quidem præsentis morbi speciem certo testatur, eam morbispeciem abesse demonstrat.

Verum, cum perpendimus quam raro hujusmodi signa occurrant, & quam angusti propterea usus sit futura eorum notio sic restricta; de vocis usitata significatione amplianda cogitare inducimur. Licet enim veteres, ut huic defectui subvenirent, ouvδεομήν παθογνωμονικήν in locum veri unius pathognomonici stricte dicti substituerint, atque nosmetipsi eandem συνδεομήν lubentissime recipiamus & comprobemus; cum tamen ea ipsa ouvdeoun raro ab ipso initio morbi appareat, & per consequens raro sit signum inseparabile, necessario sequitur eam ipsam quoqueraro officio signi, quarto modo proprii, defungi posse, adeoque hanc etiam notionem ad angustiorem usum esse repactam. Cogimur ergo ut huic incommodo plene subveniamus, nonnihil extendere fignificationem figni pathognomonici, ita, tamen ut de valore & certitudine figni- frome, ficandi nihil remittamus.

Definimus itaque signum Pathognomonicum esse quid apparens in vel circa agrotum,

quod

ma certo

but, At

Ain in

& Cepara

, mar

ampetit

drome !

respecti

enum h

eparabi

COMMITATI

oris act collecti

द्र qua

genens

valet, 8

ulque in

reto no

Indrom

entibus

ater de

tente 12

do quod certo & infallibiliter morbi speciem demonm, ftrat. Atque in hoc extenso sensu dividi poens test in inseparabile sive proprium quarto modo, tive & separabile sive proprium tantum secundo moor do, nimirum quod soli uni morborum speciei pe competit, licet non semper. Similiter & syndrome pathognomonica in 2. species prædictis respective analogas dirimatur. Aliquando gu enim hæc cum ipso morbo incipit, & eum inle separabiliter ad extremum ejus terminum conione comitatur. Ita dolor lateris punctorius, fein bris acuta, respiratio difficilis & tussis, si or collective lumantur, lyndrome quidem funt, at quæ uni simplici pathognomonico primi rint, generis, proprio scilicet quarto modo æquiben, valet, & pleuritidem à principio ad finem um usque inseparabiliter comitatur. Aliquando nitio vero non statim ab initio morbi completa est rost syndrome, postea tamen aliis signis superveeam nientibus perfecta fit, morbique speciem infalliomo hiliter denuntiat. Ex. gr. In variolis, incihant piente jam morbo, syndrome ipsa adeo innelle completa est, ut nondum morbi speciem com- terto determinet: postea vero erumpentiten bus sparsim in cute exanthematis ad matunid, ationem tendentibus, consummatur syndrome, speciesque morbi extra dubium poita est.

Quod autem signum uni soli morbo (litet non quarto modo) proprium, sive id folita-

QHIP!

Solitarium & simplex sit, sive ex syndrome conflatum, sufficiat, quando adest, conficere signum vere pathognomonicum, ex eo liquet, quod, quando adelt, æque certo ac infallibiliter morbi speciem designet, ac ipsum signum quarto modo proprium. Quod enim uni tantum speciei convenit, quando adest, præsentiam istius quoque speciei necessario infert. Licet ergo signum secundo modo proprium inseparabile non sit, &, ubi abest, non concludat de absentia morbi, quemadmodum fignum quarto modo proprium; quando tamen adest, ejusdem est cum eo valoris ac certitudinis, ut diximus. Medici enim ex certitudine significandi æstimant dignitatem signi In eum quippe sinem morbi signa quærunt, ut in certam ejus notitiam deveniant. Cum ergo signa secundo modo propria æquivaleant quoad certitudinem, quando adfunt, signis quarto modo propriis, ea sub extensa signorum pathognomonicorum significatione hic complectes mur.

Dicas hoe modo multa signa Ompauvoμενα ad παθογιωμονικά reduci, & cum iis confundi. Esto: modo infallibiliter morbi speciem designent. Digna enim sunt, quæ hoc modo ab aliis epiphænomenis fegre- & m gentur, neque ulla hic confusio in artis se- henditi semeiotica methodo sequetur, sed potius fima:

valor

valor &

insinde De fig

nihil fere

przmon

ordinen

non hic

thodus,

fontibus

ordinen

quæ (09

constitu

que met

mus, Pr

1. 81

3, 21

3. 2

4. 5

5. V.

lovem fig

les spe8

ties parti

194 G to

ciditas,

in hoc

1. 5

valor & dignitas signorum facilius & apertius inde notabitur.

De signis Cuvedeéver, sive asidentibus, nihil fere alicujus momenti habemus, quod præmoneamus, quin recta ad figna, ipfa in ordinem redigenda procedamus. Verum non hic exspectanda est exacta aliqua methodus, cum signa plerumque è tam variis fontibus permanent, ut vix in accuratum ordinem sese cogi patiantur. Quare, ut ea quæ cognatæ sunt naturæ juxta se invicem constituantur, ad sequentem qualemcunque methodum signa hujus morbi reduximus. Proponemus ergo. tdi-orbi

I. Signa que ad actiones animales spectant.

3. Que fectant ad irregularem nutritionem.

3. Que respirationem respiciant.

iani

1000

em,

100-

4. Que ad vitalem influxum pertinent.

5. Vaga quedam & extra certas classes. Valorem signorum singulis titulis subjungemus.

1. Signa diagnostica ad actiones animales spectantia. Hæc sunt 1. laxitas & mollities partium. 2. Debilitas & languor. 3. Ignaand via & torpor.

I. Laxitas quædam & mollities, si non flacciditas, omnium partium primo affectarum qui in hoc affectu observari solet. Cutis ta-Etu mollior, & ut plurimum lævior deprehenditur, caro musculosa minus rigida & articuli facile flexiles sunt, sæpe-

que

que corporisustinendo impares; unde erecto corpore antrorsum id, vel retrorsum; dextrorsum vel sinistrorsum nonnihil instectitur.

2. Debilitas quædam & languor sive enervatio omnibus partibus motui inservientibus accidit. Debilitas hæc multum dependet à laxitate, mollitie, & flacciditate partium jam jam dictis; quo nomine ea signa huic præmisimus, ut & hoc ignaviæ ac torpori proxime enumerandis; quæ multum debent tum laxitati & mollitiei. Porro debilitas hæc incipit ab ipsis primis morbi rudimentis. Si enim intra primum ætatis annum, aut circiter, pueri hoc morbo infestentur, tardius solito pedibus insistunt præ ista debilitate, & plerumque prius loquuntur quam incedunt; quod vulgo apud Anglos mali ominis haberi solet. Sin, postquam ambulare cœperunt pueri, hoc affe-Etu corripiantur, paullatim infirmius pedibus insistunt, atque interincedendumsæpius vacillant, levique de causa titubant, aut etiam cadunt; neque æque diu se pedibus fine interposita sessione sustinent, aut æque alacriter se motitant. Demum multum aucto morbo destituuntur plane usu pedum, immo vix sedere possunt erecci, collumque debile, ægre, aut non omnino onus capitis sustinet.

3. Igna-

initio m

getur,

motum

huculn

tentur

tanto

brant a gestirer

Citrana

facti, j

criter h

tur, p

Itentes .

dem cur id inclin

trorfun

runt lu viz luz

poris a

non pe

mo pr

averian

boreal

ctation alius al

morbi miant

flupidi

tà

um uic ori

de-

ili-

di-

201

ife-

ra

un-

Anoft-

fe.

edi.

12.

nt; edi-

aut

nul-

pecol-

nus

ona

3. Ignavia quædam & torpor statim ab initio morbi artus invadit, sensimque augetur, ut magis magisque indies omnem motum aversentur. Juniores pueriqui adhuc ulnis nutricum gestantur, si quando lætentur, non æque profuse rident, neque tanto cum vigore excitantse, artusque vibrant ac si è tractantium manibus exsilire gestirent: irati etiam non ita serociter calcitrant, neque tanta cum animofitate plorant ac solent sani coætanei. Grandiores facti, jamque pedibus commissi minus alacriter huc illuc cursitant, citius defatigantur, potiusque sedentes quam pedibus insistentes ludere amant, neque sedentes quidem cum vigore corpus suum erigunt, sed id inclinantes modo antrorlum, modo retrorsum, modo ad alterutrum latus, quærunt sustentacula, quibus recumbentes ignaviæ suæ auxilium præbeant. Jactatione corporis ab aliis præstita motuque violentiore non perinde ac alii pueri oblectantur, immo prævalente morbo omnem jactationem aversantur; tum plorantes non vehementiore aliquo lusu, ast molli placidaque tractatione & quiete placantur. Interim nisi alius aliquis morbus, symptoma, vel causa morbifica interveniunt, moderate tum dormiunt, tum vigilant, ingenosi sunt, non stupidi, immo præcocis solent esse ingenii,

miss aliud quid obstet. Vultum videre est magis compositum & severum, quam ætas postularet, ac si in rem aliquam seriam me-

qui

ter

ho

bi

TU

vi) fer

oft

tin

tiu

nu

fra

Du

m

祖

14

m

ditabundi essent.

Signa hæc simul sumpta, nisi ab evidenti lassitudine prægressa, aut à primario aliquo cerebri affectu proveniant (quod certe rarissime in hac ætate contingit) sufficientem hujus morbi, ζυνδεομήν παθογιωμο-עומוע primigeneris constituunt, & ubi simul adfunt, morbi præsentiam; ubi simul absunt, morbi absentiam certo attestantur. Si quando vero lassitudo sive febrilis, sive alia similia signa proferat, facile ab his distingui possunt, tum quod causa lassitudinis præcesserint, tum quod signa inde orta subito esfulgeant, citoque evanescant; in hoc affectu vero signa sensim ingruunt, permanentque, aut ulterius indies intenduntur. Primarii autem cerebri morbi suis signis innotelcunt.

Atque hac de signis, qua ad actiones animales spectant.

Signa que spectant ad irregularem partium nutritionem.

Supra monstravimus quanti momenti sit αλογοτεοφία, sive inaqualis nutritio partium in hoc affectu; hic ergo signa ab eadem snagna ex parte pendentia prosequemur, eaque zaque uno quasi intuitu conspicienda przebebimus.

eft

28

e.

nti

11-

rte

en-

U0=

6-

nul

W.

di-

Idi-

rta

10

er-

un-

TIS

7754-

tifit

till!

em

UI,

que

- que plenior & floridior, si conferatur cum cæteris corporis partibus. Licet autem signum hoc præsupponat aliqualem motum morbi antequam elucescat, adeo tamen obscurus est morbus ante ejus apparitionem, ut vix perceptibilis habeatur: à primo ergo sere principio signum hoc plus minus se ostendit, & ad exitum usque morbi continuatur, nisi sorte aliunde istarum partium colliquatio superveniat, ut supra monuimus.
- 2. Partes carnosa, imprimis musculosa infra caput, quas inter primo affectas supra numeravimus, in progressu morbi magis. magisque indies atteruntur, extenuantur, macieque consiciuntur. Hoc signum non statim à morbi initio elucescit quod notabilem morbi motum priusquam evidenter appareat, prærequirat; certissime tamen, tractu temporis in conspectum venit, morbumque ad extremum terminum, seu ad vitam, five ad mortem comitatur; optimeque motum ac gradum morbi ex incremento fuo demonstrat. Porro hoc signum cum priori junctum constituit signum saltem pathognomonicum secundi generis, sive huic morbo soli proprium; &, ubi simul adsunt, intallibi-

fallibiliter denotant morbi præsentiam, licet non æque significent eundem abesse,

quando absunt.

3. Protuberantia quædam & nodi circa nonnullos articulos, maximeque in carpis conspicuæ, paullo minus in talis observantur. Similes quoque tumores videas in extremitatibus costarum, quibus cum sterni cartilaginibus committuntur. Notavimus supra in obdervationibus anatomicis tumores hosce non in partibus, aft in ipsis ossibus sitos esse; licet hec consideratio, cum ex se vix satis innotescant, eos ut signa vix tangat. Hoc lignum quoque aliqualem motum morbi supponit, neque à principio principiante emergit; prius tamen se conspiciendum præbet quam notabilis partium extenuatio. Ubi vero adest, pathognomicum secundi generis conficit, certoque morbi speciem fignificat.

4. Ossa nonnulla incurvantur, præcipue ossa Tibia & Tibula, hinc ossa Ulna & Radii, sed paullo minus & infrequentius; aliquando etiam ossa semoris & humeri Porro nonnunquam decurtatio quadam ossium deficiensque eorum accretio secundum longitudinem observatur. Supra, ubi vitiorum organicorum rationem reddidimus, hoc casu, plane omissum suit. Videtur autem hic affectus ab eadem irregulari nutritione de-

pendere;

ins aft

get.

ferri

forfar

excre

de n

& ru

regula

maxi

referr

genus

क्तुव

tis ev

ne ift

busfir

ronal

dem

antro

libera

buran

etiam

mus,

prate

punt grefo

born

SHECT

TCA

-100

tur.

lati-

ini-

non

ese;

latis

Hoc

orbi

ante

dum

atio.

cundi

ciem

ipue

5 RA-

; ali-

OTTO

n de-

itudi-

orga-

calu,

nicaf-

e de-

deres

pendere; quatenus nempe alimentum intus assumptum ossa sec. longitudinem adauget. Hinc nonnulli pueri affectu hoc diutius afflicti Pulmiliones fiunt. Huc forte reterri potest plica illa in carpis, quod cutis forsan sec. longitudinem magis nutriatur & excrescat, quam ossa Ulnæ & Radii; unde necesse est eam sese in plicam quandam & rugam in carpis contrahere. Demum irregularis quadam ossium capitis protuberantia, maxime ofsis frontis antrorfum, huc quoque referri potest. Spectat enim ad commune genus vitiatæ figuræ offium eorumque aloγοτεοφίαν. Videtur autem hæc in offe frontis evidenter pendere à liberaliori nutritione istius offis in ambitu suo, quo cum offibus sincipitis committitur, futuramque coronalem constituit, quam in partibus ejusdem anterioribus. Hinc enim necesse habet antrorsum protrudi. Et facilius quidem istic liberalius nutritur, quod hoc os versus futuram in pueris cartilagineum sit. Atque hoc etiam, quod nuperrime tantum observavimus, superius, ubi de vitiis organicis egimns, prætermislum fuit.

5. Dentes tum tardius, tum molestius erumpunt, levi occasione vacillant, aliquando nigrescunt, aut etiam frustulatim excidunt. In
horum locum plerumque novi tarde ac laboriose
succrescunt. Hoc genus signi, ut & illud in

4 priori

priori articulo notatum, ad Cunde vovla referri potest, quod neutrum horum vel perpetuo adsit, vel, ubi adest, certo morbi præsentiam confirmet.

Conjectarunt aliqui ossa in hoc affectu interdum esse slexibilia instar ceræ; sed nos nusquam id vidimus, neque ab oculato teste side digno relatum audivimus. Quare ut sabulosum hoc signum plane re-

jicimus.

6. Pectus in ulteriori morbi progressu, à lateribus angustius redditur, anterius acuminatur, ita, ut nonincommode comparetur figuræ carinæ navis inversæ, aut pectoris caponis. In medio enim utrinque in cacumen quasi compressis lateribus assurgit. Si quis quærat an signum hoc sit huic morbi soli proprium? Respondemus, fieri quidem posse in atrophia aut phthisi ut pectus parum augeatur, minulque quam aliæ corporis partes, adeoque reddatur angustum: quoad figuræ mutationem, absque άλογοτεοφία, ca ipsa viz. quæ huic affectui propria est, vix contingere posse. Quare hoc quoque signum quando adest, licet serius invadat, pathognomonicum secundi generis reputamus, quod scilicet, ubi adest, certo morbi speciem ostendit, quamvis non è contra. Atque hæc de signis quæ spectant ad inæqualem nutritionem.

Signa

I.

do me

o by

relpu

dum

nuat

rum

tur,

flatu

(ceru

fpira

min

petu

gnon

mort

3.

MINI T

absce

CHIE

terfi

fatis

Incu

Signa que respiciunt Respirationem.

do memorata, de qua tunc fusius egimus.

ctu

led

CU-

IC.

1/4

sca-

nen

quis foli

dem

TUIT

par-

Dia,

eft,

que

uta-

norbi

ntra

102

Sign

2. Subtumida quadam Abdominis repletio, & hypochondriorum tensio; quæ liberum motum diaphragmatis deorfum, atque adeo respirationem nonnihil impedit. Notandum tamen est Abdomen & hypochondria quoad partes externas fazis macra & extenuata apparere, ab intus vero, ab iis nimirum quæ in Abdominis cavitate continentur, intumescere, unde plenitudo hæc atque tensio exsurgit. Tumor hic partium à flatulentia ventriculi & intestinorum, partim à magnitudine Hepatis aliorumque viscerum provenit. Aliquando etiam huc conspirat serosa exsudatio in cavitatem Abdominis, Ascitem invehens. Hoc signum perpetuo fere adest, neque tamen pro pathognomonico habendum, cum multis aliis morbis fit commune.

3. Tusis frequenter in hoc affectu adest, tum respiratio dissicilis, multaque alia pulmonum vitia, ut & eorum infarctus, tumores duri, abscessus, inflammationes, eorum coalescentia cum pleura; & similia: Hæctamen vix inter signa recenseri debent, quod per se non satis evidenter in sensus (dum vivunt ægri) incurrant.

SS

4. Pueri

4. Pueri hoc morbo afflicti sæpe lateralem decubitum modo dextrum modo sinistrum
aversantur, aut saltem ægrius serunt; nimirum vel ob coalescentiam pulmonum cum
pleura, vel tumorem in adverso latere; supino vero decubitu ut plurimum delectantur. Atque hæc signa etiam simul sumpta
pathognomonicum neutrius generis esticiunt, sed sum se sum sum sum sum sum
bisque aliis communia.

Signa que spectant ad vitalem influxum.

graciliores sunt debito, minusque conspicua quam in emaciato corpore expectares. In facie vero (habito respectu prædictæ gracilitatis in aliis partibus) excedunt proportionem debitam. Hoc signum fortasse pathognomonicum est, quamvis observatu difficile, necdum nobis satis exploratum.

2. Pulsus in carpis, tum alius partibus primo affectis exilis est & debilis, alioquin forte

moderatus, nisi una febris adfuerit.

3. Ligatura moderata supra cubitum aut genu injecta, non aque cito partem infra seu extra ligaturam sanguine turgidulam & coloratam reddit, ac solet in aliis pueris sanis coataneis.

THE

hibu

dulci

aut n

quod

Si ho

DISO

auch

poffi

detu

fint f

crefe

perf

COLL

CIS,

Signa quadam vaga.

I. Appetitus cibi & potus vel moderatus, vel justo debilior est, nisi febris forte adfuerit.

2. Excrementa tum alvi, tum vesica sanorum fere similia sunt, nisi alius morbus prohibuerit.

3. Observatum est hoc morbo laborantes dulcia, ut syropos, tum bellaria, multoque sacch. aut melle condita (quæ aliis pueris in delitiis esse solent) aversari: forte hæciis quoque noxia funt, quemadmodum & scorbuticis,

quod humores incrassent.

102-

訓練

4. Observarunt aliqui se pueros nonnullos hoc morbo affectos ponderosiores deprehendisse, quam alios ætate & statura pares. Si hocita se habeat, tribuendum id est partim facilitati, partim inæqualitati nutritionis ossei generis in hoc affectu. Etenim cum auctum hoc pondus carnibus adferibi vix possit, quippe quæ hic extenuatæ sunt videtur id offeo generi attribuendum; cumque ossa in hoc morbo nondum observata fint sec. longitudinem præter modum excrescere, restat, ut id eorum crassitiei superflue auctæ imputetur. Hæc etiam figna communia sunt, neque digniorem æstimationem merentur. Atque hæc de dianogsticis, sequuntur diacritica.

CAP. XXII.

iga go

nous;

phale

Augus

declin

pe mi

præti

tterm

CHIE

enim

morb

gnost

rum a

telt.

gnoth

rump

tantui

runt.

crum

derati

figna

difm

perho

fentia

ezhib

aligin

Signa differentiarum Rachitidis, sive ejus diacritica.

Idem methodo hic insistendum videtur, quam supra proposuimus, ubi de disferentiis egimus, quarum signa hic quærimus. Supra 5 differentias ab ipsa morbi esfentia diduximus. I. Erat à partibus essentiæ secundariæ separabilis præsentibus vel absentibus. Verum hujus differentiæ signa nulla alia exspectanda sunt præter ipsas partes prasentes vel absentes, quæ ipsæ per se in sensus incurrunt, & propterea inter signa diagnostica capite præcedenti classe secunda adnumerantur.

2. Differentia erat à magnitudine morbi. Hujus indicia sunt plura & graviora, vel pauciora & mitiora symptomata & signa prasentia, nempe ex diagnosticis supra descriptis petita.

3. Differentia à vehementia desumpta erat; hæc distinguitur ex tardiore vel concitatiore incremento signorum diagnosticorum.

4. Erat à viribus ægrotantis. Virium æstimandarum rationem supra exhibuimus: morbi vero differentia hinc orta respicit periculum.

(285)

riculum, ideoque ejus signa ad prognostica referimus.

5. Differentia ducebatur à morbi temporibus; quo respectu sex hujus morbi diversas phases supra enumeravimus: scil. principium, augmentum, statum, augmentum supra statum, declinationem veram, declinationem notham si-

ve migrantem in alium morbum.

tur, difizrii ef-

sen-

igna

fein

igna

mor-

, 16

114

mpta

stico-

WHITE .

Sciendum eft principium hujus morbi præter signa hoc tempus ab augmento di-Iterminantia, requirere etiam quædam peculiaria signa præsentiæ ipsius morbi: Est enim tempus maxime obscuritatis, quo morbus quasi delitescit, neque ex signis diagnosticis supra relatis ab inexperto vel parum attento medico facile deprehendi potest. Per hoc quippe tempus plurima diagnostica prædicta nondum in apertum erumpunt; & quæ se produnt, obscuriora tantum adhuc sua vestigia observanda offerunt. Postulat ergo hujus temporis indicium peculiarem collectionem signorum primo apparentium, eoruinque accuratam considerationem; reliqua vero tempora, præter signa diagnostica supra data, sola indigent discriminatione inter se, quæ levi negotio perficitur. Quare primo loco figna præfentiæ hujus morbi adhuc incipientis hic exhibenda, indeque discriminationis ejus ab augmento.

Signa

Signa prasentis morbi rachitis in principio adhuc existentis.

princ

tris C

ftam At

præli

nulla

fecta

ejuli

Had

temp

ienu

cipio

prat

dictu

partit

vero

& fig

C' M

temp

men

pton

tit,

rum genera superius actionibus animalibus adscripta: laxitatem nempe & mollitiem partium, debilitatem & languorem, ignaviam & torporem. Hæc quippe subobscure & remissiori gradu statimà principio principiante (ut loquuntur) advertenti observanda se

præbent.

2. Aspiciendus est color, tum habitus capitis & faciei in relatione ad artus. Si enim color aut habitus illis floridior sit quam his,
validam suspicionem hujus morbi radices
jam agentis exhibet. Licet enim moles capitis evidenter aucta, partiumque assectarum manisesta extenuatio antequam apparent considerabilem morbi motum tempusque prærequirant; à principio tamen disferentia quædam ratione coloris & habitus
harum partium inter se collatarum ab accurato inspectore notari potest.

3. Observandi sunt carpi & extremitates costarum. In carpis quippe ante sinem principii quædem nodorum rudimenta ut & plicæ se ostendere incipiunt, similiterque nodi in

extremitatibus costarum.

4. Subtumida quadam plenitudo & tensio ventris maxime circa hypochondria statim à prinprincipio occurrit. Magnitudo enim ventris cum magnitudine pectoris collata justam proportionem excedere competitur.

110ad-

Dail.

am

Te.

an-

(4-

his,

ices

02-

da-

ppa-

puldif-

15 (00

nct-

olica

din

tenfo

rin-

Atque hæc quædam signa simul sumpta præsentiam morbi etiam in ipso principio, certo demonstrant. Si vero eodem tempore nulla notabilis seu manisesta partium 1. affectarum extenuatio appareat, eo ipso ab ejusdem augmento clare discriminatur. Hæc de principio.

Reliquorum temporum signa ex ipsorum temporum descriptionibus supra datis inter se nullo negotio distinguuntur; cum tamen ea huc spectent, verboque expediri possint,

non gravabimur ea obiter annotare.

In augmento omnia signa quæ in principio apparuerant intensiora & evidentiora se præbent, pluraque alia & graviora indies accumulantur. Distinguitur hoc tempus, ut dictum, à principio manisesta extenuatione partium primo affectarum jam sacta; à statu vero continua aggravatione symptomarum & signorum dictorum.

In statu signa ac sympotomata gravisima e maxime obvia adsunt; durante vero hoc tempore ab ulteriori manisesto seu incre-

mento seu decremento cessat.

In augmento supra statum signa & symptomata tum ratione magnitudinis ac vehementia, tum ratione dejectionis virium superant suam fuam conditionem, quam in statu mediocri habent, atque interim indies in deterius vergunt; quibus respectibus hoc tempus distinguitur tam ab augmento ordinario, quam à statu mediocri.

dictu

prie)

tivo

nativ

tur,

mort

morbi

temp

przier

attop

albus

affect

Bolliti

qua

morb

iumus

doe

tis at

quan

In declinatione vera simplex quadam remisio symptomatum ac signorum ad integram sanitatem tendens assulget, nullis interim signis apparentibus alterius cujusdam morbi

ingruentibus.

In declinatione notha è contra, cum remissione symptomatum & signorum hujus morbi involvuntur alia novi morbi successuri, quæ variantur pro varia ejus conditione, & ex suis sontibus petenda sunt, neque hic exspectanda. Porro si quæ specialia signa cujusvis horum temporum occurrant, quæ ad morbi eventum spectant, ad prognostica reservanda sunt. Atque hæc de signis disterentiarum hujus morbi ab essentia deductis.

Differentiæ causarum, morbum in nativum & adventitium distinguunt, & nativum
quidem in proprie & minus propriesic dictum.
Morbus proprie nativus dictus, cum ab ipso
partu supponatur actu præsens, non alia
requirit signa quam diagnostica superiori capite recitata. Siquidem illa statim à partu
apparentia morbum proprie nativum adesse

demonstrant.

Sin vero illa signa non statim à partu

14-

tur

itu

16-

16-

orbi

16-

qua

ex.

CX-

CU-

pes

-916

ath

tim,

ipfo alia

164-

artu

delle

pp2-

appareant, dispositio tamen nativa ad morbum facile incurrendum ab ortu adsit, qua postea in actum erumpit, morbus inde productus nativus quoque (licet minus proprie) nuncupari potest, propter illam à nativo vitio dependentiam. Morbus hoc sensu nativus alia signa quam qua supra referuntur, postulat, quibus distinguatur ab eodem morbo plane adventitio, qua jam damus.

Signa morbi nativi improprie sic dicti.

morbi parentis utriusque vel alterutrius; ut intemperies frigida & humida, cacochymla præsertim pituitosa, cachexia, hydrops, vel atrophia & phthisis, vel gonorrhæa, sluor albus, lues venerea, scorbutus, similesque affectus.

2. Segnities & sedentaria parentum vita mollitiesque.

3. Errores matris tempore impragnationis; quæ omnia fusius supra de causis hujus morbi ad parentes spectantibus prosecuti sumus.

4. Debilitas ipsius infantis recens nati quando ea à labore parturitionis non provenit.

5. Invasio morbi ante exactum primum atatis annum. Hæc enim arguit nativam aliquam ad eundem dispositionem.

T

bo prius correpti fuerint. Tum quippe suspicari licet labem à parentibus contractam esse.

efe. 1

ex part

Der

oo acc

bus fo

figna

Super

in ipe

rata l

cum (

aicis

cum a

comit

nuenn

compl

notelo

que m

mi- 64

ab Per

me cor

7971 bi

trem in

B Ga

percipia

rior el

I. En

110105

effe fol

7. Si nullus alicujus nota error in tractatione infantis post partum, atque ante prasentis morbi invasionem commissus suerit. De quo supra

capite de causis post partum.

8. Si morbus hic non supervenerit alteri pragresso qui aptus est hunc post se relinquere. De cujus generis morbis supra quoque disseruimus.

Signa morbi noviter & ex integro post partum contracti contraria propemodum sunt

& levi idcirco pede percurrenda.

st morbus nulli infirma seu morbosa constitutioni parentum, aut eorum vita generi, aut erroribus, imputari posit.

2. Si nulla debilitas statim à partu appa-

ruerit.

3. Si morbus post sesquiannum atatis cæperit.

4. Si fratres aut sorores à morbo immunes fuerint.

5. Si notabiles errores post partum in tracta-

tione infantis commisi fuerint.

6. Simorbus aliquis pracesserit, cui suspicio est hunc insequentem adscribi posse. Hæc signa si vel omnia vel plura confluuant, satis testantur morbum hunc non labi alicui nativæ, ast erroribus postea commissis attribuendum

esse. Atque hæc de differentiis hujus morbi

ex parte causarum.

tione

mor-

De De

post

(01)-

Denique differentiæ quædam huic morbo accidunt propter alios morbos, cum quibus forte complicetur: in quo casu præter figna diagnostica supra enumerata, alia insuper desiderentur quæ morbo complicato in specie sunt propria. Non tamen accurata horum descriptio hic exspectanda est, cum eadem fere sint quæ à scriptoribus practicis passim istis morbis tribuuntur. Sed cum aliqui morbi frequentius quam alii hunc comitari soleant, corum signa breviter innuemus.

1. Ergo Hydrocephalus cum hoc affectu complicatus aliquando nullis fignis, ut innotescat, opus habet; sed ex se satis superque manifestus est, nempe vel ex ipsa enormi-capitis magnitudine, vel ex aqua exterius sub Pericranio contenta (quod tamen rariffime contingere putamus) vel insigni futurarum hiatu aqua in capite conclusa duram matrem inter suturas attollente, ita, ut tumor mollis & aquosus in ossium interstitiis exterius tactu percipiatur. Aliquando hydrocephalus obscurior est, signaque, quibus indicetur, postulat. I. Ergo omnes sensus cum exteriores tum intenste-rioros he betiores sunt, quam alias in hoc affectu esse solent. 2. Moles capitis aliquanto major quoque est quam alias. 3. Sutura in locis con-*[uetis*

suetis vel magis dehiscunt, vel tardius solito clauduntur. 4. Os frontis antrorsum magis prominet, reliquaque ossa capitis quasdam inaqualitates & protuberantias solito majores pra se

ferunt.

2. Dentitionis mala conjuncta dignoscuntur, I. Si solemne dentitionis tempus instet aut jam advenerit; Hinc quippe suspicio aliqua ingruit laboris alicujus inde provenientis. Tempus hoc septimo à partu mense incipere folet, & ad fesquiannum ætatis protendi, & ultra, ubi tardius dentitio procedit; quod in hoc affectu frequentissime accidit; terminatur antem ubi numerus dentium completus apparet. 2. Pueri ad dolorem mulcendum digitos frequenter in os indunt, secundum illud quod communi verbo dici solet, ubi dolor ibi digitus. 3. Albicant gingiva ea parte qua dens erupturus est, & ad tactum plusculum calent. 4. Dentes prodeuntes aliquando nigrescunt, aut vacillant, aut etiam frustulatim excidunt. 5. His adde vigilias, alvi profluvia, febres, convulsiones, quætamen fortuita funt symptomata.

3. Asthma ex ipsa spirandi dissicultate, quando ea non provenit à tensione & repletione insimi ventris, percipitur. Si vero una ad sit tumor, abscessus, vel Empyema, idque in altero latere pulmonum, agre serunt decubitum in adversum latus; sin in utroque, supinum aut

erectum

erectum

Palmon

additis

in Ple

60/00

exipua

cam p

febre

eliqua

Abdom

tingo,

effe, pi

4/10007

in prii

etiam

fi inter

frigent

plus (

five ft.

traffi

dieri

£0.076

Pare

fint,

que accidet in inflammatione cum coalescentias Pulmonum cum pleura, ut & in pleuritide: sed additis tum sebre acuta, tusi & sputo sanguineo in Pleoritide insuper dolore latere pungente. Phthisis innotescit ex diuturna tussi, sputo globoso & aliquando purulento (etsi Pueri rarius exspuant, quod materiam tussi in os elevatam per O Esophagum deglutiant) item ex sebre putrida conjuncta & ex sestina partium eliquatione. Ascites deprehenditur ex mole

Abdominis prater morem aucta.

ce-

1470

men

1211-

una

ing.

11 42

4. Febris Hectica se prodit ex calore continuo, acriori paullo illo qui in Ephemera solet esse, præsertim circa arterias, & auctori post assumptum cibum; item ex rapidiori partium consumptione; putrida cognoscitur ex urina in principio cruda, deinde magis cocta, tum etiam ex colore ejus justo intensiore. Ad hæc, si intermittens suerit, ex inaqualitate caloris, frigentibus nempe extremis in principio, postea plus satis incalescentibus; item ex Paroxysmis sive statis, sive erraticis; tandem ex Pulsu contractiori incipiente Paroxysmo, postmodum auctiori debito. Continua Febris ex intenso continuoque calore, tum siti, oris scabritie, linguaque colore mutato, & similibus.

7. Lues venerea conjuncta indicatur, si Parentum alteruter aut nutrix prius infecti suerint, si ulcerain Capite. Ore, ac Naribus, aut pustula stulæ eminentes vel crustosæ exortæ fuerint, præsertim quæ ordinariis remediis non cedunt: si
tumores duri aut nodi ossa carie sædantes in digitis, tibiis, ant aliis partibus apparuerint; si dolores & inquietudo nocturno tempore acerbiores
ægrum infestaverint? si bubones obliqui in in-

guine exorti fuerint.

6. Scorbutus cum hoc affectu complicatus hæc signa habet. 1. Utroque affectu laborantes agrius purgationes ferunt, sola vero Rachite afflicti easdem facile tolerant. 2. Exercitiis violentioribus multum laduntur, neque omnino ea ferre possunt. Etsi autem in hoc affectu solo, ignavia quædam & aversatio exercitii adsit, non tamen ab exercitio maniseste aut saltem non æque manifeste læduntur, nisi scorbutica affectio simul conjuncta sit. 3.Ad motum quemlibet concitatiorem magna difficultate spirandi laborant, doloribus variis per artus discurrentibus vexantur, quod ploratu exprimunt, pulsus frequentior & inequalior fit, aliquando palpitatio cordis, aut etiam Lypothymia supervenit, & hac fere sola quiete, placido nempe decubitu, cito mitigantur, vel etiam plane sedantur. 4. Frequenter Gingivarum tumores adsunt. 5. Vrina absente febre solito intensiores redduntur.

7. Strumosa affectio cum hac complicata si externa sit, tumoribus in sensus incurrentibus satis manisesta sit, immo ubi exterius

fre-

requi

genet

funt.

qui, 1

KIOS

alu I

doli

fed&

femp

Hac

lue

requentiores strumæ occurrunt non levis suspicio est similes tumores in visceribus delitescere; alias vero si strumæ intus tantum generentur, vix certo indicio discerni possiunt. Regula enim illa quam notarunt aliqui, viz. eos qui curto sunt collo, stronte brevi & angusta, temporibus compressis, & maxillis amplis præditi, esse strumis obnoxios, nimis incerta est ac sallax; addunt alii purgantia medicamenta justa alioquin dosi propinata strumosos parum movere; sed & hoc quoque aliquando tantum, non semper autem verum esse experti sumus. Hæc de signis disserntiarum.

CAP. XXIII.

Signa prognostica in morbo Rachitide.

Orbus hic specie sua lethalis non est, immo nonnunquam adeo levis mitisque est, ut pueri eo affecti solo ætatis beneficio, calore vitali aucto, eoque, vi frequentiorum exercitiorum, ad partes externas evocato, absque medicamentis convaluerint. Aliquando tamen adeo graviter affligit, ut optimis etiam adhibitis præsidiis, vix, immo ne vix quidem, imminens vitæ T 4 peri-

periculum præcaveatur. Quare ut medicus varios eventus morbi prævideat aut prædicat, signa ejus prognostica diligentius prius testati

falo 1tg

enum a

atione

effen

cem

Non

comp

pleni

temp

morbi

eum i

hei po

rari,

THING CO

demade

ASWIT

rores ta qua

RISIA

forte

nequ tam

contemplari necessum habet.

In genere vero ea quæ à partibus morbi militant, ea nempe omnia, quæ contra naturam faciunt, ex adverso pensitanda sunt, & quo hæc potentiora, illa infirmiora, eo gravior & perniciosior morbus habendus eft. Verum cum non cuivis obvium sit ex generali hoc monito fingula fatis accurate contra æstimare, non erit abs re speciales nonnullas regulas & observationes huc spe-Ctantes insuper subnectere.

I. Morbus hic proprie nativus, sive qui ante. partum invadit, periculosisimus est, & rarisime, si unquam, ad salutem terminatur. Indicat enim ipsa principia seminalia læsa, indeque vires valde esse debiles : caussarum præterea

vehementiam fignificat.

2. Quo citius à partu (hoc est) quo juniores hic morbus invadit, eo cateris paribus periculosior est; tanto quippe debiliores sunt vires. Similiter atate grandiores junioribus, pedibus incedentes non incedentibus facilius curantur.

3. Morbus nativus improprie sic dictus, qui nempe ex parte dependet ab inclinatione nativa, periculosior est eo, qui ex mero errore tra-

Etantium contrabitur.

4. Morbus hic ab aliis magnis morbis praceden - cedentibus proveniens, periculosior est eo qui solo regiminis errrore contractus est. Arguit enim antecedaneam quandam virium dejectionem.

5. Observarunt aliqui, infantes, qui crine rubras nutrices sugunt, in hunc affectum magio esse proclives. Nos tamen regulam hanc fallacem esse suspicamur.

60

ius

ex

ate

ales

pe-

Me,

cat

nes

No.

qui

tra-

114-

25.

- 6. Alii dicunt puellas frequentius quam masculos hoc morbo laborare, faciliusque curari. Nondum equidem hoc nobis usque adeo compertum est. Concedimus tamen puellas plerumque frigidioris ac humidioris esse temperamenti, cui magis congener est hic morbus, ideoque non est à ratio ne alienum eum sexum leviori de caussa hoc morbo affici posse, & ab eodem quoque facilius liberari.
- 7. Morbus hic potisimum infestat generosorum cunas, prasertim eerum qui molliter vivunt; deinde eorum qui sedentariam & securam vitam agunt; hinc insima plebis, propter varios errores, quos necessitas tam in parentum diæta quain infantium regimine insert, tandem minime omnium cunas eorum qui mediocris sunt fortuna, & qui laboribus ferendis assueti sunt, nequa competenti victu & necessariis ad vitam sustentandam mediis destituuntur.
 - 8. Quo partes primo affecta magis extenuan-

tur, eo morbus, cateris paribus, difficilioris est curationis.

9. Quo enormior est moles capitis, eo longior & difficilior curatio. Itaque os frontis
multum anterius protuberans longitudinem
saltem morbi portendit; similiter etiam aliæ
irregulares cæterorum ossium capitis prominentiæ.

o periculosior est morbus. Quare qui vix libenter erecti sedent, multo magis qui ne erecci sedere valent, & maxime quibus debile collum non sustinet capitis onus de vita periclitantur. Quinetiam à diuturniori debilitate, & inslexione spinæ, pueri modo gibbosi, modo aliter incurvi redduntur, truncusque corporis postea haud sacile denuo erigitur.

tremis tumores morbi longitudinem prasagiunt.
Porro incurvationes osium Tibia & Fibula vel
Ulna & Radii; item inflexiones articulorum
quo majores, eo longiorem ac difficiliorem curationem pranuntiant. Hæ enim non subito amoveri possunt, & masculis exercitiis ob-

eundis impedimento lunt.

12. Quibus offa Crurum & Tibia multum & diu secundum latitudinem seu crassitiem potius augentur, quam secundum longitudinem, hi demum pumiliones plerumque evadunt.

13. Qui

13.

14.

70, pe

15 1901

tur, t

ctus,

4級階

proma

tutioni

(emper

n que

Cant,

tamen tamen

184 77

MINIATI

TRITA!

conju

Dent

Cupan

que p

en fe

trum

1picio

13. Qui crura sursum trahunt, neque ea lubenter extendi patiuntur, dissiculter curantur.

14. Dentes nigrescere aut frustulatim excidere, periculo non vacat, atque id eo pejus est quo

tardius alii in eorum locum succrescunt.

e57

itis

em

liz

-010

TIOT

xli-

ine

de-

vita

de-

odo

tur,

de.

TEX-

ight.

e vo

TENT

CMT A.

to 2.

thi C

potisi bidi

00

15. Qui statum morbi attingunt, quo nempe is non amplius augetur, omnes si recte tractentur, evadunt, nisi forte alius morbus sit conjunctus, aut casu aliquo superveniat, agrumque in augmentum ulterius deturbet. Declinatio symptomatum similiter, sed certius sanitatis restitutionem pollicetur.

16. Hydrocephalus cum hoc morbo conjunctus semper periculum non leve importat. Quod si eo usque pravaleat, ut sutura cranii multum dehiscant, atque in earum interstitiis aqua in capite conclusa duram matrem in mollem & aquosum

tumorem attollant, lethalis est.

17. Dentitio laboriosa, nonnunquam gravisima symptomata secum adsert, mortemque ipsam minatur. Plerumque tamen minus serocit, atque intra paucos dies terminatur. Utcunque, dum conjungitur, multum morbi motum accelerat. Dentes vero Canini, qui oculares vulgo nuncupantur, cæteris molestius erumpunt, plusque periculi portendunt.

18. Asthma (prasertim Orthopnæa, atque ea spirandi dissicultas in qua decubitus in neutrum latus admittitur) valde periculosum. Suspicio enim est tumoris alicujus abscessus,

Empye-

Empyematis, Pleuritidis, Peripneumoniæ aut adnascentiæ pulmonum cum pleura, qui omnes affectus periculosi sunt.

terne

cet Al

percur

inflan

mult

parti

AC TA

tici,

fiften

trone

TABIL

neru

oble

XIIII.

DES!

19. Phthisis cum hoc affectu complicata lethalis ferme est, prasertim si unum idemque ulcus pulmonum ultra 40 dies perseveraverit.

20. Morbus hic diuturnior facile in Phthisin vel Tabem migrat, vel saltem ante obitum.
Tabem sibi comitem perpetuo fere adsciscit, nisi
forte alius morbus aut symptoma grave interveniens accelerata morte Tabem adventantem
pravertat, ut convulsio, tussis clangosa dicta, intumescentia Pulmonum (quam Angli the rising of the Lights / vocant)
febris continua, pleuritis, &c.

21. Hydrops Pulmonum, ut & Ascites, si forte huic morbo associentur, eundem reddunt

deploratum.

22. Febri Hectica, Lenta, Putrida, maximeque continua partes primo affectas depascendo, hujus morbi motum vehementer accelerant, eumque periculosum essiciunt.

sive hareditaria, sive ex contagio contracta difficilem admodum, si ullam, curationem ad-

mittit.

24. Scorbutus complicatus multum quoque difficultatis in curatione secum adfert, licet minus quam Lues venerea.

25. Struma sive externa, sive minores in-

terna non ex se tantopere obstant curationi, licet alias ipsa aliquando in hac atate difficillime
percurentur. Externæ enim exulceratæ, aut
inflammatæ simulque dolorisicæ, vehementer naturam lacessunt, viresque dissipant,
multo autem magis internæ, præsertim si
partes nobiles occupaverint, aut ipsa mole
vicinis partibus molestæ suerint.

completum non persecte sanantur, postea miseri ac valetudinarii serme vivunt, & vel Asthmatici, vel Cathectici, vel Phthisici sacti ante consistentem atatem moriuntur, vel saltem gibbosi, nani, curvi, aut aliter desormes postmodum su-

persunt.

XI-

nota

ACIA

esis

27. Scabies & pustula in cute, pruritusve, huic morbo supervenientes, ad curam ejusdem

multum conferunt.

28. Qui facilius tolerant omnimodam jactationem corporus, cateris paribus, facilius curantur.

Atque ita tandem absolvimus trium generum signorum, quæ hactenus in nostram observationem occurrerunt, historiam. Proximum est ut ad methodum praxeos, quæ præcautionem & curationem hujus morbi complectitur, deveniamus.

CAP. XXIV.

Methodus ad Praxin, tum Indicationis in genere. medi

julqı

poli

ftun

hice

tici I

non

preti

tinea

M Ethodus ad praxin in Θεραπόθικήν & σερφυλακτικήν, in partem Curatricem & Prafervatricem dividitur. De priore nobis hoc capite agendum, quamvis forte hic quoque nonnulla in genere proponenda fint, quæ cum Prophylacticæ, tum υρευή fint communia. Prophylacticen autem in specie ad calcem hujus tractatus refervamus.

Pars Curatrix appellari solet Methodus medendi, cujus, ut cujuslibet alius Artis, duo funt generalia instrumenta, Ratio scilicet atque Experientia; quarum conjugium omnem artificis peritiam exhaurit. Per experientiam autem intelligimus non tantum historiam morbi unius aut plurium, successusque medicamentorum; sed & observationem, hoc est, applicationem historiarum ad ea, que in eodem affectu dictat ratio, idque per viam comprobationis vel improbationis. Similiter per Rationem omnem mentis operationem volumus, ita, ut non tantum tertiam nempe ratiocinationem seu demonstrativam, seu probabilem & analogismum, verum insuper & primam & lecunfecundam, hoc est, simplicem apprehensionem tum compositionem ac divisionem hoc instrumento complectamur. Etenim, pars hæc medicinæ præsupponit Physiologiam, Pathologiam, & Semeioticem, quæ certe uniuscujusque operationis intellectus exercitium multifariam exigunt. Deinde, nemo aliquam propositionem intelligat, qui non prius simplices ejusdem terminos apprehenderit; neque syllogismum, qui ignarus suerit propositionum è quibus constatur: ut manifestum jam sit omnem mentis operationem hic exerceri.

di.

IXXI

Or.

PO-

re-

icet

om.

hoc

218

0171-

Ra-

ILLS ,

ilen

W.

Indicatio, Evdeigis, nobile illud methodi medendi instrumentum, (cujus usu Dogmatici sectam suam ab Empiricis maxime discriminari volunt) partibus Rationis etiam venit accensenda. Quandoquidem autem nonnulla cum difficilia tum obscura occurrunt circa hoc instrumentum ab ipsis neotericis vix dum enodata & illustrata, operæpretium duximus hic paucis examinare.

I. Quid fit Indicatio?

II. Ad quam intellectus operationem per-

III. In que genera & differentia distri-

Quod ad primum attinet, licet forte plu- Quid Interes hujus nominis significationes apud Au- dicatio.

tores occurrant, illa tamen prima & maxi-

me propria est quam tradit Galenus Meth.
Med. 7 Evdeis ist empaois the anologias.
Indicatio est infinuatio seu declaratio consequentia, id est, rei agenda. In hoc sensu desiniti & describi potest indicatio, Actio objectiva Indicantis relative considerati qua reprafentat intellectui Indicatum, hoc est, quid consequendum, quid sugiendum sit. Ut desinitio hac seu descriptio clarior reddatur, expendamis ulterius quid sit Indicans? quid Indicatum? qualis sit actio Indicantis? quo spectet dissinctio Indicati juvantis & nocentis, sive prosequendi & sugiendi?

tes & scientias possit; cum tamen hactenus industria medicorum (præsertim Galeni) soli methodo Praxeos approprientur, eorum definitiones, quæ hic exhibendæ, hanc solam methodum, omisso omni alieno eo-

rum usu, respiciunt.

Quid In-

Generalis igitur Indicantis definitio à natura generalissima, quæ in nostra arte indicat, petenda est. Definiri ergo potest Indicans in genere, status corporis quæ sluxilis, vel mobilis, seu potius, qua actu est in sluxu vel motu, relative consideratus, prout insinuat quid sit agendum sui causa.

Dicimus primo Indicans semper aliquem

ftatums.

flatum quod

cit, ci

ris, h

go ex

non possit

pons

qua a

requi

Gal.

mmu

ti me

contu

tas ip

ac flu

parte

medi

Atular

pertin

tus co

confic

refult

gendi

illum

flatin

que

quip

motu

764

ufe-

ofe-

ltio

en-

ica-

110-

nds-

ar-

nus

eni)

60-

200

60.

10 2

ein-

111-

ilis,

myel

quid

STEPRE .

statum vel conditionem corporis innuere; quare quod extra corpus est, ac nondumid afficit, cum non sit conditio seu status corporis, haud recte dicitur indicare. Causa ergo externa; & nondum corpus afficiens, non est Indicans, licet forte ejus aversio possit esse Indicatum. Secundo status corporis qua fluxilis, vel qua mobilis, seu potius qua actu est in motu, ad essentiam Indicantis requiritur. Etenim ut luculentissime probat Gal. 1. ad Thrasyb. si corpus nostrum esset immutabile & perpetuum, nullus locus Arti medicæ relinqueretur: ast vero cum calor continue humidum depascat, cumque sanitas ipfa vel in statu perfectissimo fragilis sit ac fluxilis, immo actu fluens, & ex aliqua parte jam defluxit, patet subsidium Artis medicæ officiumque medici practicum postulari. Tertio ad Indicantis etiam naturam pertinet relativa ejus consideratio. Nam si status corporis ejusve mutatio absolute tantum consideretur, nuda tantum speculatio inde resultat; sin vero in ordine ad id quod agendum est, quo medicus officio suo circa illum statum recte fungatur consideretur, statim instrumentum practicum evadit, atque Indicantis naturam induit. Indicat quippe ejusmodi status qua fragilis & in motu est, omni modo sanitatis habendam esse rationem, eamque esse assequendam. AdeoAdeoque quod generalis medici scopus querebat, hoc ipsum generale Indicans commonstrat. Non autem exspectandum est, ut consideratio generalissimi Indicantis quidquam aliud repræsente quam actionem generalissimam scopo generali respondentem. Si vero medicus particularem scopum ulterius prosequi voluerit, oportet ad Indicantia particularia magis descendat.

dicam,

tem, Et

que ac

recte a

tem 1

mm a

eft,ne

ex pa

ulteri

decer

prohil

poten

ter re

potest

guitur

tur au

mater

veler

contra

fubdiy

conf.

five at

26fqu

CITCHE

done

chum

COMETE

ments

gratia

autem actionem.

II. Indicatum est Actio medica ex parte dicatum. Indicantis requisita. Nam primo & formaliter Indicans denotat actionem, secundario vero & per consequentiam instrumentum, quo actio perficitur. Itaque appendicis loco addamus propositæ definitioni, quod secundario, ex consequenti atque in concreto, includat instrumentum, quo ista actio exercetur.

I. Dicimus Indicatum esse actionem. Eo enim fine Medicus utitur Indicatione, ut inde quid agendum sit, eliciat. Dicas, instante crisi aut ea legitime procedente; ipsum Indicatum esse abstinentiam ab actione, non

Respondemus, Abstinentiam hanc eo iplo quod consulto & secundum artem imperatur, sub aliquali notione actionis medicæ evidenter contineri: atque idem dicendum est de quavis actionis in arte nostra prohibitione.

II. Dicimus Indicatum este actionem medicama

dicam, hoc est, actionem ad sanitatem facientem. Etenim sinis Medicinæ sanitas est; ideoque actio illa quæ ad sanitatem collimat,

recte actio medica nuncupatur.

,ut

iid-

ge-

em.

ilte-

an-

arte

nali-

ario

um,

000

CUN-

udat

, ut

non

im-

edi-

(CEI)+

oftra

(ATT)

III. Dicimus Indicatum esse actionem saltem respectu Indicantis requisitam. Omnis enim actio Indicata non statim exequenda est, neque dici potest simpliciter, sed tantum ex parte Indicantis requisita; quocirca ea ulteriori examini subjicienda est priusquam decernatur exercenda: & si neque vires prohibeant, neque aliud contra indicans potentius repugnet, tum demum simpliciter requisita est, suoque tempore, siqua sieri potest, exequenda. Atque hinc recte distinguitur Indicatum in inutile & utile. Redditur autem Indicatum inutile vel ex defectu materiæ medicæ, qua id exequendum est vel ex præsentia validioris Prohibentis; aut contra Indicantis. Indicatum utile adhuc recte subdividitur in circumstantiatum & non circumstantiatum. Indicatum circumstantiatum sive actio rite circumstantiata quamprimum absque mora exequenda est. Indicatum noncircumstantiatum tam diu differendum est, donec debitas circumstantias perfecte nactum fuerit. Dicimus quarto Indicatum concrete & secundario includere quoque Instrumentum, quo actio Indicata perficitur. Verbi gratia, status sanitatis indicat primo & formali-

oo rat

Indica

quamo

nones

cieft

ta rati

rumq

talia

Deni

circun

officiu

las hu

telcun

Prz

action

verfin

quid }

quoqu

nun II

Scopi d

las inq

& 165

nis ni

L, 19

ci off

diffin

anet,

merat

MALETI

maliter actionem conservandi eam secundario vero & per consequens indicat simul instrumentum, quo eam conservemus, viz. similia. Hæc transitio Indicationis ab actione ad instrumentum non videtur pendere à sola virtute Indicantis, ast ex parte etiam à generalibus quibusdam certisque & vulgo receptis principiis, similia similibus conservari, contraria contrariis curari; ideoque consulto diximus instrumentum ejusmodi esse secundarium Indicatum, & per consequentiam illatum, & quod simul actionem cum instrumento includat Indicatum esse concretum.

Cognatio officii medici one Indicata.

Porro, quum officium medici practicum magnam habeat cognationem cum actione cum acti- Indicata; quousque hæc conveniant, & qua ratione inter se differant, hic consideremus. Officium medici generale est, assequi, quantum fieri potest, finem artis suæ, nimirum sanitatem. Atque eadem assecutio sanitatis propemodum est generalissima actio Indicata. Hæc tamen eo distinguitur à generali medici officio, quod assecutio sanitatis non perpetuo sit possibilis. Quamvis ergo asse. cutio faniratis semper indicetur; quando tamen ea impossibilis est, non obligat medicum, cum nemo teneatur præstare impossibilia, adeoque nulla pars est ejus officii. Similiter actio indicata aliquando inutilis est

ob rationes modo allatas, in quo casu non pertinet ea ad officium medici. Ad hæc, actio Indicata, utilis licet suo loco sit exequenda, quamdiu tamen incircumstantiata manet, non exhaurit officium medici. Etenim medici est non tantum utilia in specie, sed & habita ratione temporis ordinis, modi, cæterarumque conditionum justæ administrationis talia opem ejus implorantibus præscribere. Denique actio Indicata utilis, omnibus suis circumstantiis debitis stipata vere exhaurit officium medici. Hujusmodi quippe, & solas hujusmodi actiones (faltem ubi eæ inno-

tescunt) tenetur medicus exequi.

in viz.

con-effe

uen-

cum

con-

icum

Fione

quan-

rum

Præterea scopi sive intensiones medica, cum Collatio actiones Indicatas; tum officia medici di- urriulque versimode respiciunt, & cum utrisque ali- pis mediquid habent commercii, quo respectu hic cis. quoque veniunt leviter consideranda. Verum in ipso hujus discursus limine videntur scopi distingui posse in notionales sive formulas inquisitionis circa quodvis officium medici, & res ipsas quarendas. Formulæ inquisitionis nihil aliud sunt quam apta quastiuncula, vel interrogationes, quæ quodvis mediota- ci officium in tot partes resolvunt, quot distincte inquirendas & examinandas conpossitionet. Novem hujus generis formulas enumerat Argenterius, 1. An? 2. Quid? 3. Qua isel materia? 4 Quantum? 5. Quale? 6. Quo modo?

7. Quan-

7 Quando? 8 ubi? 9 Quo ordine agendum? Alii has ad pauciora capita contrahunt, de qua re consulantur Autores, Scopi reales sive res ipsæ quærendæ sunt partes ipsæ, in quas quodvis officium medici apte distingui potest, suntque idcirco totidem numero, quot in ilto officio reperiuntur partes distinctæ inueniendæ aut examinandæ. Hi scopi jam inventi, non re, sed sola ratione ab iis quærendis discriminantur, respectu nempe diversæ relationis ad intellectum quærentem & actuintelligentem. Ex his patet, quam cognationem habeant scopi cum officio medici, & actionibus Indicatis. Etenim scopi notionales sive formulæ scoporum, & res iplæ sub illis formulis quærendæ in eandem metam collimant, viz. distinctam omnium partium cujusvis officii medici inventionem: Verum res quærendæ sunt partes ipsæ officii à se invicem facilioris inventionis aut examinationis gratia apte disjunctæ.

Porro illæ partes hujus officii, quatenus sunt vi indicationis inventæ, ipsæ sunt actiones Indicatæ; ita ut scopi ex Indicatione inventi, & actiones Indicatæ realiter idem significent. Dicimus realiter, quod scopi etiam inventi qua scopi abillis ratione disserant, quandoquidem præter actiones Indicatæs videntur connotare intentionem easadem actiones prosequendi, sicuti scopi non-

dum

dum 1

mtelle

aliqui

ter le

(quat

plicat

tione

THUS, 1

altern

dicati

ad Inc

ulus a

tur?

instru

fcient

nim i

tuten

faifa

filtie !

action

term

quat

coni

dicar

dum inventi innuunt intentionem in illas

inquirendi. Atque hæc de Indicatis.

III. Actio Indicantis objectiva est, & Indicans, ut objectum prater seipsum, Indicatum intellectui, quodammodo infinuat. Miretur forte aliquis, qui eveniat, ut objectum aliud quid pre-

ter se ipsum reprasentet.

es

dz

di-

tem

lam

tedi-

no-iplæ

me-

par-

em:

offi-

aut

enus

ctio

iden fcop diffe Ind

nes

not

de

Resp. Eam esse naturam relativorum, ut (quatalia) concipi non possint absque implicatione suorum correlativorum. Etenim relativum aliquod in propria fua confideratione oblique saltem involvit naturam alterius, ideoque facile intellectum deducit ad alterius cognitionem. Dicat aliquis, fi Indicationis vis in mera relatione Indicantis ad Indicatum fundetur, qui fiat quod ejus usus ad solam artem medicam restringatur?

Resp. Nos non negare, quin usus hujus instrumenti extendi possit ad alias artes & scientias, ut supra quoque monuimus. Etenim in morali philosophia licet dicere virtutem indicare sui protectionem, vitium suisuppressionem. Neque vero tantum confistit hujusmodi relatio inter status rerum, actionesque eosdem spectantes, sed & inter terminos mere speculativos: ut bis duo sunt quatuor; homo non est equus. At vero hic confideramus Indicatione & efficaciam Indicantis tantummodo in ordine ad methodum

dum medicinæ, ut hic non opus sit hujus instrumenti suum ulterius extendere, quod neque fecit Galenus, cum id ad ejus scopum parum contribueret. Asserimus tamen non quamlibet relationem sufficiens esse fundamentum Indicationis, sed oportet sit talis, quæ evidentem præ se serat conformitatem & congruentiam inter indicans & Indicatum, unde in propositionem indubitatæ veritatis apte componantur; seu disparitatem & repugnantiam eorundem inter se; unde à se invicem apte dividantur, hoc est, in propositionem negativam æque certam disponantur. Quod autem propositiones hac Indicatione elicitæ sint certæ & evidentes, neque ulteriori probatione opus habeant, ex eo elucescit, quod quivis intellectus sui compos, nulloque præjudicio occæcatus, neque scepticis nugis ac fallaciis de Induftria irretitus, necessum habeat iis mox assentiri ubi earum terminos intellexerit. Quinetiam ipsisceptici, licet inter disputandum quamlibet veritatem, ut ut manifestam, susque deque habeant, & certissima quæque principia rebus quam maxime dubiis æquiparare satagant: in vitæ tamen munis obeundis dum inediæ succurrunt assumpto cibo, dum pecunias sibi annumerant, dum plagas fugiunt, atque hæc & similia constanter absque ulla mentis fluctuatione agunt, gunt, ammi victor quam

verita

Indicac in canti

præl dicifi nes, ut &

morb etiam quid

gefail inæ fe Non foluta

ti; for tuam aut an inter

ri po indic

fitam

on

da-

IS,

em

02-

ven&

eà

10-

po-

es,

fui

rus,

x2[-

tit.

211-

2011,

biis

mis

pto

dum

-1100

e a-

unt,

gunt, satis testantur se ex prava quadam animi dispositione vel gloriolæstudio, vel victoriæ in contentione spe duci potius quam reipsa de istiusmodi propositionum veritate dubitare. Interim hic notandum est, Indicationem ipsam necessario fallacem esse ac infidam, ubi absoluta natura vel Indicantis vel Indicati prius non exacte cognita fuerit. Etenim in hac Indicationum arte, præsupponimus semper medicum antea didicisse probeque nosse quid sint res illæ omnes, quas fecundum naturam nuncupamus, ut & in quo consistant morbi essentia, omnesque ejus partes, nec non causas omnes morbi perspeccas habere: immo necesse est etiam sciat cunctas medicas actiones, puta quid sit alteratio, quid calesactio, quid frigefactio, &c. quid evacuatio, purgatio, venæ sectio, &c. quid conservatio, & similia. Non enim Indicatio manifestam reddit absofolutam naturam vel Indicantis, vel Indicati; sed hæc prius nota præsupponens, mutuam tantum relationem repræsentat, viz. aut arctam connexionem & conformitatem, quam inter se habent, vel disparitatem & oppositionem, unde in propositionem certam formari possint. Verum certitudo propositionis indicatæ non potest superare certitudinem cognitionis Indicantis. Siquando igitur hesitamus de certa naturæ Indicantis notitia, VIX

vix tutum est soli Indicationi sidere, donec alio ratiocinio ut analogismo, vel experientia ulterius ea confirmetur. Sed hæc dubitatio, non naturæ Indicationis, ast ignorantiæ rei Indicantis tribuenda est.

Adhæc, sciendum est relationem indicantis in methodo Praxeos, præter evidentiam, connotare etiam quid debiti aut requisiti officii respectu actionis Indicata, propositionelque ex Indicatione formatas istud debitum infinuare vel explicite, vel saltem implicite. Ut in hac propositione; morbus indicat sui ablationem; decernitur ablatio, ut actio requisita ex parte Indicantis scilicet morbi, ac si diceretur, morbus requirit seu postulat sui ablationem; exprimitur autem frequentius & forte elegantius hoc debitum actionis officium per participium in dus, ut, morbus est tollendus: quæ propositio manifelte significatione coincidit cum prioribus.

Object.

Objectio, quadam circa actionem Indicantis restat adhuc solvenda. Nimirum, si Indicatio sit ipsa Indicantis actio, quomodo vocari possit operatio Iutellectus? omnes enim Indicationem ad aliquam intellectus operationem referunt.

nem Indicationem esse quidem actionem Indicantis, sed objectivam, eamque uniri facultati Intellectivæ, arque in eadem

effe

elle q

elle p

& qua

mis,

Aire

ferti

fi for

lenu

dica

defi

actio

fere

fugi

perp

tant

11.

tent

VIde

nu

con

Cat 1

TIDE

nec

[pe

lec

ut

cet

eu

em bi-

in

100

(41)

14.

16-

esse quasi in subjecto: porro intellectum esse potentiam, & ab objecto suo actuari, & quasi informari. Quare actio Indicationis, licet objective tribuatur Indicanti, subjective tamen tribuitur Animæ ejusque præssertim intellectivæ parti, cujus actus & quasi forma est. Atque hinc facillimum est Galenum sibi ipsi conciliare ubi aliquando Indicationem empaon, aliquando nalannin definit.

IV. Examinandum est quo respiciat illa actionis Indicatæ distinctio in actionem conferentem, & nocentem, sive prosequendam & sugiendam. Urgeat enim aliquis Galenum perpetuo affirmare ab uno Indicante unum tantum insinuari Indicatum; & in l. Meth. II. asserere eos frustra Methodum curandi tentare, qui unum ab uno Indicari ignorant: atque omnes qui de hac materia scripserunt, videntur idem attestari.

Resp. Galenum intelligendum esse de tribus distinctis Indicantium generibus, quæ nullo modo sunt consundenda, ut neque eorum Indicata. Quod enim proprie indicat morbus, non tribuendum causis aut viribus; similiter quod indicant causæ, non applicandum id vel viribus, vel morbo ipsi; denique quod vires indicant, nec morbo neque causis sadscribendum. Hoc enim respectu uni Indicanti unum Indicatum respondet,

spondet, & qui hoc non observat, necessario omnia confundit, frustraque secundum Galeni mentem hoc instrumento in artis operibus utitur, veruntamen sciendum est, in quovis genere prædicto, Indicatum in duas partes dividi posse, quarum altera actio conferens & prosequenda est, altera noxia & fugienda est; utraque vero ad idem genus è tribis dictis pertinet, & quasi media pars est totius Indicati: Nam vires jubent eligere ea, quæ illas tueri queant; ea vero vitare, quæ illas amplius lædere apta sunt, & utraque actio concurrit ad completam confervationem præstandam. Similiter cum in curatione, tum in præservatione reperitur actio tam prosequenda, quam sugienda: neutra tamen excedit sui generis terminos, ut nulla inde confusio metuenda sit. Dum enim curamus, ea eligimus quæ morbum demoliuntur; ea fugimus, quæ illum fovent. Similiter dum præservamus, causas tollimus, & easimul cavemus quæ quovis modo ad earum continuationem aut repullulationem contribuunt. Atque ob hanc racionem in definitione Indicationis supra data, distinguimus actionem Indicatam in prosequendam & fugiendam: quod idem quoque in enumerandis particularibus hujus morbi indicationibus facturi sumus.

Ad quam Tempestiyum jam est ut ad secundum

quæ-

quam (pect

nem

benfi

CALL

tion

enin

Ind

Yam

polit felta

ne,

Tra

785

tur,

YOU

Cath

COD

DIS

dic

dam

12-

tis

in

sè

eft

re,

12-

in

2:

quæsitum ab initio propositum, viz. ad intellequam intellectus operationem Indicatio rationem spectet, transeamns. Dicimus I Indicatio- Indicatio nem quodammodo includere simplicem appre-pertineat. hensionem utriusque termini, Indicantis & Indicati. Nemo enim propositionem intelligat ignotis terminis ejus fimplicibus. Verum hæc cognitio tantum præparatoria est, & præsupposita in arte Indicationum, ut supra quoque notavimus. Dicimus secundo compositionem & divisionem esse explicitam operationem intellectus in perceptione Indicationis. Etenim Indicans vi relationis suæ repræsentat Indicatum secum in propositionem relativam apte connectendum. Quod vero propositio sic conflata natura sua adeo sit manifesta & evidens, ut de ejus veritate dubitari non possit, neque ulteriori egeat probatione, expresse dicit Gal. - καλαλήψει ανευ τηρήσεως ή λομομέ, Item l. de opt. Sect. ad Traf. c. 11. - ล้งยบ รักษอย์เรียพร, หญ่ สาริสτηρήσεως. Hic aliqui Galenum calumniantur, quasi artem extruxisset ab omni ratione & experientia alienam; cum tamen nil aliud voluerit Galenus quam propositiones Indicatione elicitas per se certas esse, neque comprobatione seu experientiæ seu rationis indigere. Objicit quidem Sennertus Indicationem pertinere non posse ad secundam mentis operationem, quod Indicatum neque

ganter polita

alia

antid

refer

9000

Priu

Indi

prop

cet 1

COM

nece

Clat.

Ratu

quod

tions

titiz

Ma,

falter

Catur

plici

can

med

Canti

neque affirmetur neque negetur de Indicante. Sed videtur vir doctiffimus in hoe lapsus. Licet enim directe, & per nudum verbum substantivum sive copulam (est) forte neque affirmetur neque negetur Indicatum de Indicante; indirecte tamen & in casu obliquo maniseste de eodem prædicatur eo modo, quo fieri solet in propositionibus relationis; v. gr. Indicans est Indicati Indicans; vel status sanus est sue conservationis Indicans; status morbosus est remedii Indicans, &c. Et si quis velit exprimere Indicatum cum relatione sua ad Indicans per participium in dus, ejus prædicatio erit directa: Ut, status sanus est conservandus; status morbosus est curandus; morbus est tollendus, &c. Si negare possit doctissimus Sennertus has esse propositiones, pari facilitate negaverit Indicationem spectare ad hanc operationem intellectus; sin necesse habeat illud consiteri, etiam hoc una agnoscere tenetur. Asferuimus vero Indicationem explicite spectare ad secundam mentis operationem, quodintellectus, quoad ordinem temporis, fimul comprehendat mutuam relationem Indicantis & Indicati, indeque propositionem conficiat, quæ propositionis formatio ipsa est Indicatio, atque explicite secunda Intellectus operatio. Quod autem intellectus simul tempore Indicans & Indicatum catum in Indicatione complectatur, eleganter exprimit Galenus ficta voce de compolita, qua in ejus definitione utitur,
— συμωροσήπθεσα κατάληψε. Item in
alia definitione, — συμωροσήπθει π

συμφέρον.

di

00

m

A)

In.

80

di-

01-

di-

VA-

INa

In-

per

ire-

titis

Sic.

has

rerit

nem

onfi-

Af-

fpe-

em,

oris,

nem

itio-

ma-

le-

item

ndi-

tun

Dicimus 3 Indicationem implicite quoque referri posse ad tertiam Intellectus operationem: quoniam ordine Naturæ videtur Intellectus prius evidentem relationem Indicantis ad Indicacum percipere, quam de certitudine propositionis inde resultantis concludat, licet ordine temporis hæc simul Intellectus complectatur, ut modo dictum, neque necesse sit explicitum syllogismum conficiat. Nam revera potest intellectus simul tempore comprehendere ea, quæ ordine naturæ successiva dicantur, ut solem & lucem, ignem & calorem, &c. Eo ipso vero quod hæc simultanea comprehensio Indicationis includit dependentiam quandam notitiæ Indicati à relatione Indicantis percepta, supponit quoque relationem dictam faltem ordine naturæ prius percipi, Indicatum vero posterius & per illationem implicitam innotescere. Nam transitio quædam, respectu ordinis naturæ, hic implicari videtur à relatione Indicantis, tanquam medio termino, ad propolitionem ex Indicante & Indicato conflatam tanquam ad

conclusionem; quæ implicita quædam an-

Dic

fe, quo finplica cessario

Belli.

Гирро

DI EXT

tiout

habet

jus It

dium

menta

Cation

tiuste

гедин

tram o

cet er

ment

comp

cia ett

Di

fecie,

DENT OF

ablqu julyis

more

In a

tas a

Tia ,

gmentatio dici potest.

Dicimus 4 Posse per ambages Indicationem reduci ad explicitam augmentationem sive syllogismum, seu potius, idem quod Indicatione assequimur posse etiam per viam syllogismi inveniri & comprobari. Nam ratio evidentiæ propositionis Indicatæ explicite applicari potest, ut medius terminus ad istam propositionem inferendam. Interim syllogismus sic confectus vel mere nugatorius, vel ad summum tantum explicatorius erit. Ut si quis vellet probare morbum esse tollendum, sic procederet. Quod est contra naturam est tollendum; morbus est contra naturam; ergo morbus est tollendus: medius terminus (quod est contra naturam) est ratio relationis morbi ad sui ablationem, sed tantum est expositorius generalis naturæ morbi. Quisquis enim intelligit quid sit morbus, necessario simul concipit esse quid præter naturam Ideoque talis syllogismus tantum expositorius est. Non tamen eum semper inutilem putamus, cum ad convictionem pertinacis, vel informationem ignorantis aliquando inserviat. Huc quoque referre possumus tranflationem Indicationis ab actione ad instrumenta virtute generalium regularium, similia similibus conservantur, contraria contrariis curantur; quæ supra quoque memorantur. Dici-

Dicimus 5. Collationem Indicationum inter se, quo ex consensu & dissensu Iudicantium quid simpliciter & absolute agendum sit eliciamus, necessario involvere tertiam Intellectus operationem. Etenim limitatio cujusvis Indicationis Supponit medium terminum isti Indicationi extraneum, quo prius intellecto limitatio ut conclusio infertur. Qui enim necesse habet (quo de veritate propositionis alicujus statuat) terminum extraneum ut medium consulere, hic certe manifeste argumentatur. Cum ergo ad limitationem Indicationis præter Indicans & Indicatum tertius terminus ejusque consensus vel dissensus requiratur, patet ad ejus inventionem tertiam operationem Intellectus postulari. Licet ergo simplices Indicationes prima rudimenta Methodi ad Praxin subministrent, ad complementum tamen artis ratiocinatio focia est adsciscenda.

4-

10-

DO-

oli-

slic

um-

SILL

mir a

dest

orbi

poli-

quis

Pario

Iram

tilem

nacis,

doin-

tran-

Atro-

mili

is co

Dicimus 6. Electionem materia medica in specie, ejusque aptam administrationem non tantum omnem operationem intellectus, sed & insuper postulare experientiam. Etenim quis absque hac dosin scammonii alterius cujus in medicamenti purgantis, quosve humores in specie educat, satis intelliget? In alterantibus etiam lateat sorte qualitas aliqua non explorata, ægrotanti noxia, quæ sola experientia percipi possit.

Statuimus ergo (Indicationum propria vi usuque servatis) ad completam medicinæ methodum requiri quidquid ratio, quidquid aigui

opera confer

dame

dat,

plicat

ut vi

genti Cont

aion

cetur, Corre

nj uni

cum

junga

verils

tis, I fervat

Corre

frum

polita

tham

Con

mitio

cibo

tibus

jung ipla ftind

experientia contribuere possint.

Differencationu.

Procedendum tandem est ad tertium titiz Indi- tulum ab initio propositum, in quæ scilicet genera & differentias Indicatio distribuatur. Differentiæ quidem è supra dictis facile elici possunt, quas hic propterea omittimus. Hic autem distinguimus Indicationem in genericam, subalternam, & specificam. Generica à generali Indicante petitur, subalterna à generibus Indicantium intermediis, specifica ab infima eorum specie. Supra notavimus generale Indicans effe iplum statum corporis in genere consideratum, qua fragilem & in motu: status hic indicat sanitatem esse assequendam, quæ generalissima est actio medica, & generalissimum Indicatum. Verum tamen hæc actio quodammodo concreta est, & duas æque generales actiones in abstracto includit, scilicet Conservationem & Correctionem. Quippe status generalis prædictus etiam concretus est, duasque similes considerationes in abstracto complectitur, alteram nimirum partium secundu naturam adhuc se habentium, quæ puram putam conservationem postulant; alteram partium de integritate sua nonnihil jam lapsarum, quæ similiter puram putam correctionem exigunt.

Duo Indicata abstracta generalistima.

vi

ina quid

Ket

elici

Hic

nett-

ica à

ge-

citica

imus

orpo-

m&

n effe

actio

Ve-

COE-

ones

ionem eralis

fimi

lecti-

natu-

outari

rtiun

runi

0000

gunt

exigunt. Hæ duæ actiones in omni artis opera perpetuo conjunguntur. Qui enim conservat, simul corrigit, hoc est, vitia quædam emendat, & qui corrigit seu vitia emendat, simul Conservationi prospicit. Complicatio harum actionum adeo est, subtilis, ut videatur imposuisse ipsi acutissimo Argenterio qui l. 1. de Off. med. c. 2. affirmat Conservationem esse ipsam illam Correctionem, quæ in arte tuendæ sanitatis exercetur. Verum dupliciter errat. 1. Quod Correctionem & Conservationem in vyesvy unam & eandem actionem esse putet, cum re ipsa duæ sint distinctæ, ut ut conjungantur in artis exercitio. Etenim à diversis considerationibus generalis Indicantis, ut modo dictum, indicantur, & Conservatio respicit ea quæ sec. naturam sunt; Correctio vitia Naturæ. Quinetiam per instrumenta formaliter distincta, immo opposita perficiuntur. Nam Correctio inipsa etiam arte tuendæ sanitatis per contraria, Conservatio per similia peragitur: Ut, inanitioni in hac arte succurrimus assumpto cibo, inanitioni quidem contrario, ast partibus nutriendis simili; Quamvis ergo conjungantur hæ actiones in executione, re ipsa tamen formaliter distinctæ sunt, & distincte ab intellectu concipiendæ. Secundus error Argenterii, quod folum Correctio-X 2 nem

nem vitiorum generalem actionem totius Medicinæ esse contendat, cum Conservatio æque sit universalis pariterque in omni

m; 3

eft, 9

Artis

duz fi

bus pa

mius p

Quare

quis

neral

Scopu

dicz .

tuillet

rei po

tionis.

totius

indeq

vatio

tur,

nem q

to pra

tioest

miner

ea me

pullo

Arua

tio !

indic

tota:

Vatio

Medicinæ parte exerceatur.

Nemo dubitat quin in vyoevy conservemus: quod vero fimul corrigamus, demonstrat Galenus L. ad Thrasyb. & lib. An res tuenda sanitatis ad medicum pertineant. Dicas Gal. ibi probare omnem actionem medicam esse Correctionem, ipsamque Confervacionem sub latitudine Correctionis comprehendi. Non tamenita accipiendus est Galenus, quasi vellet Correctionem esse genus Conservationis, cum, ut modo monstravimus. Conservatio & Correctio vel in hac arte tuendæ fanitatis fint formaliliter diversæ & contra distinctæ actiones: id vero tantum voluit Galenus omnem actionem Medicam, quando actu administratur, in se Correctionem includere, eoque respectu Correctionem appellari posse, adeoque Correctionem esse generalem actionem totius Medicinæ: non tamen negat Gal. quin conservatio sit æque generalis. Quid enim prohibeat duas esse generales actiones abstractas in Medicina? Non id destruit, si quis forte putet, unitatem Artis; quin potius eam confirmat. Unitas enim Artis in communitate aliqua, quæ omnibus ejuldem partibus tribui potest, consiflit?

otius erva-omni

TYC-

non-

nres

Di-

con-tionis endus onem nodo rectio mali-

nnes: nnem mini: , eo-nosse,

m 2.

n ne-

Not

COBI

stit; atque eo firmior unitas hæc cenfenda est, quo pluribus communitatibus omnes Artis partes inter se connectuntur. Si ergo duæ sint actiones generales, eæque omnibus partibus Medicinæ communes, eo firmius partes ista in unam Artem coalescunt. Quare non repugnat ratiocinio Galeni, fi quis dicat conservationem quoque esse generalem actionem totius Medicinæ; cum scopus Galeni tantum fuerit ostendere Medicæ Artis unitatem ex communitate istius generalis actionis, viz. Correctionis: potuisset autem id æque ostendisse, si natura rei postulasset, ex communitate Conservationis. Etenim in Ynewy nobilissima pars totius concretæ actionis est Conservatio: indeque tota actio à potiori parte Confervatio, & Ars ipsa Conservatrix denominatur, licet alias, ut dictum est, Correctionem quoque includat. In Prophylactica vero præcipua pars actionis Medicæ præfervatio est, scilicet Correctio causæ morbi imminentis: ita tamen hæc perficitur, & per neraea media, quæ vires præsentes permittant, nullo autem modo per ea quæ easdem destruant. Ideoque in Prophylaxi quoqueratio habetur virium, earumque conservatio indicatur. Verum à potiori similiter parte tota actio concreta (etsi, ut dictum. Conservationem quoque includat) Præservatio & Præ Præcautio appellatur. Denique in Therapeutica, licet similiter tota actio concreta Curatio, & ipfa Ars Curatrix à principe actionis parte denominetur; reipsa tamen tota hæc actio Curandi in tres partes abstractas beneque distinctas dirimi potest: in Curationem causæ, in Curationem morbi, & Conservationem virium. Vitalis quippe sive Conservatrix Indicatio ad hanc quoque Medicinæ partem evidenter & omnium consensu spectat, & in omni Curativa actione priusquam ea exequenda est, consuli debet. Unde patet hanc etiam partem Medicinæ perpetuo conservare, hoc est, in omni Curatione prospicere, ne vires à remedio præscribendo plus detrimenti capiant, quam emolumentum id est, quod per morbi ej sfve causæ à remedio impugnationem iisdem accidit. His omnibus igitur perpensis, concludimus generale Indicatum Concretum quid esse, apreque distingui in duas generales actiones abstractas, quæ in omni parte Medicinæ exercentur, idque in Artis opera unam actionem completam sive complexam perpetuo conficere.

Porro generale Indicans, viz. status corporis, qua fragilis & in motu, præter partes sive considerationes abstractas jam propositas, dividi potest in tres species, seu potius tria genera subalterna pariter concreta:

scil.

fal. i

8 110

datti

mirun

giego

Tres

funt

9400

Artit

DUS,

mort

neute

ngen

hæc

coru

in ab

rection

tion

atque

nera

in tr

quz

ram

fpec

bie

fun

eta

pe

len

£:

-101

110-

m

tio-

de-

edi-

mni edio

12m

js.

dem

con-

nera-

parti

TEX!

pa pa

scil. in statum sanum; in statum morbosam; & neutrum. Hæ tres species ipsa sunt subjecta trium specierum Methodi ad praxin: nimirum status sanus, Ynewns; status morbosus, Jeegen Wixis; status neuter, σεοφυλακλικής. Tres hi status etiam concreta Indicantia funt, & concrete quid sit agendum, vel quodnam sit officium Medici in singulis istis Artibus respective indicant: viz. status sanus, sanitatem esse conservandam; status morbosus, morbum esse tollendum; status neuter, morbi imminentis causam esse corrigendam, ne in morbum erumpat. Atque hæc tria Indicata similiter concreta sunt, eorumque quodlibet, ut supra probavimus, in abstracto tum Conservationem tum Correctionem includit.

Denique in statu morboso actio Corrigendi in duas species resolvitur; in Correctionem causa, & Correctionem morbi; atque adeo tria actionum abstractorum genera hic reperire est. Status enim morbosus in tres species abstractas sinditur, in morbi essentiam, morbi causas, & vires, sive ea quæ supersunt in hoc statu secundum naturam. Ea enim quæ præter naturam sunt & correctionem in genere indicant, in duas species, ut dictum, hic abeunt, viz. in morbi essentiam, & morbi causas; ideoque tres sunt partes hujus status, quæ singulæ sormatiter

liter diversimode indicant. Tria ergo (ut negotio huic finem imponamus genera Indicationum in hoc statu veniunt consideranda: nempe ab essentia morbi, Curativa; à causis, praservativa; à viribus, vitalis, seu Conservativa. Ad causas referimus quælibet impedimenta curationis, ut & symptomata urgentia, quæque curationem ad se trahunt, hoc enim respectu naturam induunt causarum. Hæc in genere de Indicationibus dicta sufficiant.

CAP. XXV.

Curativa Indicationes.

A essentia morbi deduci has Indicationes modo asseruinus. Hic ergo omnes essentiæ hujus morbi partes leviter percurrendæ sunt, ut, quid quælibet agendum insinuet, percipi possit.

fistit in intemperie frigida & humida: indicat ergo morbus hic, respectu hujus partis essentiæ suæ, non tantum ea omnia vitanda esse, quæ quovis modo istam intemperiem aut sovere aut intendere apta nata sunt; sed & in subsidium advocanda essea, quæ eandem infringant, viz. calesacientia & siccantia.

2. Con-

in in

ergo

mod

vel i

fupe

re,to

tus I

gis,

viole

ta,

pore

por

gunt

faciu

nera

qual

Voc

125,

tos es

atqu

cidio

laxar

批

10-

11-

3

leu

Det

ata

nt,

16-

icta

t10-

om-

er.

ium

00:

icat

Heneffe,

t fo

& in

den

00

2. Consistit hic morbus etiam ex parte secunda, in inopia spirituum insitorum: non modo ergo ea omnia fugienda sunt, quæ quovis modo spiritus ulterius dissipare, eliquare, vel in auras dissolvere queant; sed & ea insuper eligenda sunt, quæ eosdem instaurare, fovere, ac multiplicare possint. Respuendaigitur hic validiora discuffiva, quod spiritus una discutiant; item impense calida, quod eoldem in auras resolvant: multo magis, quæ vim eliquandi partes habent, ut violentiora purgantia. Eligenda vero alimenta optima, & coctu facilia medicamenta, quantum fieri potest, spiritibus insitis amica & benigna.

3. Morbi hujus essentia ex parte in tor- Tenia. pore spirituum consistit: Insinuat hic torpor vitanda esse ea omnia, quæ nimirum sigunt ac densant spiritus, aut aliter cos stupefaciunt; qualia funt narcotica, multaque mineralia, quæ de plumbi natura participant, qualia sunt Minium, Cerussa, Lithargyrus, &c. Vocanda autem inusum esse exercitia, motus, frictiones, eaque omnia quæ spiritus insitos excitare, eorumque torporem excutere,

atque eos agiles reddere valeant.

4. Tonus, qua justo mollior, laxior, flac- Quarta. cidior, indicat vitanda esse ea, quæ emollire, laxare, aut enervare partes solent, eaque applicanda aut intus exhibenda, quæ eaf-

dem

dem firmiores, solidiores, magisque tensas præstent. Idem Tonus, qua nimis interne subricus, suspecta reddit ea omnia quæ interna subricitate multum abundant, videturque nonnihil asperitatis aut etiam adstrictionis in iis quæ vel assumuntur, vel applican-

gieno fere i

cordi

fpirit

TIS,

min

exte

at:

DUAD

te 21

reso

alim

fria

pot

Fas

2Fti

fieri

ctor

funt

qua

Aril

fecti

CIE

VO!

tur, desiderare.

5. Vitalis constitutio læsa ex parte generationis vitalium spirituum non adeo multum refert: verum ex parte distributionis vitalium spirituum inæqualitas ejusdem magni momenti est, atque indicat ea essecavenda, quæ sanguinis affluxum versus caput promoveant, ut & ea quæ ejusdem affluxum ad partes primo affectas remorentur. Eligenda vero este ea, quæ arteriarum pulsus in partibus primo affectis proritare, in capite vero potius sedare valeant. Idem propemodum indicat diminutior & tardior decursus sanguinis per partes primo affectas, nimirum pulsus ad istas partes eyocationem. Transitus vero sanguinis per habitum partium nimis lubricus & facilis, indicatione sua coincidit cum lubricitate Toni modo notata. Defectus constitutionis vitalis ex parte unionis satis vigorosæ & jucundæinter spiritus vitales & insitos, indicat ea quæ utrumque spiritum tuin nutrire ac fovere; tum excitare ad majorem activitatem possunt, contraria autem esse sugienda. gienda. Calor vitalis, qua deficiens idem fere indicat quod intemperies frigida, modo simul habeatur respectus tum roboris cordis & arteriarum, tum vigoris vitalium

spirituum.

2

m

em

100

25,

10-

um

ca-

001

品品品品

6. Inæqualis nutritio ea indicat, quæ æqualem distributionem alimenti & caloris, aut certe eam liberaliorem ad partes minus debito nutritas promoveant, Partium extenuatio pleniorem nutritionem postulat: Irregularis capitis magnitudo, extenuantia potius, quæque fluxum ab illa parte avertant, exigit. Idem indicant tumores ossium. Osa iucurvata indicant ea quæ alimentum attrahunt ad latus cavum, ut frictiones moderatas; at vero reprimentia potius secundum latus gibbum, ut ligaturas comprimentes. Articulorum inflexio, artificiosam eorundem erectionem, quoad fieri potest, infinuat. Pectoris angustia, pectoralia, & quæ pectus dilatare apta nata funt, innuit; ejusdem acuminatio yero ea, quæ ad æqualem nutritionem faciant.

7. Imperfecta animalium spirituum di- Septima. Atributio, & nonnihil in partibus primo affectis imminuta, indicat cephalica, eaque quæ istam distributionem facilitent, ut exercitia, frictiones, & similia. Defectus debitæ tensitatis nervorum partiumque nervosarum sive fibrosarum, indicat ea, quæ

nervos

nervos roborant partesque firmant. Hæc de Indicationibus Curativis. Sequentur Præservativæ. han

(tula

hoc

trar

red

cula

Car

agi

Inte

exc

refp

chy

921

qui

Tim

100

1712

CAP. XXVI.

Indicationes Prafervativa.

Earum divisio. Indicationes hæ à causis morbi vel antecedentibus, vel prasentibus deducuntur. Quæ à priori causarum genere sluunt ad Prophylacticam spectant: hic autem eas tantum proponimus, quæ à causis præsentibus & in corpore contentis, nempe vel communibus, vel huic morbo propriis proveniunt.

Quamvis autem causæ communes non videantur productionem essentiæ morbi immediate attingere; vel eo ipso tamen quod impedimenti vicem subeant, curamque remorentur, suam ablationem indicant.

Sunt vero hæ causæ, vel impuritates, aut excrementitii humores in primis viis congesti & retenti, qui, nisi tollerentur, non modo alimenta assumpta contaminarent, sed & appropriata medicamenta nonnihil retunderent, aliterve impedirent. Indicant ergo sui evacuationem sive per blandiorem vomitum, sive per lenitivam purgationem, prout occasio hance

hanc vel illam viam magis suaserit: vel sunt causa communes altius à partibus corporis inbibita: & hæ quoque suam evacuationem postulant. Verum quandoquidem secundum hoc causarum communium genus iisdem propemodum medicamentis simulque exigitur, quibus causæ huic morbo propriæ utrumque hoc genus in præsenti considera-

tione conjungemus.

ap- de- fai

anc

Causæ igitur huic morbo propriæ, ut & communes istæ quæ altius in corpus penetrarunt, dividi possunt in sanguinem & humores cacochymicos. Sanguis quidem, etsi in partibus primo affectis deficiat potius quam redundet, in capite tamen plerumque particularem sui evacuationem postulet, quæ scarificatione venarum in Aurium concha peragi solet. Huc quoque ex parte sonticulos inter primam & secundam vertebram colli excitatos referre possumus, licet hi sorte respiciant insuper ex parte humores Cacochymicos.

Humores Cacochymici dividuntur in eos, qui adhue in venoso genere fluitant; & in eos, qui certis corporis partibus impacti sunt. Causae seu humores in venoso genere fluitantes indicant (primo & quoad intentionem) sui evacuationem, verum si ad motum inepti sint, (quoad executionem) præviam præparationem. Quoniam autem pleviam præparationem.

rumque evenit, ut non omnes humores æque sint inepti, sed alii satis, alii minus, quam par est, sluxiles, & medicamento ob-sequentes, in hoc casu primo indicant evacuationem minorativam, & deinde præ-

parationem.

Porro hi humores in venoso genere subdividi possunt in febriles (nimirum si adsit febris putrida) & non sebriles. Humores febriles vel sunt turgentes, vel non turgentes. Turgentes, hoc est, inquieti seu impetuose commoti, indicant quamprimum evacuationem, saltem minorativam, nisi forte natura sua ferantur ad partes externas & ignobiles, puta cutaneas, quemadmodum accidit in variolis & morbillis, similibusque morbis. Sin vero adsit febris, eaque acuta, neque humores turgeant, indicant primo illam peculiarem præparationem, quam coctionem vocant, ut reddantur pharmaco propinando obedientes, dein evacuationem. At si febris non acuta sed lenta sit, & etiamsi materia non turgeat, ejusdem tamen pars aliqua satis sit fluxilis; in hoc casu, quovis tempore morbi indicatur evacuatio minorativa primo, & postea reliquiarum coctio, ut illæ quoque suo tempore evacuentur.

Humores in venoso genere contenti non febriles, si fluxiles sint, indicant primo eva-

cura-

coat

petu

jam

inci

hæc

&a

& U

tota

mod

Cuar

mela

80 0

mix

nem

di 11

anteo

Com

facial

Dera

requi

que

mon

lant.

cuationem: cum autem in hoc assectu perpetuo fere adfint humores lenti & crassi parumque sequaces, præparatio (saltem ubi jam præmissa est evacuatio minorativa) primo indicatur: & quidem viscidi humores incidentia, crassi attenuantia indicant. Adhæc cum morbus sit admodum chronicus & ad plures menses, immo forte ad annum & ultra extendatur, non existimandum est totam materiam morbificam posse simul præparari aut evacuari; quare hoc respectu indicat, ut, per vices, modo præparantibus, modo evacuantibes infiftamus. Præterea sciendum est aliam præparationem & evacuationem exigere humores biliofos, aliam melancholicos, aliam pituitofos & serosos: & pro diversitate humorum sanguini commixtorum variam indicari tum præparationem, tum purgationem.

Humores certis corporis partibus impacti multo magis requirunt præparationem antequam evacuentur; juxta illud Hippocr. Corpora quum quis purgare volet, ea fluxiliafaciat oportet. Neque vero humoribus his generalis quædam præparatio sufficit, sed talis requiritur præparatio, quæ peculiari, jure ipsam partem, in qua hærent, respiciat; adeoque aliam præparationem humores in Pulmone, aliam in Hepate, aut Liene, &c postu-

lant.

15,

12-

2-

ub-

dit

fe.

ites.

ma-

D2-

110-

20-

que

uta,

100

msp

1200

nem.

am-

men

260,

cua-

1112+

pore

non

eva-

11/2-

Denique quum omnium humorum genera proposita, postquam evacuata sunt, denuo possint succrescere, indicant ea esse vitanda, quæ ad similes humores facile generandos faciant. Atque hæc de Indicationibus Præservativis, restat nunc vitalis sive conservativa consideranda.

CAP. XXVII.

Indicatio conservativa, sive vitalis.

veni

pati

dia

Dan

THE

10 8

tila

rale

præ

10,

ejus

pec

Ritur hæc Indicatio ab iis rebus qua sunt secundum naturam. Ipsa enim vita in his consistit: in triplici nimirum corporis constitutione, Naturali, Vitali, & Animali, Supra memoratis.

Naturalis sub se continet

1. Temperamentum.

2. Spiritus insitos, eorumque copiam & vigorem.

3. Tonum partium.

4. Organorum structuram.

5. Continuitatem.

Vitalis continet

1. Generationem ? vitalium spirituum.
2. Distributionem ?

3. Participationem corundem ab iis partibus

tibus, quibus distribuuntur, scilicet, ex unione corum cum dictis partibus & calore communicato.

Animalis fimiliter continet

1. Generationem } animalium spirituum
2. Distributionem }

Debitam Tensitatem partium à cerebri in-

fluxu pendentium.

Hæc omnia, quod in iis vita confistat, vocantur indicantia vitalia: apud Autores vero ut plurimum communi nomine virium veniunt, sed paullo crassior est hæc nuncupatio, cum, si proprie loquamur, vires in dictis constitutionibus radicentur, earumque facultates fint. Non autem in animo habemus usum loquendi innovare, modo res

ipfa, uti est, intelligatur.

di,

11.6

par-

Indicantia hæc, quamdui sana atque integra manent, generalem tantum ac ordinariam conservationem per rectum sex rerum non naturalium usum postulant. Ubi vero ea omnia ex æquo vel læfa vel imminenti læsioni obnoxia sunt, non tantum generalem conservationem, sed & curationi, aut præservationi commixtam requirunt. Porro, ubi una aliqua constitutio, vel quædam ejus pars præ cæteris læfafuerit, vellæfioni obnoxia, præter generalem confervationem, specialem quoque postulat similiter peculiari curationi aut præservationi associanciandam: Denique ubi constitutio læsa, vel læsioni obnoxia certæ parti est affixa, ulterius eam conservationem specificat, ut nimirum habeatur simul respectus partissic

Aito

Sint

temp

dur

dive

indi

aio

Pul

01

lem

dica

Yatto

enir

ma.

que.

pete

min

(00)

Con

門馬四

Bra

rius

fery

præ cæteris laborantis.

Vitalem Indicationem effe in plures ipecies divifibilem.

Quod autem aliqui dicunt Indicationem vitalem esse unicam & Conservationem esse simplicem finem, neque ulterius subdividi posse, cum omnia quæ sec. naturam sunt uno virium nomine comprehendantur, unamque actionem vi?. sui tutelam indicent. Nos quidem concedimus vires, si (ut supra monuimus) improprie pro causis suis, nempe constitutionibus tribus prædictis sumantur, uno nomine complecti posse omnia quæ sec. naturam sunt; sed nomen hoc tunc genericum erit, atque intres species, tres nempe constitutiones divisibile, in vires, naturales, vitales, & animales. Concedimus porro finem five actionem indicatam, viz. Conservationem, esse unam, sed unitate generis, non ultimi speciei. Nam ea ipsa, quæ funt sec. naturam, ut ut genere conveniant, specie tamen inter se differre possunt, & diversimodam conservationem exigere: immo fieri potest, ut quæ vires ex una parte conservant, ex alia eas impugnent: Ex. gr. Vinum exhibitum vires vitales seu potius constitutionem vitalem erigit & roborat; interim vero vires animales, seu conX2,

ut

slic

em

effe

vidi

Uno

am-

Nos

110-

em-

nan-

nnia

tunc

tres

mes,

mus

VII.

ege-

mye.

lunt,

ere:

parte

1000-

Ai-

stitutionem animalem impetit & debilitat. Similiter aliam conservationem requirit temperamentum, aliam organorum structura, aliam continuitas: Quin & partium diversa constitutio variam conservationem indicat, neque eodem modo aut iifdem actionibus conservationi speciali Hepatis, Pulmonum, Cerebri, &c. prospicimus. Quare una aliqua constitutio præ cæteris debilis, seu una pars aliis infirmior, specialem sibique propriam conservationem indicat, adeoque dividi possunt tum conservatio tum conservantia in species suas. Etenim Conservatio & Conservantia, animali constitutioni appropriata, differunt ab iis, quæ vitali aut naturali destinantur; atque hinc primæ tres species conservationis petendæ funt; viz. Conservatio constitutionis animalis, conservatio constitutionis vitalis, & conservatio constitutionis naturalis; similiter Conservatio Hepatis, Hepaticorum, Lienis, Spleneticorum, Pulmonum, pectoralium usu perficitur: immo omnes partes infigniter diverfæ confervationem ulterius in species dirimunt. Hæc de divisione confervationis in suas species.

Porro eadem Conservatio videtur ulte-Essequorius dividi posse in suas paates. Etenim Con-que diviservatio hæc quodammodo complexa est, sibilem in partes.

& non tantum similia respicit, sed & suo

Y 2 modo

modo contraria, nimirum indicatio tum curativa tum præservativa, eaque cum viribus æstimata, vel permittit, vel prohibet : Videtur ergo in tres partes absumi: in Electionem similium; in Permissionem contrariorum sub certa conditione; in Prohibitionem eorundem

finis

fed C

lia:

da,

in li

cente

etiam

enim

lor,

tiva ac

quant

modu

limit

dat,

fe fil

lomer

trimer

dum i

cond

fieri,

perta

I SIM

jus I

damo

Catum

sub diversa conditione.

Electio similium maxime propria confervationis actio est, videturque adhuc duo genera similium respicere, viz. Similia quæ facile assimilari possunt, & proprie alimenta sunt, & similia, quæ licet quoad substantiam forte haud affimilari queant, continent tamen in se qualitates quasdam debitæ constitutioni certarum partium similes, quarum respectu naturæ familiaria & amica reputantur, certasque partes fovent ac roborant.

Dicas, hac revera esse alterantia & ad genus

contrariorum spectare.

Object.

Resp.

Respondemus, ad utrumque. genus diverso respectu referri posse; quatenus autem obtinent qualitates debitæ naturæ partium similes, licet alias tantillum alterent, ad genus fimilium referenda este. Nam & ipla alimenta tantundem quoque alterant, & inanitioni directe sunt contraria, ipsaque conservatio implicite includit quandam correctionem, ut supra probavimus. Vocantur autem hæc, ob mediam naturaminter fimilia

similia & alterantia, medicamenta quidem, sed Conservantia, Corroborantia, & Cordialia: indicantur vero hæc à peculiari virium debilitate ut conservantia, & ut eligenda, non vero tantum ut Permittenda, & in libris Practicorum communiter sic recensentur.

1113

er-

UZ

en-

an-

etilebi-

es,

mi-

nt ac

Tetting.

s di-

sau-

par-

ent,

m&

rant, ipfandam

ocan-

inte

Permisio remedii natura nonnihil contrarii etiam ad hanc Indicationem spectat. Ea enim est hujus Indicationis dignitas & valor, ut indicata tum curativa tum præservativa ad examen priusquam exequenda fint, revocat, & nontantum remedii qualitatem quantitatemque, sed & tempus repetendi, immo quicquid ad ejusdem usum aut utendi modum pertinet, eo usque moderetur ac limitet, ne ullatenus vires patientis excedat, iisve injuriam inferat: neque vero hic se fistit, ast amplius exigit, ut plus emolumenti ex morbi impugnatione, quam detrimenti ex vi naturæ illata, rebus fecundum naturam accrescat. Et sub hac lege & conditione vitalis Indicatio multa permittit fieri, quæ viribus per se sunt adverta, semper tamen in favorem sanitatis, nunquam in uitæ præjudicium.

Prohibitio contrarii imperialis plane hujus Indicationis actus est, & imperio quodam dictat hoc vel illud (licet alioquin indicatum suerit) non esse exequendum, quod

Y 3

1125 11

& m

tate vallis

lent

quan

five

iplun

int a

alter

impe

quan

Us

CUI

CLI

De

ipsi vitæ forte periculum minetur, aut quod non plus emolumenti partibus sanitatis conferat, quam certi detrimenti. Atque hæc tertia & ultima hujus Indicationis vis & usus est. Bæc jam verbo uno ad morbum præ-

sentem applicanda sunt.

Constitutiones omnes in hoc affectu esse admodum debiles & insirmas, vel ex ipsa teneræ ætatis consideratione sacile elucescit. Naturalis vero insuper vi primæ essentiæ morbi ulterius impetitur; hinc etiam vitalis nonnihil patitur; sed neque animalis impune evadit, ut supra monstravimus. Quare tum generalis harum constitutionum, tum specialis habenda ratio est, tam in electione similium, quam in permissione vel prohitione contrariorum.

alimenta optima, coctu facilia, consuetudini, ætati, annique tempori, quantum sieri potest, congrua. Respuenda contraria, quæ nempe parum nutriunt, quæ dissiculter coquuntur, insueta, ætati temporique

incongrua.

2. Eligenda sunt ea, quæ constitutiones debiliores partesque præ cæteris affectas sovent & corroborant, eaque vel separatim exhibenda, vel alimentis aut medicamentis admiscenda; ea vero quæ neque ad hunc scopum faciunt, neque a-

lias indicantur, in totum sunt sugienda.

3. Permittenda sunt evacuantia benigna & mitiora aut alias satis correcta, quantitate moderata, & interpositis justis intervallis. Contraria vero nempe evacuantia violentiora & sera, præsertim quæ partes eliquare apta sunt, item in nimia quantitate, vel frequentius justo exhibita prohibentur.

pla

m-

U2-

UIII

ne

hi-

ctu

etu-

ria,

col-

que

itio-

affe-

le-

aut

quz

163-

125

4. Permittenda quoque sunt alterantia, sive humores præparantia, sive morbum ipsum corrigentia, talia quidem quæ simul sint naturæ familiaria & amica, vel talium admixtione satis correcta. Prohibenda sunt alterantia violentiora, valde discutientia, impense calida, aut quovis modo partes eliquantia vel dissipantia.

CAP. XXVIII.

Usus rectaque administratio Indicationum prædictarum.

Propositis jam tribus simplicium Indicationum generibus, iisque in infimas species deductis, earum usus rectaque administratio proximo loco venit consideranda: cujus exacta cognitio videtur absque ratiocinio & experientia obtineri non posse. Descendit enim ad individua, & non modo Y 4 selectie-

selectionem inter tot Indicata rei simpliciter Quæ comprehendun- agendæ in specie, sed & inventionem quantitatis, loci, forma, temporis, ordinis, materiaque ulu Indi-

cationum zemedii adhibendi complectitur.

ipecies.

Consensus & Dissensus Indicationum mulfus Indi-tum ad hanc inventionem contribuunt. cationum Consensus autem duplex esse potest: Coindicationis, & Permissionis. Permissio vel lucro esse potest permittenti, vel damno, vel horum neutri. Permissio damnosa semper cum circumspectione admittenda est, eoque tanto majori, quanto majus damnum permittenti inde adveniat. Permittens enim etsi in bonum publicum de suo privato jure nonnihil cedat, semper tamen respectu totius lucrari supponitur.

Dissensus Indicantium duplex est; nimi-Diffenfus rum vel Contradictorius vel Contrarius. Condem spe- tradictorius apud Autores Prohibitio vocatur & Interdictio, & viribus ut plurimum appropriari solet, cui hoc respectu semper obsequendum. Dissensus Contraindicatio dicitur, iifque non simpliciter prohibet,

> nisi quatenus subit rationem impedimenti, aut urgentioris Indicantis.

Quid agendum ubi contia.

1. Ubi consentiunt Indicantia, five Coindicando five Permittendo, omnibus Insentiunt dicatis simul (si fieri possit) satisfaciendum: Indican- Sin hoc forte perfici nequeat, medicamenta ejulmodi cæteris præferenda, quæ pluribus,

fpond plicia plicio

dum

le d

exp

ta e

una

mul

tum

Iten

rigo

mo

902 fent

res q

tuet

Paru

ereq fenf

debi

le co

aut faltem urgentioribus scopis simul respondeant. Quod si autem hujusmodi simplicia non reperiantur, apta diversorum simplicium inter se compositio instituenda est.

iter

加一

que

ml.

unt.

Co-

rei

vel

nper

oque

per-

neth

non-

otius

ımı-

con-

catur

pro-

oble-

aindi-

libet,

enti,

oum:

Partes essentiæ hujus morbi, licet admo- Non dum variæ fint, haud multum tamen inter interfe se dissentiunt, nihilque obstat quin magna dissentint ex parte simul possint respici. Medicamen- Partes essentix ta enim temperate calida & sicca possunt hujus una spiritus insitos sovere, & sorte ad ex-morbi. cutiendum eorum torporem conducere, simulque tonum partium nonnihil firmare, tum ad æqualem sanguinis distributionem, adeoque ad nutritionis æqualitatem facere: Item spiritibus vitalibus atque animalibus vigorem conciliare, arterias in partibus primo affectis proritare, nervos roborare: ad quæ capita non inepte omnia Indicata efsentiæ morbi fere reduci possunt. Porro vires quoque, licet impense calida, aliaque omnia violentia prohibeant, hæc tamen ut moderata, satisque naturæ familiaria permittunt. Causæ similiter his Indicatis in specie parum repugnant, licet quoad tempus & exequendi ordinem nonnullus notetur difsensus, quemadmodum infra suo loco videbimus.

Quare quatenus & quousque hæc inter se consentiunt, dum curationi operam damus, una opera respicimus simul non tan-

tum vires, fed & nonnihil earundem causas, eligendo earemedia curatoria, vel iis illa admitcendo, quæ una possint crassa attenuare, viscida incidere, obstructa aperire, & similia. Similiter, dum in præservatione aut eradicatione caufarum maxime occupati sumus, talia eligimus evacuantia aut talia pharmacis admilcemus, quæ simul ex parte morbo fint contraria. Atque hæc omnia eo confilio agimus, ut quamplurimis intentionibus (uti dictum) simul subserviamus.

Inventis autem actionibus in specie sim-Circumfrantiarii actionum pliciter requisitis, proximo loco earum debi-

rum in- ta Circumstantia exquirenda sunt.

1. Ergo, cum morbus hic magnus sit, Quanti- magnam remedii Quantitatem ex parte sui exigit. Nam remedium morbo impar eum extirpare nequit. Oportet igitur ut medicamenti dosis morbi magnitudini adæquata sit. Atqui vires in hoc affectu tantam remediorum molem simul adhiberi non permittunt. Quare quantitatem istam partiri & per vices administrare oportet. Morbus enim hic chronicus est, tardique motus, neque præcipitem curationem necessario exigit, &, quamvis vires neque fortiora remedia, neque majori quantitate exhibita facile serant, per Thinggor tamen evacuantium remediorum usum permittunt. Quare, per vices, modo

modo 111000 Mend

genera ejalve ergo

fume tellin natur

perior contra inclin

per fi res eva

VICINI morb atque

ca loc Scien tes ly

cafu interc CID2:

regul fcopu

riam diam

qued

modo præparantibus, modo evacuantibus, modo alterantibus, aut corroborantibus infiftendum eft.

diis

a at-

en-

TV2-

-30 intia.

inni

hac rimis

slit,

te fui

eum

ta fit.

edio-

ttunt.

er vi-

im hic

epra-

1, 81

, De-

erant

nedio-

rices

mod

2. Quod ad locum administrandi attinet, 2. Loci. generalis regula est, Remedium ad morbi ejusve causæ sedem pertingere debere. Si ergo in vasa penetrare debeat, per os affumendum; fin fufficiat crassa tantum intestina attigisse, per anum injiciendum. Si naturæ propensione humores facilius ad superiora ferantur, vomitu exigantur; fin contra, per secessium. Similiter pro Naturæ inclinatione, per salivationem, per mictum, imper sudationem exterminentur. Particulares evacuationes in ipsis partibus affectis vel vicinis instituendæ. Ita enim vis remedii ad morbi caulæque sedem certius pervenit: atque ob eandem rationem externa & topiedicaca loco proximo convenienti applicanda. Seiendum tamen est, inter nonnullas partes sympathiam quandam observari, in quo casu frequenter parti, cum qua consensus intercedit, non autem affectæ parti, vel vicinæ admoventur remedia.

3. Forma medicamenti ex parte quoque à regula modo propofita dependet. Si enim medicascopus sit lenire fauces, aut asperam arte-menti. riam, linctus formam eligimus, ut remedium sensim partes affectas perlabatur, easque diutius tangat. Similiter, laborante ventriculo,

opera !

ta,ut q

cendi,

enim

tur, a

fitis:

Ev

cident

lo pro

hora

ventri

tes fire

n pot

nulla

CONVE

palato

naufe

diant

dejici

duz o

1d 20

viam

idpri

impe

doru

femp

QUOD

triculo, fæpe Pilulas, Pulveres, aut electuaria præscribimus, quo diutius in co commorentur; Renibus liquida potius defignamus, quo facilius ad eos cum fero deterantur. Formæ insuper nonnihil etiam ab ipla morbi natura pendent: ut in febribus ardentibus liquida fere tantum conveniunt, ficca vix admittuntur; contra in morbis humidis, alvoque nimium fluente, formæ folidiores præferuntur. Denique formæ medicamentorum nonnihil quoque à materia medica dependent; sic Cassia, forma Boli, Cornu cervi, Corallium, & fimilia, forma pulveris; alia infusa felicius operantur. S1militer amara, nauseam moventia, tœtida, Pilularum forma celantur, interdum quoque deaurantur, aut etiam boli forma nebulis involuta exhibentur.

Notandum hic est non tanti momenti ut plurimum esse remedii formam, quin ea cedat saciliori aut commodiori administrationi, respectu admissionis vel receptionis ægrotantis. Multi enim Pilulas nequeunt deglutire, alii potiones vomitu statim rejiciunt, alii alias forte formas aversantur. In hoc assectu, cum pueri ferme omnes medicamenta respuant, ea præ cæteris præserenda est forma, quæ iis minus molesta minusque nauseam creare deprehendetur.

Tempo- 4. Quod ad tempus agendi attinet, danda opera

opera eft, ut ita administrentur medicamen- ris agenta, ut quam minimum tempora cibandi, exer- dicendi, dormiendi, interturbentur. Per hanc enim ætatem vires vix integræ conservantur, absque his per justa intervalla interpofitis.

80

de-nab

ibus

int, irbis

mz

me-teria Boli,

rma Si-

tiut

ce-

110-

52-

reji-In

Evacuantia, aperientia, attenuantia, incidentia, primo mane & jejuno ventriculo propinanda; & si repetenda eodem die, hora quarta pomeridiana, similiter jejuno ventriculo. Roborantia, adstringentia, partes firmantia, quietem procurantia, vesperi potius sumenda vel admovenda, nonnulla autem ex his post cibum etiam forte conveniant.

Quæ cibo admiscentur medicamenta, palato grata esse debent, ne ventriculo nauseam moveant, & coctionem impediant, aut cibi fastidium pariant, viresque dejiciant.

5. Quod ad Ordinem procedendi attinet, duæ occurrunt generales regulæ. Prior est, proce-Id agendum esse prius, quod præmislum dendi. viam sternet ad sequentia remedia, ideoque id prius esse removendum, quod rationem impedimenti habet respectu deinceps agendorum. Posterior est, Urgentiori Indicanti femper prius esse subveniendum, nisi aliquod obstet impedimentum.

Si ergo qualtio fit, utrum morbus, an An mormorbi

fap ins à medico invadi debeat ?

ejus cau- morbi caufa prius operam medicam exigat, facilis erit fecundum priorem regulam responsio: Causas nempe habere rationem impedimenti respectu curationis morbi: Eam quippe fovent, vimque medicamentorum infringunt. Quare priusquam morbum ipsum pressius impagnamus, causa, quantum fieri potest , averruncandæ, aut saltem ita minuendæ, cicurandæque, ut quam minimum morbi expugnationi obstent. Interim tamen, dum in amovendis causis satagimus, non plane negligenda est morbi esfentia, ut supra monuimus. Immo ita domita nonnihil morbi causa, ut ad tempus curationem non infigniter impediat, licet (nondum penitus evictis ejectisque causis) essentiæ morbi impugnationem paullo pressius aggredi; ea tamen lege, ut, insurgentibus iterum & de novo rationem impedimenti induentibus causis; ad earum suba-Ctionem, evacuationemque protinus revertendum sit; adeoque in Chronico hoc affectu, per vices, modo causa, modo morbus ipse impugnandus venit: atque hanc actionum vicissitudinem vires facilius tolerant, quam si solis causis expugnandis, donec penitus exterminentur, continue insisteremus

Porro quum causæ morbificæ in hoc affectu ob visciditatem, crassitiem, & forte

ım-

randa

imped que m mt di 8

ddita

cant

tia;

ritati

tibus

te ra

quine

torun

nem

2000V

D

laribo

Sertin

bere

corpo ium e

pe ad

m

forte :

OZISZ

imper partic

igi

Rigat,

m re-

ohem

orbi:

ento-

rbum

quan-

altem

m mi-

Inte-

sfata.

bief-

tado-

empus licet

aufis)

pref.

ngennpedifuba-

rever-

caffe-

orbus

actio-

erant,

donec

k forte

im.

impactionem, ineptæ sint ad motum; liberandæ sunt, priusquam evacuentur, ab hoc impedimento & præparandæ: Siquidem quæ movenda sunt sluida prius facere oportet, ut dictat senex. Similiter crassities ista, visciditas, & impactio materiæ, si adsit, indicant attenuantia, incidentia, & deobstruentia; sed hæc non tuto propinantur impuritatibus adhuc circa primas vias restagnantibus, quæ cum medicamentis in venas forte rapiantur, sanguinemque ulterius inquinent, vel saltem essicaiam medicamentorum retundant. Habent hæ ergo rationem impedimenti, & omnino primo sunt amovendæ.

Denique universalia evacuantia particularibus & topicis sunt præmittenda, præsertim ubi utrique intentioni simul incumbere non licet. Nam cause universales in corpore fluitantes sacile in locum particularium evacuatarum surrogantur, assumque ad partem prius affectam renovant: caufarum vero particularium tenuior & admotum aptior pars evacuatur, crassior vero forte magis impingitur. Quare universales cause adhuc in corpore scatentes rationem impedimenti habent respectu evacuationis particularis, & per consequens prius sunt exigendæ.

Posterior regula erat, Indicanti urgentiori, tiori, si nullum interveniat impedimentum, primo succurendum esse. Urgentius Indicans id dicitur, quod majus periculum minatur. Omne autem Indicans urgens supponitur graviter corpus affligere, viresque cum periculo atterere. Hoc itaque respectu, aliquando morbo est opitulandum primo, neglecta causa; aliquando etiam graviori fymptomati, neglectis tum morbo tum ejus causa; ut in concitatiori alvi fluore, duiturnis vigiliis, profusiori sudore, & similibus. Sed vel in hisce casibus habenda fimul ratio est, quousque fas est, tum morbi tum causæ, & ubi tantummodo corre-Etum est urgentius symptoma, impetusve morbi repressus, ad regularem procedendi methodum redeundum est. Hæc enim regula non ad ordinarium legitimumque curandi ordinem, sed methodum necessitatis pertinet.

Adhæc, ad rectam Indicationum administrationem absolvendam, accurrata materia medita cognitio requiritur: de qua in sequentibus agendum.

CAP

Mate

cat

1730

vis neo

planee

ravulg

fidia x

lux, c

Chi

cepta

la, du

Auri

ro alii fixuet

gi, de

Vene

rant,

tis fra

tioner dere

rici i eam ret.

CAP. XXIX.

Materia modica propositis Indicationibus respondens. Et Primo צפוףצפאואין.

Ateria medica experientia potissimum Tria summa vis neque aliud qualecunque ratiocinium presidioplane excludendum putemus. In tria gene- rum mera vulgo, neque inepte, distribuitur: in præmor fidia χειεεργικά, Φαρμακοθικά, & Μαιτη-

Ture lixa, quæ hic suo ordine prosequemur.

etulve

Chirurgica in hoc affectu communiter re- Chirureden cepta ac probata, & præ cæteris famo- gica. enin sa, duo præsertim sese offerunt: scarificatio scarifica-Aurium, & Fonticulus. De pluribus ve- tio Auno aliis (ut infra videbimus) inquisitio instituetur; viz. de Cucurbitulu, de sauguisugis, de vesicantibus, de Ligaturis, & Fasciis. Vena sectionem vero ipsam vires non tolerant, ut cuivis facile innotescit, qui ad ætatis fragilitatem, habitus partium extenuationem, venarumque gracilitatem attendere velit.

Agmen ducet scarificatio Aurium. Empirici nostrates, qui hunc affectum tractant, eam pluris faciunt quam quis facile puta-Cal ret. Solemniter quippe in sua praxi eam celebrant, absque ea vix felicem curationem sperant. Nos vero, licet hoc remedii genus non improbemus, vidimus tamen absque ejus usu nonnullos pueros feliciter fanatos. Et illi ipfi, qui ei plurimum tribuunt, maxima ex parte vix notabilem quantitatem sanguinis eliciunt. Aliqui tamen testantur se vidisse satis largam sanguinis copiam cum euphoria hac operatione eductum. Ut ut sit, credibile est eos pueros facilius hoc remedium ferre, plufque emolumenti ex ejus usu obtinere, qui Sanguinei sunt & habitiores, quique alogotrophia potius quam atrophia, aut tabe, aliave magna partium extenuatione detinentur. Practici nostri plerumque bis velter, interpositis septem circiter dierum intervallis, hanc operationem repetunt. Rarius lanceola, aut acutiori scalpello, frequentius ordinario obtusiorique cultello id perficiunt, nihil dolorem ejulatumque Infantis morantes. Porro, in concha Auris ut plurimum hanc scarificationem instituunt; aliqui vero eam ad interiorem & exteriorem Alæ five Pinnæ Aurium circumferentiam, immo ad Helicenusque extendunt. Nemo hactenus, quod scimus, posterioris lateris Auriculæ scarificationem tentavit: quamvis revera haud obvium sit rationem reddere, cur illic administrata minus minus Conchi Adfe

partibu quam mus;

diligen 4. Cen lit: hi

funditu unaco politis loco c

cha Au vum à rem e stare i

ei pro Quare mente

diate do cal torpor

ei add ibiden

aut p buatu defer

a

minus conduceret quam in ipsa Auris Concha.

em

12-

Adferre tamen libet conjecturam saltem Conjenostram, cur concha Auris præ cæteris ejus cura cut partibus ad hanc operationem eligatur, Auris quam tamen nondum confidenter adstrui- præ cætemus; etsi probabiliter ad minimum sustine- partibus re posse putemus, modo verum sit id, quod in hoc diligentissimus Fabricius Hildanus, (Observ. scarifice-4. Centur. 1.) de nervo quinti paris retu- tur? lit: huic enim observationi conjectura hæc funditus innititur, eaque forte vacillante una corruit. Conjectura ipsa hæc est: Suppositis distributione & usu nervi quinti paris loco citato memoratis, scarificatio in Concha Auris commode cum liberare istum nervum à qualicunque oppressione, tum torporem ejusdem excutere, eique vigorem præstare potest. Est enim Concha Auris locus ei proximus, quam serro licet attingere: Quare evacuatio hic facta materiam prementem fere originem illius nervi immediate derivare, simulque dolorem inferendo caloremque augendo, qualemcunque torporem ejusdem excutere, vigoremque ei addere poterit. Si ergo nervus hic (ut ibidem asserit celeberrimus ille Chirurgus,) aut pars ejus ad spinalem medullam distribuatur, neque spinalem medullam unquam deserat, sed continue ramulos cum nervis fpina-Z 2

spinalis medullæ ad crurum & pedum extrema emittat; facile concedi potest, nervum hunc ab obstructione sic liberatum, excitatum, ac vigorem nactum, iplam spinalem quoque medullam, omnesque inde ortos nervos, quos ex ista sententia ad extrema concomitatur, nonnihil excitare, iifque vigorem aliquem imprimere. Quare necesse est scarificationem hoc loco factam, in concha nempe Auris, longe majoris elle efficaciæ, quam si in ulla parte ejusdem Auris à nervo quinti paris remotiore administraretur. Idem fere dici potest de vulnusculo hic facto per obtufiorem cultellum. Etenim affirmant nonnulli Practici præltantiam hujus operationis non tam quantitatem sanguinis extrahendi, quam doloris in ista parte excitationem respicere: quod ad excitationem vigorisque conciliationem nervo quinti paris facile quis reducat.

Utilitas tionis Aurium in hoc affectu

Sed, missa hac conjectura, alias propona-Scarifica- mus considerationes, quarum respectu Scarificatio hæc ex usu esse possit in hoc astectu. 1. Hinc obtinemus particularem quandam capitis evacuationem: quæ pars, si quæ alia, in hoc morbo particulari plenitudine gravatur. 2 Ipfa fanguinis evacuatione ejuldem crassitiem & visciditatem nonnihil corrigimus, adeoque æqualiorem ejus diltributionem, æqualioremque partium nutri-

tionem

tionem

exceti

No

evacul

flet,

thodo

De

fim fa

admir

TIS (21)

chone

Auru

Fo.

tur,

puello

non

ficati

& fp

Tativi.

& ad

latim

ferofi

offun

cond

lism

fusci

rem

CUS (

tionem promovemus. 3. Hinc non nihil

excutimus partium torporem.

ner-

ex-

ina-

-109

ktre-iil-

ene-

n, in effe

Au-nini-

ıfcı-

Et-

tan-

tita-

risin

babo

nem

ona-

Sca-

ectu.

ıdam |

alia,

gra-

ejul-

cor-

iffri-

jutri-

Dem

Notandum, hanc operationem, quum evacuationem particularem & topicam præstet, non simpliciter primum locum in methodo curandi mereri, ted, præmissis univer-

salibus, suo loco subsequi debere.

Denique ridiculum quid, & superstitiosum sapir, quod aliqui in hujus scarificationis administratione factitant; dum dextræ Auris sanguinem lana exceptum sinistro hypochondrio, sinistræ dextro alligant. Hæc de Aurium scarificatione.

Fonticulus in hoc affectu multum proba- Fonticuli tur, atque hoc solo sere præsidio nonnullos utilitas. puellos liberatos fuisse novimus. Etenim non tantum ea omnia præltat, quæ scarificationi Aurium modo adscripsimus; sed & specialiter Hydrocephali potens cum curativum, tum præservativum remedium est, & ad enormem capitis magnitudinem paullatim imminuendam, ejusque superfluam serositatem evacuandam, tum inordinatum offium augmentum reprimendum multum conducit. Manifeste quoque nimiam spinalis medullæ humiditatem exficcat, calorem suscitat, nervos roborat, eorumque torporem excutit.

Quum vero hoc remedii genus per se ul- Adhoc cus quoddam sit, & nonnihil doloris puel-diū non

Z 3

un (

aciculi

tur;

ris fim

modo dit,

Font

plane

ftum

ticult

ticul

rurgio

rum

rand

Si ra

mur

remi

CHI

60 W

part

tibu

here

util

CAT

tan

fug

lo gestanti inserat, nutricique insuper alidendum, quid molestiæ indies creet, non id præscrinifi nebendum, nisi ea morbi magnitudo sit, ut ceflitas eam aliis remediis absque hoc latis domari urgeat.

posse vix speremus.

Excitandus est Fonticulus inter secundam & tertiam Colli vertebram. Aliqui eum cauterio actuali inurunt, sed hunc modum ob doloris vehementiam minus probamus: alii cauterio potentiali; sed neque hic arridet, quod caustica infantuli naturæ nimis sint adversa, & nescio quid venenosi insinuent, spiritusque saltem nimiopere dissipent, partesque debilitent. Probamus ergo potius Fonticuli excitationem per simplicem incisionem acuto scalpello factam

Modus

Aliqui utuntur sorcipe ferreo in hunc usum dus Fon-concinnato, quo cutem, loco incisionis ticulum prius atramento notato, comprehendunt, ad nuchă moderataque compressione sensum partis obtundunt, dein per forcipis medium quod oblongo foramine pertufum est, scalpellum adigunt, incisionemque perficiunt. Facto vulnere pisum seu artificiale, seu naturale intrudunt, super-imposito Emplastro dige-Itivo; huic chartam vel linteum multoties complicatum imponunt, eique scutum parvulum ex materia aliqua solida factum adhibent, cui fasciæ quatuor assuuntur, quarum rum duæ superiores fronti circumductæ aciculis capitis integumentis annectuntur; quæ inferiores involucris pectoris similiter aciculis affiguntur, atque hoc modo deligato vulnere pisum non excidit, sed sonticulum format. Aliqui loco Fonticuli setaceum surrogant, quod non plane improbamus, nisi quod nimis mole-Itum ac dolorificum videatur, solusque Fonticulus ut plurimum sufficiat. Hæc de Fonticulis. Sequentur jam aliæ nonnullæ Chirurgicæ operationes examinandæ.

um

artis

uod

lun

rals

qui

TU

Primo loco Hirudines se offerunt. Ha- Hirudirum certe applicatio quid in hoc morbo cu- plus norando præstet vix dum satis experti sumus. cere qua Si rationem solam consulamus, suspica-prodesse videtur. mur plus damni quam emolumenti ab hoc remedio exspectandum esse. Etenim, si alicui capitis parti admoverentur, ob continuam suctionem facile affluxum sanguinis eo versus concitatiorem efficerent. Sin aliis partibus applicarentur, sanguinem à partibus ejus inopia prius laborantibus detraherent.

II. Cucurbitulas non tam noxias quam in- tula cum utiles existimamus. Equidem eas quæ cum scarificascarificatione adhibentur plane rejicimus, non probantantum argumentis modo allatis de sangui-turur nosugis ducti, sed & metu dejectionis virium siæ; sine ob dolorem, & administrationis molestiam, tione, ut

moti, inutiles.

Z 4

moti. Cucurbitulas sine scarificatione, ut dicere cœperamus, neque vires, neque morbus, ejusve causæ videntur respuere. Verumtamen parum hæ efficaces funt, & perpendendum relinquimus, an utilitas, qualis qualis, ex earum ufu emergens, applicationis moleltiam fatis compenset.

Nifi alterutras effla_itet quis coplicatus affectus.

Nihilominus fieri potest, ut respectu alterius morbi conjuncti earum usus alicujus alius ali- sit momenti; ut in Pleuritide, Phrenitide, atque ubi imminet periculosus aliquis fluxus in partem quandam principem. In quo calu, forlan ista, quæ cum scarificatione adhibentur, in grandioribus & robustioribus puellis admitti possint. Applicentur autem vertebris Colli, Humeris, Natibus, interioribus Femoris partibus, plantis Pedum, aliifque locis, prout peculiaris affectus complicatus postulaverit.

> Notandum interim in tam tenera ætate multo minores eligendas esse Cucurbitulas, ealque minori cum flamma admovendas, quam alias in adultis solent, scarificationemque, si omnino admittatur, leviori manu in-

fligendam effe.

Velicatoria interadhiben-SUI.

III. Quod ad vesicatoria attinet, licet eodum uti rum etiam usum nondum satis experti siliter hie mus, & licet tum ounlina, quod partes eliquent; tum καυςικά, quod altius penetrent, crustamque inducant ab hoc affectu arcea-

mus:

mus !

tum

min

tur)

CHIE

quali

mus!

tantu

exter

citata

ceffy

in co

detri

teft.

Ipec:

tem

re, t

nervo

tere

rigid

in e

in h

mon

10,

que

que

Przi

mus: illa tamen megolina, quæ vesicas tantum in cute excitant, utiliter interdum admitti posse conjectamus.

Dicas, Cantharides è quibus fere conficiun- Objet.

tur) impense esse calidas, & praterea venenosa

cujusdam qualitatis suspectas.

lis

nis

de,

11-

110

id.

0.

il.

ate

18,

ıs,

m-

m.

60fi-

1

nt,

ea-

Respondemus, Ne quid de Catharidum Resp. qualitatibus hic interseramus, concedimus id quod afferitur. Verum cum externæ tantum cuticulæ, & particulæ ejus non adeo extensæ adhibeantur, & cum statim excitata vesica amoveantur, earum caloris excessus, virusque, vix ultra cuticulam altius in corpus penetrat, adeoque sine notabili detrimento remedium hoc adhiberi potest. Sed quæras, quid hinc commodi ex- Eorum spectare liceat? Dicimus, efficaciter in- utilitas notatur. temperiem frigidam & humidam corrigere, torporemque spinalis medulla, cerebri, nervorum, partiumque nervosarum excutere, simulque omnes partes sirmiores ac rigidiores præstare, pulsumque fortiorem in externis partibus proritare: quæ omnia in hujus affectus curatione non parvi sunt momenti.

Aliquis nostrum testatur se bienni puel-Observalo, qui hoc morbo affectus in sebrim quoque continuam & malignam inciderat, quique jam prope phreneticus sactus suerat,
præscipsisse inter alia vesicatorium verte-

Z 5 - b

bris colli adhibendum. Manifestum hinc levamen puellus mox sentire visus est, & post aliquot dies à febre liberatus est. Postea bis vel ter infusione Rhabarbari, &c. purgatus, præter omnium exspectationem, fere abique aliis remediis, hunc affectum quoque excussit. Verum euimvero, ut vix reperias commodum, quod nulla secum incommoda trahat, ita neque hoc remedium ab omni parte culpa sua vacat. Tum et- Molestum quippe & dolorificum atque ingratum pueris est: eorum porro lusus & exercitia ad tempus interturbat; cujus rei respectu, nisi forte alius morbus complicatus exercitia una interdixerit, vix plus utilitatis, quam damni præstare poterit. Adhæc, vis ejus subito exeritur, & mox paullatim exhausta est, quod non usquequaque chronico morbo quadrate Denique Fonticulus, qui chronicis morbis proprius est, in hoc affectu ejus vicem supplere posse videtur. Quocirca, vix medicamenti vesicatorii applicationem in hoc curando morbo admittimus, nisi acutus una complicetur morbus, qui sui causa hoc remedii genus exigat; ut in casu modo proposito evenit.

iam in-

commo-

Ubi autem res postulat; ut applicetur diffimus vesicatorium, commodissime id fieri posapplica- se videtur super vertebras Colli, nisi forte tionis ve- Fonticulus illic excitatus locum præoccu-

payerit;

parc

Non

mor

locis

locu

mor

ferri

inut

per

adh

me

quo

coni

CTU

tum

tere

fum

tard

tun

TIS ad paverit; in quo casu, vel pone Aures, vel inhoc af-4 digitos infra Fonticulum admoveatur. fectu. Non negamus, illud, respectu aliorum morborum complicatorum, aliis atque aliis locis adaptari posse: hic vero designamus locum, qui maxime respiciat præsentem morbum.

IV. Ligatura quoque ad hunctitulum re- Ligatura ferri posse videntur, & quidem concedimus hic ex eas aliquando in hoc affectu non plane esse possunt. inutiles, nimirum, si ex valde moderata, si per justa intervalla, si locis convenientibus adhibeantur; verum cavendum, ne incre- sed cum mento partis, cui applicantur, obstent; cautione quod fit, si satis laxæ sint, si ex lana molliori da. confectæ, si interdiu aut aliqua diei parte, leviterque constricta, noctu vero soluta, si cruribus supra genu, brachiis supra cubitum, adaptentur.

Videntur autem Ligaturæ hic conducere Al quid ad fanguinis affluxum à capite revellendum, ex confeeundemque versus partes extenuatas exter- rant. nasque & extremas promovendum; præterea ad nimis lubricum sanguinis regresfum in illis partibus, quibus adhibentur, re-

tardandum.

V. Huc quoque spectat certarum par- Fasciaru tium Fasciatio, quippe que cum Ligatu- usus & ris affinitatem habet. Solent enim aliqui eas conad firmandas partes earumque calorem fo- cinnaudi. vendum

vendum fasciis laneis eas involvere; pedes nimirum, tibias, genu, & vicinas semoris partes. Cavendum vero, ne ex nimis strictx liberam partium accretionem

impediant.

Alii loco Fasciarum Ocreas sibulatas panno laneo succinctas conficiunt; has vero non sola sirmitatis, aut caloris gratia essingunt, sed etiam ad curvitatem ossium reducendam, vel ad inslexos Articulos erigendos. Aliqui Ferulas addunt, aut particulas sissi ossis Ceti.

Verum tria potissimum in harum structu-


ra sunt notanda.

**Convexamossis partem.


2. Ut cavam vix tangant, quin potius à

compressione defendant.

3. Ut parti sint bene adaptatæ, & articulorum motum quam minimum impediant.



In hunc finem ista ocreae anteriori parti, qua genu spectant, tranversim secari possitut. Similiter, si opus situt Ferulæ supra genu extendantur, ad sustinendam & erigendam ejussem destexio-



nem, requiritur, ut cum duplici articulo formentur in loco flexionis, in hunc modum.

(366)

Forma articulationis Ferularum.

A B Rotula bina ferrea.

CD Axes articulorum ferula-

Rotulæ firmiter jun-

guntur.

FG Asserculi, sive

mm!

cipiat

axe (

trans

Dent

poff

mulq

ejas a

mine

qua

ceda

Sin

quen

tron

gand

lofq:

dum

mite

dum

D

dum

TACES

terpo

corp

erec

man

ferula bina.

Loco Ferularum commodius substitui possent tenuissimæ laminæ ferri, totumque instrumentum ex ferro

fabricari posset.

Axes bini CD, super quos flectuntur afferculi sive ferulæ F G, duobus orbiculis dictis infiguntur. Orbiculi vero ipsi A B C ex laminis ferri quam tenuissimis ([modo firmis) ne nimis graves fint, fabricantur; simulque admodum politis, ne afferculorum motum impediant. Aqualis sunt diametri, seu latitudinis, hi Orbiculi, puta duorum circiter digitorum transversorum, atque ita inter se coaptantur, ut ab omni parte paralleli sint. Interstitium vero inter illos tantum



tum sit, ut asserculorum capita apposite excipiat. Porro orbiculi hi, non modo duplici axe C & D, sed & quinque clavis serreis, in schemate punctulis minoribus notatis, transsigendi, sirmiterque copulandi sunt. Denique tota instrumenti compositio ita comparanda est ut commode alligari possit ad prominens latus genu inslexi, simulque tam extensioni quam ordinaria enjustem flexioni inserviat, dessexionem vero ejus ad alterutrum latus, præsertim ad prominens, coërceat: qua causa est cur duplici orbiculo axes insigantur, scilicet ne qua junctura vacillent, & dessexioni genu cedaut.

Similiter torsio pedum fasciis quoque frequentur emendatur. Si digiti pedum extrorsum distorquentur, nocte sasciis colligandi sunt, interposito inter calcaneos talosque pulvinari. Sin introrsum digiti pedum torqueantur, colligandi sunt tali, immitendumque pulvinar inter majores pedum digitos.

Denique ad truncum corporis erigendum, aut erectum servandum, solent thoraces ex duplici panno consutos consicere, interpositis exiguis asserculis ossis ceti, quos ita corporibus Infantium adaptant, ut spinam erectam sistant, ossa prominentia reprimant, incurva ab ulteriori compressione

feu

ut2

un

ter

titul

COM

atica

curat

przro

torqu na æ

mode

ante

ti po

grug

benis

bus &

gus

vel 3

Add

70 .

Ene

desendant; curandum quoque ne sint, aut saltem quam minimum, puellis gestantibus molestæ, atque ut super spinam dorsi suniculo in hunc usum accommodato sibulentur.

CAP. XXX.

Materia Papuandini. Et 1. E. luentia primas vias.

Ateria hæc multiplicis ac nobilissimi usus est, plurimisque Indicationibus satisfacit. Omnia quippe medicamenta, quæ vel morbi causas, vel morbum ipsum, vel symptomata primo respiciunt, exceptis solis Chirurgicis, complectitur.

Dividitur in remedia Interna & Externa; & utraque in Simplicia & Composita. Interna demum subdividi possunt in Eluentia primas vias, in Praparantia, in elective Evatuantia, in Alterantia specifica, & Roborantia, de-

nique in Corrigentia symptomata.

Primum locum inter hæc merentur Interna, atque ex illis Eluentia impuritates primarum viarum: cum hæ, ut supra monuimus, habeant rationem impedimenti respectu remediorum sequentium, & simpliter primo sint amovendæ. In singulis autem titulis,

titulis, quantum rei natura fert, simplicia

compositis præmittemus.

Eluentia hæc tria genera adhuc comprehendunt, viz. Enemata, Emetica, & Cathar-Etica lenitiva.

Enematum usus, eorumque formula quadam.

Be. Lactis vace. rec. calfact. Ziij. iiij. vel v. semin. anis. pulv. gr. x. sacch. commun. Zj. zjß. vel Zij. vitellum unius ovi. M. F. Enema. Addi insuper potest butyr. recent. Zs.

1

tes

10-

Te.

159

B. Decocti emoll. q. s. elest. lenit. &B. syr.

ros. solut. viol. an. 3vj. ol. chamam. 3j. M. F. Enema. Injic. tepide.

Aa

B. Rad.

(370)

veni

multa

corpor

faculta

tentes

mitte

vice e

mend

per le

Billian

excret

fulius

forte

per v

efficac

tracha & fall

lofque

totum

ftam p

fibilen

que t

levior

fortio.

tim ha

Opera

quan

fortio

prop

R. Rad. alth. contus. ZB. vel ejus loco fol. malv. vel slor. ejus dem M B. sl. chamam. p. j. semin. carminant. Zij. Coq. in s. q. seri lactis cerevisiati. Colatura Ziiij. vel v. adde diacasia vel Elect. passulati ZB. syr. rosat. solut. simpl. sacch. culinaris an Zj. butyr. recent. Zvj. Addi potest, si visum suerit, vitellus unius ovi.

R. Fimi equi non castrati recentis ziß. semin. anis. senic. malvæ contus. an. ziß. sl.
chamæm. p. j. Coq. in s. q. ferilactis cerevisiati. In colaturæ inj. vel v. solve syr. viol.
zx. sacch. communis, ol. rosat. an. zs. M. F.
Enema.

Emeticorum usus, & quadam eorum Exempla.

Emeticorum utilitas. Emetica, seu vomitoria, tria potissimum præstant. 1. Humores sive crudos, sive corruptos, & quascuuque impuritates in ventriculo contentas evacuant, idque per viam breviorem & expeditiorem, quam si per ambages & anfractus Intestinorum circumducerentur. 2. Agitando omnes partes, imprimis viscera, humores crassos viscidos que iis adhærentes, aut iisdem impactos magis sluxiles reddunt, & frequenter excutiunt, præsertim in ventriculo & Intestinis collectos: quo nomine Colicis doloribus subveniunt,

veniunt; & ad obstructiones reserandas multum conferunt. 3. Omnium partium corporis, & maxime viscerum, excretricem facultatem efficaciter stimulant, hincque latentes morborum, imprimis febrium intermittentium, fomites & causas sæpe unica vice exhibita eliciunt. Enimyero inter vomendum Intestina quoque ad exerctionem per sedem stimulantur; Hepar per Porum Biliarum bilem ; Pancreas peculiare suum excrementum per novum ejusdem yas profusius in intestina effundit; Lien quoque forte suum excrementum in ventriculum per vasa nondum satis nota uberius exonerat; Renes serum per ureteres; Pulmones efficaciori tuffi concitata pus mucumve per trachæam arteriam; Cerebrum, pituitam, & falfum ferum per palatum, per nares, oculosque copiosius solito excernit. Denique totum corpus ad diaphoresin, sive manifestam per sudorem, sive occultam per insenfibilem transpirationem, pronius plerumque redditur. Notandum interim est, non leviora quæque vomitoria, neque etiam ipfa fortiora, si imminuta dosi exhibeantur, statim hæc omnia plene perficere; attamen fua operatione plus minusve pro viribus & quantitate medicamenti eo collimare, & fortiora quidem, plena dosi data, tres metas propolitas efficaciter attingere.

-100

en-

12111

per

m-

,IM-

ique igis

unt,

olle-

fub-

unt,

A 2 2

Ex

Circum- Ex prædictis facile cuivis innotescit foradhiben- tiora Emetica, pleniori quantitate præscrida in eo- pta, puellis hoc morbo correptis competerum ulu re non posse, neque teneras eorum vires tantos in corpore tumultus, & tam universalem evacuationem subitoque sactam perterre posse. Quapropter circumspecte admodum hoc remedii genus puellis præscribendum est, tum etiam atque etiam vires & medicamenti efficacia ac quantitas contra lunt pensitandæ. In hunc ergo finem aliquot cautiones juniorum gratia hic subnectere non erit inutile.

1. Vomitus in hoc affectu concitandus non est, nisi humores sponte sua nonnihil sursum vergant, iique per superiora non

difficulter exigi possint.

2. Nisi puelli per se ad vomendum sint

proclives, vomitumque facile ferant.

3. In sputo sanguinis, Phthisi seu Tabe, Hæmorrhagia Narium in quavis interna venarum apertione, similibusque casibus ab hoc remedio abstinendum.

4. Potentiora Emetica liberaliori dosi exhibita hic interdicuntur. Etenim metus est, ne insitos spiritus nimium depopulentur, ipsasque partes solidas plus æquo prius

extenuatas ulterius eliquent.

Oportet ergo, ut vomitaria, hic in usum vocanda, vel natura sua leniora sint, vel sal-

Qualia vomitoria hic conve-

tem

tem

DIN 0

quant

evacu

mus,

mus v polita

corpo

lenio

frabu

corre

haud

ram. humo

tisface

Libju

trath,

ad me

adde

pide,

tem fortiora satis correcta & parca dosi ad-

torfcri-

ete-

Taki

perread-

res &c

ontra m ali-

ubne-

endus

lidino

non

mint

Tabe,

nave-

nus ab

i doli

metus

pulen-

optius

nufum

ten

Object. Dicas si leniora sint aut dininuta quantitate exhibita, vix essicaciter posse humores evacuandos educere.

Resp. Revera, ubi naturam, aut non omnino, aut parum adminiculantem habemus, ita rem se habere; in quo casu negamus vomitoria omnino esse exhibenda: supposita vero aptitudine tum humorum tum corporis ad hanc evacuationem (ut in prima & secunda cautione requiritur) etiam leniora vomitoria humores in primis viis stabulantes evacuare queunt : quod idem dicendum quoque est de fortioribus probe correctis parcaque manu exhibitis. Etenim ob correctionem & diminutam quantitatem haud multum corpus exagitant, aut naturam lacessunt, atque interim ob ventriculi humorumque proclivitatem huic scopo satisfacere valent. Paradigmata jam aliquot Subjungamus.

Re. Summitat. Erigeri M. B. passul. Co-rinth. Zj. Coq. in thj. cerevisia non lupulata ad medietatis absumptionem. Colatura Ziij. adde syr. acetos. simpl. ZB. M. & exhib. tepide

Vel

Span. loco frigido facta & per subsid. optime A a 3 depurat. depurat. 31. 318. zij. (pro ratione ætatis ac roboris) syr. acetos. simpl. 3B. seri lactis cerevisiati 318. aq. cinnam. gutt. x. vel ejus loco, si convulsiones metuuntur, aq. antepilept. Lang. 9j. M. & ebibat tepide mane cum regimine.

R. Succ. fol. Afari & B. Dij. vel & j. fir. asetosi simpl. Zij. seri lactis cerevisiati q. f. M.

R. Salis vitrioli prap. à gr. v. ad gr. x. Exhibe similiter in sero lactis cerevisiate.

Catharctica Lenitiva.

obser-

vandæ.

Hæc evacuantia cum effectus suos planes circa cide sine tumultu exequantur, non illam usum Le-mientium Medici circumspectionem quam Emetica aut elective Purgantia postulant. Tria tamen circa illorum usum cavenda sunt. 1.Ne ingrato sapore eam ventriculo nauseam inferamus, ut postmodum omnia medicamenta aversetur & abhorreat. 2. Ne nimia pharmaci quantitate ventriculum gravemus. 3. Ne assumptum pharmacum vomitu statim rejiciatur. In hunc ultimum scopum solent aliqui os puelli grato aliquo liquore statim colluere; alii tantum in os ejusdem ingerunt, vel cerasa condita, vel pruna Brigniolensia, vel conservam Berberorum, vel succum Aurantiorum saccharo admixtum, aut similia.

Dividi

& Car

Pharm

natan

faciur

Mann

MATTE nuset

tortio

nonu Major

Pin Pulpa

Larun

Altha

Malve

guedi

dulc.

fe pa

ganti

VIII

ftant

cafia

Vanu, pro 3

Viola

Pass

Flor

Dividi hæc Lenitiva possunt in Simplicia Lenien-& Composita; & hæc iterum in ea quæ in tium di-Pharmacopolius exstare solent, & ea, quæ pro re

nata de novo parantur.

1320

566-

10.

HEP-

nane

1. A=

f. X.

pla.

llam

etica

a ta-

I.Ne

min-

dica-

nimia

rare-

vomi-

1 fco-

uo li-

in os

el pru-

orani,

chin;

)ividi

Simplicia, quæ huic scopo per se satisfaciunt, admodum pauca reperiuntur; ut Mama, Casia fistularis, Aloë socotrina, Tamarindi, Polypodium quercinum. At vero minus efficacia, quæque (nisi purgantibus aliis fortioribus acuantur) lenitivam indolem non induunt, plura occurrunt; ut Vva passa majores, tum Corinthiaca, Jujuba, Sebestena, Pruna dulcia & damascena, Ficus, Dactyli, Pulpa Pomorum affatorum, Flores Malva, Violarum, Herbe Parietarie, Mercurialis, Rad. Althee, Glycyrrh semina 4 frig. maj. semina Malva, Amygdala dulces, Ova sorbilia, Pinguedines, Butyrum, Oleum olivar. ol. amygd. dulc. serum Lactis, & similia. Hæc licet per fe parum efficacia fint, aliorum tamen purgantium admixtione non contemnendam vim lenitivam acquirunt.

Composita lenitiva hæc in Officinis prostant, Casia extracta cum vel sine Senna, Diacasia, Elect. Lenitivum, Diaprunum lenitivum, Elect. passulatum, Decoctum commune pro Medicina, Decoctum sl & sruct. syr. & mel Violarum, syr rosar. sol. mel Mercuriale, mel Passulatum, Conserva Rosarum pallidarum, Florum Malya, Violarum. Formulas nonnul-

Aa 4

las

las extemporaneas his subjungere possumus;

Manna Calabrina opt. 3vj. cremor. tartari gr. vij. seri lactis cerevisiati (Dosset-Ale dicti) in quo parum sem. anis. ferbuerit 3js. Misce, & exhib. mane. Loco seri ejusmodi substitui potest jusculum aliquod, vel Decoct. commun. pro Medicina, vel Decoct. sl. & fruct.

sar. solut. zijs. viol. zj. cremor. tart. gr. x. seri lactis cerevisiati zis. M. & capiat in aurora. Aliqui parant syr. lenitivum in hunc

modum.

By. Polypod. querc. Zij. tart. alb. prapar.

Zij. Poma dulc. N. xij. Uvar. passar. exacinat. Zj. Coq. in s. q. aq. font. ad thj. In Colatura infunde per noct. fol. senn. elect. Zj B. rhab.

Zij. pulpa Casia recenter extract. Zs tamarind. Zj glyc. semin. anis. coriand. an. zj B. mane per pannum laneum densum exprimantur.

By. Expressionis Zviij. sacch. alb. Zvj. Coq. parum, tum adde manna opt. syr. ros. solut. an.

Zij. viol. Zj F. syr. Lenitivus. Capiat Puellus Zj. aq. cichor. vel parietar. Zs. & succilimon. zj dilutam.

Re. Aloes lota, vel Pil. Aloephang. gr. vij. F. Pilulæ 2. cum syr. ros. solut. Immittantur in 2. cerasa condita exemptis osiculis, qua integra deglutiantur, ne sapor offendat hora

fomni

141.31

men.

Tietat.

ne je

mas v.

Pi

partu fpiciu

illam

num

vero !

maxil

L

Pituit

peran

di; T

COTTO

bus ci

reffre

fomni vesperi. Mane superbibat syr. ros. solut. zj. in sero lactis cerevisiato.

R. Syr. rof. folut. 3vj. violar. 3 B. succi limon. 3j. elect. passulat. 3j. aq. cichor. vel parietar. 3js. M. F. Haustus, quem capiat mane jejunus. Atque hæc de Eluentibus primas vias: sequuntur Præparantia.

eri

70-X.

inc

M.

101-15-

MT.

11-

200

uel-

ili-

211-

XXXI.

Praparantia, eorumque Usus.

R Emedia hac partim humores praparan- Prapara-dos, partim vias, per quasii educendi, tium gepartim ipsas partes in quibus stabulantur, re- Qui espiciunt. Sciendum autem evacuationem vacuatio illam, quæ Emeticis perficitur, minime om- quæ minium præparationem prærequirere; illam nus prævero que Catharcticis aut Expectorantibus, paratiomaxime.

I. Humores praparandi in genere funt, vel Que Pituitofi, nimirum frigidi, qui calidis attem-praparaperandi, crassi attenuandi, viscidi inciden- bus hudi; vel Biliosi, viz. acres, amari, urentes, moribus debeatut. corrolivi, qui lenientibus & compescentibus cicurandi; vel Melancholici, scil. terrestres, fæculenti, tartarei, qui benigniori

A 2 5 matemateriæ commiscendi & fluxiles reddendi; vel denique serosi, qui disponendi & quasi manu dirigendi sunt, vel ad vias urinarias, ut per mictum; vel ad alvum, ut per secesfum; vel ad partes cutaneas, ut per sudatio-

nem facilius exigantur.

Viarum

II. Via per quas Evacuatio decernitur, muprapara- niendæ quoque sunt ac adaptandæ, & non tantum communes, sed & ipsæ speciales, per quas materia peccans in specie ad communes vias deducatur. Alia enim præparatio est vasorum Renum, (quæ scilicet lubricantibus & laxantibus maxime perficitur) alia vasorum Hepatis, quæ sit aperientibus, abstergentibus, & nonnihil simul adstringentibus; alia vasorum Pulmonum, quæ potius lenientibus & maturantibus peragitur, admixtis forte pro ratione materiæ vel incidentibus & attenuantibus, vel contra incrassantibus & fluxionem avertentibus.

Præparactu partium.

III. Partes ipsa, in quibus pra cateris humotio respe- res vitiosi impinguntur vel fluitant, medicamenta sibi appropriata admiscenda postulant; & prout hoc velillud viscus plus minusque afficitur, modo cephalica, modo hepatica, modo pulmones respicientia, &c. dominium in præparantibus obtinent, & liberalius sunt admiscenda.

Conditiones Prapa-

Porro (ut simul omnes propequalitates præparantium in hoc affectu requisitas complectamur)

plea

przid

(nili

minde

jure ! frices

copta

huc

fiven

cenin

appr

præ

mor

que

mul

Aten

mate

prat

affec

t2, f

przp

rata :

reme

profi

tot fer

hic,

mort

fueri

fican

(379)

id; uafi

cef-

110-

mnon

les, om-

aratlu-

fici-

nenad-

um,

per-

enz ontra

\$110dica-

oftu-

is mito he-

c. do-

libe-

ttates

COMnur) plectamur) dicimus hæc remedia ex Arte rantime præscripta ut plurimum esse moderate calida, in hoc af-(nisi scilicet febris adfuerit) esse attenuantia, incidentia, & deobstruentia, simulque peculiari jure nonnihil Hepar, Pulmones, & Caput respicere, que partes plerumque humorum copia in hoc morbo gravari solent; Esse adhuc huic affectui in specie nonnihil appropriata: si vero non occurrant talia, quæ simul sub censum præparantium cadant, morboque approprientur, saltem alia tunc specifica præparantibus admiscenda.

Tandem in memoriam revocandum est, crasinhumorbum hunc esse Chronicum, materiam- mores in que ejusdem esse tardi motus, totamque si-hocassemul vix præparari, aut non continue insi-gendi. stendum esse præparantibus, donec tota materia fuerit præparata; ita quippe pars

præparata, & jam fluxilis reddita, vel alios affectus, vel etiam graviaforte symptomata, facile concitet. Quare per vices modo præparandum, modo materia jam præparata pharmaco exigenda. Qua sane alterna remediorum administratione, tum viribus

prospiciemus, tum causæ morbificæ tuto (ut ut sensim) occurremus. Notandum quoque hic, quod & supra monuimus, ubi causæ

morbificæ eousque diminutæ ac edomitæ fuerint, ut ad tempus non impediant speci-

ficam curationem; buic quamprimum propriis

thias dale.

Vener

de Sti

form

N.

ram

mit Ni

terra

Line

Pal

exter

9.1

US:

ridia

20.1

20, 3

3j. T

9j. (

Tim

318.

lush

tidia

priis alterantibus esse incumbendum, & in eadem persistendum esse, donec causæ de-

nuo processum interturturbaverint.

Hisce jam præmiss, Praparantia Simpli6ia, ut & Composita illa, quæ in Pharmacopolis asservari solent, nec non exempla quædam Decompositorum, ordine subjungere ulterius visum est: Monemus tamen haud
expectandum esse, ut singula simplicia, (aut
forte eorum aliquod) omnes qualitates, quas
modo exquisitis illis & appropriatis præparantibus attribuimus, complectantur; (ita
enim nulla compositione foret opus) sed tot
& talia è simplicibus à nobis enumeratis à
prudenti Medico seligenda, ac inter se contemperanda sunt, quæ simul juncta remedium omnibus iltis qualitatibus donatum
concinnent.

Simplicia, & Composita in Officinis asservata sunt sequentia. Herba omnes capillares, imprimis, Trichomanes; Ruta muraria;
Spica radicis Osmunda regalis; Gemma vixdum erumpentes Filicis maris; Polypodium murale; Phyllitis, seu Lingua Cervina, Ceterach,
Hepatica, Agrimonia, Cuscuta, Scabiosa, Betonica, Veronica mas; folia & cortex Tamarisci; cortex radicum Capparum; rad. Cichor.
Endiv. Gramin. Asparag. Myrrhidis; Glycyrr.
Tartarum; (quanquam forte ejus lubricitas
minus congruit) Passula, imprimis Corinthia-

thiaca; Pruna Damascena; semin. Anis. Fænic. dulc. Coriandr. Carui; Anethi; Syr. Capill. Vener. de Beton. simpl. & compos. Byzantin. Cichor. de Eupator. de 5 radic. de Scolopend. de Stæch.

Ex his ulterius Decomposita pro re nata

formari poffunt; Ut,

my

de-

mi-

200-

eul-

raud

(aut

quas

apa-(ita

d tot

con-

me-

mute

5 21-

(4)11-

aria;

e vix-

1 加州-

TACE,

. Be-

1774-

ichor.

NOTT.

1CItas

Corns-

this.

P. Spicas, vel Gemmas Rad. Filicis maris
N. v. Coq. in the lactis ad Ziij. Colaturam bibat mane, jejuno stomacho. Convenit maxime junioribus & lacti assuetis.

Vel

R. Gemmarum Felicis maris tenellarum è terra modo erumpentium M j. Veron. maris, Ling. Cervin. Hepat. an. Mß fl. Tamarisci p. j. Passul. minor, Zjß. Macis Zß. Pullium unum extenteratum, &c. & cum farina avenacea, q. s. F. Jusculum, ut artis est. Capiat Puellus Ziij. vel iiij. mane, & hora quarta pomeridiana; addendo, si lubet. Crem. Tart. gr.x.

B. Capill. Vener. Hepat. Agrimon. Cuscuta, an. M.B. Radic. Filic. maris, gramin. Asparag. an. 3B. fl. Tamarisc. p. j. Passul. Corinth. Zj. Tartar. alb. prap. 3j. Glycyrrh. 3B. Macis Dj. Coq. in thij. aq. font. Colatura thj. adde vini alb. vel Rhenan. Ziij. syr. de Scolopendr. ZjB. M. F. Apozema; de quo bibat Puellus haustum, mane, & hora quarta pomeridiana. Valet potisimum, ubi pertinaces obstructio-

structiones, in Mesenterio, Hepate, &c. adsunt.

R. Tußilag. Capill. Vener. Ling. Cervin. Hepat. an. M.B. Radic. Myrrhid. Asparag. an. 3B. Glyc. Hispan. zij. Macis Dj. Passul. exacinat. zj. Iujub. N. vj. Sebesten. N. viij. Fic. incis. N. ij. Coq. in s. q. aq. Hord. Colature clara thj. adde syr. Capill. Vener. zj B. M. Hujus Apozematis usus pracipuus est, infarctis simul aut obstructis Pulmonibus.

R. Musti Cerevis. thij. Hepatica, Capill. Vener. Phyllit. Scabios. Tußilag. Matricar. Artemis. an. Mj. Fic. incis. Passul. exacinat. an. thj. Glyc. sem. Anis. an. 3ij. Coq. lento igne Per horas 6. Colatura servetur in usum. In eo-

dem prope casu conveniens est.

Vel

Cornu cervi, Ebor. an. 3j. fol. Veron. maris.
Phyblit. Hepat. Scabiof. an. M. iij. spic. rad.
Osmund. regal. Filic. an. 3j. Coq. in 4. Congiis musti cerevisia non lupulata (Mc dicta)
lento igne per horas 4, vel 5. Dein post aliquot boras coletur liquor per setaceum; tum adde succi Cochlear. Becabung. an. ths. fermenti cerevis. q. s. Fermentetur more solito, & in dolio-lum reponatur, è quo ad usum pro Potu ordinario depromatur. Conducit pracipue, ubi adesse suspicio Luis Venerea, vel Scorbuti complicati.

ximu

ca hu

cant,

more:

fpiciu bend:

optin

que

poeri nori

tobu

do n

In ut

666

dere;

per epiena

tione Hi fibi a

lia C

chol

Bydy

CAP. XXXI.

M.

Fill.

an.

Fic.

1971

M.

वारीं

pil.

AT-

igne

11:00-

1.74

BATE.

Tad.

Con-

ditta)

liquot adde

nti (6-

delio-

u grdi-

diad-

plicati.

CAP.

Evacuantia elective.

PRæparata materia morbi, apertisque Evacuaviis, per quas evacuatio instituitur, protium diximum est, ut consideremus quæ pharmavisio.
ca humores in specie peccantes elective educant. Hæc autem medicamenta partim humores. partim partes in quibus stabulantur, respiciunt: in singulis vero justa virium habenda est ratio.

Violentiora vel plane abdicanda, vel Questine optime correcta & parca dosi circumspecte-rejiciena que adhibenda sunt: & junioribus quidem pueris ac infirmioribus vel mitiora, vel minori dosi, magisque correcta; majoribus & robustioribus fortiora pleniorique dosi (modo non transcendant vires) permittenda. In utroque casu tutius est paulo infra vires substitere, quam easdem vel tantillum excedere; & omnino in hoc affectu satius est per epicrasia procedere, quam simul & semel plenarium humorum peccantium eyacuationem tentare.

Humores porro in corpore dominantes sibi appropriata pharmaca desiderant; ut Bilia Cholagoga, Pituita Phlegmagoga, Melancholia Melanogoga, serum Humorque aquosus Hydragoga.

Ada

(384)

Adhæc, si Hepar præaliis partibus humoribus gravetur, talia sunt eligenda purgantia, quæ peculiari jure Hepar respiciunt. Similiter, obsessis multum Pulmonibus, aut Cerebro, aliisve visceribus, ejusmodi sunt eligenda purgantia, (quantum quidem fieri potest) quæ hisce partibus respective sunt appropriata. Sin vero non occurrant fimplicia purgantia nonnullis partibus fatis speciatim dicata, apta aliorum ingredientium istis partibus familiarium admixtione eorum defectus supplendus est.

Rhabarbati in hoc affe-

Denique (quoad fieri poterit) purgantibus directe morbi essentiæ oppositis insisteau usus. re conandum est. Hoc nomine Rharbarbarum præ aliis simplicibus commendamus. Est enim medicamentum moderate calidum & siccum, spiritibus insitis omnium partium satis familiare, & amicum, torporem spirituum benigne excutit, mollitiem laxitatemque partium firmat, internam lubricitatem nonnihil corrigit; pulsum ad artus evocat, calorem externarum partium auget, internarum & imprimis earum, que nutritioni inserviunt, vigorem & activitatem fovet. Adde quod rarisime (modo justa dosi exhibeatur) super purgationem invehat, medicamentum profecto omni atati & complexioni satis tutum.

Hisce jam præmissis, nonnulla simplicia purgantia, quæ huc speccant, nec non pa-

-radigma-

ndigm

nendali

bet, qu

put quo

rantur:

mitted a

tempera

Purga

Man

AMOT MIT

felut. d

Scamin

thoacan

Syr. Ro

querem

de pom

de Prin

Confecti

Extern

R.

liber,

Mone je

R.

Cicher,

d. Fil

radigmata quædam compositorum proponenda sunt. Neque etiam quidquam prohibet, quin multa ex lenitivis supra citatis, huc quoque, diverlo tamen respectu, refefant rantur: Illic enim respiciuntur, ut acuunt lenitiva alias ignaviora; hic vero potius, ut temperant purgantia fortiors.

> Purgantia Simplicia, tum Composita Officinalia.

fim-

is spe-

mutte

muno:

orrigit;

earun,

HITUTA-

gma

Manna, Casia fistularis, Tamarindi, Myrobalanorum genera, Rhabarbarum, Aloë, Syr. Rof. solut. de Cichor. cum Rhab. dupl. Augustan. nifte- Scammonium, Agaricus; sem Carthami, Mechoacana, Jalappa, Turpethum, Mercur. dulcus Syr. Ros. Solut. cum Agar Epithymum Polypod. quercin. Senna; Syr. Magistralis ad Melanchol. de pomis Reg. Sapor. Diabalzemer, Elect. lenit. de Prunis. Solut. Elect. passulatum, Diacathol. Confectio Hamech Bened. laxativa, &c.

Extemporaneorum Compositorum exempla quædam.

R. Syr. Augustan. 3j. Ros. solut. 3ij. aq. Cichor. 3B. pro dilutione. F. Potio, exhibenda mehat, nane jejuno stomacho

Re. Rhab. opt. pulverat. gr. xviij. Syr. de Cichor. cum dupl. Rheo 3vj. Rosat. solut. 3ij. aq. nplicia ol. Filicis zvj. M. F. Haustus. Biliosis, ut & on pa- Hepaticis, maxime convenit.

BL. FO-

R. Folior. Senna, Polypod. querc. Epithym. an. 3j. Rhab. opt. 9j. Chrystall. Tartar. semin, Fanic. dul. an. 9j. F. Infusioin f.q.aq. fumar. 1. a. pro 3iB. Colatura expressa adde Syr. Magistral. ad Melanchol. 3vj. aq. Ciunam. gut. vij. vel Antepilept. Lang. A.S. M. F. Haustus. Me-

lancholicis maxime designatur.

R. Fol. Senna zij. pulp. Tamarind. zvj. semin. Anif an. B. Cremor. Tart. 9B. F. Infusio in s. q. aq. fontan. per noct. Cum express. Ziij. F. sec. art. Emulsio ex Amygd. dulc. decortic. 38. semin. 4. frig. maj. an. Bij. pro 2. dosibus; addendo singulis Syr. de Cichor. cum qua- pur. Ti drupl. Rheo. Manna opt. an. Biij. Humores quem acres, & adustos, evacuat, & contemperat.

R. Elest. lenie. 3iij. Rhab. 9j. Crem. Tart. um. 0 semin. Anis an. D.B. fl. Borrag. Anth. an. final cu p. B. aq. fumar. q f. F. Infusio per aliquot ho-mauna ras. Colatura, per pannum laneum densum fa- 3. Eta, 3j B. adde Syr. de pomis Regis Saporis 3B. min M. F. H.

B. Folior. Senna zj B, vel zij. Agar. trochifc. lop. fo 5B. sem. Fanic. dulc. 3B. fl. Chamam. N. x. h. jala Coq. in f. q. aq. font. f. a. Express. 3x, vel 3j B, hunof adde Syr. Rof. solut. cum Agar. 3v. Manne opt. Imane Biij M. F. Haustus Humoribus crasis, & pi-man tuitosis, potisimum dicatur.

Re. Fl. Sambuci p. j. Rhab. Jij. Falapp. web. Mechoacan, an. 9j. Crem. Tart. 9 B. Nuch 13 Moschat. gr. xv. F. Infusio & levis ebullitio in chia

4.1

1876 316

F. Potro

CONTENT

8:

91. Pal

Tartari

9.44.

adde Sy

Melance

min, eura ziß. sambuci, & vini Rhen, an. q. s. Colamin, eura ziß. adde Syr. Ros. solut. zß, vel zvj. mar. F. Potio, Pituitosis, Cachecticis, & Hydropicis Mar. convenit.

Be. Fol. Sennaziß. Rhab. Dij. Agar. troch.

Me-Dj. pulpa Tamarind. Zij. semin. Anis. Crem.

Tartari, an. Dj. sl. Anth. p. S. F. Insusio in s.

1. aq. font. & levis ebullitio. Expressionis Ziß.

Insusade Syr. Ros. solut. cum Agar. Magistral. ad

Express Melanchol. an. Ziij. M. F. Haustus. Mixtos

dun-numores evacuat.

Re. Mercuriidulc. gr. xv. conserv. Viol. 3j. mand-pulv. Tragac. gr. j. M. F. Bolus cum Syr. Viol. minus juem capiat mane, superbibendo mox 3j. Syr. Ros. solut. in haustulo seri lactis cerevisiati solutati. am. Commendari potest Pueris, qui vermibus imul cum hoc affectu laborant, uti & Lue Venemulo-rea una infectis: item Strumosis.

mish we. Mercur. dulc. gr. xij. Jalapp. gr.xj.
mish nucis myrist. gr. B pulpa passul. zj. M. F. Bolus
um syr. viol. sumendus in Aurora. Loco Jamish app. substitui possunt scammon. prap. vel reN.x in. jalapp. gr. iij. vel iiij. Convenit Pueris simul
miss trumosis; ut & iis, qui Lue venerea suspecti sunt
ment aborare, iisque qui difficulter purgantur, & ingrata plane respuunt.

P. Mercurc. dulc. zj. resin. Jalapp. DB., Jalapp. acch. puriss. in aq. beton. vel simili dissolut. ziij. sel zb. F. sec. art. Tabella pond. Dijb. vel zj.

Mioi Capiat unam pro dosi.

gr. xj. syr ros. solut. q. s. Pilula, quas capiat Puellus in cerasis conditis abditas exemptis osciculis. Possunt & deaurari Pilula commodioris exhibitionis ergo.

M. j. cerevis. commun. thj. Infund. per 12 horas, de colatura hujusmodi bibant Puelli, qui

noctu avide potum expetunt.

CAP. XXXIII.

Alterantia Specifica.

Præparatis jam atque ex parte evacutis morbi causis, vel saltem ita edomitis, ut ad tempus ulteriorem curationem non impediant, statim ad hæc alterantia specifica procedendum est; quæ quidem jugulum quasi ipsius morbi petunt, & quorum gratia ista cum præparantia tum evacuantia præmissa suerum.

Eorum definitio,

Definiri autem possunt hæc specifica, Remedia, qua ipsi essentia morbi è diametro contraria sunt, adeoque eam directe impugnant.

& DiviSunt autem ea vel Simplicia vel Compofio. sita; & simplicia quidem quæ nobis hactenus innotuerunt sunt sequentia. Radis
Osmunda regalis, seu potius spica radici

ejus

ejus dem

mail,

dem 71%

minis,

Нетва

Hepath

Borrag

MINERY,

as, Ra

ne, T cortex Martis

Chaly

Sperma.

team,

dibano

Si

action

Re

ad Afy

tates,

mam r

morb

descri

Has p

pulp ejusdem abjecta media parte; Radix Filicis maris, item Turiones vel potius Gemma ejufdem vixdum è terra prorumpentes; Radices Graminis, Cichor. Asparag. Rub. tinct. Eryng. Herba capillares, Ceterach, Lingua Cervina, Hepatica, Veronica mas, flores & folia Lamii, Borrag. salvia, Roris mar. Tamarisci, Abrotonum, Absinth. pontic. Chelidon. maj. Crocus, Radic. curcuma, Sarsa parill. Sassafr. China, Tria santala, Lignum Guajaci ejusque cortex; flor. Sulph. Chalybs prapar. Crocus Martis, Sal Chalyb. vinum Chalybeatum, fr. Chalyb. vinum album Gallicum & Rhenanum, sperma ceti, Moschus, Ambra Grisea, Castoreum, vermes terrestres, Iecora Ranarum & Pullocum Corvi, Millepedes vino albo lota & in clibano siccata ac pulverata, & similia.

Si quis autem quærat quo modo quave opposiactione medicamenta hæc affectus hujus estio inter morbum sentiam specialiter impetant:

Respondemus sorte non necesse esse, ut specifica.
ad Asylum istud ignorantiæ, occultas qualitates, statim consugiamus; sed in memoriam revocandas esse partes essentiæ hujus
morbi cum primariæ, tum secundariæ supra
descriptas: Siquidem sacta collatione inter
illas partes & hæc medicamenta, haud obscuram contrarietatem ac repugnantiam erga illa invicem deprehendemus. Morbus
enim hic consistit in intemperie frigida & huBb 3 mida,

radio

可叫

mida, in spirituum insitorum inopia ac torpore, in toni partium enervatione: E contra remedia hæc calefaciunt & siccant, spiritus insitos fovent, torporem eorum excutiunt, tonumque

firmant.

Porro, quandoquidem cum caliditate ac siccitate remedia hæc infignem obtinent friabilitatem ac tenuitatem partium, fit, ut non tantum viscida incidant, crassa attenuent, sed & æquationem quandam omnium succorum in massa sanguinea sluitantium concilient, æqualemque (habita ratione distantiæ à fonte caloris) distributionem tum caloris tum fanguinis procurent. Hinc partes externæ prius extenuatæ liberaliori alimento caloreque fruuntur; parenchymata viscerum, mole nimium aucta, à craffioribus & viscidioribus succis alimentariis liberantur, & nonnihil inde imminuuntur: hinc irrationalis illa partium nutritio, seu άλογοτεοφία, à qua tanta vitiorum organicorum series dependet, emendatur. Denique remedia hæc partes nervosas quoque ipsamque spinam dorsi nimis debilem roborant, ac fovent.

Dicas, omnia simplicia à nobis supra citata non hæc omnia plene perficere. Concedimus. Nam Santalorum genera, licet sua siccitate, friabilitate ac tenuitate partium, fortiter hunc affectum impugnent, sua ta-

men

men h

partes

Emplic

d2, 16

tatem.

nulla!

Castor

bo mu

funt 1

Porro

galis

teraco

tate a

friabi

2d 20

alias

Veru

ropo

admi

Light

tate

nun

aliis

men

COTU

quin

tum

ique

teac

nent

, ut

atte-

OTTI-

itan-

tara-

utio-

rent.

libe-

aren-

ta, à

renta-

nuontritio,

mor-De-

ropo.

pra ci-

Con

cet fu

rtium

na ta-

men

men frigiditate videntur potius ad morbi partes accedere. Dicimus ergo hujusmodi simplicia per se sola non esse administranda, sed aliis duntaxat admixta, quæ qualitatem noxiam satis corrigant. Similiter nonnulla Simplicia impense calida, ut Crocus, Castoreum, flores Sulphuris, &c. huic morbo multum repugnant : sed in usum non funt vocanda, nisi prius contemperata. Porro Sarsa parilla, Sassafras, Osmunda regalis, Filicis genera, Herba capillates, Ceterach, Lingua cervina, & similia, (caliditate ac siccitate simul junctis cum insigni friabilitate ac tenuitate partium) plurimum ad æquationem sanguinis, tum ad multas alias morbi partes subigendas contribuunt. Verum partes nervosas ac fibrosas vix satis roborant firmantque; quare Cephalicorum admixtionem desiderare videntur. Adhæc, Lignum Vita, suo calore, siccitate, friabilitate refinosa ac Balsamica substantia, tonum partium multum firmat, nonnullisque aliis morbi partibus contrariatur: cum tamen parum conferat ad æquationem succorum in massa sanguinea contentorum, quin potius eam forte impediat; nonfine fumma cautione, correctumque, & exigua quantitate est præscribendum. Denique ex simplicibus hic recitatis nonnulla, magis ad vires omnes corroborandas, quam ad morbi Bb 4

morbi essentiam debellandam, recipiuntur; ut Salvia, Moschis, Ambra Grysea, & fimilia: que non nisi aliis efficacioribus magisque appropriatis admixtum in usum

biliora.

Quod si quis ulterius quæsiverit quænam specificis Simplicia è proposi is efficaciora ac nobiliora sunt æstimanda: huic regulis tequentibus respondemus.

> 1. Illa funt nobiliora medicamenta, qua simul pluribus essentia morbi partibus oppo-

nuntur.

2. Illa, cæteris partibus, nobiliora habenda, que primarias essentie morbi partes directe impetunt, prasertim si simul faciant ad aqualem distributionem sanguinis & caloris, qua tot vitia organica corrigantur.

3. Qua cateris morbi essentia partibus eminentiori gradu, ita tamen ut vires ea ferant,

contrariantur.

4 Que una & morbo adversantur & nature similia ac familiaria sunt, eique quam minimam vim inferunt.

5. Que magis grata puello laboranti sunt, minoreque cum molestia atque aversatione ad-

mittuntur.

His jam præmissis Paradigmata quædam medicamentorum compositorum subjicienda funt.

B:T.

P4/

aq.

Add

Cap

BOTA

pots

pro

mon

11143

pat.

an.

lion

(18)

fec.

rel n

fette

74410

coq.

tum

Ling

期的

Coo

žiij.

Apozemata & Cerevisia Medicata.

in-

4,80 ribus

ulum

man

nobi-

enti-

nta,

1

a ha-

es di-

nt ad

0715,

(III) -

糊,

utu-701-

湖, 20-

dam

len-

176

R. Rad. Osmunda regal. spicas N vj. Herb. veronic. maris. ling. cerv. ceterach, Capill. Vener. Hepatic. an. Mj. salvia, anthus, an. M.B. passul. minor. Bij. glyc. Hispan. B macis Bij. coq in tovj aq. fontan. f. a. R. Colatura thij. Adde syr. capill. vener. 3iij. M. F. Apozema. Capiat puellus haustulum hujus quotidie mane, bora quarta pomeridiana, tum etiam noctu, si potum tunc petierit. Immo si voluerit, utatur eo pro potu ordinario. Tußi & obstructione Pulmonum simul cum boc affectu graviter afflictis maxime convenit.

R. Fol. Osmunda regal, ling. Cervin. Hepat. Ceterach, fl. tamarisc radic. filic. maris. an. Mj. passul. minor. Zij. santal. alb. & rubr. ligni sassafras, an. 3 j. semin. Coriandr.3j. Macu 3j fol. Salvie MB. Coq in f. q. aq. font. sec. art. ad fbiij. Colatura edulcoretur Sacch. vel melle, pro Potu ordinario. Hepaticis hoc af-

fectu laborantibus succurrit.

R. Sarfa parill. incif. & optime contuf. 3iij. radic. China in taleol. concis. 3j. Infund. & coq. f. art. in thvij. aq. font. ad thinis. tum adde radic. Sassafras 3ij. Osmund. regal. Ling. Cervin. Ceterach, Capilli Vener. Lamii, an. MB. Glyc. Hispan. 3ij. Macis 3j. Coq. ad thiij. Colatura adde Mell. vel Sacch. Biij. M. pro Potu ordinario. Conducit pra-Bbs стрие

cipue iis, qui Lue venerea laborare suspecti sunt;

ut & strumosis.

R. Flor. Tamarisci recent. Mj. Veronic. maris MB. Leviter contund. & infund. frigide per 6 horas in fbij. Cerevisia commun. in lagena lapidea vel vitrea, subere optime clausa; pro Potu ordinario.

P. Radic. Sarseparill. Zviij. radic. China zij. ligni Sassafras ZB. Eboris zj. Osmund. regal. Veron. maris, Lingua Cervin. Ceterach, Capill. Vener. Hepat. summitat. Lamii, an. Mij. Concisa & contusa sec. art. coq. in Cong. mij. cerevisia recentis, ad unius absumptionem; sublatis ab igne adde Cong. j. ejusmodi Cerevisia; agitentur simul baculo, & deinde colentur. Ingredientia eadem sacculo ex tela rara includantur cum frusto ferri in ejus fundo reposito, & suspendantur in cerevisia; tum, addito sermento, F. fermentatio Cerevisia ad perfectam usque depurationem. Liquor limpidus post aliquot dies depromatur pro Potu ordinario. Deinde, ubi ad medietatis exhaustionem deventum fuerit, excipiatur reliquum Lagenis lapideis, vel vitreis; que, subere optime clausa, reponantur in loco frigido ad usum.

Rhab. Zij. Bibat ager quotidie mane, per v, vel vij dies, aut plures; nisi fluor alvi, ant ventriculi debilitas prohibuerint. In quo casu, loVene

j2/65

120

44.

MITH

111.

奶力

Cer

fal.

18/

co syr. de Cichor. cum Rhab. addatur syr. de Rosis siccis.

Juscula, & Panatella.

M-

10-

ub,

Mg.

im;

ere-

th-

MA

000-

per-

ndi-

Air-

12873

were

4 46

柳島

pel

TEN-

1,10-

00

R. Scolopendr. Ceterach, Hepat. Capill. Vener. Salviæ, an. MB. cort. Tamarisci, Santal. rubr. an. 3ij. Indantur ventri Pulli majusculi, aut Gallinæ, vel Galli veteris, &, consuto ventre, coq. cum zij. Passul.minor. in s.q. aq. font. additaque suff. quant. farinæ avenaceæ purioris. F. Jusculum perfecte coctum.

By. Radic. China in taleol. concis. Zij. Sarsa parill. alb. & medullosa. incis. & optime contus. Ziij Infunde per noct. in the aq. font. Mane, post levem ebullitionem, inde colatura Ling. Cervin. Veron. maris, an. M. j. Macis 38. Passul. Corinth. Zj: & cum carne vervecina, vitulina, vel capon. addita farina avenacea, F. s. a. Jusculum.

Quod si tenuiora juscula desiderentur, loco farina crusta panis incoqui; sin vero crassiores, mica panis cum vitellis ovorum admisceri poterit. Porro ob debilem Puelli coctionem nonnunquam cochlearia aliquot vini addantur.

Panatella ex ejusinodi jusculis colatis, iterumque cum mica panis coctis, additis tandem, ubi ab igne sublatæ suerint, butyro & saccharo q. s. conficiantur. Eædem quoque è de-

è decoctis modo præscriptis, nisi forte quid amarum aut aliter ingratum contineant, concinnentur. Præterea Panatella, Pulticulaque communes, uti & Juscula ordinaria, pulveribus modo scribendis alterari, adeoque huic morbo curando appropriari queunt. Sin vero ex lacte Pulticula parentur, & sarina tritici incrassentur, præter istos pulveres tantillum Croci inter coquendum addi convenit. Quod si quid in Pulveribus minus gratum, aut quod nauseam moveat, deprehendatur, id omittatur, aliudquel, (si res ita exigat) quod gratius est, in ejus locum substituendum.

Pulveres & Electuaria.

marum ejusdem vixdum è terra prorumpentium, & in umbra siccatarum) spicar. Osmund. regal. 2n. zij. Macis, semin. Anis. an. Ab. Croci gr. B. F. Pulvis. Dosis à Ab. ad Aj. in lacte, sero lactis cerevisiato, Apozemate aliquo, Jusculo, Panatellis, &c.

R. Medullose part. radic. Sarse p. zij. radic. Chine zj. radic. Sassafras Dj. semiv. Carui & Coriandr. an. DB. radic. Filic. mar. Osmund. reg. an. Dij. M. F. Pulvis; qui usurpandus, ut prior.

By. Milleped. aqua prius, deinde vino alb. lot.

Paly

&C.

nor

IIS,

Hall

THOT

dens

La

3].

Ele

in clibano post extract. panem siccat. q. v. F. Pulvis. Dosis similiter & B. ad & j. in jusculis, &c. ut supra. Eodem modo præparata jecinora Ranarum, & Pullulorum corvi pulveris, præscribuntur.

Re. Flor. sulph. 3ij. spec. diarrhod. Abbat. diatr. santal. an. 9 B. croci gr. B. Sacch. Chrystallini 3iij. Pulverata subtilissime cum aq. Ros. rubr. q s. F. Pasta lento calore siccanda, que denuo, ubi usus fert, in pulverem redacta exhi-

beatur ad 31.

ni-

23

m

ero

dic.

6

1337

lat

R. Conserv. Rosar. rubr. ziß. fl. Borrag.

Lamii, Salvia, Anthus, an. zß. Chalyb. prap.

zj. Cinnam. Glyc. Hispan. an. zß. Croci B.

Santal. rubr. Dj. Pulverat. pulverand. F. s. art.

Elect. cum syr. de Cich. cum Rhab. q. s. Capiat

ager zß. Dij. velzj. quotidie mane, vel per se,

vel in cochl. seri lactis cerevisiati, vel decocti ali
cujus appropriati, vel etiam vini.

Re. Conserv. fl. Lamiizj. fl. Borrag. Salvia, Caryoph. rubr. Anthus, cortic. Myrobalan. in Ind. condit. cortic. Citr. an. 3 B. Santal. rubr. Cinnam. Glyc. Hispan. an. 3 B. Salis Chalyb. vel, ejus loco. Croci 3 B. syr. de Absinth. q. s. F. Elect. Dosis & modus utendo, ut prioris.

CAP. XXXIV.

(enter

tim

THERE

tem

lingu

Myro

mus

tiani

gt.

Tan

Infa

F, I

frag

flu

Corrigentia symptomata.

Symptomata nonnulla, huic affectui supervenientia, aliquando legitimam curandi rationem anticipant, peculiaremque
tractandi rationem exposcunt. Hujus generis sunt Fluor Alvi, ut Diarrhæa, cui frequenter aliquid Lienteria est admixtum; sudores profusi; Dentitio laboriosa, dolorque
Dentium.

Fluxus Alvi.

Fluxus alvi hunc affectum frequenter lequitur; qui cum ubi diutius perseverat, aut paullo violentior est, facile vires dejiciat, ipsasque solidas partes eliquet & absumat, maniseste naturam causæ induit, & ut causa suam indicat correctionem. Dysenteria rarius huic morbo accidit, Diarrhaa vero cum intestinorum torminibus, vel cum Lienteria complicata fatis frequens. Etenim ob partium coctioni inservientium debilitatem, cum Diarrhœa, tum Lienteria facile, non item Dysenteria, supervenire possunt. Concurrunt tamen frequenter & aliæ causæ, ut ingesti cibi vel quantitate nimii, vel qualitate vitiosi, febris aliqua, vigilia, dentitio laboriosa, lumbrici, &c. Quæ omnia quoque Diarrhœam vel Lienteriam, potius quam Dyfensenteriam, sacile pariunt. Ad curam quod attinet, perficitur ea partim purgantibus, partim sedantibus & adstringentibus, partim ape-

rientibus simulque partes roborantibus.

Purgantia hic conveniunt ea quæ evidentem adstrictionem post evacuationem relinquunt; ut, Rhabarbarum, Senna, Tamarindi, 1200. Myrobalani, &c. Ex quibus, pro re nata, ut plurimum, vel Bolos vel Potiones concinnamus; quod sub illis formulis facilius deglutiantur; Ut,

gr. xij. Syr. de Corall. q. s. F. Bolus deglutiendus mane. Vel

P. Pulp. Tamarind. 3j. Rhab. pulv.gr.vij. Sacch. Ros. 3s. Syr. Cydon. q. s. ut F. Bolus. Loco hujus syrupi substitui possunt syr. Myrtil. Granat. de Corall. Mentha.

Vel

P. Fol. Senna elect. 3B. Rhab. Dj. pulpa Tamarind. 3B. semin. Anis. contus. gr. x. F. Insusio in s. q. aq. fontan. levisque ebullitio. P. Colatura 3B. Syr. de Rosis siccis 3B. Musces F. Haustus. Vel

Re. Aq. Plantag. vel aq. Cichor. vel Saxifrag. Zj. Rhab. pulv. gr. x. Syr. de Rhab Augustan. Syr. de Rosis sicc. an. zij. M. F. Potio.

m

Notandum, aliquando paulo pleniorem evacuationem requiri posse; nimirum, ubi suxus ipse parcius processerit, vel non diu

perfe-

perseveraverit, & interim materia peccans copiosa in corpore collecta suerit. In quo casu, loco syrupi Rosis siccis, drachmæ aliquot Syrupi Rosarum solut. Syr. August. vel de Cichor. cum Rhab. vel Mannæ, substituantur; tutius vero plerumque est dosin Rhabarbari, aut etiam Sennæ augere; non omisso syrupo de Rosis siccis.

Vesperi, post purgationem, grana x. Diascordii in vino cum Caryophyllis, & tantillo Cinnamomi cocto, & terria parte aq. Papav. Rhaad. diluto, syrupoque aliquo cordiali, (ut Caryophyllorum) edulcorato, virium instaurandarum, sluxusque sedandi gratia, concedantur: vel, si fluxus pertinacior sit, zij. Diacodii pro vice, loco syrupiprædicti,

admisceantur.

Vel

Re. Posseti, è lacte & vino albo parati, detracto coagulo, quod aromatizetur tantillo croci in nodulo ligati, in id immersi, leviterque expresi, donec pallida flavedinis tincturam acquisiverit, zis. confect. Alcherm. Di. cortic. Granator pulv. gr. vij. Diacodii zij. M. F. Potio, hora somni propinanda.

Magister. Corall gr xij conserv. Caryoph. vel Rosar rubr. Dj. Syr. Cydon. q. s. ut F. Bolus,

deglutiendus vesperi, hora somni.

Quod

Martin

世:

cortuc.

las Ch

Glycy

j. B. 1

Eleft.

ettam

in pol

Sceri.

ingr

culia

affec

tum

ratur

fuerit

vein

ceatu

fit,

tigati Viriu

guide brile

Quod si obstructiones adfuerint, Crocus Martis, vel Sal Chalybis, mane præscribantur : Ut,

Be. Conserv. Rof. 3j. radic, Cichor. condit. cortic. Myrobolan in India condit. an. 31. Salus Chalybis B. vel Croci Martis DJ. Cinnam. Glycyrrh. Coral. rubr. an. gr. xviij Croci gr. J.B. Syr. de Cichor. fine Rhab q. f. F. fec. art. Elect. de quo Capiat quotidie mane 31. In hunc etiam ulum ferrum candens extingui potest in potu ordinario.

In Fluxu pertinaci aliquid conserva, vel syrupi, Prunellorum sylvestrium eduliis admisceri potest; ita tamen, ne ea reddantur

ingrata.

ans

Z,

TACI

At-

ttic.

Po-

в.

料

od

Sudor profusus, modumque excedens, pe- sudor culiare aliquando Medico negotium in hoc immodiaffectu facessit : quippe qui vires multum disfipat, morbique curationem remoratur.

Cavendum tamen est, si forte febris ad- eius refuerit, aut Paroxysmus aliquis febrilis calor- fuctions ve immodicus præcesserit, ne temere coërceatur. In his enim casibus criticus esse possit, vel saltem plus utilitatis corpori ex mitigatione febris calorifye quam damni ex virium jactura adferat. Nescimus eniman quidquam potentius, aut etiam suavius febrilem calorem folvat, quam ipfe fudor.

Interim, quando in ordinate fluit, &

præ

E.m

thi

Sopi

per

COC

met

in

pal

cat

del

ren

hos

præter causam, (quam scilicet amovere queat) arguit corpus obstructionibus, crudis inutilibusque succis & superfluitatibus gravari, quos dum regere ac domare satagit natura, ex ipso labore (concurrente una laxitate partium cutanearum) in sudorem profunditur, & quidem inutilem ac laboriosum viresque depopulantem, qui idcirco quamprimum corrigendus est. Huc respexisse videtur Hippocrates, ubi dictat, Sudorem illum, qui prater causam fluit, purgationem postulare. Quid enim commodius has superfluitates minuat & eliminet? Deinde motus hic sudore contrarius est. Unde inter remedia huic symptomati opposita primum locum meretur, & cum viam sternat aperientibus cutemque firmantibus & coétionem promoventibus (quæ ultimam partem curæ absolvunt) iis jure præmittendum elt-

Purgantia huc spectantia sunt; illa quæ naturæ amica & samiliaria observantur, quæque simul obstructa aperiunt, visceraque roborant ac sirmant: quæ omnia an ex simplicibus quidquam essicacius quam ipsum Rhabarbarum præstet, dubitamus. Omnia tamen, cum simplicia, tum composita supra cap. De elective evacuantibus proposita, pro varia ægrotantis conditione, huc à prudenti medico transferantur. Aliqui Cerevi-

fiam Rhabarbaro medicatam hic multum com-

mendant; Ut,

ere

TU-

DUS

agit

una

em

100-

ITCO

ipe-

1784-

has

en-

Inde

pri-

rnat

00-

par-

ten-

quz

cera-

nex

ofum

mpia

alu.

lita,

pru-

14774

B. Rhabarb. in taleol. incisi ij uvar. passar. exacinatar. & incis. zi cerevisia tenuioris
thij Indantur lagena lapidea vel vitrea subere
optime clausa, qua in loco frigido reporatur,
sapius agitata: ante usum vero iterum subsidant
per diem unum, deinde depromatur liquor pro
potu ordinario. Exhausto liquore Lagena
denuo repleatur cerevisia, sed absque novo
Rhabarbaro.

Porro nobiliora aperientia, quæ simul coctionem promovent, inutilem sudorem reprimunt; ut vinum Gallicum & Rhenanum. Quod si horum calor in tam tenera ætate metuatur, temperari possunt pomis assatis, aq. Ros. rub. Borrag. addito saccharo & tantillo nucis moschat. rasa; propinentur ctiam in minori quantitate, & tantum tempore

pastûs.

Sunt & aperientia efficacissima, quæ non tantum coctionem juvant, sed & simul omnium partium tonum, præcipue viscerum, sirmant ac roborant. Inter quæ, præ cæteris Chalybeata commendamus; ut vinum Chalybeatum, Elect. Chalybeatum supra descriptum, & similia. Verum licet Chalybs reipsa ea efficaciter præstet, quæ diximus; cum tamenis nonnullis aliis scopis magni in hoc affectu momenti non usquequaque re-

Cc 2 fpon-

spondeat, quin potius nonnunquam ex una parte plus noceat, quam ex altera prosit, Cautiones sequentes circa ejus usum hic pro-

ponere visum est.

Cautiones cir ca bus inimicus est, facileque sævum pituitones cir ca bus inimicus est, facileque sævum pituitones chalybis sæ materiæ sluxum in tenellis corporibus usum in tenellis corporibus usum in tenellis corporibus du. Pulmonum, multoque magis Instammatio quævis, Pleuritis, Sputum sanguinis, aut dispositio ad quemvis horum affectuum adest, ab ejus usu plane abstinendum est.

2. Cum Chalybs parum aut nihil ad æquationem sanguinis contribuat, quin potius contra (ut ut attenuet caseosam & pituitosam sanguinis partem) ad ejus tamen separationem à reliqua massa sanguinis ob vitriolatam aciditatem simul faciat, omnino circumspecte admittendus est; præsertim vigente illa massa sanguineæ inæqualitate.

3. Cum vis attenuandi, incidendi & aperiendi in Chalybe cum infigni ficcitate & adstrictione conjuncta sit, illosque idcirco humores, quos sorte non dissolvat & discutiat, magis adhuc impingat; in alogotrophia ossium notabili ejus usus est suspectus. Etenim metus est ne curtas ossium partes minusque debito nutritas nimium constrin-

gat

pte

for from

YET

cet

dot

TOC

run

fua

fin

tur

mil

rel

[pa

[per

gat & consolidet; unde postea minus prompre secundum longitudinem accrescant: partes autem protuberantes (ut & convexa ofsium latera) liberalius nutritas cum dissolvere non valeat, amplius consirmet & contumaciores reddat; eas nimirum plusculum condensando & indurando.

4. In omnibus acutis febribus Chalybis ulus noxius est; quod nimium partes desiccet & constringat: immo eo ipso, quod sudores reprimat, humoresque acriores ac fe-

rociores præstet.

MI.

ito.

TUS

112-

M.

en-

ad

po-

P1-

nen

sob

nni-

012-

002-

ape-

te&

OOTH

ilcu-

CTUS.

artes

trin-

gat

Hisce Cautionibus rite observatis, Chalybis usum in hoc affectu admittimus: verum cum Medicastræ, Empiricique nequeant usum ejus ab abusu distinguere, non suaderemus tam nobilis medicamenti usum sine consilio exercitati prudentisque Medici: quoniam nisi circumspecte præscribatur, tanto cum periculo adhibetur. Alia minoris notæ aperientia huic scopo etiam inservire possunt; Ut, radic. Cichor. Borrag. vel Conserv. slor. eorundem; radic. gram. Assparagi, Filic. Rubia tinctor. fol. Ceterach, Asplen. Capill. Vener. &c. Inter composita, species, Diatr. Santal. Diarrhod. Abbat. &c.

R. Sacch. opt. Ziij. Solvantur in aq. Ros. & coq. paullum ultra Syrupi consistentiam: Deinde adde Conserv. Berberorum zj. specier. Cc 3 Diatr. Diatr. Santal. Diarrhod. Abbat. an. 3j. Croci

tis

que

dol

de

pulv. gr j. M. F. Elect.

Dentitio laboriosa, dolorque dentium, famionis la- liaria Rachitidis symptomata, cum febres, boriosa, inquietudinem, vigilias, aliaque mala protium do- ducant, peculiarem quoque merentur mitigationem. Itaque si dens gingivam pertusurus insignem molestiam puello creet, Itatim ab initio universalis aliqua evacuatio, nisi ea paullo ante sacta suerit, instituenda est; Ut, vomitus, qui dolori dentium potenter subvenire creditur. Proritari autem is potest, vel sola gutturis titillatione, immissa penna, vel digito nutricis in fauces puelli, vel etiam frictione dentis erupturi cum folio Tabaci circa nutricis digitum obvoluto, & cerevisia parum madefacto; vel denique propinato haustu aliquo Emirico supra descripto. Non est autem remedium hoc frequentur iterandum, ne ventriculum nimium debilitet. Sequenti die (dolore persistente vel recurrente) potio aliqua chatarctica, bolusve ex supra præscriptis aut similibus exhibenda. Facta hoc modo nniversali evacuatione, ad Topica deveniendum. Solent nutrices dentem erupturum frusto Corallii in hunc usum polito perfricare. Medici potius commendant radices Althaa, quæ emolliunt & laxant gingivas, quo facilius pertundi possint. Aliqui pro secreto habent frictionem dentis dolentis

tis cum radice lapathi acuti. Alii plurimum commendant frictionem gingivæ, è qua erupturus est dens, cum crista galli recenter abscissa, aut sanguine calido ex isto vulnere exstillante. Quæ in aures instillari solent, in hac ætate non experti sumus; similiter neque emplastra Mastichis, Olibani, vel de minio, quæ in adultis fluxionem sistere observantur. Aliqui parva Empl. Epspastica pone aures applicant, quæ forte materiam dentibus dolorem inserentem revellunt. Sed neque de his judicium nostrum interponimus. Tandem non proficientibus universalibus, solemus ad hypnotica confugere; quæ quidem extra applicata parum efficiunt; intro vero assumpta, ubi rite præparata & corre-Eta fuerint, plurimum juvant. Urgente ergo inquietudine, & vigiliis, hæc, vel similia, præscribimus.

R. Diascordii gr. vij. Syrupi de Meconio zjß, velzij. Posseti ex lacte & vino albo parati, paucoque Croco tinctizj. velzx. Misce, & capiat hora somni, nocte ista, qva purgationem pro-

xime subsequitur.

es,

0.

ni-

et-

et,

TUB,

nda

004

em

vel

401

04-

211-

eft

an-

Se-

en-

pra

icta

NICA

eru-

lito

14.

710-

iqui en-

tis

R. Laudani dispensatorii Londinensis gr. S. pulv. Cord. è Chelis Cancror. gr. x. Conserv. Caryophyll. Dj. Syr. Meliss. q. s. F. Bolus, deglutiendus vesperi, hora somni. Atque hæc de corrigentibus symptomata.

CAP. XXXV.

li Ra

verfar

exerc

princ

16210

perpe

liter

tem

tinea

forti

1.2

Cun

dente

pofit

In ex

teni trib

Hyp

frequ

cent

ter

dep

Remedia externa.

Bsoluta tandem disquisitione de materia & speciebus internorum medicamentorum, ad externa remedia sermo noster dirigendus est. Quæ quidem ad ultimum locum relervavimus: non, quod ea perpetuo ultimo sint exequenda, sed quod diversi plane generis sint ab internis: administranda vero immediate post evacuantia universalia, aut saltem post elective purgantia, simulque cum alterantibus specificis, ad quorum genus pertinent, licet quatenus externa sunt, ab iis, ut dictum est, differant. Monendum hic autem Externiremedii nomen paulo latius hic à nobis accipi, adeo ut omne medicamenti genus, quod proprie neque ad Chirurgica, neque ad intus affumpta referatur (modo in hujus affectus curatione usum habeat) sub se complectatur.

Dividimus ergo id in duo genera, viz. Exercitii modos, & Extrinsecus applicanda.

Exercitii modi, seu genera.

Exercitii Exercitii modi, seu genera omnia puemodi, seu ris consueta, suo loco & tampore in usum
ve-

venire possint. Quandoquidem autem Puelli Rachitide laborantes motum nonnihil aversantur, atque ob virium languorem & exercendi desuetudinem, statim à curationis principio, vix, aut ne vix quidem violentiores motus perferunt; à mitioribus exercitiis perpetuo ordiendum, & dein paulatim gradatimque ad fortiora progrediendnm: similiter breviori tempore ab initio, postea autem longiori absque intermissione sunt continuanda.

112-

(24

110-

lti-

dea

bou

m-

nti2

HI-

rifi-

12-#

116.

翻

in.

16.

Distinguimus ergo Exercitia in leniora, & Eorum fortiora, seu mascula. Leniora referimus, Divisio. I ad morem Decubitus: 2. ad Agitationem in Cunis: 3. ad Gestationem, vel Tractationem in ulnis, vel manibus Nutricum: 4. ad Lusus sedentarios.

I. Decubitus supinus inter omnes corporis variidepositiones maxime ab exercitio recedit, & cubitús in extrema virium debilitate fere solus convenit; ut in febribus acutis, exhaustis jam viribus. Solus etiam in multis Thoracis & Hypochondriorum casibus convenit; ut frequenter in Inflammatione Hepatis, Lienis, Pulmonum in Pleuritide, in Adnafcentia Pulmonum cum Pleura, in Empyemate, &c.

Decubitus lateralis versus supinum, sive dexter, sive sinister, quamproxime ad hunc decubitum accedit, & tantillum de natura Cc 5

exercitii participat. Quare convenit etiam in magna virium debilitate, saltem positionis corporis mutandæ causa, ut & quando profundior somnus non expectatur. Porro & proficuus est fatis robustis, tempore primi, vel secundi somni, mutatis post justa intervalla lateribus. Sed non æque forsitan iis postea convenit, præsertim corpore somno satis refecto. Tunc enim decubitus, qui propius accedit ad exercitii naturam, potior elt.

Decubitus simpliciter lateralis plusculum exercitii continet, & debilibus ac insuetis tempore profundioris somni vix quadrat; alias autem familiaris iis reddi poterit, si paulatim ei assueverint. Robustis omni tempore, modo justa ratio debitæ variationis

habeatur, competit.

Decubitus lateralis versus pronum laboriosus admodum est ac molestus, vixque ipsis robustis insuetis diu continuandus. Attamen paulatim per consuetudinem superata molestia, facilius toleratur; & cum dolores capitis sedet, concoctionem ventriculi promoveat, Colicos dolores mitiget, alvumque adstrictam lubricet, peracto somno naturæ debito, in usum nonnunguam vocari, & in hoc affectu exercitii vice n supplere potest. Accidit enim interdum in hoc morbo, ut Pueri ad tempus aliquod

Decubitus pre

VIX CI

immo

tu,

Etenii

firmat

tem,

funt, I

ducit.

redder confe

partit

bos a

com

facit

tione

ferne

tribu

incur

latus

las,

flanti

adapt

totius

ad ret

tem

ita le

Vinar

ad rec

fuoad

de De

tion tio-

indo

pri-

ufta

itan

groot

utus,

am,

lum

netis

irat;

t, ii

tem-

orio-

iplis

Atta-

dolo-

riculi

, al-

iom-

quam

icen

umin

louod

rix

vix citra damnum pedibus committantur, exercicia immo ut plus emolumenti ex ipso decubi- in certis tu, quam ex deambulatione percipiant. pratoga-Etenim inflexos articulos deambulatio con-tiva. firmat potius, quam curat; decubitus autem, ubi partes debito modo fasciis munitæ funt, non parum ad eorum erectionem conducit. Deinde ad curtas partes proceriores reddendas, multum ipsa decubitûs positio confert, quemadmodum cernere licet ex partium secundum longitudinem per morbos accretione. Tertio, Decubitus, ratione communium totius corporis involucrorum, facit ad caloris in omnibus partibus æquationem. Ultimo, Decubitus, sijusta ratio sternendi lectum observetur, multum contribuere potest ad spinæ truncique corporis incurvationem erigendam. Etenim ubi in latus gibbosum decumbunt, parvus pulvillus, in hunc usum apte formatus, sub exitantibus partibus immitti potest, atque ita adaptari, ut partes gibbæ magna ex parte totius corporis onus sustineant, adeoque ad rectitudinem repellantur. Quando autem Puelli in alterum latus devolvuntur, ita lectum sterni oportet, ut detracto pulvinari pars cava lectum vix tangat, nisi fe ad rectam lineam conformer, quo pondere suo ad rectitudinem deprimatur. Atque hæc de Decubitu.

II. De-

paulo

traham

mare

pedibus

fin ali

videat

tis adn

polatio

MILIT

totals

\$4110 I

lectum

to: 9

tegte

vatur

duriu

cumb

exerc

tum fert,

exerc deten

tiffin

940

cant velp

900, dum

Pus !

Cunarum agitatio.

II. Decubitum proxime æmulatur exercendi illud genus, quod Cunarum agitatione perficitur. Cunæ binis arcubus, seu portionibus rotæ, seu circuli, sustentantur: quo autem majoris circuli portiones sunt hi arcus; eo efficacius exercitium Puello præstant. Motus hic profundioris somni tempore intermittendus, aut saltem remittendus est; tempore vero vigiliarum, per vices modo intendendus, modo remittendus est. Convenit maxime debilioribus, vix dum pedibus insistentibus, aut aliter ab incessu impeditis.

Gestatio

III. Gestatio in Nutricum obambulantium in Ulnis, ulnis, iisdem prope Puellis, & sub iisdem conditionibus competit. Similiter Gesticulatio Puelli ad rhythmum cantus, sive dum Nutricis genibus insidet, sive dum ejus manibus sustentatur, ut & ejusalem horsum illorsum jactatio, frequensque elevatio & demisio, leniter apprehensis manibus, si puellus fortior sit, aut axillis, si debilior, ita quidem, ut crura & truncus inter movendum dependeant. Præterea tractio & retractio Puelli super lectum vel mensam inter binas nutrices; altera manus, altera pedes apprehendente. Duo ultimi motus aliquid videntur contribuere ad spinæ curvæ seu inflexæ erectionem, præsertim si manus, quæ humero depresso, & pes, qui coxendici elevato inarticulatur, paulo

per-

oni-

940

012-

tem-

ten-

T vi-

ndus

VIX

ations

dem

rula-

ntri-

ifen-

acta-

eniter

411

146

Pra-

edum

dipiprz-0, &

atur,

aulo

paulo fortius quam altera manus vel pes trahantur. In eundem prope scopum collimare videtur elevatio puelli, apprehensis solis pedibus, ita ut truncus & caput puelli inverso situ aliquandiu dependeant; licet hæc actio videatur quoque nonnihil respicere Hepatis adnascentiam, siqua adfuerit: ut & convolutio illa corporis, qua demisso capite attolluntur pedes, iterumque elevato capite corpus totum invertitur. Huc quoque referatur rotatio illa Puelli, a nonuullis usurpata, super lectum vel mensam corpore lateraliter reclinato: quam magis probamus, si non integre circumvolvatur: sed tantum volvatur ac revolvatur corpus: supposito duriusculo pulvinari, cui pars gibba incumbat, onusque corporis sustineat. Hoc exercitium recte administratum multum ad corporis deflexi erectionem confert.

V. Lusus sedentarii minimum inter omnia Lususseexercitia emolumentum pueris Rachitide dentarii.
detentis adserunt, iisque placandi caussa potissimum permittuntur. Utiliores vero erunt,
quo magis eos ad movendos pedes provocant, ut, verbi gratia, si à nutrice, erecto
vel projecto coram pedibus corpusculo aliquo, irritentur ad id calcitrando evertendum, vel abigendum. Quod si Puelli corpus incuryum sit, iilusus adinveniendi sunt,
qui-

calion

velen

torun

mu, a

runt,

rulz

NOS &

adapt

exerc

musy

funt.

ince

colli

opei

ea ar

pled

CITCI

unde

parti

dalu

fine

ezer

cond

refti

dos.

dam

piz

Unac

quibus Puellus ad corpus in partem contrariam movendum alliciatur. Ubi ergo alter humerus altero est depressior, alliciantur ab isto latere, ostensis superne pupis vel crepundiis, manum humerumque simul elevare & extendere, quo oblatum objectum arripiant. Innumera prope ejusmodi particularia exercitia singi possunt, quæ Nutricum industriæ relinquimus.

Exercitia Mascula exercitia majoris nota ad tres

mascula titulos reducimus.

1. Ad Incessum; 2. ad Artisicialem corporis suspensionem; 3. ad Frictionem, & Hypochondriorum atque Abdominis contrectationem.

Greffus.

I. Incessus, Gressus, sive Obambulatio inter inter nobiliora exercitia numerari potest. Etenim puelli ætate grandiores, ut & robustiores, quique huc illuc quotidie discurrere solent, hoc ipso, cæteris paribus, facilius affectum hunc excutiunt. Verum hoc exercendi genus iis non temere permittendum, quorum articuli genuum, talorum, aut vertebrarum dorsi, nondum eo usque confirmati sunt, ut oneri corporis sustinendo sint pares. Ubi enim Pueri ex incuria Nutricum (ut supra monuimus) præmature pedibus committuntur, facile fit, ut articulos istos vel introrsum, vel extrorsum, antrorsum, vel retrorsum, deslecti sinant, adeoque deformitati illi in debita corporis erectione occaliontra-

alter

ur ab

pun-

re&c

lant.

exer-

friz

tres

corpo-Hypoonem.

inter

steft.

obu-

urere

us af-

exer-

um,

ver-

irma-

nt pa-

riculan

dibus

iftos

rfum,

ie de-

neoce caliovel ex nativa debilitate & laxitate ligamentorum, vel ex incuria Nutricum, malove
usu, articulorum deslexionem jam contraxerunt, non sunt pedibus exercendi, donec serulæ aliave munimenta, quæ articulos deslexos erigere erectosque servare valeant, iis
adaptentur: acque aliis interim proficuis
exercitiis, saltem non nocivis, partim superius, partim inferius descriptis, assuesaciendi
sunt. Discursus Puerorum in suis curriculis, ita
constructis ut eos à titubatione & casu inter
incedendum desendant, in eundem scopum
collimat, iisdemque legibus subjicitur.

II. Artificialis corporis suspensio perficitur Actificiaope instrumenti cujusdam pensilis ex fasciis lis corpoea arte formati, ut pectus sub axillis com- sio. plectatur, caputque sub mento alia fascia circumdet, manusque binis ansis excipiat, unde corporis onus partim à pueri manibus, partim à capite, partim ab axillis in aëre pendulum sustineatur ita, ut ab adstantibus non fine voluptate huc illuc impellatur. Hoc exercendi genus multis modis in hoc affectu conducere creditur. Etenim ad ossa curva restituenda, ad articulos deflexos erigendos, ad curtam corporis staturam elongandam, conducit, Quinetiam, quod & alia præstant exercitia, calorem vitalem excitat, unaque uberiorem alimenti ad partes exter-

nas

都中

proba

fagaci

hanc

pront

modo

veant

125, ta

fteare

hypod

Cruru

abstin

fa pro

COPUL

aio L

tum,

nativi

infim

Matio

cere.

citu,

Vocat

hit.

minu

magis

fic di

gruta

quam Centr

movet: atque interim puellis huic exercitio assuetis voluptatem potius, quam molessiam creat. Aliqui, ut magis distendantur partes, calceos plumbeos pedibus adaptant, & contractiori corporis lateri pondus adjiciunt, quo facilius partes ad æqualem longitudinem extendantur. Hoc autem exercitium solis robustioribus competit.

Frictio.

III. Frictio quoque ad mascula exercitia suo modo referri potest: non quidem respe-Etu activi alicujus motus in Puello ad ejus administrationem requisiti (siquidem Nutricis potius actione quam Pueri perficitur) sed ob consimilem vim & efficaciam, quam habet in morbi hujus curatione. Videtur autem Frictio dubii esse generis, & partim ad exercitii, partim ad exterius applicandorum genus pertinere, quo respectu ad hunc locum eam refervavimus, ut fimul exercitiorum agmen claudat, & extrinsecus applicanda immediate præcedat. Administranda hæc est (hyberno faltem tempore) coram luculento igne, puello undique bene munito, ne afflatu frigidi aëris lædatur. Perficiunt hanc frictionem Nutrices, aliæ manu calida, aliæ linteis siccis & calefactis, aliæ pannis laneis, aliæ verriculo. Et quidem aliquæ plurimum laudant verriculum, exterisque modis præserunt: verum cum tantillum interesse videa100

itio

ole-

ntur

mt,

di-

citia

tpe-

ejus

uri-

r)fed

ha-

2110

n ad

mge-

cum

mund

anda

ceft

ento

ne af-

hanc

aliz

aliz

1211-

rafe.

idea-

tut !

tur quo ex his modis peragatur, singulos probamus, electionemque penès Nutrices sagaces permittimus. Cæterum ordiantur hanc frictionem à spina dorsi corpore puelli prono collocato, & manum modo furfum, modo deorsum, modo lateraliter promoveant, deindeilline ad clunes, femora, suras, talos, plantas Pedum descendant; postea resupinato corpore, pectus, ventrem, hypochondria, & latera, nec non anteriora crurum, tibiarum, pedum, moderate fricent, abstinendo tamenà frictione, qua parte offa prominent, & liberalius fricando partes corum cavas. Non continuanda est hæcactio ultra levem ruborem in partibus excitatum, ne magis disfipetur, quam suscitetur nativus calor. Hoc exercitii genus maxime infirmioribus puellis convenit; quique alias statione aut gressu vix satis valeant sese exercere. Supplet enim vicem hujusmodi exercitii, & caloreminsitum excitat, vitalem evocat, alimentum ad partes affectas attrahit. Concedimus tamen frictionem paulo minus ad musculorum carnes, licet forte magis ad partes cutaneas, nutrimentum ad calorem allicere, quam exercitium proprie sic dictum, adeoque eam veris exercitiis dignitate ac præstantia cedere Ad Frictionem quam proxime accedit illa nonnullis usitata Centrectatio ventris , seu Hypochondriorum & attioAb-

Ab- dominis,

Abdominis; qua viscera modo sursum, modo deorsum, modo dextrorsum, modo sinistrorsum premunt intrudendo nonnunquam digitorum apices sub costis nothis. Et sperant Practici, neque præter rationem, se hac actione Hepar à præternaturali quavis Adnascentia cum Peritonzò liberare, siqua sorte talis adfuerit. Atque hic obiter notamus, talem Hepatis Frequen- Adnascentiam in hoc affectu facile ob tensitatis Adna- tem Hypochondriorum & magnitudinem Hepatis accidere posse, unde presse admoin hocaf-dum arcteque l'eritonæum & Hepatis membrana conjungantur, conjunctaque diu in eadem positione maneant, adeoque tractu temporis prompte coalescant. Coalescentia hæc quatenus ab Hypochondriorum tensitate, & mole Hepatis, ut diximus, dependet, non incongrue ad essentiam hujus morbi secundariam referri potest, viz ad vitia

icentiæ

fectu

Cauffa.

quamvis supra suo loco casu à nobis suerit omissa, ideoque hic visum est ejus mentionem facere. Hæc de Exercitiis, sequuntur Extrinsecus applicanda.

Organica, inter quæ recenseri meretur,

CAP.

R

rumq

minif

SHITE

t12; 7

poris

reelt

74201

plica

prop

que Limi

Em

quar

yeni

YIH con Ger

CAP. XXXVI.

M.

pices

parà 1Pe-1erit. 1patis

inem

mo-

nem-iu in

ractu

cen-

ten-

pen-

mor-l vitia

etur, fuerit entio

until

CAP

Extrinsecus applicanda.

R Emedia hæc non tantum, ut diximus, frictionem prærequirunt, sed & plerumque cum ipsa frictione, at leviori, administrantur! Sunt autem vel generalia, seu Borum universalia, omnes partes ex æquo respicien-divisio. tia; vel particularia certisque regionibus corporis dicata. Generalium materia eadem fe- Generare est, quam supra proposuimus cap. De alte-teria. rantibus specificis: particularium vero varia, pro varietate regionum corporis, quibus applicanda sunt. Formulæ utriusque generis propeomnes communes videntur, & quinque numero occurrurrunt; Liquores, Olea, Formula Linimenta, Unguenta, Emplastra: quanquam Emplastra certis potius partibus dicata, nunquam universo corpori simul applicanda veniunt.

Liquores in hoc affectu longo usu probati, Liquores funt omnia prope vini genera; imprimis vero vinum Moscatellinum. Aliqui vero potius commendent vinisque præserunt Cerevisiam Gedanensem, seu Prußiacam: quæ quidem ad consolidandas & firmandas partes plurimum, ad sanguinis autem æquationem ejusdemque æqualem distributionem parum aut Dd 2

aut nihil potest. Idem quoque judicium esto de vino Alicantico, ut & de vino rubro. Aliqui loco vini utuntur aqua vita vulgari, quæ nihilo inferior vino creditur. Decosta quoque in eundem usum parari queunt.

Hitt

12, 6

tur.

0

Etici I

mus.

Facel

TH 480

tiate,

hoca

rinde

petit

cidit

fipat

hic n

guen

num

teran nibus

Ana

Con

Ut.

Radic. Osmunda regalis, fol. Salvia, fl. Calend. fol. Lauri, Scolopendr. Veron. maris, an. M.B. Roris mar. Ros. rubr. siccat. an. p.j. Coq. in aq. fontan. & aq. vita vulgari, an. fbj. ad tertia partis absumptionem. Colatura servetur ad usum.

Vel

R. Radic. Filic. maris 3j. fol. Osmunda regal. Hormini, Lauri, Salvia, Veronica mar. an. M. B. F. Infusio in vino aliquo, & Liquor cola-

tus servetur in usum.

Cæterum liquores hi raro, aut nunquam, soli adhibentur, sed Oleis, Linimentis, vel Unguentis, æquis sere partibus admixti; & quidem coram luculento igne tepidi usurpandi, calida nutricis manu donec exsiccentur affricti.

Olea.

Olea composita, & probatain hoc affectu, pauca admodum, eaque vix satis efficacia, in Officinis parata servantur. Simplicia vero paulo plura; ut, Oleum vermium terrestrium, Chamamili, slorum Calendularum, Veronica maris, è pedibus Bovinis: quibus etiam addere possumus Oleum Vulpinum, Catellorum, Hirun-

flo

176-

an,

ola-

vel

&

II-

en-

Ċtu,

a,in

Hirundinum; modo hæc ultima simpliciora, & saltem absque impense calidis parentur.

Oleum Excestrense (licet eo nonnulli Pra-Ctici utantur) videtur calidius, quam ut per se solum in tam tenera ætate facile probemus. Idem judicium esto de Oleo Castorei Facobi de Manliu; ut & de plurimis Unguentis anti-Paralyticis, Unquento Nervino, Martiato, Aregon, & similibus. Torpor enim in hoc affectu non Paralyticus est; neque, perinde ac in vera Paralysi, impense calida expetit; neque etiam conjuncta partium flacciditas talia, absque spirituum insitorum dissipatione, facile admitteret. Quare, cum Unguenhic morbus novus sit, si velimus Olea, Un- torum in guenta, vel Linimenta ei appropriata, ad ma- aucomnum habere, oportet recta methodo compo- ponendi sitionem instituamus; nimirum specifica al- formulz. terantia, supra usitata, Oleis, vel Pinguedinibus, debito modo admiscendo:

Ut:

Prima. R. Fol. Salvia rubra, Veron. maris, Anagallid. fl. Calend. an. Mij. radic. Osmund. regal. Zvj. Butyri Majal. thiij. Vini albi th.B. Concisa herba, & contusa radices coq sec. art. ad vini absumptionem: Dein F. Expressio, dum adhuc calent, cui adde Oleum Nucis Myrift. per express. 3jB. Misceantur diligenter, & post subsidentiam abjectis facibus, F. Ung. pu-Dd 3

rum, quod in olla vitreata reponatur ad usum.

Secunda. A Fol. Chamam. Becabung. Nasturt. aquat. Cochlear. hortens. Veron. maris,
Cardiaca, Capill. Vener. Liug. Cervin. Ceterach, Lauri, summit. Menth. rubr. Salvia rubr.
Roris-mar. baccar. Hedera, an. Ms. radic. Osmund. regal. Ziiij. Vini Moscatellin. Hs. Butyr.
Majal. Hiij. Incidenda incisa, & contundenda
contusa, coq. omnia ad vini absumpt. Exprimatur dum calet, &, separato impuro sedimento,
F. s. 2. Vnguentum.

Vel,

Tertia, R. Fol. Salvia rubra, Veron. maris, Lingua Cervin. Xiris, an. Mij. radic. Ofmund. regal. zvj. summitat. Lavend. Roris-mar. fol. Laur. an. M.B. Aq. Vita vulg. thj. Ol. è pedib. Bovin. Ol. Vulpin. an. th B. Sevi Cervin. vel Vervecin vel Medulla Bovin. Ol. Lumbricor, an. thj. Coq. ad consumpt. Aq. Vit. Exprimatur Vnguentum dum calet, & separatis facibus reservetur in usum.

Quarta. R. Fol. Osmund. regalis virentis M vj. Anagallid. fl. Calend. fol. Salviæ rubr. Hormin. Cardiacæ, Becabungæ, Nasturt. aq. an. M j fol. Roris-mar. Laur. an. M ß Concisa omnia minutim contundantur optime in mortario marmoreo, vel ligneo, cum stoj. butyri non saliti; dein macerentur per dies 14. tum paullatim liquescant in Balneo. Ma-

7123

114,

prefito Tanda

TECONI

lapar

ctant

drion

que debit

mod

CINI.

ferip:

वृश्रदा

Con

fittal.

contr

vel

9201

pot

插

棚

ria, &, simul ac fervescere incipiunt, F. Expresio, iterumque addantur Herba, ut prius. Tandem Vnguentum expressum, & depuratum, recondatur in vasibus idoneis, ad usum.

Hisce generalibus externis remediis nonnul-Remedia la particularia, certas corporis regiones spe-particu-

ctantia, subjungi possunt; Ut,

m.

N4.

aris,

Cete-

111/1.

1.0f-

atir.

end4

1984-

till)

別4-0-

mar.

epe-

ervin,

mbri-

X111-

tect-

rentis

tior.

. 49.

Con-

捌矿-

12-

14

Mi-

1149

Si regio Abdominis, præcipue Hypochon- 1. Hypodriorum tensa, dura, tumidaque suerit; ne-chondrise que durities, tensitas, tumorve, purgationi priata. debito modo administratæ cesserit, ad hujusmodi Topica deveniendum est: Ut,

R. Olei de Capparibus, Absynthio, Sambucini, an. 3j. Vnguenti generalis primi supra de-

scriptizj 6. M. F. Linimentum.

Vel.

R. Vnguenti è succis aperit. Foesii Ziij. Vnquenti primi generalis Zij. M. F. Vnguentum. Commendatur, etiam Oleum. Saxifragia ex multiplici infusione & coctione herba concisa & contusa fact. In Oleo vulgari.

Tempore usus hæc, similiaque Vnguenta, vel Linimenta, cum aliquo appropriato Liquore, facilioris penetrationis causa, misceri

possunt, Ut,

B. Florum Sambuci, foliorum Salvie rubre contusorum, baccarum Lauri contusarum, Santali albi crassiuscula pulverati, an. zij. Vini albi Bij Macerentur per tres dies in loco frigido, in ampulla vitrea, subere accurrate clausa, bis 277

Dd 4

in die concutienda. Tempore usus portio liquoris, qua pro una vice suffecerit, effundatur colata; denuoque clausum vas reponatur in usum. etiam

re put

1.

tici, C

Samb

deput

tradi

li sim

siB.

MAC!

şiij.

donec

Empl.

frequ

Eteral

guent

Bonen

Гирет

vel b

exigi

CTITIO

Linh

lic co

Vel, (fi fortiorem malis,)

R. Radicum Bryonia alba siccatarum & ineisarum, baccarum Lauri, stercoris Anferin. an. zij. seminis Cyminizj. foliorum Salvia rubra, florum Sambuci, an. p. j. Coq in toj s. vini Rhenani, ad toj. Colatura servetur in vase

clauso, loco frigido.

Liquores hi, similesve, Unquento commixti, & ad ignem calefacti, calida Nutricis manu, Abdomini, & præcipue Hypochondriis, ad siccitatem usque affricentur: simulque Nutrix istas partes molliter contrectet; viscera modo sursum, modo deorsum, dextrorsum, vel sinistrorsum premendo, ut supra dirigitur.

Egregie etiam hic confert Balsamum de Tolu, Unquentis, vel Emplastris admixtum. Potest & ex eo sieri Emplastrum, quod spinæ

debili utiliter applicatur.

Emplastra quoque huc nonnihil contri-

buere posse videntur: Ut,

miaci in Vino Rhenano, vel Vino aliquo Medicato modo descripto, soluti, depurati, & ad spisitumem iterum coctizi. F. s. a. Emplastrum. Hujus porro sufficiens extendatur super alutam, & dextro Hypochondrio coaptetur; vel etiam

etiam sinistro, si durities (quod raro accidere putamus) illic magis urgeat.

4

rafe nixnixnicis

vi-

ex-

tlu-

n de

um.

næ

ntri-

第6.

Situ-

Hu-

vel

120

Lici, Cochlearis bortensis, Absynthii, corticum Sambuci, radicum Filicis maris, an. 3j. Succi, depurati lento Calore, ad crassitiem ferme Extracti redigantur; tunc adde in pulverem subtilisimum comminuta Santali Citrinizij. Macis 3j.B. R. Mixtura hujus 3j.B. Gummi Ammoniaci in Vino soluti, & ad spissitudinem cocti, Ziij. Misceantur calide, & continue agitentur, donec incipiant frigescere & indurari: & F. Emplastrum, applicandum, ut prius.

Porro, Pulmonum male affectorum gratia, 2. Pulfrequenter quoque peculiare Unguentum pe- monibus dicata.

Etorale ex usu est. In quo casu.

R. Olei Violarum, Liliorum alborum, Unguenti è floribus Arantiacis, an. Zj. M. F. Linimentum, calida manu pectori affricandum, superimposita charta, mollique lana intersuta, vel panno laneo. Addi huic Linimento potest exigua quantitas Balsami Peruviani.

Vel,

w. Unguenti pectoralis Zij. Unguenti Glycyrrhiza simplicis Ziß. Olei Violarum Zj. M. F. Linimentum, eodemmodo adhibendum.

Cæterum Unguentum Glycyrrhiza simplex

sic conficitur;

P. Glycyrrhiza recentis & succulenta ziiij.

D d 5 Butyri

Butyri recentis, non saliti, in aqua Rosacea loti, toj. Glycyrrhiza incisa contundatur optime cum Butyro in mortario lapideo; postea simul frigantur in sartagine: tunc F. Colatura cum Expressione; idemque labor teriteretur, cum pari quantitate nova Glycyrrhiza.

3. Spine

Denique propter summam Spine dorsi debilitatem, quæ in hoc affectu frequens esse externa. solet, Emplastra quædam, isti appropriata, parari possunt. In Pharmacopœis exstant Emplastrum de Betonica, & Diacalcitheos; cui tamen, tempore usûs, addenda est Mastiches, Olibani pulv. an. 3B. Emplastrum quoque, Flos Unquentorum dictum, huc referri poteft, modo Caphura omittatur; Similiter & Emplastrum Nervinum.

Vel,

Re. Unguenti primi generalis 3ij Herbarum ejusdem compositionem ingredientium, minutim concisarum 3v. Cera Citrina Biij. Resina purissima Zviij. Unguento, Resina, & Ceraliquatis, adde Herbas, & f. a. F. Emplastrum,

R. Unquenti generalis tertii 3xv. Litharg yri auri triti & cribrati Zix. Coque, simul spathula agitando ad Emplastri consistentiam. Tum adde Cera, Picis Burgundiaca, an. Jij. Olei Nucis Myristica expressi 3iij. Mastiches, Olibani. Myrrha, an. 318. Caftorei &B. Vitrioli albi pulverizati 30. F. Emplastrum secundum artem.

Discre-

pot

弘仙

Til

ren

Discrepant autem Practici in figura, & applicatione horum Emplastrorum. Aliqui oblongam & angustam figuram eligunt, & secundum longitudinem Spina applicant. Alii potius figuram latiusculam, & prope trian-

gularem prolem nempe à lumbis deor Sacrum ad Co extendunt. existimamus, partes Spina,

de-

effe

ata,

tant

cui

ches,

que,

teff,

Em-

arem.

ninu-Refine

TAli-

TENS,

argyri athala

s adde

Nacis

M97-

TETT-

)iscree

bant; quahic vides: & fum fuper Os cygem usque Nos autem ubi inferiores tum Crura, ac

Tibia, partes illæ nimirum, quæ ab inferiori Spinæ parte nervos suos mutuant, (præ superioribus infirmæ sunt, formam posteriorem convenire posse: ubi vero potius superiores Spina partes videntur debiliores, priorem & oblongam formam magis quadrare.

Similiter à nonnullis pro Spina debilitate Linimentum commendatur, quod constat ex Gelatina Cornu Cervini, facta cum Nervinis, & radicibus Sigilli Maria, floribus Salvia, & Consolida. Tempore Inunctionis admissendum est aliquid Olei Nucis Myristica per expressionem, vel Olei Lumbricorum terrestrium, aut Adipis humani. Atque hæc de Medicamentis externis.

FINIS.

PRACHITIDE sive Morbo Puerili, qui vulgo The Kickets dicitur, imprimatur.

Joh. Clerck, Præses.

Mauritius Williams, Eq. Aur.

Censor.

Georgius Ent, Censor.

Joannes Micklethwait, Censor.

Ahasuerus Regemorter, Censor.

de orur. or,

