Processus integri in morbis ferè omnibus curandis ... quibus accessit graphica symptomatum delineatio, unà cum quamplurimis observatu dignis, necnon de phthisi tractatulo / [Thomas Sydenham].

Contributors

Sydenham, Thomas, 1624-1689

Publication/Creation

Edinburgi: Hamilton, Balfour & Neill, 1750.

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/sngtykpp


License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org



50489/A





58358

PROCESSUS INTEGRI

IN

MORBIS

Ferè Omnibus

CURANDIS,

A THOMA SYDENHAM, M.D.

CONSCRIPTI.

uibus accessit graphica Symptomatum delineatio, unà cum quamplurimis observatu dignis.

NECNON

De PHTHISI Tractatulo.

EDINBURGI:

Apud Hamilton, Balfour, & Neill.

MDCCL,

PROCESSUS INTEGRI

N I

RBBS

swaine O will

e i d n a su

ALM , MARHARY & MART

ATTITUDE OF

ethings Treenand



LECTORI.

AMICE LECTOR,

SPECIMEN habes Praxeos eximiæ, in dilectissimi filii M. D. usum, cautè & diligenter excogitatum, sua ipsius manu conscriptum; mihi autem pro familiaritate ista qua omnes excepit concessum à Cl. Sydenhamo; viro sanè, cui vix ætas superior parem dederat, vel postera datura est, non modò in arte sua mira sagacitate, & ingenii acumine singulari, conspicuo; sed & probis moribus, & in humanum genus studio & amore insignibus adeò, ut apud omnes summum sui reliquerit desiderium: cujus præcepta, licet animo meo

& imo pectore infixa fint, ne tamen fortè fortuna, in mei ipsius & ægrorum detrimentum, excidant memorià parum fidâ, typis haud ita pridem mandabam, exemplaribus circiter viginti impressis, ut amicis quoque inservirem. Nescio autem quo pacto in lucem irrepfit publicam inter Miscellanea Curiosa superioris anni Norimbergæ editum; sed ineptà mole inutile. Prodiit tandem eo modo vestitum, ut tibi sit in quovis loco paratum; figmentis cerebri vanis, & futilibus sciolorum dogmatis nequaquam refertum; nec hypothesi placidà solidis, ut videtur, rationum momentis undequaque constipatà superbiens; humile autem & modestum accurate morbos depingit, & accuratius adhuc medetur; in id folum folicitum, ut innotescat quod natura faciat aut ferat. Et si verum loqui liceat, modò partium fitus noveris, pateant tibi per Symptomata ægriægritudines, (quod affiduâ edifcas obfervatione), scias deinde veram & genuinam medendi methodum per Diætam & Pharmaciam adhibere, fæliciffimus eris practicus, & tibi & infirmis optime consules. Parum interim tuâ refert utrum Alcali peccet an Acidum, num in Spiritibus animalibus, an in ipso fanguine, aut in recondito aliquo Viscere delitescat morbi minera; unde de Periodico intermittentium reditu docte satis & prolixe possis disserere; dum interea ipsa Febris, sine ullis ambagibus, inquietudine, siti, calore, pulfu celeri, nauseâ, cæterisque Symptomatis, etiam astantibus palam est, & apertè dignoscitur. Hinc sæpius mirari fubit, quamobrem anxiè ita & scrupulosè immediatas & proximas morborum causas, dum Medicinam pertractandam suscipiunt, indagare satagunt, & è tenebris istis quibus natura obduxit, irrito irrito licet conatu, eruere, gravi & fubacto judicio viri & in praxi versatissimi; fatis interim gnari se latere vel quævis obvia. Unde enim dimanat graminis viridis, aut albus nivis color? Quid est quod humana anima ratiocinari nequeat dum adhuc Infantes aut Pueri sumus? Unde forma tua specifica? Satius esset Medicum quam Philofophum agere (quis enim unquam Cartesium sibi Medicum voluerit?) minutissima Phænomena plane & rite enumerare, & remedia, quibus unufquifque morbus faciliùs cedat, candido & fincero animo proponere; ita tandem limites suos prætergressa, quibus angustis nimis jam includitur ars nobilissima, omnibus, quaquaversum patet orbis, fæliciter fatis & prosperè salutem, filiis autem fuis honores fummos conciliabit.

Meditabatur, paulò ante obitum, tractatum de Phthisi peritissimus Medicus; in perquirendo naturæ methodum, quâ morbos amoliri studet, ut adjutrices porrigeret manus, & miseriis hominum subveniret, diu noctuque pensitabundo, & anxio animo, exercitatissimus: hinc fidiffimarum observationum serie & irrefragabali edoctus experientia, medicinæ praxin ornavit, & ad faniores reduxit regulas. Sed, væ tabidis, dum hujusmodi nunquam intermissis studiis detenti & defatigati spiritus, solitis non vacabant excubiis, truculentissimus hostis, Podagra, quæ per multos annos obsederat, & debilitaverat artus; impetu facto in interiora viscera irruit, per vomitum & fecessum enormiores intentans mortem: Unico autem morbo nescit cedere Medicorum Princeps; sed cum malorum cumulo accessit & Renum Calculus, qui corrasis vasorum osculis, fanguinem liberaliùs, quàm fenectus tulit, urinæ permixtum effudit; se jam mortis cupidus, placidam, & pacatam, expiravit animam. Ne tamen auxilio prorsùs destituantur tabidi, fragmenta quædam, quæ auctorem ubivis sapiunt, in primo saltem morbi stadio plerumque proficua, (neque enim sas est, quod ægrotanti proximo opituletur, celare), in publicum prodeunt; ut exindè pateat quam accurata, & omnibus numeris absoluta, si modo Deus Optimus Maximus concessisse vitam, expectari potuisse Phthisiologia.

Quid in Febribus, Variolis, Morbillis, acutis cæteris ut & Chronicis, sanandis valuit optimè meritus auctor noster, sequentes indicant paginæ. Regimen & Diæta instituuntur aptissima; præscribuntur remedia pauca, sed necessaria; nec in Pharmacopolarum lucrum excogitata, nec inani ostentationi composita: sitibundis ægris (eodem modo quo & ipse

ipse sitim suam restinguere solitus erat) cerevisiam tenuem affatim & pro libitu hauriendam, unde mirè reficiuntur & refrigerantur, concedit; nec immanitate plùs quàm barbarâ, precibus eorum furdus, Apozemata & Julapia præ ingrato sapore fastidita substituit; maximam adhibet cautelam, ne exæstuans nimis, vel igne luculentiori, vel stragulorum onere, plùs adhuc incalesceret, vel à propinatis forsan remediis eum in finem, ut per poros eliminetur materia morbifica cruda adhuc & inconcocta; quæ tamen hâc datâ ansâ concitato motu cerebrum petit, unde Phrenesis aut Coma, extravasato sanguine deturpant cutirn maculæ purpureæ, aut eruptiones quas vocant miliares, collum & pectus ubivis obsident. Numquid ad amussim magis depingi poterat quam Variolarum historia? eruptionis diem in utravis specie designat, pustularum ingenium ad unguem describit; quo tempore incipiat, & quamdiu continuetur Salivatio; quo iterum faciei manuumque tumor se prodat; quid tandem quolibet die expectandum, disertè explicat. Paregoricorum usum, quo emolumento judicent Practici, primus persuasit, malum, ingerendi Cardiaca ante eruptionem, morem, unde sæpè accersitum suerit consuentium genus, meritò primus improbavit. Meliùs autem hæc ex ipso sonte. Valeas itaque, amice Lector, & sicubi scateant Mendæ ignoscas.

S. M.

EXCELLENTI

ET IN RE MEDICA ADMIRABILI VIRO

D. THOMAE SYDENHAM, M. D.

Qui capacem nobilis artifex Eludis Orcum; quo tamen ibimus Cuncti, quo humanæ Parentes Et decimæ tulit ordo Lunæ: Præsens sugacem sistere Spiritum, Præsens maligno tollere de toro Mortale Corpus, & propinquum Exequiis removere Morbum: Quem Nos honorem, quas statuas Tibi Ponemus, O cui non alium parem In arte Phœbus, se remoto, Aut Oriens videt aut recumbens? Quo Febris audax cumque movet pedem, Te Mater omnis, Te lachrymabilis Adcurrit Uxor, ne caducum Orba virum puerosque ploret. Seu Confluentes forte timet notas Decora Virgo; Tu faciem eripis Periclitantem protegisque, Perniciem juvenum futuram. Atqui odit artes & Tua pocula Hæres profusus, quem simul extulit Ad fpem implicatus vel Febrili Igne Pater, vel Hydropis Unda. Mire paratam, Te Medico, Senex Protelat Urnam, non fine gloria Phœbi Tuaque, qui fugasti Pollicitum fibi magna morbum. Sic Te scientem non faciunt Libri Et Dogma pulchrum; sed Sapientia Enata rebus, mensque facti Experiens, animusque felix.

Non mille Plantæ & multa domi Vitra, Ignesque Centum, aut Hypothesis placens Prosunt Medenti, vel coercent

Sæya Luis mala, fæva Febris;

Ni pectus adsit concilii potens; Ni plena rugis Experientia

Ususque naturam secutus,

Quid faceret moneant in aurem.

Hæc Praxis olim grande decus Sacræ

Adduxit Arti: Sic Veterum stetit

Secura fama; sic præivit

Hippocrates, meruitque Cœlum. At non eandem forte pari viam

Pressit Galenus: Non Arabes Virum

Æque sequuti; non Falerna

Usque madens Paracelsus uva. Primus relictæ Tu genium adseris Fidemque normæ: En Diva Tibi Salus

Applaudit & ridens Juventus,

Vitaque non metuens Sepulchri, Ex quo vagantem scripta manu Tua Correxit Orbem Pagina nobilis:

Longum Illa Morbosis, Tibique Perpetuum patesecit ævum.

Jam si qua restant, Eja frequentibus Concede votis; Nos Juvenilium

Vulgus Medentum, Nos avara

Qualibet excipiemus aure.

Forte & futuro tempore quispiam
Poëta, Musis carior, ætheri

Te sidus addet, Te salubre Sidus, & in Crisibus benignum.

Me destinantem talia Chemicæ

Curæ reposcunt: Me Medicus labor

Et spes locatæ non vacare

Pieriis patiuntur undis,

Medicamentorum quædam formulæ in praxi magis familiares.

Potio Communis Purgativa.

R. TAmarind. semunc. fol. Sennæ drachm. duas, Rhei sesquidrachm. coq. s. q. aq. ad unc. tres, in Colatura dissolve Mannæ & Syrup. Rosar. solut. ana unc. unam. Misce, siat Potio.

Emeticum Commune.

R. Aq. Cardui Benedict. unc. duas, Infus. Croc. Metal. unc. unam, Syr. Caryophyll. semunc. Misce, fiat Vomitorium. Sumat horâ quartâ pomeridianâ, superbibendo post singulas vomitiones haustum largum liquoris possetici.

Julapium Perlatum.

R. Aq. Cerasor. nigr. Last. Alexeter. ana unc. tres, aq. Cinnamom. hordeat. unc. unam, Margarit. præparat. sesquidrachm. Sacchar. chrystall. q. s. adde aq. Rosar. Damascen. semidrachm. Fiat Julap. de quo capiat cochlear. quatuor, vel quinque, in languoribus.

Julapium Cardiacum.

R. Aq. Last. Alexeter. Cerasor. nigr. ana unc.

tres,

tres, aq. Epidem. Syr. Caryophyll. & de succo Citri, ana semunc. Misce, siat Julap. de quo capiat sæpiùs.

Decoctum Diæteticum.

R. Rad. Sarsæparill. unc. sex, lign. Sassafr. & Chinæ ana unc. duas, Glycyrrhiz. unc. 'unam. Coq. in aq. font. Congiis duobus per horæ dimidium; deinde stent clause super cineres calidos per horas duodecim; posteà ebulliant ad tertiæ partis consumptionem: Cum primum ab igne amoveatur, infunde sem. Anisi semunc. post duas horas coletur, & postea depuretur per residentiam, & liquor reponatur lagenis vitreis probè clausis ad usum. Sit pro potu ordinario per triginta dies.

Apozema Aperiens & Antiscorbuticum.

R. Rad. gramin. Cichor. Fænicul. & Afparag. ana unc. unam, uvarum Corinthiac. & Pafful. enucleat. ana unc. duas, fol. hepat. ling. cerv. & cap. Ven. ana manipulum unum, fol. Beccabung. fub finem addit. manipulos duos. Coq. f. q. aq. fontan. ad libr. duas; fub finem adde vini Rhenani semilibr. Colaturâ adhuc calente, infunde ad duas horas, vase clauso, Cochl. hortens. manipulum unum. Colaturæ adde Syr. è quinque radic. & è succo Aurant. ana unc. duas, aq. Cinnamom. hordeat. unc. unam. Misce, siat Apozema. Sumat semilibr. manè, & quintâ pomeridianà, per quatuordecim dies.

Eclegma

Eclegma incrassans in Tussi.

R. Ol. Amygd. dulc. unc. unam, Syr. Papav. Rhæed. Portulac. Jujub. & Lohoch. sani ana semunc. Sachar. crystall. q. s. Misce in mortario marmoveo ad integræ horæ spatium, & siat Linctus perfectè mistus; recondatur in olla sigulina ad usum, Capiat sæpiùs lambendo è baculo Liquiritiæ.

Eclegma fortiùs incrassans.

R. Conferv. Rof. rub. Syr. Violar. & de Mecon. ana unc. unam, sem. Papav. alb. drachm. tres. Contundantur simul, & per setaceum trajiciantur; deinde adde ol. Nuc. moschat. express. gr. sex. Fiat Eclegma.

In Defluxione tenui.

R. Conserv. Ros. rub. unc. duas, Syr. de Mecon. Et Jujub. ana unc. unam, Oliban. Mastich. & Succin. ana drachm. unam, ol. Nuc. moschat. per expressionem gr. sex. Misce, siat Lohoch: de quo lambat sæpè; bis in die cap. Eclegtn. descript. cochl. unum, instillando Balsam. Sulphur. Anisat. à gut. octo ad gut. duodecim.

Cerevisia Purgativa.

R. Polypod. Querc. libr. unam, Rad Rhabarb.
Monach. fol. Sennæ & Passul. enucleat. ana semilibr.
Rhabarb. incis. & rad. Raphan. Rustican. ana unc.
tres, fol. Cochl. hortens. salv. ana manipulos quatuor,
A 2 Aurantior.

Aurantior. incis. No quatuor. Infunde in Congiis quinque vel sex Cerevisiæ non lupulatæ, fermentationis tempore; & quando ad maturitatem pervenerit, sit pro potu ordinario per dies quatuordecim vel viginti & unum: præcipuè verò sumat haustum singulis Auroris.

Emplastrum Hystericum.

R. Galbani in tinctura Castor. solut. & colat. drachm. tres, Tacamahac. drachm. duas. Fiat Emplast. pro umbilico.

Catharticum pro Infantibus tenellis.

R. Syrup. Cichor. cum Rhabarb. cochl. unum parvulum.

Decoctum Amarum Purgativum.

R. Decoet. amar. duplicatá Sennâ unc. quatuor, Syrup. de Spina cervina unc. unam, Elect. de Succ. Rosar. drachm. duas. Misce, siat Potio.

Laudanum Liquidum Auctoris.

R. Vini Hispanici libr. unam, Opii unc. duas, Croci unc. unam, pulv. Cinnamomi, & Garyophillorum, ana drachm. unam. Infundantur simul in B. M. per duos wel tres dies, donec liquor debitam consistentiam alquirat. Colatura servetur pro usu.

AFFECTIONE

IN

Fæminis Hysterica, maribus Hypochondriaca dictâ.

YUM a casu aliquo graviori molestum patitur humana anima, ataxiam concipiunt animales spiritus; urina subindè limpidissima copiosè excernitur; fanitatis recuperandæ spes omnis protinùs abjicitur, et tristissima quævis sibi ominantur ægrotæ; quamcunque corporis partem morbus infiderit (plurimas autem infidet) fymptomata ei parti competentia confestim urgent: in capite apoplexiâ, hemiplegià soluta, statim à partu adoritur; spasmi epilepsiæ persimiles (vulgò uteri strangulatus, in quo venter & præcordia guttur versùs intumescunt) infestant; clavus hystericus, in quo dolor in capite atrocissimus, quem transverso pollice possis contegere, ægrâ interim materiam viridem bili porraceæ parem evomente, miserè excruciat; cordis palpitationem, tussim, passiones iliacam & colicam, nephritin, urinæ *suppressionem* fuppressionem, æmulatur paroxysmus; vomitiones enormes, diarrhœam subindè excitat; externè in carne musculosa nunc dolorem, nunc tumorem inducit, in tibiis hydropis instar; nec (quod mireris) intactos dimittit dentes; dolor dorsi creberrimè sævit; & sæpè sæpiùs adeò refrigerantur externæ partes, ut cadaver planè referant; in risum & lacrymas essussismas sine ulla προφάσει ridiculè erumpunt; ptyalismus nonnunquam eo gradu laborantes assicit, ut Mercurio delibutas facile crederes. Dolores hysterici, quamcunque partem obsident, ubi discesserint, teneritudinem, quæ tangi recusat, relinquunt, ac si verberatæ suissent carnes.

Mittatur Sanguis ad unc. octo.

Emplast. de Galbano umbilico admoveatur. Sequenti manè aggrediatur usum sequentium pilularum:

R. Pil. Coch. maj. drachm. duas, Castor. pulv. gr. duo, Balsam. Peruv. gutt. tres. Fiat Pil. duodecim. Capiat quatuor singulis vel alternis matutinis, pro ratione virium, horâ quartâ vel quintâ matutinâ, superdormiendo.

R. Aq. Rutæ unc. quatuor, Bryon. comp. unc. duas, Castor. nodulo ligat. & in vitro suspens. semidrachm. Sacchar. crystall. q. s. Fiat Julap. de

quo capiat cochl. quatuor vel quinque in omni languore.

Post has pilulas sumptas, utatur sequentibus:

R. Limatur. Chalyb. gr. octo, cum f. q. Extract. Absinth. Fiat Pil. No tres. Sumat summo manè, & repetantur horâ quintâ pomeridianâ per triginta dies, superbibendo haustum vini Absinthitis.

Sin forma boli magis arrideat,

R. Conserv. Absinth. Roman. & Conserv. slaved. Aurant. ana unc. unam, Angelic. condit. Nuc. moschat. condit. & Theriach. Andromach. ana semunc. pulv. Ari comp. drachm. tres, Zinzib. condit. drachm. duas, cum s. q. Syrup. de succ. Citr. vel, ejus desectu, Syr. Aurantior. Fiat Electuarium.

R. Elect. præscript. drachm. duas, Limatur. Chalyb. gr. octo, cum s. q. Syrup. Aurantior. Fiat Bolus, sumendus manè & serò, superbibendo haustum vini Absinthitis, vel cochl. sex seq. Insusionis.

R. Rad. Angelic. Enul. Campan. & Imperator.
ana unc. unam, fol. Absinth. wulg. Centaur. min.
Marrub. alb. & Chamædr. ana manipulum
unum, Cort. Aurant. duor. incis. affunde wini.
Hispanic.

Hispanie. q. s. ad supereminentiam duorum digitorum. Coletur tempore usus. Vel,

In Delicatulis Chalybs exhiberi poterit in forma pulv. fequentis:

- R. Limatur. Chalyb. probè trit. unc. unam, pulv. Ari comp. drachm. sex, sem. Coriand. præparat. Anisi, Fænicul. dulc. ana semunc. Cinnamom. accutiss. Corall. rubr. præparat. ana drachm. tres, Nuc. moschat. drachm. duas. Fiat omnium pulvis subtilissimus; cui adde Sacchar. albiss. ad pondus omnium. Hujus cap. è cochleari semidrachm. bis in die per quadraginta dies, superbibendo cochl. sex seq. Julap. vel vini Absinthitis.
- R. Aq. Lact. Alexeter. uncias duodecim, Gentian. comp. unc. quatuor, Absinth. magis comp. unc. duas, Sacchar. albiss. q.s. Fiat Julap. Vel,
- R. Vini Rhenan. Absinth. semilibr. aq. Gentian. comp. unc. duas, Syr. Caryophyll. unc. unam. Fiat Julap.
- R. Myrrh. elect. Galban. & Assa fætidæ, ana drachm. unam, Castor. semidrachm. cum s. q. Balsam. Peruv. Fiat Pil. è singulis drachmis duodecim. Sumat tres singulis noctibus, superbibendo

bendo aq. Bryon compos. cochl. tria vel quatuor per totum decursum hujus processus.

Si Pilulæ præscriptæ ventrem moverint, utatur sequentibus:

R. Castor. drachm. unam. Sal. succin. volatil. semidrachm. cum s. q. extract. Rutæ. Fiant Pilulæ No viginti et quatuor. Capiat tres singulis noctibus, superbibendo Julapii hysteric. cochl. tria vel quatuor.

Sp. Cor. Cervi ad gutt. sedecim, vel octodecim, in aqua aliqua appropriata sæpiùs exhibitus, valde confert.

Si verò his non cedat remediis, tum capiat fequentes pilulas:

R. Trochife. de Myrrh. pulv. scrup. unum, Balfam. sulphur. Terebinth. gutt. quatuor, cum s. q. gumm. Ammoniac. solut. Fiant Pil. No quatuor. Capiat manè et serò, superbib. Julap. hysteric. cochl. quatuor vel quinque, instillando sp. Cor Cervi gutt. duodecim.

Electuarium Antiscorbutic. cum aqua ibidem descripta prodest in his affectionibus, ut et Electuar. corroborans, cum additione Conserv. Cochl. bortens. unciam unam, pulv. Ari. compos. drachm. sex, superbibendo præscriptam aquam.

At si affectus his non cedat remediis, eundem est ad aquas ferreas; et si neque his, tum ad Sulphureas, quales sunt Bathonienses.

Inter bibendum aquas ferreas hæc observanda: si aliquod Symptoma gravius acciderit, quod potationi aquarum referri potest, tunc ab iis æger abstineat, donec Symptoma istud penitus evanuerit. Æger in earum usu per sex septimanas ad minimum, vel potiùs ad duos menses perseveret. Zinziber conditum, vel Semina Carui Saccharata, ad calesaciendum ventriculum subindè sumat. Pilulæ etiam hystericæ tres devorari possunt per primas decem noctes, superbibendo Julap. hysteric. cochl. quatuor vel quinque.

Quoàd usum aquarum Bathoniensium, duob us diebus bibat eas, ac tertio die per modum Balnei eas ingrediatur; atque ita alternatim per sex septimanas, vel duos menses.

Si Chalybs justo plùs corpus calefaciat, tum per ejus usum quarta quaque Aurora sumat aq. mineralium purgantium libr. quatuor. Quæ tametsi alvum moveant, haud tamen tumultum cient, ut solent Carthartica ex officinis deprompta.

Si Chalybs magnas perturbationes inducat, Laudanum aq. aliquâ hystericâ mistum, singulis noctibus ad tempus aliquod propinandum.

Cùm

Cum à morbi diuturnitate fractæ et attritæ fuerint vires, venæsectio, et cathartica non sunt præmittenda, sed à Chalybe statim incipiendum.

Ubi fymptomata funt mitiora, satis est sanguinem mittere, et alvum solvere ad dies tres vel quatuor; dein *Pilulas hystericas* ad dies decem, manè et serò exhibere.

In dolore intolerabili, vomitione, et diarrhæa enormioribus, exhibendum Laudanum et postea corroborandi spiritus; at modo per vires liceat, antè usum Laudani, educatur è venis sanguis, et catharticum propinetur; in viraginibus præfertim et fanguineo temperamento præditis: in debilioribus autem, et haud ita pridem paroxysmum passis, sufficit ventriculum congio uno lactis cerevifiati haufto, et mox per vomitum rejecto detergere; dein largam dosin Theriac. Androm. vel Elect. Orvietan. imperare, et cochl. aliquot liquoris alicujus spirituosi, cum pauculis Laudani liquid. guttulis, superbibenda, dare. Quòd fi ægra jampridem vomuerit, et ulteriùs emeticis folicitare periculo vacabit, Laudanum sinè mora propinandum est, eâ dosi, quæ Symptoma vincat, et post singulas vomitiones toties quoties repetendum, in forma potiffimum folida, vel in liquida, in parco vehiculo, viz. gutt. aliquot in cochl. unum aq. Cinamom,

fortior. ægrå interim conquiescente, et caput immotum tenente.

Perdomito Symptomate, manè et serò, ad dies pauculos continuetur usus Laudani.

Hæc duo diligenter notanda: quòd cum semel post evacuationes Laudano uti cæperimus, eâ dosi, atque illâ toties repetitâ, sumendum est donec Symptoma omninò suerit debellatum, interjecto tantum spatiolo inter singulas doses, ut quid prior præstiterit ante noscamus quàm alteram ingeramus; deinceps cum Laudano morbum aggredimur, nihil movendum est, nihil evacuandum vel per mitissimum enema.

Theriaca Andromachi crebrò, diuque usurpata, magnum est in hoc, et aliis morbis quam plurimis a coloris, et concoctionis defectu ortis, remedium.

Vina Hispanica Gentiana, Angelica, Absinthio, Centaurio, Corticum Aurantiorum slavedine, aliisque corroborantibus infusus medicata, si ad aliquot cochlearea ter in die potentur, admodum conferunt; modo ægra tenui non suerit biliosoque corporis habitu.

Cortex. Peruv. ad scrup. unum manè et serò, per septimanas aliquot deglutitus, præsertim in spasmis hystericis miras habet vires.

In tenui biliosoque corporis habitu possit usurpari Diata lastea, præcipuè in Colica hysterica, si modò ea incommoda possint superari, quæ primis fere diebus apportat; quod nempè tum in ventriculo coaguletur, tum etiam viribus corporis, in statu conservandis, substentandisque minus sufficiat.

Nihil tamen æque sanguinem spiritusque sovet et consirmat, ac diu multumque singulis serè diebus equo vehi; nec itinera in curru sacta suo carent successi.

De Febre Depuratoria annorum 1661, 62, 63, 64.

SI æger Juvenis sit, extrahatur sanguis è brachio; et eodem die post aliquot horas, vel sequente die, duabus horis post leve prandium, Emeticum ex infus. Croc. Metal. (paratis Zythogal. libr. sex vel octo, ut quoties vomuerit, aut alvum exoneraverit, è vestigio sumatur haustus) exhibeatur; et post sinitam operationem Emetici, hoc vel simile paregoricum:

R. Aq. Cerasor. nigr. sessunc. aq. Epidem. semunc. Laudan. liquid. gutt. sedecim, Syr. Caryophyll. drachm. duas. Misce, siat Haustus.

Vomitoria ex infus. Croc. Metall. parata puerulis, ullisve infra adolescentiam constitutis, vel minima quantitate, non est tutum exhibere.

Post hunc diem usque ad undecimum vel duodecimum decimum singulis auroris injiciatur Enema sequens:

R. Deco&t. commun. pro Clystere libr. unam (vel la&is vaccini eandem quantitatem) Sacchar. culinar. & Syrup. violac. ana unc. duas. Fiat Enema.

Post dictum diem alvus constipari permittatur, quo materia sebrilis citiùs concoquatur, ad quem etiam sinem Cardiaca moderata, his ultimis diebus exhibita, apprimè conducunt; ut,

R. Pulv. è chel. Cancror. comp. gr. quatuordecim, Elect. de Ovo semiscrup. cum s. q. Syr. Caryophyll. Fiat Bolus, sumendus octavâ quâque horâ, superbibendo sequentis Julapii cochl. quinque vel sex.

R. Aq. La&t. Alexeter. Cerafor. nigr. ana unc. tres, aq. Epidem. & Syr. Caryophyll. ana unc. unam. Misce, siat Julap. vel alia his similia.

Hac methodo folicitè observatâ, usitatò circa quindecimum diem (tum ex laudabili in urina separatione, tum ex manifesta Symptomatum omnium remissione) tempestivum esse Potionem Purgantem communem exhibere percipies.

Accidit interdum, maximè in Senibus, curatâ Febre, & purgato corpore, ægrum nihilominus valde debilem esse, & quandoque tussi, interdum etiam etiam screatu, magnam glutinosi viscosique, phlegmatis copiam expectorare. Hoc in casu vinum Malaganum annosum, cum pane tosto ei immisso, bibat æger.

Si superveniat Iliaca passio, præscribatur Sal. Absinth. scrup. unum, ex cochl. uno, Suc. Limonum, manè & sero; intermediis temporibus capiantur aq. Menth. stillatit. sine Saccharo, cochl. aliquot, bis quâque horâ. Dum hæc siunt, catulus vivens nudo ventri indesinenter accumbat. Postquam dolor cum vomitu per biduum triduumve cessaverit, exhibeatur Pil. Coch. maj. in aq. Menth. soluta, nec removendus catulus ante Pilularum usum.

Ad recidivam præcavendam, persistat in usu prædictæ aquæ per longum tempus; & duplicatis pannis laneis ventrem à frigore desendat.

De Febre Pestilentiali 1665, 66.

POst venæsectionem in lecto celebrandam, æger stragulis obruatur, & Lacinia lanea sincipiti alligetur; tum, si vomitus non adsit, hoc vel simile Hydroticum exhibe:

R. Theriac. Andromach. semidrachm. Elect. de Ovo scrup. unum, Pulv. è chel. Cancr. comp. gr. duodecim, duodecim, Coccinel. gr. octo, Croc. gr. quatuor, cum f. q. fucc. Kermes. Fiat Bolus; quem sumat sextâ quâque horâ, superbibendo cochl. sex seq. Julapii:

R. Aq. Card. Benedict. & Scord. compos. ana unc. quatuor, aq. Theriacal. stillatit. unc duas, Syr. Caryophyll. unc. unam. Misce, siat Julap.

Si adsit vomitio, hydroticum differatur, donec folo tegumentorum pondere sudor promanare incipiat, linteaminis parte vultui superinductâ.

Incepta Diaphoresis haustulis Zythogalæ salviâ alteratæ, vel Cerevisiæ, cui macis aliquantulum incoxeris, subinde repetitis, ad naturalis diei spatium (i. e. horas 24.) est continuanda; in sudore licet jusculis confortativis ægrum resicere.

Ubi tumor enatus fuerit, venam aperire non fustinui. Per horas adhuc à finito sudore viginti & quatuor, ægro se in lecto continente frigus cautè devitetur; indusium sponte suâ in corpore arescere permittatur, potulenta omnia calidiusculè hauriantur, & Zythogalæ salviâ alteratæ usus etiamnum continuetur. In seq. luce potio purgat. communis exhibeatur.

Anni 1667, 1668, Febrim Variolofam & Variolas produxerunt.

Anni 1669, 70, 71, 72, Febrim Dysente-ricam.

Anni 1673, 74, 75, Febrim Comatosam. Curationem Febrium horum annorum non attingo; quoniam methodo in febre anni 1685, &c. descriptà curari eas potuisse autumo.

De Febribus Intermittentibus.

CUM rigore & horrore adoritur paroxysmus, quibus mox succedit calor, & huic tandem sudor, & subsequens ἀπυρεξία: licet in primis morbi diebus, Autumno maximè, aliquoties remissio potius quàm intermissio persentiscitur. In calore æque ac in rigore vomiturit ut plurimum ac vehementer, ægrotat miser, cum siti et lingua arida. In tenera ætate abdominis instatio, in adultis crurum tumor febris solutionem; tonsillarum dolor, raucedo, oculi cavi, facies Hippocratica, mortem denunciat.

R. Cort. Peruv. subtiliss, pulv. unc. unam, cum s. q. Syr. Caryophyll. vel de Rosis siccis. Fiat Electuarium, dividendum in duodecim doses; quarum unam capiat quarta quaque hora, superbibendo Vini cujuslibet haustum, incipiendo immediate post paroxysmum.

Si autem præscripti boli ventrem moverint, in haustu Vini dentur gutt. decem Laudan. liquid.

fingulis vel alternis vicibus post assumptionem boli, ut opus fuerit.

Ad recidivam præcavendam (præcipuè in Quartana) repetatur processus prædictus singulis septimanis per tres alias vices.

Sin forma Pilularum magis arrideat,

R. Cort. Peruv. pulv. unc. unam, cum s. q. Syr. Caryophyll. Fiant Pilulæ mediocris magnitudinis; quarum capiat sex quarta quaque hora.

R. Cort. Peruv. pulv. unc. duas, Vin. Rhenan. libr. duas; stent simul in infusione frigida, & coletur per manicam Hippocratis. Usûs tempore capiantur unc. tres, tertiâ vel quartâ quâque horâ.

Sin ob vomituritionem, ferè continuam, Corticem deglutire nequeat æger, tum sexies, vel octies, spatio duarum horarum, Succi Limonum recens expressi cochl. unum, cum Salis Absinth. Scrup. unum assumat; dein Laudan. liquid. gutt. sedecim, cum aq. Cinnam. fortior. cochl. unum; ac brevi post, cessante vomitu, Cortices usum aggrediatur.

In intermittentibus Vernalibus, nonnunquam emeticum, tempestivè propinatum, ut nempe ante paroxysmum negotio suo desungi possit, felicissime successit. Nonnunquam Enema in diebus intermittentibus, per triduum vel quatriduum injectum,

injectum, curationem absolvit. Quæ sequenti quoque modo tentari potest.

R. Serpentar. Virgin. subtiliss. pulverisat. gr. quindecim, Vin. alb. unc. tres. Sumat duabus horis ante Paroxysmum, & stragulis coopertus æger sudet per tres vel quatuor horas; idem faciendo per duas alias vices ante Paroxysmum.

Si ab ingeminatis Paroxysmis summè debilis fuerit æger:

R. Conserv. Flor. Borag. Bugloss. ana unc. unam, conserv. Anthos. semunc. cort. Citr. condit. Nuc. moschat. condit. Theriac. Andromach. ana drachm. tres, confection. Alchermes drachm. duas. Misce, siat Opiata. Capiat ad quantitatem avellanæ, manè & vesperi, superbibendo cochlearea paucula alicujus aq. Epidemicæ simplicioris, Saccharo edulcoratæ; interdicto interim enematum usu.

Si sub morbi excitum occurrat Hydrops, nondum tamen depulsâ Febre, curatio non est instituenda remediis purgantibus, sed insussionibus rad. Raphan. Rustican. Summitat. Absinth. Centaur. min. Baccar. Juniper. cinerum Genist. &c., in vino sactis: exulante autem Febre, catharticis, & aperientibus. Pro Infantibus Febre intermittente laborantibus:

R. Aq. Cerasor. nigr. & vini Rhenan. ana unc. duas, cort. Peruv. subtiliss. pulv. drachm. tres, Syr. caryophyll. unc. unam. Misce, siat Julap. Capiat cochl. unum, alterumve, pro ratione ætatis, quarta quaque hora, donec Paroxysmi nom amplius discrutient; instillando alternis vicibus, si Diarrhæa adsuerit, Laud. liquid. gutt. unam vel duas.

De Febre Stationaria, ab anno 1685, ad 1690.

CAlor & frigus se invicem excipiunt; artus pariter & caput dolent; pulsus interim sere sanus, nonnunquam tussis, dolor circa collum & fauces, exacerbatio Febris prope noctem; inquietudo, sitis, lingua vel humida, & ex omni parte pellicula alba & scabra vestita, vel sicca, fusci coloris in medio, quam partem undique cingit simbria inalbescens. A jugi in lecto decubitu coma & phrenesis; à calido regimine petechiæ, maculæ purpureæ, eruptiones (quas vocant) miliares morbillis magis rubentes, pulsus inordinatus, tendinum subsultus, atque ita tandem mors. Sudores in initio symptomatici di-

vexant,

vexant, qui, si ab arte provocentur, viscosi à capite erumpunt, & materiam morbisicam in caput aut in artus transferunt.

Mittatur sanguis ad unc. decem è brachio. Reiteretur Venæsectio, si modò respirationis dissicultas, dolor capitis inter tussiendum lancinans, & alia signa Peripneumoniæ nothæ adsint. In hoc casu tam Venæsectio quam Catharsis repetenda, donec æger convaluerit.

Vesperi applicetur Epispasticum, & sequenti aurorâ Potio Lenitiva præscribatur; quæ ad tertiam vicem alternis diebus repetatur; & horâ somni post Catharsin haustus pacificus propinetur.

R. Aq. Paralys, unc. tres, Syr. de Mecon. unc. unam, Succ. Limon. recent. extract. cochl. duo, Misce, siat Haustus.

Aphthæ & singultus sponte sua post curationem febris supervenientes, sponte evanescunt. Si in longum tempus decurrant, facilè sugantur Cortic. Peruv. unc. una, cum Syr. Papav. Rhæad. q. s. in formam Electuar. vel Pilular. redactà, superbibendo haustum lactis dessorati. Remedium hoc certissimè scopum attingit, si non frustrentur ejus vires, ex jugi ægri in lecto decubitu.

Diebus à purgatione liberis fequentia præscribantur:

R. Conserv. Lujul. & Cynosbat. ana unc. unam, conserv. Berber. semunc. Crem. Tart. drachm. unam, cum s. q. Syr. de Limonib. Fiat Electuarium; de quo capiat ad magnitud. Nuc. moschat. ter in die, superbibendo sequent. Julap. cochl. sex.

R. Aq. Portulac. Lactuc. Paralys. ana unc. tres, Syr. de Limonib. sescunc. Syr. Violar. unc unam. Misce, siat Julapium. Vel,

R. Aq. font. libr. unam, aq. Ros. Succ. Limonum, Sacchar. albiss. ana unc. quatuor. Coq. lento inge, dum despumaverint. Capiat unc. tres ad libitum. Præscribatur quoque seq. Gargarisma.

R. Succ. Pomor. agrest. semilibr. Syr. de Rubo Idæo unc. unam. Misce, siat Gargarisma.

Si febris ita ventriculum infestet, ut æger potionem retinere nequeat, Pil. Coch. maj. ad scrup. duas exhibeantur; tum etiam hypnoticum est concedendum, verbi, gratia Laudan. Londin. sesquigr. cum simili quantitate Mastich. vel Laudan. liquid. gutt. octodecim, in aq. Cinnamom. hordeat. unc. unam.

Decoctum album paratum ex unc. una Cor. Cervi usti, in aq. communis libr. tribus cocti; & postea Saccharo albissimo edulcoratum, sit pro potu, ut & Cerevisia tenuis pro libitu.

Post Catharsin bis celebratam, concedatur ægro, pullorum carnibus vesci; & post ultimam Purgationem, modo febris aliquantulum deslagraverit, vini Canarini cochl. tria vel quatuor, manè & sero, ut & post prandium, per dies aliquot propinentur.

In Phrenitide, ut & Comate, nihil perinde confert, atque ægri caput radi, nullo admoto Emplastro, sed Piliolo tantum.

Si (quod fæminis Hystericis quandoque accidit) post venæsestionem, & purgationes hujusmodi iteratas, etiamnum duret, procurratque febris, modo signa Peripneumoniæ, & inslammationis circa partes vitales absint, singulis noctibus Paregoricum, & medicamenta hysterica, bis vel ter in die, injungantur.

De Infantibus Febre Stationaria laborantibus.

H Irudines duæ utrinque ponè aures applicentur; dein Emplastr. Epispasticum cervici admoveatur.

Cerevisiâ, quâ Rhabarbarum fuerit infusum, purgetur.

Si post Catharsin febris intermittere videatur, tum Julapium cum Cortice Peruviano (in Capite de febre intermittente pro infantibus descriptum) exhibeatur.

De Febre Scarlatina.

A State exeunte, infantes præcipuè infestat. Rigent & horrent sub initium; nec tamen admodùm ægrotant; cutis universa maculis parvis, rubris, crebrioribus, latioribus, & magis rubentibus quàm in morbillis, interstinguitur. Ad duos tresve dies persistunt; quo quidem tempore evanescunt, & decendente subjectà cuticulà squammulis surfuraceis, ad instar farinæ, cutis conspergitur.

R. Cor. Cervi usti, & pulv. è chel. Cancr. comp. ana semidrachm. Coccinel. gr. duo, Sacchar. crystall. drachm. unam. Misce, siat pulvis subtiliss. in duodecim Chartulas dividend. quarum unam capiat sextà quaque hora, superbibendo cochl. duo vel tria sequentis Julapii.

R. Aq. Cerasor. nigr. aq. Lactis Alexeter. ana unc. tres, Syr. è succ. Citri unc. unam. Misce, siat Julap.

Applicetur etiam Epispasticum cervici, & qualibet nocte paregoricum ex Syr. de Mecon. propinetur; & postqu'am symptomata cessaverint, purgetur æger.

De Pleuritide.

Nter Ver et Æstatem dominatur. A rigore et horrore orditur; quos statim comitantur calor, fitis, inquietudo, et cætera febrium fymptomata; elapsis pauculis horis, æger vehementi dolore puncturio in laterum alterutro circa costas corripitur, qui nunc versus omoplatas, nunc spinam, nunc anteriora pectoris sese propagat; tuffi crebrâ excruciatur. Materia sputo rejecta in initio morbi pauca est et tenuis, et fæpe fanguinis particulis intermista; progressu verò copiofior et magis concocta, sanguine etiam permixto. Febris pari passu incedit cum tussi, sputo sanguinis, dolore, et pro ratione liberioris expectorationis fenfim imminuitur; nunc alvus est astricta, nunc soluta nimis. Eductus è vena sanguis sevi liquati speciem præ se fert, ubi refrixerit.

Mittatur sanguis è brachio lateris affecti ad unc. decem.

R. Aq. Papav. Rhæad. unc. quatuor, Sal. Prunel. drachm. unam, Syr. Violar. unc. unam. Misce, fiat Haustus, sumendus statim à prima Venæsectione.

R. Amygd. dulc. excorticat. No quinque, sem. Melon. Pepon. ana semunc. sem. Papaw. alb. drachm. tres. aq. hord. sesquilibr. aq. Rosar. drachm. duas, cum s.q. Sacchar. cand. Fiat s. a Emulsio. Capiat unc. quatuor quarta quaque hora.

R. Decoct. Pectoral. libr. duas, Syr. Violar. et Cap. Ven. ana sescunc. Misce, fiat Apozem. Capiat semilibr. ter in die

R. Ol. Amygd. dulc. unc. duas, Syr. Violar. et Cap. Ven. ana unc. unam, Sacchar. cand. q. s. Misce, siat Eclegma; de quo sæpe lambat.

Oleum Amygd. dulc. per se vel Oleum sem. Lini recenter extract. exhiberi potest.

R. Ol. Amygd. dulc. Lilior. et unguent. Dialthææ, ana unc. unam. Misce, siat Linimentum; quo inungatur latus affectuum manè et serò, superimponendo sol. Brassicæ.

Repetatur

Repetatur Venæsectio ad tres alias vices ad eandem quantitatem, quatuor diebus continuis, ubi dolor et respirandi difficultas suadent.

De Peripneumonia notha.

Mgruente Hyeme, et sæpe sub ejus exitum emergit; insultu primo nunc incalescit, nunc
friget æger; ex motu quolibet vertiginosus est,
rubent et inslammantur genæ oculique, tussit, et
inter tussiendum dolor capitis lancinans premit,
potulenta vomitu rejicit; urina turbida est et
intensè rubet, sanguis pleuriticorum æmulus,
anhelus crebrò et celeriter spiritum ducit dolente thorace. Ab asthmate sicco planè distinguitur, quòd in isto nusquam comparant sebris indicia, in hac manifestò se produnt; licet
minora longè et magis obscura, quam in peripneumonia vera

Mittatur sanguis è brachio dextro ad unc. decem. Die sequenti æger hanc potionem sumat :

R. Cassia extract. unc. unam, Glycyr. drachm. duas, Ficus pingues Nº quatuor, fol. Senn. drachmas duas et semidrachm. Agaric. trochiscat. drachm. unam. Coq. s. q. aquæ ad unc. quatuor, in colatur. dissolv. Mannæ unc. unam, Syr. Rosar. solut. semunc.

Si verò potionem assumere nequeat, capiat Pil. Coch. maj. scrup. duos, horâ quartâ matutinâ.

Sequenti die celebretur iterum Venæsectio, ad eandem quantitatem; ac postero die repetatur Catharsis; quæ porrò repetenda est alternis diebus, vel post majora intervalla, pro ratione virium: atque insuper si Symptomata non cessaverint, extrahatur iterum sanguis semel adhuc, bis, vel sæpius, diebus aliquot interjectis, prout res postulaverit; sed ut plurimum Venæsectio bis celebrata sussiciet. Interim, dum hæc siunt, præsertim in diebus à purgatione vacuis, utatur decocto Pectorali, Eclegmate, et oleo Amygd. dulcium, in Pleuritide descriptis.

De Rheumatismo.

R Igorem et horrorem, et cætera febrium symptomata patiuntur; elapso die uno alterove (est et ubi citius) dolor adest atrox, nunc in hoc, nunc in illo artu, in carpis, humeris et genubus præsertim, vicissim hos relinquens et illos occupans; rubore, et tumore in parte, quam postremum affecit, adhuc residuis. Febris sensim evanescit, manente dolore; quin et nonnunquam immanius sæviente. In lumbagine rheumatica immanis dolor adest, circa lumborum regionem

regionem fixus, nephritim mentiens, nisi quòd æger non vomituriat, qui procumbere nequit; sed vel è lecto exilit, vel super eodem erectus sedet, corpore perpetuâ agitatione nunc versus anteriora, nunc posteriora inclinato. Sanguis pleuriticorum similis.

Mittatur sanguis è brachio lateris affecti ad unc. decem.

R. Aq. Nymph. Portulac. Lactuc. ana unc. quatuor, Syr. de Limonib. sescunc. Syr. Violar. unc unam. Misce, siat Julap. de quo bibat ad libitum.

Præscribenda Emulsio quatuor Sem. frigid. maj. Cataplasma è mica panis albiss. et lacte Croco tincto applicetur parti dolenti.

Die sequenti eadem sanguinis quantitas detrahatur; atque iterum, die uno vel altero interjecto, reiteretur; atque porrò quater vel pluries, si opus suerit: hoc observando, ut post secundam Venæsectionem, majora sint intervalla inter singulas sanguinis missiones.

Diebus à Phlebotomia vacuis Enema è lacte faccharato subinde injiciatur, vel sequens:

R. Deco&t. commun. pro Clystere libr. unam, Syr. Violar. et Sacchar. culinar. ana unc. duas. Misce, siat Enema.

Si imbecillitas ægri repetitionem Phlebotomiæ miæ non ferat, tum, post secundam vel tertiam Venæsectionem, Curatio hac methodo tentanda.

Capiat alternis diebus potionem purgativam communem, donec convaluerit, et iisdem noctibus Paregoric. ex Syr. de Mecon.

Sin his remediis non cedat, & æger ob imbecillitatem evacuationes qualescunque ferre nequeat, aggrediatur usum Elest. & aq. Antiscorbutic. in scorbuto descript. quæ etiam remedia locum habent in Rheumatismo Scorbutico.

In Juvenibus, atque iis qui temperate vixerunt, vino non plus æquo dediti; Rheumatismus Diæta simplici admodum refrigerante & mediocriter nutriente, æque feliciter, ac repetitis Venæsectionibus (quas minus ferre queant) profligari potest. Ex. gratiâ,

Solo Lastis sero ad dies quatuor vescatur æger; postea præter serum pane similagineo semel in die loco prandii, donec penitus convalescat; nisi quòd postremis diebus iterum panem in cœnam indulgere liceat. Symptomatis cessantibus, carnes pullorum elixorum, cæteraque eupepta concedantur; tertio autem quoque die solo lastis sero vistitet, donec tandem pancraticè valeat.

De Febre Erysipelatosa.

TUlla non corporis pars, præsertim facies, tumet, dolet & summè rubet; pustulæ denfæ, parvæ, in veficulas fubinde facessunt, quæ per frontem caputque serpunt; oculi tumore obruti, rigor & horror, atque reliqua febris indicia adfunt. In alia hujus morbi fpecie, liquorum attenuantium potationi superveniente, febricula adest, pustulæ urticarum puncturas referentes; nonnunquam in vesiculas sublatæ, mox recedentes, tuberculorum more sub cute se condentes, maximè pruriunt, & scalpendo rursum apparent. Est & alia eruptionis species, pectus ut plurimum obsidens; macula nimirum lata, cuti vix fupereminens, porriginofa cum fquammulis flavis; qua vigente, æger bene se habet, eâdem evanescente, leviter ægrotat; urina turbida & flava. Iifdem remediis, quibus pruritus ferinus, cedit; vino utatur æger & carnibus eupeptis.

Mittatur sanguis è brachio ad unc. novem vel decem. Die sequenti sumat potionem communem purgativam.

R. Rad. Althææ & Lilior. ana unc. unam, fol. Malv. Sambuc. Verbasc. slor. Chamæmel. Melilot. summitat.

fummitat. Hyperic. & Centaur. minor. ana manipulum unum, sem. Lini, Fænugræc. ana semuné. Coq. s. q. aq. ad libr. tres. Coletur liquor, & tempore usûs, adde singulis libris decocti Sp. Vini unc. duas. Stuphæ è panno laneo huic decocto immersæ, ac expressæ, calidè admoveantur bis in die, & pars affecta post fotum sequenti mixturà illinatur.

R. Sp. Vini semilibr. Theriac. Androm. unc. duas, pulv. Piperis longi, & Caryophyll. ana drachm. duas. Fiat mixtura; quâ Charta Emporetica madefacta, parti affectæ circumvolvatur.

Si primæVenæsectioni non cedat morbus, tum repetatur; & nondum cessante, ad duas alias vices celebretur, interposito semper die uno.

Diebus à Venæsectione liberis Enema è Laste cum Syr. Violarum, Emulsio refrigerans, & Julap. refrigerans, sunt præscribenda.

De pruritu ferino, & inveteratis cutis eruptionibus, quæ Venæsectioni & Catharsi non cedunt.

R. THeriac. Andromach. semidrachm. Elect de Ovo scrup. unum, rad. Serpentar. Virgin. subtilis. pulver. gr. quindecim, Lapid. Bezoar. oriental. ental. gr. quinque, cum s. q. Syr. è conditur Citri. Fiat Bolus, horâ somni sumendus per dies viginti & unam, superbibendo cochl. sex, sequent. Julapii:

R. Aq. Card. Benedict. unc. sex, aq. Epidem. & Theriacal. stillat. ana unc. duas, Syrup. Caryophyll. unc. unam. Misce, siat Julap.

Singulis mantutinis capiat liquoris possetici femilibr. calidè, & sudet horæ unius spatio.

His finitis, si pustulæ adhuc non evanuerint, sequenti Linimento partes affectæ inungantur:

R. Unguent. ex Oxylapatho unc. duas, unguent.
Pomati unc. unam, flor. Sulpur. drachm. tres, ol.
Rhodii semiscrup. Fiat Linimentum.

Veruntamen Medicamenta præscripta haud usurpentur, nisi Venæsectione & Catharsi ritè præmissis.

De Angina.

A Ngina inter Ver & Æstatem ut plurimum aggreditur. Sequuntur sebris insultum dolor & faucium inslammatio; unde à tumore uvulæ, tonsillarum, & laryngis, nec deglutire queat æger, nec spiritum ducere.

Mittatur sanguis è brachio copiosè. Tangantur partes inslammatæ melle Rosaceo, Sp. Vitrioli, vel Sp. Sulphuris ad summum acorem permixto, vel Sp. Vitrioli solo. Mox Gargarisma sequens usurpetur, non vulgari modo; sed ita ut sine ulla agitatione in ore contineatur, donec incalescat; dein expuatur, & repetatur subindè.

R. Aq. Plantag. Rof. rubr. & Sperm. Ranar. ana unc. quatuor, album. Ovor. in aquam agitando redact. No tres, Sacchar. crystall. drachm. tres. Misce, stat Gargarisma.

Emulsio refrigerans, in Pleuritide descripta, indies sumatur.

Sequenti manè, nisi sebris & dolor inter deglutiendum remiserint, Venæsectio repetatur; Catharsi in diem posterum rejectà, aliàs Catharticum lenitivum exhibeatur.

Manente adhuc affectu (quod oppidò rarum) repetatur adhuc Venæsectio, & Catharsis: E-pispasticum amplum ac forte applicatur cervici post primam Venesectionem.

Omni manè, nisi diebus purgationi datis Enema refrigerans & Emolliens injiciatur. Diætâ tenui utatur æger; & lecto per horas aliquot quotidie absistat.

In his omnibus Febribus, quas intercurrentes appello,

appello, ut etiam in illa, quæ stationaria est, cautè observandum, quòd æger à lecto abstineat magnam diei partem; ut jusculis hordeaceis, avenaceis, ac id genus aliis victitet; & cerevisiam tenuem lupulatam & hydrogalam pro potu ordinario bibat.

De Morbillis.

Nfantes plerumque impetunt. Primo die rigent horrentque, calent & frigent alternatim. Secundo consummatum febrim accersunt. Ægritudo vehemens, fitis, inappetentia, lingua alba (non verò ficca) tufficula, capitis & oculorum gravedo, & fomnolentia perpetua, acriter premunt; humor è naribus & oculis jugiter stillat : quæ lachrymæ certissimum morbillorum fignum. Huc accedunt sternutatio, tumor palpebrarum paulo ante eruptionem, vomitus, diarrhœa, cum dejectionibus colore viridi, in dentientibus præfertim. Symptomata ingravefcunt ad quartum usque diem; quo quidem die (nonnunquam quinto) in fronte & facie maculæ parvæ, rubræ, pulicum morfibus perfimiles prodeunt, quæ numero & magnitudine auctæ racematim coalescunt, & faciem maculis rubris majusculis interstinguunt: Hæ maculæ è parvulis E 2

vulis papulis, supra cutim paululum elevatis conflantur, quarum protuberantia digito levi, vix oculorum acie deprehendi possit.

A facie, quam primò folum occupant, ad pectus ventremque, crura deinde tibiafque propagantur maculæ: in his autem partibus latæ & rubræ, superficiem cutis non superantes conspiciuntur. Eruptione morbillorum non perinde deliniuntur Symptomata ac in variolis. Vomitus post eruptionem nullus; sed tusticula & febris cum spirandi difficultate intenduntur, in oculos defluxio, fomnolentia & inappetentia perseverant. Die sexto, aut circiter frons & facies asperescunt, emorientibus pustulis, ruptâque cuticulà; in reliquo corpore maculæ latissimæ funt, & maximè rubescunt. Octavo circiter die in facie evanescunt, & vix in reliquo corpore permanent. Nono nullæ prorsus funt; per faciem verò, & artus quandoque, & totum corpus in farinam quandam & squammulas facessunt; & tunc temporis febris, spirandi difficultas & tufficula augentur. In adultis à calido regimine livescunt primò, mox nigrescunt exanthemata.

R. Decost. Pestoral. sesquilibr. Syrup. Violar. & Cap. Ven. ana sescunc. Misce, siat Apozema. Capiat

Capiat unc. tres vel quatuor, ter vel quater in die.

R. Ol. Amygd. dulc. unc. duas, Syr. Violar. & Cap. Ven. ana unc. unam, Sacchar. cand. albiss. q. s. Misce, fiat Eclegma; de quo sæpius lambat, præcipuè quando tussis urget.

R. Aq. Cerasor. nigr. unc. tres, Syr. de Mecon. unc. unam. Misce, siat Hausius, singulis noctibus sumendus, à primo morbi insultu, usque dum convaluerit æger; dosin augendo vel imminuendo pro ratione ætatis.

Æger se contineat in lecto per biduum post primam eruptionem.

Si post Morbillorum discessum, Febris, respirandi dissicultas, & alia Symptomata Peripneumoniam mentientia supervenerint, sanguis liberaliter extrahendus è brachio, semel, bis, vel ter, prout opus suerit; convenienti spatio interposito inter singulas Venæsectiones. Atque etiam continuentur decoclum Pectorale supro descriptum, ut & Lohoch. vel. Ol. Amygd. dulc. per se. Circa diem duodecim ab invasione Cathartico lenienti purgetur.

Diarrhœa, quæ Morbillos excipit, Venesectione fanatur.

De Variolis.

CTIS invadunt rigor & horror, calor intensus, capitis & dorsi dolor vehemens, vomituritio: in adultis ingens in sudores propensio (& hinc minime consluxuras esse licet conjicere), dolor sub scrobiculo cordis si manu prematur, stupor & somnolentia; nonnunquam & insultus epileptici, in infantibus præsertim: quibus si dentitioni peractà corripiantur, in procinctu esse variolas possis prædicere; ita ut si sortè insultum epilepticum sub vesperam patiantur, sequenti aurorà in conspectum se daturæ sunt variolæ, mites ut plurimum & rarissimè consluentes.

Quarto incluvsiè ab invasione die, nonnunquam seriùs, rarò tamen ante illum erumpunt; quo tempore vel minuuntur Symptomata, vel prorsus evanescunt. In eruptione autem subrubræ primò pustulæ, tenuissimarum acicularum puncta æquantes, sparsim se produnt per faciem, collum, pectus, & corpus universum; tunc in faucibus dolor, qui cum pustulis surgentibus augetur.

Circiter octavum à primo insultu diem intervalla postularum, priùs alba, rubere jam incipiunt, in tumorem attolli, & dolore tensivo affici; extenduntur extenduntur palpebræ, & ut vesica inflata, oculos claudunt. Proximæ à facie intumescunt manus, digitique distenduntur; pustulæ faciei antea læves & rubræ, jam afperæ (primum maturationis indicium) & subalbidæ apparent; succum insuper luteum, colore à favo non ablundentem evomunt; faciei & manuum inflammatio jam summa in pustularum instertitiis colorem exhibet floridum, & rofarum Damascenarum æmulum; quem quidem colorem, quo mitiores funt variolæ, eo magis tum pustulæ tum cutis interjecta ad amussim exprimunt. Quæ faciem occupant pustulæ, asperiores quotidie ac magis flavæ pro maturationis ratione; quæ manus & reliquum corpus, minus asperæ albæque magis, conspiciuntur indies.

Die undecimo faciei tumor & inflammatio recedunt; pustulæ maturæ & justam magnitudinem (viz. pisi grandiusculi) adeptæ exarescunt deciduntque: decimo quarto vel quinto pereunt sunditus. Manuum autem pustulæ pertinaciores, albæ adhuc & recentes die uno aut altero moras trahunt, tandem dirumpuntur; cæteræ autem, faciei nimirum & corporis desquamantur, & in facie squamulis hisce surfuraceis succedunt soveæ.

Per totum morbi decursum alvus vel prorsus constipatur, vel rarissimè dejicit.

Maxima

Maxima eorum pars, qui ex hoc morbo pereunt, octavo die in discretis, undecimo autem iu confluentibus intereunt: Quippe cum in discreto hoc genere promoventur sudores tum cardiacis, tum regimine calidiore, prædicto die facies, quæ turgida, & per interstitia pustulis interjecta inflammari debuerat; è contra, flaccida reperitur & albescens, pustulis nihilominus rubentibus & elevatis, etiam post ægri mortem; sudor, qui huc usque manaverat, derepentè evanescit; æger interim phrenitide corripitur, anxietate, jactatione, ægritudine, vehementibus; urinam parcè reddit ac frequenter; & tandem paucissimarum horarum spatio ad plures migrat.

In Confluentibus eadem Symptomata (sed atrociora) febris scilicet, anxietas, ægritudo, vomituritio, &c. immanius sæviunt; licet non ita promptè, ac in discretis, in sudores dissolvitur æger. Diarrhœa nonnunquam eruptionem præcedit, & ad diem unum aut alterum post illam protrahitur, quod in discretis vix contingit.

Tertio die, aut citiùs, rarò tardiùs, erumpunt; & quo citiùs, eo magis confluunt. Quandoque ad quartum vel quintum diem differtur eruptio ob atrox aliquod fymptoma, verbi gratiâ, acutissimum dolorem in lumbis, nephritici æmulum, in latere pleuritici, in artubus rheumatici, in ventriculo cum ingenti ægritudine & vomitu. Non perinde

perinde ac in discretis, mox ab eruptione remittunt symptomata, sed & sebris & alia ad multos etiam dies post eruptionem postularum ægrum discruciant. Nunc erysipelatis ritu, nunc morbillorum erumpunt; eruptionis licet tempore planè distinguantur.

Crescente morbo, non in molem aliquam spe-Chabilem attoluntur; sed in facie sibi invicem implicitæ, tanquam vesicula rubra, vultum omnem contegunt, quem maturius elevant quàm discretæ: postmodum ad instar pelliculæ albæ vultui agglutinatæ cutis superficiem non admodum superant.

Præterlapso die octavo, pellicula alba quotidie paulatim magis exasperatur, colore susce susceptiones in
truculentiori morbo non nisi post diem vicesimum
latioribus laminis desquamatur. Hoc interim
observatu dignum, quòd quanto pustulæ maturescentes propiùs ad colorem subsusceum vergunt, eò deteriores lentiùs abscedunt; quo
magis autem slavescunt, eò minus consluxerunt,
& ocyùs se proripiunt. Ubi primum deciderit
pellicula, nulla scabritie vultus afficitur; at verò mox illam excipiunt squamulæ surfuraceæ, indolis perquam corrosivæ, quæ soveas relinquunt
patentiores, & sæpe cicatrices. Quandoque
humeri & dorsum cuticula denudantur. Morbi

periculum à pustularum frequentia & numero in facie solà, æstimandum. Pustulæ manuum & pedum majores, & quo altiùs ab extremitate artuum ascenderis, eo sensim minores & contractiores extant. In adultis falivatio, in infantibus diarrhœa (licèt non ita certò) confluentium comes. Ptyalifmus nunc cum eruptione se prodit, nunc biduo triduòve præterito, materiam primò tenuem, die undecimo viscidiorem ægerrimè excreat. Siticulosus est æger, voce raucâ, somnolentiâ & stupore ingentibus corripitur, inter bibendum subinde tussit, & potus per nares revertitur. Tunc cessat, ut plurimum salivatio, cui nisi faciei intumescentia (quæ licèt hoc ipso die pro morbi genio aliquantisper remitti debeat, non tamen nisi post diem unum alterumve omnino recedere) & manuum jam infigniter incipiens, & diutiùs perdurans suppetias tulerint, ægro protinus moriendum est. Diarrhœa non ita maturè infantes occupat, ac ptyalismus adultos.

In utraque variolarum specie febris ab insultu ad eruptionem dominatur, inde dat inducias ad pustularum maturationem, quâ peractâ, definit.

Superveniunt à malo regimine symptomata anomala; qualia sunt, postularum flacciditas & subsidentia, phrenitis, coma, maculæ purpureæ pustulis interspersæ, & in earum summitate maculæ nigræ exiguæ in medio subsidentes, sanguinis mictus & sputum sub initio morbi, urinæ suppressio.

Seperationis tempus cum febrili ebullitione tribus vel quatuor primis diebus transigitur. Expulsio per reliquum morbi tempus, mediantibus parvis abscessibus, in carne persicitur.

Dies in quo maximè periclitatur æger, in confluentibus in minimè crudo, & maximè vulgari genere, à primo morbi insultu, est undecimus, in crudiore adhuc decimus quartus, & in crudissimo decimus septimus; nonnunquam tamen, sed rarius, non ante diem vice-simum primum moritur æger. Quinimo per spatium illud omne, quod inter dies undecimum, & decimum septimum interjacet, appetente vesperà, molestissimo inquietudinis paroxystmo, quotidie vexatur æger.

Mittatur sanguis quovis ex tribus primis diebus ab invasione ad unc. novem vel decem; & postea Vomitorium exhibeatur, ad unc. unam vel sescunc. Infusionis Croci Metallorum.

His primis diebus diluatur fanguis frequenti potatione Cerevisiæ tenuis lupulatæ. Cui Vitrioli Spiritus immisceatur usque ad plenam pustularum eruptionem. Cum Variolæ omnes eruperint (quod ut plurimum est sexto die post invasionem) vesperi propinetur Syr. de Mecon. unc. una; quæ repetatur dehinc singulis noctibus ad diem decimum post invasionem. Eâ nocte, si Variolæ è Constuentium genere suerint, augeatur dosis ad sescunc. quæ dein repetatur ad unc. unam, manè, & ad sescunc. serò, singulis noctibus, donec æger convaluerit.

Si Syr. de Mecon. minus congruat, substitui possit Laudan. liquid. viz. gutt. octodecim pro unc. una Syrupi, & gutt. viginti & quinque pro sescunc. Hoc interim observandum, quòd si Paregoricum, bis in die exhibitum, orgasmum compescere non valeat (quod in Variolis insigniter Consuentibus sub sinem earum sæpe accidit) tum octavà quaque hora exhibendum, vel sæpius, si opus suerit.

At si Variolæ interstinctæ suerint, satis erit, ut solummodo singulis noctibus, post plenam eruptionem exhibeatur Paregoricum, atque etiam in minori dosi.

Qualiscunque autem generis Variolæ suerint, atque etiam qualicunque morbi tempore, si Phrenitis acciderit, omnino oportet, ut inordinato spirituum motui frænum injiciatur; ac proinde si prior Paregorici dosis metam non attingat, alia atque alia assumatur, donec tumultus penitus

penitus compescatur; interposito inter singulas doses spatio aliquo, ut pernoscere valeamus, utrum dosis ultima id, quod quærimus, præstiterit, antequam nova ingeratur.

Si omnimoda urinæ suppressio acciderit, æger e lecto eximatur, & aliquantulum obambulet.

Si saliva ob calorem sit adeò viscida, ut expectorari non possit, tum Gargarisma cum syringa sæpe in sauces injiciatur. Componatur è
Cerevisia tenui vel aq. hord. cum Melle Rosarum; vel sequens usurpari poterit:

R. Cort, Ulmi drachm. fex, rad. Glycyrrhiz. femunc. Passul. enucleat. No viginti, Ros. rub. pug. duas. Coq. s. q. aq. ad. sesquilibr. in colatur. dissolv. Oxymel. simp. & Mell. Rosar. ana unc. duas. Misce, siat Gargarisma.

Si Epispastico opus suerit, amplum satis & acre nuchæ applicetur nocte ista, quæ magnam morbi crisin præcedit, mox ab assumpto Paregorico; plantis quoque pedum applicari potest Allium, à die octavo, usque ad morbi sinem, singulis diebus renovandum.

Si infans de Symptomatis, dentitionem comitantibus, jam fecurus, derepente spasmo corripitur, hic cogitandum est convulsionem istam, fortassis à naturæ conațu, quæ Variolas, scarlatinam Febrem, aut Morbillos, in corporis habitum protrudere satagit, pendere: applicetur itaque Emplast. Epistpasticum nuchæ, lecto quamprimum committatur æger, exhibeatur insuper Cardiacum, cui Paregorici pauxillum est admiscendum, puero nempe trienni, Laud. liquid. gutt. quinque in aq. Epidem. cochl. uno.

Si die undecimo, vel alio quovis post eum, Febris secundaria cum inquietudine, jactatione, & cæteris id genus fymptomatis, usque adeò efferatur, ut Paregoricis utcunque repetitis sufflaminari nequeat, & mors quafi immineat, tum fanguis ad fatis magnam quantitatem illicò detrahatur, nempe ad unc. duodecim, vel circiter; atque porrò repeti possit semel vel bis in sequentibus diebus, si symptomatum dictorum ratio idem postulârit; at non alias. Catharsis etiam blanda die decimo tertio (non antea) vel quovis alio die eum insequente (modo Venæsectio præcesserit) institui possit, nempe ex Electuarii Lenitiv. unc. unam, dissolut. in aq. Cichor. vel lactis Alexeter. unc. quatuor. Veruntamen nec Venæsectio nec Catharsis impediunt, quo minus Paregorica in usum veniant; quæ (haud obstantibus iis) tam quoad largam dosin, quam repetitam, exhiberi debent, si opus adhuc fuerit: nam adhæc in hoc morbo semper confugienQuando Pustulæ persectè exaruerint, inungatur facies Linimento ex æqualib. partib. ol. Amygd. dulc. & Pomat. per biduum; at non ultra.

Die vicesimo uno post invasionem, mittatur sanguis è brachio; & sequenti die Catharsis celebranda, quæ porrò alternis diebus, ad tres alias vices, repetatur.

Quoad Regimen; è lecto abstineat ad sextum diem post invasionem; in quo postea se contineat usque ad decimum septimum, non aliis stragulis tectus, quam quibus sanus uti solebat.

Jusculis Avenac. hordeac. Pomis cost. et Cerevisià tenui vistitet; & post undecimum diem Vini Hispanic. cochl. quatuor vel quinque bis in die exhibeantur, si æger voluerit.

Si crurum tumor, non evacuationibus præfcript. cedat, tum fotu fol. Malv. Verbasc. Sambuc. Lauri, cum sioribus Chamæmel. & Melilot. in Laste cost. facilè fugatur.

Si primis morbi diebus æger Hæmoptoë laboret, vel urinam reddat fanguineam, tum pulvis et tinctura, quæ in capite de Hæmoptoë præfcribuntur, fextâ quâque horâ (donec fymptomata ista prorsus cessaverint) diligenter exhibeantur. Quo etiam casu Paregorica liberali manu propinanda.

De Chorea Sancti Viti.

Onvulsionis species quædam est; pueros puellasve à decimo ætatis anno ad pubertatem invadit. Prodit se claudicatione, vel instabilitate alterutrius cruris, quod æger post se trahit fatuorum more; manum ejusdem lateris, vel pectori vel alii alicui parti applicitam, nequit continere in eodem fitu horæ momento, fed in alium fitum & locum convulfione distorquebitur, quicquid æger contra nitatur; antequam poculum ad os possit adducere, mille gesticulationes, circulatorum instar, exhibebit: Non enim recta linea ori admovet, sed deducta à spasmo manu, huc illuc aliquandiu versat, donec tandem fortè fortuna, labris propius apponens liquorem derepentè in os injicit, & avidè haurit; deditâ tanquam operâ, ut spectantibus rifum moveret.

Sanguis ad unc. octo plus minus, pro ætate, ex brachio educatur.

Die sequenti, dimidia pars, vel quiddam amplius, pro ratione ætatis, potionis commun. hauriatur; & vesperi haustulus sequens propinetur:

R. Aq. Cerasor. nigr. unc. unam, aq. Epilept. Langii drachm. tres, Theriac. Andromach. scrup. unum, Laudan. liquid. gutt. octo. Fiat Haustus.

Potio Cathartic. ad tres vices, alternis diebus repetatur; & haustus Paregoricus iisdem no-Etibus.

Postea sanguis iterum extrahatur; & ad Catharsin, uti priùs, æger revertatur, & sic sanguis mittatur, & alvus subducatur ad tertiam quartamve vicem; spatio tamen inter alternas evacuationes observato, ut nihil periculi ægro immineat.

Diebus à purgatione vacuis sequentia præscribantur:

R. Conserv. Absinth. Roman. & slaved. Aurantior. ana unc. unam, Conserv. Anthos semunc.
Theriac. Andromach. vet. & Nuc. moschat. condit. ana drachm. tres, Zinzib. condit. drachm. unam,
Syr. è succ. Citr. q. s. Fiat Electuar. de quo
capiat ad magnitud. Nuc. moschat. manè, et
horâ quintâ pomeridianâ, superbibendo vini
sequentis cochlear. quinque:

R. Rad. Pæoniæ, Enul. Campan, Imperator. & Angelic. ana unc. unam, fol. Rut. Salv. Betonic. Chamædr. Marrub. alb. & summitat. Centaur.

min. ana manipul. unum, baccar. Juniper. drachm. fex, Cortic. duor. Aurantior. Incidantur & infundantur frigide in Vini Canarini libr. fex. Coletur tantummodo usûs tempore.

R. Aq. Rut. unc. quatuor, aq. Epilept. Lang. & Bryon. comp. ana unc. unam, Syr. Pæon. drachm. fex. Misce, siat Julap. Capiat cochl. quatuor singulis noctibus cubitum iturus, instillando Sp. Cor. Cervi gutt. octo.

Applicetur plantis pedum Emplast. è Caranna.

Ob Recidivæ metum pertundatur ei vena, & ad dies aliquot purgetur, eâ ipsâ anni sequentis tempestate (vel paulo ante) quâ morbus invasit.

Verisimile mihi videtur, quod hæc methodus curationi Epilepsiæ Adultorum convenire possit; quod tamen non adhuc expertus sum. Cum verò Chorea Viti ætates teneras adoriri soleat, in Epilepsia Adultorum tam sanguinis detrahendi quantitas, quàm Catharticorum doss adaugeantur.

De Apoplexia.

Somnus est profundissimus, & omnimoda sensûs & motûs privatio, excepta respiratione, quam ægri habent dissicilem cum stertore.

Mittatur

Mittatur sanguis è brachio ad unc. duodecim quamprimum, ac postea ex venis jugularibus ad unc. octo: deinde Vomitorium ex sescunc. vel unc. duabus, Insus. Croc. Metal. propinetur statim.

Emplastr. Epispastic. satis amplum, ac forte cervici applicetur.

Dum hæc aguntur, erectus sedeat æger in lecto, nec stragulis nimis obrutus.

Sp. Sal. Armoniac. optime rectificatus admoveatur naribus.

Finitâ Vomitorii operatione, subinde exhibeantur cochl. tria vel quatuor sequentis Julapii:

R. Aq. Rutæ unc. quatuor, aq. Bryon compos. & Antiepilept. Lang. ana unc. unam, Sp. Cor. Cervi gut. viginti, Sacchar. crystall. q. s. Fiat Julap.

Vel cochleare unum Sp. Lavendulæ compos. per se propinare possit bis vel ter, durante paro-xysmo, horâ dimidiâ vel integrâ interpositâ.

Cavendum est, ne Cardiaca plus justo callida, ac nimis frequenter (uti mos est) exhibeantur; nam quacunque demum specificâ virtute pollere videantur, plus damni quam emolumenti ægro apportant, utpote quæ humores fundere (ac proinde malum augere) apta nata sunt: quod etiam incommodum non minus infertur ex nimia stragulorum congestione.

Paroxysmo jam finito, ad præcavendam recidivam sequentia exhibeantur:

- R. Pil. Coch. maj. scrup. duos. Capiat tertiâ quâque die per sex vices, horâ quartâ matutinâ, superdormiendo.
- R. Conserv. flor. Salv. Rorismarin. ana unc. unam, Conserv. flaved. Aurant. drachm. sex, Nuc. moschat. condit. & Zinzib. condit. ana semunc. Theriac. Androm. vet. drachm. duas, pulv. elect. Diamb. Diamosch. dulc. ana drachm. unam, cum s. q. Syr. conditur. Citr. Fiat Opiata. Capiat ad magnitudinem castaneæ manè et serò, superbibendo aq. Epilept. Lang. cochl. duo.
- R. Ambr. gris. semidrachm. Ol. destil. sem. Anisi, Cinnamom. Nuc. moschat. ana gutt. duas, ol. Caryophyl. gutt. unam, Sacchar. in aq. stor. Aurantior. solut. unc. quatuor. Fiant s. a. Tabellæ; quarum capiat unam ad libitum.

Ab usu potûs generosioris cujusvis sibi temperet; vescatur juculis avenaceis, hordeaceis, ut & ex pullis gallinaceis confectis; & quandoque etiam

etiam (præcipue inter purgandum, carne pullorum, agnorum, ac id genus ciborum eupepton.

De Ophthalmia.

X oculorum inflamatione patet.

Mittatur sanguis è brachio ad unc. decem. Sequenti die sumat potionem purgativam communem, quæ repetenda est per duas alias vices, duobus diebus interpositis; iisdem nocibus sumat haustum Paregoricum ex Syr. de mecon. unc. unam.

Diebus à purgatione vacuis sumat ter aut quater in die unc. quatuor Emulsionis ex sem. frigid. maj. & Papav. alb.

R. Aq. Plantag. Rof. rub. & spermat. Ranar. ana unc. unam, pulv. Tutiæ præparat. drachm, unam. Fiat Collyrium; cujus guttæ aliquot instillentur oculis bis in die; at non incipiendum, nisi post primam purgationem.

Si his remediis affectus haud cedat, repetatur Venæsectio semel vel bis (præcipue si sanguis Pleuriticus apparuerit) ut etiam Catharsis.

Abstineat ab usu vini & cujusvis liquoris generosi; ab usu etiam ciborum coctu difficilium, & sale conditorum; & diebus inter purgationes bibat bydrogalam coctam.

Nota, quod sæpè accidit, quòd Venæsectioni & Catharsi utcunque repetitis Ophthalmia non cedit; hoc in casu Paregoric. ex Syr. de Mecon. unc. unam, singulis noctibus exhibitum, curationem sine aliorum suppetiis absolvit.

De Uteri Procidentia.

R. COrt. Querc. unc. duas. Coq. in aq. font. libr. quatuor ad libr. duas, sub sinem addendo Cortic. Granator. contus. unc. unam, slor. Ros. rub. Granator. ana manipulos duos; dein adde Vini rubr. semilibr. Colatura sit pro Fotu; qui cum pannis laneis parti assectæ admoveatur manè horis duabus, antequam è lecto assurgat, & nocte post decubitum, donec Symptoma penitus evanuerit.

De Paroxysmo Nephritico.

A Dsunt dolor fixus in lumborum regione; urina cruenta; arenularum aut calculi excretio; stupor cruris è directo renis laborantis; testis retractio ejus lateris, in quo est dolor; nausea & vomitus. Dolor colicus Nephritico haud absimilis; licèt in quibusdam symptoma-

tis planè discrepet, quæ recensita in Capite de Colica biliosa videas.

Si æger temperamento sanguineo suerit, mittatur sanguis è brachio affecto reni respondenti unc. decem; dein liquoris possetici, cui Rad. Althææ unc. duas, incoctæ fuerint Cong. unum, quam citissimè deglutiatur; & Enema sequens injiciatur:

R. Rad. Althææ & Lilior. ana unc. unam, fol. Malv. Parietar. Branc. Ursin. & stor. Chamæmel. ana manipulum unum, sem. Lini & Fænugr. ana semunc. Coq. s. q. aq. ad sesquilibr. Misce, stat Enema. Rejectis Vomitorio & Enemate, Laudani liquid. satis magna dosis propinetur, viz. ad gutt. viginti & quinque, vel Pill. Matth. gr. quindecim vel sedecim. In senibus verò, & morbo diuturno fractis, ut & vetulis Vaporibus obnoxiis (præcipuè si sub initium Paroxysmi urinam eæ reddant nigram & sabulosam) Venæsectio omittatur; at quoad reliqua, eadem quæ dicta est viâ omnino procedendum.

In miciu Sanguineo a Calculo renibus impacto.

CApiat æger, stato quodam die, singulis hebdomadis, Mannæ unc. duas & sem. in seri Lactis libr. duas solutas.

Conducit

Conducit aliquando, haustus cerevisiæ tenuis liberalior.

In calculo renum grandiori, dolor hebes, & obtusus, nullatenus auctus, sed satis tolerabilis persentitur, nec paroxysmus nephriticus comitatur.

Aquis chalybeatis æger se non tutò committet, nisi prius certò sciat, calculum majorem non esse, quam ut per ureteres viam possit invenire; quod, hoc tantum modo, certò potest dignosci, si nempe, jam antea, paroxysmum aliquem nephriticum fuerit perpessus, (cum dolore scilicet fævissimo in renum alterutro, per ureterum ductus propagato, & vomitu enormi) pro compertò habeat, non tam grandiorem aliquem calculum pelvi concludi, quam lapillorum exiguorum congeriem; quorum unus fubindè in ureterem illabitur, atque ita paroxyfmum invitat; qui fere non defint, nisi calculo in vesicam. detruso: cum sic se res habeat, nullum est magis efficax remedium, quam aquarum chalybeatarum potatio: quod si calculosus nullo unquam paroxysmo nephritico fuerit tentatus, cum jam major fit calculus, quam qui ex pelvi possit elabi, devitandæ sunt aquæ ferreæ.

De Dysenteria, Diarrhæa, & Tenesmo.

R Igent horrentque; fequitur deinde totius corporis calor; quem brevi excipiunt ventris tormina; & hæc dejectiones crebræ, mucosæ omnes (nisi quòd stercorosæ nonnunquam interponantur) cum ingenti cruciatu & molestissimo viscerum omnium quasi descensu, quoties exoneratur alvus; fanguinis interim lineamentis intertextæ, licèt aliquando ne minimum fanguinis per totum morbi decurfum admisceatur. Progressu morbi sanguis sincerus quandoque excernitur, & gangrænâ infanabili afficiuntur intestina. Si æger ætate floreat, vel cardiacis incalescat, febricitat admodum; lingua est subalbida, quadam mucilagine densè obsita, interdum nigra & sicca. Prosternuntur vires, dissipantur spiritus; aphthæ insuper oris interna faucesque obsident, præsertim ubi materiæ peccantis evacuatio adstringentibus præpostere impeditur, non exacto per cathartica morbi fomite. Aliquando, exulante febre, agmen ducunt tormina, & cætera morbi fymptomata fequuntur.

In Diarrhæa humores excrementitii fine fanguine aut intestinorum exulceratione excernuntur. In Tenesmo assidua est desidendi cupiditas; nihil tamen præter mucosum quoddam & subcruentum aut purulentum rejicitur.

Mittatur sanguis è brachio quamprimum, eademque nocte Paregoricum propinetur; & mane sequenti Potio purgans communis, repetenda alternis diebus ad duas alias vices; & Paregoric. post Purgationes, quam primum suo defunctæ sunt munere; ac diebus à purgatione vacuis idem manè & serò est exhibendum.

Post Venæsectionem & Catharsin semel celebratam, per totum morbi decursum, sequens Cardiacum exhibeatur:

R. Aq. Ceras. nigr. & Fragor. ana unc. tres, aq. Epidem. Scord. comp. & Cinnam. hordeat. ana unc. unam, Margarit. præparat. sesquidrachm. Sacchar. crystall. q. s. adde aq. Rosar. Damascen. semunc. ad gratum saporem. Misce, siat Julap. de quo capiat cochl. quatuor vel quinque in languoribus, vel ad libitum.

Potus sit Lac coctum cum aq. triplo, vel Decoct. alb. ut,

R. Cor. Cervi calcin. & micæ panis alb. ana unc. duas. Coq. in aq. font. libr. tribus ad libr. duas; poftea f. q. Sacchar. albiff. edulcoretur. Vel si dejectio virium postulaverit, aq. font. libr. duæ, cum Vin. Canarin.

Canarin. semilibr. simul coctæ, pro potu frigidè asfumantur.

Cum per tres vices purgatus fuerit æger, tota curatio usui Laudani bis vel ter in die repetiti postea incumbit, nisi quòd Enema ex Lac. vaccin. semilibr. & Theriac. Androm. sescunc. subinde injiciatur, quod in alvi egestionibus mire confert.

Cum alvi fluxus in Diarrhœam tantum affurgat, Phlebotom. & Catharsi præscript. omissis, seq. Bolus singulis matutinis exhibeatur:

R. Rhabarb. pulv. semidrachm. (plus minus pro ratione virium) cum s. q. Diascordii. Fiat Bolus, addendo ol. Chym. Cinnam. gutt. duas.

Noctibus insequentibus Paregoric. ex aq. Cinnam. hordeat. unc. unam, & Laudan. liquid. gutt. quatuordecim, exhibeatur.

Ubi tormina sicca sine dejectionibus excruciant, curantur diluendo sero lactis frigide propinato, & tepide injecto; ut in Cholera morbo, pullorum jusculo aut lacte cerevisiato.

Si hic morbus diutius excurrat, adeò ut omnis ejus vis in rectum intestinum decumbat, cum assidua desidendi cupiditate, Diæta Analeptica instituatur, & liquor aliquis Cardiacus pro libitu ingeratur, ut restaurari possint vires, quibus redeuntibus, Tenesmus sponte se proripit.

In Dysenteria malè curata dolores aliquando ægrum ad annos aliquot discruciant; in hoc casu Phlebotomia repetita pristinam sanitatem restituet.

Notandum est, quòd in constitutionibus huic morbo minùs faventibus omissis evacuationibus Dysenteria Laudano solo sanatur; quod manè & serò repetendum, donec symptomata penitus evanuerint, vel etiam ter Nychemeri spatio, si opus suerit.

De Colica biliosa.

Aliquot affligit febris in hunc morbum desinens, qui aut quasi injectà fascià constringit, aut
in punctum contractus quasi terebello persorat;
subinde remittitur, mox recrudescit. Sub initio non ita certò ad unum aliquod punctum determinatur, neque tam crebra vomituritio, neque alvus ita pertinaciter catharticorum vim
eludit; quo autem magis augetur dolor, eo obstinatiùs in puncto sigitur, vomituritio frequentior & major alvi adstrictio, Colicà tandem in
iliacam transeunte. A nephritide sic distinguitur. 1. Dolor nephriticus fixus in rene est, &
ab eo ad testem exporrigitur secundum longitudinem

dinem ureteris: Colicus verò vagus est, & cinguli instar medium ventrem assigit. 2. A passu Colicus dolor augetur: Nephriticus potius imminuitur. 3. In Colico dolore, ab excretione per alvum & per vomitum majus levamen emergit, quam in nephritico. 4. In dolore nephritico urina primum clara & tenuis, postea aliquid subsidet, & tandem arenulæ aut lapilli excernuntur: In Colica urinæ ab initio crassiores existunt.

Sanguis è brachio paulò liberaliùs educatur, & post horas tres vel quatuor Amodyn. exhibeatur. Postero die Catharticum lenitiv. & interposito die uno, ad tertiam vicem propinetur.

At si malum hoc fructibus horariis, vel aliis cibis avidè ingestis, originem debeat, tum ventriculus ante omnia lacte cerevisiato affatim hausto eluendus est; quo exantlato Anodynum propinandum est; sequenti autem die vena secanda est, & in ordine præscripto procedendum.

Ubi hic morbus minùs peritè tractatus diutissimè satigaverit, & ægrum penè confecerit, liberalior sive aquæ Epidem. sive Mirab. sive aliûs cujuscunque, quâ sanus maximè delectabatur, usus, ægrum hoc tempore ultra spem omnem juvit.

De Cholera Morbo.

Ntra Augusti limites se continens, vix in priores Septembris hebdomadas evagatur. A crapula & ingluvie excitatus similis assectus, nullo temporis discrimine insurgit; qui licèt eodem curetur modo, alterius tamen est subsellii. Adsunt vomitus enormes, ac pravorum humorum cum maxima difficultate & angustia per alvum dejecto; ventris ac intestinorum dolor vehemens, instatio & distentio; cardialgia; sitis; pulsus celer ac frequens, parvus & inæqualis; æstus & anxietas, nausea molestissima, sudor, crurum & brachiorum contractura, animi deliquium, partium extremarum frigiditas, & similia, quæ ægrum in viginti & quatuor horarum spatio interimunt.

Pullus tenerior in tribus circiter aq. font. congiis elixetur, ut carnis faporem vix perceptibilem liquor referat: hujus decocti, vel, defectu ejus, liquoris possetici capaciores aliquot cyathos æger tepidè exhauriat; & eodem tempore ex eodem liquore Enemata successivè repetenda. Haustibus & Clysteribus Syr. La-Euc. Violar. Portulac. Nymph. eorumve alicujus uncia subinde admisceri poterit.

Exantlato

Exantlato hoc Eluvionis penso (quod tres vel quatuor horas sibi vendicat) Paregoricum curationi Coronidem imponit.

Si non accesserit Medicus, nisi postquam æger vomitu & dejectionibus per multas horas continuatis suerit exhaustus; & jam frigescant membrorum extrema, tum ad Laudanum liquidum consugiendum est in paulò majori dosi (viz. Laudan. liquid. gutt. viginti & quinque in aq. Cinnam. fort. unc. unam); & cum cessaverint symptomata, nihilominus manè & serò quotidie est repetendum; at in minori dosi, donec pristinas vires receperit.

Est species quædam Choleræ morbi infantibus valdè familiaris, ac sæpenumerò sunesta, ex Dentitione vel Crapula originem ducens.

Horum ætas tenella minime fert, ut diluatur ventriculus largâ liquorum potatione, multo minus ut Catharticis tumultus major in humoribus excitetur; fed Curationem Laudano solo aggredi oportet; quamobrem gutt. duas, tres, vel quatuor, vel plures, pro ratione ætatis, cochl. uno, cerevisiæ tenuis, vel aquæ cujusvis appropriatæ instillatæ, exhibeantur, repetanturque, ut opus fuerit.

De Colica Pictonum.

F S r species quædam Colicæ, quæ degenerare solet in Paralysin, & motûs omnimodam manuum ac pedum depravationem; quam hoc nomine Riverius in capite de paralysi indigitat, & apud insulas Caribum notissima est; utpote quæ magnam vim hominum insestat.

Hunc dolorem atrocissimum sanat Balsam. Peruv. frequenter ac in magna dosi exhibitum, nempe si ejus gutt. viginti, triginta, quadraginta, Sacchar. albiss. cochl. uno instillentur, & bis vel ter in die dentur: at Paralysis huic remedio haud cedit.

De Illiaca Passione,

PEristalticus intestinorum motus invertitur; propinata cathartica & injecta enemata, in emetica statim transeunt; alvi sæces per vomitum rejiciuntur.

Mittatur sanguis è brachio dextro ad unc. novem vel decem; post aliquot horas exhibeatur sequens Pulvis:

R. Resin. Scammon. vel, defectu ejus, Resin. Julap. gr. duodecim, Calomelan. Torquet. scrup.

unum. Misce, siat Pulvis. Capiat è cochleari uno lactis vaccini, superbibendo ejusdem lactis cochl. unum vel alterum: vel si forma pilularum magis arrideat:

R. Pil. ex duobus semidrachm. Calomel. Torquet. scrup. unum, cum s. q. Balsam. Peruv. Fiant Pil. quatuor, summend. è cochl. uno Syr. Violarum.

Sin autem æger hoc remedium per os rejecerit, Laudan. liquid. gutt. viginti & quinque, aq. Cinnam. fort. femunc. instillatæ statim propinentur; cum vero horum usu vomituritio, ac ventris dolores, remiserint, catharticum distum iterum exhibeatur: verum si anodynorum virtute ac vi jam penitus infractis vomituritio ac dolor iterum redierint, cathartico interim in corpore restitante, ad usum paregorici supra descripti revertendum; idemque eò usque repetendum quarta vel sexta quaque hora, donec intestinis quies omnino inducatur; quo quidem tempore catharticum operationem suam per sedes exeret.

Nec sanè abs re suerit elapsa hora una, aut altera, post Venæsectionem, clysteram aliquem, ex iis qui potentiùs operantur, injicere, fumum scilicet nicotianæ, ex tubulo inverso, per vest-cam majusculam, in intestina validissimè insuf-

flatum; quæ quidem operatio post aliquot horas reiterari debet, nisi citius meatus deorsum pateat.

Finitâ operatione Cathartici, sumat sequentem haustum:

R. Aq. Cinnam. fort. unc. unam, Laudan. liquid. gutt. viginti & quinque. Misce, siat Hausius; qui porrò repetendus, est bis, ter, vel sæpius in die, donec vomituritio & dolor penitus cessaverint; atque etiam, istis symptomatis cessantibus, nihilominus ad curationem consirmandam, per aliquot adhuc noctes capiat idem paregoricum in minori dosi cubitum iturus.

De Fluxu Mensium immodico.

MEnstruorum sluxus, naturaliter constitutus, capacitatem testæ ovi anserini implet. Patet autem immodicus ex dissicili tolerantia, virium lapsu, inappetentia, cachexia, colore cadaveroso, & pedum intumescentia.

Mittatur sanguis è brachio ad unc. octo; sequenti manè sumatur potio purgativa communis, repetaturque alternis diebus ad duas alias vices; & noctibus post purgationem Paregoric. è Syr. de Mecon. exhibeatur.

Diebus à purgatione vacuis sumat sequen-

R. Conserv. Rosar. sicc. unc. duas, Trochisc. de terra Lemnia sesquidrachm. Cort. Granator. Corall, rub. præparat. & Boli Armenæ ana scrup. duos, lapid. Hæmatit. Sanguin. Dracon. ana scrup. unum, cum s. q. Syr. Cydonior. Fiat Elect. de quo sumat ad magnitudinem Nucis moschat. maj. manè & horâ quintâ pomeridianâ, superbibendo sequentis Julapii cochl. sex:

R. Aq. Germin. Querc. & Plantag. ana unc. tres, aq. Cinnamom. hordeat; & Syr. de Rosis siccis ana unc. unam, Sp. Vitriol. q. s. ad gratam aciditatem.

R. Fol. Plantag. & Urtic. ana q. s. Contundantur simul, & succus exprimatur, & possea clarificetur; de quo capiat cochl. quatuor vel quinque sæpiusculè ad libitum.

Post primam purgationem applicetur Emplast. seq. regioni Lumborum:

R. Emplast. de Minio & ad Herniam ana part. æq. extendantur super alutam. Fiat Emplastrum regioni Lumborum admovendum.

De Colica Hysterica.

E S T species quædam, seu potius insigne ac valdè usitatum affectionis Hystericæ symptoma, cui comitem se adjungit dolor circa scrobiculum Cordis atrocissimus, uti etiam humorum viridi colore per vomitionem ejectio.

Primo, quò faburra vitiosorum humorum in ventriculo contentorum minùs impediat Paregorici esficaciam, satis magna quantitas liquoris possetici assatim ingurgitetur, atque iterum per vomitionem rejiciatur, nempe ejustem liquoris sesquicong, quo peracto Laudan. liquid. gutt. viginti E quinque, in aq. Cinnam. fort. aq. Epidem. vel alius vehiculi unc. una, propinentur.

In usu Paregorici hoc notandum, quod eo usque repetendum est, donec symptomata o-mnia penitus cessaverint; debitum interea tempus interjiciendo, ut dijudicare valeamus, quid prior dosis essecit, antequam novam ingeramus.

Si sanguineo temperamento præditus sit æger, vel si antea hoc symptomate haud multum
infestatus suerit ac viribus fractus; hoc in casu
sanguis primum è brachio detrahendus, antequam vomitorium præscriptum propinetur.

Hâc ipsâ methodo Clavus hystericus curatur. Sin verò Colica Hysterica diuturnior fuerit per Paroxysmos assligens, tum in eorum intervallis, sive extra Paroxysmum, seq. usurpentur:

R. Zedoar. subtiliss. pulv. drachm. unam, cum s. q. Syr. è conditur. Citri. Fiat Bolus, sumendus manè & serò per triginta dies, superbibendo sequentem insusionem:

R. Zedoar. incif. minutim semunc. Vini Canar. unc. quatuor, infundantur frigide per duodecim horas; deinde colentur pro usu; vel Balsam. Peruv. ut in Colica Pictonum usurpetur.

Quæ de Colica Hysterica hic dicuntur, de Colica etiam Hypochondriaca dicta sunto; ut & hoc diligenter advertendum,

Utriusque affectus natura sibi vendicare videtur, ut alia atque alia tententur, donec tandem ad illud remedium perventum suerit, cui quasi genuinè morbus cedit; tametsi ut plurimum Chalybs imprimis confert.

Colica Hysterica tam in hypochondriacis quam hystericis sæpissimè in Icterum desinit; qui sensim sponte sua facessit; sin autem longas moras nectat, exhibeatur Apozema sequens; R. Rad. rub. Tinctor. Curcum. ana unc. unam, Chelidon. maj. cum toto & summitat. Centaur. min. ana manipulum unum. Coq. in æqual. partibus Vin. Rhenani & aq. fontan. ad libr, duas. Colatur. dissolv. Syr. de quinque radicibus unc. duas. Misce, siat Apozema; de quo capiat semilibr. calidè, manè & serò, usquedum convaluerit.

De Ictero, Colica neutiquam prægressa.

Color flavus in toto corpore, præsertim in oculorum albis est conspicuus, quo quidem colore objecta omnia apparent affectis tincta; corporis pruritus, segnities, & lassitudo; linguæ amaror; vomitus biliosus interdum; singultus; egestio alba; urina crocea, & pannum immersum eodem colore inficiens, morbum indigitant.

Exhibeatur potio purgativa communis, dein aggrediatur usum sequentium; & durante eorundem usu, Catharticum præscriptum quarto quoque die exhibeatur.

R. Conserv. Absinth. rom. Conserv. flaved.

Aurant. ana unc. unam, Angelic. condit. Nuc. moschat. condit. pulv. Ari compos. & Chalyb. cum aceto præparat. ana semunc. extract. Centaur. min.

extract. Gentian. & Cremor. Tartar. ana drachm.
duas, Croc. Anglic. pulv. semidrachm. cum s. q.
Syr. de quinque radicibus. Fiat Electuarium; de
quo capiat ad magnitud. Nuc. moschat. manè &
horâ quintâ pomeridianâ (vel vice Electuarii
sumat pilulas chalybeatas) superbibendo post matutinam dosin aquarum mineralium purgantium
libr. quatuor; & post pomeridianam dosin Apozemat. in Colica hysterica deseript. semilibr.

At si signa Hydropis assuerint, tam manè quàm serò Apozema superbibat.

Si vel his diu continuatis morbus adhuc obfliterit, ad aquas ferreas eundem est, quæ ex ipso fonte sunt bibendæ.

Ad præcavendum Abortum.

E Adem præscribenda, ac in sluxu Mensium immodico; omissis solummodò catharsi & succis.

De immodico Lochiorum fluxu.

FLuxum Lochiorum naturalem tria constituunt, sanguis scilicet purus, copiosus, per triduum primum sluens; dehinc sanguis aquosus, fus, loturæ carnium crassiori similis, per quatriduum præter propter durans; hinc postmodum materia viscosa & mucilaginosa, pauco aut nullo sanguine permista, per quinque aut septem dies prodiens, & sic porro ad mensis sinem.

Fluxus autem eorum immodicus dijudicandus est ex virium dejectione, animi deliquio, sanguine grumoso essluente, cibi fastidio, dolore in hypochondriis, ventris tensione, pulsu debili & frequenti, visûs obtenebratione, aurium tinnitu, & convulsionibus.

Victus incrassans instituatur, & potus sequens

R. Aq. Plantag. Vin. rubr. ana libr. unam. Coq. simul ad tertias, & deinde edulcoretur s. q. Sacchar. albiss. cujus, cum frigescat, capiat semilibr. bis vel ter in die.

Interim Julap. aliquod Hystericum (at satis mite) subinde propinetur, & Nodulus sequens naribus applicetur:

R. Galban. Assæ fætid. ana drachm. duas, Castor. sesquidrachm. sal. Succin. volat il. semidrachm. Misce, siat Nodulus. Vel,

R. Sp. Salis Ammoniac. drachm. duas; quem fæpe olfaciat.

De suppressione Lochiorum.

Ntumescit venter; dolor gravativus imum ventrem, lumbos & inguina occupat; facies rubescit; dissicilis est respiratio; perturbantur oculi; rigores, sebres acutæ adsunt; animi deliquia; sudores frigidi; pulsationis & ardoris sensus in utero; paralysis in partibus inferioribus; ut & interdum epilepsia.

E vestigio lecto addicatur, & Emplast. hystericum umbilico admoveatur quamprimum; Elect. seq. adhibeatur:

R. Conserv. Absinth. Rom. Rut. ana unc. unam, Trochisc. è Myrrh. drachm. duas, Castor. Croc. Anglic. sal. volatil. Sal. Ammoniac. & Assæ fætid. ana semidrachm. cum s. q. Syr. è quinque radicib. Fiat Elect. Capiat ad magnitud. Nuc. moschat. quartâ quâque horâ, superbibendo seq. Julap. cochl. quatuor vel quinque:

R. Aq. Rutæ unc. quatuor, Bryon. compos. unc. duas, Sacchar. cand. q. s. Fiat Julap. Vel sumat Trochisc. de Myrrh. scrup. unum, quarta quaque hora.

Si tota prædictorum quantitas confumatur, & Lochia adhuc supprimantur, Laudanum unicâ K saltem faltem vice exhibendum; ut, Laudan. liquid. gutt. quatuordecim in aq. Bryon. compos. vel Laudan. solid. sesquigr. cum Assæ fætid. semiscrup. in Pilulas duas redactum.

Si hæc nihil proficiant, tum Enema ex lacte Saccharato, unicâ faltem vice, injiciatur.

De Hydrope.

POveæ à digitorum impressione in surarum parte inferiori sub noctem conspicuæ, manè evanescentes, hoc malum primum indicant; maximè si spiritus interim ægriùs ducatur; (haud raro tamen fæminæ prægnantes, & quibus catamenia fistuntur, ut & viri ab asthmate inveterato derepentè liberati eodem tumore tentantur) pedibus cruribùsque ad extremum extensis, in abdomen ruunt aquæ, & ad ultimum capacitatis fuæ limen paulatim distendunt, donec tandem in viscera nobiliora impetu ab iis facto æger submergitur. Pro rata qua partes à morbo obfessæ mole augentur, aliæ magis magisque gracilescunt, urgentibus dyspnω, urinæ paucitate, et siti intensâ. Viros, ingravescente ætate; fœminas, ubi jam parere defierint, utplurimum adoritur.

Indicationes curativæ dirigendæ funt primò

ad aquarum evacuationem; deindè ad instaurandum sanguinis robur, quò novus aquarum proventus præcaveri possit.

R. Vini albi unc. quatuor, Jalap. subtiliss. pulv. drachm. unam, Zinzib. pulv. semiscrup. Syr. de Spin. cervin. unc. unam. Misce, siat Potio, summenda summo manè, repetendaque singulis vel alternis diebus, pro ratione virium, donec partes assectæ detumuerint. Vel,

R. Tamarind, semunc. fol. Senn. drachm. duas, Rhei sesquidrachm. Coq. in s. q. aq. ad. unc. tres, in Colatur. dissolv. Mannæ & Syr. Ros. solut. ana unc. unam, Syr. de Spin. cervin. semunc. Elect. è succ., Rosar. drachm tres. Misce, siat Potio, sumenda ut supra. Vel,

R. Pil. ex duob. scrup. unum, Elater. gr. tria, Ol. chym. Caryophyll. gutt. duas. Fiant Pil. No tres. Capiat summo manè, repetanturque ut opus fuerit. Vel,

R. Gambogiæ gr. quindecim. Vin. alb. & aq. Cichor. ana sescunc. Syr. de Spin. cervin. semunc. Misce, siat Potio, summenda ut supra. Vel,

R. Cortic. interior. Sambuc. è ligno derasi ma-K 2 nipulos nipulos tres. Coq. in Aq. & La&t. partibus aq. mistorum libr. duabus ad libr. unam. Colaturæ capiat dimidiam partem mane, & alteram serò quotidie, donec convalescat. At hoc remedium nisi in corporibus, quæ facillimè purgativis cedunt, nihil consert.

Circa usum Catharticorum in hoc morbo hæc tria advertenda sunt.

Primo, Utrùm ægri corpus facilè, an verò difficulter Catharticis cedere foleat; cum in iis qui facilè purgantur Syrup. de Spin. cervin. folus ad unc. unam exhibitus, aquas fat copiosè eliciat; in illis verò, qui difficulter purgantur, Cathartica fupra descripta, utut valida, vix scopum attingant.

Secundo, Cathartica omnia, quæ fegniùs operantur, magis officiunt quam profunt; quamobrem purgatio paulò fortior & nimia, justo debiliori est præferenda.

Tertio, Aquæ eâ maximâ celeritate exhauriridebent quam ægri vires ferre queant; ne nimis longa inter purgationes intervalla adhibendo, aquæ denuò affatim colligantur.

Est autem ubi medicamenta omnia, qualiscunque demum generis, quæ alvum movent, prorsus omitti possint ac debeant; quoties enim æger constitutione est insirmiori, vel sæmina vaporibus obnoxia, aquarum evacuatio Diureticis solum committenda, inter quæ ea sunt esticacissima, quæ ex salibus Lixivialibus siunt; ut,

R. Cinerum Genistæ libr. unam; infundatur frigide in Vini Rhenan. libr. quatuor. Liquoris per siltrationem colati unc. tres mane, quinta pomeridiana, & serò singulis diebus exhibeantur, usque dum humor evanuerit.

Aquis jam penitùs evacuatis, calefacientia & corroborantia medicamenta ufurpanda; ut,

- R. Rad. Raphan. Rustican. fol. Cochl. hortens. Absinth. wulgar. Salw. summitat. Centaur. min. & Genistæ; infundantur in Cerevisia forti, pro potu ordinario; qui potus incipienti hydropi aliquando sine Catharticis subvenit. Vel sequenti utatur:
- R. Conserv. Cochl. hortens. Absinth. Roman. ana unc. unam, extract. Gentian. Absinth. vulgar. & Centaur. min. ana drachm. tres, cum s. q. Syr. è cortic. Citr. Fiat Electuarium; de quo sumat ad quantitatem Nuc. moschat. maj. manè, quintâ pomeridianâ, & vesperi, superbibendo unc. quatuor sequentis Insusionis:
- R. Rad. Gentian. unc. unam, summitat. Genist. Centaur. min. & Absinth. vulgar. ana manipulum unum, sem. Fænicul. & Petroselini, ana drachm. duas.

duas, incisis minutim affunde Vini Rhenani libr. quatuor; stent simul in insussione frigida, & coletur solummodo tempore usûs.

Notandum, cùm ad corroborantium usum deventum suerit, ægrum nullo modo esse purgandum, tantisper dum sanguinis corroborationi navetur opera.

Quod & per Salium Lixivialium usum omnino observandum, quo quidem tempore pariter corroborare convenit.

R. Rad. Raphan. Rustican. unc. tres, fol. Cochl. hortens. Absinth. vulg. Salviæ, summitat. Centaur. & Genistæ, ana manipulos tres, Aurant. incis. No tres. Infundantur in Congiis sex Cerevisiæ fortis non lapulatæ, inter fermentandum. Sit pro potu ordinario.

De Gonorrhæa virulenta.

COrripiunt dolor genitalium infolitus, & rotatio testiculorum; in non recutitis macula morbilli æmula glandem occupat: statim à cujus exortu liquor, seminis instar, exstillat, qui quotidie à seminis colore & consistentia recedens slavescit, tandem dilutior ovi vitello; in lue virulentiore virescit, & aqueo humori permiscetur sanguine tincto. Pustula dicta ulcus sit, aphthis infantum

infantum simile indies latiùs & profundiùs depascens, superveniente orificii callo. Verpi
non glandis ulcere, sola Gonorrhœa tentantur.
Mox magnus dolor in pene, quoties erigitur;
quasi manu transversus fortiter constringeretur,
noctu præcipuè urget, dum æger lecto incalescit.
Curvatur penis à fræno contracto. Accedit
ardor urinæ, inter mingendum vix perceptibilis,
sed mictu finito, per urethræ ductum acriter urens, maximè, quà in glandem desinit. Carunculæ lotii exitum quandoque impediunt; & scroti
dolor ac inslammatio nonnunquam superveniunt.

R. Mass. Pil. Coch. maj. drachm. tres, extract.
Rud. drachm. unam, Resin. Jalap. & Diagryd.
ana semidrachm, cum s. q. Opobalsam. Fiant Pilul.
è singulis drachmis sex. Capiat quatuor singulis auroris, donec urinæ ardor & color slavus materiæ seminisormis admodum imminuantur.
Posteà alternis diebus ad septimanas adhuc duas; ac sub sinem bis in septimana, donec humor stillare prorsus cessaverit.

In iis, qui difficulter purgantur, subinde intercalari possit potio communis purgativa; cui addantur Syr. è Spin. cervin & Elect. è Succ. Rosar. ana drachm. duas; vel, curatione minus sceliciter succedente, Turbith. Minerale ad gr. octo, exhiberi

potest, bis vel ter, diebus quatuor interpositis; vel vice Turbith. Mineral.

R. Pil. ex. duob. semidrachm. Merc. dulc. scrup. unum, cum s. q. Opobalsam. Fiant Pil. quatuor, summo manè sumendæ.

Si æger à dicta Catharsi abhorreat, post Pilulas primò descriptas, tribus auroris continuis sumptas, tum manè & horâ quintâ pomeridianâ, quotidie injiciatur Clyster sequens; nisi quod semel aut bis in hebdomade, omisso Clystere, Cathartic. imperandum.

R. Elect. è succ. Rosar. drachm. sex, Terebinth. Venet. vitello Ovi solut. semunc. dissolvantur in aq. hord. libr. unam. Colatur. adde Syrup. Violar. unc. duas. Misce, siat Clyster.

Singulis noctibus capiat Opobalsam. vel Balsam. è Mech. gutt. viginti & quinque Sacch. frustulo exceptas. Hujus defectu, Terebinth. Cypr. ad quantitatem Avellanæ substitui possit.

Sit pro potu hydrogala; at Cerevisia tenuis in pastibus.

Vel sequentem methodum aggrediatur:

R. Pil. ex duobus semidrachm. Opobalsam. gutt. tres. Fiant Pil. No tres. Capiat horâ quartâ matutinâ, superdormiendo, repetanturque alternis diebus, vel tertiâ quâque die.

Diebuss

Diebus à purgatione vacuis, injiciatur manè & horâ quintâ pomeridianâ Clyster supra descriptus.

Procedente curatione (quâcunque eâ demum methodo tentetur) fanguis sub medium curationis semel vel bis mittatur, & diæta refrigerans, & incrassans præscribatur, & medicamenta iisdem virtutibus pollentia; qualia sunt Hydrogala, Emulsiones ex seminib: frigid. &c.

Si Penis tumore afficiatur,

R. Rad. Althææ, Lilior. ana sescunc. fol. Malv. Verbasc. Sambuc. Hyoscyam. stor. Chamæmel. Melilot. ana manipulum unum, sem. Lini, Fænugr. ana semunc. Coq. s. q. aq. font. & stat fotus, parti affectæ admovendus, per horæ unius spatium, bis vel ter in die.

Peractà fomentatione, perungatur pars affecta ol. sem. Lin. rec. extract. dein Emplast. è mucila-ginibus alutæ agninæ inductum labiis præputii tumidis circumponatur.

Si Ulcus in præputii labiis, vel in subjecta Glande, hæreat; tum sequens Linimentum præscribatur:

R. Unguent. Basilic. drachm. sex, Unguent. Nicotian. drachm. duas. Præcipitat. aq. Rosar. loti & optime levigat. semidrachm. Misce, siat Linimentum; quo lintei rasura imbuatur, & ulcusculo admoveatur semper post fotûs præscripti usum.

Si scrotum tumore afficiatur, statim sanguis è brachio extrahatur, atque bis in die sotus præscriptus parti affectæ admoveatur, singul. sotibus addendo Sp. Vin. Gallic. cochl. unum vel alterum, vel Cataplasma ex Oxycrato & farina fabarum ejus loco applicandum.

Catharticis interim & refrigerantibus modò descriptis introsumptis utendum est.

De Lue Venerea.

astringentium usu, labes sanguini imprimitur, exoritur Lues. Comparent in inguine bubones; in capite dolores & artubus, articulorum interstitiis, noctu præcipuè invadentes in lecto calidos; crustulæ & porrigines in variis corporis partibus, quæ ad instar favi slavescunt. Quo magis scabies dissunditur, tanto minus æger discruciatur. In cranio, tibiis brachiisque exostoses, ossum instammatio & caries; ulcera phagædenica in variis partibus; sed fauces utplurimum primò aggredientia, quæ sensim per palatum in nasi cartilaginem propagata mox eam absumunt, ita ut sulcro destitutus nasus plane concidat. Ulceribus, carie & dolore in-

dies exacerbatis, pereunt per vices membra; lacerum donec cadaver, & jam superis grave, humo condatur.

R. Axung. Porc. unc. duas, Mercur. crud. unc. unam. Misce, siat Linimentum, in tres equales partes dividendum; quarum una brachia, crura & tibias, ad tres noctes continuas manibus suis æger perungat.

Si intra tres dies post ultimam inunctionem salivatio haud procedat, tum gr. octo Turbith. mineral. in Conserv. Rosar. rubr. exhibeantur; aut corporibus minus robustis, Mercur. dulc. scrup. unum. Sed si salivatio jam incepta priùs elanguescat, quam symptomata penitus disparuerint, extimulanda subindè est eadem dosi Mercur. dulc.

Ptyalismus ita moderari debet, ut libr. quatuor Nycthemeri spatio expuat, aut circiter.

Si justo altiùs exurgat Ptyalismus, cum inflammatione nimia, atque id genus symptomatis ingruentibus, aliquantulum reprimendus est medicamentis Catharticis, donec debitum gradum attingat.

Quamprimum symptomata cessaverint, statim immutentur indusium & tori lintea; at sint ea, quæ priùs usurpata suerint. Si Diarrhœa supervenerit (quod plerumque accidit antequam salivatio bene assurgat) tunc sistenda est usu Laudan. liquid. ita dosin augendo atque repetendo, ut debitum opus absolvat.

Si os exulceretur, aq. Ros. Damascen. vel lacte aq. permisto, vel seq. Decoct idem colluatur:

R. Rad. Alth. Hord. mundat. ana unc. unam, fem. Cydonior. femunc. Coq. s. q. aq. ad libr. duas. Misce, siat Gargarisma; quo sæpius utatur.

Diæta & reliquum ægri regimen, eadem ac in Cartharsi imperanda; nisi quòd primis aliquot diebus liquore possetico, jusculis avenac. hordeac. ac cerevisià tenui tepesactà nutriatur.

His omnibus ritè peractis (etiamfi fymptomata omnia evanuerint, ac subindè morbus penitus profligari videatur) quo minùs recidivam postliminio patiatur, ægro semel in septimana per quatuor vel sex vices, Mercur. dulc. scrup. unum exhibendus, utcunque bene se habeat, & etiamsi jam domo egrediatur.

De Fluore albo.

Uod effluit, modò album, modò pallidum, flavum, viride aut subnigrum; modo acre & erodens; tetrum quandoque & grave-olens;

olens; decoloratur facies; dolet spina dorsi; prosternitur appetentia; oculi pedesque intumescunt.

Mittatur sanguis è brachio ad unc. octo.

- R. Pil. Coch. maj. scrup. duos, Castor. gr. duo, Balsam. Peruv. gutt. tres. Fiant Pil. No quatuor. Capiat horâ quartâ matutinâ, superdormiendo; repetanturque per duas alias vices, interponendo diem unum vel alterum, pro ratione virium.
- R. Aq. Rut. unc. quatuor, aq. Bryon. comp. unc. duas, Saccbar. crystal. q. s. Fiat Julapium. Capiat cochl. tria vel quatuor in omni languore; deinde aggrediatur usum sequentium:
- R. Theriac. Audromac. sescunc. Conserv. slaved. Aurant. unc. unam, Diascord. semunc. Zinzib. condit. & Nuc. moschat. condit. ana drachm. tres, pulv. è chel. Cancr. comp. sesquidrachm. cort. exterior. Granat. rad. Angelic. Hispan. Corall. rubr. præparat. & Trochisc. de terra Lemnia ana drachm. unam, Boli Armen. scrup. duos, Gumm. Arabic. semidrachm. cum s. q. Syr. de Ross siccis. Fiat Electuar. de quo sumat ad magnitud. Nuc. moschat. maj. manè, horâ quintâ pomeridianâ, & nocte, per mensem integrum; superbibendo sequent. infusionis cochl. sex:

R. Rad.

R. Rad. Enul. campan. Imperator. Angelic. Calam. Aromat. ana semunc. fol. Absinth. Roman. Marrub. alb. Centaur. min. Calamenth. vulgar. Salv. sicc. ana manipulum unum, Bac. Junip. unc. unam; incidantur minutim, & infundanter in vini Canarini libr. quatuor; stent simul in infusione frigida; coletur tantummodo tempore usûs.

Vescatur cibis eupeptis, & abstineat ab usu olerum & fructuum qualiumcunque, & singul. pastibus bibat vinum Hispanicum.

De Diabete.

SUcci fanguini illati per vias urinarias crudi & inconcocti exitum fibi quærunt; unde fensim labefactantur vires; colliquescit corpus, & quasi substantia ejus per hanc cloacam exinanitur cum siti; ardore viscerum; lumborum coxarumque intumescentia; & salivæ spumosæ expuitione crebra.

Eadem præscribenda sunt, quæ in Fluore albo, omissis solummodò Venæsectione & Catharsi.

De Dolore Hamorrhoidum.

Intensissimus inter excernendum dolor excruciat, & excrementi superficies cruore conspergitur: Nonnunquam tumores verrucis similes in sphinctere delitescunt, vel in margine ani apparent.

Mittatur fanguis è brachio dextro ad unc. decem.

R. Sem. Melon. Pepon. ana semunc. sem. Papav. alb. drachm. duas, Amygd. dulc. excorticat. No quinque. Contundantur in mortario marmoreo, sensim affundendo aq. kord. sesquilibr. aq. Rosar. drachm. duas, Sacchar. albiss. q. s. Fiat s. a. Emulsio. Capiat unc. tres sæpiuscule.

R. Flor. Sulphuris, Pulv. Glycyrrhiz. Salviæ ana drachm. unam, cum f. q. Balfam. Lucatel. Fiant Pil. è fing. drachm. fex. Capiat tres ter in die, superbibendo Emuls. præscript. cochl. fex.

R. Aq. Spermat. Ranar. unc. quatuor; in qua dissolv. Lythargyr. drachm. duas, Opii scrup. unum. Fiat Mixtur. cujus tantillo Linteum madefactum parti affectæ applicatur; vel, si tu-

mor intus lateat, cochl. tria ejusdem mixturæ modo Clysteris injiciantur.

Pro potu ordinario bibat aquam cum lacte coctam, vel aquam hordei; & à carnis usu abstineat. Singulis noctibus sumat Diacodium.

De Fluxu Hæmorrhoidum immodico.

Nnotescit ex viribus prostratis, copia & diuturnitate sanguinis excreti, sodo corporis colore, ad citrinum (ut in Ictero) vergente. Succedit Cachexia, & deinde Hydrops.

Eadem conferunt, quæ in fluxu mensium immodico, omisså solummodò Catharsi.

De Epilepsia Puerorum.

VEI primo mense aggreditur à frequentibus nimis alvi dejectionibus, (quo in casu DiaJeordium ad quantitatem grani piperis in aq. Saxifrag. aut laste materno solutum, & exibitum præstantissimum est remedium.) Vel circa dentitionis tempus, à septimo ad decimum mensem,
tussi comitata est, aut (quod multo deterius)
vomitu & diarrhæâ, viridia (ut solent hystericæ) egerente infante. Quandoque improvisò
occupat

occupat paroxyfmus, os oculosque distorquens, nigredine vultum perfundens, & artus varios convellens; quandoque præfentitur ex digitorum in pugnum contractione, & ex stabili & insolità oculorum orbitarum immobilitate. Nunc ferius nunc ocyus se proripiunt paroxysmi, certâ subinde periodo, vago alias insultu revertentes; sed, appetente morte, à tergo se invicem premunt: Si quando inducias dent, in foporem proclives funt infantes, donec à novo refuscitentur insultu.

Applicetur Emplast. Epispastic. cervici quamprimum.

R. Ag. Epilept. Lang. drachm. tres, Laudan. liquid. gutt. unam, vel duas, vel plures, pro ratione ætatis, Syr. Pæon. drachm. unam. Misce, fiat Haustus, sumendus quamprimum.

R. Aq. Rutæ unc. tres, aq. Epilep. Lang. & ag. Bryon. comp. ana unc. unam, Syr. Caryophyll. semunc. Misce, fiat Julap. Capiat cochl. unum fingulis horis, si haustus præscriptus paroxysmum non fugaverit.

M D_{θ}

De Rachitide.

IN Rachitide adfunt partium laxitas & mollities, debilitas & languor, ignavia & torpor, & inæqualis earundem nutritio, viz. caput justo majus; facies plenior & floridior; partes carnose infra caput emaciantur; nodis protuberant articuli; maximè carpi, paulò minus tali; tument & extremitates costarum; ossa incurvantur, præcipuè tibiæ & fibulæ; hinc ulnæ & radii; aliquando femoris & humeri, decurvantur etiam ossa; dentes tardè & molestè erumpunt, vacillant, nigrefcunt, & frustulatim excidunt; peclus à lateribus angustum, anteriùs acuminatum, abdominis repletio, & hypochondriorum tenfio; tuffis & pulmonum vitia laceffunt; lateralis decubitûs modò dextri, modò finistri aversatio.

R. Fol. Absinth. vulgar. Centaur. minor. Marrub. alb. Chamædryos, Scordii, Calamenth. vulg. Parthen. Saxifrag. pratens. Hyper. Virg. aureæ, Serpill. Menth. Salv. Rutæ, Card. Benedict. Puleg. Abrotan. Chamæmel. Tanacet. Lilior. convall. omnium rec. collect. & incis. ana manipulum unum, Axung. porcin. libr. quatuor, Sev. Ovin. & Vin. claret. ana libr. duas; macerentur in olla sictili su-

per cineres calidos per horas duodecim; deinde ebulliant ad humiditatis consumptionem; & postea colentur, ut siat Linimentum; quo venter & hypochondria illinantur manè & serò, ut etiam & artus hoc malo affecti, per triginta vel quadraginta dies, vel donec convaluerit.

R, Singulor. ingredient. præscript. ana manipulos duos; infundantur frigidè in Cerevisiæ non lupulat. Cong. quatuor, pro potu.

In Tumoribus Infantum ventres occupantibus ab evacuationibus nimiis procedentibus, Sanguis & Viscera herbis corroborantibus confortentur, ut in Rachitide vera; nisi quod axillæ etiam utræque inungantur, at non artus.

De Febribus à Dentitione crtis.

R. S.P. Cor. Cervi gutt. duas, vel tres, vel quatuor, pro ratione ætatis, in cochl. uno, vel altero aq. Cerasor. nigr. vel Julap. alterius appropriati exhibeantur quarta quaque hora, ad vices quatuor vel sex.

De Febre bectica Infantum.

SIne infigne calore languent cum appetitûs dejectione, artus & truncus corporis emaciantur.

Rhabarb, incisi drachm, duas in lagenam vitream, Cerevisiæ tenuis libr, duarum capacem, immittantur pro potu ordinario.

Epoto hoc liquore, aliæ libr. duæ eidem Rhabarb. superaffundantur ad tertiam vicem.

Si verò potus vi Cathartica faturatius imprægnetur, tum libr. una epota alteri Cerevifia mox adjiciatur.

De Tusti Puerorum Convulsiva.

PHlebotomià & repetità Catharfi, eâque solà, expugnatur hæc tussis, malum aliàs pertinacissimum, & fere insuperabile; sed leniora tantum cathartica hic conveniunt, eaque cochleatim ingerenda sunt, pro ratione ætatis.

De Hæmorrhagia Narium.

Dolor & calor finciput lancinant.

Sanguis è brachio frequenter extrahatur; victûs ratio refrigerans & incrassans injungatur; Julap. refriger. & incrassans, cum Emulsionibus refrigerantibus, præscribantur.

Singulis diebus injiciatur Enema refrigerans, atque omni nocte Paregoric. ex Syrup. de Mecon. exhibeatur, & semel vel bis Potio purgativa commun. præscribatur.

Lintea quadruplicata immersa aq. frigidæ, in qua sal. Prunell. dissolvatur, & postea leviter expressa admoveantur nuchæ, & utrinque cervici sæpius in die.

Post Evacuationes, liquor sequens applicetur:

R. Vitriol. Hungaric. & Alum. ana unc. unam, Phlegmat. Vitriol. semilibr. Coq. tamdiu, dones omnia fuerint dissoluta; liquorem frigefactum filtra, & à Crystallis subinde natis separa, liquori residuo adde ol. Vitrioli duodecimam partem. Vel potius,

R. Aq. Plantag. unc. tres, bol. Armen. subtiliss. pulver. semunc. probè misceantur; Turunda ex lin-

teo raso liquore boc bumectata nari, ex quo sanguis stillat, indatur, per dies duos isthic relinquenda.

Hoc minus succedente, Vitriol. Rom. aq. commun. dissolvatur, qua Turunda imbuta nari indatur; liquore etiam hoc linteamina imbuta, & applicata sanguinem sistunt, si ex parte externa disfluat.

De Chlorofi.

A Díunt vultûs & totius corporis decoloratio; intumescentia in facie, palpebris & malleolis; gravitas totius corporis; crurum ac pedum tensiva lassitudo; respiratio dissicilis; cordis palpitatio; capitis dolor; pulsus febrilis; somnolentia; pica, & mensium suppressio.

Sumat Pilulas Chalybeatas, vel pulv. Chalybeatum in affectione hysterica præscript. plus minus pro ratione ætatis, superbibendo haustum vini cujuslibet ad libitum, vel Insuson. corrolorant. cum rad. Angelic. ibidem descriptam. Si ægra non valde debilis fuerit, purgetur semel, vel bis, ante præscriptorum usum.

De Suppressione Mensium.

CIbum fastidiunt mulierculæ; fædus faciei color est; gravitas totius corporis; dolores sincipitis, lumborum, crurum & imi ventris; pedum tumores infestant.

Eadem præscribenda ac in Hysterica affectione; at si iisdem remediis affectus non cesserit, tum sequentia sunt præscribenda:

Singulis auroris, & quarta pomeridiana, sumat Julap Hysteric. sine Castor. cockl. quinque, instilland. Sp. Cor. Cervi gutt. duodecim. Singulis noctibus sumat cubitum itura Trockisc. de Myr. scrup. unum, cum Syr. de Artemis. in formam Boli wel Pil. redact.

De Vomitu sanguinis, vel etiam de Hæmoptoë.

IN Hæmoptoë dolor & calor pectus obsident, cum debilitate quadam.

Mittatur sanguis ex brachio dextro ad unc. decem. Sequenti mane sumat Potionem purgativ. commun. & eadem nocte Paregoric. ex unc. tribus, aq. Cerasor. nigr. & Syr. de Mecon. unc. una.

Postea aggrediatur usum sequentium:

R. Bol. Armen. unc. unam, pulv. Radic. Symphyt. drachm. duas, Ter. sigillat. Lapid. hæmatit. & Sang. Dracon. ana drachm. unum, Sacchar. albiss. ad pondus omnium. Misce, siat pulvis subtilissimus; cujus cap. drachm. unum manè, quintâ pomeridianâ, & nocte, superbibendo sequent. Apozemat. unc. quatuor:

R. Fol. Plantag. Rubi Sylvestris, & Millefol. ana manipulum unum. Coq. s. q. aq. ad sesqui-libr. in Colatura dissolv. Syrup. de Symphyt. unc. duas. Misce, siat Apozema. Vel cap. cochl. sex sequent. Tincturæ:

R. Flor. Ros. rubr. drachm. sex, Cort. intern. Querc. semunc. sem. Plantag. parum contus. drachm. tres, aq. font. libr. duas, Sp. Vitriol. q. s. ad levem assiditatem; infundantur in vase clauso, calore leni, per quatuor horas; Colatur. adde aq. Cinnamon. hordeat. unc. tres, Sacchar. albiss. s. q. ut siat Tinctura gustui grata.

Si ab usu Pulveris abhorreat, utatur Elestuario in sluxu mensium immodico præscripto.

Enema quotidie injiciatur, & Diacodium horâ fomni propinetur.

Phlebotomia insuper semel, bis, vel ter (ut opus suerit) reiteretur, diebus aliquot interposi-

tis; & semel iterum, si res postulet, repetatur potio purgativa.

Diæta incrassans & refrigerans observanda.

De Punctura Tendinis.

HUmor aqueus, vel ichor quidam, ex orificio venæ incifæ jugiter distillat.

R. Rad. Lilior. alb. in Laste vaccin. ad teneritud. cost. & contus. unc. quatuor, Farin. sem. Lin. & Avenæ ana unc. tres. Coq. ad Cataplasmatis consistentiam in eodem laste, quo radices costæ suere: applicetur parti affestæ manè & serò.

De Ambustis.

POveatur pars affecta linteis Sp. Vini imbutis, usque dum evanescat dolor; ac deinceps de novo imbuatur linteum, quod ter vel quater in die, parti affectæ applicatur.

De Mania communi.

A Nimis exaltata & vivida fanguinis crafi oritur. Est & alia maniæ species febres intermittentes diuturniores excipiens, in stulti-

N

tiam tandem degenerans, producta quidem à debilitate & vapiditate sanguinis, à diutina fermentatione. Præscribantur itaque Cardiaca generosiora, viz. Theriac. Andromach. Electuar. de Ovo, pulv. Comitiss. pulv. Gualt. Rawleigh, in aq. Epidem. Theriacal. vel alia; & diæta instituatur analeptica.

In junioribus mittatur sanguis è brachio ad unc. octo vel novem, bis vel ter, diebus tribus inter singulas Venæsectiones interpositis. Tum semel extrahatur sanguis è venis jugularibus. Posteà tota curatio innitatur sequenti Cathartico, quod sumat tertià vel quartà quâque die, donec convaluerit: hoc interim observando, quod cùm octies vel decies purgatus suerit æger, exhibitio Cathartici ad septimanam unam vel alteram omittatur.

- R. Pharmac. domestic. (i.e. rad. Bryon. alb.) pulv. unc. unam, Lactis vaccin. unc. quatuor. Vel,
- R. Ejusdem semunc. vel drachm. sex, Vin. alb. unc. quatuor; infundantur per noctem; in colatura dissolv. Syr. Violar. unc. una. Misce, siat Potio. Vel,
- R. Gambogii gr. quatuordecim, aq. Cerafor. nigr. unc. tres, Syr. Caryophyll. femunc. Fiat Potio.

De Contusionibus.

MIttatur sanguis è brachio lateris magis affecti ad unc. decem; sequenti manè exhibeatur Potio communis purgativ. ac deinceps eodem modo Venæsectio & purgatio alternatim repetantur, donec æger convaluerit. Interim toto decursu, si internæ partes lædantur, sequentia præscribantur:

R. Decost. Pestoral. sesquilibr. Syr. Violar. Cap. Ven. ana unc. duas. Fiat Apozema. Capiat semilibr. ter in die. Item ol. Amygd. dulc. rec. cochl. unum, sæpius propinetur.

R. Ol. Amygd. dulc. Unguent. Dialth. & Pomat. ana unc. unam. Misce, siat Linimentum; quo ungatur pars læsa manè & serò, superimponendo sol. Brassicæ.

De Furfure, sive Porrigine capitis.

POtio purgans communis bis propinetur; dein,

R. Ol. Amygd. amarar. & Laurini, Cinerum fol. Abrotani ana unc. unam; misceantur probè, & fiat

fiat Linimentum; quo inungatur totum caput fingulis matutinis, diligenter infricando, & postea fuperimponendo veficam fuillam.

At primum abradatur totum capillitium, & postea defricentur squamulæ, sensim singulis auroris, prout decidere pronæ fuerint.

De morsu Canis rabidi.

POst quadraginta dies, aut plures, melancholica adfunt fymptomata; febris, fitis, hydrophobia, & tandem partium extremarum convulsio.

R. Sp. Vin. optime rectificat. unc. quatuor, Theriac. Andromach. unc. unam. Fiat Mixtura; qua illinatur pars læfa ter in die, fuperimponendo linteum eâdem mixturâ imbutum.

De Ulcere Vesica.

DUs graveolens, aut fanguis, nonnunquam fquamulæ feu pelliculæ membranaceæ ac veluti furfuraceæ crustulæ (fin in renibus hæreat ulcus, carunculæ minutulæ, aliquando craffiores) unà cum urina excernuntur; perpetua dyfuria

dysuria & continuus earum partium dolor infeftant. Renibus autem affectis ulcere, dilucida dysuriæ, & doloris dantur intervalla; pus etiam excretum copiosus est, album, leve & minimè fœtidum; lacti similis profunditur urina: & longè post mictionem pus ab eo separatum in fundo residet.

- R. Emplast. Flor. Unguent. diet. sesquidrachm. Fiant Pil. No novem. Capiat tres horis medicinalibus, superbibendo sequentis aq. cochl. sex:
- R. Rad. Fænicul. Confol. Aristoloch. & Caryophyll. ana unc. tres, fol. Agrimon. Hyper. Bugul. Sanicul. Plantag. ana manipulos sex; incidantur minutim, & distillentur in Vini alb. & Lact. ana libr. quatuor, & eliciantur solummodo libr. quatuor pro usu.

R. Pulv. rad. Consolid. maj. & Gumm. Arab. ana unc. unam, Sacchar. Penid. unc. duas. Fiat Pulv. Capiat cochl. unam bis in die.

De Assemate inveterato in iis, qui sanguineo temperamento præditi sunt.

Dividitur in tres species; Dyspnæam, quæ dissicilis est respiratio, in qua crebrior densiorque est spiritus tractio, ex infarctu pulmonum sine stertore oriunda: Asthma, ubi frequens & magna respiratio, in qua diaphragma, musculi intercostales, tum etiam abdominis, violenter moventur, cum stertore & sibilo: in priore specie substantia pulmonum, in posteriore bronchia oppilantur: et Orthopnæam, quæ est maxima spirandi dissicultas, sub qua ægrotantes non nisi sedentes, & erecta cervice respirare posiunt: musculi etiam pectoris & scapularum vehementer exagitantur.

Mittatur sanguis è brachio dextro ad unc. decem. Die sequenti sumat Potionem purgativam communem; quæ repetatur tertia quaque die, per duas alias vices.

Diebus à Purgatione vacuis sumat sequentia:

R. Sem. Anif. subtiliss. pulv. drachm. duas, cum s. q. Balsam. Lucatell. Fiant Pil. ex singulis drachmis, sex. Capiat tres manè, & quintâ pomeridianâ, superbibendo decocti Amari sine purgantibus unc. quatuor calidè.

Si Symptomata adhuc maneant, repetatur de novo integer Processus.

De Paralysi.

SEnsus & Motus in partibus quæ afficiuntur, vel simul, vel alterutra tantum facultas aut prorsus extinguitur aut vitiatur.

Sumat Pil. Coch. min. scrup. duos, alternis matutinis per sex vices; deinde capiat ter in die per triginta dies Electuar. Antiscorbutic. drachm. duas, superbibendo aq. Antiscorbutic. cochl. sex. Vide in Scorbuto.

R. Unguent. Nervin. unc. tres, Sp. Lavendul. comp. & Sp. Coch. hortenf. ana fescunc. Misce, & inungantur partes affectæ, ut spina dorsi, &c. manè & serò.

Pleraque præscriptorum, utut curationi scorbuti solum destinari videantur; attamen cum humores crudos, ac sixos, volatilisare præ aliis apta nata sunt, in Paralysi etiam conveniunt.

De Tuffi & Phthifi.

Tuffis per se patet. Phthis autem invadit ab ætatis anno octodecim ad triginta & quinque. Extenuatur totum corpus. Febris molestat hectica, à cibo invalescens, (quæ ex celeritate pulsus, rubedinéque genarum dignoscitur); materia per Tussim excreta cruenta est aut purulenta; in ignem conjecta, tetrum spirat odorem, & immissa in vas aquâ repletum, sundum petit. Sudores nocturni superveniunt; livescunt tandem genæ; facies pallet, exacuantur nares; temporum quoque collapsus; unguium incurvatio; capillorum dessuxio; & alvi prosluvium colliquativum, mortem statim subsecuturam denunciant.

Si Tussis recens fuerit, & nondum febrim, aut alia signa Peripneumoniam notham comitantia, accersiverit; vel si à Pleuritide, aut Peripneumonia, ob neglectam sufficientem Phlebotomiam, malè curatis eadem nequaquam orta suerit; satis erit, ut æger per dies aliquot ab usu Vini & Carnis abstineat; & his similibus remediis ad libitum utatur.

Balfamum sulphuris Anisatum ad gutt. decem, eochl. uno Sacchar. crystall. instillatum, bis vel

ter in die devoretur; ut etiam Tabellar. sequent. quas secum æger continuò portet, unam frequenter assumat.

R. Sacchar. cand. sesquilibr. Coq. s. q. aq. font. usque dum adhærescat extremis digitorum; tum adde pulv. Glycyrrhizæ, Enul. campan. sem. Anis. & Angelic. ana semunc. pulv. Irid. Florentin. Sulphur. ana drachm. duas, ol. Chem. Anis serup. duos. Fiant s. a. Tabellæ domesticæ vocand. atque hoc interim Eclegmate utatur.

R. Ol. Amygd. dulc. unc. duas, Syr. Cap. Ven. Violac. ana unc. unam, Sacchar. cand. q. s. Fiat Lochoch. de quo sæpius lambat bacillo Glycyrrhizæ, quando Tussis urget.

In defluxione tenui Eclegmata incrassantia exhiberi poterint.

Sin verò Tussis his remediis haud cessaret, (præcipuè autem si sebrim comitem habeat, vel si à Peripnuemonia aut Pleuritide originem ducat), tum ineptum suerit pectoralibus sidere; sed Venæsectione & Catharsi debellanda est, ut in methodo, quæ in curatione Peripnuemoniæ nothæ describitur.

Verum enimverò cùm, his omnibus non obstantibus, Tussis non modò non curationi cesserit, sed & diuturna Pulmonum concustione eos adeò debilitaverit, ut Phthisis tandem subingreffa fuerit, tum hâc methodo procedendum.

R. Balsam. Peruv. gutt. decem; instillentur cochl. uno Syr. Hederæ. terrestris: vel si id minus gratum fuerit ægro, cochl. uno Sacchar. crystal. Capiat ter in die, superbibendo Decocti amari sine purgantib. unc. quatuor, vel (si idem ventrem moverit) unc. tres.

Sed omnibus aliis (quotquot adhuc inventa funt) Equitatio ad fatis longa & diutina itinera facile palmam præripit, hoc observando, ut si æger juvenilem ætatem prætergressus fuerit, plus temporis huic exercitio impendere debet, quam si puer aut juvenis esset: & sanè haud multò certius Cortex Peruv. Febri intermittenti, quam in hac ætate Equitatio Pthisi medetur.

De Scorbuto.

A Dsunt spontaneæ lassitudines; corporis gra-vitas; dyspnæa, præcipuè ex motu corporis; gingivarum putrefactio; oris graveolentia; sanguinis è naribus crebra eruptio; ambulandi difficultas; crurum nunc intumescentia, nunc extenuatio, in iifdem perpetuo maculæ lividæ.

vidæ, plumbeæ, flavæ, aut violaceæ; faciei color plerumque ex pallido fuscus.

Extrahatur fanguis è brachio ad unc. octo, nisi signa Hydropis adfuerint. Seq. manè exhibeatur Potio purgat. communis; quæ repetatur tertià quâque die per duas alias vices.

Diebus à purgatione vacuis, ut etiam postea, per mensem unum vel alterum sumat sequentia:

R. Conserv. Coch. hortens. unc. duas, Conserv. Lujul. unc. unam, pulv. Ari compos. drachm. sex, cum s. q. Syr. Aurantior. Fiat Electuar. de quo capiat ad magnitud. Nuc. moschat. maj. manè, quintâ pomeridianâ, & nocte, superbibendo aq. Raphan. compos. cochl. sex; vel sequentis:

R. Rad. Raphan. Rustican. raspat. libr. duas, rad. Ari libr. unam, sol. Coch. hort. manipulos duodecim, sol. Menth. Salv. Nasturt. aquat. & Becabung. ana manipulos sex, sem. Coch. hort. parum contus. semilibr. Nuc. moschat. semunc. Vin. alb. libr. sex; destillentur organis communibus, & eliciantur solummodo libr. sex pro usu.

Vel Folia rec. Coch. hortens. per se destillentur pro usu dicto.

Porrò fequens cerevisia sit pro potu ordinario.

R. Rad. Raphan. Rustican. recentis incisi drachm. duas, fol. Coch. hortens. No duodecim, Passular. enucleat. No sex, Aurantii cum toto incisi dimidium, in Lagenam vitream libr. duarum. Cerevisiæ tenuis capacem, subere mox probè obturandam, immittantur.

In hunc modum parentur eodem tempore sex Lagenæ pro usu; & post aliquot dies sex aliæ, antequam priores exhauriantur, & sic deinceps. Vel,

Viçe hujus Cerevisiæ seq. Misturæ cochl. tria vel quatuor, immisceri poterint, singulis haustibus potûs communis.

R. Rad. Raphan. Rustican. & sem. Coch. hortens. ana semunc. fol. Coch. hortens. manipulos duos, pulpam unius Aurant. Contundantur simul in mortar. marm. sensim adfundendo Vin. alb. semilibr. Coletur cum levi expressione, & reponatur prousu.

Eadem remedia, Phlebotomiâ & Catharsi omissis, in Rheumatismo scorbutico, sive Hysterico, valde prosunt.

De Podagra.

E Xeunte Januario, aut incipiente Februario, ingruit horâ ferè fecundâ matutinâ, dolore pollicem

pollicem pedis ut plurimum occupante, quandoque verò calcaneum, furam aut talum; mox fequitur rigor, cum horrore, & febricitatione aliquali, dolor gradatim intenditur, & pari passu rigor atque horror recedunt; idque in fingulas horas, donec tandem fub noctem ad apicem pervenerit, nunc tenfionem violentam, nunc morfum canis rodentis, quandoque preffuram, & coarctationem exprimens: hinc præ exquisito dolore, nec linteorum superincumbentium pondus, nec cubiculi à fortiori ambulatione concussionem ferre Podagricus valeat: dolor non fedatur, nifi ante horam fecundam, tertiamve matutinam, (decurso scilicet ny&hemeri spatio à primo appulsu), & jam leni madore perfusus æger somno concedit; à quo evigilans, dolore multum imminuto, partem affectam tumore recenter occupatam cernit. Sequenti die, fortè etiam ad biduum, triduumve dolet nonnihil pars affecta, idque vehementius advesperacente die; levatur autem sub galli cantu. Intra paucos dies alter pes eodem dolore torquetur. Postquam utrumque pedem exercuerit dolor, qui sequuntur Paroxysmi abnormes funt, tum quoad tempus invafionis, tum durationem; atque ex ferie horum paroxymu-Iorum, constat Paroxysmus, qui dicitur Podagræ, diuturnior breviorve pro ægri ætate. In

iis, qui vegetiores funt, & quos Podagra rarius invasit, diebus sæpe quatuordecim; in senioribus, atque iis quos sæpius afflixit, duobus mensibus ferè desinit; iis verò qui vel annis, vel diuturniore morbi mora fracti sunt, non priùs valedicit, quàm æstas jam adultior eam sugaverit.

Ad quatuordecim primos dies urina coloratior est, cum sedimento rubro, & quasi arenulis referto, alvus serè constipata est. Appetitus prostratio, rigor totius corporis sub vesperam, integrum Paroxysmum comitantur: recedentem Paroxysmum excipit pedis assecti inter digitos pruritus, vix ferendus; unde decidunt surfures, & pedes desquamantur.

Hactenus dolor pedibus tantum fuerit infeflus; cum verò vel ab indebita medicatione
turbatur Podagra, vel ob diuturnam morbi pertinaciam, corporis fubftantia quasi in morbi
fomitem pervertitur; jam manus, carpos, cubitos, genua, aliasque regiones occupat; quandoque unum, pluresve digitos distorquens fasciculo radicum pastinacæ similes eos reddit, motu paulatim privans; tandemque concretiones,
circa articulorum ligamenta, tophaceas generans, cretam, vel oculos cancrorum æmulantes: nonnunquam in cubitis tumorem subalbum ciet, serè ad ovi magnitudinem, qui sen-

fim inflammatur, cum rubore; nonnunquam femur occupans fensum exhibet quasi ingentis ponderis appensi, sine dolore tamen notabili, at genu exinde petens, id acrius urget: artus jam habet æger ferè undequaque contractos & impeditos, ita aut claudicet, & permoleste prorepit. Urina illam colore imitatur, quæ in diabete excernitur; dorsum aliæque partes molestè pruriunt, maximè sub horam somni.

Post multos dirosque cruciatus, Paroxysmi subsequentes (natura partim onere materiæ peccantis, partim senio oppressa) ægrum quoad dolorem clementius tractant; at, loco doloris consueti, ægritudo quædam cum dolore ventris, lassitudo spontanea, quandoque etiam propensio ad diarrhæam superveniunt; quæ symptomata evanescunt, quoties articulos dolor fatigat: atque ita nunc dolore, nunc ægritudine, quasi alternatim lacessentibus, Paroxysmus longas moras nectit.

Calculum Renum in quamplurimis parit hic affectus.

Fæminas perrarò infestat; easque, non nisi jam vetulas, & viragines; pueros quoque, & juvenibus minores, vix adoritur. Indicatio Curativa in eo vertitur, ut coctioni confulatur, indigestionibus sublatis, seu sit per Pharmaca, seu victûs rationem, seu exercitationem, seu alia ex istis quælibet, quæ sex res non-naturales indigitantur.

Venæsectio, Catharsis, ac Diaphoresis scopum non attingent; licèt iis qui Renum simul Calculo, & exindè orto Mictu sanguineo laborant, non abs re erit, semel in septimana, alvum Manna subducere, & singulis noctibus, post purgationem Paregoricum exhibere.

Medicamenta, quæ prædictæ indicationi fatisfaciunt, ea funt, quæ moderatè calent, & vel amaricant, vel linguam leniter feriunt; talia funt, Rad. Angelic. Enulæ, fol. Absinth. Cent. min. Chamædr. Chamæp. &c. quibus addi poffunt Antiscorbutica dicta; ut, Rad. Raph. rustic. fol. Coch. hort. Nasturt. aquat. &c. quæ tamen parcius usurpanda veniunt, quia morbi fomiti aculeos subdunt, & calorem augent, præ istis aliis, quæ miti calore, atque amaritudine, ventriculum corroborant. Haud inutile est Electuar. sequens:

R. Conserv. Coch. hort. sescunc. Absinth. Rom. slav. Aurant. ana unc. unam, Angel. condit. Nuc. mosch. cond. ana semunc. Theriac. Androm. drachm.

tres, pulv. Ari comp. drachm. duas, cum s. q. Syr. Aurant. Fiat Elect. de quo sumat drachm. duas bis in die, superbibendo seq. aq. distill. cochl. quinque vel sex:

R. Rad. Raph. Rust. incis. unc. tres, Coch. hortens. manipulos duodecim, Nasturt. aq. Becabung. Salv. Menth. ana manipulos quatuor, Cort. Aur. No sex, Nuc. mosch. condit. No duo, Cerevis. Brunsvicens. libr. duodecim; distillentur organis communibus, donec solummodo libr. sex aquæ eliciantur pro usu.

Hæc autem remedia digestiva, constanter, atque omni adhibità diligentià, assiduè usurpanda, & in Paroxysmorum intervallis præcipuè in usum revocanda sunt.

Mediocritas ea in cibo observanda est, ut neque plus alimenti ingeratur, quàm ventriculus concoquere valeat; neque è contra nimiâ abstinentiâ, partes eâ proportione alimenti destraudentur, quæ earundem robur & vigorem sustinere potis est. Quoad qualitatem autem ciborum, ægri palato consulendum est, & unica ciborum specie singulis pastibus vescatur; de cæteris, demptâ carne, pro libitu comedat; modò nec acria, nec sale condita sint, nec aromatis. Prandere tantum expedit; loco autem cœnæ in-

dulgeat sibi haustum cerevisiæ alicujus tenuioris, quo calculi concretio impediatur.

Liquores optimi funt, qui neque ad vini generositatem ascendunt, nec ad aquæ debilitatem, ne frigore suo lædant ventriculum, deprimuntur. Hujusmodi est Cerevisia tenuis Londinensis, aut multa aqua cum pauco vino permixta; aqua autem pura & cruda periculosa est: cùm autem universa ferè corporis substantia in podagram degeneraverit, à liquore quocunque fermentato, quantumvis leni & tenui, abstineat, & utatur Decocto Diætetico ex Sarsa, in remediorum formulis descripto, ubi primum à paroxysmo convaluerit, per reliquum vitæ cursum.

Sin autem æger à longo & nimio liquorum inebriantium usu, vel ab ætate provectiore, vel denique præ nimia debilitate, cibos absque vino nequeat concoquere; in pastibus haustum vini Hispanici sibi indulgeat, Apozema Diæteticum abdicans.

Æger maximè hyemis tempore, maturè lectum petat, diluculo exfurgat, animus sit tranquillus, nec nimis intentus studiis, & rebus seriis; cæteris verò omnibus, exercitatio corporis quotidiana facile palmam præripit, quæ moderata sit, & perseverans, nullo autem modo justo vehementior. Quoad exercitii genus, quoties nec grandior ætas, nec calculus intercedant, reliquis præferenda est equitatio constans, ac assidua in aëre salubri, aut vectio in curru.

Veneris lenociniis ne indulgeat: Remedia externa nulla adhibenda.

Quamvis nihil magni in paroxysmo tentandum sit, conducet tamen sortasse per aliquot dies, ubi primum à morbo corripitur, à carnibus abstinere, jusculo uti avenaceo, aut alio pari alimento; sin autem spiritus animales ataxiam concipere apti sunt, non expedit à carnibus abstinere diutius, quam ventriculus earum usum aversetur: ne quid autem, vel in quantitate vel in qualitate, ciborum aut potûs peccet.

Symptomatis iis occurrendum est, à quibus æger in paroxysmo de vita periclitatur: horum maximè familiare est, ventriculi languor, cum ventris torminibus, tanquam à slatu: hoc in casu, nihil æque votis respondet, ac Vini Canariensis haustulus subindè deglutitus; exercitio utatur æger: sin autem symptoma, inducias haud ferens, mortem minitetur, modo caput malum non impetat, ad Laudanum statim confugiendum, viz. gutt. viginti in haustulo aq. Epidem. & in lecto ad quietem se componat. [Hâc ipsâ methodo, se ab imminenti morte liberavit auctor clarissimus; ubi ex errore aliquo, circa res sex non-naturales, in ingentem ventriculi ægri-

tudinem incidit, cum vomituritione, & aliquali ventris dolore; artus interim, ex retrocessione materiæ Podagricæ, dolores erant expertes, ac ad motum plus solito habiles. Congium nempe unum liquoris possetici, vel Cerevisiæ tenuis devorabat; & quamprimum totum per vomitum rejecerit, Vini Canar. haustulum, cui instillatæ fuerint Laud. liquid. gutt. octodecim sumebat.] Quod si huic remedio symptoma non cedat, sudor provocetur methodo & medicamentis huic usui dicatis, ad biduum triduumve, manè & vesperi, per duas tresve horas continuas.

Si autem metastasis fuerit materiæ peccantis in pulmonum lobos, liberatis artubus à dolore, & tumore, tractandum est hoc symptoma pari modo ac Peripneumonia absoluta; venæsectione scilicet repetità, diætà, & remediis resrigerantibus, & incrassantibus; purgandus est insuper æger, inter venæsectiones, potionibus lenientibus; sudoris autem provocatio obest.

PHTHISIS seu TABIS Descriptio & Cura.

Lures sunt Tabis species: PRIMA ferè oritur è frigore hyeme contracto. Paulo enim ante folstitium Brumale quamplurimi ab ingruente tempestate frigidâ, tusti tentantur. Quæ cùm illos invaferit quibus pulmones ab ortu funt infirmiores, omnino necesse est, ut à repetitis Tussiendi conatibus magis adhuc debilitentur; atque ita tandem alimento fibi proprio assimilando, præ mala Siadiou, prorsus impares reddantur. Hinc jam ingens Pituitæ crudæ copia aggeritur, quæ continuâ Pulmonum agitatione & vehementi nisu affatim per os rejicitur. Pulmones exinde pure referti purulenta μιάσματα quaquaversum in carnes dispergunt. Hinc enascitur febris putrida, cujus Paroxysmus sub vesperam fatigat; sub auroram verò sudore copioso ac vires imminuente solvitur. Denique ad malorum cumulum Diarrhœa fuccedit, partim ab humoribus putridis ex arteriis mesentericis in intestina depositis excretisque, partim à labefactato pessundatoque viscerum Tono. Atque ita demum æger proximâ æstate sato suo sungitur, à morbo, cui prægressa hyems viam straverat, extinctus. Atque hæc est præcipua Tabis species.

Porro cum fanguis hac tempestate particulis humidis admodum scateat, perspiratioque à subita pororum contractione plus fatis inhibeatur, particulæ hæ in pulmones depluunt per interspersos Venæ Arteriosæ ramos; vel per Ductus Salivales in glandulis fauces occupantibus reponuntur; unde jam humor per Afperam Arteriam delapsus in Pulmones, Catarrhi ritu, eos ita jugiter irritat, ut creber & vehemens tuffiendi connatus, tum illam debilitatem, tum alia quæ diximus fymptomata, brevi accerfat. Cumque non jam amplius naturalem fibi pulmones œconomiam statumque tueri valeant, Glandulæ & Tubercula adnasci solent; quæ in ægris ex hoc morbo decedentibus, si aspiciantur pulmones, purulentà fanie, utplurimum distenta reperiuntur.

Ubi semel invaluerit hic morbus, & radices egerit, remedia plerumque aspernatur. Tentari utcunque potest medicatio, minuendo causam desluxionis in pulmones, pertusa in Cubito Vena, Catharticis mitioribus; tum medicamentis pectoralibus dictis, ad varios morbi status

accommodatis; incrassantibus scilicet, ubi humor subtilior & tenuior vim expultricis facultatis videtur eludere; attenuantibus verò, ubi pituita crassior ægre, & cum molestia per os rejicitur. Dein & hectica Febris remediis refrigerantibus contemperantibusque coërcenda: talia sunt Lac. Asininum, aqua lactis stillatitia; Emulsiones ex Amygd. dulc. sem. Melon. Pepon. Papav. albi, aq. Fl. Paralys. &c. Denique & curando Ulceri opera danda est; cui rei Terebinthina illa liquida, Opobalsamum vulgò dicta, apprimè conferre censetur.

Hujusce morbi Curatio, me judice, hâc methodo optimè ac felicissimè instituetur. Primum educatur è brachio fanguis; dein subducatur Alvus ad tres dies continuos, vel Pil. Coch. majoribus, vel Decocto leniente à nobis præscripto. Tertià nocte exhibeatur Syrup. de Mecon. semunc. Intermisso biduo triduove, pro re natâ repetatur Purgatio; idque toties fiat, quoties opus esse videatur, donec fymptomata vel prorfus evanuerint, vel faltem mitescant. Post fingulas Catharses jam finitas, capiat Opobalsami gutt. viginti, Sacchari particulæ majori instillatas permixtasque, nihil superbibendo; vel Pil. è Terebinth. ex insula Chio cum Saccharo cando confectam. Opobalfamum non affumendum est, nisi prægreffis

prægressis evacuationibus debitis. Hujus loco Electuarium è Balsamo Lucatelli, Glychirrhizæ pulvere, semine Anisi & Terebinthina concinnatum poterit substitui. Post evacuationes sedulo conandum est, ut Tussis sedetur, ne pulmones jugi agitatione infirmiores evadant. Huc facit præ cæteris Syrupus jam laudatus, qui hac formula possit usurpari:

R. Decoct. pectoral. libr. unam, Syr. de Mecon. Syrup. Capill. Ven. ana unc. duas. Capiat cochl. quinque ter in die. Medicamentum hoc ita frequenter haustum catarrhum in Pulmones depluentem paulatim sistet; eosque in pristinam τυεξίων reducet, nisi jampridem à naturali statu nimium recesserint. Promovebit insuper purulentæ materiæ in issdem aggestæ concoctionem.

At verò Palmarium hujusce Morbi præsidium est, ut æger quotidie equo vehatur. Et qui se huic corporis exercitio sanandum tradit, nullis jam Diætæ legibus adstrictus, nullo cibi potusve genere privandus est: cum in hoc uno omnis rei cardo vertatur. Quibusdam eorum qui ex hac methodo convaluere, tumor in collo exortus est, non multum à Scrophulis abludens.

Est & ALIA Tabis species à Tussi prognata, longè diverso anni tempore, initio scilicet æstatis. Hæc Juvenes persæpe illos invadit, qui debiliori sunt corporis habitu, & quorum sanguis particulis calidis acribusque refertus est. Sanguinem isti è pulmonibus per tussim exantlant, nimio meri potu priùs excalesacti. Ægri dolorem sive ægritudinem quandam in pulmonibus persentiscunt: Quæ symptomata, nisi maturè remediis appropriatis eliminentur, primo scabrities, mox & ulcus accedit; unde pus confectum demum exspuitur.

Dicta jam Tabis species, Venæsectione & Catharsi bis alternatim repetitis, saltem in principio, facile vincetur: si Diætá insuper resrigerante & incrassante utatur æger, & à carnibus in solidum abstineat.

TERTIA hujus Morbi species ortum debet materiæ Febrili in pulmones, Febre jam fatiscente, amandatæ; qui sensim insirmiores redditi à symptomatis jam memoratis vexantur.

Quandoque oritur à fanie istà purulentà, quæ à Pleuriticis non satis copiosè per expectorationem egeritur. Quo in casu eandem, quàm Empyema, curationem postulat.

Sunt

Sunt etiam qui à nimis copiosis, & debito frequentioribus evacuationibus debilitati in QUARTAM Tabis speciem præcipitantur. Hos calor Hecticus à cibo potuque sumpto, sub noctem lacessit: atque hos præ cæteris Aphthæ infestant.

F I N I S.

I N D E X.

Bortus præcaven-		F	
dus Pag. 71		Febr. Constitutionum	
4 1 0	97	variarum	23
Angina	33	a Dentitione	
Apoplexia	50	ortæ	91
4 07	02	Depuratoria	13
		Eryfipelatofa	31
C		Hæctica Infa	
Chlorofis	94	tum	92
Cholera Morbus	62	Intermittens	17
Chorea Sancti Viti	48	Pestilentialis	15
Colica biliofa	60	Scarlatina	24
Hysterica	68	Statitionaria	20
Pictonum	64	Fluor albus	84
Contufiones	99	Furfur, five Porrigo)
		Capitis	99
D			,,
Diabetes	86	G	-
Diarrhœa	57	Gonnorrhœa viru-	
	id.	lenta	78
at the same of			
E		H	
Epilepfia Puerorum	88	Hæmoptoë	95
•			Iœ-

INDEX.

Hæmorrhagia Na-	0.	
	Ophthalmia 53	
rium 93 Hæmorrhoidum Do-		
lor 87	P	
Fluxus immo-	Paralysis 103	
dicus 88	Paralysis 103 Peripneumonia no-	
Hydrops 74 Hypochondriaca af-	tha 27	
Hypochondriaca af-	Phthisis 104 & 117	
fectio 5	Pleuritis 25	
fectio Hysterica Passio ibid.	Pruritus ferinus 32	
	Punctura tendinis 97	
I	Podagra 108	
Icterus 70		
Icterus 70 Illiaca Paffio 64	R	
	Rabies canina 100	
L	Rachitis 90	
Lochiorum Fluxus	Rheumatismus 28	
immodicus 71	Remediorum formu-	
Suppressio 73	læ 1	
Lues venerea 82		
	S	
M	Scorbutus 106	
Mania communis 97		
Menfium fluxus im-	T	
modicus 66	Tenefmus 57	
Suppressio 95	Tuffis 104	
Mictus Sanguis à Re-	Tuffis Puerorum con-	
num calculo 55	vulfiva 92	
Morbilli 35		
	V	
N	Variolæ 38	
Nephriticus Paroxyf-	Ulcus Vesicæ 100	
mus 54	Vomitus fanguinis 95	
	Uteri procidentia 54	











