

Aphorismi, cum concordantia eorumdem, ac indice locupletissimo / [Hippocrates].

Contributors

Hippocrates

Publication/Creation

Louvain : A. Denique, [1730?]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/srgnvmub>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.

**wellcome
collection**

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

1939



28,889/A

v/2

A x o z

Hippocrates III

16/

Lewis
16/-
10/12/28

54930

M A G N I
HIPPOCRATIS
C O I
APHORISMI
C U M
CONCORDANTIA
E O R U M D E M
A C
INDICE
LOCUPLETISSIMO.



L O V A N I I .
Typis ÆGIDII DENIQUE

[C. 1750]
3
?

MA G M I
HARVARD
LIBRARY
OF THE
MUSEUM OF
COMPARATIVE ZOOLOGY
AND
ANATOMY
OF THE
MUSEUM OF
COMPARATIVE ZOOLOGY
AND
ANATOMY





A D

LECTOREM.

BENEVOLUM

Hippocratis opera, quidquid de iis infeliciori ævo fenerint Medici aliqui nimis theoretici, constat hodie à Clarissimis omnium gentium & Academicarum viris sic celebrari & coli, ut nullos de Arte Medica præstantiores salubrioresque libros existere credendum sit. Horum autem excellentia & dignitas quantum sinceros Medicinæ candidatos ad legendum & perscrutandum incitat & accendit, tantum iisdem molis, obscuritas & exemplarium penuria difficultatis adfert & mo-

A 2

lestiæ

AD LECTOREM

lestiæ. Quapropter ut Eximia
Medicinæ antistitis doctrina,
ex aliqua saltem parte, ab om-
nibus, qui eam tam avidè
cupiunt, commodè queat de-
guttari, visum fuit *Aphorismo-
rum* ipsius per novam hanc edi-
tionem copiam facere. Nimi-
rum volumen constituunt per-
exiguum & modico sumptu pa-
rabilie, sed in quo universæ dis-
ciplinæ & artis hippocraticæ me-
dullam expressam habeas. Nam
quid sunt hi *Aphorismi*? Nisi
sententiæ quædam graviores,
vel breves & selectæ regulæ,
quæ ab autore scientiâ jam &
ætate consummato, atque ope-
ra sua revidente, quasi quædam
Medicinæ oracula, vel ut alii
volunt, miracula editæ fuêre:
& in quibus idem scriptor, te-
ste Suidâ, se ipsum superasse
videtur.

Accipe nunc benevole Le-
ctor

AD LECTOREM

Et or quid in hac editione *Aphorismorum* præstitum sit.

1. Interpretes Hippocratis mirum quàm sæpe inter se differant diffideantque ; propterea fortassis quod quisque ad suam mentem & theoriam flectere autoris verba & detorquere voluerit. In hac verò versione, quantum per sermonis latini proprietatem licuit, verbum verbo fideliter redditum est.

2. Quoties occurrit vocabulum aliquod græcum, quod plures admittit interpretationes à sensu *Aphorismi* non abhorrentes, placuit easdem apponere, quo posset lector faciliùs per se ipsum de sententia Hippocratis judicare.

3. Ad tollendam obscuritatem, quæ ex hac interpretandi ratione accidere potuit, adhibetur non rarò suppletio alicujus vocalæ, quæ ut lectori non

AD LECTOREM

lateat, litteris *subcisivis*, picta est.

4. Quæ græca nomina apud Medicos latinè tractantes, usu recepta sunt, hîc etiam retinentur, etsi sæpiùs in gratiam tyronum Latina significatio in parenthesi adjiciatur.

5. Ad notata in super est Aphorismorum concordantia: hoc est, post quemlibet Aphorismum assignati sive citati sunt alii Aphorismi, qui superiorem vel aliquam ejus partem, elucident, confirment, vel quoquo modo attingant.

6. *Sectio* indicatur syllabâ *sect.* vel litterâ S. item *Aphorismus* syllabâ *Aph.* vel litterâ A.

7. Accedit index locupletissimus.

Vale Lector, & hisce utere: in id quod data sunt; in corporum salutem, & Dei gloriam.

HIP.



HIPPOCRATIS

APHORISMORUM

S E C T I O P R I M A.

I.

Vita brevis, Ars verò longa, tempus præceps, experimentum periculofum, judicium difficile. Oportet autem non solum se ipsum exhibere quæ oportet facientem, sed etiam ægrum, & præfentes, & externa.

2. In perturbationibus ventris & vomitibus spontè factis siquidem, qualia oportet purgari, purgentur, confert & facile ferunt: si verò non, contrà. Sic & vasorum depletio siquidem, qualem oportet fieri fiat, confert, & facile ferunt. si vero non, contrà. Respicere igitur oportet & regionem, & tempestatem, & aetatem, & morbos, in quibus oportet, aut non.

Sect. 1. Aph. 25. 17. Sect. 2. Aph. 14.

Sect. 4. Aph. 2. 21. Sect. 7. Aph. 23.

3. In exercitiis Gymnasticis utentibus
ad

ad summum bonæ corporis habitudines periculosa, si in extremo fuerint. Non enim possunt manere in eodem, neque quiescere: cum verò non quiescant, neque amplius possint ad melius progredi: superest ergò in pejus *labantur*. Horum igitur causâ bonum habitum solvere confert non tardè, ut rursus renutritionis, initium accipiat corpus. Neque confidentiæ *vasorum* ad extremum ducendæ, periculosum enim: sed qualis fuerit natura ejus, qui perferet, eousque ducendæ. Similiter evacuationes ad extremum ducentes periculosa. Et rursus renutritiones in extremo existentes periculosa.

Sect. 2. Aph. 22. 51.

4. Tenues & *planè* accuratæ diætæ (seu victus rationes) & in longis semper affectionibus, & in acutis, ubi non expedit, periculosa sunt. Et rursus diætæ ad extremum tenuitatis perductæ difficiles sunt. nam & repletiones ad extremum perductæ difficiles sunt.

Sect. 1. Aph. 3. 5.

5. In tenuibus diætis delinquant ægrotautes: ideò magis læduntur. Omne enim delictum, quodcumque fiat, multò majus fit in tenuibus, quàm in paulò plenioribus diætis. Quapropter etiam sanis periculosa sunt valde tenues, & constitutæ, ac exactæ diætæ; quia delicta gravius ferunt. Ob hoc igitur tenues, & accuratæ diætæ multò periculosiores paulò plenioribus.

Sect. 1. Aph. 4.

P R I M A 9

6. Ad extremos verò morbos, exactè
extremæ curationes optimæ sunt.

7. Ubi igitur peracutus est morbus, sta-
tim extremos labores habet, & extremè
tenuissimo victu uti necessarium est. Ubi
verò non, sed pleniore victu uti licet,
tantum a tenui recedendum, quantum
morbus extremis mitior fuerit.

Sect. 4. Aph. 10.

8. Cum in vigore fuerit morbus, tunc
& tenuissimo victu uti necesse est.

Sect. 2. Aph. 29.

9. Considerare autem oportet etiam
agrotantem, si sufficiat cum victus ratione
ad vigorem morbi, & utrum ille deficient
prius, & victu non sufficiet, aut morbus
prius deficient ac obtundetur.

10. Quibus igitur statim vigor est, statim
tenuiter alendi, quibus vero vigor serius,
in illo (vigore scilicet) & antè illum pau-
lulum auferendum est. Antè verò (vigo-
rem scilicet) uberius alendum, ut suffi-
ciat ager.

11. In paroxysmis (seu exacerbationi-
bus) cibum subtrahere oportet; apponere
enim noxium est. Et quacumque per pe-
riodos (seu circuitus) exacerbantur. In
exacerbationibus abstinere oportet.

Sect. 1. Aph. 19.

12. Ex.

12 Exacerbationes autem & constitutiones indicabunt morbi, & anni temporum & periodorum ad invicem *collata* incrementa, sive quotidie, sive alterno die, sive etiam longiore fiant tempore. Cæterum quæ *mox* apparent *eadem* indicantur, veluti in pleuriticis sputum, si statim appareat incipiente *morbo* breviter: si verò serius appareat producit. Et urina, & excrementa & sudores, cum apparent, vel judicantur faciles, vel difficiles, vel breves, vel longos morbos fore indicant.

Sect. 4. Aph. 71. Sect. 5. Aph. 155

13 Senes facillimè jejunium ferunt; secundò ætate consistentes. Maximè adulescentes. Omnium verò maximè pueri: his verò ipsis, si contingat hos aliis accriores esse.

14 Quæ crescunt plurimum habent calidi innati: plurimo igitur egent alimentis, si minus, corpus consumitur. Senilibus autem modicus est calor, quapropter periculis fomitibus indigent, sub multis enim extinguuntur. Propter hoc & febres senilibus non similiter acuta: frigidum enim est corpus.

15 Ventres hyeme & vere naturâ calidissimi sunt, & somni longissimi. In his autem temporibus & alimenta plura dantur sunt. Etenim innatum calorem habent, & alimento ergò copiosiore indigent. Senes autem sunt ætates & Athletæ.

Sect. 1. Aph. 18.

16 Hum

16 Humidi victus omnibus febricitantibus conferunt, maxime verò pueris, & aliis tali victu uti solitis.

17 Et quibus semel aut bis, & plura vel pauciora, & per partes *auferr* conducatur *videndum est*. Concedendum est autem aliquid & consuetudini, & tempestati, & regioni, & ætati.

Seçt. 2. Aph. 49. 50.

18 Æstate & Autumno cibos difficillimè ferunt: hyeme facillimè, deindè vere.

Seçt. 1. Aph. 15.

19 His qui per circuitus exacerbantur, nihil dare oportet, nequè cogere, sed auferre de appositionibus antè crises (sivè judicationes).

Seçt. 1. Aph. 11.

20 Quæ judicantur & judicata sunt integre, neque movere nequè innovare licet, sivè purgantibus, sivè aliis irritamentis, sed sinere.

Seçt. 2. Aph. 29.

21 Quæ ducere oportet, quò maxime vergunt, eò ducenda sunt, per convenientia loca.

Seçt. 7. Aph. 61.

22 Concocta medicari & movere oportet, non cruda, neque in principiis, nisi turgent. Plurima verò non turgent.

Seçt.

*Sect. 2. Aph. 29. Sect. 4. Aph. 10. 133.
Sect. 5. Aph. 29. Sect. 7. Aph. 688.*

23 Quæ prodeunt non copiâ sunt æstima-
manda, sed si prodeant, qualia oportet, &
facile ferat. Et ubi oportet usque ad animi
deliquium ducere, & hoc faciendum
est, si sufficiat æger.

Sect. 1. Aph. 2. 25.

24 In acutis affectionibus rarò, & in
principiis purgantibus utendum, atque
hoc diligenti cum præmeditatione faciend-
um est.

*Sect. 1. A. 22. S. 2. A. 29. S. 4. A.
1. 10. S. 5. A. 29.*

25 Si, qualia purgari oportet, purgenn-
tur, confert & facile ferunt. Contraria
verò difficulter.

S. 1. A. 2. 23. S. 4. A. 3.



16 Humidi victus omnibus febricitantibus conferunt, maximè verò pueris, & aliis tali victu uti solitis.

17 Et quibus semel aut bis, & plura vel pauciora, & per partes offerri conducat videndum est. Concedendum est autem aliquid & consuetudini, & tempestati, & regioni, & ætati.

Sect. 2. Aph. 49. 50.

18 Æstate & Autumno cibos difficillimè ferunt: hyeme facillimè, deinde vere.

Sect. 1. Aph. 15.

19 His qui per circuitus exacerbantur, nihil dare oportet, nequè cogere, sed auferre de appositionibus antè crises (sivè iudicationes).

Sect. 1. Aph. 11.

20 Quæ judicantur & judicata sunt integre, neque movere neque innovare licet, sivè purgantibus, sivè aliis irritamentis, sed sinere.

Sect. 2. Aph. 29.

21 Quæ ducere oportet, quò maximè vergunt, eo ducenda sunt, per convenientia loca.

S. 7. A. 61.

22 Concocta medicari & movere oportet, non cruda, neque in principiis, nisi turgeant. Plurima verò non turgent.

B

S.

S. 1. A. 24. S. 2. A. 10. 29. S. 4.
A. 10. 13. S. 5. A. 29.

23 Quæ prodeunt non copiâ sunt æstimanda, sed si prodeant, qualia oportet, & facile ferat. Et ubi oportet usque ad animi deliquium ducere, & hoc faciendum est, si sufficiat æger.

S. 1. A. 2. 25. S. 4. A. 3.

24. In acutis affectionibus rarò, & in principiis purgantibus utendum, atque hoc diligenti cum præmeditatione faciendum est.

S. 1. A. 22. S. 2. A. 29. S. 4. A. 1.
10. S. 5. A. 29.

25 Si, qualia purgari oportet, purgentur, confert & facile ferunt. Contraria verò difficulter.

S. 1. A. 2. 23. S. 4. A. 3.



HIPPOCRATIS
APHORISMORUM

SECTIO SECUNDA

I.

In quo morbo somnus laborem facit, lethale : si vero somnus proſit, non eſt lethale. S. 4. A. 67.

2 Ubi ſomnus delirium ſedat, bonum.

3 Somnus, vigilia, utraque ultra modum ſientia, malum.

S. 7. A. 71.

4. Non ſatietas, non fames, neque aliud quidquam bonum eſt, quod plus eſt quam pro natura.

S. 2. A. 22. 51.

5 Laſſitudines ſpontaneæ morbos denuntiant.

S. 4. A. 31.

6. Quicumque aliquã corporis parte dolentes, maximã ex parte dolorem non ſentiunt, his mens ægrotat.

7 Multo tempore extenuata corpora lentè reficere oportet : brevi verò, breviter.

S. 2. A. 11. 18.

8 Si à morbo cibum quis capiens non roboretur, significat corpus pleniore alimento uti : si verò cibum non capienti hoc contingat, scire oportet, quod evacuatione opus habeat.

S. 2. A. 22. 31. 32. S. 4. A. 41.

45.

9 Impura corpora, quò magis nutries, eò magis lædes.

S. 7. A. 65. 67.

10 Corpora, ubi quis purgare voluerit, oportet facile fluentia facere.

S. 1. A. 22. 24. S. 4. A. 13. S. 7. A. 70.

11 Facilius est repleri potu, quàm cibo

12 Quæ relinquuntur in morbis post crisin (seu judicationem) recidivas facere solent.

S. 2. A. 8. 27. S. 4. A. 36.

13 Quibus crisis fit his nox gravis est antè exacerbationem : subsequens verò tolerabilior plerumque.

14 In alvi fluxibus mutationes excrementorum juvant, nisi in prava mutantur.

S. 1. A. 2. S. 4. A. 21 23.

15 Ubi fauces ægrotant : aut tubercula in corpore nascuntur, excretiones inspicere oportet : si enim biliosæ fuerint, corpus

S E C U N D A 51

pus unà ægrotat : si verò similes sanis
fiant, tutum est corpus nutrire.

S. 3. A. 26.

16 Ubi fames, non oportet laborare.

S. 2. A. 48. S. 7. A. 59.

17 Ubi cibus præter naturam copio-
sior ingressus fuerit, istud morbum facit.
Ostendit autem sanatio.

S. 2. A. 22.

18. Confertim & celeriter nutrientium
celereres etiam excretiones fiunt.

S. 2. A. 7. 11.

19 Acutorum morborum non omninò
tuta sunt prædictiones neque mortis, ne-
que sanitatis.

20 Quibus juvenibus existentibus ven-
tres humidi sunt, iis senescentibus sic-
cantur. Quibus verò juvenibus, existen-
tibus ventres sicci sunt; iis senescentibus
humectantur.

S. 2. A. 53.

21. Famem vini potio solvit.

22 A repletionem quicumque fiunt mor-
bi, evacuatio sanat. Et quicumque ab eva-
cuatione, repletio : & aliorum contrarie-
tas sanat.

S. 2. A. 8. 17. 48.

23 Acuti morbi in quatuordecim diebus judicantur.

S. 2. A. 19.

24 Septimorum quartus est index. Alterius hebdomadæ octavus est principium. Considerandus verò est undecimus : is enim quartus est alterius hebdomadæ. Considerandus rursus est decimus septimus, hic enim est quartus quidem à decimo quarto, septimus verò ab undecimo.

S. 4. A. 36. 61. 71.

25 Quartanæ æstivæ plerumque fiunt breves : autumnales, verò longæ, & maxime quæ propè hyemem incidunt.

S. 3. A. 9. 21. 22.

26 Febrem spasmo (sive convulsioni) supervenire melius est, quàm convulsionem feбри.

S. 4. A. 57. 66. 67. 68. S. 5. A. 5. 70. S. 7. A. 13.

27 His, quæ non secundùm rationem levant, non oportet credere, neque timere valdè quæ præter rationem prava fiunt. Multa enim horum sunt inconstantia, nec admodum permanere, neque durare solent.

S. 2. A. 28. 31.

28 Febricitantium non omninò leviter permanere, & nihil remittere corpus, aut etiam magis quàm pro ratione colligere.

que fieri malum est. Illud enim morbi longitudinem indicat, hoc verò infirmitatem.

S. 2. A. 31.

29 Incipientibus morbis, si quid movendum videatur, move, vigentibus verò quiescere melius est.

S. 1. A. 8. 20. 22. 24.

30 Circa principia & fines *morborum* omnia debiliora sunt. Circa vigores verò vehementiora.

S. 2. A. 29.

31 Ab ægritudine benè comedenti, nihil proficere corpus, malum est.

S. 2. A. 8. 28.

32 Ut plurimum omnes malè habentes circa principia cibum quidem benè capientes, & nihil proficientes, ad finem rursùm cibos non appetunt. Circa initia verò cibum omnino non appetentes, postea verò cibum benè capientes, melius liberantur.

S. 2. A. 8. 31. S. 7. A. 6.

33 In omni morbo mente valere, & benè se habere ad ea quæ offeruntur, bonum est: contrarium verò, malum.

34 In morbis minùs periclitantur, quorum naturæ, & ætati, & habitui, & tempori magis similis fuerit morbus, quàm in quibus horum nulli fuerit similis.

S. 8. A. 1. 8.

35. In

35 In omnibus morbis, *partes* ad umbilicum & inum ventrem crassitiem habere, melius est. Valdè autem tenues & eliquatas *habere*, malum. Periculosum verò illud est, etiam ad infernas purgationes.

36 Sana habentes corpora, pharmacis purgati exsolvuntur cito, & qui pravo utuntur cibo.

S. 2. A. 37. S. 4. A. 16.

37 Qui benè habent corpore purgati sunt difficiles.

S. 2. A. 36. S. 4. A. 16.

38 Pauló deterior & potus & cibus, jucundior autem eligendus potius, quàm meliores quidem, sed ingratiore.

39 Senes ut plurimum quidem juvenibus ægrotant minus. Quicumque verò morbi fiunt ipsis diuturni, plerumque commoriuntur.

S. 2. A. 40. S. 3. A. 31. S. 5.
A. 7.

40. Raucedines & gravedines *in* valdè senibus non coquantur.

41 Qui animo linquantur sæpe & fortiter absquè manifesta causa ex improviso moriuntur.

42 Solvere Apoplexiam vehementem
qui-

quidem impossibile : debilem verò non facile.

43 Ex strangulatis & resolutis, nondum autem mortuis, non se recolligunt, quibus spuma circa os fuerit.

S. 2. A. 41.

44 Crassi admodum secundum naturam magis subito moriuntur, quam graciles. S. 5. A. 46.

45 Epilepticis pueris liberationem mutationes maximè ætatis, & regionum, & vitarum faciunt.

S. 3. A. 28. S. 5. A. 7.

46 Duobus doloribus simul fientibus, non in eodem loco, vehementior alterum obscurat.

47 Circa generationem puris dolores & febres magis accidunt, quàm ipso facto.

48 In omni motu corporis, quando incipit dolere, interquiescere statim lassitudinem curat.

S. 2. A. 22.

49 Consueti solitos labores ferre, etiam si fuerint debiles aut senes, insuetis, licet robustis ac juvenibus, facilius ferunt.

50 A multo tempore consueta, etiam si deteriora fuerint, insuetis minùs molestare

re solent. Oportet igitur etiam ad insolita mutare.

S. 1. A. 17.

51. Multum & derepentè evacuare, aut replere, aut calefacere, aut frigefacere, aut aliter quocumque modo corpus movere, periculosum est. Etenim omne multum naturæ contrarium est, quod verò paulatim fit tutum est: tum aliàs, tum si quis ex altero ad alterum transeat.

S. 2. A. 4. S. 4. A. 14. S. 5. A. 16. 17.

18. 20. 22. 23. 24. S. 6. A. 27. 39.

52. Omnia secundum rationem facientibus & non secundum rationem fientibus, non transeundum ad aliud, manente, quod visum fuit ab initio.

S. 3. A. 1. S. 4. A. 9.

53. Quicumque ventres humidos habent, dum quidem juvenes sunt, melius degunt (sive liberantur) his, qui siccos habent. Ad senectutem verò pejus degunt (sive liberantur): siccantur enim ut plurimum senescentibus.

S. 2. A. 20.

54. Procero corpore juventutem quidem degere liberale est, nec deformis: insenescere verò incommodum, & parvis deterius.

HIPPOCRATIS

APHORISMORUM

SECTIO TERTIA

I.

Mutationes temporum anni maximè pariunt morbos : & in ipsis temporibus magnæ mutationes aut frigoris , aut caloris , & alia juxta rationem eodem modo.

Secl. 2. Aph. 51.

2 Naturarum aliæ quidem ad æstatem , aliæ verò ad hyemem benè aut malè sunt constitutæ.

3 Morborum alii ad alia tempora benè aut malè sunt constituti : & ætates quædam ad tempora , & regiones , & diætas.

Secl. 8. Aph. 1.

4 In temporibus quando eadem die , modo calor , modo frigus fit , autumnales morbos expectare oportet.

S. 3. A. 22.

5 Austri aurum hebetantes , caliginosi , caput gravantes , torpidi , dissolventes. Cum hic prævaluerit , talia in morbis patiuntur. Si verò Aquilo fuerit , tusses , fauces asperæ , alvi duræ , dysuria (sive urinæ difficultates ,) horrores , dolores costarum , pectorum. Cum hic dominatus fuerit , talia in morbis expectare oportet.

S. 3. A. 17.

6 Cum æstas fit veri similis, sudores in febribus multos expectare oportet.

7 In siccitatibus febres acutæ fiunt. Eæ siquidem annus pro majori parte talis fuerit, qualem fecit constitutionem, ut plurimum etiam tales morbos expectare oportet. *Sect. 3. Aph. 19.*

8 In constantibus temporibus si tempestive tempeſtiva reddantur, constantes & faciles iudicatu morbi fiunt: in inconstantibus autem, inconstantes & difficiles iudicatu.

9 In autumno morbi acutissimi & omnino mortiferi: ver autem saluberrimum & minimè lethale. *S. 3. A. 22.*

10 Autumnus tabidis malus.

11 De temporibus: siquidem hyems sicca & Aquilonia fuerit, ver autem pluviosum & australe, necesse est æstate febres acutas, ophtalmias & dyenterias fieri, maxime autem mulieribus, & viris naturâ humidioribus.

12 Si vero hyems australis, & pluviosa & clemens fiat, ver autem siccum & aquilonare, mulieres quidem, quibus partus in ver incidit ex omni occasione abortiunt: quæ vero pepererint, infirmos & morbosos pariunt pueros; ita ut vel statim pereant, aut tennes & morboſi vivant. Cæteris vero mortalibus dyenteria & ophtalmia sicca fiunt. Senioribus vero cathari brevi interficientes.

Sect. 5. Aph. 45.

13 Si verò æstas sicca & aquilonaris fiat, autumnus autem pluviosus & australis, cephalalgia (sive dolores capitis) ad hyemem fiunt, & tusses, & raucedines, & coryzæ seu gravedines : quibusdam verò etiam tabes.

14 Si verò aquilonaris & sine pluviis autumnus fuerit, iis quidem qui natura sunt humidi & mulieribus commodius erit : reliquis verò erunt ophtalmiæ siccæ, febres acutæ, & coryzæ diuturnæ : quibusdam verò etiam melancoliæ.

15 Ex anni verò constitutionibus, in uniuersum quidem siccitates pluviosis sunt salubriores & minus lethales.

16 Morbi autem, in pluviosis quidem plerumque fiunt, & febres longæ, & alvi fluxus, & putredines, & epileptici, & apoplectici, & anginæ. In siccitatibus verò, tabidi, ophtalmiæ, Arthritides, stranguriæ, & dysentericiæ.

17 Quotidianæ autem constitutiones, Aquilonares quidem corpora compingunt & tonica, & facile mobilia, & benè colorata, & meliùs audientia faciunt, & ventres exsiccant, & oculos mordent, & dolorem circa thoracem, si quis præexistat, majorem faciunt. Austrinæ verò corpora exsoluunt, & humectant, & auditus graves, & capitis gravitates faciunt, & vertigines in oculis, & corporibus diffi-

C cilem

cilem motum , & ventres humectant.

S. 3. A. 4. S. 4. A. 33. S. 5. A. 16.

18 Secundum tempora autem, Vere quidem & primam Æstate pueri, & his ætate proximi optime degunt & maxime sani sunt. Æstate & Autumno ad aliquam quidem partem, senes. Reliquo autem Autumno & hyeme qui medii sunt ætate.

19 Morbi autem omnes quidem in omnibus temporibus fiunt: nonnulli tamen magis in quibusdam eorum fiunt & exacerbantur.

S. 3. A. 7. 17.

20 Nam vere quidem mania, & melancholia, & epilepsia, & sanguinis effusiones, & angina, & coryza, & raucedines, & tusses, & lepra, & impetigines, & vitiliginis, & pustula ulcerosa plurima, & tubercula, & articulorum dolores.

S. 6. A. 55.

21 Æstate vero & horum nonnulli, & febres continua, & ardentes, & tertiana plurima, & quartana, & vomitus, & alvi fluxus, & ophthalmia, & aurium dolores, & oris exulcerationes, & pudendorum putredines, & sudamina.

22 Autumno vero & ex æstivis multi, & febres quartana, & erratica, & lienes, & hydropes, & phthises, & stranguria, &

& lienteria, & dysenteria, & ischiades,
& angina, & asthmata, iliaca passio, &
epilepsia, & mania, & melancholia.

S. 3. A. 4. 10. S. 6. A. 55.

23 Hyeme verò pleuritides, peripneu-
monia, lethargi, coryza, raucedines, tuf-
ses, dolores pectorum, pleura, & lum-
borum, cephalalgia, vertigines, apoplexia.

S. 5. A. 24.

24 In ætatibus autem talia contingunt:
parvis quidem ac recens natis pueris aph-
ta, vomitus, tusses, vigilia, tumores um-
bilici inflammationes, aurium humidi-
tates.

25 Ad dentitionem verò accedentibus
gingivarum pruritus, febres, spasmi, diar-
rha, & maximè ubi caninos dentes pro-
ducunt, tum crassissimis pueris, tum his
qui duros ventres habent.

26 Senioribus autem factis, tonsilla *in-*
flammata, vertebræ in occipitio introrsum
luxationes, asthmata, lithiasis (seu calcu-
lorum generationes,) lumbrici rotundi,
ascarides, verrucæ pensilles satyriasmis,
stranguria, struma, & alia tubercula,
maximè verò prædicta.

27 Adhuc verò senioribus, & ad pu-
bertatem accedentibus, & multa ex illis,
& febres diurnæ magis, & ex naribus
sanguinis fluxiones.

S. 3. A. 26.

28 Plurimæ quidem affectiones pueris judicantur, aliæ in quadraginta diebus : aliæ in septem mensibus : aliæ in septem annis : quædam verò jam ad pubertatem, accedentibus. Quæ verò pueris permanferint, neque solutæ fuerint circa pubertatem, aut foeminis circa menftruorum eruptiones, perfeverare (feu diuturnæ fieri) folent.

S. 2. A. 45. S. 5. A. 7.

29 Juvenibus autem fanguinis fputiones, phthifes, febres acutæ, & alii morbi, maximè verò ante dicti.

S. 5. A. 9. S. 8. A. 7.

30 Ultrà hanc ætatem verò *progressis* afthmata, pleuritides, peripneumoniæ, lethargi, phrenitides, febres ardentes, diarrhææ diuturnæ, cholera, dyfenteria, lienteria, hæmorrhoides.

31 Senibus autem dyfpnææ, (feu fpirandi difficultates) catharri tufficulofi, ftranguriæ, dyfuriæ, articulorum dolores, nephritides, vertigines, apoplexiæ, cachexiæ, pruritus totius corporis, vigilia, ventris, & oculorum & narium humiditates, visûs hebetudines, glaucedines, auditûs gravitates.

S. 1. A. 14. S. 2. A. 39. 40. 53. S. 6. A. 6. 57.

Q U A R T A
H I P P O C R A T I S
A P H O R I S M O R U M
S E C T I O Q U A R T A

I.

Utero gerentes sunt medicandæ (seu purgandæ) si *materia* turgeat, quadrimenses & usque ad septimum mensem. Hæ verò minùs. Juniores autem & seniores foetus vereri oportet.

Secl. 1. Aph. 22. 24. Secl. 5. Aph. 29. 31. 36.

2 In purgationibus talia è corpore sunt ducenda, qualia etiam spontè prodeuntia utilia sunt: contrariò autem modò prodeuntia sistenda.

Secl. 1. Aph. 2. 25.

3 Siquidem qualia purgari oportet purgentur, confert, & facile ferunt: contraria verò difficulter.

Secl. 1. Aph. 2. 23. 25.

4 Purgandum, æstate quidem, magis superiores ventres: hyeme verò inferiores.

Secl. 4. Aph. 6.

5 Sub cane & antè canem difficiles sunt purgationes.

Secl. 2. Aph. 37.

6, Gm

6 Graciles, & facilè vomentes, fursùm medicandi (seu purgandi,) vitantes hyemem. *Seçt. 4. Aph. 4.*

7 Difficulter autem vomentes, & mediocriter carnosi, deorsùm, vitantes æstatem. *Seçt. 4. Aph. 4.*

8 Phthifici autem, vitantes purgationes superiores. *Seçt. 5. Aph. 12. 14.*

9 Melancolicos autem largiùs deorsùm purgabis. Eâdem ratione, contraria adhibens. *Seçt. 2. Aph. 52. Seçt. 6. Aph. 23. Seçt. 7. Aph. 40.*

10 Purgandum in valdè acutis, si turgeat, eâdem die: morari enim in talibus, malum est. *S. 1. A. 22. S. 2. A. 29. S. 4. A. 1. 8.*

11 Quibus tormina, & circa umbilicum dolores, & lumborum dolor, qui nequè purgante, nequè aliter solvitur, in hydropem siccum firmatur. *Seçt. 4. Aph. 20. 73.*

12 Quibus alvi sunt lientericæ, illos hyeme fursùm purgare, malum est.

13 Ad helleboros, qui non facilè fursùm purgantur, *iis* antè potionem corpora humectanda copiosiore alimento, & quiete.

Seçt. 1. A. 22, S. 2. A. 9. S. 7. A. 70.

14 Ubi biberit quis helleborum, ad motiones quidem corporum, magis ducit. Ad somnos verò, & quietem, minus. Declarat autem & navigatio, quod motus turbat corpora.

Sect. 4. Aph. 13. 15.

15 Ubi vis magis ducere helleborum, moveto corpus. Quando verò cessare somnum facito, & non moveto.

16 Helleborus periculosus est sanas carnes habentibus: spasmum enim inducit.

S. 2. A. 36. 37. S. 5. A. 1. 4. S. 7. A. 25.

17 Non febricitanti, cibi fastidium, & cardiogmos (sive oris ventriculi morsus,) & tenebricosa vertigo, & os amarescens, fursum purgante opus esse indicat.

18 Super septum transversum dolores, qui purgatione opus habent, fursum purgante opus esse significant. Quæ verò infra, deorsum.

19 Qui in purgantium potionibus non fitiunt, dum purgantur, non cessant antequàm fitierint.

20 Non febricitantibus si fiat tormen, & genuum gravitas, & lumborum dolor, deorsum purgante opus habere significat.

21 Dejectiones *alvi* nigrae, qualis sanguis niger, suâ sponte prodeuntes, & cum
fe-

febre, & sine febre, pessimæ sunt. Et quanto colores dejectionum plures fuerint peiores, eò deterius: cum purgante verò melius. Et quanto colores plures fuerint, non mali.

Secl. 4. Aph. 23.

22 Morbis quibuscumque incipientibus, si bilis atra vel fursùm, vel deorsùm prodierit lethale.

23 Quibuscumque, ex morbis acutis aut ex diuturnis, aut ex vulneribus, aut aliter quocumque modo extenuatis, bilis atra, vel velut sanguis niger prodierit, postridiè moriuntur.

Secl. 4. Aph. 21.

24 Dysenteria si ab atra bile incoeperit lethale.

Secl. 5. Aph. 32. 33. Secl. 7. Aph. 23.

25 Sanguis fursùm *emissus*, qualiscumque sit, malum. Deorsùm verò bonum, niger subtus secedens.

Secl. 7. Aph. 37.

26 Si à dysenteria detento veluti *caerunculae* secesserint, lethale est.

Secl. 4. Aph. 76.

27 Quibus in febribus sanguinis copia undecumque eruperit, in refectionibus his alvi humectantur.

Q U A R T A 31

28 Quibus biliosæ sunt egestiones (seu dejectiones) surditate superveniente cessant. Et quibus surditas; biliosis supervenientibus, cessat.

Sect. 4. Aph. 60.

29 Quibus per febres sextâ die rigores fiunt, difficulter judicantur.

S. 4. A. 58. 63.

30 Quibus paroxysmi fiunt, quâcumque horâ dimiserit febris, postridiè eâdem horâ si corripuerit, difficulter judicantur.

31 Lassatis per febres ad articulos, & circa maxillas maximè abscessus fiunt.

Sect. 4. Aph. 74.

32 Quibus verò ex morbo resurgentibus aliquid dolet, ibi apostases (sive abscessus) fiunt.

S. 4. A. 45.

33 Sed hæc, si quid doluerit ante morbum, ibi se figit morbus.

34 Si à febre detento, œdemate (seu tumore) non existente in faucibus, suffocatio ex improvise superveniat, lethale.

Sect. 4. Aph. 35. S. 7. A. 58.

35 Si à febre detento, collum repente inversum fuerit, & vix deglutire possit, tumore non existente, lethale.

Sect. 4. Aph. 34. S. 7. A. 58.

36 Sudores febricitantibus si incoeperint, boni.

boni sunt tertiâ die, & quintâ, & septimâ, & nonâ, & undecimâ, & decimâ quartâ, & decimâ septimâ, & vigesimâ primâ, & vigesimâ septimâ, trigesimâ primâ, & trigesimâ quartâ. Hi enim sudores morbos judicant, qui verò itâ non sunt, laborem significant, & morbi longitudinem, & recidivas.

S. 2. A. 24. S. 4. A. 61. 64. S. 8. A. 44.

37 Frigidi sudores cum acutâ quidem febre fientes, mortem: cum mitiore vero, morbi longitudinem significat.

Secl. 4. Aph. 42. 56.

38 Et ubi in corpore sudor est, illius morbum esse significat.

39 Et ubi in corpore est calor aut frigus, ibi morbus.

40 Et ubi in toto corpore mutationes, & si corpus perfrigeretur, aut rursus calefiat, aut calor alius ex alio fiat, longitudinem morbi significat.

Secl. 7. Aph. 60.

41 Sudor multus ex somno sine causa manifesta factus, corpus uberiore alimento uti significat: si verò cibum non assumenti hoc fiat, significat quod evacuatione indigeat.

Secl. 2. Aph. 8. Secl. 7. Aph. 61.

42 Sudor multus frigidus, aut calidus, semper

semper fluens. Frigidus quidem majorem, calidus verò minorem morbum significat.

Sect. 7. Aph. 61.

43 Febres, quæcumque non intermittentes tertiâ die vehementiores fiunt, magis periculosa: quo quo modo autem intermittant, quod sine periculo sint, significat.

S. 4. A. 38. S. 7. A. 62. S. 8. A. 37.

44 Quibus febres longæ, hisce tubercula ad articulos, aut dolores fiunt.

Sect. 7. Aph. 63. 64.

45 Quibus tubercula ad articulos, aut dolores ex febribus longis fiunt, hi plurimis utuntur cibis.

Sect. 4. Aph. 32. Sect. 7. Aph. 64.

46 Si rigor incidat febri non intermittenti, debili jam existente agro, lethale.

Sect. 4. Aph. 58. Sect. 6. Aph. 26.

47 Excreationes in febribus non intermittentibus livida, & cruenta & graveolentes, & biliosa, omnes malæ: At probe secedentes, bonæ. Et eadem ratio est quoad alvi egestionem & quoad urinas. Si verò nihil ex conducentibus excernatur per hæc loca, malum.

Sect. 1. Aph. 25. Sect. 7. Aph. 69.

48 In febribus non intermittentibus, si externa quidem frigida sint, interna verò urantur, & sitim habeant, lethale.

Sect. 7. Aph. 1. 26. 72.

49 In febre non intermittente, si labium, aut palpebra, aut oculus, aut nausus pervertatur (seu distorqueatur,) si non videat, si non audiat, corpore jam debillitate existente; quidquid horum fiat in prope pinquo mors est.

Sect. 7. Aph. 73.

50 Ubi in febre non intermittente difficultas (sive difficultas spirandi) fit, & delirium, lethale.

Sect. 4. Aph. 68.

51 In febribus abscessus, qui non solvuntur (vel qui non solvunt,) ad primas judicationes, longitudinem morbi significant.

52 Quicumque in febribus, aut aliis infirmitatibus, ex proposito, (sive ob causam manifestam) lacrymantur, nihil inconueniens. Qui vero non ex proposito, inconuenientius.

Sect. 8. Aph. 2.

53 Quibus circa dentes in febribus viscosa adherent, his febres fiunt vehementiores.

54 Quibus diu tusses siccae, parum irritantes in febribus ardentibus, non admodum siticulosi sunt.

55 In bubonibus febres, omnes malae praeter ephemeram.

56 Febricitanti sudor superveniens te-
bre non remittente, malum : prolongatur
enim morbus, & copiosiore humidita-
tem significat. S. 4. A. 42.

57 A spasmō, aut tetano vexato febris
superveniens solvit morbum.

Sect. 2. Aph. 26. S. 5. A. 5. 70.

58 A febre ardente detento rigore su-
perveniente, solutio fit.

Sect. 4. Aph. 63. Sect. 6. Aph. 26.

59 Tertianā exquisita in septem periodis
(sive circuitibus) ad summum judicatur.

60 Quibus in febribus aures obsurdue-
rint, *vis* sanguis è naribus effluens, aut
alvus exturbata, morbum solvit.

Sect. 4. Aph. 28.

61 Febricitanti nisi in diebus imparibus
dimiserit febris, reverti solet.

62 Quibus in febribus icterus superve-
nit ante septimum diem, malum est, nisi
confluxus humorum per alvum fiant.

Sect. 4. Aph. 64.

63 Quibus in febribus quotidie rigores
fiunt, quotidie febres solvuntur.

S. 4. A. 29. 46. 58.

64 Quibus in febribus septimâ, aut no-
na, aut undecimâ, aut quartâ decimâ icte-
rus supervenit, bonum est, nisi dextrum
hypocondrium durum sit, alioquin non
bonum.

Sect. 4. Aph. 62. Sect. 6. Aph. 42.

65 In febribus circa ventrem æstus ve-
hemens, & cardiogmos (sive oris ventri-
culi dolor,) malum.

66 In febribus acutis, cum spasmi & circa viscera dolores vehementes, malum.

Sect. 2. Aph. 26.

67 In febribus ex somnis pavores, aut spasmi, malum.

Sect. 2. Aph. 1.

68 In febribus spiritum offendens, malum. Spasimum enim significat.

Sect. 4. Aph. 50.

69 Quibus urinæ crassæ grumosæ, paucæ, non sine febræ, copia ex his succedens tenuis juvat. Tales autem maximè prodeunt, quibus ab initio, aut brevi hypostasim (sive sedimentum) habent.

70 Quibus autem in febribus urinæ conturbatæ, quales jumentorum, his cephalalgia aut adsunt aut aderunt.

71 Quibus *morbi septimâ die* judicantur, iis nubeculam rubram *urina die quartâ* continet, & alia secundum rationem.

72 Quibus urinæ pellucidæ, albæ, malæ: maximè verò in phreniticis apparent.

73 Quibus hypochondria elevata murmurant, lumborum dolore superveniente, iis alvi humectantur, nisi flatus eruperint, aut urinæ copia prodierit. In febribus autem hæc.

74. Quibus spes est ad articulos fore apostasim (seu abscessum,) eos ab apostasi liberat *urina multa, & crassa, & alba facta, qualis in febribus laboriosis (sive cum lass-*

lassitudine,) quartâ die quibusdam fieri incipit. Si verò etiam ex naribus sanguis eruperit, brevi admodum solvit.

75 Si quis sanguinem aut pus mingat, renum aut vesicæ exulcerationem significat.

Sect. 4. Aph. 81.

76 Quibus in urina crassa existente, carunculæ parvæ veluti pili simul exeunt, his de renibus excernuntur.

Sect. 4. Aph. 26.

77 Quibus in urina crassa existente, furfuracea simul minguntur, his vesica scabie laborat.

78. Qui spontè sanguinem meiunt, iis à renibus venæ ruptionem significat.

Sect. 4. Aph. 75.

79 Quibus in urina arenosa subsident, illis vesica calculo laborat.

80 Si quis sanguinem mingat, & grumos, & straguriam habeat, & dolor incidat ad hypogastrium & perinæum, partes circa vesicam laborant.

Sect. 7. Aph. 39.

81 Si quis sanguinem & pus mingat, & squammas, & odor gravis sit, vesicæ exulcerationem significat.

Sect. 4. Aph. 75.

82 Quibus in urethera tuberculum nascitur, his, suppurato eo & perrupto, solutio.

Sect. 7. Aph. 57.

83 Mictio noctu multa facta, paucam dejectionem significat.

HIPPOCRATIS

APHORISMORUM

S E C T I O Q U I N T A.

I.

1 Spasmus ex elleboro, lethale.

S. 4. A. 16. S. 5. A. 4. S. 7. A. 25.

2. Vulneri convulsio superveniens, lethale.

3 Sanguine multo effuso, spasmus, aut singultus superveniens, malum.

S. 5. A. 56. Sect. 7. Aph. 9.

4 Hypercatharsi (sive immodicæ purgationi) spasmus, aut singultus superveniens, malum.

Sect. 5. Aph. 1. S. 7. A. 25. 41.

5 Si quis ebrius derepente mutus fiat, convulsus moritur, nisi febris corripuerit, aut ubi ad horam, quâ crapulæ solvuntur, pervenit, locutus fuerit.

Sect. 7. Aph. 7.

6 Qui à tetano corripuntur, in quatuor diebus pereunt, si verò hos effugerint, sani fiunt.

7. Quibus

7 Quibus epilepsia antè pubertatem sunt, mutationem habent. Quibus verò fiunt viginti quinque annis *natis*, hi plerumque commoriuntur.

Sect. 2. Aph. 45.

8 Qui pleuritici facti, non repurgantur superne in quatuordecim diebus, his in empyema convertitur.

Sect. 5. Aph. 15.

9 Phthisis maximè fit ætatibus, ab anno decimo octavo usque ab trigesimum quintum.

Sect. 3. Aph. 29. S. 8. A. 7.

10 Quibus anginam effugientibus ad pulmonem vertitur, in septem diebus moriuntur. Si verò hos effugerint, empyici fiunt.

Sect. 6. Aph. 25. 37. S. 7. A. 49.

11 A phthisi infestatis, si sputum quod extussunt, graveoleat prunis superfusum, & capilli de capite defluant, lethale

Sect. 5. Aph. 12. 14. S. 7. A. 16.

12 Quibus phthificis capilli de capite defluunt, hi diarrhæâ superveniente, moriuntur.

Sect. 5. Aph. 14. Sect. 6. Aph. 16.

Sect. 7. Aph. 78.

13 Qui sanguinem spumantem expuunt, his ex pulmone rejectio fit.

14 A phthisi detento diarrhæa superveniens, lethale.

S. 5. A. 12. S. 6. A. 16. S. 7. A. 78.

15 Qui ex pleuritide empyici fiunt, si intra quadraginta dies, ex quo ruptio fuerit facta, repurgentur supernè, liberantur: si verò minus, ad phthisim transeunt.

Sect. 5. Aph. 8.

16 Calidum, eo frequenter utentibus, has adfert noxas: carnis effœminationem, nervorum impotentiam, mentis stuporem, hæmorrhagias, leipotymias. Hæc, quibus mors.

17 Frigidum autem spasmos, tetanos, nigrores, & rigores febriles.

Sect. 5. Aph. 18. 20. 24.

18 Frigidum inimicum ossibus, dentibus, nervis, cerebro, spinali medullæ: calidum verò utile.

19 Quæ perfrigerata sunt excalefacere oportet, præterquam quæ sanguinem effundunt, aut effusura sunt.

Sect. 5. Aph. 23.

20 Ulceribus quidem frigidum mordax cutem obdurat, dolorem non suppurantem facit, nigrores, rigores febriles, spasmos, & tetanos.

21 Est verò, ubi in tetano sine ulcere, juveni

juveni benè carnosò astate mediâ frigidæ
multa affusio revocationem caloris facit:
Calor verò hæc solvit.

Sect. 5. Aph. 25. S. 7. A. 42.

22 Calidum suppuratorium, non in omni ulcere, maximum signum ad securitatem. Cutem emollit, extenuat, dolores sedat, rigores, spasmos, tetanos mitigat: in capite verò gravitatem solvit: plurimum autem confert ossium fracturis, maxime verò denudatis, ex his quidem maxime qui in capite ulcera habent, & quæ à frigore moriuntur aut ulcerantur, & herpetibus exedentibus, sedi, pudendo, & utero, vesicæ. His calidum quidem amicum & decretorium, frigidum inimicum, & interimens.

23 In his autem frigido uti oportet, unde sanguis erumpit aut erupturus est: non super ipsa, sed circa ipsa undè influit: & quæcumque inflammationes, aut flammei ardores ad rubrum & sanguineum colorem vergentes novo sanguine, super ipsos: nam inveteratos nigrefacit: erysipelas etiam non exulceratum juvat, quoniam exulceratum lædit.

Sect. 5. Aph. 19.

24 Frigida, veluti nix, glacies, pectori inimica sunt, tusses movent, hæmorrhagias, & catharros inducunt.

Sect. 3. Aph. 23.

25 In articulis autem œdemata (sive tumores,) & dolores absque ulcere, & podagricos, & spasmos, horum plurima, frigida multa affusa & levat, & extenuat, & dolorem solvit. Torpor enim modicus doloris solvendi vim habet.

Sect. 5. Aph. 21.

26 Aqua, quæ citò calefit, & citò refrigeratur, levissima.

27 Quibus autem bibendi appetentiæ noctu, iis valdè sitientibus, si obdormierint, bonum est.

28 Muliebria ducit aroratum suffitus. Sæpius verò etiam ad alia utilis esset, nisi capitis gravitates induceret.

29 Prægnantes medicandæ (seu purgandæ) si *materia* turgeat, quadrimestres & usque ad septimum mensem: hæ verò minus. Juniores autem & seniores foetus vereri oportet.

Sect. 1. A. 22. 24. S. 4. A. 1. Sect. 5. Aph. 31. 36.

30 Mulierem in utero gerentem ab aliquo acuto morbo corripì, lethale.

Sect. 5. Aph. 43.

31. Mulier in utero gerens sectâ venâ abortit: & magis si foetus grandior fuerit.

32 Mulieri sanguinem evomentì, menstruis erumpentibus, solutio fit. 33

33 Mulieri catameniis (seu menstruis) deficientibus, sanguinem è naribus fluere, bonum.

34 Mulieri in utero gerenti si alvus multum fluxerit, periculum, ne abortiat.

Sect. 7. Aph. 72.

35 Mulieri ab hysterica passione vexata, aut difficulter parienti, sternutatio superveniens, bonum.

Sect. 5. Aph. 49.

36 Mulieri menses decolores, neque secundum eadem (*tempus & modum* :) semper prodeuntes, Catharsi (sive purgatione) opus esse significat.

37 Mulieri in utero gerenti si mammae derepentè graciles fiant, abortit.

Sect. 5. Aph. 38. 53.

38 Mulieri in utero gerenti, si altera mamma gracilis fiat gemellos gestanti, alterutrum abortit. Et siquidem dextra gracilis fiat, marem: si verò sinistra foeminam,

Sect. 5. Aph. 37. 53.

39 Si mulier, quæ nec prægnans, nec puerpera est, lac habet, ei menstrua defecerunt.

40 Mulieribus, quibus in mammas sanguis convertitur, maniam (seu furorem) significat.

41 Mu

41 Mulierem si velis cognoscere ante conceperit, ubi dormitura est, aquam mulsam bibendam dato. Et siquidem tormentum habeat circa ventrem, concepit: si vero non, non concepit.

Secl. 5. Aph. 59. 61.

42 Mulier pragnans si quidem marem gestat bene colorata est, si vero foeminam decolor.

43 Si mulieri pragnanti erysipelas in utero fiat, lethale.

Secl. 5. Aph. 30.

44 Quaecumque prater naturam tenuia existentes in utero gerunt, abortiunt priusquam (sive donec) crassescant.

Secl. 5. Aph. 55.

45 Quaecumque vero mediocriter corpora habentes abortiunt bimestres & trimestres sine causa manifesta, his cotylidones (sive acetabula uteri) mucosae plenae sunt, & non possunt praepondere continere foetum, sed abrumpuntur.

46 Quaecumque prater naturam crassa existentes non concipiunt in utero, haec omentum os uteri comprimit, & priusquam extenuentur, non concipiunt.

Secl. 5. Aph. 62.

47 Si uterus ischio (sive coxae) incurvatus, suppuratus fuerit, necesse est medicamenta in linteis carpto applicari.

48 Fœtus, mares quidem in dextris, fœ-
mina verò in sinistris magis.

Sect. 5. Aph. 38.

49 Ut secundinæ excidant, sternutato-
riò inditò, nares & os apprehendere oportet.

Sect. 5. Aph. 35.

50 Mulieri menstrua si velis cohibere,
cucurbitam quam maximam ad mammas
appone.

51 Quæcumque in utero gerunt, harum
os uteri clausum est.

S. 5. A. 54.

52 Si mulieri in utero gerenti multum
lactis ex mammas flexerit, infirmum fœ-
tum significat. Si verò solidæ fuerint sa-
niores fœtum significat.

S. 5. A. 37. 38.

53 Quæ perdituræ sunt fœtus, his mam-
mæ graciles fiunt. Si verò rursus duræ fiant,
dolor erit aut in mammas aut in coxis, aut
in oculis, in genibus, & non perdunt.

Sect. 5. Aph. 37. 38.

54 Quibus os uteri durum est, his ne-
cesse est, os uteri clausum esse.

S. 5. A. 51.

55 Quæcumque in utero gerentes à fe-
bribus corripuntur, & fortiter attenuan-
tur absque manifesta causa (sive occasio-
ne,) pariunt difficulter & periculosè, aut
abortientes periclitantur.

S. 5. A. 30. 44.

56 Si fluxui muliebri spasmus & lypothimia superveniat, malum.

Sect. 5. Aph. 3. S. 7. A. 9.

57 Menstruis fientibus copiosioribus morbi contingunt: & non fientibus, ab utero fiunt morbi.

58 Recto intestino inflammato, & utero inflammato, & renibus suppuratis stranguria supervenit. Hepati autem inflammato singultus supervenit.

Sect. 7. Aph. 17.

59 Mulier si in ventre non concipiat, velis autem scire, an conceptura sit, vestimentis circumtectam subter suffito: & si quidem procedere tibi videatur odor per corpus ad nares, & ad os, scito hanc non propter seipsam infœcundam esse.

Sect. 5. Aph. 41. 61.

60 Si mulieri utero gerenti purgationes prodeant, impossibile est fœtum esse sanum.

61 Si mulieri purgationes non prodeant neque horrore, neque febre superveniente, cibi autem fastidia ipsi accidant, existimato hanc in utero gerere.

Sect. 5. Aph. 41. 59.

62 Quæcumque frigidas ac densas matrices (sive uteros) habent, non concipiunt. Et quæcumque præhumidas habent matrices, non concipiunt: extinguuntur enim

enim ipsis genitura. Et quæcumque siccas magis & adurentes: inopiâ enim alimenti corrumpitur semen. Quæcumque verò ex utrisque temperiem habent moderatam, ex ipsa prolifera fiunt.

63 Similiter autem etiam in masculis, aut enim propter corporis raritatem spiritus extra fertur ut non emittat semen. Aut propter densitatem humidum non procedit foras. Aut propter frigiditatem non incalescit, ut ad hunc locum non congregetur. Aut propter caliditatem hoc idem fit.

64 Lac dare capite dolentibus malum. Malum verò etiam febricitantibus, & quibus hypochondria elevata sunt murmurantia, & fiticulosi. Malum autem & quibus dejectiones biliosæ, & qui in acutis sunt febribus. Et quibus multi sanguinis facta est egestio. Convenit verò phthificis non admodum valde febricitantibus lac dare, & in febribus longis, & languidis nullo ex prædictis signis, præsentibus: & præter rationem extenuatis.

65 Quibus œdemata (sive tumores) in ulceribus apparent, non valde convelluntur neque insaniunt. His autem disparentibus derepentè, quibus in postica quidem parte fuerint spasmi, tetani: quibus verò in antica mania, aut dolores lateris acuti, aut empyema, aut dysenteria, si rubicundi fuerint tumores.

66 Si vulneribus fortibus & pravis existentibus, œdemata non apparent, ingens malum.

67 Tumores laxi (seu molles,) boni, crudi verò mali.

68 Posticâ capitis parte dolenti, recta in fronte vena secta juvat.

69 Rigores incipiunt mulieribus quidem ex lumbis magis, & per dorsum ad caput. Viris autem magis posticâ quàm anticâ parte corporis, veluti ex cubitis ac femoribus. Sed & cutis *viris* rara est. Significat autem id pilus.

70 A quartanis correpti, à spasmo non admodum corripuntur. Si verò corripantur prius, & postea quartana supervenerit, liberantur.

S. 2. A. 26. S. 4. A. 57. S. 5. A. 5.

71 Quibus cutis obtenditur arida & dura, sine sudore moriuntur. Quibus verò laxa ac rara cum sudore moriuntur.

72 Ictericici non admodum flatulenti sunt.

HIPPOCRATIS

APHORISMORUM

SECTIO SEXTA.

I.

IN diuturnis lienteriiis (five intestino-
rum laxitatibus) ructus acidus non
factus Prius, signum bonum.

2 Quibus nares humidiores naturâ, &
genitura humidior, imperfectius valent:
quibus verò contraria, perfectius.

3 In longis dysenteriis appetitus pro-
stratus, malum. Et cum febre pejus.

4 Circum glabra ulcera, maligna.

5 Dolores & in pleuris (seu lateribus,)
& in pectoribus, & in aliis partibus si
multum differant, considerandum.

6 Nephritici & qui circa vesicam *exi-
stunt* dolores, difficulter sanantur in seni-
bus.

Sect. 3. Aph. 31.

7 Dolores circa ventrem fientes subli-
mes quidem leviores: non sublimes verò
vehementiores.

8 Hydropicis facta in corpore ulcera, non facile sanantur.

9 Lata exanthemata non admodum pruriginosa.

10 Caput laboranti, & circumcircà dolenti, pus, vel aqua, vel sanguis effluens: per nares, aut per os, aut per aures, solvit morbum.

11 Melancholicis & nephriticis hæmorrhoides supervenientes, bonum.

S. 6. A. 21.

12 Hæmorrhoidas sananti diuturnas, nisi una servata fuerit, periculum est ne hydrops superveniat, aut phthisis.

13 A singultu detento sternutationes supervenientes solvunt singultum.

14 Ab hydrope detento, secundum venas in ventrem aquâ fluente, solutio.

Sect. 7. A. 29.

15 A diarrhæa detento diuturnâ spontè vomitus superveniens, solvit diarrhæam.

S. 1. A. 2.

16 A pleuritide aut à peripneumonia detento, diarrhæa superveniens malum.

S. 5. A. 14.

17 Ophthalmiâ laborantem à diarrhæa corripit, bonum.

18 Cui perfecta est vesica, aut cerebrum, aut cor, aut diaphragma, aut aliquod ex intestinis tenuibus, aut ventriculus, aut hepar, lethale. S. 6. A. 24.

19 Ubi dissectum fuerit os, aut cartilago, aut nervus, aut genæ pars tenuis, aut præputium, neque augetur, neque coalescit. S. 7. A. 28.

20 Si in ventrem sanguis effusus fuerit præter naturam, necesse est suppurari. S. 7. A. 38.

21 Maniacis, si varices, aut hæmorrhoides supervenerint, mania solutio. S. 6. A. 11.

22 Quæ ruptiones (sive dolores) ex dorso ad cubitos descendunt, venæ sectio solvit.

23 Si metus & tristitia multo tempore perseverent, melancholicum hoc ipsum.

24 Si ex intestinis tenuibus aliquod dissectum fuerit, non coalescit. S. 6. A. 18.

25. Erysipelas foris quidem intrò verti, non bonum: intus verò foras, bonum. S. 6. A. 37. S. 7. A. 49.

26 Quibus in febre ardente tremores sunt, mentis emotio (seu delirium) solvit.

27 Qui empyici, aut hydrofici uruntur, aut secantur, pure aut aquâ effluente: acervatim, omninò moriuntur.

S. 7. A. 44.

28 Eunuchi non laborant podagrâ, neque calvi fiunt.

29 Mulier non laborat podagrâ, nisi menses ipsi defecerint.

30 Puer non laborat podagrâ ante veneris ulum.

31 Dolores oculorum meri potio, aut balneum, aut fomentum, aut venæ sectio, aut purgatio, solvit.

S. 7. A. 46.

32 Balbi à diarrhæa maximè corripuntur longâ.

33 Acidum ructantes non admodum pleuritici fiunt.

34 Qui calvi sunt, his varices magni non fiunt. Quibus verò calvis existentibus varices superveniunt, hi rursus capillati fiunt.

35 Hydroficis tussis superveniens malum.

S. 7. A. 47.

36 Dysuriam venæ sectio solvit: secandæ verò sunt internæ.

S. 7. A. 48.

37 Ab angina detento tumorem fieri in collo, bonum: foras enim vertitur morbus. S. 5. A. 10. S. 6. A. 25. S. 7. A. 49.

38 Quibus occulti cancri fiunt, non curare melius: curati enim pereunt citò: non curati verò longiore tempore perdurant.

39 Spasmus fit vel à repletione vel evacuatione: ità verò & singultus.

S. 1. A. 3. S. 5. A. 4. S. 7. A. 25. 41.

40 Quibus ad hypochondrium dolores fiunt sine phlegmone (sive inflammatione) his febris superveniens, solvit dolorem.

S. 7. A. 52.

41 Quibus suppuratum quid existens in corpore, nullum sui signum prodit, his propter crassitudinem puris, aut loci, non se prodit.

42 In ictericis hepar durum fieri, malum.

S. 4. A. 64.

43 Qui lienosi à dysenteria corripuntur, his longà superveniente dysenteriâ, hydrops supervenit, aut lienteria, & intereunt.

S. 6. A. 48. S. 7. A. 76.

44 Quibus ex stranguria iliaca passio supervenit, in septem diebus intereunt, nisi febre superveniente, abundè urina fluxerit,

45 Ul-

45 Ulcera quæcumque annua fiunt, aut longiore tempore durant, necesse est ossa abscedere, & cicatrices cavas fieri.

46 Quicumque gibbosi ex asthma, aut tussi fiunt, antè pubertatem intereunt.

47 Quibus phlebotomia, aut purgatio confert, his convenit, vere venam lecare, aut purgare.

Sect. 7. Aph. 53.

48 Lienosis dysenteria superveniens, bonum.

S. 6. A. 43. S. 7. A. 76.

49 Qui podagrici morbi fiunt, hi sedata inflammatione, in quadraginta diebus decedunt.

50 Quibus cerebrum dissectum fuerit, his necesse est febrem, & bilis vomitum supervenire.

Sect. 6. Aph. 18.

51 Quibus sanis dolores fiunt derepente in capite & protinus muti fiunt, ac sterunt, intereunt in septem diebus, nisi febris eos apprehenderit.

52 Considerare verò etiam oportet oculorum subtus apparentia in somnis: si enim albi quid, palpebris commissis, subtus appareat, cui *id* non ex diarrhæa est, aut ex portione purgante, pravum signum & valde lethale.

53 Deliria, cum risu quidem fientia, tutiora: cum studio verò, periculosiora.

54 In acutis affectionibus, cum febre luctuosæ respirationes, malæ.

S. 4. A. 50. 68.

55 Podagrici dolores vere, & autumnino moventur plerumque.

S. 3. A. 20.

56 Morbis melancholicis ad hæc periculosi sunt *humorum* decubitus, vel apoplexiam corporis, vel spasmum, vel maniam, vel cæcitatem significant.

57 Apoplectici autem maximè fiunt, ætate ab anno quadragesimo usque ad sexagesimum.

S. 3. A. 31.

58 Si Epiploon (sive omentum) exciderit, necesse est putrescere.

59 Quibus à diuturno ischiade vexatis ischion excidit & rursus incidit, his mucus innascitur.

S. 6. A. 60.

60 Quibus à diuturno ischiade vexatis ischion excidit, his tabescit crus, & claudicant, nisi ulti fuerint.

Sect. 6. Aph. 59.

HIPPOCRATIS

APHORISMORUM

S E C T I O S E P T I M A.

I.

IN acutis morbis frigus extremarum partium, malum.

S. 4. A. 48, S. 7. A. 26. 72,

2. Ex osse agrotante caro livida, malum.

3 A vomitu singultus & oculi rubri, malum.

4 A sudore horror, non bonum.

5 A maniâ dysenteria, aut hydrops, aut exstasis (sive mentis alienatio,) bonum.

S. 6. A. 21.

6 A morbo diuturno appetitus prostratus, & meracæ *alvi* egestiones, malum.

7 A multo potu rigor & delirium, malum.

S. 5. A. 5.

8 Ex tuberculi intus ruptione exsolutio, vomitus, & lypothimia fit.

S. 6. A. 27.

9 A sanguinis fluxu delirium aut etiam convulsio, malum.

S. 5. A. 3.

10 Ab ileo vomitus, aut singultus, aut spasmus, aut delirium, malum.

11 A pleuritide peripneumonia, malum.

12 A peripneumonia phrenitis, malum.

13 Ab ardoribus vehementibus spasmus, aut tetanus, malum.

14 A plaga in capite stupor, aut delirium, malum.

S. 5. A. 2. S. 7. A. 24. 58.

15 A sanguinis sputo puris sputum, malum.

S. 4. A. 25. S. 7. A. 78.

16 A puris sputo phthisis & fluxus, malum. Postquam vero sputum retentum fuerit, moriuntur.

S. 5. A. 12. 14.

17 A phlegmone hepatis singultus, malum.

S. 5. A. 58.

18 A vigilia spasmus, aut delirium, malum.

19 Ab

19 Ab ossis denudatione erysipelas, malum.

20 Ab erysipelate putredo, aut suppuratio, malum.

21 A forti pulsu in ulceribus hæmorrhagia, malum.

22 A dolore diuturno partium circa ventrem suppuratio, malum.

23 A meraca alvi egestione dysenteria, malum.

Sect. 7. Aph. 75.

24 Ab ossis dissectione delirium, si in vacuum penetraverit.

S. 7. A. 14.

25 A purgantis potione convulsio, lethale.

S. 4. A. 16. S. 5. A. 1. 4. S. 7. A. 41.

26 A dolore vehementi partium circa ventrem, extremarum frigus, malum.

S. 4. A. 48. S. 7. A. 1. 72.

27 Mulieri in utero gerenti tenelmissupervenient, abortire facit.

S. 5. A. 34.

28 Quodcumque os, vel cartilago, vel nervus dissectus fuerit in corpore, neque

auger

augetur, neque coalescit.

S. 6. A. 19.

29 Si à leucophlegmatia detento diarrhæa superveniat vehemens, solvit morbum.

S. 6. A. 14.

30 Quibus spumosa egestiones in diarrhæis, his à capite phlegma defluit.

31 Quibus febricitantibus in urinis hypostases (sive subsidentia) crassiori farinae similes fiunt, longam infirmitatem significant.

32 Quibus autem biliosa hypostases, ab initio verò tenues acutum morbum significant.

33 Quibus autem divulsa fiunt urinæ, iis vehemens est in corpore turbatio.

34 Quibus verò in urinis superstant bullæ, nephritidem significant, & longam fore invaletudinem.

35 Quibus autem pingue est & confertum quod superstat, his nephritidem, & acutas affectiones significat.

36 Quibus verò nephriticis existentibus prædicta signa accidunt, doloresque circa musculos spinales fiunt, siquidem ad loca exteriora fiunt, apostema expecta futu-

rum extrorsum. Si verò dolores fiant magis ad interna loca, etiam apostema expecta magis introrsum futurum.

37 Qui sanguinem vomunt, siquidem sine febre, salutare: si verò cum febre malum. Curandum autem refrigerantibus ex stipticis (sive adstringentibus.)

S. 4. A. 25.

38 Catharri in ventrem superiorem suppurantur in viginti diebus.

S. 4. A. 8.

39 Si quis sanguinem & grumos mingat, & stranguriam habeat, & dolor incidat ad perinaeum, & hypogastrium, & pectinem, partes circa vesicam laborare significat.

S. 4. A. 80.

40 Si lingua derepentè impotens fiat, aut aliquid corporis apoplecticum, melancholicum hoc ipsum fit.

S. 6. A. 23.

41 Si seniorum hypercatharsi (seu nimiae purgationi,) singultus superveniat, non bonum.

S. 4. A. 16. S. 5. A. 1. 4. S. 7. A. 25.

42 Si febris non à bile detineat, aquam multam & calidam in caput affusam, solutio fit febris.

43 Mulier ambidextra non fit.

44. Qui empyici uruntur, aut secantur, siquidem purum effluat pus & album, evadunt. Si verò subcruentum, & cœnosum, & foetidum, pereunt.

S. 6. A. 27. S. 7. A. 45.

45. Qui *ad* hepar suppuratum uruntur, aut secantur, si quidem pus effluat purum & album, evadunt: in tunica enim pus ipsis est. Si verò effluat velut amurca, pereunt.

S. 7. A. 44.

46. In doloribus oculorum postquam merum bibendum dederis, & multâ calidâ laveris, venam secato.

S. 6. A. 31.

47. Hydropicum si tussis habeat, desperatus est.

S. 6. A. 35.

48. Stranguriam & dysuriam vini potus & phlebotomia solvit. Secandæ verò internæ venæ.

S. 6. A. 36.

49. Ab angina detento tumor & rubor in pectore superveniens, bonum: foras enim vertitur morbus.

S. 5. A. 10. S. 6. A. 25. 37.

50. Quibus spacelatum fuerit cerebrum in tribus diebus pereunt: si verò hos effugerint, sani fiunt.

51 Sternutatio fit ex capite, percalefacto cerebro aut perhumectato, *quod est in capite vacuo*. Erumpit enim aër qui intus est foras. Strepit autem, quia per angustum ipsi est transitus.

52 Quibus hepar circumcircà dolet, his febris superveniens solvit dolorem.
S. 6. A. 40.

53 Quibus conducit sanguinem de venis auferre, his oportet vere venam secare.
S. 6. A. 47.

54 Quibus inter diaphragma & ventrem phlegma concluditur, & dolorem exhibet non habens in alterutrum ventrem transitum, his per venas in vesicam versò phlegmate, solutio fit morbi.

55 Quibus hepar aquâ repletum ad epiploon eruperit, his venter aquâ impletur, & moriuntur.

56 Anxietatem, oscitationem, horrorem, vinum parvari aquâ potum, solvit.

57 Quibus in urethra tuberculum fit, his eo suppurato & perrupto, solvitur dolor.
S. 4. A. 82.

58 Quibus cerebrum concussum fuerit ab aliqua causa, necesse est eos statim mutos fieri.

Si à febre detento collum invertatur
&

& deglutire non possit, tumore non existente in collo, lethale.

S. 4. A. 35.

59 Corporibus humidis carnes habentibus oportet famem inducere. Fames enim siccat corpora.

60 Ubi in toto corpore mutationes, & corpus perfrigeratur, & rursus calescit, aut color alius ex alio mutatur, longitudinem morbi significat.

S. 4. A. 40.

61 Sudor multus, calidus aut frigidus, semper fluens significat habere redundantiam humidi *corpus*. Educere igitur oportet robusto quidem supernè, debili verò infernè.

S. 4. A. 41. 42.

62 Febres non intermittentes si per tertiam vehementiores fiant, periculosa. Quocumque autem modo intermittant significant sine periculo esse.

S. 4. A. 43.

63 Quibus febres longa, his aut tubercula, aut ad articulos dolores fiunt.

S. 4. A. 44.

64 Quibus tubercula diuturna, aut ad articulos dolores ex febribus fiunt, hi cibis copiosioribus utuntur.

S. 4. A. 45.

65 Si quis febricitanti cibum det, convalescenti quidem robur, ægrotanti verò morbus fit.

S. I. A. 10. II. 19. S. 2. A. 9. S. 7.
A. 67.

66 Per vesicam prodeuntia inspicere oportet, an sint qualia sanis prodeunt. Quæ igitur minime his similia, ea morbosiora, similia verò sanis, minime morbosa.

67 Et quibus egestiones si permiseris stare & non moveris, subsident veluti ramenta & si pauca fuerint, parvus fit morbus: si verò multa, magnus. His confert alvum infernè purgari. Si autem non purgatâ alvo dederis forbitiones, quanto plures dederis, eò magis lædes.

S. 2. A. 9. S. 7. A. 65.

68 Quæ cruda deorsum secedunt, ab atra bile sunt: si plura, major, si pauciora, minor est morbus.

69 Screationes in febribus non intermittentibus lividæ, & cruentæ, biliosæ, & foetidæ, omnes malæ. Secedentes verò benè, bonæ: per alvum etiam & vesicam, & ubicumque quid secedens restiterit non purgatum, malum.

S. I. A. 25. S. 4. A. 47.

70 Corpora oportet, ubi quis purgare vult, benè fluentia facere. Et si quidem sursum

S E C T I O

65

sùm velit benè fluentia facere, alvum sistere. Si verò deorsùm, humectare.

S. 1. A. 22. 24. S. 2. A. 9. S. 4. A. 13.

71 Somnus, vigilia utraque ultrá modum fientia, morbus.

S. 2. A. 3.

72 In non intermittentibus febribus, si externa quidem frigida sint, interna verò urantur, & sitim habeant, lethale.

S. 4. A. 48.

73 In febre non intermittente, si labrum, aut nasus, aut supercilium distorqueatur, si non videat, si non audiat jam debilis existens: quidquid horum fiat, lethale.

S. 4. A. 49.

74 Leucophlegmatix hydrops supervenit.

75 A diarrhæa dysenteria.

S. 7. A. 23.

76 A dysenteria lienteria.

S. 6. A. 43.

77 A sphacelo abscessus ossis.

78 A sanguinis vomitu phthisis & puris purgatio sursum.

S. 7. A. 15. 16.

A

A phthisi rheuma ex capite. A rheumate diarrhæa. A diarrhæa inhibitiõ purgationis fursum. Ab inhibitione, mors.

A sanguinis sputo, puris sputum & fluxio. Postquam autem sputum inhibetur moriuntur.

79 Qualia etiam in his, quæ per Vesicam, & in his quæ per alvum fiunt ejectionibus. Et in his quæ per carnes & sicubi aliâ naturæ viâ corpus exeat: si parum parvus morbus fit, si multum, magnus: si admodum multum, lethale istud est.

S. 7. A. 66.



HIPPOCRATIS

APHORISMI

INTERJECTI.

QUIBUSDAM

SECTIO OCTAVA.

I.

Quicumque supra quadraginta annos phrenitici fiunt, non admodum convalescunt: minus enim periclitantur illi, quorum naturæ & ætati morbus familiaris fuerit.

Sect. 2. Aph. 34.

2 Quibuscumque in ægritudinibus oculi in morbis ex proposito lacrymantur, bonum. Quibus vero sine proposito malum.

S. 4. A. 52.

3 Quibus in febribus quartanis existentibus sanguis è naribus fluxerit, malum.

4 Sudores in judicatoriis diebus fientes vehementes & veloces, periculosi sunt: qui expelluntur ex fronte sicut guttæ & aquæ scaturientes, & frigidi valde & multi, necesse est enim talem sudorem prodire cum violentia, & laboris excessu, ac expressione diuturna.

S. 4. A. 42.

5 Ex chronico morbo alvi fluxus, malum.

S. 7. A. 6.

9 Quæ

6 Quæcumque pharmaca (seu medica-
menta) non sanant, ea ferrum sanat. Quæ
ferrum non sanat, ignis sanat : quæ verò
ignis non sanat, ea oportet judicare ina-
curabilia.

7 Phthifes maximè fiunt à decimo octa-
vo anno usque ad trigesimum quintum.

S. 3. A. 29. S. 5. A. 9.

8 Quæ verò secundum naturam facta aut
phthifim, omnia quidem vehementia, quæ-
dam verò etiam lethalia. Secundum autem
erat, si quidem eo tempore ægrotet, quæ
tempus ipsum opem fert morbo: quemad-
modum febrī ardenti æstas, hydropicæ
hyems. Obtinet enim victoriam id quod
est à natura: at spleni plus adfert timoris.

S. 2. A. 34. S. 3. A. 3. S. 8. A. 11.

9 Lingua nigra & cruenta, cum quidam
horum signorum abest, non valdè malum,
significat enim morbum minorem.

10 Hæc igitur in febribus acutis obser-
vare oportet, ut noscamus quandò quis
moriturus sit, & quandò evasurus.

11 Testis dexter frigidus & convulsus,
mortiferum est.

12 Ungues nigri, & digiti manuum, ac
pedum frigidi, contracti, vel remissi,
proximam mortem significant.

S. 7. A. 1.

13 Labra livida aut etiam resoluta & inverfa, & frigida, mortifera.

S. 4. A. 49. S. 7. A. 73.

14 Aures frigidae, pellucidae, contractae, mortiferae sunt.

15 Et scotomiâ (five tenebricosâ vertigine) laborans, & lucem averfans, & fomno ac ardore multo detentus, desperatus est.

16 Et paulatim rabie agitari incipiens, & non agnoscens, & non audiens, neque intelligens, morti proximus est.

S. 4. A. 49. S. 7. A. 73.

17 Moriturus hæc *signa* fiunt manifestiora, & ventres attolluntur, & inflantur.

18 Terminus verò mortis *est* cum animæ calor ascendit supra umbilicum ad locum diaphragmatis superiorem, & exuritur humor omnis. Cum autem pulmo & cor calore in mortiferis locis coacervato humorem amiserint, exhalat confertim caloris spiritus, cujus ope compactum erat totum cum toto. Prætereâ partim per carnes, partim per capitis spiracula, undè vivere dicimus, relinquens anima corporis domicilium, & frigidum, & mortale simulacrum, simul cum bile, & sanguine, & phlegmate, & carne deditione reddit.

F I N I S.

I N

INDEX

Littera f. significat Sectionem,
a. verò Aphorismum.

A

ABORTUS causæ. Sect. 3. Aphor. 122.
f. 5. a. 31. 34. 44. 45. f. 7. a. 27. Signa
f. 5. a. 53.

ABSCCESSUS ubi fiant. f. 4. a. 31. 32.
51. Renum quotuplices. f. 7. a. 36. Post
ossis sphacelismum. f. 7. a. 77. In arti-
culis quomodo solvantur. f. 4. a. 74.

ACUTI MORBI signa. f. 7. a. 32. 35.
Natura. f. 1. a. 7. f. 2. a. 23. Prognosti-
ca. f. 2. a. 14. 19. 23.

ÆSTUS circa ventriculum malus. f. 4.
a. 65.

ÆTAS consideranda. f. 1. a. 2. Ætatis
temperies. f. 1. a. 14. 15. Prognosis.
f. 2. a. 34. 45. f. 8. a. 1. Diata. f. 1.
a. 13. 14. 15. 16.

INFANTUM morbi. f. 3. a. 24. Dentitio
f. 3. a. 25. Eorum iudicium. f. 3. a. 28.

PUERORUM morbi. f. 3. a. 26. Prognosis
eorum. f. 3. a. 28. Puerorum fames
f. 1. a. 13. 14. Diata. f. 1. a. 16.

PUBESCENTIUM morbi. f. 3. a. 27.
Prognosis. f. 3. a. 28. Iis autumnus &
æstas profunt. f. 3. a. 8.

JUVENUM morbi. f. 3. a. 29. Prognosis
f. 2. a. 39. 45. f. 5. a. 7. Fames. f. 1.
a. 13. Alvus. f. 2. a. 20. 53.

VIRORUM morbi. f. 3. a. 30. f. 6. a. 57.
Valeo

I N D E X.

- Valetudo in autumnno & hyeme. f. 3. a. 18. Fames. f. 1. a. 13.
- SENUM** morbi. f. 1. a. 14. f. 3. a. 31. Prognosis. f. 2. a. 39. 40. 49. f. 3. a. 12. f. 6. a. 6. f. 8. a. 1. Valetudo in æstate. f. 3. a. 18. Temperies. f. 1. a. 14. Fames. f. 1. a. 13. 14. Alvus. f. 2. a. 20. 53.
- ALVI PROFLUVIUM** in tabe. f. 5. a. 14. In gravida. f. 5. a. 34. In pleuritide. f. 6. a. 16. In ophtalmia. f. 6. a. 17. In balbis. f. 6. a. 32. In morbo diuturno. f. 8. a. 5. In surditate. f. 4. a. 28. Quomodo solvatur. f. 6. a. 15.
- AMBI DEXTERITAS.** f. 7. a. 43.
- ANIMI DEFECTIO** quid significet. f. 2. a. 41. In venæsectione necessaria. f. 1. a. 23. Post profluvia menstrua. f. 5. a. 56. A calido. f. 5. a. 16. A tuberculi ruptione. f. 7. a. 8.
- ANNI TEMPUS** seu constitutio consideranda. f. 1. a. 2. Prognosis indè deducenda. f. 2. a. 34. f. 8. a. 8. Alii aliis temporibus fiunt morbi. f. 3. a. 19. Mutationes temporum quos pariant morbos. f. 3. a. 1. 4. 8. Constitutio sicca salubrior. f. 3. a. 15. Quos morbos inducat. f. 3. a. 16. 17. Humidior minus salubris. f. 3. a. 15. Quos morbos pariat. f. 3. a. 16.
- IN VERE** saluberrimum. f. 3. a. 9. Pueri benè valent. f. 3. a. 18. Qualis diæta. f. 1. a. 15. 18. Confert medicari. f. 6. a. 47. f. 7. a. 53. Morbi grassantes. f. 3. a. 20. f. 6. a. 55. Prognosis constitutionis vernæ. f. 3. a. 11. 12.

I N D E X

- IN ÆSTATE** senum valetudo firma. f. 3. a. 18. Qualis diæta. f. 1. a. 18. Qualis purgatio instituenda. f. 4. a. 4. 6. Qui morbi. f. 3. a. 6. 21. Constitutionis æstivæ prognosis. f. 3. a. 2. 6. 13. 14. f. 8. a. 8.
- IN AUTUMNO** morbi. f. 2. a. 25. f. 3. a. 4. 22. f. 6. a. 55. Mediâ ætate consistentes benè valent. f. 3. a. 18. Diæta. f. 1. a. 18. Morbi perniciosi. f. 3. a. 9. Tabidis malus. f. 3. a. 10. Constitutionis prognosis. f. 3. a. 4. 13. 14.
- IN HYEME** mediæ ætatis benè valent. f. 3. a. 18. Diæta. f. 1. a. 15. 18. Purgare. f. 4. a. 4. 7. 9. 12. Prognosis. f. 3. a. 2. 11. 12. f. 8. a. 8.
- ANGINA** familiarior quò tempore? f. 3. a. 16. 20. 22. Prognosis ejus bona. f. 6. a. 37. Mala. f. 5. a. 10.
- APOPLEXIA** familiarior quò tempore? f. 3. a. 16. 23. Quâ ætate? f. 3. a. 31. f. 6. a. 57. Cura ejus difficilis. f. 2. a. 42.
- AQUA** quantum bona? f. 5. a. 26. Calidæ effectus. f. 7. a. 42.
- AROMATUM** suffitus quid faciat? f. 5. a. 28.
- ARS** medendi longa. f. 1. a. 1. Ad eam requisita. f. 1. a. 1.
- ARTICULORUM** dolores quibus accidunt? f. 4. a. 44. f. 7. a. 63. Quibus non? f. 6. a. 28. 29. 30. Quomodo solvantur. f. 5. a. 25. Tubercula. f. 7. a. 63.
- ASTHMATIS** tempus. f. 3. a. 22. Prognosis. f. 6. a. 46. Cui ætati familiarior? f. 3. a. 26. 30.

I N D E X

AUDITUS quid in febribus indicet. f. 4.
 a. 49. f. 7. a. 73. Obtusus quo tempore?
 f. 3. a. 5. 17. Acutus quo tempore? f.
 3. a. 17. Qua ætate. f. 3. a. 31.
AURES frigida mortifera. f. 8. a. 14.
AUSTER quos morbos creet. f. 3. a. 5.
AUTUMNUS *vide* anni tempora.

B

BALBI cui obnoxii f. 6. a. 32.
BALNEA id doloribus oculorum. f. 6. a.
 31. f. 7. a. 46.
BILIS atra lethalis. f. 4 a. 22 23 24 Bilis
 atra signa. f. 7 a. 68
BILIOSA dejectio cui bona vel mala? f.
 4 a. 28.

C

CALCULI signa. f. 4 a. 79
CALIDI commoda. f. 5 a. 18 22 Incom-
 moda. f. 5 a. 16 Calidum innatum quan-
 do & quibus fit copiosum. f. 1 a. 14 15
CALORIS mutationes. f. 4 a 40 f. 7. a.
 60 Calor in parte particulari. f. 4 a. 39
CALVI prognos. f. 6 a. 34.
CANCRI OCCULTI quo pacto tractan-
 di. f. 6 a. 38
CAPITIS DOLOR quo tempore. f. 3 a.
 13 23 Signum. f. 4 a. 70 Diæta. f. 5 a.
 64 Prognos. f. 6 a. 51. Curatur venæ-
 sectione. f. 5 a. 68 Evacuazione per alias
 partes. f. 6 a. 10 Capitis gravitas. f. 3 a.
 5 17 Ejus causa calidum. f. 5. a. 22
 Vulneris capitis prognos. f. 7 a. 14
 Ulcus capitis calidum juvat. f. 5 a. 22.
CARNIS effoeminationis causa. f. 5 a. 16.

I N D E X

- CARTILAGO** percissa non coalescit. f. 6 a. 19 f. 7. a. 28.
- CATHARRI** quâ ætate familiares? f. 3 a. 12 21 **Causa** est frigus. f. 5 a. 24 **Signum** in diarrhæa. f. 7 a. 30.
- CEREBRI** divisi symptomata. f. 6 a. 50 **Concussi**. l. 7 a. 58 **Syderati**. f. 7 a. 50 **Cerebro dissecto lethale**. f. 6 a. 18 **Frigus** ei nocet. f. 5 a. 18.
- CIBI** fastidium quando malum. f. 6 a. 3 f. 7 a. 6 **Curatur vomitu**. f. 4 a. 17 **In quibus contingat**. f. 2 a. 32 **Subtractio**. f. 1 a. 10 11 19 **Copiosi signa**. f. 2 a. 8. 17 f. 4 a. 41 45 f. 7 a. 64 **Copiosi effectus**. f. 2 a. 17 **Quibus exhibendi**. f. 1 a. 15 18 **Quibus non**. f. 7 a. 65 **Pauci cibi quibus**. f. 1 a. 14 15 18 **Cibi quando per partes & sensim offerendi**. f. 1 a. 17 f. 2 a. 7 51 **Prognosis**. f. 2 a. 31 32 **Deterior. Quando præferendus**. f. 2 a. 38 **Citò reficientes**. f. 2 a. 18.
- CIRCUITUS** *vide* paroxysmos.
- COLLI** intorti prognosis. f. 4 a. 35 f. 7 a. 58
- COLORUM** diversorum prognosis. f. 4 a. 40 f. 7 a. 60.
- COMITIALIS** morbus *vide* epilepsiam.
- CONCOCTA** purganda. f. 1 a. 22.
- CONCEPTUS** signa. f. 5 a. 41 59 61 **Masculi**. f. 5 a. 42 48 **Impedimentum**. f. 5 a. 46 62.
- CONSUETUDO** attendenda. f. 1 a. 16 17 f. 2 a. 38 49 50.
- CONVULSIO** (sive spasmus) qua ætate? f. 3 a. 25 **Ob ardores vehementes**. f. 7 a. 13 **Ab elleboro**. f. 4 a. 16 f. 5 a. 14 f. 7

I N D E X

- f. 7 a. 25 Ab ebrietate. f. 5 a. 5 A frigore. f. 5 a. 17 20 Ab ileo. f. 7 a. 10.
A repletionem vel evacuationem. f. 6 a. 39 A sanguinis fluxu. f. 5 a. 3 f. 7 a. 9 A vulnere. f. 5 a. 2 Febri superveniens, pessimum. f. 2 a. 26 f. 4 a. 49 Post menstrua. f. 5 a. 56 Post evanescentes tumores. f. 5 a. 65 Ob vigilias. f. 7 a. 18 In febre acuta, malum. f. 4 a. 66 67 Imminentis in febribus signum. f. 4 a. 68 solvitur febre. f. 4 a. 57 f. 5 a. 70,
CORDIS vulnus lethale. f. 6 a. 18.
CORPUS fluxile. f. 2 a. 9 f. 4 a. 13 f. 7 a. 70 Procerum. f. 2 a. 54.
CORYSÆ *vide* catharros.
COXÆ luxatio. f. 6 a. 59 60.
CRINES *vide* pilos.
CRASSITIES partium ad umbilicum. f. 2 a. 33 Crassities noxia. f. 2 a. 44
CRISIS signa. f. 2 a. 13 f. 4 a. 71 Critici dies. f. 2 a. 24 f. 4 a. 36 61 Post crimum relicta. f. 2 a. 12.
CRUDA ab atra bile. f. 7 a. 68 Non movenda. f. 1. a. 22.
CUCURBITULÆ ubi necessariz f. 5 a. 50.
CUTIS rara in mulieribus. f. 5 a. 69 Cutis aridæ & duræ, laxæ & raræ prognos. f. 5 a. 71.

D

- DEJECTIONES** ab atra bile. f. 7 a. 68 Sinceræ. f. 7 a. 6 23 67.
DELIQUIUM animi *vide* animi defectio-
 nem.
DELIRIUM ab ossis præfectione. f. 7 a.

I N D E X

- 24 A multo potu. f. 7 a. 7 In febre intermittente. f. 4 a. 50 A sanguinis profluvio. f. 7 a. 9 Ab ileo. f. 7 a. 10 A vigilia. f. 7 a. 18 A vulnere capitis. f. 7 a. 14 solvit tremores. f. 6 a. 26 A somno solvitur. f. 2 a. 1 Quodnam tutius f. 6 a. 53.
- DENTIBUS** frigidum noxium. f. 5 a. 18
Lentores adnati. f. 4 a. 53.
- DENTITIO** Quos pariat morbos. f. 3 a. 25.
- DIAPHRAGMATIS** vulnus lethale. f. 6 a. 18.
- DIARRHÆA** quibus temporibus? f. 3 a. 16 21 Quâ ætate? f. 3 a. 25 31 Ejus prognosis. f. 2 a. 14 Mala. f. 5 a. 34 f. 6 a. 16 Lethalis. f. 5 a. 12 14 Cum spumosis excrementis. f. 7 a. 30 Succedit ei dysenteria. f. 7 a. 75 Curatio diarrhææ. f. 6 a. 15 Curat morbos. f. 4 a. 60 f. 6 a. 17 f. 7 a. 29 Vide plura de alvi profluvio.
- DIÆTA.** *Quare* victûs rationem.
- DIES JUDICATORII.** f. 4 a. 36 61
- DIGITORUM** prognosis. f. 8 a. 12
- DOLOR** quando non sentitur. f. 2. a. 6 Minús sentitur. f. 2 a. 46 Augetur dum pus fit. f. 2 a. 47 Calido lenitur. f. 5 a. 22 Frigidâ solvitur. f. 5 a. 25 Item torpore. f. 5 a. 25 Capitis quæ signa habeat? f. 4 a. 70 V. S. curandus. f. 5 a. 68 Quomodo solvitur? f. 6 a. 10 Lethalis. f. 6 a. 51 Vehemens circa ventriculum. f. 4 a. 66 Laterum & pectoris. f. 6

I N D E X

f. 6 a. 5 Quâ tempestate? f. 3. a. 5 17
 23 Jecoris solvitur febre. f. 7 a. 52 Ven-
 tris quotuplex? f. 6 a. 7 Prognosis. f. 4
 a. 11 f. 7 a. 22 26 Oculorum quibus
 abigatur? f. 6 a. 31 f. 7 a. 46 Hypochon-
 driorum febre solvitur. f. 6 a. 40 Lum-
 borum quo tempore? f. 3 a. 23 Infer-
 nâ purgatione opus esse significat. f. 4
 a. 20 Articulorum quo tempore? f. 3 a.
 16 20 Quâ ætate? f. 3 a. 31 Post lon-
 gas febres. f. 4 a. 44 f. 7 a. 63 Causa-
 tur à copiosiore alimento. f. 4 a. 45 Po-
 dagrici quo tempore moveantur? f. 6 a.
 55 Ischiadici quâ tempestate? f. 3 a. 22
 Prognosis eorum. f. 6 a. 59 60
DYSENTERIA quibus temporibus? f. 3
 a. 11 12 16 22 Quâ ætate? f. 3 a. 30
 Subsequitur diarrhæam. f. 7 a. 75 Prog-
 nosis. f. 6 a. 3 43 f. 7 a. 76 Bona est
 in lienosis. f. 6 a. 48 Item in mania. f. 7 a.
 5 Mala à sincera dejectione. f. 7 a. 23
 Lethalis ab atra bile. f. 4. a. 24. Item
 cum carunculis. f. 4 a. 26

E

EBRIETATIS prognosis. f. 5 a. 5
EMPYEMA quando generetur? f. 5 a. 8
 10 A sanguine extravasato. f. 6 a. 20
 A pleuritide. f. 5 a. 8 Ab angina. f. 5
 a. 10 Ab ulceribus. f. 5 a. 65 Empye-
 matis prognosis. f. 5 a. 15 f. 7 a. 44
EPILEPSIÆ quibus temporibus? f. 3 a.
 16 20 22 Quâ ætate? f. 3 a. 29 Prog-
 nosis. f. 5 a. 7 Curatio. f. 2 a. 45
ERYSIPELAS ab osse denudato. f. 7 a. 19
 Uteri

I N D E X

- Uteri gravidarum lethales. f. 5 a. 433
 Prognosis. f. 6 a. 25 f. 7. a 20 Erysipelatis non exulcerati cura. f. 5 a. 23
- EVACUATIO** vasorum spontanea. f. 1. a 2 Artificialis. f. 1 a. 3 23 Quo tempore instituenda? f. 1 a. 22 Evacuatio ubi necessaria? f. 2 a 8 f. 4 a. 41 Undè judicanda? f. 1 a. 23 Ad animi deliquium. f. 1 a. 23 Quâ viâ? f. 1 a. 211
- Repentina magna & noxia. f. 1 a. 3 f. 2 a. 51 Paulatim bonæ. f. 1 a. 23 Evacuatio sanat morbos, qui repletionem fiunt & contra. f. 2 a. 22
- EUNUCHI.** *Quare* podagram. Calvi non fiunt. f. 6 a. 28
- EXACERBATIONES.** *Quare* paroxysmos.
- EXCRETIONES PER ALVUM** copiosiores. f. 1 a. 23 Spumosa. f. 7. a 30 Qualitas. f. 1 a. 12 23 f. 2 a 14 15 f. 4 a 22 47 f. 7 a 69 79 Cum surditate. f. 4 a. 28 Celeres. f. 2 a. 18 Cruentæ. f. 4 a. 25 Cum carunculis. f. 4 a. 26 Parvæ. f. 4 a. 83 In febribus continuis. f. 4 a. 47 f. 7 a. 69 Similes sanis. f. 2 a. 15 In biliosis. f. 2 a. 15 f. 5 a. 64 Curatio in biliosis. f. 4 a. 28 Ab atra bile lethales. f. 4 a. 22 23 24 Nigræ quid significant. f. 4 a 21 Sanguis niger excretus bonus. f. 4 a. 25 Lethalis. f. 4 a 23 Sinceræ malum. f. 7 a. 6 23
- PER VESICAM.** f. 7 a. 66 Qualitas. f. 7 a. 99 Veluti strigmenta. f. 7 a. 67
- EXOLUTIO** ex tuberculi ruptione. f. 7 a 8 Exolutionis frequentioris prognosis.

I N D E X

fis. f. 2 a 41 Exolvuntur citò sani dum
 purgantur. f. 2 a. 36
EXSCREATIONES in febribus quænam
 malæ? f. 4 a. 47 f. 7 a. 69
EXTENUATIONIS prognosif. f. 4 a. 23
 In febribus. f. 2 a. 28 In gravidis. f. 5
 a. 55 Diætâ. f. 5 a 64 Extenuationes ad
 extremum non ducendæ. f. 1 a. 3

F

FAMES diversa pro ætatibus. f. 1 a. 13
 Excedens malum. f. 2 a. 4 Non fert
 laborem. f. 2 a. 16 Fames quibus cor-
 poribus proffit. f. 7 a 59
FAUCES Exasperat aquilo. f. 3 a. 5 Fau-
 cium ægrotantium prognosif. f. 2 a. 15
FEBRIS quâ ætate? f. 3 a. 29 Prognosif
 à somno. f. 4 a. 67 A surditate. f. 4 a.
 60 A collo. f. 4 a. 35 A suspiriis. f. 6
 a. 54 A suffocatione. f. 4 a. 34 Cum
 sanguinis vomitu. f. 7 a. 37 Cum hy-
 pochondriis sublatis. f. 4 a. 73 Ex uri-
 na. f. 4 a. 69 70 f. 7 a. 31 Ex excremen-
 tis. f. 4 a. 21 Cum dysenteria. f. 6 a. 3
 Cum vehementi æstu & stomachi mor-
 su. f. 4 a. 65 Cum rigoribus. f. 4 a. 29
 Cum bubonibus. f. 4 a. 55 Cum spas-
 mo. f. 2 a. 26 Cum lassitudine. f. 4 a.
 31 Cum abscessibus. f. 4 a. 51 Cum
 colliquesactione. f. 2 a. 28 Cum hæ-
 morrhagiis. f. 4 a. 27 Cum ictero. f. 4
 a. 62 64 Quando febres expectandi co-
 piofi. f. 3 a. 6 In febre victus humidus
 convenit omni febricitanti. f. 1 a. 16 In
 febre cibus non dandus. f. 7 a. 65 Nec
 in.

I N D E X

- in paroxysmis. f. 1 a. 19 Febris non biliosa quomodo curatur? f. 7 a. 42 Febres quæ mala curet? f. 4 a. 57 f. 5 a. 58 f. 6 a. 40 44 51 f. 7 a. 52 Quando periculum recidivæ. f. 2 a. 12 f. 4 a. 36 41
 Nox quomodo se habet ante & post judicationem febris. f. 2 a. 13
- FEBRIS ACUTA** quibus temporibus? f. 3 a. 7 9 11 14 Quâ ætate? f. 1 a. 14 f. 3 a. 29 Prognosis. f. 2 a. 19 f. 4 a. 66 f. 6 a. 54 f. 7 a. 1 f. 8 a. 10 Quàm diu duret? f. 2 a. 23 Diæta lactea non convenit. f. 5 a. 64
- FEBRIS ARDENS** quo tempore? f. 3 a. 21 Quâ ætate? f. 3 a. 30 Prognosis. f. 4 a. 54 In curatione æstas opem fert. f. 8 a. 8 In qua tremores fiunt delirio solvitur. f. 6 a. 26 Rigore solvitur. f. 6 a. 26
- FEBRES CHRONICÆ** quo tempore? & quâ ætate? f. 3 a. 27 Quâ anni tempestate? f. 3 a. 16 Undè. f. 4 a. 45 Signa longitudinis desumuntur ex sudore. f. 4 a. 36 Ex urina. f. 7 a. 31 Ex abscessibus. f. 4 a. 51 Prognosis. f. 4 a. 44 f. 7 a. 63 Diæta lactea convenit. f. 5 a. 64
- FEBRIS CONTINUA** quo tempore? f. 3 a. 21 Prognosis ex sudore. f. 4 a. 56 Ex tremore. f. 4 a. 46 Ex saliva, urinâ facibus. f. 4 a. 47 f. 7 a. 69 Ex spasms. f. 4 a. 49 Ex respiratione difficili. f. 4 a. 50
- FEBRIS EPHEMERA.** f. 4 a. 55
- FEBRIS LYPIRIÆ** descriptio, & prognosis. f. 4 a. 48 f. 7 a. 72

I N D E X

FEBRIS QUARTANA quibus temporibus? f. 3 a. 21 22 Signa ejus ex urina. f. 4 a. 74 In quartana raro convulsio. f. 5 a. 70 quando diutiùs duret? f. 2 a. 25 Sanguis è naribus effluens malum. f. 8 a. 3

FEBRIS QUOTIDIANÆ signum. f. 4 a. 63 Quando judicatu sit difficilis? f. 4 a. 30

FEBRIS SYMPTOMATICA à pulsu f. 2 a. 47 A dissecto cerebro. f. 6 a. 50

FEBRIS TERTIANA quo tempore? f. 3 a. 21 Exquisita quando judicetur? f. 4 a. 59 Febres tertianæ continuæ periculosæ intermittentes verò minùs. f. 4 a. 43 f. 7 a. 62

FERRUM sanat quæcumque medicamenta non sanant. f. 8. a. 6

FLUXILIA quando facienda corpora. f. 2 a. 10 f. 4 a. 13 f. 7 a. 70

FLUXIONES. *Vide catharros.*

FOECUNDITATIS causa in utroque sexu f. 5 a. 62 63

FRIGIDI incommoda & noxæ. f. 5 a. 17 18 20 22 23 24 Frigidâ quando utendum. f. 5 a. 19 21 23 25 Frigus in parte aliqua particulari. f. 4 a. 39 Prognosis inde desumenda. f. 8 a. 11 12 14 Frigus partium extremarum, malum. f. 4. a. 48 f. 7 a. 1 26 72

FURORES (five Maniæ,) quo tempore? f. 3 a. 20 22 Furor ab ulcere. f. 5 a. 65 In melancholicis. f. 6 a. 56 Ex mammis. f. 5 a. 40 Furoris prognosis. f. 7 a. 5 Solutio. f. 6 a. 21

GENÆ

INDEX

G

- GENÆ** tenuis particula dissecta non accrescit. f. 6 a. 19
- GENITURA** quomodo extinguitur? f. 5 a. 62 Prognosis. f. 6 a. 2
- GENUUM** gravitas deorsum purgatione opus esse significat. f. 4 a. 20 Dolor ex mammis. f. 5 a. 53
- GIBBOSORUM** prognosis. f. 6 a. 46
- GINGIVARUM** fit pruritus pueris addentitionem accedentibus. f. 3 a. 25
- GLAUCEDINES** senibus fiunt. f. 3 a. 311
- GRACILES** fursum purgandi. f. 4 a. 66
Diutius vivunt quam crassi. f. 2 a. 44
- GRAVEDINES** quibus temporibus & constitutionibus anni? f. 3 a. 13 14 200
22 Gravedines & raucedines in senibus. f. 2 a. 40
- GRAVIDITATIS** signa. f. 5 a. 41 51 61
An mulier marem vel foeminam gestet? f. 5 a. 38 42 48 An geminos. f. 5 a. 38
Prognosis ex nimio profluvio f. 5 a. 34
Ex colore. f. 5 a. 42 Ex erysipelate. f. 5 a. 34
Ex febribus. f. 5 a. 55 Ex induratione mammarum. f. 5 a. 52 53
Ex mammis. f. 5 a. 37 38 52 53 Ex menstruis. f. 5 a. 60
Ex morbo acuto f. 5 a. 31
Ex venæ sectione. f. 5 a. 300
Gravidæ quando purgandæ. f. 4 a. 1 f. 5 a. 29
Tenesmus in gravidis, malum f. 7 a. 27
Uteri osculum quale. f. 5 a. 51

I N D E X

H

- HABITUS** athleticus (seu bonus.) f. 1 a. 3
 3 Habitudinem bonam ad summum progressam non tarde solvere confert. f. 1 a. 3
 3 Mali corporis habitus (sive cachexiæ contingunt senibus.) f. 3 a. 31
- HÆMORRHAGIA.** *Vide* sanguinis fluxum.
- HÆMORRHOIDES** quâ ætate ? f. 3 a. 30
 Atrabiliariis & phreniticis accedentes, bonum. f. 6 a. 11
 Insanis supervenientes insaniam solvunt. f. 6 a. 21
 An omnes curandæ ? f. 6 a. 12
 Prognosis. f. 6 a. 12 f. 4 a. 25
- HEPATIS** dolor febre superveniente solvitur. f. 7 a. 52
 In ejus inflammatione singultus supervenit. f. 5 a. 58
 Quod malum est. f. 7 a. 17
 Hepar durum ictero superveniens malum. f. 6 a. 42
 Hepatis purulenti curationis prognosis. f. 7 a. 45
 Hepatis hydropici. f. 7 a. 55
 Vulnus hepatis, lethale. f. 6 a. 18
- HORROR** à sudore malus. f. 7 a. 4
 Horrorem vinum cum aqua potum solvit. f. 7 a. 56
- HUMIDÆ** naturæ signum. f. 4 a. 56 f. 7 a. 61
 Morbi. f. 3 a. 11
 Prognosis. f. 6 a. 2
 Fames convenit. f. 7 a. 59
 Item siccus autumnus & ventus Borealis. f. 3 a. 14
 Humorū decubitus de loco in locum prognosis. f. 6 a. 56
 Humorū copia quomodo curanda ? f. 7 a. 61
- HYDROPS** quo tempore ? f. 3 a. 22 f. 8 a. 8
 Hydrops ascites quomodo generetur ?

I N D E X

tur? f. 7 a. 55 Siccus unde? f. 4 a. 11
 Supervenit hæmorrhoidibus curatis. f.
 6 a. 12 Lienosis. f. 6 a. 43 Maniæ cum
 levamine. f. 7 a. 5 Leucophlegmatia.
 f. 7 a. 74 Hydrops cum ulceribus. f. 6
 a. 8 Tussis superveniens malum. f. 6 a.
 35 Prognosis. f. 6 a. 27 35 In cura quid
 reflectendum. f. 6 a. 27 Ejus solutio.
 f. 6 a. 14

HYEMS. *Vide* anni tempus.

HYPOCHONDRIA murmurantia quid
 significant. f. 4 a. 73 Lac dare quibus
 hypochondria murmurant, malum. f.
 5 a. 64 Hypochondriorum dolores fe-
 bris superveniens solvit. f. 6 a. 40 Hy-
 pochondrii dextri prognosis. f. 4 a. 64
HYSTERICÆ sternutatio superveniens
 bonum. f. 5 a. 35.

I

IN ICTERO quæ prognosis. f. 4 a. 62
 64 f. 6 a. 42 IctERICI non flatulenti. f. 5
 a. 72

JECORIS dolores. *Vide* Hepatis dolores.

JEJUNIUM quando & quibus conveniat
 f. 1 a. 13 19

IGNIS SACER. *Vide* Erysipelas.

IGNIS sanat quæ ferrum non sanat. f. 8
 a. 6

ILIACA PASSIO quo tempore? f. 3 a.
 22 Ejus prognosis. f. 6 a. 44 f. 7 a. 10

IMPETIGINES vere fiunt. f. 3 a. 20

INCURABILE. f. 6 a. 24 f. 8 a. 6

INFANTES. *Quare* aetatem.

INFLAMMATIO recens curatur frigido
 f. 5.

I N D E X

- f. 5 a. 23 Contingit infantibus f. 3 a. 24
INSANIA. *Vide* delirium vel maniam.
INTESTINORUM levitas. *Quare* lienteriam.
INTESTINUM tenue læsum lethale. f. 6
 a. 18 Rectum inflammatum. f. 5 a. 58
ISCHIADES quo tempore? f. 3 a. 22
JUDICIUM. *Quare* crîsim. In iudicationibus cibi nec medicamenta requiruntur. f. 1 a. 19 20

L

- LABIORUM** prognosîs. f. 8 a. 13 In febribus continuis. f. 4 a. 49 f. 7 a. 73
LAC quibus conveniat & non. f. 5 a. 64
 Lac habens mulier quæ nec prægnans, nec peperit, menses ipsi defecerunt. f. 5 a. 39 Lactis è mammis fluentis Prognosîs. f. 5 a. 52
LACRYMARI ex voluntate in febribus aut aliis ægitudinibus nihil absurdi. f. 4. a. 52 f. 8 a. 2
LASSITUDINIS signa. f. 4 a. 74 Prognosîs in febribus. f. 4 a. 31 Lassitudo quid significet. f. 2 a. 5 Ejus remedium. f. 2 a. 48
LATERIS dolores qualem considerationem exigant. f. 6 a. 5 Laterum dolores hyeme fiunt. f. 3 a. 23
LETHARGI hyeme fiunt. f. 3 a. 23 Ætatem constantem agentibus accidunt. f. 3 a. 30
LEUCOPHLEGMATIÆ solutio. f. 7 a. 29 Post eam aqua intercus. f. 7 a. 74
LIENIS tumor autumnò fit. f. 3 a. 22
 Lienosorum prognosîs. f. 6 a. 43 48

I N D E X

LIENTERIA quo tempore? f. 3 a. 22
Quâ ætate? f. 3 a. 30 Ejus productio
in lienosis. f. 6 a. 43 Lienteriæ super-
veniens ructus acidus, bonum. f. 6 a.
1 Longis lienteriiis cibi fastidium, ma-
lum. f. 6 a. 3 Lienteria supervenit dy-
senteria. f. 7 a. 76 In lienteria emeti-
cum, malum. f. 4 a. 12

LINGUA quid significet? f. 7 a. 40 f. 8
a. 9

LIPPIENTEM alvi profluvio corripitur, bo-
num. f. 6 a. 17

LIPPITUDINES in siccitatibus plerum-
que fiunt. f. 3 a. 16 Sicca quibus &
quando fiant? f. 3 a. 14 21 Si hyems
sicca & Aquilonaris fuerit. f. 3 a. 11

LOCORUM mutatio prodest. f. 1 a. 17
f. 2 a. 45

LUMBORUM dolor citra febrem internâ
purgatione opus esse significat. f. 4 a. 20
Qui nec medicamentis nec aliis solvi-
tur, in hydropem siccum firmatur. f. 4
a. 11

LUMBRICI rotundi pueris grandiusculis
fiunt. f. 3 a. 26

M

MAMMÆ lacte turgida. f. 5 a. 39 San-
guine. f. 5 a. 40 Earum extenuationis
in gravidis prognosis. f. 5 a. 37 38 53
Si solidiores fuerint mammæ, sanior est
foetus. f. 5 a. 52 In mammis dolor si
ex gracilibus rursus duræ fiant. f. 5 a.
53 Ex mammis lac fluens, utero gestan-
ti debilem foetum significat. f. 5 a. 52

MANIA. Vide furorem.

MAS-

I N D E X

- MASCULUM** gestantes mulieres benè coloratæ sunt. f. 5 a. 42 In masculis uti & in fœminis impeditur conceptio. f. 5 a. 63
- MAXILLAS** circâ abscessus fiunt delassatis ex febribus. f. 4 a. 31
- MEDENDI** ars, ejusque requisita. f. 1 a. 1
- MEDICAMENTA** quæcumque non sanant ea ferrum sanat. f. 8 a. 6
- MEDICARI.** *Vide* purgare.
- MELANCHOLIA** quo tempore? f. 3 a. 14 20 22 Melancholicorum signa. f. 6 a. 23 f. 7 a. 40 Morborum eventus. f. 6 a. 11 56 Melancholici infra vehementiùs sunt purgandi. f. 4. a. 9
- MENTIS** ægrotantis signa. f. 2 a. 6 Mente valere & benè se habere ad ea quæ exhibentur, in omni morbo bonum. f. 2 a. 33 Mente torporem calida frequenter eâ utentibus invehit. f. 5 a. 16 Mente emotio á furore bonum. f. 7 a. 5
- MENSTRUUA** ut sistenda. f. 5 a. 50 In gravidis noxia. f. 5 a. 60 Retenta imprægnationem indicant. f. 5 a. 61 Copiosiora sunt causæ morborum. f. 5 a. 57 Prognosis mensium deficientium. f. 5 a. 51 Prognosis. f. 5 a. 57 f. 6 a. 29 Mulieri deficientibus sanguis è naribus erumpens, bonum. f. 5 a. 33 Mulieri defecerunt si lac habens nec prægnans est, neque peperit. f. 5 a. 39 Menstrua quomodo cohibenda? f. 5 a. 50 Sanguinem vomenti erumpentibus, solutio. f. 5 a. 32 Cura suffitu haberi potest. f. 5 a. 28 Decolorata quid significant? f. 5 a. 36

I N D E X

- MICTUS** sanguinis. f. 4 a. 75 78 80 81
 Caruncularum. f. 4 a. 76 Furfuraceo-
 rum. f. 4 a. 77 Plurimus noctu modi-
 cam alvi egestionem significat f. 4 a. 83
- MORBI** futuri signa. f. 2 a. 5 **Causa.** f. 2
 a. 17 22 f. 3 a. 1 5 8 f. 4 a. 22 **Mor-**
borum prognos. f. 1 a. 12 f. 2 a. 31
 32 33 34 35 f. 3 a. 3 f. 7 a. 79 **Mor-**
borum sedes. f. 4 a. 33 38 39 **Acuti**
natura. f. 1 a. 7 f. 2 a. 23 **Acuti** quo
 tempore? f. 3 a. 9 **Signa** ex urinis. f.
 7 a. 32 35 **Diuturni.** f. 3 a. 28 **Brevi-**
tas unde cognoscatur? f. 1 a. 7 12
Longitudinem quæ indicent. f. 1 a. 12
 f. 2 a. 28 31 f. 4 a. 37 40 51 56 f. 7
 a. 31 60 **Quando** vehementiores? f. 2
 a. 30 **Morborum** curatio. f. 2 a. 22 **Ini-**
tio morborum si quid movendum mo-
 ve. f. 2 a. 29
- MORTIS** indicia. f. 2 a. 41 44 f. 4 a. 46
 48 49 50 f. 7 a. 73 f. 8 a. 10 usque ad
 18 **Causa** & terminus. f. 8 a. 18
- MOTUS** & quies se invicem curant. f. 2
 a. 22 48 **Effectus** eorum in purgatione.
 f. 4 a. 14 15 **Prognos.** f. 2 a. 51 **Mo-**
tus corpora turbat & purgationes pro-
 movet. f. 4 a. 14 **Movendum** si quid vi-
 detur incipientibus morbis move. f. 2
 a. 29
- MUTATIONES** ubi in toto corpore lon-
 gitudinem morbi significant. f. 4 a. 40
 f. 7 a. 60 **Maximè** ætatis & regionum
 & victum juvenibus epilepticis libera-
 tionem faciunt. f. 2 a. 45 **Temporum**
 maximè pariunt morbos. f. 3 a. 1 **Item**
 frigoris & caloris. f. 3 a. 1 2

I N D E X

MUTI fiunt ab ebrietate. f. 5 a. 5 **A** cerebro concusso. f. 7 a. 58 Eorum prognos. f. 6 a. 51

N

NARIUM prognos in febribus continuis. f. 4 a. 49 f. 7 a. 73 Ex iis pus, vel aqua, vel sanguis effluens. f. 6 a. 10 Quibus nares humidiores morbosiores sunt & contra. f. 6 a. 2

NATURÆ inimica. f. 2 a. 4 51 Naturarum differentia. f. 3 a. 2 Quid faciat. f. 2. a. 34

NEPHRITIDIS signa. f. 7 a. 34 35 Senibus fiunt. f. 3 a. 31 Prognos in senibus. f. 6 a. 6 Iis hæmorrhoides utiles. f. 6 a. 11

NIGREDINIS causa frigus. f. 5 a. 17 20 Nigra deorsum subeuntia. f. 4 a. 21

NOX ante exacerbationem gravis est quibuscumque judicatio fit. f. 2 a. 13

NUTRITIO corporum impurorum major eorum læsio. f. 2 a. 19 Eorum, quæ nutriunt acervatim & velociter, veloces etiam egestiones fiunt. f. 2 a. 18

O

OCULORUM humiditates quâ ætate? f. 3 a. 31 Inflammatio quibus temporibus? f. 3 a. 11 14 16 21 Morsus quâ constitutione temporis? f. 3 a. 17 Obscuritates, humiditates in senectute. f. 3 a. 31 Cæcitas in melancholicis. f. 6 a. 56 Dolor erit si mammæ ex gracilibus rursus duræ fiant. f. 5 a. 53 Doloris solutio.

I N D E X

- lutio. f. 6 a. 31 f. 7 a. 46 In morbis oculos inspicere oportet. f. 6 a. 52 Oculi rubicundi ex vomitu, malum. f. 7 a. 3
 Oculus in febre non intermittente distortus, aut non videns, lethale. f. 4 a. 49
- OMENTUM** crassum infœcunditatem parit. f. 5 a. 46 Omentum putrescens. f. 6 a. 58
- OPHTHALMIÆ** siccæ quâ anni tempestate contingant mulieribus? f. 3 a. 12
 Plura *vide* de lippitudinibus, & de oculorum morbis.
- OS UTERI** quibus durum, his clausum esse necesse est. f. 5 a. 54 Ab omento quibus comprimatur? f. 5 a. 46 Oris ulcera (seu Aphthæ,) quibus fiant? f. 3 a. 24 Exulcerationes quâ tempestate? f. 3 a. 21 Non febricitanti oris ventriculi morsus, & os amarescens quid indicent. f. 4 a. 17
- OSCITATIO** curatur vino. f. 7 a. 56
- OSSIS** abscessus unde fiant? f. 6 a. 45 f. 7 a. 77 Osse ægotante caro qualis? f. 7 a. 2 Denudato erysipelas. f. 6 a. 19
 Præciso Delirium supervenit. f. 7 a. 24
 Præcisum non accrescit. f. 6 a. 19 f. 7 a. 28 Ossi frigus nocet. f. 5 a. 18 22
 Calor prodest. f. 5 a. 22

P

- PALPEBRÆ** distortæ in febre non intermittente prognosis. f. 4 a. 49 f. 7 a. 73
- PAROXYSMOS** quæ indicent? f. 1 a. 12 13 f. 4 a. 30 In paroxysinis cibi substrahendi. f. 1 a. 11 19

I N D E X

- PARTUS** difficilis aut periculosus ubi gravida febris corripitur. f. 5 a. 55 In partu difficili sternutatio prodest. f. 5 a. 35
- PAULATIM** quod fit, tutum est. f. 2 a. 51
- PAVORES** (seu timores) quibus accidunt. f. 3 a. 24
- PECTORIS** dolores qualem considerationem habeant? f. 6 a. 5 Dolores facit Aquilo. f. 3 a. 5 17 Hyeme fiunt. f. 3 a. 23 Pectori inimica sunt frigida. f. 5 a. 24
- PERACUTUS** morbus statim extremos habet labores. f. 1 a. 8
- PERFRIGERATA** Quaecumque sunt, calefacere oportet. f. 5 a. 19
- PERINÆI** dolor. f. 4 a. 80 f. 7 a. 39
- PERIPNEUMONIA** quò tempore? f. 3 a. 23 Quà ætate? f. 3 a. 30 Superveniens phrenitis, malum. f. 7 a. 12 Item diarrhæa f. 6 a. 16
- PHLEGMONE.** *Quare* inflammationem.
- PHRENITIDES** quàm ætate? f. 3 a. 30 Prognosis in senibus. f. 8 a. 1 Malum in peripneumonia. f. 7 a. 12 Phreniticis hamorrhoides supervenientes bonum. f. 6 a. 11 In phreniticis frequentiores sunt urinæ pellucidæ & albæ. f. 4 a. 72
- PHTHISIS** (seu tabes) quibus temporibus? f. 3 a. 13 16 22 Quàm ætate? f. 3 a. 29 f. 5 a. 9 f. 8 a. 8 Oritur ex pleuritide. f. 5 a. 15 Ex sanguinis sputo. f. 7 a. 15 16 78 A puris sputo. f. 7 a. 16 78 Ab hamorrhoidibus curatis. f. 6

I N D E X

- 6 a. 12 Autumnus phthificis malus
 f. 3 a. 10 In vergentibus ad tabem
 omnia vehementiora. f. 8 a. 8. Diarrhæa
 superveniens, lethale. f. 5 a. 11
 14 f. 7 a. 78 Prognosis ex sputis. f.
 a 11 f. 7 a. 16 69 78 Diæta lactea con-
 venit. f. 5 a. 69 Nocet vomitorium. f.
 4 a. 8.
- PILUS** quid significet? f. 5 a. 69 Pili ex
 renibus. f. 4 a. 76 Excidentes in phthi-
 ficis, lethale. f. 5 a. 11 12
- PINGUE** urinæ supernatans quid sig-
 nificet? f. 7 a. 35
- PLEURITIS** quo tempore? f. 3 a. 23
 Quâ ætate? f. 3 a. 30 Acidum eructan-
 tes raro pleuritici fiunt. f. 6 a. 33 A
 pleuritide peripneumonia, malum. f.
 a 11 Item diarrhæa. f. 6 a. 16 Prog-
 nosis ejus à sputis. f. 1 a. 12 f. 5 a. 8 19
- PODAGRA** quibus temporibus? f. 3 a. 16
 20 f. 6 a. 55 Quâ ætate? f. 3 a. 31 Qui-
 bus accidat, aut non? f. 6 a. 28 29 30
 Podagræ prognosis. f. 6 a. 49 Frigida
 affusione curatur. f. 5 a. 25
- POTUS** deterior aliquando admittendus
 f. 2 a. 38 Potu est facilius repleti quam
 cibo. f. 2 a. 11 Ex multo potu rigor &
 delirium malum. f. 7 a. 7
- PRÆCORDIA** *Vide* hypochondria.
- PRÆGNANTES.** *Vide* gravidas.
- PRÆPUTII** vulnus. f. 6 a. 19
- PROGNOSIS** in morbis acutis incerta. f.
 2 a. 19
- PRURITUS** totius corporis senibus. f. 3
 a. 31

I N D E X

EX PULSU forti in ulceribus sanguinis
 eruptio. f. 7 a. 21
PULMONUM inflammatio. *Quare* peri-
 pneumoniam.
PURGATIO spontanea. f. 1 a. 2 Artifi-
 cialis. f. 4 a. 2
PURGARE per inferiora in vere conve-
 nit. f. 6 a. 47 In hyeme. f. 4 a. 4 Non
 convenit generaliter vel nocet. f. 1 a. 2
 25 f. 4 a. 2 3 In sanis. f. 2 a. 36 37 f.
 4 a. 16 Non convenit in æstate. f. 4 a.
 47 In diebus canicularibus. f. 4 a. 5 In
 vigore morbi. f. 2 a. 29 In attenuatis.
 f. 2 a. 35 f. 4 a. 6 Tempore crisis. f. 1 a.
 20 Ad purgationem: præparatio. f. 2 a.
 9 f. 4 a. 13 f. 7 a. 70 Quos & quæ oportet
 purgare. f. 2 a. 8 f. 4 a. 18 20 Dif-
 ficulter vomentes. f. 4 a. 7 Melancho-
 licos. f. 4 a. 9 Tabidos. f. 4 a. 8 In
 oculorum vitiis. f. 6 a. 31 Debiles mul-
 to sudore defluentes. f. 7 a. 61 Gravi-
 das. f. 4 a. 1 f. 5 a. 29 In menstruis de-
 coloribus. f. 5 a. 36 Concocta & non
 cruda. f. 1 a. 22 Ubi magna turgescencia
 f. 1 a. 22 f. 4 a. 1 10 f. 5 a. 29 De loco
 per quem purgandum. f. 1 a. 21 Quàm
 multum purgandum. f. 1 a. 23 Purgatio
 quomodo promoveatur vel diminua-
 tur. f. 4 a. 14 15 In purgatione quæ con-
 sideranda. f. 1 a. 2 23 25 In acutis mor-
 bis purgatio consideranda. f. 1 a. 24
 Effectus ejus in purgatione. f. 4 a. 14
 15 Signum finis purgationis. f. 4 a. 19
 Bonæ purgationis signum. f. 1 a. 2 23
 25 f. 4 a. 2 3 Nimia purgationis prog-
 nosis

I N D E X

- nosis. f. 5 a. 4 f. 7 a. 25 41 Ex excre-
 mentis prognos. f. 4 a. 21
PURIS fientis signa. f. 2 a. 47 Puris su-
 perne purgatio à sanguinis vomitu. f. 7
 a. 78 Pus lotio redditum renum ulce-
 rationem significat. f. 4 a. 75 Item vesî-
 cæ. f. 4 a. 81 Quandonam bonum? f.
 7 a. 44 45 Quandonam malum? f. 6 a.
 27 f. 7. a. 44 45 Effluens per nares ca-
 pitis dolorem solvit. f. 6 a. 10 Quando
 generatur? f. 2 a. 47 Quot diebus fiat?
 f. 7 a. 38 Quandonam non cognosci-
 tur? f. 6 a. 41 Ex puris sputo tabes, &
 fluxus, malum. f. 7 a. 15 16
PUSTULÆ ulcerosæ plurimæ vere fiunt.
 f. 3 a. 20 Pustulæ latæ. f. 6 a 9
PUTREDINES quibus temporibus? f. 3
 a. 16 21 Putredo ab erysipelate, ma-
 lum. f. 7 a. 20

Q

QUARTANA *Vide* febrim.

QUIESCERE statim in corporis motu
 cum incœperit dolore lassitudinem exi-
 mit. f. 2 a. 48

R

RABIEI prognos. f. 8 a. 16

RATIO quid jubeat? f. 2 a. 27 52

RAUCEDINES quibus temporibus? f. 3
 a. 13 20 23 Diurnæ. f. 3 a. 14 Rau-
 cedines in senibus vix curantur. f. 2 a. 40

RECIDIVAM faciunt relicta post judi-
 cationem in morbis. f. 2 a. 12

REGIO consideranda in curatione mor-
 borum

I N D E X

- borum. f. 1. a. 2. In victus ratione. f. 1. a. 17. Regionis mutatio curat epilepsiam. f. 2. a. 45.
- REGIUS** morbus. *Quare icterum.*
- REMEDIA** qualia esse debeant? f. 1. a. 6. In perfrigeratis. f. 5. a. 19. Quando instituenda? f. 2. a. 29. Quo ordine adhibenda? f. 8. a. 6.
- RENUTRITIONES** extremæ periculosa. f. 1. a. 3. Quomodo instituenda? f. 1. a. 7. f. 2. a. 7. 15.
- IN RENIBUS** venularum sanguiferarum ruptio undè colligitur? f. 4. a. 78. Renum affectiones acuta. f. 7. a. 35. Ulcerationem sanguinis aut puris mictus significat. f. 4. a. 75. Ulcerati renis symptomata. f. 5. a. 58. Ex iis carunculae secedentes. f. 4. a. 76 Renum vitiorum in senibus prognosis. f. 6 a. 6 Vitiis succedentes hæmorrhoides, bonum f. 6 a. 11 Renum dolorum prognosis. f. 7. a. 34. 35. 36.
- REPLETIO** noxia. f. 1 a. 2 3 4 f. 2 a. 4 17 51 f. 6 a. 39 facilius est repleri potu quàm cibo. f. 2 a. 11 Curatio repletionis. f. 2. a. 22
- RESPIRATIO** difficilis quâ ætate. f. 3 a. 31 Prognosis ejus in febribus. f. 4 a. 50 68 Respiraciones luctuosæ malæ. f. 6 a. 54
- RIGORES** (sive horrores) quo tempore? f. 3 a. 5 A sudore mali. f. 7. a. 4 A frigore. f. 5 a. 17 20 Signum febris quotidianæ. f. 4 a. 63 Solvit febrem ardentem. f. 4 a. 58 Rigorum prognosis in febre. f. 4 a. 29 46 f. 6. a. 26 Sexto die

I N D E X

die. f. 4. a. 29. A multo potu, malum
 f. 7 a 7 Curantur calido. f. 5. a. 22 In-
 ducuntur à frigore. f. 5 a. 17. Rigores
 in utroque sexu. f. 5 a. 69.
 RUCTUS acidus in lienteria (sive intesti-
 norum levitate) superveniens, bonum.
 f. 6 a. 1 Ructum acidum habentes non
 ita pleuritici fiunt. f. 6. a. 33
 RUBOR & tumor in pectore ab angina
 detento accedens, bonum. f. 7 a. 49

S

SACER morbus. *Quare epilepsiam.*
 SANA habentes corpora pharimacis pur-
 gati citò exolvuntur. f. 2 a. 36 37 f. 4 a. 16
 SANGUINIS fluxionis tempus. f. 3 a. 20
 Causa. f. 4 a. 74 f. 5 a. 16 24 Progno-
 sis in febribus. f. 4. a. 27 f. 7 a. 9 In
 ulceribus. f. 7 a. 21 Eruptio sanguinis
 per nares, os, aut aures prodest capiti
 dolenti. f. 6 a. 10 Sanguinis è naribus
 fluxus in pueris senioribus contingit. f. 3
 a. 27 In febribus quartanis, malum. f. 8
 a. 3 Quibus aures obsurduerint, mor-
 bum solvit. f. 4 a. 60 Mensibus defi-
 cientibus, bonum. f. 5 a. 33 Ab absces-
 su liberat. f. 4 a. 74
 Sanguinis ex pulmonibus ejectionis sig-
 num. f. 5 a. 13 Sputiones juvenibus
 fiunt f. 3 a. 29 Prognosis. f. 7 a. 15 69
 Sanguinis vomitûs signum. f. 7 a. 37 Prog-
 nosis. f. 7 a. 78 Menstruorum fit solu-
 tio. f. 5 a. 32 Sanguis sursùm quidem
 qualiscumque fuerit, malum. f. 4 a. 25
 Sanguineæ urinæ prognosis. f. 4 a. 75 78
 80 81 f. 7 a. 39 San.

I N D E X

- Sanguinis fluxûs per alvum prognosis. f. 4
 a. 21 23 25 Magnæ in febribus eruptiones in refectionibus alvos humectant. f. 4 a. 27
- Collectio sanguinis in mammis quid significet? f. 5 a. 40 In ventre quid indicet? f. 6 a. 20
- Sanguinis erumpentis aut erupturi remedium est frigidum. f. 5 a. 23 f. 7 a. 37
 Lac dare his, quibus sanguinis multiegestio facta est, malum. f. 5 a. 64
- Non SATIETAS, non fames, neque aliud quidpiam bonum est, quod naturæ modum excedit. f. 2 a. 4
- SATYRIASMI pueris grandiusculis fiunt. f. 3 a. 26
- SECUNDINÆ quomodo deturbandæ? f. 5 a. 49
- SEMEN humidius quid significet? f. 6 a. 2
- SENES. *Vide sub ætate.*
- SEPTUM transversum inter & ventrem phlegma conclusum. f. 7 a. 54 Suprà septum transversum dolores qui purgatione opus habent sursùm purgatione indigere indicant. f. 4 a. 18
- SICCITATES salubriores pluviosis constitutionibus. f. 3 a. 15 In siccitatibus qui morbi. f. 3 a. 16 Febres acutæ. f. 3 a. 7
- SINGULTUS ex volvulo (seu ileo,) malum. f. 7 a. 10 Item ex vomitu. f. 7 a. 3 A nimia purgatione. f. 5 a. 4 Item in senioribus nimis purgatis. f. 7 a. 41 Item ex sanguine multo effuso. f. 5 a. 3

I N D E X

Ex hepatis inflammatione. f. 5 a. 58 f. 7
a. 17 Singultus fit à repletione vel eva-
cuatione. f. 6 a 39 Curatur sternuta-
tione. f. 6 a. 13

SITICULOSI non valde in febris ar-
dentibus quinam sint? f. 4 a. 54 In fe-
bribus continuis sitis prognosis. f. 4 a.
48 f. 7 a. 72 Siticulosus lac dare, ma-
lum. f. 5 a. 64 Qui non sitiunt dum
purgantur, non cessant priusquam sitie-
rint. f. 4 a 19

SOMNI hyeme & vere longissimi. f. 1 a.
15 A somno sudor multus quid signifi-
cet? f. 4 a. 41 Somnus nocturnam sitim
sedans, bonum. f. 5 a. 27 Item deli-
rium sedans. f. 2 a. 2 Somnus modum
excedens, malum. f. 2 a. 3 f. 7 a. 71 In
febris somno pavores supervenien-
tes, malum. f. 4 a. 67 Somni profun-
di prognosis. f. 8 a 15 In quo morbo
laborem facit somnus, lethale. f. 2 a. 1
Somnus in purgationibus quomodo
dirigendus? f. 4 a. 14 15

SPASMUS. Vide convulsionem.

SPHACELUS f. 7 a. 2 50 77

SPUMÆ circa os prognosis. f. 2 a. 43
Spumæ (seu bullæ) in urina. f. 7 a. 34
Spumosa excrementa. quid significant.
f. 7 a. 30

SPUTI suppressio lethalis. f. 7 a. 16 Phthi-
ficorum graveolens in igne, lethale.
f. 5 a. 11 Sputi in pleuritide prognosis.
f. 1 a. 12

SQUAMMAS mingenti vesica est exul-
cerata. f. 4 a. 81

STE-

I N D E X

- STERILITATIS** causa in viris. f. 5 a. 63
 In mulieribus. f. 5. a. 59 62
- STERNUTATIO** undè fiat. f. 7 a. 51
 Sternutatio à singultu liberat. f. 6 a. 13
 Secundinas expellit. f. 5 a. 49 Prodest
 in hysterica & partu difficili. f. 5 a. 35
- STRANGURIAE** quo tempore? f. 3 a.
 16 22 Stranguria senibus fiunt f. 3 a.
 31 Stranguria symptomatica f. 4 a. 80
 f. 5 a. 58 f. 7 a. 39 Curatur V. S. &
 vino. f. 7 a. 48
- STRUMÆ** pueris grandiusculis fiunt. f. 3
 a. 26
- STUPOR** ex plaga in capite, malum f. 7
 a. 14 Ab atra bile. f. 7 a. 40
- SUBSIDENTIAE** urinæ crassiores in fe-
 bribus quid significant? f. 7 a. 31
- SUDORES** multi quo tempore? f. 3 a. 6
 Quinam cum sudore & quinam sine
 moriantur? f. 5 a. 71 Ubi in corpore
 sudor ibi morbus. f. 4 a. 38 Ex sudori-
 bus prognos. f. 1 a. 12 f. 7 a. 79 Ex
 copioso, frigido, calido fluente. f. 4 a.
 42 f. 7 a. 61 In febribus quando boni
 aut mali. f. 4 a. 36 37 Mali sunt febre
 non remittente. f. 4. a. 56 Qualis sit
 sudor in crisi. f. 8 a. 4 Sudor multus à
 somno quid significet? f. 4 a. 41.
- SUFFITUS** aromatum menstrua movent.
 f. 5 a. 28 Nocent. f. 5 a. 28 Suffitu ex-
 ploratur graviditas. f. 5 a. 59
- SUFFOCATIONIS** in febribus prognos.
 f. 4 a. 34 35 Suffocatorum (sive stran-
 gulatorum) prognos. f. 2 a. 43
- SUPERCILIUM** in febre distortum quid
 significet? f. 4 a. 49 f. 7 a. 73

I N D E X

- SUPPURATIO** quibus contingat. f. 5 a. 65
 Ab erysipelate, malum. f. 7 a. 20 Ex
 dolore diuturno circa ventrem, malum.
 f. 7 a. 22 Ex angina quando fiat? f. 5 a.
 10 Ex pleuritide suppurati si in quadra-
 ginta diebus purgati liberantur. f. 5 a. 15
 Suppuratio in ventrem superiorem quan-
 donam fiat? f. 7 a. 38 Suppuratum quid
 quomodo in corpore lateat f. 6 a. 41
SURDITAS in febribus continuis lethale.
 f. 4 a. 49 f. 7 a. 73 Biliosis egestionibus
 superveniens eas sedat & contra. f. 4 a.
 28 Prognosis in febribus. f. 4 a. 60.
SYDERATIO. *Vide* apoplexiam.

T

- TABES.** *Quare* phthisim.
TEMPUS. *Quare* anni tempus.
TENESMUS gravidæ superveniens abor-
 tire facit. f. 7 a. 27
TENUES præter naturam in utero geren-
 tes abortiunt priusquam crassescant. f.
 5 a. 44 55
TESTIS dextri frigidi prognosis. f. 8 a. 11
TETANOS frigidæ frequens usus adfert.
 f. 5 a. 17 20 Prognosis. f. 4 a. 57 f. 5
 a. 6
TIMOR & tristitia si multo tempore per-
 severent melancholicum hoc est. f. 6 a.
 23 Timores ex somnis in febribus, ma-
 lum. f. 4 a. 67
TONSILLARUM inflammatio pueris
 grandiusculis fiunt. f. 3 a. 26
TORMEN circa ventrem ex aqua mulsa
 prægnantem mulierem arguit. f. 5 a. 41
 Tor-

I N D E X

- Termina quibus adsunt, quæ curari non possunt, in sicconi hydropem firmantur. f. 4 a. 11 Citra febrem cathartico opus esse significant. f. 4 a. 20
TREMORUM in febribus ardentibus solutio. f. 6 a. 26
TURBATIO in corpore vehemens quibus sit. f. 7 a. 33
TUBERCULA quo tempore? f. 3 a. 20 Quibus fiant? f. 3 a. 26 f. 7 a. 63 Quibus ad articulos in febribus longis fiunt hi plurimis cibis utuntur? f. 4 a. 45 f. 7 a. 64 Ex tuberculi intus ruptione quid fiat? f. 7 a. 8 Iis in corpore nascentibus excretiones oportet considerare. f. 2 a. 15 In urethra nascentibus prognosis. f. 4 a. 82 f. 7 a. 57 In articulis prognosis. f. 4 a. 44 f. 7 a. 63
TUMORES laxi boni, crudi mali. f. 5 a. 67 Repentè evanescentes. f. 5 a. 65 In vulneribus majoribus non apparentes, malum. f. 5 a. 66 Tumores quibus ulceribus apparent, non convelluntur neque insaniunt. f. 5 a. 65 Tumores in articulis frigidâ curantur. f. 5 a. 25 Tumor & rubor ab angina detento in pectore accedens, bonum. f. 7 a. 49 Item foris in collo apparens. f. 6 a. 37
TURGENS materia. f. 1 a. 22. f. 4 a. 110 f. 5 a. 29
TUSSES vere fiunt. f. 3 a. 20 Hyeme. f. 3 a. 23 Parvis ac recens natis puerulis. f. 3 a. 24 Senibus. f. 3 a. 31 Movet aquilo. f. 3 a. 5 Movent frigida velut nix & glacies. f. 5 a. 24 Siccæ quibus

I N D E X

bus non ita siticulosi sunt. f. 4 a. 54
Tussi aut asthmae gibbosi ante pubertatem moriuntur. f. 6 a. 46 Tussis hydro-picis accedens, malum. f. 6 a. 35 Item desperatum est. f. 7 a. 47

V

VARICES supervenientes maniam solvunt. f. 6 a. 21 Non magni sunt calvis. f. 6 a. 34

VENÆSECTIO vere instituenda. f. 6 a. 47 f. 7 a. 53 Quomodo instituenda? f. 1 a. 3 Rectæ in fronte sectio dolenti capitis partem posteriorem prodest. f. 5 a. 68 In oculorum dolore utilis. f. 6 a. 31 f. 7 a. 46 In stranguria. f. 7 a. 48 Item in dysuria. f. 6 a. 36 Nocet gravidis. f. 5 a. 31 Dolores ex dorso ad cubitos descendentes solvit. f. 6 a. 22

VENTI (Auster & Aquilo scilicet) quos inducant morbos. f. 3 a. 5 11 12 13 14 Quomodo corpora afficiant? f. 3 a. 17

VENTER quibus aquâ impleatur? f. 7 a. 55 Circà ventrem æstus vehemens malum. f. 4 a. 65 Dolores sublimes leves sunt. f. 6 a. 7 In ventrem si sanguis effusus fuerit suppuratur. f. 6 a. 20 In ventrem superiorem catharri suppurantur In viginti diebus. f. 7 a. 38 Inter ventrem & diaphragma phlegmate concluso quid fiat? f. 7 a. 54 Ventris partes quales optimæ? f. 2 a. 35 Ventres hyeme & vere naturâ calidissimi sunt f. 1 a. 35 Ventres humidi juvenibus, senibus sic-

I N D E X

- siccantur: sicci veró, contra. f. 2 a. 20
 Ventris prognosis in morituris. f. 8 a. 17
VENTRICULUM dissectum esse, lethale. f. 6 a. 18
VER. *Vide* anni tempus.
VERRUCÆ pensiles pueris grandiusculis fiunt. f. 3 a. 26
VERMES. *Vide* lumbricos.
VERTIGO quibus temporibus? f. 3 a. 17
 23 Quâ ætate? f. 3 a. 31 Tenebricosa pessima. f. 8. a. 15 Non febricitanti vomitu opus esse significat. f. 4 a. 17
VESICÆ partes affectas esse unde colligitur. f. 4 a. 80 f. 7 a. 39 Vesicæ calculi signa. f. 4 a. 79 Ulceratæ signa. f. 4 a. 75 81 Scabiosæ signa. f. 4 a. 77 In vesicæ ejectionibus qualia sint, inspicere oportet. f. 7 a. 67 79 Calidum vesicæ prodest. f. 5 a. 22 Vulnus vesicæ, lethale. f. 6 a. 18 Vesicæ morbi difficulter sanantur in senibus. f. 6 a. 6
VICTUS instituendi ratio. f. 1 a. 9 10 Variat secundum tempora. f. 1 a. 17 18 Secundum ætatem. f. 1 a. 14 17 Et varia alia. f. 1 a. 17 Victus tenuioris ratio quando & quibus conveniat. f. 1 a. 4 5 6 7 8 10 14 17 Copiosioris ratio quando & quibus? f. 1 a. 14 15 17 Humidi omnibus febricitantibus conferunt? f. 1 a. 16 Victus ratio in paroxysmis. f. 1 a 11 19 *Vide* cibum.
VIGILIA Modum excedens, malum. f. 2 a. 3 f. 7 a. 71 Quibus ætatibus? f. 3 a 24 31 A vigilia spasmus aut delirium, malum. f. 7 a. 18

VIGEN-

I N D E X

- VIGENTIBUS** morbis nihil movendum. f. 2 a. 29 Circa vigores omnia sunt fortiora. f. 2 a. 30 In vigore morbi victu tenuissimo utendum est. f. 1 a. 8
- VINUM** solvit famem. f. 2 a 21 dyfuriam & stranguriam. f. 7 a. 48 Oculorum dolores. f. 6 a. 31 f. 7 a. 46 Morbos varios. f. 7 a. 56
- Circa **VISCERA** dolores vehementes, in alium. f. 4 a. 66
- VISUS** hebetudines inducunt austeri. f. 3 a. 5 Senibus fiunt. f. 3 a. 31 Visus deperditionis prognosis in febris continuis. f. 4 a. 49 f. 7 a 73 Plura *vide* de oculo.
- VITA** brevis est. f. 1 a. 1 Vita á calore. f. 8 a. 18
- VITILIGINES** vere fiunt. f. 3 a. 20
- ULCERA** quo tempore? f. 3 a. 20 21 24 In ulceribus á forti pulsu hæmorrhagia f. 7 a. 21 In iis tumores conspicui quid præfagiant? f. 5 a. 65 Prodest iis calor. f. 7 a. 22 Nocet frigus. f. 5 a. 20 22 Ulcera oris. f. 3 a. 21 Ulcera circumglabra. f. 6 a. 4 In antiquis os abscedit & cicatrices cavæ fiunt. f. 6 a 45 Hydropticorum non facile sanantur. f. 6 a. 8
- UMBILICI** inflammationes parvis ac recens natis contingunt. f. 3 a. 24 Circa umbilicum dolor quid significet? f. 4 a. 11 Partes crassitiem habere in morbis bonum & contra f. 2 a. 35
- UNGUES** nigri proximam mortem significant. f. 8 a. 12
- VOMITORIUM** æstate magis convenit quam

I N D E X

quàm hyeme. f. 4 a. 4 6 A vomitorio
convulsio lethalis. f. 5 a. 1 Singultus &
oculi rubri mali. f. 7 a. 3 Non convenit
difficulter vomentibus. f. 4 a. 7 Nec in
lienteria. f. 4 a. 12 Periculosum sanas
carnes habentibus. f. 4 a. 16 Quibus
conveniat. f. 4 a. 6 Vomitus quomodo
magis promovendus vel sistendus. f. 4
a. 14 15 Præparatio ante exhibitionem.
f. 4 a. 13 f. 7 a. 70 A quibus indicetur.
f. 4 a. 17 18 f. 7 a. 61

VOMITUS quo tempore magis fiat? f. 3
a. 21 Quâ ætate? f. 3 a. 24 Quid circa
spontaneum observandum. f. 1 a. 2
Prognosis ejus. f. 1 a. 23 f. 7 a. 3 In
iliaca, malum. f. 7 a. 10 Vomitus diar-
rhææ superveniens solvit eam. f. 6 a. 15
A sanguinis vomitu phthisis & puris
purgatio sursum. f. 7 a. 78 Bilis vomit-
us a cerebro dissecto. f. 6 a. 50 Atræ
bilis lethalis. f. 4 a. 22 Fit à tuberculi
intus ruptione. f. 7 a. 8 Sanguinis vo-
mitus prognosis. f. 4 a. 25 f. 7 a. 37

URETHRÆ tubercula. f. 4 a. 82 f. 7 a.

57

URINA qualis ab abscessu ad articulos
liberet. f. 4 a. 74 Nubeculam rubram
habet quartâ die, quibus septimâ die
morbi judicantur. f. 4 a. 71 Ex urina
dignoscitur præsentia calculi vesicæ. f.
4 a. 79 Carunculae aut pili de renibus
excernuntur. f. 4 a. 76 Divulsio vehe-
mentem turbationem in corpore signi-
ficat. f. 7 a. 33 Conturbatae veluti ju-
mentorum capitis dolorem significant.

f. 4

I N D E X

T 4 a. 70 Albæ. f. 4 a. 72 74 Urinæ sangui-
 nolentæ *quare* mictum sanguinis. Cras-
 sâ. f. 4 a. 74 f. 7 a. 31 Sabulosa. f. 4 a.
 79 Tenuis. f. 4 a. 69 Copiosa. f. 4 a.
 74 83 cum furfuribus. f. 4 a. 77 Cum
 squammulis. f. 4 a. 81 guttatim emissa.
 f. 4 a. 80 f. 5 a. 58 f. 7 a. 39 Cum gra-
 vi odore. f. 4 a. 81 Cum sedimento. f.
 4 a. 69 f. 7 a. 31 32 Cum bullis. f. 7
 a. 34 Cum adipe. f. 7 a. 35 Urinæ ge-
 neralis prognosis. f. 1 a. 12 f. 7 a. 66 79
 In febribus continuis. f. 4 a. 47 f. 7 a.
 69 difficultatem urinæ (sivè dysuriam)
 V. S. solvit. f. 6 a. 36 f. 7 a. 48
UTERI temperies signum fœcunditatis.
 f. 5 a. 62 Uteri os in gravidis clauditur.
 f. 5 a. 51 Cur arctetur. f. 5 a. 54 In-
 flammati signa f. 5 a. 58 Ulcerati cura.
 f. 5 a. 47 Erysipelas lethale in gravidis.
 f. 5 a. 43 Calidum utero amicum. f. 5
 a. 22
VULNERA magna sine tumoribus pessi-
 ma. f. 5 a. 66 Convulsio superveniens
 lethalis. f. 5 a. 2 Atra bilis per alvum
 evacuatio, lethale. f. 4 a. 23 Vulnera
 partium quæ non coalescunt. f. 6 a. 18
 19 24 f. 7 a. 28

F I N I S.



