Bernardi Siegfried Albini De ossibus corporis humani. Ad auditores suos / [Bernhard Siegfried Albinus].

Contributors

Albinus, Bernhard Siegfried, 1697-1770

Publication/Creation

Leidae Batavorum : Apud Henricum Mulhovium, 1726.

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/vazpwas8


License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org




SUPP 57.019/4

History of Medicine Room

Suppl. Seq. ALBINUS, B.S.







BERNARDI SIEGFRIED A L B I N I


DE

OSSIBUS corporis humani

AD AUDITORES SUOS.



LEIDAE BATAVORUM, Apud HENRICUM MULHOVIUM. MDCCXXVI.



BERN. SIEGFR. ALBINUS AUDITORIBUS SUIS S.



Rrequenter a me petiis, ut Epitomen quandam Rei Anatomicae ad usus vestros conscriberem, publi-

caremque. Conscrips, ne aut vestra caussa noluisse me, aut declinasse laborem putaretis. Atque eo libentius & studiosius, etsi otio minime abundans, hanc rem suscepi, quod interesse vestra arbitrarer, ut ducem quendam, breviter & fine erratione ad cognitionem operis impediti, & cognosci tamen dignissimi, perveniendi haberetis : & illae partes sint meae, vestris commodis studiisque, quibuscunque rebus possim, ut prospiciam & consulam. Primum autem illam partem, quae est de

de offibus, vobis exhibeo. Nam & absolutior mibi videbatur, & quoniam caeteris corporis humani partibus omnibus ossa subjecta sunt, prima tradenda. Id vero operam dedi, ut hoc libro artificium, quo verum omnium Creator totam constructionem ac formam ossium hominis adulti perfectique fabricatus est, usugue, quos omnia tum universa, tum singula, tum quaeque cujusvis eorum partes habeant, paullo accuratius breviterque complecterer. Non enim ex lectione optimorum Auctorum illa, quibus fuse lateque scriptis volumina satis magna impleverunt, in bunc libellum coarctavi, quemadmodum plevique Epitomatores : sed, postquam per Auctores profeceram, atque ipse penitius in omnes corporis humani partes introspexeram, ex ipso illo corpore ea, quae boc libro CO12continentur, sumsi. Et ut pictores ad cujuscunque vei imaginem in tabula exquisite exprimendam, toti ab. exemplari pendent, ita & ego multiplices illas variasque offium formas verbis quasi depicturus, oculos de iis ipsis nusquam dejeci. Quae vero sit utilitas, quaeque opportunitas in nobis eorum, cum ex patefactis mortuorum corporibus, tum e vivis hausi. Quo factum, ut communia ac pervulgata, & quae ex aliorum scriptis intelligi possunt, tradiderim, adjectis plurimis, quae videntur praeteriisse priores. At, neque Auctorum nomina intexenda censui, ne passim interrumperetur continua descriptio, & volumen cresceret; neque quae nova visa sunt, aut majori cura elaborata, uspiam significanda, ut ostentationis suspicionem vitarem. Praeterea autem minutissima, quae 111-

nihil attinent, veliqui. Et licet ut in lineamentis atque formis corporum bumanorum, sic in ossibus magnae dissimilitudines sint; nullas tamen varietates, quod infinitum, nec admodum frugiferum sit, eas prosequi, praeterquam insignes quasdam, easdemque frequentiores, operae pretium visum est consectari. Solas inprimis praecipuas ossum partes, quarum usus certi sunt & necessarii, & quas satis similes inter se ossa babent, simpliciter, ac nudis verbis oculis vestris subjicere, eorundemque usus exponere conatus sum. Has utique illi omnes, qui ossium utilitates percipere, ac corporis humani fabricam perspicere volunt, necesse habent diligenter penitusque cognoscere : illavum jacturam facilius patiuntur; atque eas etiam perse quisque haud difficulter asseguitur, si prius illas, quas praepraecipuas dixi, cognoverit. Jam vero quantumvis totam hanc rem ipsistantummodo verbis necessaris expedierim, non dubito tamen fore plerosque, quibus compendii alicujus modum excedere bic liber videatur. Hi, si paullo diligentius attenderint, quam multa, & quam multiplicia sint quae describuntur, facile intelligent, brevius ea omnia comprebendi non potuisse; judicabuntque, non librum qui describit, sed sceletum, cui describendo totus immoratur, magnum esse. Neque enim solis titulis ossa, & eorum partes utilitatesque indicare, aut capita tantum & Jummas colligere volui; sed uberiorem quandam epitomen concinnare. Immo vereor ne, dum breviter volui scribere, scriptum a me sit paullo obscurius : nisi forte, ut natura comparatum est, ea

nihil attinent, veliqui. Et licet ut in lineamentis atque formis corporum bumanorum, sic in ossibus magnae dissimilitudines sint; nullas tamen varietates, quod infinitum, nec admodum frugiferum sit, eas prosequi, praeterquam insignes quasdam, easdemque frequentiores, operae pretium visum est consectari. Solas inprimis praecipuas ossum partes, quarum usus certi sunt & necessarii, & quas satis similes inter se ossa habent, simpliciter, ac nudis verbis oculis vestris subjicere, eorundemque usus exponere conatus sum. Has utique illi omnes, qui ossium utilitates percipere, ac corporis humani fabricam perspicere volunt, necesse habent diligenter penitusque cognoscere : illavum jacturam facilius patiuntur; atque eas etiam perse quisque haud difficulter asseguitur, si prius illas, quas prae-

praecipuas dixi, cognoverit. Jam vero quantumvis totam hanc rem ipsistantummodo verbis necessaris expedierim, non dubito tamen fore plerosque, quibus compendii alicujus modum excedere hic liber videatur. Hi, si paullo diligentius attenderint, quam multa, & quam multiplicia sint quae describuntur, facile intelligent, brevius ea omnia comprebendi non potuisse; judicabuntque, non librum qui describit, sed sceletum, cui describendo totus immoratur, magnum esse. Neque enim solis titulis offa, & corum partes utilitatesque indicare, aut capita tantum & Jummas colligere volui; sed uberiorem quandam epitomen concinnare. Immo vereor ne, dum breviter volui scribere, scriptum a me sit paullo obscurius : nisi forte, ut natura comparatum est, ea

ea quae scripfi cum labore, etiam cum labore legi putem. Utcunque fit, adnitar certe, ut quae recisa & purgata peranguste refersi, in scholis Anatomicis dilatem vobis atque explicem planissime. Et quo facilius & melius tot tamque diversas ac mirificas offium formas & commissuras animo & quasi oculis percipere, ac memoria custodire possetis, earum praestantissimas, & intelligentium Vivorum ductu expressas imagines, quas a vobis in lectione bujus libelli assidue adhiberi ve-' lim, ubique magna cura laudavi. Longe autem omnium, quaecunque adhuc in vulgus emanarunt, principes sunt Vesalianae; & effigierum delectu, & callida partium notatione, & definientium linearum gratia, umbrarumque artificio eximiae: quocirca praesertim, & ubi potui, ad

ad eas vos relegavi. Ubi vero Eustachianas aliquid praeter eas praecipui habere, aut easdem illustrare deprehendi, ipsas quoque advocavi. Quamvis enim artificio & gratia omnino Vesalianis illis cedant, & sint quasi inchoatae; atque e juniorum offibus pleraeque ductae, simplici tamen & perspicua, ac plane electa partium designatione multo caeteris antecellunt. Porro quae in utrisque desiderantur, ex aliis paucissimis, atque iis ipsis quoque bonis, sed cum prioribus istis vix conferendis, petenda indicavi. Quinetiam cum semel atque iterum bonae imagines forte non suppeterent, eas etiam, quae vix tolerabiles sunt, praetereundas non putavi. Quanquam non desint partes, quas ne quidem male repraesentatas invenerim. Atque baec ego sic accipi volos

volo, non tanguam in sola iconum contemplatione studium vestrum omne ponendum voluerim; sed tanquam viam, ad ipsa offa recte examinanda & cognoscenda, proximam monstrare laboraverim : quae si his ducibus, & me forte interprete ac demonstratore paullo studiosius consideraveritis, impriment, & (nisi me fallit) quasi signabunt in animis vestris suam, non facile delendam, speciem. Nulla autem in re minus. diligentiae adhibui, quam in illis ofsum processibus, eminentiis, sinibus, vestigiis, & his similibus, quae musculorum caussa habent, describendis: existimavi enim illa, cum maxima ex parte ab ipsis istis mu-Jculis paullatim formentur, ad eorundem descriptionem, quam adhuc perpolio, potissimum adscribenda. Similiter offeas auditus instrumentorum

torum partes, quod seorsim cum caeteris describendae videbantur potius, quam hic inserendae, consulto reliqui. At multa tamen, quae ad ossa pertineant, praetermissa judicabitis, guum neque explicatum legetis, quem ortum habeant, neque relatum, quae sit eorum in singulis aetatibus natura & conditio, quae conformatio, quamque admirabilis interior constructio singulorum. Quae quidem omnia negligi certe non debuisse fateor, quotiescunque titulum bujus libri lego: sed cum me quotidie aliud ex alio, ne inchoata absolverem, impedierit, sinatis ut extremam limam paullisper, dum me expedio, opperiantur in scrinio meo. Interim non potui vobis, Auditores optimi, boc qualecunque opusculum debere diutius: quod si studiis ve-Aris , stris, quorum caussa mibi excidit; plane inutile non fuerit, satis praeclarum laboris, quem in eo conficiendo non mediocrem consums; fructum me percepisse existimabo. Valete! Dabam Leidae Batavor: CIDIDCCXXVI.

DE

D E O S S I B U S CORPORIS HUMANI.

1. DE OSSIBUS IN GENERE.



§Ι.

Artes corporis humani, quae fensibus percipiuntur esse durissimae, maxime stabiles, totae diversae a reliquis, aliis-

que partibus undique vestitae & tectae, ossa appellant.

2. Haec rerum Effector Homini complura, eaque magnitudine, forma, firmitate, aliisque inter fe maxime diverfa, eft fabricatus. Eademque in certam figuram aptiflime formata fummo artificio compofuit, ut quaedam ex iis inter fe jugata, alia fuperficiebus cartilagine quadam cruftatis coagmentata & ligamentis conftricta, firmiter cohaereant : alia interpofita cartilagine quafi conglutinata, nonnihil cedant vi illatae: alia A intervenientibus cartilagini fimilibus ligamentis disjuncta, & connexa, obfequantur: pleraque fuperficiebus inter fe aptis, aequabilibus, cartilagine tenui, folida, elastica, laevissima, lubricata, crustatis alia alia contingant; mobili aliquando interjecta cartilagine; & ligamentis vel stricte coagmentata paullulum & obfcure dimoveri, vel laxius constrita manifestis, pluribus, certisque motibus agi facile possint : nonnulla denique quasi pensilia, & fere tantummodo carnibus firmata, quoquoversus duci & impelli laxissime queant.

3. Atque ea nobis talia opportunifime dedit, primum ut fint & ad firmamentum ac robur, atque ad hanc ftaturam sime praestanda apta; & ad mollia corporis nostri fulcienda & stabilienda accommodata; & ad artus finiendos; & ad motus figuratos plerosque: deinde ut receptacula forment, quae tenerioribus fint praefidio; cavaque & meatus, ad usus neceffarios.

4. Ad hos igitur usus cum universa con-

conftructa fint, fingula etiam fe ad plures, pro re nata, mirifice accommodant: & cum partes caeterae pleraeque omnes vel fint in iis inclufae, vel iis prope admotae & adnexae, vel circumpofitae, fimul a preflione & actione earum faepe finguntur formanturque.

5. Offium omnium in homine compolitorum lyntaxin totam sceletum appellare confueverunt.

6. Ut autem homines extima membrorum circumcaesura variant, similiter sceletus uniuscujusque dissimilis extrinfecus est caeterorum : maxime tamen pro aetate, natione, temperie, vitae genere, & pro sexu.

7. Sed ea cum foret infinitum omnia expendere, illa oportebit delcribenda feligere, quae caeterorum norma esse possint.

8. Quare non alienum erit inftitutis nostris, primo contemplari Sceletum virilem perfectum, qui sit Viri florentis maxime aetatis, appositae staturae, sanissimi, boni habitus & temperiei, corpus suum moderate exercentis, certis A 2 tamen

2

tamen quibusdam exercitiis non multum adsueti; tum adnotare, quid ab eo discrepet Foemininus, similiter perfectus.

9. Expediet porro ad evidentiorem doctrinam sceletum primo dissolvere, partesque fingulas seorsum considerare, ut constet quales sint, & ad quos usus factae & siguratae; deinde ex iis cognitis totum rursus quasi coagmentare.

II. DE SCELETO VIRILI PER-FECTO.

10. SCELETUS' constat ex Trunco, fuffulto Pedibus; a quo pendent Brachia; qui sursum versus migrat in Collum erectum; cujus in summo Caput est collocatum.

I Vid. A, Vefalii de humani corporis fabrica Lib. I. Tabulas ultimas tres. & B. Eustachii Tabul. Anatom. XLIII. XLIV. XLV. Fig. I.

I. DE CAPITE SCELETI.

II. CAPUT SCELETI, domicilium quoddam & fedes cerebri, oculorum, nasi, aurium, oris, & mordendendi mandendique instrumentorum constat ex Calvaria & binis Maxillis.

12. CALVARIAM', os quali capitis, ofla componunt octo; duo Verticis, ad verticem & in lateribus posita'; tertium Frontis, in priori parte, & in basi'; quartum Occipitis, in parte postica & in basi'; post haec duo Temporum, infra in lateribus & in basi', ad utramque aurem unum; septimum Multiforme, caeteris omnibus interjectum, in basi & in lateribus ad tempora '; octavum Cribriforme, in basi & delitescens.

- 1 Vefal. Lib. 1. Cap. v1. Fig. 3. 4. 5. Cap. 1x. Fig. 1.
- 2 Ibid. Cap. vt. Fig. 3. I.
- 3 Ibid. Cap. 1x. Fig. 1. I. I. I. I.
- 4 Ibid. Cap. v1. Fig. 4. & 5. M. M. M.
- 5 Ibid. Fig. 3. 4. & 5. N.
- 6 Ibid. Fig. 5. 4. & 3. O. O.

13. Haecomnia calvariam potifiimum conftruunt; deinde, pro re nata, alia etiam, plura variaque, vel fola faciunt, vel cum aliis offibus ad ea fabricanda coeunt.

14.

A 3.

14. Ac primo quidem VERTICIS OSsA maximam concamerationis iftius amplitudinem faciunt; ob id ampliffima, fimplicia, extrinfecus gibba', intrinfecus concava²: eademque quinquelatera, fuis fuperioribus ³ craffis oris fimul junguntur ⁴; posterioribus⁵, fere craffiori-^a§. ²¹. bus, connectuntur cum offe ^a occipitis⁶; inferioribus iisdemque posterioribus &

b 26. crassis⁷, cum offibus ^b mammillaribus⁸; inferioribus autem ac fimul prioribus, at-

> I Vid. citat. §. 12. 2. & Spigelii de human. corp. fabr. Lib. 11. Tab. VI. Fig. 3.

> 2 Eustach. Tab. XLV I. Fig. 7. Spigel. Lib. 11. Tab. VI. Fig. 4.

3 Eustach. 1. c. 47 ÷ 20.

4 Extrinsecus, Vesal. Lib. 1. Cap. v1. Fig. 3. à B per E ad D.

Intrinsecus, Ibid. Fig. 7. O. O.

5 Euftach. 1. c. 34 - 28.

6 Extrinjecus, Vefal. Lib. 1. Cap. v1. Fig. 3. à C ad D, ab uno latere, & in fine Lib. 1. Fig. 3. B.

Intrinsecus, Ibid. Cap. v1. Fig. 6. & 7. A. A. A.

7 Eustach. 1. c. 51 - 34.

8 Extrinsecus, Vesal. Lib. 1. Cap. v1. Fig. 3. & 4. à Cad G.

Intrinsecus, Ibid. Fig. v1. à loco, ubi in futuram, cui i adscriptum, futura Ξ incidit, per Λ primum, paullo ulterius. atque iis totis paullatim extenuatis 9 fo-c 25. lidisque, cum offibus c fquamofis ¹⁰ & cum ^d multiformi ¹¹; prioribus ¹² denique ^d 34. cum offe ^e frontis ¹³, & iis maxima qui- ^e 16. dem ex parte craffis, fuis autem inferioribus ¹⁴ extremis extenuatis, & offi frontis extrinfecus infidentibus. Itaque calvariae verticem, ac prope latera, fyncipitisque partem faciunt : tota quidem fatis craffa; at craffiffima in vertice, & ad os occipitis; tenuiora in lateribus, & ad fynciput.

9 Euftach. 1. c. 46 - 33.

10 Vefal. 1. c. Fig. 3. & 4. à Gper F. ad H.

11 Ibid. ab Had A.

12 Euftach 1. c. 40 ÷ 28.

13 Extrinsecus, Vesal. 1. c. ab A ad B. ab uno latere.

Intrinsecus, Ibid. Fig. 7. Г. Г. 14 ad A. Vesal. 1. c Fig. 3. & 4.

15. Horum priori parti os FRONTIS adjungitur. Id amplum (ac futura fagittali per ejus medium ad nafi officula usque recta pertingente, rarius sectum ') quo-

I Eustach. Tab. XLVI. Fig. 1.15 - 5. Paaw primit. Anatom. de offib. p. 31. b. & pag. 38. inter b & a. Bidloo Anat. Tab. LXXVII. 2.

(8)

quodammodo orbieulatum², sed varium, plurimum ad calvariam construendam, multum ad oculorum cava, aliquid ad nasum confert.

2 Euftach Tab. XLVI. Fig. 4.

16. Ejus enim pars superior maxima eft, & ampla, atque ex interiori parte similiter concava', extrinsecus gibba 2: connectiturque sua posteriori extremitaa 14. te offibus a verticis 3 & b multiformi 4; ^b 34. & quidem superiori, eaque crassa, ejus partes, oslibus verticis; utraque autem inferiore tenuatà 6 offa verticis & multiforme subit : intrinsecus media ima parte 7 c 41. jungitur offi c cribriformi⁸. Quare cavi cal-

I Eustach. Tab. XLVI. Fig. 4.

2 Vefal. Lib. 1. Cap. 1x. Fig. 1. I. I. fuperiora, & Cap. v1 Fig. 3. L, Spigel. Lib. 11. Tab. v1. Fig. 1.

3 Vid. citat. §. 14. 13.

4 Extrinsecus in tempore, Vefal. 1. c. Cap. vi. Fig. 3. & 4. b.

5. Eustach. Tab. XLVI. Fig. 4. à 2 - 29. per 10 - 21 ad 17 - 28.

6 Ibid. fub $2 \div 29.$ & 17 $\div 28.$

7 Ibid. 15 - 34. 8 Vefal. 1. c. Fig. 6. inter m. & .

calvariae priorem partem facit: fimulque extrinsecus frontem, sua priori parte; dein superiore, syncipitis portionem; utroque latere, temporis utriusque partem: ubi frontem facit crassa; ad synciput & ad tempora tenuior; loco inter haec medio crassion.

(9)

17. Extrinsceus porro a parte priore & eadem inferiore exigit utrimque eminentia supercilia', firma & arcuata, imâque parte cava; propenafum obtufiora², tenuiora, & excipientia 3 offium maxillarium superiorum processus a; inde in a 79. exteriorem partem maxime deorsum projecta, ibique acuta4, crassa, & excipientia 5 osla jugalia b; ad oculorum fora-b 93. mina, a superioribus tota, & exparte in lateribus, finienda. His interjecta pars modice eminens, a fronte deorsum versus coarctata, tenuior, & tandem excipiens 6 officula nasi c & septum na-c 91. rium d', facit glabellae partem. 18. d 44.

- 1 Vefal. Lib. 1. Cap. 1x. Fig. 1. ab Y X ad R.
- 2 Ibid. ab X Y ad A.
- 3 Ibid. ab X ad Y.
- 4. Ibid. ab A ad R.
- 5 Ibid. R.
- 6 Ibid. ab Yad Z.

18. Ab extremis superciliis a lami-2 17. nae ' binae retrorfum, usque ad offis multiformis processus b laterales 2, ejusdemb 33. 34. que oram c eandem & priorem & supec 32. riorem 3 procedunt, iisdemque nectuntur': utraeque amplae, percenues, folidae, incurvae, atque a superiori parte gibbae & inaequabiles 4, ab inferiori concavae, aequabiles, laevesque'; fifsuras oblonga lataque, ad quam os cribriforme d'admotum, divisae. Faciunt d 41. autem utramque priorem maximamque fundi calvariae partem⁴; atque etiam oculis cedunt, eorundemque cavorum lacunaria ' maxima ex parte sunt. Jam vero, non

> I Vefal. Lib. Cap. IX Fig. 1.1. I. fub fuperciliis" Eustach. Tab. XLVI. Fig. 1.14 - 12.

2 Intrinsecus, Vefal. 1. c. Cap. vi. Fig 6. ad 3.

Extrinsfecus, Ibid. Cap.1x. Fig. 1. ab S. ad locum, qui est paullo supra G; obscurius.

3 Intrinsecus, Ibid. Cap. v1. Fig. 6. à &. per 4. ad L. & tic in altero latere.

Extrinsecus, Ibid. Cap. 1X. Fig. 1. incipiendo paullo supra G, inde supra E. ad T. obscurius. Eustach. 1. c. 12 <u>1</u> – 12 <u>1</u> supra nervi optici foramen. 2. 2.

4 Vesal. 1 c. Cap. v1. Fig. 6. inter & 4. L. I. & extimum marginem: ac sic quoque in altero latere.

5 Eustach. 1. c. Fig. 4. 34 - 10,

non longe a fissura illa, utraque in duas abit: superiorem rectam & planiorem, nexamque offi e cribriformi 6 & f multi-f 32 formi; quae lacunaris nasi pars maxima: inferiorem, ad oculi cavi convexitatem ab ea parte faciendam, deorsum incurvatam, & offi g cavernoso, h plano⁷, & g 42: i unguis⁸ nexam: itaque, qua nasum re h 43. spiciunt, diductae, ibidemque quasi cavernosae, insuper ad cryptas offis cavernosi accedunt.

6 Vefal. 1. c. Cap. v1. Fig. 6. ab I. ad L. quodammodo.

7 Ibid. Cap. IX. Fig. I. à T. ad V. Eustach. 1. c. 12 - 14. 8 Ibid. ab X. ad V. Eustach. 1. c. 12 1 - 15.

19. Tabulae offis hujus, ubi id glabellam facit, & superciliorum capita, plerumque quasi diductae, formant sinus frontales; cavernas duas ' magnas; amplissimas prope nasum, inde & recta fur-

1 Paaw Primit. Anatom. de offibus, pag 38. c. c. *. ubi in glabella effractae sunt. Et J. Palfyn de offib-Tab. II. Fig. 1. E. E. Higmor. Disquisit. Anatom-Tab xv1. Fig. 3. c. ubi una secundum altitudinem in medio secta est. B 2

furfum, & in utrumque latus, fupra oculorum cava, fere ad media fupercilia, productas, paullatimque angustatas; nonnunquam vero inaequales, 'aut laminis parvis magnisve varie discretas²: quae aperturis³ binis magnis ad priora fuperioraque offium cavernoforum ^a, ad utrumque septi narium latus patentes, nares co versus augent, mucum recipiunt, fervant, & capite erecto, vel ad posteriora leniter inclinato emittunt.

a 42.

2 Vefal. Lib. 1. Cap. v1. Fig. 6. & 7. K, & ad hujus latera utrimque. Bidloo Tab. xc1. Fig. 2. ubi ex transverso sectae sunt.

3 Higmor. 1. cit.e. Palfyn. 1. c. Tab. 1. Fig. 1.Q.

20. Posteriori ossi verticis parti os fimiliter amplum adjungitur, quod occipitis dicimus; quodque septem oris terminatum?, ad solam calvariam pertinet, & cum vertebra summa committitur.

1 Vid citat. §. 12.4. & Spigel. L. 11. Tab. v1. Fig. 5. & 6. 2 Euftach. Tab. XLV1. Fig. 9.

21. Atque ejus etiam pars superior rior ' maxima est, & ampla, & intrinsecus cava², extrinsecus gibba '; facitque calvariae posteriorem3, atque etiam inferiorem 4 partem, fimulque extrinsecus occiput 3. Jungitur autem offibus a ver- a 14ticis⁵, oris suis superioribus⁶; deinde b mammillaribus 7, oris lateralibus 8: b 26. parte superiori 3 in occipite infigniter crassa, & aequabilis extrinsecus; inferiori⁴latior, valde tenuis, solida tamen & carnibus alte immersa, ac propter ligamentorum & musculorum plurimorum adhaefionem extrinsecus inaequabilis, & asperiuscula, variaque; in medio 9 omnium craffiffima. 22.

1 Vefal. Lib. 1. Cap. v1. Fig. 4. à D. ad posteriora proceffuum, quil.l.infcripti.

2 Ibid. Fig. 7. pone Δ. Δ. Δ. & Fig. 6. à Δ., per Ξ, ad c.d. & fic in altero latere. Eustach. Tab. xLv1. Fig. 9. $a_{29} = 30.ad_{32} = 42.\& 25 = 42.$

3 Vefal. 1. c. Fig. 4. à D. ad M. C.

4 Ibid ab M.C.ad posteriora processium 1.1.& Fig. 5. ab M. M. ad proceffus i, i.

5 Vid. citat. §. 14.6.

6 Eustach. Tab.xLv1. Fig. 9. à 29 - 30. ad 23 - 36. & ad 35 - 36.

7 Extrinsecus, Vefal. 1. c. Fig. 5. à loco qui est paullulum pone C, ad proceffum i.

Intrinsecus, Ibid. Fig. 6. ab z, ad c.

8 Eustach. 1. c. à 23 - 36. ad 25 - 42. & fic in alt. lat. B 3

9 Vefal. 1. c. Fig. 6k

a 21.

22. Isti a autem parti continuata pars inferior eademque prior ' multo minor est. Ac primum lata & crassa, priora versus in angustum paullatim cogitur, & fimul craffescit; leniterque sursum versus b 27. procedens, le in osfa petrofa b infinuat, atque eis leviter adnectitur 2; fuperficie denique extrema, ampla, plana, scabra, c 32. Offis multiformis basi c adglutinatur 3; fic mediam fere fundi calvariae partem faciens; atque intrinsecus 1 laevis, inaequabilis, finuata; extrinsecus' gibba, & ad priorem partem 4 asperiuscula, firmansque ligamenta, & nonnullos capitis musculos.

> I Extrinsfecus, Vefal. Lib. I. Cap. VI. Fig. 5. 1.1. m.m.n.n.

> Intrinsecus, Ibid. Fig.6. a.c.d, ad II. Eustach. Tab. ILVI. Fig. 9 à 25 - 42. & à 32 - 42. ad 29 - 44. 2 Extrinsecus, Vefal. 1. c. Fig. 5. ad processus i. & ad m. m. priora. Eustach. Tab. XLI. Fig. 13. 48 - 73.

& 46 ÷ 72.

Intrinsecus, Vesal. 1. c. Fig. 6. z prius.

3 Extrinsecus, Vefal. 1. c. Fig. 5. n. n. Eustach. ab. XLI. Fig. 13.43 - 70.

Intrinsecus, Vefal. 1. c. Fig. 6. II.

4 Vefal. l. c. Fig. 5. inter m. m. priora, & n.n.

23. Eadem ab inferiori parte sua, ad pr10priorem partem marginis foraminis magni^a, unum utrimque *tuber* 'exigit:^a 6³. utrumque craffum, oblongum, ima parte planius, per longitudinem gibbum, & nonnihil oblique ad exteriora fpectans, laevique cartilagine cruftatum : eaque a medio magni foraminis margine incipiunt, & inde priora verfus ad fe invicem inclinant. Atque his in duos finus ^b ver-^b 125. tebrae fummae receptis, & per ligamenta firmatis, nititur caput totum, mobilibus juncturis.

I Vefal. Lib. 1. Cap. vi. Fig. 5.1.1. & Cap. xv. Fig. I.B. & inprimis C.D.E.F.

24. Porro ad inferiorem verticis offium partem unum utrimque TEMPOR IS os applicatur. Ea praecedentibus minora, & varia', faciunt calvariae partem; praecipua auditus inftrumenta continent; calvariae jugant maxillam superiorem; & maxillae inferioris articulis sedem praestant.

I Vid. citat. §. 12. 5. Spigel. Lib. II. Tab. VI. Fig. 7. & 8. Eustach. Tab. XLVI. Fig. 5. & 6.

25.

(16)

25. Utrique pars fuperior ', cui fquamofae nomen, ampla, femicircularis, tenuis, folida, planior, intrinfecus ² leviffime cava, extrinfecus ' quodammodo gibba. Eaque lateris calvariae partem magnam facit : totis oris fuperioribus paullaa 14. tim extenuatis offi ^a verticis ³ & ^b multi-^b 34. formi ⁴ extrinfecus infidens & adnexa; priori autem parte, quae craffior, nexa ^b multiformi⁵.

> 1 Vefal. Lib. 1. Cap. v1. Fig. 3.4 5. N. & Cap. 1X. Fig. 1. L.

2 Eustach. Tab. XLVI. Fig. 5. 23 - 21.

3 Vide citat. §. 14. 10.

4 Vefal. 1. c. Cap. v1. Fig. 3. H. a. Fig. 4. H. a. a.

5 Vefal. l. c. Fig. 5. paullo supra a interius, ados petrosum usque.

26. Hujus posteriori parti continuata pars Mammillaris ' minor est, & crassa, atque intrinsecus 2 cava, extrinsecus ' gibba: perficit que calvariam post aures; sua fuperiore orâ nexa ossi a verticis 3; posterib 21. ore cademque inferiore, ossi b occipitis 4.

27.

1 Vefal. Lib. 1. Cap. v1. Fig. 3. & 4. G. C. k.

2 Ibid. Fig. 6. z. A. i. Eustach. Tab. XLVI. Fig. 5. 26 - 24.

- 3 Vid. citat. §. 14. 8.
- 4 Vid. citat. 9. 21.5.

27. Inter partem squamosam a mam- a 25: millaremque b oritur pars Petrosa ' di-Eta; indeque in priora & interiora oblique procedit, inter os occipitis c, squa- c 22: mosum d & multiforme c sete interserens, d 25. iisque leviter connexa 2: sic perficit fundum calvariae ad latus ossis occipitis f; extrinsecus aspertima, praerupta, & varia.

2 Offioccipitis, Vid. citat. §. 22.2. Offi squamoso, Vefal. 1. c Cap. v1. Fig. 5.r. Offi multiformi, Eustach. Tab. x11. Fig. 13.46 ÷70.

28. Eadem autem intrinfecus' a fundo calvariae intra ejus cavum, inter eadem illa offa, altius furgens², atque infigniter craffa, oblonga, duriffima, mirifice ad auditus praecipua inftrumenta recipienda aptata & collocata eft : quin & cameram cerebri ^a & cerebelli ^a tanquam vallum di- ^a 46. flinguit; a priori & a posteriori parte quafi compressa, in medio per longitudinem eminens & acutior.

I Eustach. Tab. XLVI. Fig. 5.23 - 24. 2 Vefal. Lib. 1. Cap. VI. Fig. 6. a A. posteriori ad Y.fere.

29. Quaevis porro harum partium exigit extrinsecus processum infignem. Ho-C rum rum praecipuus est Zygomaticus'; qui la-

te & oblique in latus surgens de parte infe-

riori offis squamosi 2, mox inde in priora a 25. reflexus, gracilescens & angustatus, rursumque nonnihil latescens, totus fortis, b 93. & offi jugali blutura brevi & obliqua 2 jun-Etus, os jugale calvariae jugat, firmat; partemque jugi dimidiam facit. Alter Mammillaris³, in quem inferiora versus abit c 26. pars mammillaris c, basi latior, ab ea deorfum versus fimul & modice in priora procedens & gracilescens, intus cavernosus, tympanum auget; extrinsecus asper & ab interiori parte profunde incifus+, ad mu-

sculos firmandos accommodatus est. Tertius Styliformis, gracilis, procerus, fod 27. lidus, ab osse petroso d, non longulea processu mammillari, priora versus demissur, excipit & firmat ligamentum, vel

e 336. officula, offis hyoidis e, & musculorum nonnullorum exortui sedem praebet.

30.

- I Vefal Lib I Cap. VI. Fig. 3. & 5. X.
- 2 Ibid Fig 3 Z. & Fig. 5. Y.

3 Ibid. Fig. 3. 4. 5. k.

4 Ibid. Fig. 5. in finistro latere, prope k. interiora verfus. Eustach. Tab. XLVI. Fig. 8. 15 - 52. ex parte. 5 Vefal. 1. c. Fig. 3. 4. 5. i.

30. Postremo natura pro articulo maxillae inferioris in offis squamosi a parte 225. ima, ad exortum processus zygomatici b, b 29. fingulari artificio fabricata est, primo sinum' magnum, profundum, oblongum, ex transverso & nonnihil oblique positum, cujus pars prior laevi cartilagine crustata; deinde & tuberculum², juxta priorem illius finus partem eminens, fimiliter positum, oblongum, in medio depressius, & continua cum finu cartilagine laevi crustatum. Utraque enim illa, utriusque lateris, maxillam, sed diversis temporibus, sustinent, mobili junctura c, ac c 110. per capfam membranaceam firmata : & quidem laxitate singulari modo obsequiofa, propter lamellam 3 cartilagineam, totam tenuem, sed mediam tenuissimam⁴, elasticam, & utrimque laevem, interpofitam; quae capfae membranaceae ambitu suo adnexa, tota mobilis obsequitur, fese in quacunque capitis maxillae positu-

ra

3 Ibid. Cap. x. in margine textus. Morgagn. Adv. Anat. 11. Fig. 3. & Fig. 1. & 2. B 4 Morgagn. 1. c. Fig 1. & 2. d. C 2

I Vefal. Lib. 1. Cap. VI. Fig. 5. h.

² Ibid anteh.

ra & capiti isti, & sinui tuberculoque ossis temporum aptissime accommodans.

31. Jam vero os MULTIFORMB' fe omnibus calvariae offibus interferit; ad calvariam, ad oculorum cava, & ad nafum pertinens, atque maxillam fuperiorem majori ex parte firmans; propter ea admodum varium.

1 Eustach. Tab. XLVI. Fig. 11.12.13.16.

32. Nempe media hujus craffiffimaque
a 22. bafis ', inter os occipitis a', cribriforb 41. me b, & frontis c interpofita, fua poffic 18. ca lata plana fcabra fuperficie 2 offi occid 22. pitis d quafi adglutinatur 3. A parte autem eadem & priore & fuperiore utrimque augetur proceffu tenui 4, folido, a
bafi latiore in acutum abeunte, & fere recta in latus tendente : connectiturque cum

- 1 Vefal. Lib. 1. Cap. vi. Fig. 6. ап ad 4. Eustach. Tab. XLVI. Fig. 12. 29 - 55.
 - 2 Euftach. I. c. Fig. 11. 11 60.
 - 3 Vid. citat. §. 22.3.

4 Vefal. 1. c. in finistro latere, inter S. ζ . ψ . L. ψ . & fic in altero latere. Eust. 1. c. 26 \div 53. & 33 \div 53.

(21)

osse e cribriformi⁵, & f frontis⁶, ora te-e 41. nui. Sic facit medium eundemque non-f 18. nihil priorem calvariae fundum.

5 Vefal. 1. c. L. ¥. & fic in altero latere. Eustach. 1. c. a 27 ÷ 52 ad 30 ÷ 52. 6 Vid. citat. §. 18. s.

33. Simul etiam processus illi tenues a, a 32. cum oculorum cavis superimmineant, sua parte eadem & ima & extrinseca ', eaque laevi, istorum cavorum portionem posticam eandemque superiorem, quae est pone os frontis ^b, & circum optici ner-^b 18. vi ^c ingressum ', faciunt : ab ea parte nexi d 18. ofli ^d frontis ³, & ^e cavernoso, & ^f plano ⁴. e 42. f 43.

I Euftach. Tab.XLVI. Fig.16. 27 ÷ 75. & 30 ÷ 75. 2 Vefal. 1. c. circum E, obscurius. Eustach. 1. c. circum 12¹ ÷ 12.

3 Vid. citat. 9. 18.8.

4 Vesal. Lib. 1. Cap. 1x. Fig. 1. a T. fere add. Eustach. 1. c. Fig. 1. 13 - 121

34. Ex media hac basi a utrimque ena- a 32. scitur processus ' lateralis maximus; qui ca-

I Eustach. Tab.xLv1.Fig.12.25 ÷ 55.& 33 ÷ 55. & fic in Fig. 11. 13.16. C 3 cavatus intrinfecus ², in priora fimul & exteriora & furfum verfus procedens, atque ex lato paullatim coarctatus, fe pulb 27 chre interferit inter os petrofum ^b, fquac ²⁵ mofum ^c, verticis ^d, & frontis ^e; iis od ¹⁴ e 16.18 mnibus nectitur ³; & fundi calvariae partem, quae est post oculorum foramina, utrimque perficit.

> 2 Vefal. Lib. 1. Cap.v1 Fig. 6. inter Y. R. E. E. Ç. S.
> 3 Petrofo, vid. citat. §. 27 2. ultim. Squamofo, vid. citat. § 25.4 & s. Verticis, vid. citat. § 14.11. Frontis, in tempore, vid. citat. §. 27.2. ultim. intrinsfecus, parte priori. Vid. cit. §. 18.4. in oculi cavo, vid. citat. §. 18.7.

a 34. 35. Uterque iste processus a ab exteriori parte' medius secundum longitudinem in priora simul & exteriora insigniter quasi productus, & ex crasso paullatim
b 93. extenuatus, os jugale b versus procedit; donec ei nectatur' extremitate ³ oblonga, re-

1 Eustach. Tab.xLv1. Fig. 13. & 16. conf. cit. §.33. 1.

2 Vefal. Lib. 1. Cap. vi. Fig. 3. 4. 5. d. in tempore.

Ibid. Cap. IX. Fig. I à Q ad S. in oculi cavo sinistro: Q. in dextro.

3 Eustach. 1. c. Fig. 13. 41 ÷ 61. & 53 ÷ 61. & Fig. 16. 23 ÷ 76. & 34 ∵ 76. recta, tenui, oblique pofita. Sic duo acquirit latera externa: quorum unum + ad tempus pertinet; amplum, oblongum, cavatum, oras versus extenuatum: alterum ⁵ ad oculi cavum; praecedente latius, planius, laeve; quo fit pars dicti cavi exterior & eadem postica⁶, eaque longe maxima, quae est inter ossa frontis c, c 18, multiforme ^d ipfum, palati ^e, maxillare ^d 89. fuperius f, & jugale g. f 82.

g 93.

4 Euftach. 1. c. Fig. 13. 41 \div 62. & 54 \div 62. & Fig. 16 23 \div 77. & 35 \div 77. Vefal. 1. c. Cap. vi. Fig. 3. a. H. A. b. d. & Fig. 4. inter a. a. H. A. b. d. 5 Euftach. 1. c. Fig. 13. 43 \div 611 & 51 \div 611 & Fig. 16. 25 \div 76. & 33 - 76. 2. 2. 6 Vefal. 1. c. Cap. 1X. Fig. 1. N. in dextro, G. H. in finiftr.

36. Ab utriusque porro eorundem procession a parte eadem & extrinsecaa 34. & ima & etiam postica, ubi basi b conti-b 32. nuatur, deorsum & nonnihil priora versus processus alisormis ' procedit. Hi insti-

I Euftach. Tab. X L V I. Fig. II. $81 \div 63$. & $131 \div 63$. Fig. 16. 26 ÷ 78. & $31 \div 78$. infignes, proceri, craffi, ac pone maxillam fuperiorem, ad partem ejus imam usque², demiffi, ibique dehiscentes³,
c 90. & nexi⁴ offibus palati^c, maxillam fuperiorem a posteriori parte aptissime firmant.

2 Vefal Lib. 1. Cap. v1. Fig. 4. P.

3 Parte priori, Eustach. 1. c. 27 - 80. & 32 - 791

Parte postica, Ibid. Fig. 11.7 ÷ 64. & 13 ÷ 64. 4 In nasi foraminibus, Vesal. 1. c. Fig. 5. q. Extrinsfecus, Ibid. Fig. 4. sube. Inferiori parte, Eust. Tab. XLI. Fig. 13.46 ÷ 67¹

& 45<u>1</u> ÷ 68.

37. Processus praeterea aliformis uterque a sua postica parte per totam fere longitudinem profundissime cava-2 90. tus ', cum parte ossis palati ^a quam infra admittit, format cavum alare², magnum, profundum, oblongum, ad excipiendos musculos. Quin &

I Eustach. Tab. XLVI. Fig. 11. 81 ÷ 63. & 121 ÷ 63.

2' Vefal. Lib. 1. Cap. v1. Fig. 5. P. inter 2 & 3. & inter 4 & 5.

& paries cavi istius interior 3, lamellae fimilis, longus, non admodum latus, retroversus & extrorsum leniter plerumque incurvatus, cum adplicata osfis palati parte^b, latus foraminis narium, b 88. quod ad fauces patet, facit : finu leni, oblongo, quem habet a parte eadem & posteriori & superiori, ad exteriora, locum & originem praebet musculo pterygostaphylino externo; cujus alterum extremum fustinet & corrigit hamulus⁴ tenuis, extrorlum incurvatus, in quem paries iste imâ sui parte abit. Paries autem exterior 5, fimiliter lamellae fimilis, multo latior, magisque retroversus eductus, & ad exteriora inclinans, musculorum pterygoideorum maxillae inferioris origini locum commode praestat.

(25)

38.

3 Euftach. 1. c. $9 \div 63$. & $12 \div 63$. & Fig. 16. 28 $\div 80$. & $31 \div 79$. Vefal. 1. c. Fig. 4 & 5. P. 3. 4. 4 Euftach. 1. c. Fig. 16. 27 $\div 80$. & $31 \div 80$ & Tab. XL1. Fig. 13. 46 $\div 68$.

5 Euft. Tab. XLVI. Fig. 11. 8 ÷ 64. & 14 ÷ 64. & Fig. 16. 26 ÷ 80. & 33 ÷ 79. Vefal. 1. c. Fig. 4 & 5. P. 2. P. 5.

38. Medius inter hos processus, a media exteriore partis crassilimae ossis a 32. totius regione a recte exfurgens, oblongus, humilis, in tenue, oblongum, gibbumque definens, parte postica per b 95. finum vomeris b receptus, id os firmat; antica autem excipit pariterque firmat c 44. offis cribriformis laminam mediam c. 39. Pars oslis totius media a, a prioa 32. ri parte, ubi crassissima apparet, plerumque cavernas habet, utplurimum binas', septo 2 tenui rectoque divisas, qui sinus sphenoidales: hae saepe plures, magnae parvaeque, in latera sub 36. pra processus aliformes b, & retrorsum c 22. per os occipitis c, vel ad magnum fod 68. ramen d usque, aliquando procedunt: semper foraminibus 3 binis, quodammodo ovalibus, ad posteriora & supee 44. riora narium, prope septum e earum, ab

> I Vefal. Lib. 1. Cap. v1. Fig. 8. C. D. & J. Drake Anthropol. Lib. 111. Tab. xv11. Fig. 4. F. Paltyn ofteol. Tab. 1. Fig. 1. P. Tab. 11. Fig. 3. L. L.

> 2 Ibid. E. Palfyn I. c. Tab. 1. Fig. i. ad * & Tab. 11. Fig. 3. f.

> 3 lbid. F. Palfyn l, c. Tab. 11, Fig. 2. H. H. & Fig. 3. M. M.

ab utroque latere patent; itaque nares augent, mucum in se recipiunt, servant, & capite prono emittunt.

40. Os CRIBRIFORME.', praecedentibus multo minus, & forma varium, minimum confert ad calvariam, plurimum ad nares, & ad oculorum foramina.

1 Vefal. Lib. 1. Cap. v1. Fig. 8. A. A. collat. cum Fig. 6. I. L. &c. & Cap. 1x. Fig. 1. Θ& O. Euftach. Tab. xLv1. Fig. 14. 12. 13. 16. 11.

41. Laminis fuis binis ' fuperioribus, quae proprie funt os cribriforme, longis, non admodum latis, tenuibus, folidis, criftae galli a utrimque continua- a 47. tis, & receptis in fiffuram b offis fron- b 18. tis, ei 2 & offi c multiformi 3 undique c 32. firmiter connexis', perficit denique & hic loci cavum calvariae; id feparat a naribus; harumque eft lacunar.

Vefal. Lib. 1. Cap. v1. Fig. 8. A. A. Euftach.
 Tab. XLV1. Fig. 12. 28 → 51. & 30 → 51. Vefal.
 I.c. Fig. 6. ab 1 ad L, & fic in altero latere.
 2 Vid. citat. § 16.8. & §. 18.6.
 3 Vid. citat. §. 32.6.

42. Ex iis ^a autem pendent partes a 41. D 2 bi-

binae', utrimque una, magnae, tenerae, fragiles, cavernosae cum raritate quadam, facientes meatus amplos, multiplices, plerosque tortuos; nexae intrinsecus superiori parte offi frontisb; b 18. priori primo maxillaribus superioribusc, c 79. hinc posteriora versus oslibus unguis d, d 92. tum iterum maxillaribus superioribus e, e 78. deinde palati f, postremo multiformi g; f 89. g 33. quae singulae tandem parte ima, qua se mutuo respiciunt, abeunt in lamel-32. lam, primo tenuem & extrorfum incurvatam, tum crassiorem convolutamque, oblongam, scabram, porosam, liberam, quod os spongiosum superius 2. Sic in nares demissae opplent earum superiora; muci narium sunt officinae; faciunt que aërem cum contentis per has narium regiones longo errore ferri, & in iis aliquandiu retineri.

> I Euflach. Tab. XLVI. Fig. 13. ad latus utrumque 48 - 60.

2 Ibid. $46 \stackrel{\mathrm{I}}{\rightarrow} \stackrel{.}{\leftrightarrow} 60.$

43. Quoniam vero sic ex alto demifmiffae ^a fimul neceflarie oculorum fo- ^a 42raminibus interjiciuntur, natura opportune lateri cujusvis externo, quod eft ad oculi foramen, maxima ex parte obduxit cruftam tenuem, folidam, pellucidam, quodammodo quadrangulam, planiorem, politam, quod os planum'; connexam fuperiori parte offi ^b fron-^b 18. tis ², priore offi ^c unguis ³, inferiore ^c 92porro maxillari ^d fuperiori ⁴ & ^e palati, ^d 82pofteriore denique ^f multiformi ^s; quae ^f 33lateris oculi foraminis interni partem pofteriorem ['] maximamque facit, atque a naribus id dividit.

I Vefal. Lib. I. Cap. IX. Fig. I. O. inter V. c. d. T. V.

2 Vid. citat. §. 18. 9.

3 Vefal. 1. c. Cap. 1X. V. c. Euftach. Tab. XLVI. Fig. 1. 15 - 13.

4 Vefal. 1. cit. c. d. Eustach. 1. c. 13 1 - 13.

5 Vid. citat. §. 33.3.

44. Tandem lamina ' lata crassaque, quae ab ima ossis cribriformis a parte in a 41. medio, inter partes cavernosas b, re-b 42. Eta

I Eustach. Tab. XLVII. Fig. 3. 16 ÷ 4. D 3 c 17. ri parte offibus frontis c nafique d, postd 91. ica superiore multiformi c, postica e 38. inferiore occurrit 2 vomeri f; est pars f 95. fepti narium superior maximaque 3.

2 Ibid. 17 ÷ 5.

3 Euft. 1. c. Vefal. Lib. 1. Cap. 1x. Fig. 1. O.

45. Offa haec omnia, partibus suis a 14. descriptis a inter se apta & firmiter 16.13. connexa, formant conceptaculum uni-21.22. 25. 26. cum, per se constans & immutabile, 27. 32. fornicatum, capax, periculis quae ex-34.41. trinsecus afferuntur propulsandis aptissimum; a posteriori parte fere globosum, planius tamen fundo & varium, capacissimum; inde ad priora angustatum & productum in additamentum, vertice & praesertim lateribus ad interiora depressius, fundo altius, varium, & prope convexum, paullatim priora versus coangustatum, donec terminetur concavum & angustius ': quod cerebrum, ce-

> 1 Inter se confer Vesal. Lib. 1. Cap. v. Fig. 1. & Cap. v1. Fig. 3. 5.6. & 7. & Cap. 1X. Fig. 1.

cerebellum, & medullam oblongatam, maxima, tenerrima, & ad vitam ac humanitatem fummopere neceffaria vifcera excipit, recondit, incolumia fervat; fimul & oculis, auribus, ac quodammodo naribus quoque, cedit & locum dat.

46. Sic factum conceptaculum dispertitur in cameras veluti duas. Earum una est cerebelli, eadem & minor & etiam posterior & inferior, sita pone offa multiforme ^a & petrofa ^b, atque a ^a 32. fuperiori parte terminata primo fub-^b 28. superiori parte terminata, primo subrecta postica osfis c multiformis parte', c 32. tum offium petroforum d summis, post-d 28. remo eminentia², quae ex offibus mammillaribus e & occipitis f, propee 26. ossa petrosa g, e regione summitatum f 21. eorum, utrimque leviter exfurgit, &^{g 28}. per cavas offium mammillarium h & h 26. occipitis i partes, ad regionem offisi 21. occipitis mediam craffissimam k usque, k 21. prope horizontaliter, exporrigitur. Altera cerebri superior & major, caetera cavi

- I Vefal. Lib. I. Cap. vi. Fig. 6. inter M. & П.
- 2 Ibid. Cap. x11. Fig. 3. fub k. i. i. & k. h. h.

cavi calvariae occupat, a parte poste-1 28. riore inferioreque, inter ossa petrola¹, terminata eminentià alterà 3, fimili, utrimque ab offium petroforum fummism, m 28. n 14. per ossa verticis n & occipitis o, ad spe-0 21. ciem prioris, paullo altius, ad partem offis occipitis mediam crassifimam-P 21. que P usque procedente.

3 Ibid. fupra k.i.i. & k.h.h.

47. Quin etiam camera utraque, a priori parte calvariae per superiora ad posteriora & inferiora, quodammodo bipartitur, primo crista galli', proa 41. cessu ex osse cribriformi a a posterioribus in priora admodum exsurgente, crasso, utrimque planiore, sursum versus in acutum extenuato, solido (intus saepe cavo & ad priora nasi patente), quem b 44. producit ' lamina media b offis cribriformis: tum foramine caeco3, exiguo, quod

> 1 Vefal. Lib. 1. Cap. v1. Fig. 8. B. Eustach. Tab. XLVI. Fig. XII 29 - 50. Vefal. 1. c. Fig. 6. n. 2 Eultach. Tab. XLVII. Fig. 3. 15 - 11 3 Vefal. 1. c. Cap. x11. Fig. 2. m.

quod est in media regione ossis frontis c intrinseca imaque : dein eminen-c 16. tia 4 acuta, plerumque a dicto foramine per medium os frontis d suturam d 16. fagittalem e versus aliquantum exporre- e 54-Aa, paullatim evanescente, & abeunte in eminentias duas 5, leves, modice distantes, primo per os f frontis6, tum f 16. per offa g verticis 6 propter suturam sa-g 14. gittalem, dein per os h occipitis o me-h 21. dium, ad partem ejus mediam crassifimamque i usque procedentibus : post-i 21. remo eminentia 7 altius subrecta, acuta, a parte ossis occipitis media crassissimaque porrecta ad limbum magni foraminis k; in medio tenuiore, extre-k 68. ma versus latescente.

(33)

4 Spigel. Lib. 11. Tab. v1. Fig. 2. a C, B verfus. Vefal. 1. c. Cap. XII. Fig. 3 & 4. pone K. 5 Spigel. 1. c. ad latus B. B. utrumque. 6 Vefal. 1. c. Cap. XII. Fig. 4, ad latus 1. 1. 1. u-

trumque, usque ad k. Figurae 3.

7 Ibid. Fig. 3. a k. magnum foramen versus.

48. Ab his a enim, & ab eminentiis a 47. transversariis b, cum ossium mammil-b 46. E lalarium & occipitis, tum offium verticis & occipitis, fummisque offium petroforum ^b, & fubrecto multiformi ^b, quae diftinguunt calvariae cameras, oriuntur membranae dividentes, falx quaedam cerebri & cerebelli, & proceffus transverfarii, membranae durae.

49. CAMERAE CEREBELLI fcrobes ' binae, amplae, fatis profundae, aequabiles, laeves, impreffae maximam
a 21. partem in ofle a occipitis ', tum & in
b 26. partibus offium temporum b mammillac 28. ribus 3, pofterioribusque c petroforum 4,
d 47. eminentia media d divifae 5, carnibus alte immerfae, globos cerebelli duos inferiores excipiunt, & tutos ab omni periculo extrinfecus accipiendo confervant.

I Vesal. Lib. I. Cap. VI. Fig. 6. circiter inter d. c. A. i. i. k. ad foramen magnum.

2 Ibid. inter d. c. z. & inde fub i. i. k. ad foramen magnum. Spigel. Lib. 11. Tab. v1. Fig. 6. G. G.

3 Vefal. l. c. inder g & z. posterius.

4 Ibid. supra i primum.

5 Vid. citat. §. 47. 7.

50. Sinus autem qui a priori hujus parparte, inter subrecta utrimque offa petrofa ^a, in offe occipitis ^b maxime impref- ^a 28. fus ¹ eft, oblongus, ab offe multiformi ^c ^b 22. recta ad marginem magni foraminis ^d ex. ^d 68. porrectus, admodum declivis, medullam oblongatam excipit, & deducit ad foramen magnum.

I Vefal. Lib. I. Cap. VI. Fig. 6. а П ad e.

51. CAMERA CEREBRI, vertice & ateribus (factis ab offibus verticis ², fron-a 14. (15^b, multiformi ^c, fquamofo ^d, & occipi-^b 16. (15^c) fornicata ¹, ad priorem partem & d 25. etiam ad averfam in fcrobes, utrobique ^e 21. binas, amplas, priores tamen minores, offibus ^f frontis ² & ^g occipitis ³ impreffas, f 16. abit: fundum habet, ante offa petrofa ^h ^g 21. htrimque in lateribus, primo amplum, fatis profunde cavatum ⁴, factum ab offibus

I Vefal. Lib. I. Cap. VI. Fig. 7.

2 Ibid. Fig. 6. ad latus m utrumque.

3 Ibid. Fig. 7. ad latus 1 posterioris utrumque. pigel. Lib. 11. Tab. v1. Fig. 6 F. F. 4 Vefal 1 c Fig. 6 circiter inter Aposterius V

4 Vefal. 1. c. Fig. 6. circiter inter A posterius, Y. 5. z. A. A posterius. E 2

(36)

h 28. fibus h petrofiss, i squamofiss, & k multi-1 25. formi7; deinde priori parte angustiok 34. rem, & propter oculorum foramina multo elatiorem, convexum, & a posterioribus in priora & exteriora paulla-1 32. tim elatum 8, factum ab offe 1 multiformi^{9 m} frontisque ¹⁰; tota acquabilis; nisi m 18. ubi cerebri eminentiis ", vasisque cedit, & duram membranam firmat 12. Haec. cerebri dicta hemisphaeria tuberaque in fe aptislime recipit & fustinet.

> 5 Ibid. ab A poster. ad Y. per R. ad locum inter A. A. medium.

> 6 Ibid. a loco inter Λ . Λ . medio, ad R. per Σ . Σ . Λ . ad locum inter Λ . Λ . medium.

7 Ibid. ab R. per $\Sigma \Sigma \zeta S Y$ ad R.

8 Ibid. a ζ ad S per γ . L. I. ad m. & inde per exteriora iterum ad ζ .

9 Ibid. 2. S. v. L. 4. ζ.

10 Ibid. g. v. L. I. m. & inde iterum ad g.

11 Vide citata univers. §. huj.

12 Vefal. l. c. Fig. 7.Ω. Ω. Bidlo Tab. xc1. Fig. 2. hinc & inde.

52. Sed medius fundus ' camerae istius, a subrecta postica ossis multiformis

1 Vefal. Lib. 1. Cap. v1. Fig. 6. inter Y. E. L. I. m. & fic per alterum latus. mis parte ^a ad priora usque non admo-^a 46. dum latus, planior, prope horizontalis; interjicitur posteriori parte lateribus ampliter cavatis fundi hujus camerae ^b, iisque multo est elatior; priori ve-^b 51. ro lateribus ejusdem gibbis eminentibusque ^b, iisque depression; factus ab offe ^c multiformi ² & ^d cribriformi ³: parte c 32. postica fustinet medullae oblongatae ^d 41. principia & cerebrum; priori autem superimminens naso sufficient processus mammillares, defensos eminente utrimque fundo, & divisos per interpositam cristam galli ^c. e 47.

2 Ibid. Y.E.L. 4. & fic per alterum latus. 3 Ibid.L.I.m. & fic per alterum latus.

53. Postremo pars medii fundi postica opportunissime sinuata est, sinu profundo', habente fundum ' aequabiliter cavatum, & terminato a parte posteriori sub-

I Vefal. Lib. I. Cap. VI. Fig. 6. inter Y. F. & fic per alterum latus. 2 Ibid. M.

E 3

a 46. subrecto ossis multiformis a pariete3, a b 38. priori eminente b multiformi 4 & proceffibus ejus clinoideis 5; lateribus autem patente, & clauso dura membrana; quae sella equina; ad recipiendam, & defendendam pituitariam glandulam.

3 Ibid. inter M & n.

r Ibid. pone y.

a 45.

54. Porro haec ossa a, qua alia alia contingunt, alibi in eminentias ' plurimas, hic magnas, illic parvas, hic re-Aas, acutas, illic obliquas, curvatas, latescentes, variis migrant modis; hisque alia aluis firmiter intexuntur, & quafi serratis pectinatim struuntur compagibus: alibi utraque in squamam tenuantur, unumque alteri late insidet, & eminentiis emissis exiguis connectitur; ut in unoquoque loco opportunum est. Atque hinc oriuntur suturae cranii propriae: hae infignes, latae, & admodum implicatae; aliae exiliores & fimpli-

I Vefal. Lib. I. Cap. VI. Fig. I.

⁴ Ibid. F.

pliciores; jamque aliae imbricatae, aliae consutos referentes pannos, pluribus modis; nec ipfae fibi ubique fimiles : omnes autem extrinsecus manifestiores, & ibi praelertim inter se dissimiles; intrinsecus exiliores, & obscuriores, & etiam fimpliciores : prima Coronalis², transversa, ad tempora per synciput tendens circulari specie, cum additamentis interioribus suis 3 : tum Lambdiformis +, similiter transversa, ad aures per occiput tendens, ad utramque aurem late disjuncta, in ipfo ad-Icenfu in mucronem abeuns; cum addicamentis inferioribus⁵, deductis ad mediam calvae basin : tertia Sagittalis 6, recta, a mucrone lambdiformis per me-Hium verticem & synciput ad mediam coronalem recta procedens, & modo bi definens, modo frontem fecans, & inter supercilia finiens7: post hanc duae Squa-

2 Vid. citat. §. 14. 13. 3 Vid. citat. §. 18. 4&5. 4 Vid. citat. §. 14. 6. 5 Vid. citat. §. 21. 5. & 22. 2&3. 6 Vid. citat. §. 14.4.

7 Vid. citat. 9. 15. 1.

Squamosae conglutinationes⁸, super aures utrimque a temporibus per capitis longitudinem porrectae, semicirculari specie; cum additamentis posterioribus 9 rectis, & prioribus transversis 10: & quae os cribriforme intrinsecus circumscribit "

(40)

8 Vid. citat. § 16.4. & 14. 11 & 10. 9 Vid. citat. 9. 14. 8. 10 Vid. citat. §. 15.4& s. & 27.2 ultim. 11 Vid. citat. 0. 4.1. 2 & 3.

55. Ut tamen exstructum ex his cona 45. ceptaculum a admitteret a corde venientes arterias, emitteret & ad cor tendentes venas, & medullam spinalem, & nervos in corpus ducendos cum membranis, multis necessario distinctisque foraminibus artificiole pervium redditum eft; maxime in medio fundo.

56. Horum prima ' censentur offis a 41. cribriformis^a, plurima, exigua, quaedam circularia, alia ovalia, oblonga alia, partim recta, partim nonnihil obliqua, quae totum id os cribro simile

fa-

a stal shall and

I Vid, citat. 9. 41. 1.

faciunt; omnia a calvariae cavo ad nares perforantur; & fibras nerveas a fuperincumbentibus processibus mammillaribus plurimas, aliasque, cum vasculis & membranis, ad nares admittunt.

57. Par fecundum, offis multiformis, ore 'magno & quodammodo orbiculato utrimque incipit in fummo offis multiformis ^a, inter ejus bafin, hu-a 32: jusque quibus latefcit proceffus tenues; nde in priora & exteriora per idem os procedit, & tandem ad posteriora foraminis oculi patet². Emittit nervos opticos; quorum continuitas medio inter haec foramina offi incumbens, veftigium³ ei lene imprimit. Emittit & liverticulo quodam⁴ arteriolas ab interna carotide ad foramina oculorum.

58.

1 Euflach. Tab. XLVI. Fig. 12. $28 \div 54 \stackrel{1}{=} & \\ 54 \stackrel{1}{=} & Vefal. Lib. 1. Cap. XII. Fig. 3. E.$ 2 Vefal. 1. c. Fig. 1. E. Euflach. 1. c. Fig. 1. $2 <math>\stackrel{1}{=} \stackrel{1}{=} 12.$ 3 Vefal. 1. c. Fig. 3. F. 4 Ibid. γ .

58. Par tertium, utrimque incipit . a 32. ad latera baseos a ossis multiformis, sub processibus hujus tenuibus, inter eos & processus ejusdem laterales b, principio 6 34. quodammodo orbiculato; adícendendo autem in latus & paullisper priora versus in rimam magnam angustatur 2, c 18. & apposito tandem osse frontis c terminatur; totum statim ad postica & fuperiora foraminis oculi patens³. Pertransire sinit nervorum paria, tertium, quartum, quinti ramum primum, fextum, arteriolas, venulasque.

> I Vefal. Lib. I. Cap. XII. Fig. 3. G. 2 Eustach. Tab. XLVI. Fig. 11.9 - 61. & 13 - 61.

intrinsfecus. Fig. 16. 27 - 76. & 31 - 76. extrinfecus.

3 Vefal. 1. c. Fig. 1. G.

59. Par quartum, offis multiformis^a, multo angustius, fere teres, ua 34. trimque incipit ' pone praecedens, non b 53. longe a fella equina b, ubi os ab ea decli-

> 1 Eustach. Tab. XLVI. Fig. 12. 26 - 55. coll. cum Fig. 14. 26 - 69. Vefal. Lib. 1. Cap. XII. Fig. 3.H.

clive ad latus fertur; inde in priorem partem nonnihil extrorfum procedens, tandem patet ' e regione partis foraminis oculi posticae imaeque 3. Emittit ramum paris nervorum quarti secundum.

2 Euflach. 1. c. Fig. 16. 26 \div 77. & 32 \div 77. Fig. 13. 50 \div $63^{1}_{2.}$

3 Vefal. 1. c. Fig. 1. H.

60. Par quintum, totum plerumque offis multiformis, praecedenti multo majus, ovale, oblique pofitum, a fuperiori ' offis multiformis a parte, ubi a 34. id petrofo & squamoso nectitur, pone praecedens, recta deorsum ad posteriora & exteriora processum aliformium patet². Emittit ramum paris nervorum quinti tertium, maximum.

61.

1 Euftach. Tab. x L v 1. Fig. 12. 25 \div 57. & 33 \div 57. coll. cum Fig. 14. 24 \div 71. & 34 \div 71. Vefal. Lib. 1. Cap. x11. Fig. 3. Q. 2 Euftach. 1. c. Fig. 13. 44 \div 66. & 51 \div 66. Vefal. 1. c. Fig. 2. Q.

F 2

61. Par sextum', quo recta utrimque perforatus est ultimus oslis multia 34. formis a angulus, qui se inter os squamosum & petrosum interserit, valde angustum, & orbiculatum, arteriolas, utrimque unam, ad duram membranam admittit; venulas emittit. Ab his per internam lateris calvariae partem furfum procedunt vestigia ' oblonga, referentia truncos quasi majores & profundos, furfum versus & ad partem priorem & ad posteriorem paullatim angustatis diffusos ramis, & maxime in offibus fquamofis, multiformi, verticis 3 & occipitis impressa; quae iisdem vasis in exteriorem durae membranae partem ductis cedunt: ad haec alia fimilia in offe frontis 4 accedunt.

> 1 Extrinsecus, Eustach. Tab. XLVI. Fig. 13. 48 - 67. Vefal. Lib. 1. Cap. XII. Fig. 2. R. Intrinsecus, Eustach. 1. c. Fig. 12. 25 - 58. & 34 - 58. Vefal. 1. c. Fig. 3. R. 2 Vefal. 1. c. Fig. 3 & 4. T.T.T.T.T. 3 Eustach. 1. c. Fig. 7. 4 Ibid. Fig. 4.

62. Par septimum, sunt canales am-

ampli & tortuosi, qui utrimque incipiunt' extrinsecus in imo medioque offe petrofo a, ore magno & ovali; & moxa 27. ad priora incurvati, per partem offis petrosi dimidiam priorem totam procedunt, introrsum oblique in priora; tandem ab extremo petrolo 2 furium & nonnihil ad priora incurvati, patent³ ad cavum calvariae, ab utroque subrecti offis multiformis b latere, ore magno & b 46. ovali, facto a coeunte osse petroso excremo cum multiformi c: hi in calva- c 32. riae cavum admittunt arterias carotides 34. Atque hae porro fub dura internas. membrana procedentes, leniter in osse multiformi d'imprimunt vestigia, quaed 32. ab his aperturis ad sellae equinae e la-e 53. tera, ubi primo ab ea declives ad latera recessus funt, in priora leniter adscen-Hendo excurrunt, & tandem rectius mo-

(45)

I Vefal. Lib. 1. Cap. XII. Fig. 2. X. Euftach. Tab.
XLI. Fig. 13. 40 ÷ 72. & 47 − 72.
2 Euftach. Tab. XLVI. Fig. 5. 21 ÷ 26. & Fig. 6.
3⁸ ÷ 23.
2 Vefal. L. c. Fig. 2 X. guodemmodo.

3 Velal. 1. c. Fig. 3. X. quodammodo.

F 3

modice interiora versus adscendentia, & ultimo quasi retrorsum incurvata, finiunt 4 statim pone par foraminum sef 57. cundum f, ab exteriori parte eductis posteriora & interiora versus processibus clinoideis terminata.

> 4 Vefal. 1. c. Fig. 3. pone E. Eustach. Tab. XLVI. Fig. 12. 28 ÷ 55. & 30 ÷ 55.

63. Par octavum, amplum, offis pea 28. trofi a, in posteriore fere media ejus regione incipiens', & inde ad exteriora retrorsum oblique procedens, admittit par nervorum septimum, cum molle tum durum: extremo suo maximam partem ad cochleam & ad vestibulum auris pertinet, eoque deducit portionem mollem; a parte autem eadem & superiori & posteriori abit in canalem angustum, aquaeductum a Falloppio dictum, procedentem per tympanum, donec inter procession mammilb 29. larem b & styliformem b extrinsfecus pateat

> 1 Eustach. Tab. XLVI. Fig. 5. 22 - 25. Vesal. Lib. 1. Cap. XII. Fig. 3. a.

(47)

teat foramine caeco², ad emittendam portionem duram.

2 Vefal 1. c. Fig. 2. b. Eustach. Tab. XLI. Fig. 13. 38 - 73.

64. Par nonum, sunt hiatus ' ampli, quasi interrupti, utrimque factiab osse petroso a coëunte cum osse occipi- a 28. tis b; uterque quodammodo geminus, b 22. parte interiora spectante, angusta, emittit par nervorum octavum, & ad id accedens spinale; parte, quae exteriora spectat, multo ampliore, emittit lateralem durae membranae finum, & ad duram membranam admittit arteriolam: hujus autem finus amplum in quod migrat diverticulum in se recipit spatium² magnum, fere circulare, quod est ad basin calvariae inter processium styliformem c & tuber ossis occipitis d, par-c 29. tim ab osse occipitis e, partim etiam a d 23. petrofo f factum. f 27.

65.

F Vetal. Lib. 1. Cap. XII. Fig. 3. c. 2 Ibid. Fig. 2. c. Euftach. Tab. XLI. Fig. 13. 40 ÷ 73. & 48 ÷ 73.

65. Tendunt autem infignia ad istos hiatus vestigia, a durae membranae sinibus in calvaria intrinsecus impressa. a 47. Primum' a foramine caeco a inter emib 47.4. nentias descriptas b per medium os fronc 16. tis c, tum per ossa verticis d fere sub d 14. sutura sagittali, & tandem per os occie 21. pitis e medium ad partem ejus crassisimam e recta incedit, ex angusto principio paullatim latescens; donec in duo abeat lateralia², ampla, quae a medio crassifimoque osse occipitis e ad latus utrumque, fere horizontaliter, procedunt, primo inter eminentias descrif 46. ptas f per os g occipitis 3 & deinde per g 21. 05 h verticis ⁴ ad partem ossis petrosi i i 28. posticam, tumque pone istud ad interiorem & priorem fundi calvariae partem oblique descendunt per partem osk 26. sis temporis k mammillarem 5 & per 1 22. exiguam denique offis loccipitis, leniterque

I Vefal. Lib. 1. Cap. XII. Fig. 4. 1. 1. 1.

2.4

- 2 Ibid. Fig. 3.1. i. i.
- 3 Ibid. i primum.
- 4 lbid. i secundum,
- 5 Ibid. i tertium.

que tandem ad priora incurvata & velut adfcendentia in dictos ^m migrant ^{m64}. hiatus. Tum duo alia, quae plerumque offi occipitis ⁿ, proxime ejus cum ⁿ ²². petrofo ^o nexum, utrimque impreffa ^o ²⁸. funt, angustiora, & a subrecta postica offis multiformis parte ^p, per margi-^p 46. nem offis occipitis, sub eminente petroso, retrorsum descendendo ad eosdem hiatus extrorsum incurvata. In summis praeterea offibus ^q petrosis vesti-^q ²⁸. gia este folent exilia, finibus pariter cedentia.

66. Quaedam etiam *foramina*, ab exteriori calvariae parte ad impressa illa vestigia ^a plerumque perforata, venulas ^a 65. inprimis ad sinus admittunt. Praecipua funt, *duo*¹ quae a posteriori processu funt, *duo*¹ quae a posteriori processu mammillarium ^b parte in sinus laterales ^b 29. deducunt venas occipitii; utrumque modo totum¹ in osse ^c mammillari, modo ^c 26.

1 Extrinsfecus, Vefal. Lib. 1. Cap. XII. Fig. 2. g. Eustach. Tab. XLVI. Fig. 4.49 ÷ 16. & fic Fig. 8. 10. 16.

Intrinsecus, Eustach. 1. c. Fig. 5. 27 - 23. Vefal. 1. c. Fig. 3. g.

a

(50)

a cocunte 2 offe c mammillari cum ofd 21. se d'occipitis factum. Tum duo alia, quae e 23. incipiunt 3 a postica tuberum e ossis occipitis parte, & inde per idem os longiori via in priora & sursum versus procedunt, donec ad praecedentes hiaf 64. tus f intrinsecus pateant; quo versus deducunt venas vertebrales. Duo denique verticalia 4, offium verticis g, g 14. perquam exigua, ad suturam sagittalem, non longule a lambdiformi. Haec tamen foraminum tria paria interdum ab uno desunt latere, saepe ab utroque.

2 Valfalva de aure human. Tab. IV. d.

3 Vefal. 1. c. Fig. 2. f. Valfalv. 1. cit. e.

4 Eustach. 1. c. Fig. 8.6 - 44. & 7 - 44. Spigel. Lib. 11. Tab. 2. g. g. & Tab. 4. Fig. I.G.G. Intrinsecus, Spigel. 1. c. Tab. 4. Fig. 2. G. G.

a 22. 67. Par decimum, offis occipitis a, fatis amplum & teres, incipiens ' fere b 23. supra media istius ossis tubera b, proc 68. pe marginem magni foraminis c, & oblique incedens exteriora & priora verfus,

I Vefal. Lib. I. Cap. XII. Fig. 3. d.

fus, donec nonnihil supra eadem tubera ^b extrinsecus pateat², emittit par nervorum nonum.

2 Ibid. Fig. 2. d.

68. Foramen denique unicum¹, offis occipitis², maximum, ovale, quo re-a 21. Eta deorfum inter tubera^b offis occipi-^{22.} tis medius camerae cerebelli fundus pa-^b ^{23.} tet, emittit oblongatam medullam; intromittit arterias vertebrales, & par nervorum spinale ad octavum accedens.

1 Intrinsecus, Eustach. Tab.xlv1. Fig. 9. 29 - 42. Vefal. Lib. 1. Cap. XII. Fig. 3. e. Extrinsecus, Vefal. 1. c. Fig. 2. e.

69. Jam vero calvaria a superiori parte, quod ibi caput finit & corpus totum, simplex & uniusmodi extrinsecus facta est, atque ad cavi sui a spe-a 45. ciem figurata; nisi quod os modo tenuius, modo crassius, cam nonnihil discrepare faciat.

70. Est autem pars calvariae dimi-G 2 dia dia superior fere tenuissima & infirmitfima ad synciput; tum ad tempora: ad verticem vero & ad aures crassior & validior, quam a priori parte tota.

71. Deinde ab utroque latere fuperficiem ' habet ampliffimam, a fuperiori parte termino ' quafi femicirculari & afperulo finientem, laevem, factam ab offe verticis ', fquamofo b, multiformi c, & frontis d; e qua mufculus temporalis enafcitur; fub quo os totum quafi compreffum tenuius eft, fimul & denfius & etiam durius.

I Vefal. Lib. I. Cap. VI. Fig. 3. fub R. R. R. usque Q. a. &c. 2 Ibid. R. R. R.

72. At ab inferiori parte admodum varia facta est, multiformis & praerupta, modo sinuata, modo in processus excressens, hic tenuis & densa, illic crassa & rara, majorem partem carnibus immersa; ut apta esset & ad maxillam superiorem partim faciendam partim firmandam, & ad articulos tam maxillae

a 14. b 25. c 35.4. d 16. xillae inferioris, quam capitis cum suma vertebra fabricandos, & ad partes molliores varias locandas firmandasque.

73. Praeter descriptas praecedentium offium partes ^a MAXILLAM SUPER 10-^a 17. REM ' offa componunt tredecim; duo ^{18.19.} Maxillaria superiora, ad partes ejus 33. omnes pertinentia ²; duo Palati, a ^{35.55} parte horum postica ³; duo Nasi, a ^{36.38.} priori & superiori⁴; Unguis duo, a la- 42.43. teribus, in oculorum cavis, ad nasum ⁵; 44. duo Jugalia, ab exterioribus lateribus⁶; duo Spongiosa inferiora, ab interioribus; tertium decimum Vomer, intrinsecus in medio, discernens ⁷.

I Vefal. Lib. 1. Cap. v1. Fig. 3. 5. Cap. 1X. Fig. 1. 2 Ibid. Cap. v1. Fig. 3 & 4. S. S. Fig. 5. S. A. A. & Cap. 1X. Fig. 1. A. A.

3 Ibid. Cap. vi. Fig. 5. п. п.

4 Ibid. Cap. 1x. Fig. 1. Z. Z.

5 Ibid. Δ . 6 Ibid. Cap. vi. Fig. 3. Q. Q. Q. Fig. 5. Q. r. Cap.

1X. Fig. 1. r. 7 Ibid. Fig. 5. z. & Cap. 1X. Fig. 1. adg.

74. Ex his, & ex partibus, ad quas accedunt, calvae offium, conftant ocu-G 3 lo-

(54)

lorum cava, nares, maxilla superior, palatum, genae.

75. OSSA MAXILLARIA SUPERI-ORA' maxima funt & multiformia; faciuntque maxillam superiorem; maximam palati, narium, & genarum partem; magnam quoque foraminum oculorum.

I Citatis §. 73. 2. adde Eustach. Tab. XLVII. Fig. 7. partem maximam.

76. Ergo fuis imis partibus, & a priori parte, & a lateribus, in marginem' coeundo² abeunt magnum, crassium, aequabiliter incurvum, extrinsecus³ simum, ex interiori parte⁴ cavum, a priori maxime gibbum, ad posteriora patentem⁴; quae proprie maxilla superior: hic gingivam facit, ac superiorum dentium radices continet⁴, fossulis suis sexdecim, similiter ac dentium istorum radices variis, quas ab

1 Vefal. Lib. 1. Cap. v1. Fig. 4. ab S. per priora, fere ad 4.

2 Ibid. Cap. 1x. Fig. 1.h.

3 Ibid. Cap. v1. Fig. 3.S. S. & Cap. 1X. Fig. 1. ab N. per b. ad dextrum latus.

4 Ibid. Cap. vi. Fig. 5. ante u. a. a. u.

(55)

b inferiori parte alias propter alias per otam longitudinem habet dispositas, mnes sursum versus tendentes, proindas, & ex amplis totamque margiis latitudinem occupantibus alias in uum oblongum & caecum finem, alias i duos tresve varie coarctatas.

77. A parte hujus intrinfeca tota, sque ad utramque foffulam quae denm alterum ab ultimo continet, lamiae ' ad fe mutuo producuntur binae, mplae, a priori parte ex imo margine posteriora & superiora modice convae, inde autem per latera ex altiori ullatim marginis parte exeuntes & ex ansverso planiores, junctae se fimul ', offibus ^a palati ³, ima parte scabrae; ^a 86. ae partem faciunt palati offei priom maximamque.

Vefal. Lib. 1. Cap. v1. Fig. 5. inter a. u.t.u.
Ibid. y.
Ibid. u. t. u.

78. Offa haec supra descriptas lamis^a pariter ampla, utrimque admo-a 77. dum dum & aequabiliter ex transverso cava
b 76. ta¹, cavis ad priora supra maxillae^b par tem quae incisorum radices contine productis², sensimque angustatis, par tem faciunt fundi laterumque narium si militer priorem & maximam : partibu superioribus³ longis & angustis, ac ple rumque quasi cavernosis, utrimque ex c 42. cipiunt os cavernosum c: in medio au d 95. tem, qua parte coeunt, vomeris ^d par tem priorem sufficient ⁴.

- I Palfyn de offib. Tab. 1. Fig. 1. w. & Tab. 11 Fig. 2. M.
 - 2 Vefal. Lib. 1. Cap. 1X. Fig. 1. ad g.
 - 3 Eustach. Tab. XLVII. Fig. 6. 42 1 4.

4 Ibid. Fig. 3.

79. Extrinsecus autem offium isto a 76. rum quodvis supra eandem maxillam ^a a nasi foramine ad posteriora, late ac cavum oculi usque elatum', locum naribus inter maxillam & oculi foramer augendis parat. Simul & ab exterior parte superiora & maxime exteriors ver-

> I Vefal. Lib. I. Cap. IX. Fig. I. A. B. coll. cum Cap. VI, Fig. 4. S. Φ.



versus infigniter crasselecens & procerius eductum, os jugale ^b versus quasi ex-b.93. crescit², donec id ipfum extremitate afperrima suftineat & firmet ³:ad priora hujus fere sinuatum ⁴, & genam cum offe jugali producens; ad posteriora gibbum ⁵ & asperiusculum, locans & educens musculi pterygoidei externi maxillae inferioris partem.

- 2 Ibid. Cap. 1X. Fig. 1. b & a versus.
- 3 A parte priori, Ibid. a & b.
- A posteriori, Ibid. Cap. v1. Fig. 4.f.
- Ab inferiori, Ibid. Fig. 5. f. 4 Ibid. Cap. 1X. Fig. 1. A. B.
- 5 Ibid. Cap. v1. Fig. 4. S. Φ.

80. Huic porro a posterioribus per interiora ad priora continuata pars osfis postica simul & interna, quae extremo palato & oculi cavo continetur', extrinsecus gibba & aspera, satisque lata,

1 Euftach. Tab. XLVII. Fig. 7. inter $50 \frac{1}{2} \div 7$. & $51 \div 3 \frac{1}{2}$

H

ta, praesertim ab inferiori parte², fira 86. missime connectitur 3 ossi palati 2.

2 Ibid. $50 \stackrel{1}{\xrightarrow{1}} \stackrel{.}{\xrightarrow{-}} 6.$ 3 Extrinsfecus, Ibid. Fig. 1. $a 3 \stackrel{1}{\xrightarrow{-}} \stackrel{.}{\xrightarrow{-}} 3 \stackrel{1}{\xrightarrow{-}} ad$ 4 $\stackrel{.}{\xrightarrow{-}} 7.$ Intrinsfecus in cavo narium, Ibid. Fig. 6. $43 \stackrel{.}{\xrightarrow{-}} 4_{\ast}$ & $41 \stackrel{1}{\xrightarrow{-}} \stackrel{.}{\xrightarrow{-}} 6. & 42 \stackrel{1}{\xrightarrow{-}} - 7 \stackrel{1}{\xrightarrow{-}} \frac{1}{2}.$

81. Os itaque inter oculi foraminis fundum & maxillam, ftatim iupra foffulas hujus quae radices dentium molarium omnium, vel posteriorum quatuor, continent, intus totum cavatum est, habetque cavernam ' maximam, a parte exteriori & a superiori undique fere tenui osse circundatam, qui *sinus maxillaris:* haec vero ab interna parte ad os maxillare superius adpositis ossibus palati ^a & spongioso inferiore ^b & cavernoso ^c perfecta, ore ² inter haec offa

I Eustach. Tab. XLVII. Fig. 7.50 ÷ 4. & Paaw. prim. an. de ofl. pag. 64. Fig. 1. ubi in antrum integrum per ejus os apertum introspicis. Higmor. Disq. an. Tab. XVI. Fig. 1 & 2 M. & Fig. 3. F. ubi medium dissectum. Drake Anthrop. Lib. 111. Tab. XVIII. Fig. 1. K, ubi extrinsecus in latere effractum.
2 Eustach. 1. c. Fig. 6. 41 ÷ 4.



fa magno ad latus cavi narium patet; has infigniter auget; mucum recipit, fervat, & capite ad latus oppositum inclinato emittit.

82. Jam vero os supra hanc cavernam maximam partem tenue¹, folidum, pellucens, simul a priori parte ad posteriorem & ab exteriori ad interiorem acclive, a superiori parte 2 latum, planius, laeve, & plerumqueaequabile, excipiens os ^a unguis³, ^b pla- ^a 92. num ⁴, & ^c palati⁵, fundum foraminis ^b 43. c 89. oculi fere totum facit.

I Eustach. Tab. XLVII. Fig. 7. 41 -3 -

2 Vefal. Lib. 1. Cap. 1x. Fig. 1. A. in oculorum cavis.

3 Ibid. à c. i versus.

4 Vid. citat. §. 43. 4. 5 Euftach. 1. c. Fig. $1.3 \stackrel{1}{_2} \stackrel{.}{_2} 3 \stackrel{1}{_2} \& Fig. 6.43 \stackrel{.}{_2} 4.$

83. Deinde a priori parte supra dentis canini & proximi molaris radicem, ante finum a, excrescit in altum, pro- a 81. H 2 ceffu

cessur volique posito; primum lato, extrinsecus modice convexo, intrinsecus cavo²; deinde nonnihil retrorsum adscendente & angustato, ibique extrinsecus planiore & leviter finuato, exinteriori parte 3 crassefcente, asperab 42. to, & excipiente os cavernofum b; tanc 17. dem ad os frontis c pertingente, eique connexo 4. Hic totum os atque adeo totam maxillam a priori parte firmat; fimul & de gena primo surgentem nasum facit; ora priori & superiori, fere recta, officula nafi d excipiens ; infed 91. riori autem, acuta & lunata, finiens nafum osseum⁶: a parte quoque posteriori⁷, majorem partem nexus⁸ offi unguis

> I Vefal. Lib. I. Cap. IX. Fig. I. inter B. i. X.
> Y. e.
> 2 Euftach. Tab. XLVII. Fig. 7. 47 ÷ 4.
> 3 Ibid. 47 ÷ 2.
> 4 Vid. citat. §. 17. 3.
> 5 Vefal. I. cit. Y. e.
> 6 Ibid. ab e. deorfum.
> 7 Ibid. inter i & X.
> 8 Extrimecus, Ibid. ab X. deorfum. Intrinfecus, Euftach. Tab. XLVII. Fig. 7.
> 47 ÷ 2.

uis e, extremitate crassa & quasi luna- e 92. 1 finit oculi cavum.

(6r)

84. Eminentia oblonga & afperula, uae est in parte interiore principii huus processus, a posterioribus in prionodice descendens & incurvata, parem appositi ossis s spongiosi inferioa priorem excipit & firmat. 294

85. OSSA PALATI', exigua & pernuam varia, funt praecedentium comlementa quaedam, ad palatum, nares, z ad oculorum cava perficienda; atque d commodum eis connexum cum proeffibus aliformibus praestandum.

1 Eustach. Tab. XLVII. Fig. 8. Vidus Vidius Aat. Lib. 11. Tab. VI. Fig. 19.

86. Namque partibus imis ', latis, uodammodo quadrangulis, tenuibus, olidis, ab inferiori parte ' planis & cabris, a fuperiori ² ex transverso catatis & lenibus, junctis fimul ³, & offibus

I Vefal. Lib. 1. Сар. vi. Fig. 5. П. П.

² Palfyn de off. Tab. 1. Fig. 1. X.

³ Vefal. 1. cit. t. x.

a 77. bus a maxillaribus superioribus, a post eriori parte tenuibus & quasi lunatis palatum offeum 1 & narium fundum 2 por b 77. ne offa maxillaria superiora b perficiunt media quoque, qua coëunt, parte vomerem fustinentes.

> 4 Ab inferiori parte, Ibid. u. t. u. adde Eustach Tab. XLI. Fig. 13. 45 - 67. A superiori, Palfyn. 1. c. ante X.

a 86.

87. Ab externo hujus a partis latere os palati quodvis furrigit laminam ' latam & tenuem, quae ad os maxillare b 80. fuperius b latere suo externo, leviter cavo, late applicata 2, eique aspera superficie & a posteriori & ab inferiori parte firmiter adnexa, perficit postie 81. cam c finus maxillaris 3 & lateris cavi narium ⁴ partem; ad haec cava utrobique lenis; praeter eminentiam oblongam & al-

1 Euflach. Tab. XLVII. Fig. 8. $53 \stackrel{1}{_2} \div 5 \stackrel{1}{_2}$ 2 Ibid. Fig. 1. $3 \stackrel{1}{_2} \div 5$.

3 Ibid. conf. cum Fig. 7. & 8. Figuram 6.

4 Ibid. Fig. 6. 43 - 5 1

perulam, rectiorem, quae per medium tus', quod ad nares est, a prioribus posteriora modice descendit, ad expiendam & firmandam partem offis - d 94. ongiosi d'inferioris posteriorem. 88 Haec a deinde a parte posteriori a 87. superiori abit in laminam ' tenuem, is latam, in posteriora vergentem, ndem & late applicatam 2 ad partem rinfecam parietis interioris aliformis ocellus b, & nexam 3 offis multifor-b 37. s basi, sub ejus sinu c, proxime a-c 39; ormem processum d; ut claudat hia-d 36. m, qui inter os maxillare superius e & e 80. Ram d alam ad nares caeteroquin paet; naresque ibi perficiat.

Ab interno latere, Euftach. Tab. XLVII. Fig. 8. $\div 5$. Ab externo, Ibid. Fig. 1. $2 \stackrel{!}{} \div 5 \stackrel{!}{} \frac{1}{2}$. Latere citat. fupr. 1 ext. Conf. cit. §. 36. im. Extremo $55 \stackrel{!}{} \div 5$. Fig. 8. ibid. & $2 \div 5$. I.

89. Quin etiam a parte priori & suriori altius ad os maxillare a prore-a 80. pens

pens', & paullatim crassefcens, per tingit tandem ad oculi cavum, & a ossis multiformis basin; nexa, part priore offi b maxillari superiori 2, par te postica 3 ossis multiformis basi non nihil ad exteriora & inferiora oris finu sphenoidalis c, parte superiore 4 off d 43. plano d, interiore 5 cavernoso e: si € 42. connectit ea parte os maxillare superiu cum multiformi; claudit similiter adi tum ad nares; atque intrinsecus 5 quo dammodo cavernosa, una cum finitima f 78.3. offis maxillaris superioris parte f ad cag 42. vernulas offis cavernosi g accedit, na. res sic perficiens; a superiori denique par-

1 Extrinsecus, Eustach. Tab. XLVII. Fig. 1 3 - 4. Intrinsecus', Ibid. Fig. 6. 43 - 4. & Fig. 8. 54 - 4. 2 Extrinsecus, Ibid. a 3 ÷ 5. ad 3 1 ÷ 3 1. Intrinsecus, Ibid. Fig. 6. 42 - 4. 3 Ibid. Fig. 1. 2 1 - 4. & Fig. 6. 44 - 4. & Fig. 8. 54 - 3 -4 Ibid. Fig. 8. 54 - 31 & Fig. 6. 43 - 31 5 Ibid. Fig. 6. 43 1 + 4.

Ъ 80.

c 39.

parte planior, modice ex transverso sinuata, aequabilis, laevis, & in priora acclivis latescensque, fundum foraminis oculi pone os maxillare ^h perficit, ^h 82. exiguam apponens partem.

90. Tandem pars offis totius eadem & poftica & inferior & etiam extrinfeca, ad extremum palatum, in proceffum ' migrat craffiufculum; qui retroverfus & extrorfum defcendit ad proceffum aliformem ^a; atque extrinfecaa 36. principii fui parte, leviter cava & afpera, firmiter connectitur ² offi maxillari fuperiori ^b, ad internum foffulae, b 86. quae radices dentis poftici continet, latus; a parte autem poftica, cavis duobus oblongis, afperulis, ad utrumque marginem pofitis, excipit ³ firmatque de-

 Extrinsfecus, Eustach. Tab. XLVII. Fig. 1.
 3 1/2 ÷ 7.
 Intrinsfecus, Ibid. Fig. 8. 54 ÷ 7. & Fig. 6.
 43 ÷ 7. Ab inferiori parte, Ibid. Tab. XLI. Fig. 13.
 46 ÷ 68.
 2 Ibid. Tab. XLVII. Fig. 1. 4 ÷ 7.
 3 Vid. citat. §. 36. 4ultim.

書

dehiscentem processus aliformis finem. Sic cum multiformi ^a ca inprimis parte connectit os maxillare superius ^b, totamque maxillam firmat; perficiens simul cavum alare ^c, parte cavis istis interjecta, exigua, quodammodo triangula, ab acuta superiore parte deorsum versus latescente, aequabili, & modice cavata.

91. Ossicula NASI additamenta oflium maxillarium fuperiorum funt, tenuia, folida, firma, oblonga & lata, oris prioribus & fuperioribus procefares, fuum a maxillarium fuperiorum fuperimpofita & connexa; juncta etiam fiber, mul², & offi^b frontis³. Atque haec principio fatis angufto ab'offe frontis primum rectius in priora aliquantifper defeendentia & plerumque nonnihil anguftata⁴, eâque parte craffa, intrinfece 44. cus⁵ afpera & innitentia narium fepto⁶, gla-

- I Vid. citat. 9.83. s.
- 2 Vefal. Lib. 1. Cap. 1X. Fig. 1. a Z ad f.
- 3 Vid. citat. §. 17.6.
- 4 Vefal. 1. c. à Z Y ad z.
- 5 Eustach. Tab. XLI. Fig. 4. 21 1 2.

glabellam perficiunt : deinde deorfum verfus infignius latescentia & in priora eminentia⁶, extrinsecus sima⁶, intrinsecus cava⁷, editissimum nasi dorfum producunt: imis tandem oris⁸, acutis & inaequabilibus, finientia partem nasi offei superiorem.

6 Vefal. 1. c. ab Z ad f. e.

7 Euftach. l. c. 21 1 - 3.

8 Veial. l. c. ab f ad e.

92. OSSICULA UNGUIS¹, offium planorum² complementa, bracteolae² 43. funt offeae, fatis folidae, tenerae, quae cavernulas offis cavernofi^b quafi fqua-^b 42. marum inftar a priori parte integunt; utrimque nexa offi^b cavernofo, ^aplano², ^c frontis³, & ^d maxillari fuperiori ⁴: ^c 18. fic perficiunt & a naribus dividunt ocu-^d 82. lorum cava.

93.

I Vid. citat. §. 73. 5. & Euftach. Tab. XLVII. Fig.
6. 40 - 3. & fic quoque Fig. 7.
2 Vid. citat. §. 43. 3.
3 Vid. citat. §. 18. 10.

4 Vid. citat. 5. 82. 3. & 6. 83. 8.

93. OSSA JUGALIA¹, craffa & fira 79. ma, offibus maxillaribus fuperioribus ^a quafi fuperenata², & ab iis proceffibus b 35. fuis pertingentia ad os ^b multiforme ³, c 17. ^c frontis ⁴, & ad zygomaticos ^d prod 29.1. ceffus ⁵, hisque omnibus firmiter nexa, calvariae maxillam fuperiorem inprimis jugant, hancque firmiflima quafi compactione ftabiliunt. Simul & quodvis extrinfecus a priori parte⁶ gibbum, atque a latere⁷ planius, cum offe maxillae 79. ri fuperiori ^e facit prominulam fub oculo genam : atque ab interiori parte ⁸, quae ad cavum oculi eft, latius, & ab offe maxillari primum in exteriora dein-

de in fuperiora ad os frontis ^c & multiforme ^b usque concavum, laeve, finit oculi cavum, ejusque partem facit candem & priorem & exteriorem & etiam in-

- I Vid. citat. §. 73.6.
- 2 Vid. citat. §. 79.3.
- 3 Vid. citat. §. 35.2.
- 4 Vid. citat. §. 17. s.
- 5 Vid. citat. §. 29. 2.
- 6 Vefal. Lib. 1. Cap. 1x. Fig. 1. a. b. r.
- 7 Ibid. pone г.
- S Ibid. r. in oculorum cavis.

iferiorem totam: parte autem superio-& exteriori? perficit temporis cavum: latere denique in posteriora & supeora ad processum zygomaticum d proectum 10, & ex lato nonnihil tenuaum, totumque tenuius, jugum 11 cum to processu producit; qui est arcus, oris gibbus, latis utrimque sed se muuo versus gracilescentibus radicibus rodeuns, a calvaria admodum remotus, ortis; quo natura musculum temporam, & maxillae inferioris cui is inferiur processum, sub tempore circumdeit, ut cum finitima offis maxillaris fuerioris parte locum pararet educendo nasseteri, & ut parte posteriori & sueriori¹², finuata, a posterioribus in riora declivi & latescente, regeret emporalem.

9 Ibid. Cap. vi. Fig. 4. Q. fub *.
10 Ibid. Fig. 3. a priori parte V verfus.
11 Ibid. Fig. 5. ab h ad f. & fic in Fig. 3. & 6.
12 Ibid. Fig. 6.

94. OSSA SPONGIOSA INFERIO-I 3 RA

RA' lamellae sunt oblongae, una parte convexae, altera cavae, a priori parte latiores, ad posteriora angustatae, majorem partem tenues, ab inferiori crafsiores, totae tenerae, scabrae, porosae; quae utrimque pendentia ex emi-2 84. nentiis offis a maxillaris superioris 4 & b 87. b palati 3 medioque inter dictas eminenc 81. tias imo oris finus e maxillaris margine 4, atque adeo ex latere cavi narium, in imas maxime cavas nares. propendent⁵, ad eosdem ac superiora usus; os fimul finus maxillaris ab ea parte nonnihil minuentia⁶.

> 1 Palfyn de offib. Tab. 1. Fig. 2. 2 Euflach. Tab. XLVII. Fig. 6. 39 - 4 1.

3 Ibid. 42 - 5.

4 Ibid. Fig. 7. 49 ÷ 5. 5 Ibid. Fig. 6. 40 ÷ 5. 6 Conf. Euft. 1. c. Fig. 6 cum 7.

95. VOMER ', os latum, maximam partem tenue, utrimque planum, ex medio narium fundo subrectum, extremitate

I Eustach. Tab. XLVII. Fig. 3. 16 - 6. add. cit. 9.73.7.

ite inferiore, longa, rectiore, tenui, onnectitur 2 eminenti ossium palati a & a 86. axillarium superiorum b commissurae, b 78. uae medium narium fundum a posteori parte ad priorem discernit; inde nomboidis instar retrorsum procedit 1 offis multiformis basin c, prope hanc c 38. assessed and em extremitate 3 latio-, oblonga, finuata, recipit 4 baseos ius processum c, sic nares ex parte partitur : a posteriori parte septum naim, quod offe multiformi & palato ntinetur, solum faciens'; & ad faus extremitate longa, recta, & fere teii finiens: a priori autem partem se-. i tantum imam; ibique sursum vers abeuns in lamellas duas, perquam nues & quasi exesas, haud multum dintes, quae a superiori parte nectunr 6 laminae d'ossi cribriformis mediae, d 44-

(71)

Eustach. 1. c. a 20 - 6. ad 13 1 - 5.

Ibid. 19 ÷ 5.
Vefal. Lib. 1. Cap. v1. Fig. 5. fub. g. Euftach.
b. xLv1. Fig. 11. 11 ÷ 62. & Fig. 13. 47 ÷ 66.
Vefal. 1. c. ab x fere ad n.
Euftach. Tab. xLv11. Fig. 3. 16 ÷ 4 1.

82

(72) & cum ea faepe in unum coeunt, al inferiori⁷ denique excipiunt feptum per ficientem cartilaginem.

7 Ibid. 14 - 5.

a 73. 96. Haec a itaque offa, fimiliter at 96. que calvae illa b, partibus fuis deferipti b 45. inter fe & cum quibusdam calvariae of c73. a. fium partibus capta & firmiter connexa fpeciem oculorum cavis, naribus, ma xillae fuperiori, palato, & genis, con ftantem praestant.

97. Ac primo quidem utrimque sub jacent Oculorum FORAMINA prio ri calvariae parti; mediis naribus dis Cava magna : quodvis conc juncta. recumbenti, & a quatuor lateribus ob lique ac inaequaliter depresso & qual complanato, quodammodo fimile; ca a 17. vo a vertice angusto in priora amplia 18. to, & tota basi foras patente; facto al b 33. c 82. offe frontis^a, multiformi^b, maxillar fuperiori c, palati d, plano e, unguis f 83. d 89. & jugali 8; atque majorem quidem par e 43. tem tenui & imbecillo; latere auten f 92. ex. g 93.

externo, totaque fere ora finiente, craffo & valido. Haec oculos recipiunt & custodiunt.

98. Ad ea autem a calvariae cavo diriguntur viae certae; ad unumquodque tres; superior a, media b, infimaque c. a 57.

99. Ab utroque etiam foras patet ri-b f8. ma 'longa, fatis ampla, quae per exteriorem fundi partem a posterioribus in priora, inter os palati a & maxillare^a 89. fuperius b ab una parte & multiforme cb 82. ab altera, ad os jugale d descendit; quae-d 93. que membranas, vasa, nervosque pertransire finit. Tum foramen supercilii², quod in extremo hujus e margine e 17. eft, haud longe a naso, plerumque exiguum & oblongum; saepe interruptum 3; interdum bina aut terna; frequenter quafi dimidum, & leviter impressive vestigii instar 4; quandoque in uno deficiens la²

1 Vefal. Lib. 1. Cap. XII. Fig. 1. & 2. D.

2 Ibid. Fig. 1. A finistrum. Eustach. Tab. XLVI. Fig. 10 53 - 46.

3 Euftach. 1. c. Fig. 1. 19 - 10.

4 Vefal. 1. c. A dextrum. Eustach. 1. c. Fig. 1. 19 - 10. Bidlo Tab. xc11. Fig. 1.

(74)

latere; quod ad frontem ex oculi cavo tuto repere finit nervulos, vafaque. Deinde canalis ⁵, qui in parte poffica
f 82. & fuperiori offis maxillaris fuperioris f incipiens e regione foraminis calvariae
g 59. quarti ^g, ftatim fub fundo oculi foraminis in priora defcendit; primum dimidius & a fuperiori parte patens, aut tenui offe tectus; deinde integer, deorfum magis incurvatus, & tub oculi cavo ad genam apertus ⁶; ad deducendam magnam rami quinti nervorum paris fecundi partem, cum vafculis.

Porro ad nares patet canalis nafalis 7, amplus, ab interno cantho extrorfum & nonnihil retrorfum defcendens; a fuperiori parte dimidiatus, fadens; a fuperiori parte dimidiatus, fadens; a fuperiori parte tota impreffum hatusque a finu oblongo & profundo, quem a priori parte tota impreffum habet os h unguis 7, coeunte cum offis maxillaris fuperioris proceffu ⁱ leviter finuato; ab inferiori autem integer, factusque primum ab offe maxillari & un-

guis,

- 6 Ibid. B. Eustach. 1. c. 14 15.
- 7 Ibid. A. C.

h 92.

i 83.

⁵ Vefal. l. cit. A.

guis, deinde a folo maxillari, rectius nonnihil in posteriora descendens; ore tandem magno & ovali⁸ deorsum in posteriora patens ad nares, sub parte ossis spongiosi inferioris^k priore, de-^k 94. ducensque saccum lacrymalem.

Ad calvariae denique cavum ducunt for amina⁹ exigua, plerumque bina, ad mediam fere partem commiflurae offis Frontis¹ cum plano^m; haec enim in ca-¹ ^{17.} wum calvariae intromittunt nervulos va-^{m43.} faque, mox nares petentia.

8 Palfyn de off. Tab. 11. Fig. 2. b. 9 Vefal. 1. c. ad T.

100. Sic & NARES subjectae priori parti calvariae sunt, inter oculorum cava ab ea demissae. Cavum magnum; acunar habens planius, oblongum, angustum (factum ab osse cribriformi^a, a 41. & ei finitimis osse frontis ^b & multi- b 18^b formi^c); ab eo lateribus similiter pla- c 32. nioribus (factis ab osse planis ^d, & d 43. unguis ^e) inter oculorum cava descen- e 92. dens & nonnihil latescens; statimque K 2 sub

fub iis in latera diductum & ampliter cavatum, longiusque descendens (fa-&um ab offibus maxillaribus superioribus f & palati g); donec utrimque ad 78. g 89. interiora incurvetur in fundum ' am-87. interiora incurvetur in fundum ' amh 78. plum (factum ab iisdem h offibus), in medio capacissimum, oblongum, a priori capitis parte supra dentes qui secant totumque palatum ad fauces pertinentem. Atque hoc cavum magno ad fauces foramine patet², sub offis multifori 32. mis basi i, & inter parietes ab ea ad palatum demissos (factos a processibus k 37. aliformibus k & ab ossibus palati 1). A parte autem eadem & priori & superiori nasum habet appositum; qui oculis interjectus eminet (factus a prom 83. cessibus m ossium maxillarium superiorum, & ab officulis nasi n); & ex lan 91. teribus ab oculorum foraminibus utrimque leviter gibbus in priora exsurgens, in oblongum eminensque angustatur dorsum; simul & ab inferiori latissima 80

> 1 Palfyn de off. Tab. 1. Fig. 1. W. X. 2 Vefal. Lib. 1. Cap. XII. Fig. 2. n. o.

(77)

kamplissima parte glabellam versus iner oculos coarctatus 3: sub quo foranen magnum ad totas nares supra maxillam patet 4.

3 Ibid. ab e f. z verfus.

4 Ibid. fub e f. fupra b.

101. Hoc deinde cavum septo ' medio latisfimo discernitur; quod a medio toto offe cribriformi a & a multiformis a 41. basi b demissum, pertingit ad medium b 38. totum eminentemque narium fundum; posteriori parte sua foramen ejusdem istius cavi bifariam quoque dividens; fic & a superiori parte in priora ad os frontis c & ad officula nasi d procedens; c 17. a priori autem perficiendum cartilagine. d 91.

1 Eustach. Tab. XLVII. Fig. 3. Conf. citat. §. 44. & 9.95.

102. Sic constructas nares majorem partem opplent in eas demissa, a superiori quidem parte osla cavernosa 2 cum a 42. spongiosis suis a, ab inferiori autem ofsa spongiosa inferiora b. b 94. K 3

103.

103. Et patent ad eas primum sinus a 19. fex; duo frontales a, a priori parte; b 39. duo sphenoidales b, a posteriori; duo c 81. maxillares c, a lateribus. Tum a sud 56. periori parte foramina d offis cribrifor-Deinde a parte postica & supemis. riori foramina ' duo : quodvis factum ab extremo osse palati e coëunte cum e 88. 89. multiformi, sub hujus sinu f; satismaf 39. gnum; arteriam venamque & nervum admittens : horum e regione in osse multiformi, supra interiorem radicis processus aliformis g partem, utrimque g 36. canalis incipit 2 ore magno & orbiculato; qui supra eundem processum fere recta in posteriora procedens, & paullatim coarctatus, tandem supra eundem istum processum ad latus foraminis narium,

> I Extrinsecus, Eustach. Tab. XLVII. Fig. I. 2 I - 4 I.

Intrinsecus, Ibid. Fig. 6. 43 $\frac{1}{2} \div 4 \frac{1}{2}$. coll. cum Fig. 8. ubi pars ejus maxima, tota quam os palati confert, exhibetur.

2 Ibid. Tab. XLVI. Fig. 16. 28 ÷ 78. & 31 ÷ 77 ⊥ & Fig. 13. 47 ÷ 64. & 49 ÷ 64.



ium, quod ad fauces est, patet 3; ad cosdem ulus. Postremo canalis nasais h; per quem ex oculis lacrymae af-h 99. luunt.

3 Ibid. Fig. 11. $8 \stackrel{1}{\xrightarrow{1}} \div 61 \stackrel{1}{\xrightarrow{1}} \& 12 \stackrel{1}{\xrightarrow{1}} \div 61 \stackrel{1}{\xrightarrow{1}}$ Vefal. Lib. 1. Cap. XII. Fig. 3. Y.

104 Quare nares aptissimae factae & n loco opportunissimo collocatae sunt, d stabiliendam & latislime per tota caa sua, totamque cavernularum, ossiulorum, septique superficiem expliandam ordinandamque membranam nuciparam; ad copiosum ab ea paraum mucum recipiendum, quodammoo retinendum & servandum, ac pro e nata dimittendum; ad nervos & vaa admittenda & in se ducenda; ad aëem, cum exspirationibus quas contiet & vehit, admittendum in receffus avernasque suas omnes; ad eundem in is retinendum, remorandum, tandem. ue ad fauces ducendum, atque ab iislem eodem iterum modo emittendum; ad

ad lacrymas denique ex oculis recipiendas.

(80)

105. Sub naribus tandem est MAXIL-LA SUPERIOR, tota ab offibus maxila 76. laribus superioribus a facta, dentes exigens superiores, immobilis, stabilis, sub 109. perimminens maxillae inferiori b, eique sursum tractae resistens. Et huic interjectum PALATUM, ab offibus maxillac 77. ribus superioribus e & palati d factum, primum a dentibus prioribus in superiora & posteriora concavum, deinde planius, latius, & ad fauces versus modice elatum, tandemque processibus ae 36. liformibus e utrimque terminatum; quod prementi linguae refistit, pressaque ad fauces cedere cogit.

106. Ad palatum nervos vafaque deducunt canales duo: quorum quisque, a 87. factus ab osse palati a coëunte cum mab 80. xillari superiori b, incipit in media postica istorum ossium commissura, & in priora inter eadem ista osfa descendens patet ' ad palatum, prope dentem mola-

I Vefal. Lib. I. Cap. XII. Fig. 2. q.

larem posticum. Ad hos deinde accea dere solent canales exiles, ad palatuni per ipsa palati ossa c non longe a prae- c 90. cedentibus perforata ².

(8i)

A palato autem ad narium fundum canales pertinent itidem duo; qui ftatim pone dentes qui fecant propter commiffuram offium maxillarium fuperiorum ^d incipiunt³, furfum retrorfum-d 77; que procedunt, & patent ⁴ ad narium fundum ab utroque eminentis commiffurae latere; hi membranam qua palatum vestitur cum ea qua nares obducuntur conjungi finunt, portione media cum vasculis permeante.

2 Ibid. z. Eustach. Tab. XLI. Fig. 13. 46 - 67 1

3 Vefal. 1. cit. 2. 4 Palfyn de off. Tab. 1. Fig. 1. ubi aciculât u indicatur.

107. Atque haec eadem offa ^a emi-a96.a. nentiis quoque, qua alia alia contingunt, ^{c.} exiguis; variis, fed fere fimplicioribus compinguntur Igitur commissionftar futurarum b calvariae habent; ple-b 45. rasque tamen exiles, & fimplicem fere L of-

offium contactum extrinsecus mentien-Ad has accedunt suturae, quae tes. offium maxillarium superiorum propriae funt: praecipue una ' ex transverso palatum fecans; ab uno canino dente ad c 106 alterum pone foramen palati c pertinens; & supra quoque, fere a media d 84. offis hujus eminentia d quae os spongiosum inferius sustinet, per narium fundum ex transverso pone idem foramen c procedens ad alterum latus: altera per oculi foraminis fundum a posterioribus in priora incedens ' supra canalem dee99. 5. scriptum e, modo longa modo brevior, circum oram ejusdem cavi non longe ab osse jugali inflexa, & ad ejusdem istius canalis aperturam pertingens 3.

> I Vefal. Lib. 1. Cap. 1x. Fig. 2. a. a. Euftach. Tab. x11. Fig. 13. 44 ÷ 63.
> 2 Euftach. Tab. x1v1. Fig. 1. 13 1 ÷ 14.

3 Ibid. 14 1 - 15. Vefal. 1. c. Fig. 1. i.

108. MAXILLA INFERIOR ' os eft ma-

I Vefal. Lib. 1. Cap. x. Fig. 1. & 2. Eustach. Tab. XLVII. Fig. 5. magnum & validum, in quo infixi funt lentes inferiores omnes, quod ad fuperiorem maxillam huc atque illuc facie movetur, quodque fe ei fcite adaptat.

109. Itaque pars hujus prior ', incurva, magna, craffa, lata, dura, furlum versus migrat in marginem fimilimum maxillae superiori ^a; qui prae-a 76. rerquam quod gingivam faciat, fossuis itidem similibus sexdecim, sed deorium tendentibus, & aliis in unum aliis in duos caecos fines abeuntibus, radices dentium inferiorum continet & firmat.

I Vefal. Lib. 1. Cap. x. Fig. 1. ante C. E. & Fig. 2. ante D. Euflach. Tab. XLVII. Fig. 5. ante $17 \stackrel{1}{\xrightarrow{1}} \div 9$. & $29 \stackrel{.}{\xrightarrow{}} 5 \stackrel{1}{\xrightarrow{1}}$.

110. Ab extrema hac parte utrimque procedit' pone maxillam superiorem oblique aures versus, donec ad calvariae ba-

I Eustach. Tab. XLVII. Fig. 5. 26 - 9. & 28 - 4. Vesal. Lib. 1. Cap. X. Fig. 1. & 2. pone dentes,

L 2

basin pertingens, ad eam cum stabilitate moveri queat. Itaque prope calvariam utrimque ex gracili collo 2 paullatim crassescit, tandemque abit in capitulum³ fatis magnum, oblongum, ex transverso & nonnihil oblique, ab exterioribus ad interiora & posteriora, pofitum, totum in priora recurvatum, in medio modice eminens, ad latera depressius, & cartilagine leviter crustatum 2. Atque haec duo capitula in eos sinus b, qui juxta foramina aurium sunt, b 30. recipiuntur, interposita lamella cartilaginea mobili c: jamque modo ad priorem fundi illorum ipforum finuum partem & ad tubercula d, quae ante finus a 30. eminent, moventur; modo ad posteriora tuberculorum paullatim deorsum vertuntur; quandoque & ex finibus protracta subter tubercula delabuntur; aut quo tempore alterum capitulum se in sinu ad tuberculum quasi circa axin suam quodammodo vertit, codem alterum ex finu fuo

2 Vefal. 1. cit. B.

3 Ibid. A.

a 2.

C 2.

fuo excidens fub tuberculo in priora fimul & in oppofitum latus fertur, exiguum fuo curfu arcum quafi decircinans. Ex quo facilis & stabilis certaque maxillae mobilitas est, singulari artificio; ante & pone, deorsum & surfum, & ad dex-

(85)

tram & ad laevam, & in obliquum, & quodammodo in orbem, pluribus modis.

Simul & hae ad calvariam procedentes maxillae partes, fere usque capitula, latae, utrimque planiores, tenuiores, folidiores, & quafi compresse, mufculos excipiunt maxillam moventes validiffimos, masseres & pterygoideos; ab his figuratae, & modo asperatae 4, modo depresse: fic & a priori parte excresse fice in fastigium exacutos, ad exteriora modice inclinantes, totos tenues & folidos, quibus sub jugis e subeun- e 93 tibus temporalium musculorum tendines circumadnascuntur.

III.

4 Ibid. D. E. 5 Ibid. C. Euftach. I. c. $26 \stackrel{1}{} \div 5$. & $30 \stackrel{.}{} \div 2$ L 3

III. Caeterum tota maxilla a lateribus planior, & in priora leviter deorsum procedens ac angustata, genarum partem facit. Deducta ab his sub dentium priorum radicibus modice priora & inferiora versus in acumen extremum nonnihil in priora prominens gibbumque, mentum fit; cujus parti eidem & imae & mediae affiguntur biventres maxillae musculi. A postica autem parte refima, & fauces versus diducta, fundo oris & faucibus locum parat : linguam cum osse yöide, & quodammodo laryngem, horumque nervos, vala, glandulas, musculos, admittit: fundamentum denique stabile est, a quo oriantur linguae musculi genioglossi, offis yöidis geniöyoidei & myloyöidei, & fibrae quae per exteriora membranae oris & pharyngis decurrunt; idcirco etiam eminentias oblongas, tubercula', fossulasque nacta.

1 Vefal. Lib. 1. Cap. x. Fig. 2. H.

a 110. 112. In medio partis lateralis ² canalis is utrimque intrinsecus incipit ore mano', per os in priora descendens, & orro sub dentium radices ad mentum procedens; qui nervum & vasa intronittit, ac subter dentes deducit : hic ero ad exteriora sub dentibus molarius primis patens², eorundem ramuos emittit.

Vefal. Lib. 1. Cap. x. Fig. 2. F. Euftach. Tab.
 LV11. Fig. 5. 28 ÷ 5.
 2 Vefal. 1. c. Fig. 1. G. Euftach. 1. c. 31 ÷ 9[⊥].

113. Tali igitur artificio natura toam conftructionem capitis offei fabriata eft, ut nec ad usum melior, nec d speciem pulchrior effe potuerit. Huus pars tota superior & maxima, coneptaculum cerebri est: hoc a parte ofteriori capacissimum, extrinsfecus sumnum verticem habet fere globossum; ab versa parte planius, occiput est; subus quoque planius, sed latum, eaque parte infistens collo: projectum ad prioa in fynciput depressius; temporibus lepressions utrimque terminatum & an-

angustatum; a priori parte fronte finiens angustiore, planiore, & utrimque leviter protuberante; quae inferiora versus abit in eminentia utrimque supercilia, hisque interjectam glabellam. Sub his oculorum duo magna cava sunt, quibus cedit calva & mala, quae & prae temporibus eminent. His interjectae nares, a calvaria demissae, sub oculorum cavis latescunt; ante & retro patent: eis additus nasus inter oculos in priora eminet. Subter nares palatum est, & maxilla superior. Ad hanc deinde admovetur inferior. Maxillae parte capitis superiore multo graciliores, breves & gibbae, in os vergunt: hae tandem in mentum abeunt, acumen faciei, extremum, gibbum & modice prominulum. A lateribus primum sub oculis infigniter eminent malae; mox depressae, latae & planiores, gracilefcendo deducuntur deorsum & nonnihil in priora. Pone oculorum foramina funt tempora cava. Post genas aurium for amina, quae ad auditus instrumenta intra calvariae cavum eminentia duducunt. Maxillae ad posteriora didutae patescunt. Totumque hoc caput, cum cerebrum, oculos, nares, aures, os, linguam, mordendi & mandendi instrumenta una opportunissime contineat, merito etiam & quam aptissime in summo collocatum est, atque huc & illuc pluribus modis facillime movetur.

114. Simul etiam hie deprimi & finuari, illic afperari & protrahi admodum varie debuit, ut partibus tam multis tamque variis & diverfis locum dare ac ftabilitatem praestare posset : praesertim ut originem commodam infertionemque praeberet musculis admodum multis, qui caput ipsum, scapulas, supercilia, oculos, nares, buccas, labia, aures, maxillam inferiorem, os yöides, linguam, palatum mobile, uvulam, pharyngem movent; a nonnullis horum multis quoque figuratum modis.

(90)

II. DE TRUNCO SCELETI.

115. TRUNCUS SCELETI pars hujus maxima & post caput praecipua est, constatque ex Spina, Thorace, & ex Pelvi.

116. SPINAM¹, columnam per to⁴ tum truncum & collum ad caput usque erectam², offa componunt viginti & novem : nempe Os facrum³; hujus appendix Coccyx⁴, ex quatuor officulis conftans; & Vertebrae quatuor & viginti⁵, quarum quinque Lumborum⁶ funt, duodecim Dorfi⁷, Colli feptem⁸.

Vefal. Lib. 1. Cap. XIV.
 Ibid. in Tabulis totius libri ultimis tribus.
 Ibid. Cap. XIV. à 25 ad 30.
 Ibid. à 31 ad 34.
 Ibid. ab 1. ad 24.
 Ibid. à 20. ad 24.
 Ibid. ab 8. ad 20.
 Ibid. ab 1. ad 7.

117. Quae etsi specie & magnitudine inter se differant, in universum tamen men corpus ' habent orbiculatim quasi vertebratum, magnum, latum, crafsum, breve, a priori parte & a lateribus gibbum & prominulum, a posteriori parte planius & fere sinuatum, a superiori & ab inferiori planius. Deinde ab utroque hujus latere, a parte horum posteriori & superiori, processus² exit craffus & validus, retrorfum & nonnihil in latus procedens : qui sursum deorsumque processus exigit obliquos, hunc descendentem 3 in posteriora declivem, illum adscendentem 4 & in priora acclivem : in latera transversum s: tumque ad se invicem posteriora & inferiora versus aliquantisper producti & fere incurvati, latescentes & quasi confluentes, abeunt in arcum 6, fcu-

Exempla exvertebra dorsi simpliciore peti possunt: nempe

I Vefal. Lib. I. Cap. XVI. Fig. I & 2. A.

- 2 Ibid. Fig. 1. pone B.
- 3 Ibid. Fig. 1. c. Fig. 2.a.b.
- 4 Ibid. Fig. 1. V. T. Fig. 2. X.Y.
- 5 Ibid. Fig. 1 & 2. I. H.
- 6 Ibid. Fig. 2. inter X.Y. a.b.

M 2

scutulo similem, latum, a corpore vertebrae remotum; sicque for amen 7, quo ossa media perforata sunt, cum corpore isto parant: hic denique arcus a parte postica media in spinam⁸ migrat. Nonnulla autem ab hac fabrica quasi degenerant; quaedam etiam imperfectiora sunt; ut in unoquoque loco necessarium est.

7 Ibid.inter A.X.Y. 8 Ibid. N.

118. Os sacrum', fundamentum quo spina nititur, latum, constans ex vertebris degenerantibus quinque, aliis aliis adnatis, & omnibus quasi in se mutuo fusis, parte corporis sui primi fumma², lata, plana, quodammodo ovali, proximae lumborum vertebrae corpus atque adeo totam reliquam ad caput erectam spinam fulcit 3.

I Vefal. Lib. 1. Cap. XVIII. Fig. 1 & 2.

2 Ibid. Fig. 1. fupra A.

3 Conf. citat. §. 116. 1822.

119. Hoc ipsum deinde ossa ileum fulfulciunt & ftabiliunt '. Namque pars nujus tota fuperior, primum latiflima & craffiffima, inde deorfum verfus paulatim gracilefcens & quafi cuneata ', in offibus iftis inferitur ' & plane defigitur; atque iis etiam latere 3 utroque, longo & lato, in priora inprimis producto, planiore, inaequabili afperoque, prorfus coagmentatur.

I Vefal. Lib. I. Fig. ult. I & 3.

2 Vid. citat. §. 118. 1. 3 Vefal. 1. c. Cap. xv111. Fig. 2. N.N. Euftach.

Tab. XLVII. Fig. 11. 33 - 76.

120. Huic basi ^a innitentes Verte. a 118. brae, aliae aliis corporibus suis superimponuntur'; omnibus tamen, ad vertebram à summa alteram usque, mediis lamellis quibusdam crassis, flexibilibus & elasticis, discretis ^a ac inter se nexis & conglutinatis. Itaque prima spinae pars oritur; columna quasi geniculata, erecta, procera, & cum stabilitate stexilis. 121,

I Vefal. Lib. I. Cap. XIV. a 24. ad 1.

2 Ibid. inter numeros.

M 3

121. Ex his corpora vertebrarum lumborum maxima sunt: ab offe facro tamen vertebras thoracis versus paullatim gracilescunt 1. Omnia a parte superiori & etiam ab inferiori admodum lata & plana²; media parte graciliora; & a priori tota planiora3; lamellis crassissimis, inter os sacrum & huic proximam vertebram atque inter duas quasque subsequentes interpositis, satis disjuncta 4: ac proinde plane apra & idonea quae superimposita suftineant, nec tamen impediant ne lumbos huc atque illuc flectere & torquere possimus.

1 Vefal. Lib. 1. Cap. XIV. a 24 ad 20. L. 2 Ibid. Cap. XVII. Fig. 1 & 2. inter A. A.

4 Ibid. Cap. xiv. inter numerosa 25 ad 20.

122. Corpora deinde vertebrarum dorsi omnium a superiori & ab inferiori parte similiter lata & plana sunt ', praeter superiorem summae partem. Pariterque a lumborum vertebris continua serie

1 Vefal. Lib. 1. Cap. xv1. Fig. 1.2.3.4. A.

³ Ibid.

ie furfum ad decimam usque gracilecunt, & fingula breviora fiunt²; melia quoque parte nonnihil graciliora; ed a lateribus depressa, & in priora proninula; habentque interpositas lamelas tenuiores, & cum vertebris suis tenuatas³. Ex quo dorsum erectum & lexile est, sed ea parte stabilius & riidius.

Inde reliquarum corpora 4 collum versus paullatim latescunt; a priori pare planiora, nec prominula; per interpositas lamellas 5 paullo crassiores laxius ionnexa; atque sensim ad speciem & axiorem mobilitatem vertebrarum coli propius accedentia.

- 2 Ibid. Cap. XIV. a 20 ad II. L.
- 3 Ibid. inter numeros.
- 4 Ibid. ab 11. ad 8. L.
- 5 Ibid. inter numeros.

123. Corpora denique vertebrarum rolli ' a dorfi vertebris continua ferie iurfum ad quintam gracilescunt: sed inde

I Vefal. Lib. I. Cap. XIV. a 7 ad I.

de caput versus paullatim insigniterque Summae autem dorsi verlatescunt. tebrae & colli inferiorum quinque partes superiores 2 non admodum latae funt: omnes in priora declives & ex transverso profunde sinuatae; medio tamen fundo planiores3. Sic & partes imas 4 colli inferiores sex non admodum latas habent, atque ex transverso gibbas, & in medio planiores; ad haec a posteriori parte in prioremi modice finuatas & declives. Adde quod haec omnia prope dorfum levia fint; inde vero caput verfus magis magisque infignia fiant. Ex quo fuperior quacque earum inferiorem quamque quodammodo ingreditur 5; eamque ipsami ob caussam, & quod lamellis crassioribus disjunguntur, ad laxiorem motum accommodatae funt.

2 Exempla praebet Vefal. 1. c. Cap. xv. Fig. 8, inter 1 & 25. & Fig. 9. x. n. 0.

3 Ibid. n.

4 Ibid. Fig. 7. fub e.

5 Ibid. Fig. 10. vide binas inferiores.

124. At vero corpus vertebrae, quae

(97)

eltera a summa est, sursum versus in latus utrumque praecipue atque infigniter latescit', ut summam a vertebram vertici- a 125. bus suis utrimque sustinere posset: & ut axam eidem mobilitatem simul praestaret, peropportune a superiori parte, qua summam sustinet, abit in tubercua duo², quorum unum in dextris est, alterum in sinistris; utrumque satis lacum, leviter eminens & propemodum planum, oblique positum, id est, a media axi declive ad latus recedens 3, a parte priori ad posteriorem gibbum, cotum prope orbiculatum, praeterquam quod in posteriora, supra processum qui a latere corporis retrorsum procedit, nonnihil producatur⁴, totum quoque laevi cartilagine crustatum.

Sed medio inter haec tubercula loco excrescit in altum, totumque migrat in procession ' axi prorsus similem, crassum

Vefal. Lib. 1. Cap. xv. Fig. 5.
Ibid. c. & d. e.f. & Fig. 6.
Ibid. à d. ad e.
Ibid. f.
Ibid. à k.l. ad n.

med.

fum validumque, procerum, rectum, b 125. & fere teretem, qui intra fummam b vertebram recta erigitur 6, donec supra ejusdem istius vertebrae eandem & priorem & mediam partem nonnihil emineat. Haec porro axis a priori parte teres est, & non longe a cacumine suo superficiem 7 habet gibbam, fere ovatam, laevem, laevique cartilagine crustatam, ad quam deinde vertebrae summae pars interior sinuata b admovetur versaturque. A posteriori autem parte gracilior in medio est, & quasi trochleae orbitae similis8; eâque parte ligamentum admittit & retinet, quod a summa vertebra pone hanc axem ex transverso procedit, & circum eandem vertitur. Sursum denique in cacumen 9 acutius & asperiusculum fastigiatur, quod ligamenta, quibus ad caput alligatur, valida educit.

125.

6 Ibid. Fig. 10. & 11... 7 Ibid. Fig. 5.g. 8 Ibid. Fig. 6. i. 9 Ibid. Fig. 5. & 6. n.

125. Similiter quoque corpus vertebrae *fummae* admodum latum eft¹; atque ab inferiori parte in duos finus ² abit, magno disjunctos intervallo; utrumque etiam leviffimum, fatis latum, oblique pofitum, fimiliterque in latera declivem³, & quafi orbiculatum, cruftatumque laevi cartilagine. Atque his folis fuper tubercula ^a fubjectae verte-^a 124. brae nititur ⁴ non modo tota haec verinit.

Medio autem inter finus istos loco prope totum exsectum est, a priori tantum parte exigua portione⁶ remanente, quae ab una quasi corporis parte ad alteram procedit, tota arcuata, tenuis, solida tamen validaque: itaque spatium parat in quod subjectae vertebrae

r Vefal. Lib. 1. Cap. xv. Fig. 2. ad latus M utrumque.

- 3 Ibid. ab a. ad b.
- 4 Ibid. Fig. 10.
- 5 Ibid. Fig. 4. inter Y. & a. b.
- 6 Extrinsecus, Ibid. Fig. 2. ad latus M utrumque. Intrinsecus, Ibid. Fig. 4. ab Y. per L. ad a. b.

N 2

² Ibid. Fig. 4. Y. & a. b.

b 124. brae axis b furrigitur 7. Ad hujus deinfin. de axis priorem partem admovetur tota arcus istius pars eadem & interior & media, eam ipsam ob caussam leviter & quodammodo orbiculatim sinuata8, aequabilis, laevique cartilagine crustata. Ut autem ad axem illam applicata femper retineretur, sive quiescens, sive mota, natura a tuberculis⁹ oblongis, quae ex utroque exsecti corporis latere interno, axem respiciente, non longe ab arcu illo eminent, ligamentum crassum & validum ex transverso deduxit pone axem 10, quod eam arctislime adstringit, nec ullam in partem vacillare finit. Ex e 124. quibus vertebra summa circum axem 9 fin. subjectae, & supra ejusdem tubercula d, d 124 laxe & cum stabilitate verti potest & ad init. dextram & ad laevam, atque etiam in priora & in posteriora deorsum nonnihil inclinari.

(100)

In summo denique vertice, supra de-

- 7 Vid. citat. §. 124. 6.
- 8 Vefal. 1. c. Fig. 3. & 4. L.
- 9 Ibid. Fig. 3. & 9.0.0.
- 10 Ibid. in textu, K.

lescriptos finus, altius utrimque finuaum est ". Ac finus illi fimiles tubeum e offis occipitis funt, & magni-e 23, udine, & figura, & positura, fimilier quoque cartilagine tenui crustati: taque plane apti ad recipienda eadem sta tubera, atque adeo ad totum caout suftinendum: cui praeterea ex his urticulis mobilitas laxa & certa est; praefertim nutatio in priora, & in postetiora; hoc etiam ossium contextu quolammodo cedente, quo tempore caput vel ad latus inclinamus, vel circumagimus.

11 Ibid. Fig. 2. & 3. N. & O. P. Q. R.

126. Processus vertebrae cujusvis obliqui adscendentes cum descendentibus superimpositae committuntur; omnes qua parte alii alios tangunt cartilagine laevi crustati, & ligamentis undique constricti. Sic siunt laxae vertebrarum commissurae, in utroque latere una, modice pone corpora: hae autem spinam magis stabiliunt, nec tamen cer-

tae

(102)

tae & necessariae mobilitati ejus ob-

127. Et primo quidem obliqui adscendentes summi sacri ossis ' & vertebrarum lumborum 2 omnium qua se mutuo spectant lati sunt3, & ad posteriora versus diducti 4; iisque partibus totis satis profunde sinuati⁵, tubercula 6 admittunt, infignia illa, oblonga, gibba, aequabilia, quae in lateribus exterioribus obliquorum descendentium vertebrarum lumborum 7 omnium & proximae dorsi 8 funt. Sic fiunt sex utrimque articuli, magni & firmi; qui stabiliunt lumbos, simulque permittunt, ut eos quoquoversus cum firmitate flectere, & quodammodo vertere queamus.

128.

Vefal. Lib. 1. Cap. xv111. Fig. 1. & 2. S.
 Ibid. Cap. xv11. Fig. 1. 2. & 3. I. & M.K.L.
 Ibid. Fig. 2. M. K.L.
 Ibid. Fig. 1. & 3.
 Ibid. Fig. 2. & 3. K.
 Ibid. Fig. 2. & 4. O. & Cap. xv1. Fig. 4. h.
 Ibid. Fig. 3. N.
 Ibid. Cap. xv1. Fig. 4. g.

(103)

128. Sed processus obliqui adscendentes vertebrarum dorsi ' omnium & colli 2 inferiorum quinque, atque descen. dentes dorsi 3 superiorum undecim & colli 4 inferiorum sex, praecedentibus a multo minores sunt; hi in poste- a 127. riora modice declives, illi in priora acclives : descendentesque posteriori adscendentium parti extrinsecus insidents; utrique, qua parteº alii ad alios admoventur, propemodum plani, quasi ovati, & aequabiles. In universum tamen adscendentes a posteriori parte levissime protuberant, superficie quodammodo gibba 7; eâque recipiuntur per sinum⁸ evissimum, similiter figuratum positumque,

Vefal. Lib. 1. Cap. xv1. Fig. 1. T. V. Fig. 2 & 3.
 X. Y. Fig. 4. e. f.
 2 Ibid. Cap. xv. Fig. 8. 3. 4. & Fig. 9. δ.
 3 Ibid. Cap. xv1. Fig. 1. c. Fig. 2 & 3. a. b. Fig. 4.
 3. h.
 4 Ibid. Cap. xv. Fig. 7. β. Fig. 8. 5. 6. Fig. 9. γ.

5 Ibid. Fig. II. B. J.

6 Ibid. Cap. xv1. Fig. 1. c. Fig. 2 & 3. X. Y. Fig. 4. e. f. & Cap. xv. Fig. 7. β. Fig. 8. 3. 4. Fig. 9. δ. 7 Ibid. Cap. xv1. Fig. 2 & 3. X. Y. Fig. 4. e. f. &

Cap. xv. Fig. 8.3.4. Fig. 9. J.

8 Ibid. Cap. xv1. Fig. 1. c. & Cap. xv. Fig. 7. B.

que, qui in priori parte tota descentdentium est. Itaque ergo articuli continua praecedentibus serie utrimque septemdecim minores oriuntur : omnes quidem oblique positi, id est, in priora quasi acclives, vel declives in posteriora; sed in dorso rectiores; in collo autem admodum obliqui, eoque magis, quo quilibet situ superiores sunt. Hi dorsum & collum pariter stabiliunt, fimulque utrumque ad priora & ad posteriora flecti, & ad latera inprimis recte: inclinari & incurvari, atque etiam in alterutrum latus oblique, & quasi quodammodo spirae modo, torqueri posse: finunt : dorsum modice tantum, collum vero laxiflime omnium.

Vertebrae autem binae fummae, qua inter fe & cum capite committuntur, ob laxiorem & plane fingularem mobi-124. litatem, articulos quoque fingulares ^b, 125. nullos autem proceffus obliquos atque adeo nullos etiam articulos pofteriores habent.

129. Dextri porro duarum quarum-127. vis vertebrarum articuli illi ^a posterio-128. res es a finistris satis longo intervallo disunguntur : non eodem tamen omnes. Ac lumbor um quidem majores sex b per- b 127. ongo ad os facrum: inde per lumbos isque ad dorsi primos paullatim brevio-Dorfi autem & colli septendecim 1. minorum c primi fere acqualiter distant, c 128. ut ad nonam dorsi vertebram plerumjue magis magisque ad se invicem appropinquant. Inde sequentes per reiquum dorsum & colli initium, usque d secundam a dorso colli vertebram, a e invicem magis magisque discedunt; lonec fere admodum multum inter fe listent tertii & decimi. Qui supersunt lenique quatuor sursum versus paullaim plerumque breviori intervallo disuncti funt.

130. Processus vertebrarum spinosi n plerisque multum dispares sunt ¹. Omnes in posteriorem partem produti, & alii aliis vel recte superimminenes, vel quasi incumbentes ². Plerique omnes

I Vefal. Lib. I. Cap. XIV.

2 Ibid. & Eustach. Tab. XLV11. Fig. 11.

(106)

omnes etiam a media fuperiori parte per longitudinem eminentes & acuti³; ab inferiori latiores, & in medio pariten per longitudinem eminentes acutique, ad latera depreffiores, leviter finuati, & afperiufculi⁴, praefertim ad radicem fuam. Iisque partibus pertinaciter adhaerent ligamenta robulta, quae inten duas quasque fpinas intercedunt, valideque alias ad alias adductas retinent. Totam vero hi proceffus fpinam ftabiliunt, vertebras a posteriori parte constrictas tenentes; fimulque fedem mufculis plurimis praestant.

3 Vefal. 1. c. Cap. xv11. Fig. 1. 2. & 3. C. & Cap. xv1. Fig. 4. S. Fig. 3. R. Fig. 2. N. & Cap. xv. Fig. 8. 11. & Fig. 9. t.

4 Ibid. Cap. xv11. Fig. 2. D. E. & Cap. xv1. Fig. 1. Q. & Cap. xv. Fig. 7. f.

131. Atque in *lumborum vertebris* ' fere recta in posteriora vergunt, modice declives, nec admodum longi, sed lati,

I Vefal. Lib. 1. Cap. XIV. P vertebrarum 24, 23, 22, 21 & 20 collat cum Cap. XVII. Fig. 2. C.F.G. E.& Euftach. Tab. XLVII. Fig. 11.

lati, fatis craffi, ab utroque latere plani, a fuperiori parte tenuiores & quafi acuti ac afperiufculi², ab inferiori craffiores³, a posteriori⁴ denique retusi: in mediis tribus maximi: toti validi, fatisque disjuncti. Quare lumbos stabiliunt, neque tamen eorum & patulum in posteriora curvamen & mobilitatem impediunt.

2 Vefal. 1. c. Cap. XVII. Fig. 3. C.

3 Ibid. & Fig. 2. E. D.

4 Ibid. Fig. 2. & 3. F.G.

132. Ab his autem in proximis dorst vertebris paullatim degenerant. Imae enim hujus lumborum fimilis eft; fed nonnihil brevior, gracilior, magis declivis, magisque in mucronem quasi tenuatus. In fecunda² a lumbis paullo longior, magis adhuc declivis, & in mucronem magis etiam coarctatus. Haec omnia infigniora habet tertia³. Sicque

I Vefal. Lib. I. Cap. XIV. Pvertebrae 19.

02

² Ibid. P 18.

³ Ibid. P 17.

(108)

que praeterquam quod mobilitatem par riter concedant, praeterea fead amplam dorfi in priora curvationem paullatim accommodant⁴. Mediarum⁵ dorfi vertebrarum longiffimi funt, & admodum declives: omnes ex amplis in mucronem acutiorem extenuati, inter feque imbricati, & vinculis arcte conffricti; eamque ob caustam magnam stabilitatem dant huic dorfi parti, ut quoquoversum nonnihil obsequatur magis, quam flectatur; simulque ex hac dorfi⁵ curvatura nimium in posteriora non eminent.

In *fuperioribus* dorfi *tribus*⁶, *quatuorve*, proximarum dorfi fimiles quidem funt; fed a lateribus toti usque in pofteriora latiores, nec ita in mucronem tenuati; paullatimque & modice fuperiores quique breviores fiunt; paullatim quoque per dorfi in priora collum verfus curvaturam⁶ minus declives,& a fe

- 4 Vid. citat. §. huj. 1. 2. 3.
- 5 Ibid. P 16 ad 11.
- 6 Ibid. P 10.9.8.
 - Conf. Euftach. Tab. XLVII. Fig. 11.

(109)

nvicem magis diducti, mobilitatem paullo laxiorem concedunt.

133. Ab his quoque in imis colli paullatim degenerant. Primae ' brevior eft, gracilior, in mucronem magis migrans, rectior, & a fubjecto dorfi ongius diductus. Secundae ² multo previor, gracilior, in mucronem graciliorem & faepe bifurcum extenuatus, iterumque rectior. Quare ad laxiorem mobilitatem paullatim accommodantur.

Sequentibus colli tribus ³ breviffimi dati funt, lati tamen, deorfum modice inclinati, a superiore parte gibbi, ab inferiore cavi, utrobique asperiusculi, ab utroque latere leviter depressi, & extremis suis bifurci: omnes surfum, ad vertebram sextam usque, cum vertebris imminuti. At in *fexta*⁴ multo crasfior est, longior, & infignior. Quapro-

Vefal. Lib. 1. Cap. XIV. P vertebrae 7.
 Ibid. P 6.
 Ibid. P 5. 4. 3.
 Ibid. P 2.
 Conf. Euftach. Tab. XLVII. Fig. 11.
 O 3

propter quanquam ligamentis conftricti collum stabiliant, omnimodae tamen & laxae mobilitati non obstant; neque etiam accumbentes musculos impediunt.

134. Praeterea omnes hi processus toti aptati sunt ad locandos & stabiliendos musculos, praesertim numerofos illos, quibus lumbi, dorsum, & collum a posteriori parte constrata sunt, quique totam hanc spinam cum capite ab ea parte regunt; nempe Sacros, Transversarios dorsi & colli, Dorfi longifimos, Semispinales, Spinales colli, Interspinales; Splenios, horumque partes inferiores, Rectos & Obliquos capitis majores. Deinde & costarum nonnullos, scapularumque, & humerorum; Serratos posticos superiores & inferiores; Rhomboideos, Cucullares; Latifimos dorfi.

135. In *fumma* denique vertebra vix tantillum, & levissimi tantum asperique tuberculi instar eminet ', ut capiti

I Vefal. Lib. I. Cap. XIV. P vertebrae I. & Cap. xv. Fig. 3. 4. & 9. X.

(111)

piti ad posteriora inclinando cedat, musculos capitis non impediat, educatque Rectos capitis minores.

136 Processus transversi ' vertebrarum lumborum omnium longi, fatis tenues, & ab utroque latere plani funt : ad haec nonnihil retrorfum recta procedunt. Omnes e lateribus harum vertebrarum praecipue eminent, ut in iis inserti musculi Quadrati lumborum & Intertransversales lumbos majori vi & rectos tenere, & ad latus flectere queant : deinde ut locum originemque praestent musculis Sacrolumbalibus, Lumbalibus magnis, & Transversis abdominis. Ne tamen inclinato ad latus corpore imi in ossa ileûm, similiterque alii in alios, & summi in costas incurrant, satis disjuncti, imique & summi breviores funt, atque imi insuper fursum versus modice tendunt.

1 Vefal. Lib. 1. Cap. XIV. M vertebrarum 24.23. 22.21.20. & Cap. XVII. Fig. 1.2. & 3. H.

137. Vertebrae autem dorsi processus sus transversos ' crassiores & validiores habent; sursumque & retrorsum tendentes, eo fere magis, quo quilibet fitu superiores sunt. Prima quidem brevislimos, & instar tuberculorum², atque sursum introrsumque pone articulos obliguos minores primos nonnihil reflexos exacutosque. Secunda paullo quam prima longiores & craffiores 3. Decem vero superiores longissimos 4, crassifimos, quasi teretes, a priori tamen parte & ab aversa planiores, ac prope inter se aequales, nisi quod in tribus summis paullatim longiores fiant; aptissimos ad costas superiores decem, vel novem, sustinendas; quarum capitula posteriora recipiuntur per finus laevi crustatos cartilagine, qui a priori parte horum processium, ad ipsos eorum apices, funt 5; fuperiores quidem ampli

I Vefal. Lib. 1. Cap. XIV. M vertebrarum 19. ad 7. coll. cum Euftach. Tab. XLVII. Fig. 11.

2 Vefal. 1. c. Cap. x v 1. Fig. 4. H. I. Euftach. 1. c. 27 - 52.

3 Vefal. 1. c. Fig. 3. H. I. Eustach. 1. c. 28 ÷ 50. 4 Vefal. 1. c. Fig. 1. & 2. H. I.

5 Ibid. Fig. i. K.

pli & profundi, & primo deorsum modice spectantes, inde magis magisque recti; inferiores autem minores, planiores, immo aliquando hinc inde leviter & inaequaliter quasi protuberantes, & paullatim nonnihil oblique in superiora directi⁶. Simul etiam partim locum, partim infertionem & originem praestant hi processus musculis Sacrolumbalibus, Longissimis dorsi, Transversariis dorsi, Levatoribus costarum, Spinalibus colli, Complexis, Trachelomastoideis.

6 lbid. Cap. xiv.

138. Transversi vertebrarum colli processus ' omnes gemina quali radice prodeunt: una posteriore², inter processus obliquos, a priori ipsorum parte; altera priore³, e latere corporis. Jam vero in-

Vefal. Lib. 1. Cap. xiv. M. vertebrarum 7, 6, 5.
4, 3, 2, 1
2 Ibid. Cap. xv. Fig. 8. inter 4. 6. & 25.
3 Ibid. fub 25.

(114)

inter se quoque diffimiles sunt. Nam in *ima vertebra* posterior radix in amplum migrat processum, dorsi procesfuum transversorum similem, sed ab iis degenerantem, breviorem, in latus modice deorsum & simul aliquantum in priora tendentem, latum, a priori parte leviter cavatum surfumque oblique spectantem, ab aversa gibbum: ad hand deinde accedit radix prior, gracilis in latus procedens, statimque tota cum imâ posterioris radicis parte con fluens.

In vertebris fequentibus quatuor un traeque radices fatis latae funt, & ten nues: posteriores ² quidem oblique pos fitae, atque a superiori parte cavae, al inferiori gibbae; priores ³ vero rectae & planae; modiceque progressa, stat tim partibus imis, ad se invicem recur vatis, confluunt⁴, fiuntque processus nues, breves, ampli, oblique in late ra & simul nonnihil in priora declives a superiori parte quasi cavati & patuli al

4 Ibid. ad 9.

b inferiori gibbi, extremis quodamnodo bifurci. Toti vero infigniores unt in vertebris duabus, quae imam tatim fequuntur.

(115)

At *fexta vertebra* posteriores radices graciles & fere teretes habet, priores autem crassiores; ac utrasque mox coeuntes in obtusum tuberculum 5.

Summa utramque radicem habet infigniorem, praesertim priorem; quaeque longius progressae, fimiliter coeunt, abeuntque in processus ⁶ magnos, latos, & plerumque planiores.

Praestant autem hi processi partim priginem, partim infertionem, muscuis qui collum, caput, costas, & scapulas movent; Longis colli, Spleniorum partibus inferioribus, Scalenis, Cervicalibus descendentibus, Intertransverlariis, Trachelomastoideis, Rectis internis capitis majoribus, Levatoribus scapularum : ac *summae* praeterea inprimis Rectis lateralibus, Obliquis majo-

5 Ibid. Fig. 6. & 7. u. 6 Ibid. Fig. 2. 3. & 4. S.

P 2

joribus & minoribus: imae vero Sacrolumbalibus. Simul non impediunt colli mobilitatem; atque inferiores quinque nervis a fpinali medulla in latera tendentibus appofite cedunt.

139. At vero priorem natura his proceffibus radicem addidit, ut pararet foramen', quo processus illi transversi ad exortum suum quasi perforati sunt. Haec foramina in quinque inferioribus, & in summa, recta surium spectant; in sexta oblique retrorsum : in omnibus magna & orbiculata funt; in septima Itaque alia aliis superimmimaxima. nentia, simul ab utroque colli latere faciunt canalem longum, in vertebris inferioribus quinque recta per colli curvaturam sursum tendentem, per sextam & septimam modice extrorsum simulque retrorsum; donec in summa septimae parte abeat in finum 2 amplum, oblongum, circum corpus istius vertebrae

1 Vefal. Lib. 1. Cap. xv. Fig. 8. a. Fig. 5. 6. 7. x. & Fig. 2. T. 2 Ibid. Fig. 2. V.

(117)

rae in posteriora & interiora, fere hoizontaliter, incurvatum; ad arterias & enas vertebrales tutisfime deducendas, d sua quasque in osse occipitis foramina a. * 66.3.

140. Caeterum partes vertebrarum, Juae a proceffibus obliquis & transveris ad fpinofos procedunt ^a, in pleris-^{a117.6}, Jue tenues, validae tamen, incurvae, & aequabiles funt; amplae & latae in *iumborum* ¹ & dor fi² vertebris, & etiam in *ima colli*; longiores, fed minus latae, in colli mediis ³ quinque; gibbae & quafi teretes craffaeque in fumma⁴. Atque hae & foramina vertebrarum perficiunt, & mufculos extrinfecus habent accumbentes, Sacros & Transverfarios Horfi & colli; nonnullis etiam originem praeftantes: ad haec ligamentis conftringun-

I Vefal. Lib. I. Cap. XVII. Fig. 3. inter I. L. N.

2 Ibid. Cap. xv1. Fig. 2. inter a. b. & proceffus X. Y.

3 Ibid. Cap. xv. Fig. 11. inter d. y. & locum in altero latere, ubi eaedem litterae ponerentur.

4 Ibid. Fig. 4. ad latus X utrumque.

guntur validis, quae partibus harum fuperioribus & inferioribus, eam ipfam ob cauffam afperiufculis, pertinaciter adhaerent, fpinamque magis ftabiliunt: hic infuper aliae aliis propiores, illic longius disjunctae, ut in unoquoque loco fpinae vel ftabilitas, vel mobilitas requirit ⁵.

5 Ibid. in Fig. Lib. 1. ultima, & Eustach. Tab. XLIV. & XLV.

141. Hujus columnae appendix eft.
a 118. reliquum os facrum ^a. Primum enimi fub imae lumborum vertebrae corpore conftat ex corporibus ¹ fimilibus quinque, quae alia aliis fupponuntur, firmisfimeque nectuntur, mediis lamellis ilb 120. lis ^b, & hic interjectis, quafi compreffis, totisque in os mutatis. Simul autem
c 118. ab ampla ifta bafi ^c deorfum verfus paullatim gracilefcunt, & extenuantur, donec ultimum corpus coarctetur in mucronem ² extremum, tenuem, oblongum,

> 1 Vefal. Lib. 1. Cap. xv111, Fig. 1, A. B. &c. 2 Ibid. Fig. 1. & 2. a.

gum, a priori parte & ab aversa planiorem, ovatum, leviterque protuberantem; quem coccyx excipit ^d.

142. Corpora deinde illa a lateribus tota abeunt in processus transversos'; crassissimos quidem in superioribus tribus; tenuiores, attamen latos, in inferioribus. Omnes hi processus cum vertebris suis fere imminuuntur, & postquam paullisper processere, extremis suis in unum plane confluunt: ex quo latera offis facri oriuntur. Horum autem pars superior primum coagmentarur offibus iliûm a; deinde ad posterio-a 119. rem harum commissurarum partem, quodvis istorum laterum sinus duos² amplos, inaequabiles, iterumque sinuatos & quasi perforatos, mediaque eminentia disjunctos 3, habet, ad firmanda ligamenta, quibus os facrum ad iliûm ossa valide alligatur. Inde porro deorsum versus paullatim tenuiora, paulla-

I Vefal. Lib. 1. Cap. xv111. Fig. 1. L. L. R. &
Fig. 2. L. M. L. R.
2 Ibid. Fig. 2. P. Q.
3 Ibid. Φ.

latimque minus procera⁴, ab offibus ifchiis recedunt; ad quae tamen alligata tenentur per ligamenta longa & valida, inferta tuberculis⁵ oblongis, quae ab utroque latere in medio eminent.

4 Ibid. L. R. usque ad extremum.

5 Ibid. R.

143. Quinetiam processus obliguos, & partes ab iis in posteriora tenden. au7.6. tes a, degeneres illae vertebrae habent; cum ipsis vertebris pariter imminuta; sed quae omnia in se muituo fusa, simul producunt scutum ' plerumque integrum, tenue, solidum, latum & longum, a superiore parte latius, deorsum versus cum vertebrarum corporibus angustatum, & tandem dehiscens; quod parti corporum posteriori oppositum, cum ea facit canalem offis facri; hujusque offis pars est eadem & postica & media; processus quoque exigens spino s 2 tres quatuorve, minutos & breves,

Vefal. Lib. 1. Cap. xv111. Fig. 2. inter d. d. d. &
3. 4. 5. 6. & fic in altero latere.
2 Ibid. d. d.

(121)

ves, simplices, & deorsum quodammodo inclinatos.

Processus vero obliqui descendentes corporis imi deorsum tendunt; ipsi graciles & fere instar tuberculorum; ad excipiendos processulos primi officuli coccygis adscendentes. ^a a 146.

144. Atque ex his a tandem fit os fa- a 118. trum; quod totum amplum est, latum 141. & longum, quasi triangulum; a supe-142. riori parte inter osla iliûm crassius, la. 143. zius, & per longitudinem rectius; ab infe- 127. 1. riori tenuius, angustius, & in priora recurvatum; a priori parte satis acquapile, & per transversum planius, nisi quod ad offa iliûm modice in prio. a recurvetur; a posteriori gibbum & inacquabile: quodque & spinae basis est, & pelvis pars postica stabilis, & etiam pars trunci posterior sub lumbis; simulque posteriori parte sua, & lateribus ub oslibus iliûm, partim locum originemque, partim insertionem praestat musculis Sacris, Longissimorum dorsi & Sacrolumbalium principiis, Latisfimis dorsi, Glutaeis magnis, Iliacis externis, & Coccygaeis. 145.

2 141. 145. Extremo denique ossi sacro 2 appenditur coccyx'; ipfe similiter constans ex vertebris degenerantibus &: fimplicioribus, id est, ex corporibus; quatuor 2, aliis aliis pariter suppositis, & ab offe facro caudae inftar paullatim imminutis, donec ultimum in mucronem cartilagineum abeat 3. In universum autem corpora ista a priori parte: planiora⁴ sunt, a posteriori leviter gibba 5 : dein a superiori lata & sinuata 6; ab inferiori angustiora & modice gibba 7; primumque officulum extremumi offis facri mucronem parce sua superiore leviter recipit, eodemque deinde alia alia modo, sed semper levius, recipiunt: adde quod per interpositas lamellas⁸, ut b 120. vertebrarum corpora b, nonnihil disjun-

Vid. citat. §. 116.4. & Vefal. Lib. 1. Cap. XVIII.
Fig. 3. & Euftach. Tab. XLVII. Fig. 11.28 - 82.
Vefal. 1. c. G. H. I. K.
3 Ibid. Fig. 3. c.
4 Ibid. Fig. 1.G. H. I. K.
5 Ibid. Fig. 3. G. H. I. K.
6 Ibid. fupra G & c.
7 Ibid. fupra b. & c.
8 Ibid. b. & c.

junguntur, inter seque laxius nectuntur; ad facilem modicamque in priora & in posteriora flexionem coccygi concedendam.

146. Processus praeterea obliquorum similes ' ex his officulis solum plerumque primum habet, graciles, satisque proceros; qui a posteriori hujus parte fursum tendunt ad processulos descendentes a offis facri, ad cosque alligan- a 143. tur; principium coccygis stabilientes.

1 Bidl. Tab. xcv111. Fig. 2 & 3. A. B.

147. Ac primum quoque & fecundum, & quodammodo etiam reliqua, a superiori laterum suorum parte ad instar processium transversorum extuberant', co minus quo quodvis officulum humilius est; iisque partibus inseruntur musculi Coccygaei.

I Conf. Vefal. Lib. I. Cap. XVIII. Fig. 1.2.3.

148. Coccyx itaque pars ipla extrema oslis sacri est, gracilescens, flexilis, to-

(124)

totaque paullatim, & faepe varie, degenerans; quae in priora acquabiliter recurvata, pelvis pars eadem & pofterior & ima ftabilis, & tamen nonnihil obfequiofa eft; apta & ad anum fulciendum, hujusque fphincterem ftabiliendum, & ad originem Glutaeis magnis praeftandam, & ad cedendum pofteriora verfus.

149. Jam vero quemadmodum spina ex descriptis, atque aliis aliis superimpositis, oslibus fit, eodem modo ex eo-2117.7. rundem foraminibus 2, aliis aliis superimminentibus, canalis oritur amplus & · stabilis, qui magno osfis occipitis forab 68. mini b supponitur, & ab eo per vertebras colli, dorsi, & lumborum, atque inde per os sacrum, procedit: sane quam opportunissime, ad medullam spinalem, in quam abit medulla oblongata per magnum offis occipitis foramen exeuns, recipiendam, tutamque ab omni periculo per totam trunci longitudinem deducendam. Quare & amplitudinem eandem ubique non habet, sed totum se ad spinalis medullae crassitiem,

(125)

em, & prope figuram, accommo at.

150. Et ne in eandem medullam inurrat vertebra fumma cum offe occipis, quo tempore vertitur circum axem ibjectae, foramen vertebrae summae, one articulos cum capite a & cum sub- a 129. A vertebra b, diametrum transversam, b 125. uae inter dextram & sinistram partem init. ntercedit, multo quam subjectae longioem ' haber.

I Vefal. Lib. 1. Cap. xv. Fig. 4. à q. ad eunem locum in altero latere.

151. Hic canalis, cum acque atque alva a arterias admittere, venasque & a 55. naxime infignes ad corpus tendentes iervos emittere debeat, pervius pariter ist factus, viis utrimque triginta', per otam ejus longitudinem ordine aptisjue & accommodatis locis patentibus; ple infuper ad extremum dehifcens². 152.

 Q_3

I Vefal. Lib. I. Cap. XIV. Q. Q. &c. 2 Ibid. Cap. xvIII. Fig. 2. k.

(126)

152. Viae illae, sub osse occipitisa principium coccygis usque, relinquui tur primum inter os occipitis & fun mam vertebram, deinde semper inte duas quasque se subsequentes vertebra postremo inter os facrum & primu coccygis officulum. Omnes a lateribu pone vertebrarum corpora patent, fiuni que praccipue ex processibus illis, qu a lateribus corporum vertebrarum re 2117. 2. trorsum procedunt a, modice, qua al alios, id est superiores & subjecti se mi tuo spectant, sinuatis '; tum a corpo ribus ipsis, eorumque commissiris; pe articulos denique posteriores (praete pn

> I In capite, (quod circum magnum foramen suu vertebrae summae simile est) Vesal. Lib. I. Can IV. Fig. I. H.

> In summae vertebrae superiore parte, Ibid. Fil 3. V.

> In parte ejusdem inferiore, Ibid. Fig. 4. q. In vertebrae, quae altera a summa est, par superiore, Ibid. Fig. 6. p.

> In reliquis vertebris, ut Ibid. Fig. 7. 7. & Fil 9. 5.

> In vertebris dorsi & lumborum, conf. Ibid. Ca XIV.

In offe facro, Ibid Cap. XVIII. Fig. 2. 1.

rima duo paria) perfectae 2. Ac prina quidem paria duo fissurarum amliorum, & quasi horizontalium, speiem habent. Reliquae viae amplae unt & irregulares, inter seque & mainitudine in universum inaequales, & igura in collo, dorso, lumbis, & subumbis diffimiles ². Itaque mirifice a provida natura paratae sunt, primum it nervi aequaliter tutoque in utrumque orporis latus ducantur; deinde ut spina ad usus necessarios inclinari, flecti, & torqueri possit, caputque super summam vertebram, ac summa super subectam, laxe moveri, nervis interim vasisque, quae per has vias deducunur, neque distractis, neque compresfis.

2 Conf. Ibid. Cap. XIV.

153. Cum vero processus transversi offis sacri omnes cito in unum confluentes, atque majorem partem offibus iliûm nexi, impediant nervorum, ex quatuor viarum oisis istius paribus, in latera progres-

greffum; viae illae abeunt in foramina quae per longitudinem offis facri, anto & retro, patent, inter processus trans versos, priusquam coeunt; quatuor ui trimque paria'; priora quidem inter dictos processus, & corpora vertebrarum eorumque commissuras²; posteriora inter eosdem illos processus, & processus obliquos in se mutuo fusos³. Ex his autem priora 2 magna sunt & prope orbiculata, eoque minora, quo quaelibet humiliora : omnia ad latus quasi tendunt; fingulaque abeunt in finum, confluentibus processibus transversis a priori parte impressum, & ad latus pergendo sensimevanescentem; ac superiores modice deorsum tendunt; subsequentes paullatim rectius in latera; imi leviter imprimuntur. Posteriora foramina 3 minora sunt, & inaequalia.

I Eustach. Tab. XLIII. XLIV. & XLVII. Fig. 11. Spigel. Lib. 11. Tab. 1X. Fig. 1 & 2. 1. 2. 3. 4. 2 Vefal. Lib. 1. Cap. XVIII. Fig. 1. 3. 4. 3 Ibid. Fig. 2. 3. 4. 5.

154. Quamobrem quoniam spina, sub-

(129)

subjecta corporis trunco, ex oslibus descriptis a, multis parvisque, exstructa est, a 116 ossaque illa commissuras habent plane ad 154 fingulares, atque ligamentis valide retinentibus, & tamen obsequiosis, constringuntur, tota singulars opera artisicioque perfecta est, ut musculis suis, copiosis illis validisque, firmata, & firma stabilisque sit, ad truncum totum stabiliendum erigendumque, & facile, quo velimus, per multos vicinosque & parvos articulos curvabilis, ad lumbos, dorsum, & collum, vel erigenda, vel aequabiliter a summo inflectenda, vel quasi torquenda; quovis osficulo declinante intervallo minimo : deinde etiam, ut via sit tutissima, perpetua, multisque transversis divisa, medullae spinali a capite ad extremum truncum, nervisque ab ea ad corpus ducendis.

155. Hujus deinde mirabilis figura ad corporis aequilibrium, fingularumque partium ufus, plane accommodata eft. Nam a facro osse lumbi primo in priora infigniter curvati, mox rectiores, ad posteriora modice inclinant, patulo in R poste-

(130)

posteriora curvamine; ad thoracem commodius sustinendum, non obstantibus partibus, quae in abdomine repositae: funt. Inde dorsum ad posteriora inclinans, leviter a summo inflexum est, patulo in priora curvamine; thoracem medium a posteriori parte augens, faciensque ut ad priora nimium non inclinet. A dorlo sursum in priora fertur collum, modice reflexum, caput, in priora quafi pendulum, suftinens. Sublumbis autem os facrum primo inter offa iliûm ini posteriora rectius tendens, pelvis cavum auget; inde cum coccyge aequabiliter in priora incurvatum, eandem pelvim inferiora versus coarctat, ad anum fustinendum in priora tendens.

Vefal. Lib. 1. Cap. XIV.

156. Quin & certa ejusdem mobilitas maxime convenit. Tota primum stabili osse facro plane firmata. Supra hoc deinde tota, fere usque ad caput, ad omne latus inclinanda & inflectenda; praesertim in priora, & aequaliter in utramutramque partem; quodammodo etiam torquenda: lumbis imoque dorso firma fimul, & quantum neceffarium est mobilis: medio dorso stabilior: collo & capite (quod summa pars spinae est) laxe atque praecipue, certaque lege mobilis: coccyge denique nonnihil obsequiosa.

157. Et cum spina cum capite per se non rigida, sed tota slexilis & obsequiola sit, musculis, quibus erigatur & regatur, plurimis validisque instructa est; iis omnibus, aliisque costarum, abdominis, scapularum, humerorum, semorum, nec non ligamentis, sedem & fundamentum praestans; atque ab eorundem nonnullis certis in locis varie depressa & finuata, aut protracta & afperata.

158. Tota porro a priori parte fimplicior est. Sigillatim vero in collo fummoque thorace planior, cedens pharyngi cum stomacho, atque laryngi cum aspera arteria. At in reliquo thorace assures, ad posteriorem thoracis partem discernendam, & locum com-R 2 momodum parandum stomacho, arteriae magnae, venae azygae, canali chylifero. In lumbis minus prominula; itaque, etsi in posteriora incurvata, non impediens arteriam magnam & venam cavam. Postremo ad pelvim planior, hujusque amplitudinem a posteriori parte augens.

159. Media denique spina, exvertebris dorsi constans, simul etiam pars thoracis sceleti eadem & posterior & media stabilis est; atque costis omnibus stabilitatem, earumque articulis posterioribus sedem idoneam praestat.

160. Dorfum igitur ad recipienda capitula prima coftarum *finus* ' in utroque latere habet diftinctos duodecim; omnes
a 122. corporibus a vertebrarum dorfi imprefb 152. fos, prope ' vias nervorum b. Et primus quidem utrimque in margine fuperiore corporis fummae dorfi vertebrae eft, rotundus, fatisque profundus: fubfequentes autem novem quique funt in marginibus fe mutuo fpectantibus corportione

I Vefal. Lib. 1. Cap. XIX. Fig. 3. X.

porum duarum inter fe nexarum vertebrarum', & fiunt ex finibus duobus minoribus, planioribus, inaequalibus, & lamellam mediam c, corpora illa con-c 120, nectentem, verfus declivibus; inferiore femper majore': duo denique postremi in marginibus fuperioribus corporum vertebrarum dorfi imarum duarum, rotundi infignesque: omnes cartilagine crustati, capitulisque costarum magnitudine & figura respondentes.

Ad hos accedunt finus d processium d 137. transversorum.

161. THORAX SCELETI', conceptaculum amplum & mutabile, mediae spinae a priori parte appensus est, ac praeter dorsi vertebras a constat ex Pe-a 159. Etoris osse', Costisque quatuor & viginti.

1 Eustach, Tab. XLIII. XLIV. XLV. 2 Vesal. Lib. 1. Cap. XIX. Fig. 6 & 7.

162. OS PECTORIS, fundamentum inter dextras & finistras septem superiores extremas costas a priori parte inter-R 3 jc-

(134)

jectum, ossa praesertim tria ' componunt.

I Vefal. Lib. 1. Cap. XIX. Fig. 1. g. h : h. i: i. k.

163. Eorum primum & fuperius ' trianguli formam quodammodo habet, ac parte fua fuperiori², infigniter lata, inter latas craffasque & duriores & etiam breviores primarum coftarum cartilagines interponitur³, iisdem late firmiterque lateribus fuis ⁴ Junctum : fic coftas illas primas stabilit; & viciss ab iisdem optime, & quantum expedit, firmatum, pars totius offis pectoris stabilior est, cum costis illis surfum deorfumque mobilis.

164.

I Vefal. Lib. 1. Cap. XIX. Fig. 1. g. h. Euftach. Tab. XLVII. Fig. 18. 5 - 28. & fic Fig. 19. 20. 21.

2 Vefal. 1. c. Fig. 6 & 7. à p. ad alterum latus, conf. Eustach. 1. c.

3 Vefal. 1. c. Fig. 1. coll. cum Euft. Tab. XLIII. 4 Vefal. 1. cit. p. Euft. Tab. XLVII. Fig. 18. $2 \stackrel{!}{}_{-} \stackrel{.}{}_{-} 27 \stackrel{!}{}_{-} \& 7 \stackrel{.}{}_{-} 27.$

(135)

164. Deinde a superiori illa a partea 163. deorsum versus insigniter angustatur', parteque ima², angustiore, fere recta, & inaequabili, per interpositum gluten cartilagineum & obsequiosum connectirur² cum parte offis fecundi superiore², imiliter angusta, rectiore, & inaequa-Inde porro os secundum 3 deoroili. um tendit, praecedente multo longius, nferiora versus paullatim modiceque atescens 4, & tandem extremitate quolammodo orbiculata 5 finiens; cujus imae oarti⁶ adglutinatur⁶ os tertium⁷, mininum, multo angustius, breve, & ab inferiori parte in cartilaginem⁸, forma variam 9, abeuns. Ex quo totum os pectoris

I Vefal. Lib. 1. Cap. XIX. Fig. 6 & 7. à p. ad u.
k Fig. 1. à C. ad D. coll. cum Euftach. Tab. XLVII.
Fig. 18. 19. 20. 21.
2 Vefal. 1. c. Fig. 6 & 7. t. coll. cum Euftach.
c.
3 Vefal. 1. c. Fig. 1. h. i. & Fig. 6 & 7. à t
ad ζ.
4 Ibid. Fig. 6 & 7. usque ad Z.
5 Ibid. à Z per β.
6 Ibid. ζ
7 Ibid. Fig. 1. k.
8 Ibid. Fig. 6. & 7. n.
9 Euftach. Tab. XLVII. Fig. 18. 19. 20. 21.

(136)

ctoris satis longum & stabile est; nec tamen plane rigidum, sed nonnihil obsequiosum.

a 163. 165. Ex his a igitur factum os pecto 164. ris, praeterquam quod costarum primarum cartilagineis extremis continue b 163. tur b, praeterea costarum ab utroque latere subsequentium sex cartilaginea extrema recipit ' sinibus', formam anguli quodammodo habentibus, & cartilagine crustatis, quos in utroque latere sex habet, ordine dispositos; primos ad commissuram offis primi cum secundo, subsequentes quatuor 4 in lateribu: offis secundi, ultimos' ad commissu. ram offis fecundi cum tertio: fuperiores cujusque lateris satis inter se distantes, imos propinquiores. Quare fundamentum stabile est, quod septem superiora costarum paria sustinet & ordinat; par quidem superius pertinaciter, caetera autem articulo nonnihil mobili; ab iisdem

- 4 Ibid. x. y. z. a.
- 5 Ibid. B.

¹ Vefal. Lib. 1. Cap. XIX. Fig. 1.

² Ibid. Fig. 6& 7. u. x. y. z. a. ß.

³ Ibid u.

(137)

dem vicisim firmatum. Simul etiam thoracis, pectorisque, partem eandem & priorem & mediam perficit; eam ob caussam modice latum & planius, fed per longitudinem nonnihil incurvum, atque extrinsecus ⁶ gibbum, ex interiori ⁷ parte concavum.

6 Ibid. Fig. 6. 7 Ibid. Fig. 7.

166. Et ut basis quoque idonea effet, in qua inniterentur, & ad quam moverentur claviculae, superior ejus pars', utrimque ad primarum costarum cartilagines, sursum versus insigniter crassecit; atque a superiori parte abit in sinus² duos, magnos, oblongos, per longitudinem simos & declives in latera, a priori parte ad posteriorem gibbos & modice declives, cartilagine crussatos, mediaque summa in lunulae siguram formata ossis parte secretos: hi claviculas su

1 Vefal. Lib. 1. Cap. x1x. Fig. 1. fupra C. 2 Ibid. Fig. 6 & 7. 9. r.

(138)

sustinent³, interposita lamella cartilaginea mobili.

3 Ibid. in fin. Lib. 1. Tab. 1 & 2.

167. Fundamentum denique praesta principiis musculorum Pectoralium, Sternomastoideorum, Sternoyoideorum Sternothyroideorum, & Triangularium firmat Diaphragma, & Transversos abdominis.

168. Costa E multo maximam & praecipuam thoracis sceleti partem faciunt ': ossa longa, modice lata, maxima ex parte plana & tenuia, incurva, parte cavâ laevia & aequabilia; primis partibus crassa dura, inde priora versus paullatim tenuiora & infirmiora; postremo a priori parte rursus nonnihil crasses tia, fungosa tamen, & in cartilaginem², fatis, pro magnitudine cujusvis costae, longam, latam, crassa, & pariter incurvam, degenerantia.

169.

1 Vefal. Lib. 1. Cap. XIX. Fig. 1 & 2. 1 — 12. conf citat § 5. 1. 2 Vefal. I. c. Fig. 3. B.E. & Fig. 1. & Euftach. Tab. XLIII.

(139)

169. 'Atque duodecim tales a costae a 168. ad utrumque dorsi latus, directo per totam dorsi incurvi longitudinem ordine, aliae infra alias, intervallis inter sefe modicis disjunctae, ita dispositae sunt, ut omnes partibus primis dorso inhaereant, indeque in priora tendant, ac dextrae & sinistrae partibus suis concavis se mutuo spectent. Dextrae etiam quaeque sinistris quibusque, e regione collocatis, magnitudine & figura respondent. Tum autem superior brevis est; sub eam sequentes sex paullatim longiores fiunt : atque septem hae primae utriusque lateris, quas veras appellant, cartilaginibus suis usque ad os pectoris perveniunt, & ad utrumque oslis istius latus, & per totam ejus longitudinem, similiter ut ad spinam, aliae infra alias, modicis quoque intervallis b inter duas quasque relictis, ordi-b 165. nantur; ab osse isto firmatae, vicissimque id ipsum sustinentes. Rursum a septima reliquae inferiores, quae not hae, paul-

I Euftach, Tab. XLIII. XLIV. XLV.

paullatim infigniterque breviores fiunt, fic ut duodecima brevissima sit: quare & ad os pectoris non pertingunt; sed octava cartilagine sua extrema, paullatim gracilescendo in acutum mucronem abeunte, imae parti cartilaginis septimae jungitur; ac sic nona octavae, & decima nonae; duae denique imae lateribus abdominis extremis suis partibus inhaerescunt. Adde quod omnes a lateribus corporum vertebrarum dorsi in latera, juxta priorem partem extremorum procelluum transversorum vertebrarum dorsi, maxime incurvae procedunt, ac sic ad utrumque dorsi latus patescunt; inde in priora recurvantur, & porro per latera incurvae incedunt; donec tandem a priori parte superiores recurventur os pectoris versus, inferiores autem paullatim in thoracis lateribus definant. Ad haec superiores maxime incurvae funt, inferiores rectiores.

Eoque fit ex costis, & ex dorso ac pectoris osse (quae costis stabilitatem dant) unius cavi magni, partim ossei partim cartilaginei, & majorem partem innterrupti, species: cui oblonga, & fee ovata, figura; praesertim a priori parte, & a lateribus; totum nempe a uperiori parte angustum, hinc deorsum verfus paullatim & aequabiliter infignierque ampliatum, ima tandem parte rurlus nonnihil coarctatum; a posterioi porro parte, & a lateribus, longius; 1 priori breve; tum a media postica pare, prominentibus in priora, id est, os pectoris versus, corporibus vertebrarum dorsi, per longitudinem aliquancum discretum; eamque ob caussam in medio angustius, a lateribus capacius; alioquin intrinsecus aequabile; denique per se patens a parte superiori, & etiam ab inferiori. Hujus autem pars tota superior praecipuaque cor & pulmones recipit, & contra vim extrinsecus inferendam munit : a lateribus deorsum protensum hypochondriis munimenta praebet : praeterea partim admittens, partim emittens, partim etiam transmittens, trachaeam, arterias, venas, nervos, stomachum, canalem chyliferum. Extrinsecus quoque a priori parte peetus S 3

Etus facit gibbum, latum & planius, breveque; a posteriori dorsum; a lateribus latera.

170. Hoc ipfum cavum pulmonum potissimum caussa, miro opere naturae, certo quodam modo mutabile est. Et primum inhaerent costae omnes, para 160. tibus suis primis, sinibus a corporum vertebrarum dorsi', mobilibus articulis : summa quidem capitulo satis insigni, & fere rotundo², crustatoque cartilagine; secunda superficiebus duabus planioribus, quas in prima parte habet, una scilicet inferiore eademque & majore praecipuaque, altera superiore & minore, oblique positis, eminentia media oblonga transversaque disjunctis, atque eam versus acclivibus, & cartilagine pariter crustatis; eodemque reliquae, usque ad undecimam, modo 3; duae denique postremae superficie insigni,

I Vesal. Lib. 1. Cap. XIX. Fig. 3. a.

² Eustach. Tab. XLVII. Fig. 22. 38 - 30. 3 Vefal. 1. c. Fig. 4. L. Eust. 1. c. Fig. 23. 37 - 36.

gni, planiore, rotunda 4, similiterque Verumtamen ne cartilagine crustata. vacillent, ligamentis singularibus pertinaciter adstringuntur; primo a lamella media b, corpora vertebrarum inter seb 120. nectente, producto, & costis inserto; in prima quidem, & in duabus postremis, tuberculo, quod ad superiorem partem superficiei cum sinibus dorsi commissae est; in reliquis eminentiae oblongae, duas earum superficies disjungenti: deinde & aliis, e tuberculis sinibusve 5 corporum vertebrarum, prope costas, enatis, & primo costarum margini insertis; uno solum in prima costa, a summa dorsi vertebra; & sic quoque in duabus imis, a vertebris quibus inhaerent; at duobus in reliquis costis, a binarum vertebrarum, quibus quaeque costa inhaeret, corporibus, attamen saepe confluentibus.

4 Vefal. 1. c. Fig. 5. N. Euft. 1. c. Fig. 24. 37 - 41. 5 Ut Vefal. Lib. 1. Cap. xv1. Fig. 4. F.

171. Praeterea decem, vel novem, su-

* 170. superiores costae, modico ab istis a com missuris intervallo, id est, qua juxt extremos processus transversos proce dunt, a posteriori parte, ibidemque in imo margine, leniter quasi capitulata sunt, exigentes tubercula ' gibba & car tilagine crustata, quibus processiur transversorum vertebrarum dorsi sini b 137. bus b inhaerent; prima processui trans verso vertebrae dorsi summae, secund secundae, & sic porro: ad eosdem il los processus insuper alligatae, praeser tim per ligamenta robusta, quae a cu jusvis transversi processus apice ad cc stam quamvis tendunt, inserunturqu tuberculo 2 aspero, quod in costarur posteriori parte, juxta capitula praece dentia est; sic magis firmatae, certar quoque mobilitatem habent; nemp partibus illis primis ad vertebras furfur deorsumque verti queunt.

172

Vefal. Lib. 1. Cap. XIX. Fig. 4 M. Euftach
Tab. XLVII. Fig. 22. 42 ÷ 30. & Fig. 2
43 ÷ 36.
2 Vefal. 1. cit. O. Euftach. 1. c. Fig. 2
40 ÷ 35.

(145)

172. Deinde a priori parte cartilaginibus suis non uno modo componuntur. Primae enim cartilago prope os pectoris latescit, & cum eo a in unuma 163: plane confluit 1. Reliquae omnes in priora tendentes modice arctantur². Sex autem infra primam extremis suis crafsioribus 3 recipiuntur 4 in sinus b offist 165. pectoris, articulis nonnihil mobilibus, per ligamenta firmatae : octava ad septimam, & deinde aliae ad a-Has, ulque ad undecimam, extremis fuis acutis alligantur 5; ac fextae, septimae, octavae, & nonae cartilagines 6 mediae saepe confluunt : undecima & duodecima, per se liberae⁷, carne firmantur.

173.

1 Vefal. Lib. 1. Cap x1x. Fig. 1. C.

2 Ibid. 2.3.4.5 6.7. 8.9. 10. 11. 14.

3 Ibid. Fig. 3 E. Spigel. Lib. 11. Tab. VII. Fig. 18. A.

4 Vefal. 1. c. Fig. 1. 2 3. 4. 5. 6. 7. coll. cum Euff. Tab. XLIII.

5 Vefal. 1. c. 8. 9. 10. coll. cum Euft. 1. c.

6 Euft. 1. c. 32 - 27. &c.

7 Vefal. 1. c. 11. 12. Euft. 1. c.

173. Sed & extremae coftae in cartilaginem versae flexibiles sunt & elasticae. Et ex his primae costae cartilago durior est, reliquarum mollior: primae etiam brevis est; inde quaevis costa, usque ad octavam, cartilaginem paullatim longiorem habet; rursus a septima reliquae fingulae paullatim breviorem, ac simul etiam graciliorem. Quare prima cartilago stabilior est; fex infra eam eo facilius flecti possunt, quo quaelibet earum situ inferior est; reliquae facile obsequentur.

Vesal. Lib. i. Cap. XIX. Fig. 1. Eustach. Tab. XLIII.

174. Postremo ipse costarum singularum ductus ad certam earum mobilitatem plurimum confert. Nam praea 168. terquam quod arcuatae sint a, omnes praeterea a dorso in latera modice deorsum versus tendunt '; atque inde etiam porro, per latera corporis ad prio-

I Eustach. Tab. XLIV.



priorem partem, deorsum², eo fere magis, quo quaelibet costa inferior; donec a priori parte³ ad se invicem recurventur, & superior toto ductu declivis ossi pectoris continuetur, ad angulum obtusum cum inferiori offis pectoris parte; secunda eidem ossi jam fere ad angulos rectos inseratur; reliquae omnes, ulque ad undecimam, sursum tendant, eo fere rectius, quo quaelibet inferior; quare & angulus infertionis cujusvis costarum reliquarum verarum eo cum offis pectoris inferiori parte acutior est, quo quaelibet earum inferior : in universum tamen omnes a dorso in priora deorsum tendunt. Ad haec quinque superiores costae aequabili & quodammodo orbiculato ductu a lateribus ad os pectoris incedunt; quinque autem sequentes, hactenus insigniter deorfum tendentes, mox in principio cartilaginum suarum magno flexu facto, inde rectius sursum feruntur; co magis 8z

2 Ibid. Tab. XLV. 3 Ibid. Tab. XLIII. & infignius quo quaelibet istarum co starum inferior. Undecima & duode cima aequabili & rectiore ductu in pric ra deorsum tendunt⁴. Itaque & ad spi nam in universum omnes deorsum infi gniter inclinant, & etiam ad planur per dorsum & os pectoris ducendum.

(148)

4 Ibid. Tab. XLV.

175. Costae igitur decem superiore fic ad spinam partibus suis primis ordi a 169. natae & firmatae sunt a, extremis au 170. tem suis flexibilibus b ad os pectoris c b 173. vel aliae ad alias c, ut mediis suis arcu c 169. bus in universum sursum duci possint 172. & deprimi rursus. Et cum praetere omnes hi arcus ad planum per spinan & per os pectoris ducendum deorsur d 174. inclinati & incurvati fint d, ipsi illi ar cus, quando sursum ducuntur, ad per pendiculum magis eriguntur, ac simu gibbis suis partibus extrorsum in su periora convertuntur. Ex quo dextr quique arcus, a sinistris quibusque, regione collocatis, paullatim recedunt fu

superiores quidem quinque, vel sex, maxime mediis arcubus, sequentes quatuor inprimis prope cartilaginea sua additamenta : ac sic thoracis, ex his costis potissimum facti, amplitudo per transversum augetur. Contraria siunt, quando rursus deprimuntur.

176. Sigillatim vero par coftarum fuperius maxime stabile & pene fixum est a. Reliquae costae mobiliores sunt b, a 172.1. & paullatim eo fere magis duae quaelib 172. bet earum oppositae a se invicem recedere c possunt, quo ipsae situ inferio-c ut res. Eamque ob caussam thoracis latera a summo deorsum paullatim, fere magis magisque, & aequabiliter ampliari, ac rursus coarctari, queunt.

177. Sed etiam orbiculus ille, fere integer & stabilis, factus continuo dudu a costarum primo pari & a primo ossis pectoris osse a, innitensque suis 163. extremis in spina mobilibus articulis b, b 170. & ad ipsam illam spinam deorsum admodum inclinatus c, medio arcu suo c 174. fursum duci potest, magisque ad perpendiculum erigi. Quod si fiat, pars T 3 ororbiculi istius prior, quae spinae opponitur, ab ejusdem illius spinae plano in priora recedit, simulque gibba sua parte extrorsum sursumque nonnihil convertitur. Quin & reliquum os pectoris

eadem opera furfum ducitur : itaque & d 172 coftarum, vel offi pectoris infertarum d, e 172 vel inter fefe ligatarum e, extrema prio-* ra, os pectoris fequentia. Quare illae etiam coftae admodum ex deorfum inclinatis eriguntur, prioribusque fuis cur-

vaturis, una cum offe pectoris, a ípina in priora recedunt : ac fic thoracis diameter, inter priorem & posteriorem ejus partem intercedens, augetur, & fere a fummo deorsum magis magisque & aequabiliter; vicissimque coarctatur, cum contraria fiunt.

- f 169. Costae f autem utriusque lateris imae 170. duae totae per se mobiliores sunt.
- a 177. 178. Denique, quo haec a fiunt tempore, os offis pectoris fecundum & terpore, os offis pectoris fecundum & terginum coftarum fex inferiorum verarum, & priores quoque partes cartilaginum coftarum trium notharum fuperiorum, re-

etrorfum, fpinam verfus, nonnihil coi poflunt; maxime in inferiore thorais parte: quo fit, ut mediae ejusdemue & inferioris thoracis partis, ubi cor ocatum, diameter inter priorem & poftriorem partem intercedens nimium on augeatur, ac latera fimul infignius implientur.

179. Potest igitur offeus ille thorax n universum insigniter a summo deorum, quasi follis instar, maxime a lateibus, ampliari; cum scilicet & costaum decem, vel novem, superiora paria mediis suis arcubus a, & totum os pe-a 175. storis b, sursum ducuntur, simulque os b 177. offis pectoris secundum cum prioribus partibus cartilaginum costarum sex infeiorum verarum, & priores partes carilaginum costarum notharum superiorum trium, retrorsum nonnihil cogunur c; imis interim duobus, vel tribus, c 178. costarum paribus vix dimotis. Idemque ille thorax, postquam sic ampliatus, rursus contrario modo ad pristinam luam angustiorem capacitatem recidere potest: quin etiam ultra nonnihil coangugustari: itaque porro mirabilem in mo dum a rerum creatore constructus est ut, cum cellant caussae vel dilatante vel constringentes, ipse se restituat.

180. Ex quibus omnibus non mode a 169. circumfepta & munita a sunt cor, pul mones, & hypochondria, solidae illiu & durae cratis, id est thoracis, ample xu, quae pleuram & septum transver sum aequabiliter sustinet & stabilit; sec ipfe etiam ille thorax, ut spiritus in pul mones reciproca vicisitudine commea ret, follis instar, certa lege, & per va rios gradus, ampliari, & rursus angustari aequabiliter potest; maxime a la b 179. teribus b, ubi & pulmones positi. Ne que tamen magnum hocce offeumque c 156. cavum necessariam spinae mobilitatem impedit, nec iplum, spina huc atque illuc inflexa, multum patitur, planemirabiliter cedentibus costis, & sele accommodantibus. Deinde multos quod 167. que thorax musculos d, ac scapulas, i 181. temque claviculas e, commode suftine e 166. & firmat.

^{181.} Et costae quidem musculos stabi

biliunt Intercostales, Levatores costaum proprios, Subclavios, Triangulaem, Serratos omnes, Diaphragma, Sacrolumbales, Longissimos dorsi, Cervicales descendentes, Scalenos, Obliquos abdominis, ejusdemque Transversos & Rectos, Quadratos lumborum, Latissimos dorsi, Pectorales: qui & costas varie extrinsfecus partim deprimunt, partim in eminentias tuberculave inaequabilia gibberaque protranunt.

182. Sulcum ' infuper pleraeque ex coftis (exceptis inferioribus aliquibus) nabent, parti eidem & intrinfecae & mae impressum; eumque in omnibus llis oblongum, & aequabilem, & inprimis profundum, qua costae juxta transversos processus in priora pergunt, inleque priora versus paullatim evanescentem; nec in omnibus costis aeque infignem; praesertim autem leviorem in superioribus aliquibus: hi vero fulcus vasis intercostalibus cedunt.

183.

I Spigel. Lib. II. Cap. VII. Fig. 18. F. F.

(154)

182. Ima fpina binis COXARUM OS SIBUS' adaugetur: quae magna, eadem que & valida, & torma varia, iman trunci partem longe ampliorem effici unt; ficque & femorum articulis fede idoneas praestant, & pelvem cum off facro & coccyge faciunt, & musculi multis, iisque magnis valentisfimisque locum, stabilitatem, & originem prae bent.

I Vefal. Lib. I. Cap. XXIX. Fig. 1. 2. 3. coll. cui Tab. ult. trib. Lib. 1.

184. Nempe ad utrumque offis fac 119. latus a Coxarum offa, partibus fuis ii dem & fuperioribus & posterioribus & maximis latisque (quae offa Hiûm ' applicantur, eidemque offi quodvis en rum apre coagmentatur, fuperficie ' an pla, id est, oblonga lataque, planiore & inaequabili, ac cartilagine quadan CT

> Vefal. Lib. I. Cap. XXIX. totum, quod fup lineam, à c, per b, ad S in Fig. 2. & ab S, P N, ad c, in Fig. 3. ducendam, eft.
> 2 Ibid. Fig. 3. A. B. C.C. D.D.

crustata, quam os iliûm in parte sua intrinseca, ac simul inferiori posteriorique, & deorsum nonnihil producta3, totaque crassa & valida, habet : ac ligamentis commissurae istae devinctae firmiterque constrictae tenentur; praefertim vero a posteriori parte b. b 185.

3 Ibid. B.

185. Namque a posteriori istarum 2 a 184. commissurarum parte, utrumque os iliûm ist posteriora, nonnihil ultra os facrum, procedit ', parte 2 ampla & crassa validaque, ac paullatim modiceque ab osse facro recedente: eaque primo statim pone dictam commissuram, qua os sacrum spectat, superficie 3 ampla, inaequabili, gibberaque, excipit & firmat ligamenta crassa valentissimaque, ab osse facro b venientia, quibus ossa 142. ista

Vefal. ad calcem Lib. 1. Fig. 3.
2 Ibid. Cap. XXIX. Fig. 3. pone D. D. ulque ad
Q. H.
3 Ibid. E.F.G.

V 2

(156)

ista pertinacissime retinentur; deinde autem ulterius paululum progressa4, locum parat musculo Sacro, originemque praestat principio Sacrolumbalis ac Longiffimi dorfi.

4 Ibid. pone E. F. G.

a 184. 186. A parte autem earundem a commissurarum priore, coxarum osfa a se invicem in diversum nonnihil discedunt', & per latera prope orbiculatim, atque ampla curvatura, in priora procedunt², iis partibus crassa & valida; paullatimque ad se mutuo recurvantur, partibus tenuioribus, & primo angustis, deinde infigniter latescentibus, quae ofsa Pubis 3 appellant; donec a priori parte per interpositam cartilaginem crassiorem, satisque latam, ac duram, firmissime conglutinentur 4. Sic cum offe

I Vefal. ad calcem Lib. I. Fig. I.

2 Ibid. Cap. XXIX. Fig. 3. ab A, per N, O verfus.

3 Ibid. ab O, u versus. conf. Tab. 1. trium ad fin. Lib. 1.

4 Ibid, Tab. 1. ad fin. Lib 1. s.

offe facro imam plane ftabilem fpinae partem faciunt, ac fimul fummam, eamque amplam, & cavam, ac fere orbicuatam, pelvis oram : privatimque infuper pubis offa musculos ftabiliunt; & oblonga quidem acutaque eminentia ⁶, quama fuperiori parte habent, Pectinaeos, partimque Transversos abdominis; parte autem priore, eaque gibbera & capitulata finuataque⁷, Rectos, Pyramidales, & Obliquos abdominis; intrinsecus Levatores ani magnos.

5 Ibid. 6 Ibid. Cap. xx1x. Fig. 3. O. 7 Ibid. Fig. 1. & 2. juxta u.

187. Media fere pars ista a utrius-a 186. que coxarum ossis arcuata, infigniter deorsum, ac simul nonnihil in priora, & introrsum, protracta, *Ischion*, id est ipsa *Coxa*, est '. Id a latere positum, & primo amplum, crassumque & va-

I Vefal. Lib. I. Cap. XXIX. Fig. 3. ab N.O. ad k Φ.& Fig. 2. à.c. V, ad l. Φ.

V 3

valens2, ab exteriori parte tota finum (cui acetabuli nomen) habet, qui recipit caput femoris, mobili quoquover. sus articulo, firmatoque capía membranacea valida, quae ex margine acetabul externo, ea de caussa inaequabili, orbicutim enata, ad femur tendit. Ac finue ille maximus & fere rotundus eft. Ejus autem superficies + lunata, eaque satis ampla, & ab extrema finus ora interiora versus aliquantum exporrecta, atque in medio latior, extrema versus angustata, cornubusque suis, satis inter se disjunctis, ad partem acetabuli eamdem & priorem & nonnihil inferiorem definens, ac tota aequabilis, cartilagine laevi crustata sola est, solaque & in femoris capite innititur, & ad id versatur. At vero reliqua ejusdem istius sinus pars altius opportune cavata est 5, ipfa inaequabilis asperaque, cum ad locandam glandulam muciparam ita, ut &

² Ibid Fig. 2. & 3. à c. V. ad k. r.

³ Ibid. Fig. 1. & 2. e. f.g.

⁴ Ibid. e.f.

⁵ Ibid. g.

a femore, five quiescentibus offibus hisce, sive motis, plane comprimi nequeat, & tamen leviter quasi emulgeatur, tum ad educendum ligamentum, dictum teres: ad quae ut vasa adrepere possent, ipfum acetabulum inter superficiei istius laevis cornua infigniter deficit, & quafi diminuitur 6, vasa tutissime admittens. Atque ut acetabulum caput femoris exquifitius retineat, simulque extrema ejus ora, cum opus est, cedat, cartilagineo quasi ligamento, orbiculatim orae ejus adnexo, ipfiusque illius orae defe-Aum supplente 7, & in tenue desinente, ac caput femoris arcte complectente, au-Idemque denique sinus maxigetur. mam quidem partem in latera, & fimul aliquantum deorsum, & etiam modice priora spectans, ita mirifice positus est, ut coxa cum toto trunco, in erecto, aut ad priora, aut ad posteriora, aut ad latera inclinato, super femur niti queat, atque eadem coxa super femur inclinari, ad

6 Ibid h. 7 Eustach. Tab. xxxv. 31 - 43. & 24 1 - 43.

(160)

ad priora quidem in angulum valdeacutum, fatis quoque infigniter ad latus externum, & etiam nonnihil ad posteriora, iisdemque plane modis femur ad coxam flecti, possit.

Ischia intrinsecus modice cavata & aequabilia⁸, pelvis laterum partem faciunt.

8 Ibid. Fig. 3. inter c. O. r.k.

a 187. 188. Subacetabulis^a aliquantum deorfum, modiceque in priora & fimul leviter extrorfum, tendunt *ifchiorum tubera*¹; quae angustiora, crassa tamén & valida, fedentis truncum sustinent; atque posteriora & etiam inferiora versus crasses centia, in superficiem quaeque definunt amplam, oblongam, gibbam, & inaequabilem², a qua capita Seminervossi, Semimembranossi, Bicipitis longum, unumque Tricipitis, oriuntur: eademque

> 1 Vefal. Lib. 1. Cap. XXIX, Fig. 2. & 3. ab r. k ad Φ .

2 Ibid. Fig. 2. m. n. o.

(161)

que porro tubera exteriori parte sua Quadrato femoris, interiori autem Gemellis, aliisque ani & urethrae musculis originem praebent.

189. Ima vero ischiorum tubera a a a 188. priori parte tota paullatim in offa ' abeunt tenuia, utrimque plana, nec admodum lata, ac sursum oblique in priora, & fimul se mutuo versus 2, ad pubis offium b partes easdem & priores & b 186: imas procedentia, cum iisque confluenria. Hiec fundamenta sunt corporibus cavernosis penis (aut clitoridis) eorundemque musculis Erectoribus; tum & Gracilibus tibiae, ac Tricipitibus: simulque magnum ex eo cujusvis coxarum offis foramen 3 fit, quod membrana occlusum, originem utrimque margine fuo praestat Obthuratoribus femoris musculis.

I Vefal Lib. I Cap. XXIX. Fig. I. 2. & 3.t.

2 Ibid. Cap. ult. Fig 1. Eustach. Tab. XLIII.

3 Vefal. 1. c. Cap. xx1x, Fig. 1. 2. & 3. r.

190. Ac ne partes illae a fic deorfum a 187. protensae, & ab osse facro magno se-X jun-

(162)

junctae intervallo¹, vacillarent, liga mentis validis utrimque ad os facrum religantur; primo² a posteriori eadem. 188. que interiore inferioreque tuberis ischii 142. parte ad ossis facri latus c, sub ossissistiu cum ossis facri latus c, sub ossissistiu cum ossis acuto processu⁴ (qui a media posteriori eademque & interiori ischi parte os facrum versus aliquantum pro cedit, quique praeterea musculum Coc cygaeum, ac Levatorem ani, & unun de Gemellis, educit) ad eandem illan ossis facri partem tendente.

> I Vefal. Lib. I. Cap. ult. Fig. 2.& 3. Eustach Tab. XLIV. XLV.

2 Eustach. Tab. XXXVI. 17 - 43.

3 Ibid 21 - 43.

4 Vefal. 1. c. Cap. xx1x. Fig. 2. & 3.d.

191. Reliquae autem superiores iliûn ossum partes', eaeque amplae, atque in trinsecus concavae', extrinsecus gibbae

a

- 2 Ibid. ad finistram K. K.
- 3 Ibid. Fig. 2.

I Vefal. Lib. I. Cap. XXIX. Fig. 3. H. K. M. N. T S. P L K. H.

(163)

c majorem partem crassae, in medio auem tenuiores, modice ad latera reclinatae & quasi resupinatae sunt 4, imaque abdominis latera, deorsum versus paullatim coangustata, faciunt, ad incstina, praesertim iliûm, erecto trunco, suftinenda. Sed & utrumque os totum musculis multis locum & fundamentum praebet; nempe cava sua eademque amola & leni parte², Iliaco interno; dor-6 3 amplo & inaequabili, lineisque dilincto, Glutaeis, Rectoque; ora posteriore imaque, statim ante nexum cum offe facro, Iliaco externo; Spinas, id oft summa ora, eaque quasi simiorbicuata, a posteriori inprimis parte crassilima⁶, satis etiam crassa a priori⁷, in medio tenuiore⁸, totaque inaequabili & aspera, Quadrato lumborum, Obliquis

4 Ibid. Cap. ult. Fig. 1. Eustach. Tab. XLIII. XLIV

5 Vefal. 1. c. Fig. 2. Q. H. R. R. P. & Fig. 3. Q. H. L.P.

6 Ibid. Fig. 3.Q.H.

7 Ibid. P. L & Fig. 2. R. R. P. & Fig. 1. R. R. 8 Ibid. Fig. 3. ad K.

Xe

quis & Transverso abdominis, ac Glutace magno medioque; ora priori, statin sub spina, Membranoso & Sartorio capiti denique Recti, tuberculo⁹ am plo, oblongo, & inaequabili, quod in parte eadem & priore & inferiore, pro pe acetabulum, habet.

9 Ibid. Fig. 1. 2. 3. S.

192. Sic itaque facta, inter feque a pta, & coagmentata ofla, Sacrum & Coxarum duo, primo fundamentum stabile sunt, quo truncus nititur; quod que suffultum pedibus, totum sub lumbis, & super femora, cum stabilitate mobile est.

Deinde cum coccyge Pelvem² faciunt: cavum magnum, fere orbiculatum, interruptum, intrinfecus aequabile, totumque maximam partem stabile a 144 factum a posteriori parte ab osse facro a b 48. & coccyge b, a lateribus ab ischiis c, a c 187. prio-

> Vefal. in Tab. ult. trib. Lib. 1. Euft. Tab. XLIII. XLIV. XLV.

2 Vesal. 1. c. Fig. 1. Eust. Tab. XLIII.

priori parte ab offibus pubis d. Hocd 186. vero inferiori abdominis parti stabilitatem & formam dat, ac fimul imum quasi abdominis additamentum est, ad recipienda, transmittenda, ordinanda, & munienda magnam intestini iliûm partem, vesicam, intestinum rectum, ac privatim in viris vesiculas seminales, in foeminis vaginam uterumque cum tubis suis & ovariis. Idemque ab inferiori parte inter ischiorum tubera & coccygem ampliffimo hiatu patens, extremum rectum intestinum emittit, non obstantibus ani necessariae dilatationi ischiorum, satis inter se disjunctis, tuberibus, & cedente mobili coccyge: emittit & a priori parte, sub pubis offium commissura, urethram vasaque & nervos, hiatu angustiore 3: ad haec ab utroque latere, inter os sacrum, iliúm, ischion, ac ligamentum ab acuto ischii processu ad os lacrum pertinens, foramen + habet magnum, per quod ex pel-V1

3 Vefal. 1. c. fub s.

4 Ibid. Fig. 2. Eustach. Tab. XLV. 23 ÷ 43. X 3

vi nervus ischiadicus, cum insigni arteria venaque, ac musculus Iliacus externus, elabuntur : praeterea inter ligae 190. menta illa e duo & ischii tuber utrimque relictus hiatus minor ex pelvi prodire finit Obthuratorem internum; qui porro, tanquam ad fixam quandam rotulam, inflectitur ad posteriorem interioremque tuberis ischii marginem 5, eumque per longitudinem modice finuatum, per transversum vero gibbum, totum crassum, valentem, & aequabilem : denique in summa utriusque magni foramif 189. nis f. parte finus ° est oblongus, & sub pubis offe oblique in exteriora protensus, vasa nervumque transmittens. Summa autem pelvis ora utrimque supra acetabulum, & ante os iliûm, finum 7 habet levem & patulum, a musculo Iliaco interno, & a Pfoa impressum: sic & pubis os utrumque, supra magnum foramen, a parte superiori eademque & priori, ampliter sinuatum est, sinu longio-

⁵ Vefal. 1. c. Cap. xxx. Fig. 1. 2. 3. k.

⁶ Ibid. f.

⁷ Ibid. T.

(167)

giore^{*}, qui musculo Pectinaeo, ac crurali arteriae & venae, vasisque seminalibus in viris, eleganter cedit.

Postremo musculis g, qui hoc ipsum^g 144. trunci fundamentum movent, ac ple-148. 185. risque omnibus femorum, multis quo-186. que crurum, ac lumborum, dorsi, costa-188. rum, abdominis, atque ipsorum humero-189. 190. rum, aliisque qui ad extremum intesti-191. num rectum, ad urethram, & ad penem, aut clitoridem, pertinent, ipsique peni, vel clitoridi, stabilitatem dant.

8 Ibid. V.

111. DE PEDIBUS SCELETI.

193. P EDES duo SCELETI', trunci fulcra, ex columna, hujusque basi, quisque constat.

1 Vefal. Lib. 1. Cap. ult. Tab. 1.2.3.

194. Columna longa est, & crassa, &

(168)

& valentissima, ac fere media, in Femur & Crus, divisa.

Vid. citat §. 193. 1.

195. Ac primo ftatim sub trunco unum utrimque FEMURⁱ est: offa longifsima, crassaque & dura & valentissima, apta ad totam superimpositam trunci, capitis, & brachiorum molem suftinendam, & ad stabiliendos multos vastos validissimosque musculos.

i Vefal. Lib. 1. in fin. Tab. 1. 2. & 3. A. & Cap. xxx1. Fig. 1. & 2.

i 195. 196. Horum ^a utrumque a fuperiori parte ex craffa cervice ⁱ intumescit, abitque in *caput* ² magnum, globosum, & cartilagine laevi crustatum, cumque & cartilagine laevi crustatum, cumque 187. acetabulo ^b magnitudine & rotunditate congruens, & similiter oblique positum, id est surface intrors and the congruent interest enders: ea-

I Vefal Lib. I. Cap. XXX. Fig. I. & 2. D.

2 Ibid. A.A.

(169)

que capita in acetabula conjecta 3, & ab iis quasi comprehensa, coxas suftinere valent; atque ita, ut ipsae illae coxae super haec capita in omnem partem cum celeritate & stabilitate inclinari, & versari queant; similiterque femora ad coxas flecti vertique.

Sinum⁴ praeterea utraque capita, nonnihil sub media convexitate sua, ab interiori parte habent, eumque parvum ac satis profundum & inaequabilem, cui ligamentum teres, ex acetabulo veniens, pertinacissime inseritur.

3 Ibid. in fin. Lib. 1. Tab. 1.2.3. Eustach. Tab. XLIII. XLIV. XLV. 4 Vefal. 1. c. Cap. XXX. Fig. 1.B.

197. Ab utroque istorum a capitum a 196. crassa oblongaque cervix ' oblique in exteriora, & quasi transversa, modice deorsum procedit, magis magisque crassesses donec ab ea reliquum femur, angulo obtuso facto, deorsum tendat. Qua

Y

Vid. citat. 9. 196. 1.

Qua de cauffa utrumque femur ad coxam quodque tuam, etiamfi immotam, ad oppositum latus, id est, alterum femur fecundum alterum intigniter flectere possume, eodemque modo coxam utramque, super femur quamque suum, ad interiora inclinare; deinde & coxas femora totumque truncum melius suftentant²; eademque a superiori parte sic magis divaricata², locum parant multis craffisque musculis.

Extremae cervici capfa ab acetabuli 187. margine externo procedens ^b, totumque hunc articulum complectens & firmans, inferitur, inprimis firmiter adhaerens eminentiae ³ oblongae asperaeque, quae a parte priori est.

2 Vefal. Lib. 1. in fin. Tab. 1. Eustach. Tab. XLIII.

3 Vefal. 1. c. Cap. xxx. Fig. 2. f.

a 197. 198. Porro a cervicibus illis a ad genua deorfum tendentia temora per longitudinem incurva funt; a priori quidem parte gibba, a posteriori concava va': deinde ad coxas longius disjuncta, procedentia ad fe invicem magis magisque appropinquant; quo aptiora fint & ad ftatum erectum, & ad inceffum curfumque, & ad feffionem: atque ut eadem illa femora, fic oblique a cervicibus fuis ad fe invicem tendentia, in rectioribus tibiis infiftere poffint, ab inferiori parte modice in exteriora recurvata funt².

1 Spigel. Lib. 11. Tab. x. Fig. 3. Vefal. ad calc. Lib. 1. Fig. 2.

2 Vefal. 1. c. Cap. xxx. Fig. 1. & 2.

199 Et primo quasi teretia, media intumescere incipiunt', ac procedendo, quo propiora cruri, eo fiunt latiora², donec in capita³ duo maxima definant, quibus innituntur in tibiis⁴: eaque capita infigniter crassa funt, & oblonga, id est, a priori parte ad posteriorem ultra

- I Vefal. Lib. I. Cap. XXX. Fig. 1. ad d.
- 2 Ibid à d deorsum.
- 3 Ibid. E.F.
- 4 Ibid, ad calc, Lib. 1 Fig. 1 2 3.

(172)

tra femur suum porrecta 5, & a posteriori parte diducta 4; tum autem tota per transversum, & praesertim per longitudinem gibba; at ab inferiori parte planiora, a posteriori sursum incurvata & rotundiora; gibbisque suis partibus oblique ex lateribus ad se invicem nonnihil directa, ac laevi cartilagine crustata: privatim vero caput exterius totum rectius a priori femoris parte ad posteriorem tendit; ab eo interius primo introrsum nonnihil abscedens, mox inde in posteriora oblique recurvatur; ad haec exterius minus est, & tum ab inferiori parte, tum a posteriori, planius & latius; interius autem totum plenius, magisque gibbum : insident que utraa 203. que tibiae finibus a, facili, & tamen stabili, totaque singulari mobilitate.

> Jam vero a priori parte capita illa confluunt, abeuntque in *finum*⁶ trochleae rotulae finus affimilem, eumque amplum patulumque, & in priora furfum,

5 Spigel. Lib. 11. Tab. x. Fig. 3. 6 Vefal. 1. c. Cap. xxx. Fig. 2. H. fum, ac fere recta, incurvatum, fimiliterque atque ipfa illa capita cartilagine laevi crustatum; infigniter eminentibus marginibus ejus, & qua parte fe invicem respiciunt, latis gibbisque, praefertim exteriore, qui & sursum versus productior. Ad hunc sinum, & ad ipfa illa capita, in intervallo eorum, patella, cum genu flectimus, rursumque extendimus, libere movetur.

At a posteriori parte eadem ista capita media quasi finuata 7, totaque magno intervallo disjuncta sunt; quo finu illo amplo profundoque & inacquabili recipiant ligamenta, quibus hic articulus firmatur, sic ut ad posteriora insigniter stectendo genu non fint impedimento.

Adde quod femur utrumque, ne genu ad posteriora infigniter inflectendo obstaret, a posteriori parte, supra promentia capita sua, planius, immo leviter sinuatum st⁸. Quemadmodum &

7 Ibid. Fig. 1. I. 8 Ibid. e.

a priori parte, supra sinum patellae amplum & planum & quasi sinuatum non obstat patellae sursum valide trahendae.

9 Ibid. Fig. 1. supra G.

200. Musculorum vero, quos femora firmant, caussa, utrumque primo ad extremam cervicem suam ab exteriori parte sursum versus totum excrescit processu maximo ', qui Trochanter major nominatur: is ab exteriori parte gibbus & inaequabilis², ea ipsa firmat Glutaeum medium minimumque; firmat & Iliacum externum, parte superiori; posteriori autem Quadratum; ab interiori parte inaequabiliter sinuatus³, locum parat insertioni Obturatoris externi internique cum Gemellis; totusque vim Glutaei maximi auget. Deinde a posteriore eademque inferiore extremae cer-VI-

- vefal. Lib. 1. Cap. xxx. Fig. 1. & 2. Q. R. S.
 X. Y.
 2 Ibid. Fig. 1. S. Y. & Fig. 2. V. X. Y.
 - 3 Ibid. Fig. I. R.

(175)

icis parte ex femore eminet Trochanter vinor⁴, tuberculum oblongum, gibum, nonnihil introrsum tendens, ac 'foam & Iliacum internum excipiens. plum porro femur a posteriori parte, ere tota longitudine sua, insertionem praebet musculis validissimis, Glutaeo naximo, Tricipiti, Pectinaeo, Vastis, ducitque caput Bicipitis breve, ab iis plis in eminentias oblongas & inaequaviles gibberasque⁵, per longitudinem uam, a trochanterum radicibus recta leorsum, protractum. At reliquum fenur, quod fere Cruraeus Vastique ocupant, satis acquabile est. Capitibus lenique inferioribus infertionem tendii Tricipitis, Gemellis vero, Plantari, & Poplitaeo originem praestat.

201. CRUS autem est ex offibus duoous'; nempe ex Tibia², & Fibula³.

202.

- I Vefal. Lib. I. Cap. XXXI. Fig. 1. & 2.
- 2 Ibid Fig. 3. & 4.
- 3 Ibid. Fig. 5. & 6.

⁴ Ibid. Fig. 1. & 2 a. 5 Ibid. Fig. 1. T. T. c. c. d. d.

(176)

202. TIBIA femur fustinet, ipfa in pede extremo innixa : os praelongum fed femore brevius, crassum valens que¹.

1 Vid. citat. §. 201: 2.

203. Igitur a superiori parte insigni ter tumens, vertice summo' planior a 199. basis lata & idonea capitum femoris : init. est : leviterque capita illa recipit sini bus 2 convenientibus & modice disjun Ais duobus, iisque valde levibus, in teriore³ tamen profundiore, & medic suo fundo rotundiore, exteriore 4 in medio levissime sinuato, a priori vero parte, & praesertim a posteriori, quo dammodo gibbo, utrisque autem ob longis & quasi ovatis, & a priori tibiad parte ad posteriorem pertinentibus, at que etiam nonnihil oblique positis, ic est, a medio tibiae in latera declivibus lae

- I Vefal. Lib. 1. Cap. XXXI. Fig. 7.
- 2 Ibid. F. G.
- 3 Ibid. F.
- 4 Ibid. G.

(177)

laevi denique cartilaginea crusta oper-Atque eo non modo femur in ti-ITIS. bia recte firmiterque insistere potest; sed etiam genu, ex his juncturis factum, in posteriora ad angulum valde acutum flecti, rursumque extendi: insuperque tibia, genu, praesertim ad angulum rectum, flexo, ad femur satis infigniter, maxime extrorsum, converti, & restitui rursus; tibia scilicet tunc se suo interiore finu ad posteriorem partem interioris b femoris capitis, quasi circum b 19% axem suam, inprimis nonnihil vertente; exteriori autem, ad posteriorem itidem partem exterioris b femoris capitis praesertim describente arcum exiguum : simulque ipsa ossium, e quibus articuli illi fiunt, figura non facile concedit, ut genu multum in priora, aut in alterutrum de lateribus, sive extensum sive flexum, inflectatur; neque ut tibia, ex= tenso genu, ad femur convertatur.

Quem etiam ad finem ligamentis ofsa illa singularibus firmantur : primo crasso & valente, e posteriore eademque inter sinus istos e media tibiae e Huj, in. par- \mathbf{Z}

d 199 parte s enato, & fundo finus d, qui med capita femoris disjungit, inserto; ficque & tibiam ad femur religante, & impediente, ne femur & tibia ex extensis in priora admodum fle&antur: multum etiam adjuvantibus, & ne genu in alterutrum laterum inflectatur, aut extenso genu tibia ad femur convertatur, impedientibus ligamentis duobus validis longisque, quae a femoris capitum lateribus externis procedentia, cruris summis lateribus inseruntur, & quidem tota nonnihil secundum posteriorem laterum istorum partem deducta : itaque simul non obstant genu in posteriora flectendo; laxatis tunc ligamentis istis lateralibus, medio autem in posterius e 199. femoris capitum intervallum e admisso, & retinente offa: quin & flexo genu, tibiae ad femur conversionem permittunt; tunc insuper caput femoris exterius iplanque mediam tibiam inprimis retinente ligamento crasso & robusto, quod ex summa medii tibiae tuberculi⁶ parte, jux-

5 Ibid. Fig. 2. 4. 7. K. 6 Ibid. I.

(179)

juxta sinum interiorem, enatum, lateri interno capitis femoris exterioris inferitur. Praeterea utrumque illum articulum, totumque adeo genu ambit & includit capsa membranacea valida, quae ex interiori sua parte, utrimque e regione summae tibiae, abit in cartilagines semilunares7: hae primo crassae8, interiora, id est, mediam tibiam versus procedendo extenuantur, & mox in acutum desinunt 9; totae supra summos tibiae finuum margines ab exterioribus partibus prorepentes 10, iisdemque aptissime & proxime, laxe tamen, adjunctae, ac cornubus " suis, in fibrola ligamenta definentibus, nexae mediae inter sinus inaequabili parti tibiae : exteriore quidem cartilagine, suo priore cornu inserta sinui, qui statim ante tuberculum

7 Ibid. Fig. 8. & J. B. Morgagni Adverf. anat. 11. Tab. Fig. 4. C. D.

8 Vefal. 1. c. N. N. Morgagn. 1. c. Fig. 5. f. g.

9 Vefal. 1. cit. O. O. Morg. 1. c.

10 Morgagn. l. c. Fig. 4.

11 Ibid. Fig. s. e. e.

Z 2

(180)

culum tibiae medium est; cornu autem posteriore, summo tuberculo isto, & laepe etiam ipsi capiti interno femoris, qua id finum spectat, producto ligamento: interiori vero cartilagine, suo priori cornu, tibiae leviter & inaequabiliter ante finum ejus interiorem finuatae; posteriore denique, radici internae medii tibiae tuberculi : quapropter exterioris cartilaginis cornua magis ad se invicem recurvata funt 12; quae & in ligamenta longiora vertuntur : utraeque autem laevissimae sunt, & a superiori parte inprimis cavae 13; totae mobiles, praesertim exterior : itaque augent sinus tibiae14, quo melius recipiant femoris capita; ipfae tamen capitibus illis motis cedentes, iisdemque sese accommodan. tes.

14 Ibid.

204. Deinde ut tendinis genu extendentium musculorum vis ad flexum genu

¹² Ibid. Fig. 4. conf. inter fe D. & C.

¹³ Ibid.

nu extendendum major esset, & femoris capitum intervallum, flexo genu, venu. ste expleretur, atque etiam ne quid idem ille tendo crebro & vehementi, quoties genu flectimus rursumque extendimus, capitum femoris intervalli attritu detrimenti acciperet; natura ad extremum femur a priori parte appoluit os * parvum, quodammodo orbiculatum, crassum, durum, pensile, prorsus mobile, & ad ipsum illum genu articulum pertinens: PATELLAM vocant. Eaque tibiae summa eademque prior quasi pars est; ad quam, per se quidem soluta, religatur ligamento longo lato crasso valente, quod a parte tibiae eadem & superiore & priore & media, eaque modice protuberante², sursum ad patellam tendit, ejusque imae & in mucronem plerumque migranti parti 3 inseritur : tota quoque cum ligamento isto capsae genu ambienti undique innexa. Huic

Z 2

I Vefal. Lib. I. Cap. XXXII. Fig. I. & >

² Ibid. Cap. xxx1. Fig. 1. & 3. B. 3 Ibid. Cap. xxx11. Fig. 2. E.

Huic igitur musculi genu extendente inseruntur; a superiori parte Cruraeu & Rectus, a lateribus Vasti: sic magi firmatur. Jam vero genu, quantum ma xime potest, flexo, insidet intervallo ca pitum femoris prope tibiam, in ima ca pitum illorum eademque intervallo pro xima parte innixa. At cum genu ex fle xo extendimus, patella, ab extenden tibus tibiam musculis truncum corpori versus tracta, circum extremum femur 2 199 in capitum ejus intervallo finuque 2, tan quam in trochleae rotulae finu, paulla tim vertitur; sequente tibia, & paulla tim extenso genu: donec plane extenso & firmato genu, patella supra femori: ^b 199. capitum finum pertracta, ibidem ^b fe fin. mori leniter adfideat; id permittente ligamenti patellam tibiae nectentis longi tudine : rursumque per eandem viam patella redit, cum genu flectimus, tibiam sequens. Eamque ob caussam a posteriori parte⁴, qua ad femur applicatur lata est, & lenis, & laevi cartilagines cru-

4 Ibid. A.B. C.D.

(183)

crusta operta; atque femoris capitum intervallo finuique congruit, id est, ex lateribus ejus eminentia media oblonga gibbaque ⁵ furgit, ipfa latera ampliora & leviter finuata ⁶ funt, praesertim exterius ⁷. Tota autem, quia a tibia foluta, fe cum ligamento suo ad femur, genu sive extenso, sive ad quemcumque demum angulum slexo, quam scitissime accommodat: atque nec genu extensioni, in priora quinetiam, quamvis levi, flexioni, nec tibiae, flexo in posteriora genu, conversioni quicquam obssate.

5	Ibid. A.B.
	Ibid. C. D.
7	Ibid. D.

205. Tibia a genu ^a rectius deorfum ^a 203. procedens, magis magisque atque infigniter gracilescit ': at ab inferiori parte, quo cum talo committi commode possit, rursum paullatim ac modice intu-

I Vefal. Lib. I. Cap. XXI Fig. 3. ab I. ad d. e. inferiora. & Fig. 4. ab F. G. ad d. r. inf. tumeſcit'; donec ſua ima parte praeſet tim deſinat in *ſinum* i levem, amplum quodammodo quadrangulum; a prior parte tibiae usque ad poſteriorem mo dice & aequabiliter concavum; per trans verſum vero in medio eminentiorer gibbumque +, ad utrumque latus modi ce ſinuatum ⁵; totum a priori tibiae par te in poſteriorem aliquantum declivem & laevi cartilagine cruſtatum; qui i b 219 ſumma tali parte ^b inſiſtit, laxa mobili tate.

> Ab utroque hujus latere deorfur protenduntur *Malleoli*⁶, articulum istur firmantes. Ac primo quidem inferic tibiae pars ab interno latere, ibique ma xime a priori parte, paullatim magi magisque intumescens⁷, tandem abit i processum ⁸ amplum, crassum, valen tem

- 2 Ibid. à d. e. inf. deorfum.
- 3 Ibid. Fig. 9. & 10. f. d. e.
- 4 Ibid. d.
- 5 Ibid. e. f.

6 lbid. Fig. 9. i. n. & fic Fig. 1. E. Φ. & Fig. i. n.

7 Ibid. Fig. 2. ad m. & fic Fig. 3.

8 Ibid. & Fig. 9. & 10. i.

(185)

tem, quem *malleolum internum* dicimus: is aliquantum deoríum, & fimul etiam oblique nonnihil introríum procedens⁸, ad latus tali internum ^c admo- ^c 219. vetur⁹; ea parte quodammodo finuatus¹⁰, ac perpetua cum finu tibiae cartilaginea crusta opertus. Quod deinde ab altero finus illius ^d latere *fibula* prae- d Huj. stat; quam recipit extremae tibiae latus ^{init.} internum, amplum, totum per transversum finuatum¹¹, & oblique posteriora spectans.

9 Ibid. in fin. Lib. 1. Tab. 11. in finistro crure, φ .

10 Ibid. Cap. XXXI. Fig. 10. e.

11 Ibid. Fig. 4. & 10. S.

206. Etenim ad tibiam additamenti inftar ab externo latere FIBULA admota est': ea similiter oblonga, sed multo gracilior & debilior; extremis utrimque capitibus tumida, media tenuis².

207.

1 Vefal. Lib. 1. Cap. XXXI. Fig. 1. & 2. 2 Ibid. Fig. 5. & 6.

Aa

(186)

207. Hujus caput superius¹, a superiori fui parte superficiem² habet amplam, leviter finuatam, & laevi cartilagine crustatam, fursumque ac simul introrsum, tibiam versus, spectantem qua ad tibiam, statim sub junctura genu, adplicatur³; nempe ad partem tibiae eandem & posteriorem & exteriorem⁴, ob id modice prominentem, ac deorsum oblique ad posteriora exterioraque supertantem, totamque leviter gibbam, & cartilagine laevi crustatam: ipsum porro ad tibiam ibidem ligamentis religatum, fic ut immobile fit.

208. Inde gracilescens deorsum procedit ¹, tota a tibia disjuncta ²: & primo rectior, dein tibiam versus nonnihi recurvatur : jamque inferiori parte rursus

I Vefal. Lib. 1. Cap. XXXI. Fig. 1. 2. 5. 6.

2 Ibid. Fig. 1. & 2.

I Vefal. Lib. I. Cap. XXXI. Fig. I. C.

² Ibid. Fig. 5.Q.

³ Ibid. Fig. 2. V.

⁴ Ibid. Fig. 4. R.

(187)

fus plenior; eaque recipitur in finum³, qui a latere tibiae ^a eft; ibidem quoque ^a 205. ad tibiam valide firmiterque religata:ultra tibiam denique longius procedens, in *malleolum externum* migrat ⁴; qui admodum craffus, & interno longior, ad latus tali ^b externum admovetur 5,^b 219. fuperficie ampla, aequabili, leviter gibba⁶, & laevi cartilagine cruftata.

3 Ibid. Fig. 2. X. & Fig. 1.

4 Ibid. Fig. 1. E. Fig. 2. & 9. n.

5 Ibid. in fin. Lib. 1. Tab. 2. in dextro crure, x.

6 Ibid. Cap. xxx1. Fig. 10. & 11. h.

209. Crus itaque extremum inprimis in *finum*¹ illum ^a definit; quo innititur ^a 205. in talo², id eft, in pede extremo; ad eum ligamentis a priori & a posteriori parte alligatum. Et articulus ille mobilis est : ac malleolis ^b utrimque deorfum ^b 205. protensis ³ firmatur; qui & ipsi ligamen- fin. & tis

1 Vefal. Lib. 1. Cap. XXXI. Fig. 9. e. d. f.

2 Ibid in fin. Lib. 1. Tab. 1. & 3.

3 Ibid. Cap. xxx1. Fig. 9. i.n. conf. ibid. Tab. ult. tres Lib. 1.

Aa 2

tis firmantur, atque ad talum religantur; uno a parte malleoli interni ima finuataque⁴, altero a parte externi eadem & interna & pofferiore & inferiore finuataque⁵, ad talum tendente. Ex quo crus in pede extremo infiftit ftabili ^{e 219} certaque ^c mobilitate. Adde quod articulus ifte totus oblique ad crus ponitur, id eft, finus ille a pofferiori tibiae parte ad priorem non recte, fed fatis infigniter extrorfum tendit; eaque de cauffa malleolus quoque internus prior eft, externus pofterior: fcilicet ut pesextremus a crure extrorfum vergeret.

> Malleoli extrinsecus gibbi, protuberant.

4 Ibid. Cap. xxx1. Fig. 4. & 10. k. 5 Ibid. Fig. 2. 6. & 11. r.

210. Caeterum utraque illa offa, medio ligamento lato tenui valente conjuncta', primo infertionem crus moventibus musculis praebent. *Tibia* scilicet latere suo interno, & quidem hujus par-

1 Vefal. Lib. 11. Cap. 1. a.

parte superiori, Sartorio, Gracili, Seminervoso, Semimembranoso; deinde eminentia² oblonga & inaequabili, quae in posteriore eademque superiore ejus. parte oblique exporrecta, Popliteo. Fibula autem Bicipiti, sui capitis superioris exteriore & inaequabili parte 3. Deinde locum, stabilitatem, & originem praestant multis magnisque musculis, ad pedem extremum, & ad digitos ejus pertinentibus; ab iis ipsis maximam partem figurata. Ac tibia in triangulam quodammodo figuram formata est: interno latere 4 ampla infigniterque gibba, & fere tota a musculis libera: exterioris, quo fibulam spectat, similiter ampla, sed planior & fere sinuata, cedens accumbentibus musculis, Tibiaeo antico, Extensori digitorum pedis longo, itemque pollicis : posteriori 6 non valde depressa, sed gibba, firmansque Fle-

3 Ibid. Fig. 5. & 6. c.

- 5 Ibid. 2. inter y. y. S. S.
- 6 Ibid. Fig. 2. & 4. 8. inter S. S. E. E.

Aa 3

² Vefal. Lib. 1. Cap. xxx1. Fig. 2. & 4. #.

⁴ Ibid. Fig. 1 & 3. n. inter y. y. E. E.

(190)

Flexorem digitorum longum, & Ti biaeum posticum, Soleumque. Sic & fa bula quasi triangula est, & varie com pressa; internoque 7 latere suo, tibian spectante, originem praebet ceditque Extensori digitorum pedis, atque etian pollicis longo: externo 8 autem ample & majorem partem finuato, Fibulaeis posterioriº denique, Flexori pollicis lon. go. Ad haec tibiae posterior imaque pars, prope malleolum internum, itidemque posterior malleoli externi pars: sinus habent oblongos, a tendinibus mulculorum, pedem extremum peten. tium, impressos; hunc 19 quidem a Fibulaeis, illos " autem a Tibiaeo postico & a Flexoribus longis digitorum pollicisque pedis.

- 7 Ibid. Fig. 1. & 5. x. x. inter f. f.t.t.
- 8 Ibid. a. a. inter f. f. u. u.
- 9 Ibid. Fig. 2. & 6. s. inter t. t. u. u.

10 Ibid. q. q.

11 Ibid, Fig. 2. 4. 10. m.

211. Hujus columnae basis Pes extre-

(191)

tremus ' est; qui e Tarso', Metatar-Vo 3, & ex Digitorum ossibus ', con-

I Vefal. Lib. I. Cap. XXXIII, Fig. 1, & 2.

2 Ibid. A. F. O. 1. 2. 3. 4.

3 Ibid. 1. 11. 111. IV. V.

4 Ibid. tota reliqua extrema pedis pars.

212. TARSUS e septem offibus, in Huos ordines compositis, fit. Primi Calcaneus ' est, cum Talo ': secundi Naviculare 3, Cuneiformia tria 4, & Cubiforme 5.

Vefal. Lib. 1. Cap. XXXIII. Fig. 1. & 2. Δ.
 Ibid. Γ.
 Ibid. Θ.
 Ibid 1. 2. 3.
 Ibid. 4.

213. CALCANEUS OS maximum inter septem illa est, oblongum, crassumque'. Incipit autem admodum crasso tubere', quod proprie calcem facit, ac sua

I Vefal. Lib. I. Cap. XXXIII. Fig. 7. 8.9.

2 Ibid. Fig. 2, 8.9. c.

fua ima³ latiore & planiore parte in ter ra infiftit; fimulque valentiflimum, qu totum extremum pedem in posteriora flea ctit, tendinem achillis & plantaris mus culi excipit & firmat, parte sua postica⁴ modice gibba & inaequabili.

3 Ibid. Fig. 2. Y. Z. & Fig. 8. Y. Fig. 9. Z. 4 Ibid. Fig. 8. 9. c.

214. Inde gracilior in priora proce dit ', fuum extremum multo gracilius habens 2, definensque in fuperficiem amplam, aequabilem, planiorem, per transverfum leviter gibbam, fecundum altitudinem fuam modice concavam, laevi cartilagine cruftatam, ad priora & nonnihil oblique introrfum fpectana 228. tem; cum qua os Cubiforme 2 mobili committitur 4 junctura.

I Vefal. Lib. 1. Cap. XXXIII. Fig. 8. & 9.

2 Ibid. Fig. 8. ante R. V. & Fig. 9. ante R. g.

3 Ibid. Fig. 7. & 9. i.

4 Ibid. Fig. 1. inter g. & 4. & fic Fig. 2.

a 218. 215. Is vero, ut talum 2 recte suftineret

(193)

neret, a superiori & eadem priori parte profunde quasi exsectus est ': ac deinde ibidem primum medius fere abit in caput² magnum, oblongum, & per longitudinem suam gibbum, atque a superiori calcanei parte deorsum & simul oblique in exteriora exporrectum, opertumque laevi cartilaginea crusta, ac totum oblique in priora & superiora directum; quod in sinum b tali recipitur. b 218. init. Deinde ad priorem capitis illius radicem altius sinuatus est 3, ad recipiendum & suftinendum imum ejusdem tali C 218. tuberculum c. med.

Ab interna etiam capitis iftius finusque ^d parte in latus aliquantum, & fi-^dHuj. mul nonnihil oblique in priora, procedit, augeturque parte fatis lata ⁴, fed tenui; quae fimiliter, atque caput illud, pofi-

r Vesal. Lib. 1. Cap. XXXIII. Fig. 7.8. & 9. ante P. V.R.

2 Ibid. P.

3 Ibid. statim ante P.

4 A Superiori parte, ibid. Fig. 7. V. R.

Ab inferiori, ibid. Fig. 2. e.

Bb

posita, sustentaculum cervicis tali est, e 218. eamque e recipit sinus levi, oblongo, o-med. vato, & cartilagine laevi crustato, quem a superiore parte, ad ipsum extremum

fuum, habet.

Eandemque cervicem e insuper suftinere calcaneus solet, sinu 6 levissimo & laevi cartilagine crustato, qui plerumque in parte ejus eadem & superiori & priori & ad internum latus eft.

5 Ibid. Fig. 7. 8. 9. R. 6 Ibid. Fig. 7. h.

216. De reliquo externum 1 calcanei totius latus amplum est, planius, inacquabile, tuberculatum, finuatum; educitque Abductorem digiti minimi, & Extensorem digitorum brevem; ac sustinet tendinem Fibulaei longi, eminentia exi-Internum² vero, totum infignigua. ter sinuatum, tendinibus Tibiaei postici, Flexoris digitorum, itemque pollicis, longi, arteriae venaeque & nervo. ac

2 Ibid. Fig. 8. d. e.

I Vefal. Lib. I. Cap. XXXIII. Fig. 9. f.g.

ad plantam tendentibus, locum parat, atque Abductorem pollicis educit. Tum denique calcaneus fua inferiore parte primo finuatus eft³, ad educendum & locandum Flexorem digitorum pedis brevem : deinde ad priorem fuam eandemque interiorem partem *tuber*⁴ habet oblongum, a quo praecipue ligamentum per plantam pedis excurrens, quodque pleraque ejus offa colligat, oritur^a.

2 242.

3 Ibid. Fig. 2. X. 4 Ibid. ante X.

QUE TALUS, ad utrumque pertinens, medius interjectus est: is calcaneo minor, tumidulus, multiformis.

Vefal. Lib. 1, Cap. xxxIII. Fig. 3. 4. 5. 6.

218. Talus, ut in calcaneo infifteret certa lege mobili ac fimul stabili articulo, primum inferiore & eadem post-Bb 2 eriore

(196)

eriore sui parte sinuatus est : sinusque ² ²¹5. ille recipit ² calcanei caput ²; ob id amin. plus, oblongus & quasi lunatus, ac per longitudinem suam concavus, & a superiori pedis parte deorsum simulque extrorsum oblique exporrectus; laevi cartilagine crustatus; retrorsum deorsumque spectans; totusque capiti calcanei congruens, nisi quod superiori parte sua angustior fit.

b Huj.

Deinde ad extremum finum istum b, in. a priori parte ejus, atque adeo in latere pedis externo, definit in processium 3 deorsum tendentem & paullatim gracilescentem, qui, hac tali calcaneique junctura in exteriora, quantum potest, flec 215. xa, finui c calcanei infidet 4, extremo in. retuso, crassiore, a priori parte gibbo, aequabili, & cartilagine laevi crustato.

> Tum autem ipfe talus priorem partem

- I Vefal. Lib. I. Cap. XXXIII. Fig. 4.Q.
- 2 Ibid. Fig. I.
- 3 Ibid. Fig. 6. K.
- 4 Ibid. Fig. 1. inter r.g.

(197)

tem fuam exeuntem in cervicem s latam craffamque habet, quae in priora modiceque introrfum, atque ad latus prioris calcanei partis, fed ea fublimius, vergens⁶, ima fui eademque posteriori parte abit in tuber culum⁷ leviter eminens, oblongum, ovatae figurae, per longitudinem leviter gibbum, & laevi cartilagine opertum, quo in finum ^d calcanei recepto ^d 215. mititur. Quin & cervix illa priori parte fua plerumque innititur priori calcanei parti ^e.

Atque hos articulos ligamenta valida firmant; quae a calcanei media inter caput fejus finumque g finuata & inaequa-f 215. in. bili parte⁸ ad talum procedunt, ejusquei-g 215. tidem mediae inter ejus finum h capitulumque i ac profunde finuatae parti⁹ hHuj. in. inferuntur. Ex quibus obliqua in utrum- i Huj. que latus, praefertim in internum, mobilitas talo, atque adeo toti cruri, fuper

Bb 3

5 Ibid. Fig. 3. 4. 5. 6. N. 6 Ibid. Fig. 1. 7 Ibid. Fig. 4. S. 8 Ibid. Fig. 7. 8. 9. V. V. 9 Ibid. Fig. 8. T. T.

(198)

per calcaneum est; similiterque calcaneo sub talo.

219. Jam talus a superiori parte nihil nisi tuber ' magnum est. Id vero quodammodo quadrangulum, sed a priori parte sua latius, inde posteriora verfus paullatim angustius 2; vertice suo a priori parte usque ad posteriorem insigniter gibbum, & quasi orbiculatum; per transversum vero in medio, & maxime in summa parte, leviter sinuatum 3, ad utrumque latus gibbum 4: ipsis lateribus suis planius; & internum⁵ quidem ad summam oram, praesertim a priori parte, aequabile ac leviter gibbum est; externum ⁶ vero multo amplius, id est, deorsum versus productius, totumque secundum altitudinem sinuatum, per transversum leniter gibbum. Ac tuber illud totum laevi cartilagine crustatum,

- 1 Vefal. Lib. 1. Cap. XXXIII. Fig. 3. 5. 6. A.B. C. D.
 - 2 Ibid. Fig. 6. ab A. C. ad B. D.
 - 3 Ibid. Fig. 3. E. E.
 - 4 Ibid.F.F.
 - 5 Ibid. Fig. 5. G. 6 Ibid. Fig. 6. H.

(199)

tum, finui tibiae a malleolisque b con-a 205, gruit; eo tamen finu in priorem & inb 205. posteriorem partem productius : perquefin. & finum extremi cruris c recipitur, & u-208. trimque quasi comprehenditur. Quac 209. re crus suftinet, mobili articulo; & quidem flectendo in priora, rursumque, immo vero infignius, in aversum; coque ligamentis firmato, quae ab ima tibia & a malleolis ^d ad talum tendunt, ^d 209. atque hujus ipfius tuberis inaequabili finuataeque radici inferuntur, praesertim a priori parte, & a lateribus 7.

Talus ad posteriorem radicem istius tuberis finuatus⁸ est, tendinesque ad internum calcanei latus deducit.

7 Ibid. Fig. 5. I. & Fig. 6. K. 8 Ibid. Fig. 6. L. M.

220. Ipfa denique cervix a mox defi-a 218. nit in *caput* magnum, gibbum, oblongum, fere transverfum, hoc eft, ab externo tali latere ad internum, fimulque mo-

I Vefal. Lib. I. Cap. XXXIII, Fig. 3.4.5.6.0.

modice deorfum, exporrectum; partin prorfum, partim etiam ad latus inter num pedis fpectans; totum autem non nihil oblique in terram directum, lae vique cartilagine crustatum : cujus par prior committitur ² cum offe navicula
^b ²²². ri ^b, mobili junctura; reliqua autem inferior ac pedis latus internum spectans
^c ²²². fustinetur ^c a ligamento, quod a calcaneo ad naviculare pertinet.

2 Ibid. Fig. 1. & 2. inter Γ. & Θ.

3 Ibid. Fig. 2. r.

a 212. 221. Altero tarsi offium ordine a, ac metatarsum usque pertingente, pes extremus in priora longior fit, latiorque.

> 222. Ac cum talo committitur os NAVICULARE', parvum, craffum, oblongum, transversum, figura naviculae. Hujus igitur pars posterior tota profunde sinuata est², & cartilagine laevi crustata, apteque congruit capi-

I Vefal. Lib. I. Cap. XXXIII. Fig. 10. &II.

² Ibid. Fig. 11. k.

(201)

i a cervicis tali; cujus priorem partem a 220. recipit³, articulo quoquoverfus quidem nonnihil mobili, fed maxime tamen in tatus pedis internum; indeque rurfus in externum: eumque ligamenta undique irmant; praefertim latum valensque, quod a calcanei parte eadem & interna & priore, mediaque inter juncturas ejus cum cubiformi & cum talo, oriundum, fub capite tali in priora procedit, inferiturque inferiori marginis finus oslis navicularis parti; id namque pede in terram innixo, prefloque corporis pondere, os naviculare ad calcaneum alligatum retinet, ac caput tali ^b fuftinet. ^b 220.

3 Vid. citat. §. 220. 2.

223. At contra prior offis navicularis pars gibba' est; sed distincta, & ex tribus superficiebus 2 planioribus, ac perpetua cartilaginea laevique crusta opertis, constans; ad quas tria cuneifor-

- I Vefal. Lib. I. Cap. XXXIII, Fig. 10. l.m. n.
- 2 Ibid.

(202)

a 225. formia a, fingula ad fingulas, admot: funt.³

3 Ibid. Fig. 1. & 2. inter O. & 1. 2. 3.

224. Ab offe naviculari tria CUNEI FORMIA' in priora ad ipfum metatar fum procedunt'. Ea praecedentibu minora funt: at primum² inter illa ma ximum; fecundum³ minimum; tertium paullo majus quam fecundum.

- I Vefal. Lib. 1. Cap. XXXIII. Fig. 1. & 2. 1. 2. 3.
- 2 Ibid. Fig. 12. & 13. 1.
- 3 Ibid. 2.
- 4 Ibid. 3.

225. Omnium horum pars posterior ampla & leniter sinuata, praesertim pri mi²; omnium laevi cartilagine crustata iisque partibus recipiunt ³ offis navicu a 223. laris superficies ^a; primum interiorem maxi

- Vefal. Lib. 1. Cap. xxx111. Fig. 13. f. t. u.
- 2 Ibid. f.

³ Ibid. Fig. 1. & 2. inter O. & 1. deinde inter O. & denique inter O. & 3.

dum mediam minoremque; tertium tertiam, fimiliterque parvam.

226. Inde in priora procedunt: primum autem longiflimum eft '; fecundum breviflimum; hoc tertium longius', primo tamen brevius'. Poftremoque a priori parte quaeque definunt in fuperficiem amplam, aequabilem, & laevi cartilagine cruftatam: ampliorem, oblongam, oblique pofitam, leviterque gibbam, in primo²; angustiorem planioremque, in fecundo³ & tertio⁴. Atque iis tria prima metatarsi offa fustinent ^a; primum quidem, pollicis⁵; ac^{a 237}. deinde fecundum, fecundum⁶; tertiumque, tertium⁷.

Vefal. Lib. 1. Cap. XXXIII. Fig. 1. & 2.
 Ibid. Fig. 12. 4.
 Ibid. κ.
 Ibid. λ.
 Ibid. Fig. 1. inter 1. & I. & Fig. 2. inter 1.
 & π.
 Ibid. Fig. 1. inter 2. & II. & Fig. 2. ante 2.
 7 Ibid. Fig. 1. inter 3. & III. & Fig. 2. ante 3.

227. Verum ab externo pedis latere Cc 2 unum unum tantummodo os inter calcaneun metatarfumque intercedit, quod сиви FOR ME¹ dicimus: cuneiformibus maju & plenius, fed ufu refpondens.

(204)

1 Vefal. Lib. 1. Cap. XXXIII. Fig. 12. & 13. 4.

228. Itaque & hujus pars posterior ampla est, & planior, & laevi cartilaginea crusta operta; totaque priori cala 214. canei superficiei ^a apte congruit, & cum ea committitur².

1 Vefal. Lib. 1. Cap. XXXIII. Fig. 13. 2.

2 Vid. citat. §. 214. 4.

229. A calcaneo quoque in priora, juxta naviculare & cunciforme tertium, modice extrorfum procedit '. Quin & a priori parte definit in fuperficiem ' amplam, oblongam, quafi transverfam, & in duas ' minores, perpetuam cartilagineam laevemque crustam obductas, di-

1 Vefal. Lib. 1. Cap. XXXIII. Fig. 1. & 2.

2 Ibid. Fig. 12. a. & B.

(205)

distinctam; ad sustinenda quartum³ quintumque⁴ metatarsi ossium^a. ^a 237.

3 Ibid. Fig. 1. inter 4. & IV. & fic Fig. 2. 4 Ibid. Fig. 1. inter 4. & v. & fic Fig. 2.

230. Jam vero quinque ista secundi tarsi ossi ordinis ossa ipsi etiam lateribus suis inter se juncta sunt : naviculare cuboidi ¹; hoc quoque cuneiformi tertio²; ac denique cuneiformia alia aliis³.

Et Naviculare quidem, qua cubiforme spectat 4, gibbum est & inaequabile, educitque ligamenta, quibus ad posteriorem lateris ossis istius⁵, eamque sinuatam, partem religatur.

Cubiforme autem & Cuneiformia, sulfua latera, quibus se invicem respiciunt, lata

I Vefal. Lib. 1. Cap. XXXIII. Fig. 1. & 2. inter O & 4.

2 Ibid. inter 4. & 3.

- 3 Tertium secundo, Ibid. inter 3. & 2.
- Secundum primo, 1bid. inter 2. & 1.
- 4 Ibid. Fig. 11. ad p.
- 5 Ibid. Fig. 12. & 13. 7.

Cc 3

lata & planiora habent. Iisque primum alia alia contingunt, superficiebus planioribus, aequabilibus, & laevi cartilagine crustatis. Cubiforme scilicet, superficie ampla, quam in lateris fui cuneiforme tertium spectantis medio, ibidemque ad superiorem partem, habet, contingit sui similem, quae in parte eadem & posteriore & superiore lateris Cuneiformis tertii, quod cubiforme spectat, est. Cuneiforme tertium solo sui lateris, secundum respicientis, margine posteriore⁶, eoque ipso sua superiori atque etiam inferiori parte latiore leniterque gibbo, convenientem, & ea re leniter concavum, lateris secundi ofs, quo tertium spectat, marginem 7. Secundum vero, lateris sui, primum spectantis, margine tum superiore, tum posteriore, iisque continuis & leviter gibbis, similes leviterque sinuatos lateris primi8, quod secundum respicit. At

6 Bidlo Tab. cv. Fig. 5. ipfe locus cui s. infcript.

7 Ibid. Fig. 4. ad superiorem 4 partem.

8 Ibid. Fig. 7.

(207)

At reliqua, eaque major, cujusvis istorum laterum pars⁹ inaequabilis est, gibberaque; firmatque ligamenta valida & brevia, quibus ossa illa alia ad alia alligata tenentur.

9 Unius, Cuneiformis tertii, Ibid. Fig. 5. <u>Jecundi</u>, Ibid. Fig. 4. Cuneiformis primi, Ibid. Fig. 7.

231. Porro os Cuneiforme primum longiffime in priora protenditur : fecundum brevius: tertium fere aeque longe ac fecundum : Cubiforme denique his brevius; & hoc ipfum quoque ad externum pedis latus, breviflime. Ex quo pes extremus a calcaneo & talo in priora longior fit: & quidem minimum ab externo fui latere; inde vero, pedem alterum verfus, magis magisque.

Vefal. Lib. 1. Cap. xxxIII. Fig. 1. & 2.

232. Tum vero os Cuneiforme primum a naviculari fere recta in priora tendit: secundum, modice extrorsum: ma-

(208)

magis tertium: maxime omnium, a calcanco Cubiforme. Eoque idem ille pes extremus a calcaneo & talo paullatim in priora extrorfum latefcit.

Vefal. Lib. 1. Cap. XXXIII. Fig. 1. & 2.

233. Quin & Cuneiforme primum ac tertium, ultra secundum utrimque in priora nonnihil protensa, finum ' quasi efficiunt, recipiendo ' metatarsi secuna 238. do ossi a : ad cujus latera a superiori parte suis similiter primo applicantur lateribus; ac primum, exiguo levique sinu³; tertium, superficiebus duabus planioribus pariterque exiguis ⁴; utrisque autem laevi cartilagine crustatis : tum deinde etiam ab inferiori alligantur.

Sic quoque Cuneiformis tertii, ultra cubiforme paululum progreffi², externum latus, fuperiori fui parte, exigua portione, atque ea etiam laevi cartila-

gine

- I Vefal. Lib. I. Cap. XXXIII. Fig. 12. inter ι & λ.
- z Ibid. Fig. 1.
- 3 Ibid. Fig. 12. sub 1. esset indicandus.
- 4 Ibid. inter * & > designandis.

(209) gine crustata, plerumque contingit posteriorem lateris interni ossis metatarsi

quarti partem b : ad idemque sua infe-b 238. riori parte religatur.

234. Praeterea autem ita figurata eadem ista ossa sunt, compositaque, ut suis superioribus partibus, simul cum cervice tali, dorsi pedis ' partem, quae statim ante crus est, faciant; & eam fatis aequabilem, gibbam, atque in externum latus devexam : inferioribus autem, plantae partem; eamque in terram concavam, & inaequabilem². Igitur ab interno pedis latere, & cervix Tali sui superiore parte leniter gibba est, atque in internum pedis latus declivis 3; & fimiliter os Naviculare4; atque etiam Cuneiforme primum a superiori parte tenuius, inde oblique in interiora deorsum fertur, paullatim intumescens, modiceque gibbum s. Ab externo autem, Cu-

Da

I Vefal. Lib. I. Cap. XXXIII. Fig. I.

² Ibid. Fig. 2.

³ Ibid. Fig. 1. anter.

⁴ Ibid. O. & Fig. 11. ap. ad o.

f Ibid. Fig. 1. 1. coll. cum Fig. 12. & 13. 1.

Cubiforme superiori parte sua extrorsum declive est, sed planius⁶. Secundum denique tertiumque ex Cuneiformibus, media inter primum & cubiforme demissa, suis superioribus partibus crassa funt, lataque, & planiora⁷; ab histerram versus per latera sua exacuuntur, & quasi cuneantur⁸.

6 Ibid. Fig. 1.4. coll. cum Fig. 12. & 13.4. 7 Ibid. Fig. 1.2. 3. & Fig. 12. & 13.2.3.

8 Ibid. Fig. 12. & 13. 2. 3.

235. Ad ligamenta denique firmanda, tendinesque partim firmandos, partim deducendos, fuis inferioribus partibus inaequabilia funt variaque '. Et quidem Navicularis ima pars, primum
222. inaequabilis, ligamentum^a a calcaneo procedens firmat; deinde finuata ², deducit Tibiaei postici tendinem : qua vero os illud totum alterum pedem respicit, in tuber ³ magnum & inaequabile migrat; cui Tibiaeus posticus inseritur.

Cu-

- 1 Vefal. Lib. 1. Cap. XXXIII, Fig. 2.
- 2 Ibid. Fig. 10. & 11. q.
- 3 Ibid. Fig. 10. ad q. & 11. ad o. & q.

Cuneiforme primum fuam imam partem oblongam & craffiorem habet⁴, eaque firmat Tibiaei antici & postici ac Fibulaei longi tendines.

At fecundum & tertium multo breviora funt, acutioraque⁵: ac fecundum firmat tendinis Tibiaei postici partem: tertium educit brevem pollicis Flexorem, imo suo tuberculo⁶.

Cubiforme denique ima parte latum eft, & planius ⁷, sed inaequabile, totumque divisum eminentia ⁸ media oblonga, obliqua, crassa, inaequabili, & ligamentum ^b, a calcaneo veniens, fir-b 2423 mante, ac suftinente tendinem Fibulaei longi, qui ad priorem ejus partem, ubi os ipsum leniter sinuatum⁹, inflectitur.

236.

4 Ibid. Fig. 2. 1. 5 Ibid. 2. 3. 6 Ibid. Fig. 13.θ. 7 Ibid. Fig. 2. 4. 8 Ibid. inter ζ.& η. 9 Ibid. η.

Dd 2

236. A tarfo METATARSUS' oritur. Is conftat ex offibus, aliis juxta alia pofitis, quinque: oblongis omnibus, gracilibus, valentibus, & a tarfo ad digitos pertinentibus: at primum², quod pollicem fustinet, caeteris brevius est, fed fimul crassius, longeque valentius.

I Vid. citat. §. 211. 3.

2 Vefal, Lib. 1. Cap. XXXIII. Fig. 1. I. & fic. Fig. 2.

237. Incipiunt autem capitibus craffis, multiformibus, & inaequabilibus. Eaque cum tarfo committuntur, partibus fuis posterioribus; iis amplis, planioribus, aequabilibus, laevem cartilagineam crustam obductis, ac primis tarsi partibus plane congruentibus: pri-225. mum cum cuneiformi ^a primo², superficie ampliore, oblonga, obliqua, & modice finuata: fecundum cum ^a secundo

> I Vefal. Lib. I. Cap. XXXIII. Fig. I. & 2. ante. 2. 2. 3. 4. 2 Vid. citat. §. 226. 5.

(213)

do 3; cum tertio a tertium 4; quartum vero quintumque cum ^b cubiformi ⁵; & b 229: haec quidem quatuor, superficiebus angustioribus & planioribus.

3 Vefal. 1. c. s. 4 Ibid. 7.

5 Vid. citat. §. 229. 3. & 4.

238. Eadem quoque ista capita a alia a 237. aliis', & nonnulla etiam offibus cuneiformibus', suis juncta sunt lateribus; iis ipsi ob id planioribus & latioribus, partimque se contingentibus superficiebus inter se aptis & cartilagine laevi crustatis, partim inter se ligatis.

Contingit autem os metatarsi secundum, inter cuneiforme primum tertiumque receptum', uno de lateribus suis, cuneiforme b primum', superficie exi-b 233gua & aequabili, quae est in parte ejus in. postica eademque superiore: altero, primo cuneiforme b tertium', superficiebus duabus planioribus & exiguis, utrisque

Vefal. Lib. 1. Cap. XXXIII. Fig. 1. Dd 3

que ad posticum marginem, altera au tem superiore, altera inferiore; deind etiam os metatarsi tertium ', superficie bus duabus planioribus, ac priori prae cedentium parti continuatis. Tertiur altero latere admovetur' ad secundum superficiebus plane congruentibus, & a posticum ejus marginem positis: altere ad quartum ', superficie ampliore leviter que finuata, quam ad posteriorem ean demque superiorem partem suam haber Quartum porro uno latere, primum ple ¢ 233. rumque cum cuneiformitertio commit fin. titur¹, superficie exigua & leviter cava quae juxta posticum ejus marginem, ibi que a superiori parte est; dein ad prio rem istius commissurae partem, cum tertio metatarsi ', capitulo conveniente a leviter gibbo : sed altero cum osse me tatarsi quinto ', superficie ampla & leviter gibba, quae est ad partem ejus posteriorem. Quintum denique quarte jungitur¹, sinulo congruente, quem ad partem posticam lateris sui, quod

> Reliquae laterum istorum partes omnibus

quartum spectat, habet.

bus sunt inaequabiles, tuberculatae, sia nuatae : quemadmodum & Primi offis latus, quod secundum respicit, ad posticam partem medium inaequabile eft. Partesque illae firmant ligamenta brevia & valentia, quibus ossa ista inter se & cum tarso cohaerent, continenturque.

(215)

239. Jamque a capitibus illis in priora modice deorsum procedunt, gracilescuntque ': ac rursus a prioribus quoque partibus intumescunt, atque in capita2, laevi cartilagine crustata, definunt; quibus in terra insistunt, digitosque suftinent, articulis mobilibus. Omnium autem, excepto primo, capita illa parva sunt, & oblonga, id est, a lateribus quasi depressa, per longitudinem gibba, & a superiori oslium suorum parte per priorem ad imam posterioremque quasi orbiculata. Sed primum os, quod ad pollicem pertinet, cum caeteris majus sit, caput quoque maximum habet, & a priori parte rotundius : sim1-

I Vefal. Lib. I. Cap. XXXIII. Fig. I. & 2.

2 Ibid. 5. 5.

militerque quidem deorfum retrorfum que productum; at ab inferiori part multo latius, ibidemque ad utrumqu latus per longitudinem finuatum, in me dio eminens; ad recipienda officula fe famoidea. Atque capitibus illis perte nui diferimine feparata funt: primus tamen a fecundo introrfum longius al feedit: inter feque ligantur ac retinen tur ligamentis, quae e capitum iftorun lateribus, ob id planioribus, finuatis tuberculatis, prodeunt.

240. Omnibus porro pars superio latior, & per longitudinem leniter gil ba est¹; inferior acutior, infigniterqu concava²: aliaque aliis ita junguntur, simul cratem quandam efficiant, p transversum gibbam a superiori, cava ab inferiori parte; eamque tarso cont nuatam, sic ut cum eo gibbum pedis e tremi dorsum ³ faciat, cavamque plan tam³.

24

I Vefal. Lib. I. Cap. XXXIII. Fig. 1. I. II. I IV.V.

- 2 Ibid. Fig. 2.
- 3 Ibid. Fig. 1. & 2.

241. Postremo mediis lateribus suis Hepressa, musculis, praecipue Interosfeis, cedunt, iisdemque locum & originem praebent. Insuperque secundum, tertium, quartumque educunt Adductorem pollicis : quintum, Abductorem minimi digiti. Ac primum insertionem praebet Tibiaeo antico & Fibulaeo longo, parte postica imaque '; firmat & Abductorem pollicis: quintum, Fibulaeo brevi, tubere 2 magno & inaequabili, in quod migrat pars ejus posterior exteriorque; firmans pariter Abductorem digiti minimi: secundum, parti Tibiaei polici: denique quartum guintumque, Nono pedis.

I Vefal. Lib. I. Cap. XXXIII. Fig. 2.π. 2 Ibid. g. & fic Fig. I.

242. Omnia tarsi metatarsique ossa, cum una basis firma esse debeant, quae in terra insistens corpus suffineat, praeter ligamenta, quae inter corum aliqua ^a a 218, intercedunt, aliis undique continentur: fin. maxime ab inferiori parte; ne, dum cor-E e pus

pus sustinent, dissolvantur, aut nimi sequacia curventur in superiora. Et qu b 222. dem unum b a calcaneo ad navicula: pertinet. Alind craffum valensque, a c 116. imo calcanei tubere c in priora proc fin. dit, ac pertinacissime praesertim insei d 235. tur toti imae cubiformiseminentiae d; tu & medio ejusdem offis imo margini, q est juxta os cuneiforme tertium; atq etiam parti ejus eidem & imae & po eriori, juxta os naviculare, eique pr tuberanti: id vero a cubiformis oblon eminentia ulterius procedens, paul tim latescens, tenuius, attamen vales inseritur imis, & ob id inaequabilibu capitibus posterioribus oslium metatan quinti, quarti, tertii, praesertim ver & quidem extremo latiore ac valentio secundi. Alia denique, similiter vale tia, ab offe naviculari pertinent ad o neiformia; rurlus ab his & a cubiforn ad ossa metatarsi; at inprimis a cun formi primo, ad primum, secundu tertiumque ex metatarsi oslibus.

243. Pars prior metatarsi DIGIT qu

quinque ' augetur : gracilibus omnibus, & oblongis, ac prope rectis: sed secundo fere longiore, quam primo; reliquis a secundo paullatim brevioribus; maxime guarto quintoque. Hi autem ex ossibus ternis constant²: excepto primo, id est pollice; qui est ex offibus omnino duobus³, exempto quasi medio. Ac pollicis crassa sunt 3, & valentia: reliquorum multo tenuiora. Primi autem ordinis longissima sunt : secundi perquam brevia: tertii brevislima: & pollicis eadem ratio est; at utraque offa sua satis magna habet. Omnia extremis utrimque capitibus tumidula, media graciliora.

1 Vid. citat. §. 211.4. 2 Vefal. Lib. 1. Cap. XXXIII. Fig. 1. & 2. s. 8.2. 3 Ibid. 4. 2.

244. Primi ordinis omnia in postcriorem partem sinuantur. Ac sinus illi rotundi, nec admodum profundi, & cartilagine laevi crustati, leviter reci-Ee 2 piunt piunt' prominula metatarsi offium capi-239 ta a, articulis per capsulas membranaceas firmatis, & in omnem partem mobilibus, maxime tamen terram versus flectendis, rursumque in superiora.

I Vefal. Lib. I. Cap. XXXIII. Fig. I. & 2.

245. Ad haec, ut musculis genu exa 204. tendentibus patella ^a, fic pollicem fle-Atentibus o s s A SESAMOIDEA ' data funt. Et ut patella tibiae quafi pars eft ^a, ita & fefamoidea ad primum pollicis os pertinent. Pollex autem duo habet, plerumque magnitudine inaequalia '; utraque oblonga, & ab inferiori ² parte gibba, a fuperiori ³ per longitudinem concava, per transverfum quodammodo gibba, & ifta parte cartilagine laevi cruftata: eaque ad imum caput offis metab 239. tarfi pollicis ^bapplicantur⁴, id eft, utrimque in finus offis iftius recipiuntur, fic

ut

4 Ibid. Cap. XXXIII. Fig. 2. 4 w.

I Vefal. Lib. I. Cap. xxvIII. Fig. A. B. C. D.

² Ibid. A. & D.

³ Ibid. B. & C.

ut modico discrimine separata sint 5 : quin etiam & ad partem primi pollicis offis posteriorem imamque religantur, & caplae articuli istius innectuntur. Atque iis Flexor pollicis brevis, ejusdemque Adductor, Abductorque inseruntur : quibus agentibus retro trahuntur, sequente, flexoque in terram primo pollicis offe; rursumque extenso articulo isto, per eandem viam redeunt. Itaque robur musculorum illorum augent, impediuntque, ne in statu comprimantur; simulque tendinem Flexoris pollicis longi per medium intervallum suum, tutum ab omni compressione, ad priora deducunt. Quin & patellae instar a sese accommo-a 204. fin. dant.

Reliquis vero juncturis illis c raro se- c 244. famoidea.

5 Ibid E.

246. Priora autem primi ordinis offium capita minora funt. Omnia a lateribus fuis plana, a fua fuperiori parte deorfum verfus latefcunt : eadem a pri-E e 3 ori ori parte, qua fecundi ordinis officula fuftinere debent, rotulae orbitae quodammodo fimilia, id eft, a fuperiore fui parte per priorem, ad imam, & porro infigniter retrorfum orbiculatim ducta; medio orbiculo illo profunde, & fimiliter orbiculatim finuato; ad latera eminente gibboque, & quafi capitulato; at minimum a fuperiori parte, inde vero per priorem ad inferiorem magis magisque. His feilicet orbitis, ea re laevem cartilagineam cruftam obductis, committuntur ' cum fe-247 cundi ordinis offibus a: praeterquam pollicis, quod cum ultimo'.

1 Vefal. Lib. 1. Cap. xxxIII. Fig. 1. & 2.

247. Namque secundi ordinis digito. rum quatuor minorum officula, ac pollicis ultimum, capitis sui primi partem posteriorem latam habent, & primo per altitudinem suam totam orbiculatim, sec leniter, concavam; deinde per trans versum in medio eminentem gibbamque ad latus utrumque sinuatam; totamque lae laevi cartilagine crustatam, & orbitis illis a primi ordinis offium aptislime con-a 246. venientem; atque ita adaptatam ', ut hi articuli duntaxat & in rectum extendi, &, eo quod orbitae illae ab inferioribus partibus retroversus productiores fint, deorsum infigniter flecti queant : hos inprimis articulos firmantibus ligamentis lateralibus, quae a lateribus capitum priorum primi ordinis offium ad latera capitum posteriorum cum iis commisforum pertinent.

1 Vid citat. § 246. 1.

248. Rursum capita priora secundi ordinis offium digitorum minorum quatuor minora sunt, & primi ordinis similia quidem, sed quasi degenerantia, id est, fere instar oblongorum, transversorum, & a superiore sui parte per priorem ad inferiorem posterioremque gibborum tuberculorum; quibus cartilagine laevi crustatis, cum primis capitibus ^a tertii ordinis officulorum pa- a 249. siter committuntur'. 249.

I Vefal. Lib. 1. Cap. XXXIII. Fig. 1. & 2.

249. Quapropter & tertii ordinis, digitorum minorum quatuor, officulis capitis primi pars posterior lata est, & planior, & oblonga transversaque, atque a sua superiori parte usque ad imam leviter orbiculatimque finuata, laevemque cartilaginem obducta: atque iis adeo finibus priora secundi ordinis capia 248. tula a recipiunt' simili, ac juncturae prib 247 mi secundique ordinis b, mobilitate, similiterque ligamentis firmata.

Ultimi autem pollicis perfectior, & primae parti secundi ordinis officuloc 247. rum c similis, ac cum primi ordinis offis d 246. capite d simili commissa mobilitate. fin.

1 Vid. citat. §. 248. 1.

250. Eoque digiti illi toti ad metatarsum in omnem partem flecti possunt; maxime deorsum; tum & sursum; atque etiam nonnihil in utrumque latus, id est, diduci, rursumque adduci : ipsi autem & in rectum porrigi, & deorsum aequabiliter curvari, suis praesertim extremis.

251.

251. Digitorum offa, praeter capita fua, a superiori parte aequabilia, & ex transverso rotunda sunt '; ab inferiori latiora & planiora, ac per longitudinem modice sinuata ', ut aequabilius deorsum in arcum curvari possent, & locum praebere Flexorum tendinibus. Ordinis autem tertii, priori parte latiora, & per ambitum quasi semiorbiculata, deorsumque inaequabiliter protuberantia³.

Omnia & musculis infertiones praeftant. Primi ordinis minorum quatuor, capitibus fuis primis, utrimque Interosfeis; interno autem latere, Lumbricalibus: pollicis primum, capitis fui primi externo latere, Abductori fuo. Secundi ordinis, capitum primorum fuperiori parte, Extenforibus; inferiori utrimque, Flexoris brevis tendinibus. Tertii denique, fimiliter capitum primorum fuperiori parte, Extenforibus; inferiori me-

I Vefal. Lib. I. Cap. XXXIII. Fig. I.

² Ibid. Fig. 2.

³ Ibid. Fig. 1. & 2.

mediaque, Flexori longo digitorum:ac fic quoque *pollicis* primum caput, sua ima parte, Flexori longo suo; superiori autem, Extensoribus.

252. Ergo est ex tarso metatarsoque pedis extremi ampla, praelonga, lataque, & compacta pars; qua in terra insistimus, lato & stabili vestigio. Eaque incurva; atque a superiori partegibba, ab ima concava; maxime qua alterum pedem spectat; inde in exteriora devexa : itaque non tota inferiori parte sua nitens, sed partibus omnino tribus; sicque aequabiliter firmiterque, etiam in quacumque fere superficie, insistens; a posteriori scilicet parte calcaneo; a priori, praesertim extremo metatarsi primo osse, ob id crasso & valente, totoque reliquo extremo metatarso, eo ipso quidem lato, sed cedente & sese facile accommodante; ab externo denique latere, ibidemque fere in medio, capite primo offis metatarsi quinti : quo simul locus a compressione tutus musculis, tendinibus, vasis, nervisque paratus est. Quin & ad meliorem facilioremque statum

tum & incessum, non ex uno aut ex singulis rectisque offibus riger, sed e multis parvisque flexilis est. Et quidem certa mobilitate: laxa ad talum calcanei, pariterque navicularis: adstricta & tantum obsequiosa, inter se caeterorum; nempe calcanei, cubiformis, navicularis, cuneiformium, & capitum posteriorum metatarsi omnium. Ac posteriora ossa, quo crus commode sustineant, maxima sunt; atque ad innixus stabilitatem, pauca: duo autem; ut mobilitas juncturae cruris cum pede extremo & stabilis, & tamen in priora posterioraque, atque etiam in utrumque latus obliqua sit. Ante talum os naviculare est, mobili adjunctum articulo; ut ad talum quiescentem simul & naviculare, & calcaneus, oblique in utrumque latus, maxime in internum, moveri possint; consequente naviculare cum calcaneo reliquo pede extremo. De reliquo statim ante crus pes extremus e multis parvisque & inter se ligatis ostibus nonnihil obsequiosus, ad faciliorem incessum. Deinde autem metatarsus, ut firmiter pes Ff 2 111 in terra insisteret, e longis rectisque ossibus rigens: utque simul, cum latus sit, sua se latitudine accommodet, ex quinque talibus, juxta se positis, obsequiosus; maxime, qua parte insistit. Is denique a priori parte in digitos definit: qui discreti, flexilesque, & incurvati terram premunt ac quasi reprimunt, & in progressu, sublata calce, cedunt; magni ad stationis incessusque firmitudinem usus; praesertim pollex; ipse priori parti pedis, qua post calcem maxime nitimur, praepositus, & ea re valentior. Jamque in hoc pede crus infiftit, fic ut & in priora, & in posteriora ultra crus ipse pes extremus producatur; ne in priora, aut in posteriora vacillet. Et cum nos omnes in priora proni simus, & in priora praesertim progrediamur, pes quoque ultra crus in priora longius, quam in posteriora projicitur: qua de caussa & a posteriori parte angustior, in priora magis magisque latescit; atque etiam a posteriori riget; a priori obsequitur, digitisque augetur.

a 193. 253. Atque duo nobis tales a pedes, ad 253. fimisimiles inter se, dati sunt; ambo justae magnitudinis : quibus & erecti in quocumque fere loco consistere possumus; & quoquoversus incedere, in priora quidem rectissime, tum quoque in aversum, ac quodammodo in dextram, inque laevam; & currere, falire, faltare, calcare, calcitrare, nos totos convertere, caeteraque, ut poscit necessitas: super eosque, quo volumus, corpus nostrum inclinamus: quin & permittunt, ut commode sedere, & recumbere quea-mus; ac juvant eriguntque surgentes. Nam per coxarum articulos & truncum super pedum vertices erigimus, ac quoquoversus inclinamus versamusque, tum super alterutrius, tum etiam super utriusque fimul; & pedes totos sub trunco in omnem partem flectimus convertimusque, ac sic utrumque pedem extremum, in quemcumque prope nos locum videtur, satis insigniter transferimus, ponimusque vestigium, ad truncum sive erectum, sive ad quamcumque partem inclinantem, sive propendentem, sive labantem ac prope cadentem, Ff 3 ful-

fulciendum, eundemque quoquoversus transferendum, atque in utramque partem convertendum, mira agilitate. Ipfae autem pedum columnae ex paucis, rectis, valentibusque ossibus stabiles sunt: at mediae divisae curvabilesque, quo se ipfis breviores fieri possent, & ad multos usus accommodari; ut ad progrediendum, sedendum, recumbendum, furgendum, alta conscendendum, descendendum in inferiora, caetera. Utrique basis, ipfa obsequens, mobili adaptatur junctura, id est, facile ante nos flectenda, & in aversum, atque etiam in utrumque latus; cum ut crus, totaque pedis columna, iisdem super basem fuam modis inclinari posset, tum ut bafis illa sub crure suo se accommodaret, eoque vel recto, vel modicum inclinato, lato in terra infisteret vestigio. Jam vero, quia in priora progredimur, & eandem in partem ad multos usus deorsum curvamus corpus, pedesque flectimus, ac sedentes in priora pedes commodissime protendimus, coxarum quoque articuli maxime in priora flecti poffunt.

(230)

funt. At genua, cum nulla id exigat necessitas, nec in latera, nec fere in priora flectimus; ad stabilitatem. Curvamus autem in posteriorem partem: primum ad rectum inceffum; ut translato in priora altero extremo femore, sublatoque, ab eo crus in terram rectius tendere, eidemque commode recteque insistere posset; atque etiam progredientis pes posterior, a terra sublatus, secundum alterum in priora commode transferri, non facile in terram impingendo: deinde ad sessionem; multaque alia necessaria opera. Quin & praesertim ob incessum cruris cum pede extremo juncturam in priora flectimus, & magis in aversum: tum quoque in internum latus oblique insigniterque; ut pedibus divaricatis, vel & altero ab altero in latus abducto, tota prope planta in terra infisteret, pedibusque extremis medium forte corpus quasi comprehendere possemus: sed minimum in externum latus, ne vacillante articulo, facile corruamus. Et ne in utramque partem toto corpore vacillemus, con-C1-

(232)

cidamusque, unus utrimque pes trunco fuppofitus eft: ex quo & incedere poffumus; alterum juxta alterum in priora transferendo pedem. Impedit autem pes extremus, ne in priorem partem vacillemus, aut in averfam. Jamque ad firmiorem ftatum inceffumque pedes extremi in priora divergunt: iidemque ad eosdem ufus, & ut corpus convertere poffemus, fuper terram in utrumque latus, praefertim extrorfum, converti queunt; & quidem cum genu extenfum, ut in ftante, totum ad coxam pedem convertendo; at cum flexum, ut in fedente, folum ad femur convertendo crus.

IV. DE BRACHIIS SCELETI.

254. BRACHIA duo SCELETI', multorum usuum ministri, constant ex Scapularum ossibus², horum-

> Ibid. R.

I Vefal. in fin. Lib. I. Fig. 1. 2. 3.

(233)

rumque Claviculis 3; ex Humeris+, Cubitis⁵, Manibusque⁶.

1.	and the product of the second s
3 Ibid. Q.	
4 Ibid. S.	
r Ibid. T.V.	
6 Ibid. post V.	
o Ibid. poir v.	and the state of t

255. Humerorum cum trunco recte committendorum caussa, duo lata sca-PULARUM OSSA' sceleto data scaatque ad posteriorem eandemque superiorem exterioremque thoracis partem utrimque adjuncta'; locum quoque, originem, infertionemque musculis praestantia.

I Vefal. Lib. 1. Cap. XXI. Fig. 1. 2. 3.

2 Ibid. in fin. Lib. 1. Fig. 1. 2. 3.

256. Ea igitur, ut ad thoracem commode apteque & cum quadam stabilitate applicari possint, lata ' sunt, & ex interiori² parte leniter concava, dorso³ gibba.

I Vefal. Lib. I. Cap. XXI. Fig. I. & 2.

² Ibid. Fig. 1.

³ Ibid. Fig. 2.

ba. Applicantur autem quam laxifime, intercedentibus musculis: tota penfilia, & velut innatantia; ob hoc levia & maximam partem tenuia, folida tamen; perque musculos validos firmaa 263. ta, ac claviculis a a fuperiori eademque exteriori parte fubnixa. Itaque in omnem partem facillime moveri & impelli poffunt; furfum, deorfum, in dextram, inque laevam, in priora, & in averfum; quin & a thorace non-nihil removeri, rurfumque ad eumdem propius admoveri; plurimis modis.

257. Latiffima ' autem ad spinam trunci, inde in exteriora paullatim in triangularem formam coangustantur ' ad spinam quidem terminata ora ' recta praelonga, satis tenui, quam basem dicunt : a superiori parte, ora + transversa, brevissima inter tres illas, tenuique: a priore, extremitate ' longissima re-

Vefal. Lib. 1. Cap. xx1. Fig. 1. & 2. Z. Y. coll. cum Fig. tribus ult. Lib. 1.
 2 Ibid. à Z. Y. ad D. C.
 3 Ibid. X. Y.
 4 Ibid. Fig. 1. a. Z.

⁴ Ibid. Fig. 1.a.Z.

⁵ Ibid. Fig. 1. & 2. D. Y.

rectiore, crassa, caque ab ima basi oblique sursum in exteriora prioraque du-Sta: jamque sua ima parte in angulum6 crassum desinentia : superiori autem, quae ad spinam est, inter basem oramque superiorem, velut resecto angulo, in extremitatem 7 tenuem, oblongam, rectiorem, brevem, oblique ductam; ne ex gibbo dorso nimium eminerent : at superiori eademque exteriori, in a cer-a 258. vicem⁸, quae humerum sustineat, migrantia. Atque haec ossa basibus suis ad gibbum thoracem prope admota funt⁹; non longe a spina: ab ea autem quo longius procedunt, eo a thorace magis recedunt⁹; in latera & fimul nonnihil in priora tendentia; sic ut cervices fuas longissime protendant?. Ex quo trunci pars superior, sub collo, utrimque latior fit 9; deinde locus utrimque articulo humeri paratur9, atque ille ipfe a

6 Ibid. Fig. 1. 2. 3. Y. 7 Ibid. Fig. 1. & 2. Z. X. 8 Ibid. C. D. 9 Ibid. in fin. Lib. 1. Fig. 1. 2. 3. Gg 2 a trunco admodum remotus, ad ampliorem humerorum mobilitatem : nec tamen scapulae sub his articulis, etiamsi amplae & deorsum ad majorem stabilitatem protensae, invenuste eminent, aut

impedimento funt?. 258. Jamque cervix ' brevis eft, lataque, & crassa: atque exteriora versus in priorem partem, atque etiam in aversam intumescens, mox in sinum 2 desinit satis amplum, levissimum, oblongum, & ima sui parte quasi semiorbiculatum amplioremque3, inde ad superiorem paullatim angustatum 3: hic ad latus fimulque nonnihil ad priora spe-Etans, & laevem cartilagineam crustam a 268. obductus, caput humeri a levissime recipit⁴, suftinet, junctura mobilissima. Ipse autem sinus istius margo in cartilagineum ligamentum quasi vertitur; quod paullatim in capfam membranaceam

I Vefal. Lib. 1. Cap. xx1. Fig. 1. & 2. C. D.

² Ibid. Fig. 2. A. B. & Eustach. Tab. XLVII. Fig. 17.53 - 21.

³ Eustach. 1. c.

⁴ Vefal. in fin. Lib. 1, Fig, 1.2.3.

ceam abit; eaque totum illum articulum complectens, humero inseritur.

259. Ex superiori dorsi scapulae parte, per transversum, a summa basi usque ad cervicem, exsurgit spina'; quae ad basem scapulae angusta², inde in posteriorem partem paullatim latescit 3, magisque exfurgit, & furfum incurvatur, tandemque producitur in processum 4 praelongum, primo modice angustatum, deinde rursus latescentem, sursumque in priora recurvatum; a superiori parte gibbum⁵, cavum ab ima⁶; totum a cervice scapulae remotum7, & ultra eam longius protensum7, ei denique a parte eadem & posteriore & superiore quasi superimminentem 7, quem summum humerum dicimus. Is autem juncturae humeri praepositus, eam ab ifta

Vefal. Lib. 1. Cap. XXI. Fig. 2. G. H. I.
 Ibid. G.
 Ibid. à G. ad H.
 Ibid. Fig. 1. 2. 3 K.
 Ibid. Fig. 2. & 3.
 Ibid. Fig. 1.
 7 Ibid. Fig. 1. 2. 3.

Gg 3

ista parte firmat; humerum, cum brachio nitimur, sustinet, retinet; ipfe ^{a 264}. Subnixus ⁸ clavicula; cujus extremum ^a quodammodo recipit *funu* ⁹ levissimo, oblongo, ovato, transverso, & laevi cartilagine crussato, quem in suo interiore margine, haud longe ab ipso extremo, habet; intercedente lamella cartilaginea mobili.

> 8 Ibid. in fin. Lib. 1. Fig. 1. & 2. 9 Ibid. Cap. xx1. Fig. 1. & 3. L.

260. Ipfa porro cervix suam superiorem pàrtem exeuntem in processum coracoidem ' habet; qui lata crassaque radice ' prodeuns, mox in priora exterioraque se reflectit ', multo quam cervix longius protensus, ac procedendo gracilescens, a superiori ' parte rectior & inaequabilis, ab inferiori ' modice con-

- I Vefal. Lib. 1. Cap. xx1. Fig. 1 & 2. E.F.
- 2 Ibid. Fig. 1. inter C. &a.
- 3 Ibid. ab F. ad E.
- 4 Ibid. Fig. 1.
- 5 Ibid. Fig. 2.

(239)

concavus laevisque, tandemque in obtufum ⁶ definens. Hic claviculam ⁴ fuftinet ^a; ac fimul os humeri ab interiori^a ²⁶⁴. parte retinet; musculos insuper ligamentaque firmans.

6 Ibid. E.

261. Scapularum offa musculos quoque locant, stabiliuntque. Tota interiore cavaque parte, Subscapularem. Dorso gibbo, sub spina, Infraspinatum: cavo, quod supra spinam est, Supraspinatum. Ora superiore, non longe a processu coracoide, Coracoyoideum. Angulo superiore, Levatorem. Basi, Rhomboideum, Serratum anticum majorem. Angulo inferiore, Teretem majorem. Ora priore, Teretem minorem, Longumque. Spina summoque humero, Cucullarem, Deltoidem. Processu coracoide, Serratum anticum minorem, Coracobrachiaeum, unumque de capitibus Bicipitis. Cervice denique, caput Bicipitis alterum.

262. Illa autem osla CLAVICU-LIS

(240)

Lis' suffinentur : quae oblongae, graciles, valentes.

1 Vefal. Lib. 1. Cap. XXII. Fig. 1. 2. 3.

263. Utraque incipit *capite* ¹ craffo, oblongo, retulo, quodammodo triangulari², & cartilagine crustato; quo in a 166. summa offis pectoris parte ^a innititur ³, intercedente tenui mobilique cartilaginea lamella; junctura obsequiosa & quoquoversus satis mobili, ac ligamentis undique firmata.

I Vefal. Lib. I. Cap. XXII. Fig. 1. 2. 3. A.

2 Ibid. Fig. 1. B. C. D.

3 Vid. citat. 9. 166, 3.

264. Tenuior deinceps, transversa in suum quaeque latus modiceque posteriora versus, supra processum coracoia 260. dem a, ad ipsum usque summum hume269. rum b protenditur', ejusque sinui b quam levissime, intercedente etiam tenui cartilaginea lamella, infidet ' extremo suo lato

I Vefal. Lib. 1. in fin. Tab. 1.

lato, sed tenui, & in capitulum 2 levissime gibbum, oblongum, ovatum, transversum, ac laevi cartilagine crustatum, definente; articulo obsequente, validisque ligamentis adstricto. Quin & ipfa clavicula ad scapulam religatur ligamento valente, quod a processu coracoide scapulae ad claviculam procedit, atque imae ejus parti, qua supra processum istum incedit, ob id tuberculatae3, inseritur. Media igitur inter summum pectus summumque scapulae processum, sustentaculum superioris scapulae partis, atque adeo totius scapulae est; quam a pectore costisque remotam tener, & in latus protendi facit, ad faciliorem liberioremque humeri mobilitatem : quo simul pectus dorsumque latiora efficiuntur. Ob eamque caussam scapula hoc suo fulcro & in pectore innititur, & cum stabilitate mobilis est; maxime surfum, deorsum, tum & insigniter retrorsum, minimum autem in priora : dum fimul

2 Ibid. N.

² Ibid. Cap. XXII. Fig. 3.Q.

fimul offa haec duo soluta, & obsequente junctura connexa, sele facillime accommodant.

265. At vero claviculae non rectae sunt, sed insigniter meurvae. Et primum a pectoris offe fere usque ad processus coracoideos, a priori parte admodum gibbae', a posteriori concavae², ipfi pectori figura quasi similes sunt; insuperque a pectore remotae, transitum musculis Scalenis, atque axillas petentibus vasis nervisque praebent; ea parte craffae³, ac durae. Deinde rurlus contrario modo, ad extremum fummum humerum recte sustinendum, in priora eum ipsum versus se incurvant, a priori parte concavae⁴, ab aversa gibbae⁵; caque parte tenuiores, & tum a Iuperi. ori

1 Vefal. Lib. 1. Cap. XX11. Fig. 1. H. E. coll. cum Tab. 1. in fin. Lib. 1.

2 Ibid. Cap. XXII. Fig. I.

3 Ibid. Fig. 1. E. H. I. Fig. 2. F. H. I. Fig. 3. F. H. L.

4 Ibid. Fig. 1. ab H. ad Q. coll, cum Tab. 1. in fin. Lib. 1.

5 Ibid. Cap. XXII. Fig. 1.

011

(243)

ori⁶, tum ab inferiori⁷ parte latte, & planiores.

6 Ibid. Fig. 2. I. Q. 7 Ibid. Fig. 3. L. O. Q.

266. Praeterea musculis, fe ipfas, humeros, caput, costas, os hyoides, cartilaginem thyroidem, moventibus stabilitatem dant: Cucullaribus, Deltoideis, Pectoralibus, Cleidomastoideis, Subclaviis, Sternoyoideis, Sternothyroideis; ab his quoque figuratae.

267. A fcapularum oflibus HUMERI^{*} deorfum procedunt : qui praelongi, quodammodo teretes, craffi valentesque, brachiorum post scapulas superiorem, camque maximam, partem faciunt.

I Vefal. Lib. I. Cap. XXIII. Fig. I. & 2.

268. Uterque capite ' incipit crasso, fe-

I Vefal. Lib. 1. Cap. XXIII. Fig. 1. & 2. A. B.

Hh 2

semirotundo, aequabili, laevem cartilagineam crustam obducto, ac vertice fuo & introrfum & furfum & infigniter a 258. retroversus, ad scapulae sinum a directo: coque in parvum illum scapulae sinum quam levissime inserto², mobilitatem in omnem partem laxisfimam liberrimamque habet. Ne tamen articulus ille plane instabilis vagusque foret, totus primo capía membranacea, a scapub 258. la b ad humerum procedente, ejusque fin. capitis inaequabili radici inserta, continetur : dein a dimidia superiori parte prominente septo (facto a summo huc 259. mero c, clavicula d, processu coracoide e, d 264 ligamentisque 3 latis & valentibus, quae e 260, inter fummum humerum & coracoidem processum intercedunt) circummunitus est, atque coërcitus²; qua etiam de caussa truncus humeris firmiter inniti potest.

2 Ibid. in fin. Lib. 1. Tab. 1. 2. 3.

3 Euflach. Tab. xxx111.44 - 15. & 441 - 151

269. A capitibus illis a paullatim ina 268. figni-

(245)

figniterque gracilescunt '; ac deinde primo rectiores, medii fere paullatim & modice ad se invicem incurvantur ', eo magis, quo propiores cubitis, ad meliorem amplexum. Similiter pars eorum dimidia inferior ad multas res modice in priora sefe flectit.

1 Vefal. Lib. 1. Cap. xx111. Fig. 1. & 2. 2 Ibid. in fin. Lib. 1. Tab. 2. & 3.

270. Primum autem teretes quasi crafsique, medii fere gracilescunt, procedentesque paullatim latescunt, donec latissimi facti ', apti sint ad cubitos sustaque ad extremum uterque musculos. Itaque ad extremum uterque primo medius fere desinit in quandam trochleae, eamque fixam, rotulam², circum extremum humerum ab exteriori ejus parte in interiorem orbiculatam; totamque mediam fere, ac similiter orbiculatim, sinua-

1 V.efal. Lib. 1. Cap. XXIII. Fig. 1. & 2. 2 Ibid. K. L. M.

Hh 3

finuatam³; eminentibus utrimque latis gibbisque marginibus⁴, quorum qui pofterior⁵, is & plenior, magisque gibbus; totam quoque ab interiori humeri parte usque ad exteriorem nonnihil oblique in priora exporrectam, & laevi 2 274. cartilagine crustatam; qua ulnam ^a mobili junctura fustinet⁶.

Ad superiorem istius rotulae partem ipfe humerus utrimque finuatus, ab exteriori quidem parte *finu ⁷ maximo*, ab interiori multo *minore*⁸, discernente eos medio osse tenui, cedit ulnae procesmedio osse tenui, cedit ulnae proces-²⁷⁴ sibus ^b, ut cubitus & in rectum cum stafin. bilitate extendi, & insigniter stecti posfit.

3	Ibid. K.
4	Ibid. L. M.
	Ibid. L.
6	Ibid. in fin. Lib. 1. Tab. 1. 2. 3.
7	Ibid. Cap. XXIII. Fig. 2. O. Ibid. Fig. 1. N.
8	Ibid. Fig. 1. N.

271. Deinde ad priora dictae rotulae, ab interiori parte, migrat in *caput* ' ma-

1 Vefal. Lib. 1. Cap. XXIII. Fig. 1. P.

(247)

magnum, rotundum, gibbum, deorfum in exteriora nonnihil productum, aequabile, laevi cartilaginea crusta opertum; cum quo radius a committitur 2, a 2770 articulo mobili.

2 Ibid. in fin. Lib. 1. Tab. 1. 2. 3.

272. Caeterum humeri musculis fuis, aliisque ulnae, radii, extremae manus, ac digitorum, fedem & fundamentum praebent. Uterque tubere ' magno, quod ad exteriorem capitis fui partem habet, Infraspinato & Tereti majori. Tubere ' minore, eoque ad partem ejusdem capitis priorem, Subscapulari & Supraspinato. Sinu ' autem oblongo, qui in summa parte inter caput & tuber illud majus incipiens, porro inter duo illa tubera deorsum fertur, continet Bicipitis longum tendinem. Deinde ipso trunco suo firmat Pectoralem & Deltoidem,

I Vefal. Lib. I. Cap. XXIII. Fig. 1.& 2. E.

² Ibid. Fig. 1. D.

³ Ibid. H.I.

(248)

dem, ob id protuberans & inaequabilis: ac praeterea Latiflimum dorfi, Teretem majorem, Coracobrachiaeum, Brachiaeum internum externumque, Brevem cubiti extenforem, Supinatorem longum. Ab inferiori parte musculorum cauffa in tubera, quos condylos 4 dicunt, abit: quorum prior⁵, idemque miaor, educit Bicornem, Extenforem carpi ulnarem, Anconaeum, Supinatorem brevem: pofterior⁶, atque is multo major, Pronatorem teretem, Flexorem carpi radialem, Flexorem digitorum fublimem, Palmarem longum.

6 Ibid. Fig. 1. & 2. S.

273. CUBITUS', pars magna brachii, fed humero brevior, conftat ex offibus duobus, *Ulna²* & *Radio³*: utrisque oblongis, gracilibus, valentibus. 274

1 Vid. citat. §. 254. s. & Vefal. Lib. 1. Cap. XXIV. Fig. 1. & 2.

- 2 Vefal. 1. c. Fig. 5. & 6.
- 3 Ibid. Fig. 3. & 4.

⁴ Ibid. Fig. 2. S. P.

Jbid. P.

(249)

274. ULNAE summum caput " plenius est, & ab interiori parte per longitudinem profunde orbiculatimque exsectum: ac sinu² illo lunato recipit³ humeri orbitam a; cui is aptissime con-a 270. gruit; similiter orbiculatus, medius per - init. longitudinem suam eminens & ex transverso gibbus4, ad utrumque latus ampliter finuatus , praesertim ad posterius⁶, & laevi cartilaginea crusta opertus; at totus tamen orbiculato humeri orbitae ambitu multo brevior. Ob quem articulum ulna ad humerum & in rectum extendi potest, exteriore eodemque superiore ac tumente ulnae extremo 7, quod Olecranon appellant, tunc in posteriorem b humeri sinum admisso, ejus-b 270. que in fundum innitente; & summo ca-fin.. pite

Vefal. Lib. 1. Cap. XXIV. Fig. 1. & 2. A.
2 Ibid. Fig. 1. C. E. D. & Fig. 11. F.F. G. G. H.
H.
3 Ibid. in fin. Lib. 1. Fig. 1. 2. 3.
4 Ibid. Cap. XXIV. Fig. II. F.F.
5 Ibid. G. G. H. H.
6 Ibid. H. H.
7 Ibid. C.

pite suo circum humeri orbitam, alterum brachium versus, verti, id est, ad angulum valde acutum slecti, donec ulna sua interiore & eadem superiore ac prominente parte⁸ in sinum humeri interiorem^b recepta, ejusdem sundo occurrat; rursumque per eandem viam redcundo, extendi.

8 Ibid. D.

275. Ima vero finus istius lunati pars, a priori parte, ubi radii caput ulnam contingit, angustior est, cedens capiti a 277. isti a, quod insuper ipsa ulna levissime, ac mobili junctura, recipit per *finum* 'levem, parvum, oblongum, transversum, & per transversum concavum, qui est ad priorem partem superioris ulnae capitis, statim sub imo finu lunato cjus, continuam cum eo laevem cartilagineam crustam obductus.

1 Vefal. Lib. 1. Cap. xxIV. Fig. 11.1.

276. Ulna a capite suo superiori rectius

ctius procedens, paullatim gracilescit'; ad ipfum fere extremum fuum in priora rursus nonnihil intumescens², ac majori ex parte definens in capitulum 3 in interiora, & simul oblique in priora modice eminens, eaque parte per ambitum orbiculatum 4, & laevi cartilagine crustatum; quo extremum radium a susti-a 278. in. net^s, mobili articulo. Idem vero illud capitulum suam imam⁶ partem retusam habet : & eandem primo inaequabiliter finuatam⁷, ad firmandum⁸ cartilagineum quoddam latumque ligamentum⁹, quod inde ad radium procedit ^b: dein juxta h 278. fin. exteriorem ambitum aequabilem, planiorem, leviter gibbam 10, & laevi cartilagine

- I Vefal. Lib. I. Cap. XXIV. Fig. J. & 6.
- 2 Ibid. ad P. 3 Ibid. Q.
- 4 Ibid. Fig. 5. & 10. p.
- 5 Ibid. Fig. 1. & 2.
- 6 Ibid. Fig. 5.6. 10.
- 7 Ibid. Fig. 10. S.
- 8 Ibid. Fig. 1. & 2. juxta R.
- 9 Ibid. T.
- 10 Ibid. Fig. 10, inter S. & p.

Ii 2

(252)

gine opertam, ad fustinendum " idem illud ligamentum ^b; & quidem junctura quadam mobili.

At vero ad exteriorem capituli istius partem ulna in processum ¹² acutum migrat, qui ultra capitulum deorsum protensus, ligamenta firmat.

11 Ibid. Fig. 1. & 2. fupra Q. 12 Ibid. Fig. 1. 2. 5.6. 10. R.

277. Ut tibiae fibula, fic ulnae RA-DIUS additamentum ' eft; fed mobile, & a priori parte adjunctum. Is autem incipit capite ² magno & orbiculato, cui vertex retufus, totusque modice finuatus & aequabilis ³ ac laevi cartilagine crutus & aequabilis ³ ac laevi cartilagine crupit ⁴, fic ut ex eo radius non modo ulnae flexionem extensionemque sequi commode possit, sed ipse etiam ad humerum

> r Vefal. Lib. 1. Cap. xxiv. Fig. 1. & 2. coll. cum Tab. ult. trib, Lib. 1.

² Ibid. Cap. XXIV. Fig. 1. 2.9. N.

³ Ibid. Fig. 9.O.

⁴ Ibid. in fin. Lib. 1. Tab. 1. 2. 3.

merum in utramque partem quasi circum axem suam converti, & quidem ulna ad humerum sive quiescente, sive mota, eademque vel extensa, vel ad quemcumque angulum flexa.

Et ut junctura illa stabilior sit, idem istud radii caput ulnae statim sub humero infidet⁵, per finum ejus ^b leviter re-^b 275. ceptum : utque simul ibidem radius ad ulnam facile converti posset, & capitis illius ambitus rotundus est, & qua ulnam spectat, inprimis acquabiliter orbiculatus latiorque⁶, ac laevi cartilagine crustatus, totusque sinui b ulnae congruens.

5 Ibid. & Cap. XXIV. Fig. 1.& 2. 6 Ibid, Fig. 3. 4.9. m.

278. Hinc procedens, primo ulnam versus nonnihil tendit ', sed mox ab ea paullatim modiceque leniter incurvus recedit², rursumque medius ulnam versus paul-

I Vefal. Lib. I. Cap. XXIV. Fig. I. & 2. ab N. q verfus. 2 Ibid. Fig. 2. à q, u versus, & sic Fig. 1.

li 3

paullatim se recurvat 3, donec sua ima parte cum ea coeat 4, ejusque capitua 276. lum a levissime recipiat sinu 5 levi, patulo, oblongo, per longitudinem leniter cavo, & laevi cartilagine crustato. Quibus de caussis extremus radius ulnae capitulo suffultus, circum id ipsum in utrumque latus semiorbiculatim converti potest, dum caput ejus superius ad humerum ulnamque se quasi circum axem suam convertit : eoque radius cum recta secundum priorem ulnae partem protendi potest; tum etiam sua superiori parte se convertens, & tamen in eodem loco quasi fixus manens, inde quo propior manui, eo paullatim magis magisque oblique circum ulnam immotam per interiora in posteriora converti, & restitui rursus. Retinet autem extremum radium, ac simul eundem circum ulnam converti finit, ligamentum⁶ cartilagineum, quod acutum ex ul-

(254)

- 3 Ibid.abu, usque ad extremum.
- 4 Ibid.
- 5 Ibid. Fig. 7. 0.
- 6 Ibid. Fig. 1. & 2. T.

(255)

ulnae imo finu ac processi enatum, sub ejusdem capitulo radium versus procedens latescit⁸, atque extremo radii margini⁹, qui ulnam spectat, latum inseritur ¹⁰.

7 Ibid. ad R. 8 Ibid. Fig. 1. ab R. ad T. 9 Ibid. Fig. 8. ad T. 10 Ibid. Fig. 1. ad T.

279. Idemque sub capite suo superiore ^a primo crassus ', & quodammodo 2 277. teres ', procedens paullatim latescit², atque inferiori inprimis parte, ad manum excipiendam & sustinendam, quo propior eist, eo magis intumescit²; modice alterum cubitum versus fe incurvans: ima denique parte definit in *sinum* ³ amplum, levem, oblongum, a priori parte angustum⁴, inde per longitudinem sustine ulnam versus paullatim la-

Vefal. Lib. 1. Cap. XXIV, Fig. 1.2. 3. 4. 9. M.
Ibid.
Ibid. Fig. 8. a. x. z. y.
Ibid. **

(256)

latiorem ', medio transverso oblongo gibbo leviterque eminente tubere ⁶ in duos finus⁷ minores distinctum, laevem denique continuamque cartilagineam crustam obductum; cum quo carpi os
²⁸⁴ naviculare ^b lunatumque ^c mobili com-^{c 289} mittuntur junctura.

5 Ibid. ab a, Tverfus.

6 Ibid. z.

7 Ibid. x. y.

8 Ibid. in fin. Lib. 1. Tab. 1. 2. 3.

280. Atque adeo totus cubitus, utrisque offibus fuis cum humero extremo,
274. articulis a mobilibus & per ligamenta
277. firmatis, commiffus, alterum cubitum verfus in angulum valde acutum flecti poteft, rurfumque in rectum extendi: privatimque radius circum ulnam oblique, maxime ima fui parte, infigniter
378. converti b.

281. Ulna radiusque media majori ex parte se mutuo versus exacuuntur ', tandemque

1 Vefal. Lib. 1. Cap. XXIV. Fig. 1. & 2.

(257)

demque extremis acutioribus & inaequabilibus firmant ligamentum medium latum tenue valens, quo, haud secus atque cruris duo osfa, conjunguntur: pariterque locum & stabilitatem praebent musculis multis valentibusque, qui partim totum cubitum, partim solum radium movent, partim quoque ad manum, ejusque digitos pertinent. Ulna scilicet excipit extremum Extensorum cubiti tendinem, Anconaeum, Brachiaeum internum; sua superiori parte: educit Supinatorem brevem, Pronatorem quadratum, Flexorem carpi ulnarem, itemque Extensorem, Sublimem, Profundum, Extensores pollicis, indicisque. Radius infertionem praestat Bicipiti, tubere 2 magno & inaequabili, quod in sua superiori eademque interiori parte habet; deinde & Supinatoribus, Pronatoribusque: originem vero, pollicis Flexori longo, ejusdemque Extenforibus. Atque ab his etiam varie figurantur :

2 Ibid. Fig. 1. 2. 3. 4. 9.

Kk

rantur: infuperque ad nonnullorum tendines deducendos finuata funt: ulna a priore fui extremi inferioris parte, inter capitulum proceffumque³, pro extenfore carpi ulnari. radius, a priori parte uno finu, pro Extenforibus pollicis: ab exteriori, duobus, pro tendinibus Bicornis; alio, pro Extenfore pollicis; alio, pro Extenfore indicis, & digitorum communi: ab interiori denique parte⁴, ad multos tendines ad volam deducendos.

3 Ibid. Fig. 2. & 6. V. 4 Ibid. Fig. 1. & 3. n.

282. Cubito extremo adjuncta Manus ' constat ex Carpo², Metacarpo³, & ex offibus Digitorum⁴.

I Vefal. Lib. I. Cap. XXV. Fig. I. & 2.

2 Ibid. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

3 Ibid. A. I. II. III. IV.

4 Ibid. tota reliqua extrema manus.

283. CARPI' offa octo funt: parva, mul-

1 Vefal. Lib. 1. Cap. xxv. Fig. 3. 4. 5. 6.

multiformia. Eaque in duos ordines componuntur: atque ad utrumque quatuor pertinent; ad primum, Naviculare², Lunatum³, Triquetrum⁴, Subrotundum⁵; ad fecundum, Multangulum majus⁶, minusque⁷, Capitatum⁸, Cuneiforme⁹.

2 Ibid. Fig. 3. 4. 5. 1. 3 Ibid. 2. 4 Ibid. 3. 5 Ibid. Fig. 3. 5. 6. 4. 6 Ibid. Fig. 3. 4. 5. 6. 5. 7 Ibid. 6. 8 Ibid. 7. 9 Ibid. 8.

284. Os carpi NAVICULARE fere longiflimum est; & primo in radii sinus a priorem partem levissime recipitur a 279. sua superiori parte', ob id ampla, gibba, & laevi cartilagine crustata.

I Vefal. Lib. I. Cap. xxv. Fig. 2. 4. 5. 1.

285. Inde in priora producitur'; eaque

1 Vefal. Lib. 1. Cap. xxv. Fig. 2. & 4. ab 1. ad 5. 6. verfus. conf. & Fig. 5. Kk 2

(260)

que parte, qua illa exteriora, id eft, dorfum manus, ac fimul nonnihil deorfum spectat, abit in *caput*² magnum, leviter gibbum, oblongum, laevem cartilagineam crustam obductum, quo sia 298 nus osfium multangulorum a ingredi-3°4 tur².

2 Ibid. Fig. 2. & 4. inter 1. & 5. 6.

286. Porro ab inferiori parte per longitudinem totum fere amplissime fatisque profunde *finuatum*, & laevi cara 307. tilagine crustatum, recipit ' capitis a offis capitati partem priorem.

> 1 Vesal. Lib. 1. Cap. x x v. Fig. 2. & 4. inter 1. & 7.

287. Ad posteriorem denique, eandemque interiorem finus istius partem, definit in superficiem planiorem, oblongam, angustam, incurvam, cartilaginea laevi crusta opertam; qua cum osse a 288. lunato a committitur'. 288.

> 1 Vefal. Lib. 1. Cap. xxv. Fig. 1.2. 3.4.5. inter 1.& 2.

(261)

288. Posteriori navicularis parti ^ao s^a ^{287.} LUNATUM, idque parvum & incurvum, adsidet ', superficie planiore & conveniente, ac laevem cartilagineam crustam obducta.

I Vid. citat. §. 287. 1.

289. Atque ejus quoque pars fuperior ' ampla est, totaque modice gibba, & laevi cartilagine crustata; eaque similiter in posteriorem sinus a radii partem a 279. recipitur.

1 Vefal. Lib. 1. Cap. xxv. Fig. 1. 2. 3. 4. 5. 2.

290. Quin etiam pars ejusdem inferior ampla est, totaque profunde sinuata, & ab interiori parte in exteriorem lunata, laevique cartilagine crustata; ad recipiendam ' posteriorem capitis a offis a 307. capitati partem.

1 Vefal. Lib. 1. Cap. xxv. Fig. 2. & 4. inter 2. & 7.

291. Postremo cum osse triquetro a a 922. Kk 3 com-

(262)

committitur ' parte sua posteriore; quae ampla, planior, levissime gibba, & laevi cartilagine crustata.

1 Vefal. Lib. 1. Cap. xxv. Fig. 1. 3. 2. 4. 5. inter 2. & 3.

292. Namque ad posteriorem offis 291. lunati ^a partem OS TRIQUETRUM, atque id parvum, applicatum est¹, superficie ampla ac plane conveniente, & laevi cartilagine crustata.

1 Vid. citat. §. 291. 1.

293. Hoc a junctura illa totum retrorfum fimulque modice deorfum procedit', paullatim gracilefcens; ac fuam fuperiorem partem', juxta os lunatum, amplam, gibbam, laevemque habet; ea-2 278. que ad ligamentum a, quod ab ulna ad fin. radium pertinet, admovetur.

1 Vefal. Lib. 1. Cap. xxv. Fig. 2. & 4.3.

2 Ibid. fub 3.

294. At vero inferior ejus pars, jux-

(263)

ta idem illud os lunatum, multo amplior est, planior, ad interiorem & ad posteriorem manus partem leviter sinuata, media nonnihil eminens, gibbaque, ac tota laevi cartilagine crustata : com-mittitur autem cum osse cuneiformi a. a 310.

1 Vefal. Lib. 1. Cap. xxv. Fig. 1. 3. 2. 4. inter 3. 8: 8.

295. Ipsum denique extremum ejus, in acutum definens, ex interiori parte capitulum exigit leviter gibbum, oblongum, ovatum, & laevi cartilagine crustatum; cui officulum subrotundum aa 297jungitur '.

I Vefal. Lib. I. Cap. XXV. Fig. I. 3. 5. inter 3. & 4.

296. Tria autem illa officula fimul suis superioribus partibus faciunt unum caput ' magnum, oblongum, gibbum, laeve; quod cum radii finu a, & cum a 279 li-

1 Vesal. Lib. 1. Cap. xxv. Fig. 1. 3. 2. 4. 5. 1. 2. 2.

^b 278. ligamento ^b ab extrema ulna ad radium fin. deducto, committitur², articulo, quem in omnem partem facile infigniterque flectimus.

(264)

Eadem ab inferiori parte committunc 312. tur cum fecundo c carpi offium ordine, mobili articulo. Et quidem primo efficiunt caput fatis magnum, oblongum, planius, gibbum, laeve, factum a nad 285. viculari d folo, receptumque per fie 312. num e fecundi ordinis offium : deinde, med. ad posteriorem capitis illius partem, finum amplum, oblongum, laevem, unoquoque istorum offium aliquid ad
f 286. eum conferente f; qui recipit fecundi 290. ordinis offium caput e.

Et cum suis planioribus, angustis, laevibusque ses contingant lateribus, & ligamentis laxius adstricta sint, facillime obsequuntur, atque se accommodant.

2 Ibid. in fin. Lib. Tab. 1. 2. 3.

297. His SUBROTUNDUM additum est: quod minimum omnium, & quasi torotundum, affidet ' triquetro *, fuper-a 29%, ficie planiore, leviter gibba, laevi cartilagine crustata, mobili articulo; atque inde in interiora eminens & inaequabile, excipit tendinem Flexoris carpi ulnaris, patellae instar; ipsum quoque ligamento crasso & valente ad os metacarpi manus quartum religatum; ac praeterea minimi digiti musculum educens.

I Vid. citat. §. 295. 1.

298. Primum fecundi ordinis officulorum, quod MULTANGULUM MAJUS dicimus, a priori manus parte pofitum, primo in fuperiorem partem fuam ampliter, fed leviffime finuatum eft; eoque finu, laevi cartilagine cruftato, capitis ^a offis navicularis partem reci-a 285. pit¹.

I Vesal. Lib. I. Cap. XXV. Fig. 2. & 4. inter 1. & 5.

299. Hinc deorsum procedens latescit, as majorem partemabit in superfi-Ll ciem

(266)

ciem ¹ amplam, oblongam, fecundum longitudinem fuam finuatam², ex transverlo gibbam³, totam oblique ad priora fpectantem, & laevi cartilaginea crufta opertam; qua os metacarpi pollia 322. cis a fuftinet⁴, mobili articulo.

- 1 Vefal. Lib. 1. Cap. xxv. Fig. 6. G.
- 2 Ibid. ab a. ad b.
- 3 Ibid. à c. ad d.
- 4 Ibid. Fig. 1. & 2. inter 5. & A.

300. Suo deinde extremo, qua id pri-300. Suo deinde extremo, qua id pri-317. mum os metacarpi manus ^a spectat, ejus ipsius partem sustinet¹, superficie² exigua, oblonga, ovata, oblique posita, & laevi cartilagine crustata.

> 1 Vefal. Lib. 1. Cap. xxv. Fig. 2. inter 5. & Q. 2 Ibid. Fig. 6 h.

301. Qua denique multangulum mia 302 nus a refpicit, eidem jungitur ' superficie ampla, oblonga, per longitudinem modice cava, per transversum nonnihil gib-

> 1 Vesal, Lib. 1. Cap. xxv, Fig. 2. 4. 1. 3. 6. in er 6. 8 5.

gibba, & similiter cartilagine laevi crustata.

302. Igitur MULTANGULUM MI-NUS posteriori majoris a parti junctum a 301. est ', superficie conveniente & laevem cartilagineam crustam obducta.

I Vid, citat. 9.301.

303. Idemque sua posteriori parte recipit ' capitatum ^a, *finu* satis amplo, le- ^a 306. vi, & laevi cartilagine crustato.

1 Vefal. Lib. 1. Cap. xxv. Fig. 2. 4. 1. 3. 6. inter. 6. & 7.

304. Sic multangulo majori capitatoque interjectum, a fuperiori parte gracilius est, finuatumque, & laevi cartilagine crustatum, ad recipiendam 'partem capitis ^a offis navicularis. a 2853

1 Vefal. Lib. 1. Cap. xxv. Fig. 2. & 4. inter 1. &. 6,

305. Ab ea deorsum versus intume-Ll 2 scit, fcit, definens in superficiem ' amplam, oblongam, per longitudinem suam modice cavam, ex transverso gibbam; qua
3¹⁷ maximam offis primi metacarpi manus a partem suffinet².

> 1 Vefal. Lib. 1. Cap. xxv. Fig. 6. 6. H. 2 Ibid. Fig. 1. & 2. inter 6. & 1.

306. CAPITATUM maximum craffiffimumque omnium est; medium inter a 303. multangulum minus a & cuneiforme b b 309. interpositum, atque utrique junctum', superficie conveniente, & laevi cartilagine crustata,

> I Multangulo minori, vid. citat. §. 303. Cuneiformi, Vefal. Lib. I. Cap. xxv. Fig. 1.3.2. 4.6. inter 8. & 7.

307. Incipit autem *capite* ' magno, gibbo, laevi cartilagine crustato; quod a 286. in finum, a naviculari ^a & lunato ^b fab 290. Aum, recipitur²,

308.

1 Vefal. Lib. 1. Cap. xxv. Fig. 2. 4. fub 7. 2 Ibid. inter 7. & 1. 2. 308. A quo ad metacarpum procedens, tum in exteriorem tum in interiorem manus partem aliquantum intumefcit, fuaque ima latiore parte ' fuftinet tria metacarpi manus offa a, totidem di- a 317, ftinctis, & continuam laevem cartilagineam cruftam obductis, fuperficiebus: & primo quidem partem offis primi², fuperficie oblonga, angufta, leniterque cava; deinde totum os fecundum³, fuperficie media, ampliffima, planiore; denique plerumque offis tertii partem, fuperficie exigua.

- I Vefal. Lib. I. Cap. xxv. Fig. 6.7.
- 2 Ibid. Fig. 1. inter 7. & 1.
- 3 Ibid. Fig. 1. & 2. inter 7. & 2.

309. Postremo os CUNEIFORME, idque magnum & crassum, ad posteriorem capitati partem admotum est; in hiatum, qui inter capitatum triquetrumque relinquitur, quasi cunei instar infertum, & ea re a superiori parte tenue', atque inde deorsum versus intume-

J Vefal. Lib. 1, Cap. xxv. Fig. 2. & 4. 8.

(270)

a 306. mescens¹. Itaque os capitatum ^a contingit² superficie ampla, levissime protuberante.

2 Ibid. Fig. 1. 3. 2. 4. 6, inter 8. & 7.

310. Sed altero latere committitur 2 294. cum triquetro ^a, fuperficie ampla, gibba per longitudinem, dein ad priorem & ad posteriorem manus partem protuberante, media leniter finuata, totaque laevi cartilagine crustata.

I Vid, citat. §. 294, 1.

311. Ejus denique inferior tumidula pars tota definit in superficiem amplam, oblongam, laevi cartilagine crustatam, atque in duas, nonnihil oblique positas, distinctam'; quibus duo metacarpi ma-distinctam'; nus ossa du guartumque, superior superior du guartumque, superior du guartum du guartumque, superior du guartumque, superior du guartumque, superior du guartum du guartumque, superior du guartum du guar

1 Vefal. Lib. 1. Cap. xxv. Fig. 6. L. M. 2 Ibid. Fig. 1. & 2. inter 8. & III. IV.

312. Quatuor haec fecundi ordinis offi-

(271)

officula suis alia alia contingentia lateribus, ligamentis insuper, vel ambientibus, vel intervenientibus, firmiter colligata sunt; coque fit unius offis, quodammodo obsequiosi, species, quod sua superiori parte cum primo ordine 2 com- 2 296. mittitur, inferiori sustinet metacarpum b 317. manus b, pollicisque c. C 322.

Quocirca a superiori parte habet primo caput magnum, oblongum, gibbum, (factum a capitato d & a cunei-d 307. formi e) quod recipitur per sinum f pri-e 310. mi ordinis. Deinde ad priorem capitis f 296. istius partem sinum minorem, oblongum, modice cavum, (factum a multangulis g) ac caput f primi ordinis re-g 298. 303. cipientem. Ex quo primi ordinis cum secundo junctura mobilis est; praesertimque in interiorem, atque etiam in exteriorem partem flecti potest.

At ab inferiore parte, ad metacarpum h 317. manus h itemque pollicis i sustinendum, 1 322. abit in superficiem ' amplam, oblongam, inaequabilem, hic finuatam illic eminentem. 313.

1 Vefal. Lib. 1. Cap. xxv. Fig. 6, 8, 7.6.5. M. L. K. H. G. h.

313. Est autem carpi inter cubitum manumque interjectu certa juncturae manus cum cubito mobilitas. Nam ex articulo cubiti cum primo carpi ordine flecti potest in priora, atque in aversur: ex utrisque simul, id est, tum cubiti cum primo carpi ordine, tum primi cum secundo, multo insignius & aequabiliter, ac cum stabilitate, in interiorem, itemque in exteriorem partem curvari.

314. Caeterum omnia fimul ab exteriori parte superficiem faciunt gibbam & saequabilem': ab interiori autem per transversum sinuatam, inaequabilem², ligamentis perpetuis obductam, & aequatam; eumque sinum, ad posteriorem partem, prope manum, insigniter auget processus oblongus, latus, tenuis, qui ex parte osso cuneiformus eadem & interiore & inferiore, in interiora eminet, modice finum versus incurva-

3 Ibid. Fig. 1. 3. 6. O.

I Vefal. Lib. 1. Cap. xxv. Fig. 2. & 4.

² Ibid. Fig. 1. & 3.

vatus : deducit autem tendines Sublimis, Profundi, Flexoris pollicis longi, Palmaris longi, Flexoris carpi radialis; nervos, arterias, venas : privatimque os multangulum majus ex interiori parte finum ⁴ oblongum, profundumque habet, qui tendinem Flexoris carpi radialis continet.

Adde quod praeter descriptas partes tota inaequabilia, finuata, gibberaque fint, ad firmanda ligamenta, quibus & inter fe, & cum cubito, & cum metacarpo colligantur. Ac denique cuneiformis processure a originem praestat a Huj. minimi digiti Abductori, ejusdemque in. Flexori parvo: multangulum vero majus, pollicis Abductori, Flexoribusque parvis; excipiens quoque partem Extensoris offis metacarpi pollicis, & Flexoris carpi radialis: utraque firmant ligamentum transversum, quod tendines in finu carpi continet.

4 Ibid. Fig. 1. & 3. ad P.

315. A carpo, non secus atque a Mm tar-

(274)

^a 236. tarso ^a, ossa quinque procedunt, e quibus METACARPUS ¹ est. Ea pariter oblonga, gracilia, valentia, & alia juxta alia posita. Metacarpi autem una pars ad manum pertinet, altera ad pollicem.

I Vid. citat. §. 282. 3.

316. Metacarpi manus offa funt quatuor '. Ac primum² inter ea longiffimum: ab eo reliqua³ paullatim breviora. Craffiffima etiam duo prima⁴: tertium quartumque graciliora⁵.

Vefal, Lib. 1. Cap. xxv. Fig. 1. & 2. I. II. III.
IV.
2 Ibid. I.
3 Ibid. II. III. IV.
4 Ibid. I.II.
5 Ibid. III. IV.

317. Omnia etiam incipiunt capitibus ' crassis, multiformibus, inaequabilibus. a 312. Atque haec carpo a suis verticibus amfin. plis, inaequabilibus, & perquam diversis

> 1 Vesal. Lib. 1. Cap. xxv. Fig. 2. Q. & fic in reliquis.

fis inter fe, fed cum carpo aptifime convenientibus, & laevi cartilagine cruftatis, ftrictiflime coagmentantur alliganturque; fic ut vix oblequantur. Nempe primum, primo & praecipue multangulo b minori²; fuperficie ampliffima: de-b 305. inde c majori³; exigua, quam ad prio c 300. rem partem fuam habet : tum ^d capita-d 308. to⁴; angusta & oblonga, quae ad partem ejus posteriorem est. Secundum, e capitato⁵; una ampla. Tertium, f cu- e 308. neiformi⁶; ampla leviterque gibba: de-f 311. inde plerumque capitato g; exigua g 308. Quartum foli ^h cuneiformi⁷, ampla gib-^h 311. baque.

2 Vid. citat. §. 305.2.
3 Vid. citat. §. 300. 1.
4 Vid. citat §. 308.2.
5 Vid. citat. §. 308.3.
6 Vefal. 1. c. Fig. 1. & 2. inter s. & III.
7 Ibid. inter s. & IV.

318. Eademque capita suis quoque lateribus alia aliis juncta sunt'. Et primo

I Vefal. Lib. 1. Cap. xxv. Fig. 1. & 2. Mm 2

mo se contingunt superficiebus inter se aptis, & laevi cartilagine crustatis. Secundum lateris sui, quo tertium respicit, margine superiore toto, coque leviter prominulo, & ad exteriorem pariterque ad interiorem manus partem ampliore, infidet superiori plane convenienti margini lateris tertii, quod fecundum spectat. Tertium ad superiorem partem sui lateris, quartum respicientis, duos parvos finus habet, alterum posteriorem amplioremque, alterum priorem & minorem; quibus recipit capitula convenientia, quae eminent ad fuperiorem partem lateris quarti, spectantis tertium. Quarto ejus lateris, quo quintum respicit, margo superior ampliter sinuatus est; coque recipit leviter prominulum gibbumque caput, quod quintum ad superiorem partem lateris, quartum spectantis, habet.

Deinde reliquum laterum istorum inaequabile est, firmatque ligamenta valentia, quibus alia ad alia pertinaciter alligata tenentur.

319. Quin etiam a capitibus illis deorsum orfum procedentia gracilescunt ', rurfumque paullatim infigniterque intumefcunt ', donec in *capita* ' quoque definant. Ea autem omnibus majora, quam metatarso funt, admodum gibba, & ab exteriori manus parte per imam in interiorem orbiculata; praesertimque per interiorem illam partem surfum producta, ac laevi cartilagine crustata: fimiliterque digitos a fustinent³, mobilibus a 327. articulis.

1 Vefal. Lib.1. Cap. xxv. Fig. 1. & 2. & Cap. xxv11. Fig. 1.

2 Ibid. Cap. xxv. Fig. 1.R. & fic in reliquis, & Cap. xxv11. Fig. 1.C.

3 Ibid. Cap. xxv. Fig. 1. & 2.

320. Omnia haec offa per longitudinem pariter incurva; ex interiori parte concava', extrinsecus gibba². Ponuntur autem alia juxta alia, continua serie³: ex quo similiter cratis species³; quae

- I Vefal. Lib. I. Cap. xxv. Fig. I. I. II. III. IV.
- 2 Ibid. Fig. 2. I. II. III. IV.
- 3 Ibid. Fig. 1. & 2. I. II. III. IV.

Mm 3

quae ex interiori parte concava, amplam manus volam facit; extrinsecus gibba, dorsum. Eadem suis superioribus capitibus alia alia proxime contingentia, inde autem satis insigniter divergentia, palmam juxta carpum angustam, inde digitos versus latescentem producunt 3: quae & sua inferiori parte cum stabilitate obsequiosa est; eo quod inferiora metacarpi capita longiori intervallo disjuncta sunt 4, & ligamentis, quae inter capita ista interveniunt, eorumque lateribus, quibus se invicem respiciunt, eam ob caussam planioribus & inaequabilibus, inseruntur, retinentur : maxime tamen tertium quartumque imis capitibus suis tum in exteriorem, tum in interiorem partem mobilia funt.

4 Ibid.

321. Pollex unum tantummodo metacarpi os'habet; quod brevius', sed crassum 'valensque.

322.

1 Vefal. Lib. 1. Cap. xxv. Fig. 1. & 2. A.



322. Hujus capiti superiori vertex ab Interno latere in externum insigniter gibbus, simulque a priori parte in posteriorem modice sinuatus : eoque partim recipit convenientem imam partem ossis multanguli majoris^a, partim ab eadem a 299. recipitur', articulo, qui & in priorem atque in aversam partem, & in utrumque latus insigniter stecti potest.

I Vid. Citat. §. 299.4.

323. Inde etiam deorfum procedens gracilefcit', medium fere paullatim intumefcens', donec in *caput* definat ²: quod fimiliter ab externa fui parte per inferiorem in interiorem gibbum; fed ima parte planius & quafi retufum; per transverfum leviflime gibbum; totum laevi cartilagine cruftatum; fuftinetque pollicem ^a, ejusdemque offa ^b fefamo-^a 327. b 328,

324.

I Vefal. Lib. I. Cap. xxv. Fig. 1. & 2, 2 Ibid.

(280)

324. Per longitudinem porro fuam leniter incurvum, & ab interiori parte infigniter concavum, ibidemque per transverfum gibbum, extrinsecus rectius & planius. Jamque ad priorem eandemque interiorem primi offis metacarpi manus partem apponitur; cava parte sua ad volam conversum: & superiori quidem capite offi isti propinquum; inde autem ab codem infigniter abscedens; liberum, totumque mobile.

Vefal. Lib. 1. Cap. xxv. Fig. 1. & 2. A.

325. Sunt denique metacarpi manus, pollicisque offa musculorum fundamenta. Namque primo tendines excipiunt: pollicis os, Extenforis fui, itemque Flexoris, & Adductoris ad indicem; primum manus, fuo fuperiori capite, Flexoris carpi radialis, & Bicornis unum; fecundum, Bicornis alterum; quartum, Extenforis carpi ulnaris, ac ligamentum quod os carpi fubrotundum retinet. Deinde musculos educunt: pollicis, Abductorem indicis; manus primum, FleFlexorem pollicis brevem, ejusdemque Adductores; manus quatuor; Interoffeos; quartum infuper, Flexorem parvum minimi digiti, & Palmarem brevem. Atque ab his varie finguntur.

326. Metacarpus quoque in DIGITOS quinque ' vertitur : manus quidem, in Indicem, Medium, Annularem, Minimum; pollicis autem, in Pollicem. Hi similiter quidem, ac pedum illi a, a 243. graciles sunt, oblongi, recti; sed quasi perfectiores '. Namque multo longiores sunt ': inter eos autem medius longiffimus'; post hunc, qui claudunt ei utrumque latus'; minimus praecedentibus longe brevior '; brevifimus pollex'. Sunt etiam craffiores'; praeter pollicem, qui multo quam pollex pedis tenuior, crassior tamen reliquis manus digitis'; quorum gracillimus, qui brevissimus. Similiter porro ex oslibus ternis constant 2: & pollici quoque medium non da-

2 Vefal. Lib. 1. Cap. xxv. Fig. 1. & 2. D. E. F. & fic in caeteris.

I Vid. citat. §. 282. 4.

(282)

tum; itaque ut in pede a duo tantummodo habet³. Omnia autem fatis longa funt ': ac primi ordinis longiffima⁴; fecundi aliquantum breviora⁵, tertii rurfus breviora⁶; quod & ad pollicem pertinet⁷, nifi quod ejus primum os non aeque multum excedat ultimum⁷. Denique extrema utrimque capita his tantummodo paullum fupra truncos tument¹: totaque offa ex craffis, quo magis deorfum procedunt, graciliora¹.

3 Ibid. B. C. 4 Ibid. D. 5 Ibid. E. 6 Ibid. F.	
7 Ibid. B.C.	And the second

327. Jam & primi ordinis offa in verticem finuantur '; iisque finibus, laevem cartilagineam crustam obductis, revem cartilagineam crustam obductis, re-vem cartilagineam crustam obductis, re-vem capita ², articulis, ^{323.} quos etiam capsae membranaceae continent, quique in omnem partem flecti posfunt: in manu quidem, primo praecipue

I Vefal. Lib. I. Cap. XXVII. Fig. I. D.

2 Vid. citat. §. 318. 3.

clpue in volam, dein in externum latus, tum quoque infigniter in priorem partem, & in posteriorem : in pollice autem, praesertim in exteriorem partem, minus in volam, minimum in utrumque latus.

328 Atque ex his quoque primum pollicis os duo plerumque SESAMOI-DEA ' habet, ad partem fuam fuperiorem eandemque volam fpectantem religata: fed minora, & ad gibbam capitis inferioris offis metacarpi pollicis partem, quae volam refpicit, admota²; iisque partibus leniter concava³, & cartilagine laevi cruftata. His autem Flexor pollicis brevis inferitur. Eademque tendinem Flexoris longi per medium intervallum fuum tuto procedere finunt: ac porro in reliquis cum iis pedis ^a con-a 245. veniunt.

Nonnunquam & iisdem in manu articulis quaedam quasi sefamoidea natura

Nn 2

Vefal. Lib. 1. Cap. xxv111. Fig. C. D.

² Ibid. Cap. xxv. Fig. 1. & 2. T.

³ Ibid. Cap. XXVIII. Fig. C.

(284)

tura tribuit 4. Raro autem sequentib 324. bus b articulis⁵. 325.

> 4 Ibid. Cap. xxv. Fig. 1. v. v. &c. Eustach. Tab. XLVII. Fig 25. 5 Vefal. 1. c. xx. Euftach. 1. c.

329. Inferioribus primi ordinis offium capitibus ', & superioribus 2 se-cundi ordinis digitorum quatuor, ac pollicis ultimi, caedem figurae funt, a 246. quae & iisdem in pede a; sed perfectio-247. res: (quas autem partes posteriores in pede, hic superiores dicimus; quas superiores, exteriores; quas inferiores, interiores). Ergo etiam articuli3 iidem, eodemque modo firmati, mobilesque.

Pollicis autem primi ordinis os sui capitis inferioris orbitam ab exteriori parte sursum versus productiorem habet : ex quo articulus ille, ossis primi cum ulti-

1 Vefal, Lib. 1. Cap. xxvII. Fig. 2. G. L. H.

In pollice, Ibid. inter B. & C.

³ In digitis, Ibid. Cap. xxv. Fig. 1. & 2. inter E. & D.

ultimo, in exteriora satis infigniter flecti potest.

330. At capitibus inferioribus ¹ fecundi ordinis offium, digitorum quatuor, eadem figura, quae inferioribus primi ordinis in manu^a: & fuperioribus² tertii ordi-^a 329. nis, eadem, quae & fuperioribus fecundi ordinis in manu^a. Eaque de cauffa articuli³ quoque toti iidem; fed minores.

1 Vefal. Lib. 1. Cap. xxv11. Fig. 3. N. caput inferius.

2 Ibid. O. caput.

3 Ibid. Cap. xxv. Fig. 1. & 2. inter E. & F.

331. Quas ob res etiam his digitis totis ad metacarpum certa mobilitas eft: & quidem praesertim flecti possint in volam; pollex autem minus quam caeteri: deinde in diversum, 1d eft, ex propinquis infigniter alii ab aliis abduci; ac rursus adduci; excepto pollice: denique modice in partem, quae volae opponitur; at pollex fere infignius. Tum vero, ut in pede a, ipsi & recti effe queunt, a 250. & aequabiliter involam fe curvare.

Nn 3

332.

332. Omnia quoque digitorum offa extrinsecus aequabilia funt, & ex transverfo quasi 'teretia; ex interiori parte lata & planiora²; totaque in interiorem partem incurva³; ad eosdem, atque in pea 251. de ^a, usus. Quorum itidem ad similitudinem tertii ordinis ossa priorem partem habent latiorem, per ambitum quasi ovatam, & in internam partem inacquabiliter protuberantem.

> Infertiones denique praestant musculis. Primi ordinis digitorum quatuor, capitibus suis superioribus, utrimque Interofleis, sicut in pede a: pollicis primum, Abductori fuo, & uno de Adductoribus, atque etiam Extensori: indicis primum, Abductori suo: auricularis primum, Flexori suo. Secundi ordinis, capitum superiorum interiori parte, Flexori sublimi: exteriori, Extenfori communi; ac praeterea indicis, Extensori proprio suo. Tertii ordinis digitorum quatuor, capitum superiorum exte-

3 Ibid. Fig. 1. & 2.

I Vefal. Lib. 1. Cap. xxv. Fig. 2.

² Ibid. Fig. 1.

(287)

exteriori parte, Interoffeis cum Lumbricalibus; eminentia aspera, quam in media interiore parte habent, Flexori profundo: eodemque modo pollicis ultimi offis caput superius, sua exteriore parte, Extensori suo; ac media interiore eminente aspera parte, Flexori longo suo. Ad haec primi & secundi ordinis offibus margo uterque, ex interiori parte, inaequabilis est, & asperiusculus, ad firmanda ligamenta, quae tendinibus Flexorum orbiculatim obducuntur.

333. Manus natura extremis cubitis affixit ad apprehendendum; & quidem multiplici ratione. Ob id a cubito ftriĉtiore paullatim carpus, & deinde metacarpus, se pandunt in latum. Ac metacarpi quatuor longissima osfa, quae proprie ad manum pertinent, simul faciunt unam amplam, planiorem, leniter in interiora concavam partem: eamque, ut stabilis sit, & sustinere queat comprehensa, per longitudinem suam rigentem: utque simul ex planiore concava fieri possit, ac comprehendendis accom-

commodari, per transversum obsequentem, maxime qua parte latissima est, id est, prope digitos; atque ibi etiam praesertim ad posticam manus partem. Haec deinde pars digitis quatuor augetur; qui proprie apprehendunt. Igitur oblongi, atque in interiorem partem modice incurvi, & extendi possunt, id est, quasi aperiri; & ex rectis in interiorem partem per varios gradus curvari, donec fuis extremis extremum contingant metacarpum. Quam ob rem non ex uno offe rigidi sunt, sed ex pluribus flexiles: & quidem in internam partem; fed, neque in externam, neque in latera, ut plus firmamenti ac roboris habeant. Eademque de caussa ex paucis osfibus constant. Ex ternis autem; ut, quamvis ex oblongis rigidisque offibus fint, tamen aequabiliter quasi in arcum se curvare, & apprehendenda multiformiter circumplicare queant. Et ut extremis suis commode firmiterque, etiam parva corpuscula, apprehendere, & pertinaciter retinere possint, prima ossa sua longissima habent, secunda breviora, ter-

(288)

tertia brevissima : quocirca & ex crassis paullatim gracilescunt, & in parvum rotundumque desinunt. Toti autem ad metacarpum mobiles: primo infigniter ac praecipue in volam; quo in eam flecti queant, ac sic volae, ipsi primo recti, dein paullatim incurvati, obviam ire; donec vel ampla curvatura facta, suis extremis pertingant fere ad principium metacarpi; vel per varios gradus magis incurvati, ad quamcunque cavae volae partem; ad manum per varios gradus, & diversimode claudendam : tum deinde modice in exteriorem partem, ad explicandam eandem, infigniterque ape-Discreti praeterea, ut vel oriendam. mnibus fimul, vel uno, vel aliquibus, multipliciter uti possimus. Denique in utrumque latus ad metacarpum mobiles; maxime si recti cum metacarpo; eo minus, quo magis flexi: itaque diduci possunt, & a metacarpo paullatim in latum expandi, explicata manu. Et directo quidem ordine alii aliis adstant, rectaque in volam se curvant, cum vola planior. At eadem per transversum juxta digitos con-00 cava,

(290)

cava, ipsi digiti adducti modiceque flexi, unum cum ea veluti cavum formant: diducti autem in semiorbem ponuntur, ac maxime tertius quartusque pollicem versus se convertunt; tunc vero se curvantes, suis extremis paullatim coëunt: in volam autem omnes simul, nisi recte, curvari nequeunt. Huic manui parva quaedam manus adjutrix data est, cui pollicis nomen. Itaque majori manui in universum quidem similis, sed multo brevior, e fingulis, & ob id valentibus, offibus constat. Ac pollex totus suo principio cum carpo mobili committitur junctura; ut a manu abduci, ad eandem adduci, eidemque opponi plurimis modis queat. Ponitur autem a latere, ut cum reliqua manu explicatus, palmam amplam planioremque efficere possit: rursumque in interiora surgens, cum posteriore volae parte, similiter surgente, cavam volam. Et quidem merito juxta indicem, id est, praecipuam, stabiliorem, majoremque manus partem. Atque juxta ejusdem interiorem partem, ut totus in volam flecti, & volae, caeterisque di-

digitis opponi possit. Itaque & in volam, caeterosque digitos versus se curvat. Ejus autem discreta pars ad suum metacarpum maxime in exteriorem partem, id est, a reliquis digitis flectitur, ad totam manum maxime aperiendam: minus in interiorem, quoniam caeteris digitis tantum necesse habet occurrere: vix in utramque partem, ad majus robur, & quia fingularis, totusque pollex ad carpum latis in eas partes mobilis. Quapropter manu & pollice ex contrariis partibus apprehendimus. Nam & pollicis metacarpus reliquae volae occurrere, & totus pollex digitique quatuor invicem obviam ire poffunt. Atque ut digiti quatuor in volam flexi, eidem suis extremis occurrunt; sic pollicem versus flexi, cum ejusdem extremo, ob id lato & valente, coëunt. Et cum digiti discreti sint, vel unus ex iis, atque is quicunque, vel plures, vel omnes fimul cum pollice conveniunt. Quin & cavata vola, & digitis polliceque in orbem diductis, & ad se invicem ex omni parte incurvatis, comprehendimus undique 002 fir-

(292)

firmiterque. Porro ut digiti cum polli-ce magnum quid complecti possint, longi funt : sed non nimis, ne infirmi. At quatuor juxta se positi longissimi sunt, ut cum vola comprehendere possint. Pollex autem cum solus sit, & eum versus inprimis digiti curventur, ipse brevior est, crassior, ac sic valentior : ex ossibus praeterea duobus; quod non aeque multum, ac reliqui, in arcum curvatur. Itaque extremus quisque digitorum cum extremo pollice velut in orbiculum coire potest. Jamque pollicis ultimum os portione longius est, & ad primum in exteriora modice flecti potest; ut digitis pollicem versus curvatis, ipse extremus pollex contrario modo quodammodo incurvatus, tota interiore extrema sui parte cum digitis convenire, eosdemque late contingere possit. Quin & ipsi extremi digiti, ut cum pollice melius convenire possint, in exteriora nonnihil curvari queunt. Ea insuper singulorum digitorum, pollicisque longitudo est, ut in orbem diducti, suis simul extremis in unius quasi circuli ambitum coire posfint:

fint : eumque, dum ad se invicem aequabiliter curvantur, paullatim minorem, donec ipsis extremis suis conveniant : ex quo apti sunt, ad rotunda corpora aequabiliter circumplectenda. Ac secundus digitus longissimus est & valentissimus: itaque cum pollice eximiam vim habet. Hunc unus ab utraque parte juvat: utrique breviores, debiliores, & fere similes inter se. Tertius denique minimum adjutorem accepit. Ob quam rem etiam simul in volam ita flecti queunt, ut parvus digitus medium spatium fere nullum relinquat: inde reliqui usque ad pollicem, fere paullatim majus: cui denique pollex quoddam quasi operculum est. Ergo ex his omnibus manus aptislimae factae sunt ad contrectanda, apprehendenda, comprehendenda, retinenda, magna, parva, minima, solida, fluida, rotunda, recta, cava, quadrata, angulosa, figuras denique omnes; multiplicibus variisque modis: & quidem vola & uno, coque quocunque, ex digitis, vel pluribus, vel omnibus fimul: rurfum iisdem modis, pollice digitisque extremis; 003 tum

tum tota manu; maxima & inexplicabili varietate. Quinetiam ad innumeras res alias idoneae funt. Et cum prior pars corporis potior fit posteriore, praecipua quoque manuum pars, id est, medius, index, ac pollex, a priori parte posita.

334. Illae autem manus, cum praelongis brachiis affixae fint, & per eadem illa brachia cum trunco corporis cohaereant, infigniter protendi possunt. Ea vero brachiorum longitudo, ut manus ad quamcunque corporis partem admoveri possint, ad ipsos, si sublati fuerint, extremos pedes; ad terram praeterea, deorsum incurvato corpore. Et ut eaedem in omnem partem libere transferri possint, brachiorum cum scapulis articuli quoquoversus mobiles sunt: utque mobilitas ista liberior sit, ipsae brachia sustinentes scapulae obsequuntur. Brachia porro, similiter ac pedum colua 253. mnae a, ex paucis, rectis, & valentibus osfibus constant, ad majorem firmitatem: fimiliter quoque fere media divisa, ut se curvare, & ut poscit necessitas, accommodare possint. Atque ad se invicem fele

sese flectunt; ut manus manum juvare queat, ut brachia ad amplexus, ut manus ad corpus nostrum contrectandum, atque ad innumera alia praestanda apta fint. Sunt autem stabiliora, quod praeterquam in internam partem, flecti nequeunt. Jamque mira ipfis manibus agilitas est, eo quod ad extremos cubitos totae in omnem partem flecti queunt. Eaedem totae converti possunt: & quidem vel totius ad scapulam brachii converfione; vel folius circum ulnam radii, cui ob id praesertim manus adjuncta; vel denique utriusque simul; per varios gradus, multiplicibus modis. Quo fit, ut concavam manus alterutrius partem ad quamcunque corporis partem admovere possimus, atque ad innumerabilia alia utrasque recte adhibere. Adjuvat autem brachium brachium, manus manum.

V.

(296)

V. DE OSSE HYOIDE.

335. IN fummo praeterea gutture, inter linguam laryngemque, os' aliquod repositum est; idque parvum, bicorne, pensile, leve, totum mobile; HYOIDES nominant.

1 Vefal. Lib. 1. Cap. XIII. Fig. 1. & 2. Eustach. Tab. XLVII. Fig. 14. & 15. Palfyn. de offib. Tab. 1. Fig. 5.

336. Plerumque autem ex partibus quinque constat. Prima basis 'est: pars media; eaque oblonga, lata, incurva, a priori ² parte tota gibba, a posteriori ³ concava. Ab utroque basis latere cornu⁴ procedit: haec longiora, tenuiora, tota strictiora, atque ex latis paullatim, quo magis a basi procedunt, angustiora, donec in extremum tumidulum

4 Ibid. Fig. 1. & 2. E. F.

¹ Vefal. Lib. 1. Cap. XIII. Fig. 1. A. B. C. & Fig. 2. D.

² Ibid. Fig. 1.

³ Ibid. Fig. 2.

lum 5 definant; totaque a basi modice divergunt. 1psi cornu utriusque cum basi juncturae, a parte eadem & priori & superiori, adfidet officulum graniforme6, oblongum, tumidulum. Ac cornua ad basem7, ad cornua vero basemque ossicula graniformia, per ligamenta alligata, obsequuntur : saepe tamen cornua cum basi, vel utraque, vel alterutrum, ac sic quoque osficula graniformia, in unum abeunt. Jam vero basis in gutture prior est 8: ab ea cornua per latera retrorfum tendunt 9. Totumque os liberum, nec contingens aliud, sed partibus mollibus innexum, ad caput quasi religatur, per ligamenta 1º praelonga, gracilia, quae ab officulis graniformibus ad styliformes a ossium remporum a 29. processus pertinent, quaeque saepe, atque

5 Ibid. Fig. 1. H. 6 Euftach. Tab. XLVII. Fig. 14. 16¹ \div 23¹ Palfyn. de off. Tab. 1. Fig. 5. e. e. 7 Vefal. 1. c. Fig. 1. & 2. Q. 8 Euftach. Tab. XLI. Fig. 8. 38 \div 47. & fic quo-

que Fig. 11.

9 Ibid. 40 - 47.

10 Palfyn, l. cit. f.f.

Pp

(298)

que varie in os abeunt ": religatur & ad apices processium superiorum cartilaginis thyroideae, ligamentis gracilibus, brevibusque, quae ab extremis cornubus ad dictos processus procedunt.

11 Vefal. 1. c. Fig. 1. K. L. M. N. Eustach. Tab-XLVII. Fig. 14. & 15.

337. Eft vero fundamentum firmum, idemque mobile, linguae, cujus radix basi ejus affixa: multis praeterea musculis, qui linguam, cartilaginem thyroidem, pharyngem, ipsumque hoc os movent; Geniogloss, Basiogloss, Ceratogloss, Hyothyroideis, Basiogloss, Ceratogloss, Hyothyroideis, Hyopharyngeis, Myloyoideis, Genioyoideis, Sternoyoideis, Coracoyoideis, Styloyoideis. Ab his autem omnibus diversimode fingitur.

III. DE SCELETO FOEMININO PERFECTO.

338. SCELETUS FOEMININUS in universum virili similis. Sed non totus toti : namque infirmior fere est,

(299)

est, & nescio quid foeminini habet, difficilis ad explicandum.

Cafp. Bauhin. Vivae imag. Lib. Iv. offium Tab.Iv.

339. Maxime autem ad coxas a virili discrepat. Foeminino enim os sacrum latius, & inferiori parte sua non acque in priora incurvatum, sed totum per longitudinem rectius; atque etiam in coccygem rectiorem, & magis obsequentem definens. Eidem & coxarum ossa ampliora, & ab osse sacro ampliore curvatura ad pubem coeuntia, ibidemque cartilagine fere craffiore connexa. Ad haec ischia magis in fuum quaeque latus extrorium tendunt; suis praetertim tuberibus. Quocirca illa quoque osla, quae ab imis ischiis ad pubis offa fe invicem versus procedunt, in rectiorem angulum quasi conveniunt; tota suis prioribus marginibus in exteriora magis versa. Ob quas res pelvis amplior; eademque & ampliore hiatu deorsum patet, & a priori parte, sub pubis oslium commissura hiatum habet patentiorem: quin Pp 2

(300)

quin & ima abdominis pars amplior. Deinde ilium offa pariter ampliora, internis partibus magis cava 1, & magis quasi resupinata : quo sit, ut imum abdomen longe adhuc amplius fit. Itaque totum illud trunci fundamentum portione corporis multo majus est. Quapropter femora a superiori parte magis divaricata: atque a coxis magis oblique ad se invicem procedunt. Eisdem, ut coxas melius sustentent, simulque a superiori parte longius disjuncta fint, cervices plerumque magis transversae, & cum trunco angulum rectiorem facien-Quibus omnibus ad ea, quae praetes. ter virum praecipua praestare foemina debet, aptissimus factus est : nam propter ea foemina & virum melius admittit, & foetum continet gestatque, eundemque commode enititur.

I Spigel. Lib. VIII. Tab. XVIII. f. f.

340. Discrepat etiam thorace; qui fere angustior, & a priori parte depressior: qua de caussa & claviculae rectiores.

(301)

DE

DENTIBUS.

S.I. N foffulis ^a, quas extre-a De mus utriusque maxillae ^{off 76.} margo habet, DENTES¹, finguli in fingulis, altis defixi funt² radicibus. Hi duriores offe, folidioresque, toti ex materie plane fingulari, ipfisque propria conftant.

I Vefal. Lib. I. Cap. XI. A. A. B. B. Euftach. Tab. XLVII. Fig. 10. & 11.

2 Vefal. 1. c. Cap. vi. Fig. 3. 5. Cap. 1x. Fig. 1. Cap. x. Fig. 1. & 2.

2. Omnibus corona ': quae extra eminet,

I Vefal. Lib. 1. Cap. XI. 1.2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. & fic in inferioribus quoque. Eustach. Tab. XLVII. Fig. 10. 23 -151 & fic Fig. 12.

Pp 3

minet, pendetve²; nuda, candida, perpolita, nitens, ac duriffimo folidisfimoque cortice obducta. Omnibus & radix³: his fingularis; illis binae, ternae, quaternae: atque hae in maxillis inclufae, & tanquam in vaginis reconditae latent²; ipiae impolitae, neque ita nitentes, nec crufta aeque folida opertae.

2 Vid. citat. 9. 1. 2.

3 Vefal. 1. c. fupra 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. & fic quoque in inferioribus. Eustach. 1. c. Fig. 10. 23 - 14. &c. & fic Fig. 12.

3. Dentes utrique maxillae fexdecim : eorundemque tria genera, Incifores ', quaterni primi; tum Canini ², unus utrim-

Dextri lateris,

I Maxillae sup. Vefal. Lib. 1. Cap.XI. 1. 2. Eustach. Tab. XLVII. Fig. 10. 23 - 15. & 22 - 15.

infer. Vel. 1. c. fub 1. 2. Eust. 1. c. Fig. 12.39 1 -14.

2 Max. Sup. Vefal. 1. c. 3. Euftach. 1. c. Fig. 10. 201 - 15.

inf. Vefal. 1. c. fub 3. Eustach. 1. c. Fig. 12. 37¹ - 14. trimque ad inciforum ordinem adstans; ultra quos ab utraque parte Molares 3 quinque sunt; quorum ex omni parte postremi, vel aliqui, vel omnes, saepe non prodeuntes, varium efficiunt dentium numerum.

3 Max. sup. Vefal. 1. c. 4. s. 6. 7. 8. Eustach. 1. c. Fig. 10. qui supersunt. inf. Ves. 1. c. sub 4. s. 6. 7. 8. Eust. 1. c. Fig. 12. qui

fuperfunt.

4. Ex his incifores coronam habent minus quam caeteri infignem, oblongam, & ex crassa radice in utrumque latus paullatim latescentem, ac simul exacutam, definentemque in oblongam rectioremque aciem; totam praeterea in posteriora quasi recurvatam, a priori parte modice gibbam, a posteriori infigniter fimam : superiores autem latiorem, amplioremque, quam inferiores; & qui superiorum medii, amplissimam: inferiorum extremi fere infigniorem, quam medii. Caninis corona infignior, magis tumens, procerior, & ex crassa radice fere in extremum angufius

(304)

stius migrans, similiterque a priori parte gibba, a posteriori leniter sima. Rursus magis quam caninorum tumet Molarium corona, & ex crassa radice usque ad extremum magis magisque intumescit, per ambitum majori ex parte gibba, abeunsque in superficiem amplam, planiorem, mediam fere inaequabiliter sinuatam, ad orae suae ambitum inaequabiliter eminentem, asperamque: horum vero duobus ex omni parte primis corona minor, fere caninis cedens, extrema parte quodammodo teres : his proximis duobus major; at tertio maxima; postremo magnitudine media: ad haec primi molaris corona brevior, quam proximi canini; atque inde etiam reliquorum molarium coronae fere paullatim breviores.

5. Radices, Inciforibus quidem fimplices, fatis magnae, oblongae, rectae, tenues, latae, & contrario coronis modo utrimque compressae, ad extremumque in acutum migrantes. Caninis fimiliter fingulae, fimilesque inciforum; fed crassiones, & proceritate caeterorum

rum dentium omnium radices superantes; eaedemque a priori parte, quam a posteriori crassiores: caninis autem superioribus & longiores, & acutiores. At Molaribus variis datae sunt modis. Singulares fere, satisque crassae, primis in inferiori maxilla : in superiori autem, modo singulae, modo binae; eaeque vel vicinae, vel disjunctae; aliquando etiam tres. Secundis utriusque maxillae, plerumque singulae. Sed tertiis maxillae inferioris plerumque duae, latae, procerae, utrimque compressae, disjunctae, quasi parallelae; raro tres: superioris, tres, fere aequales, teretes, crassae, maxime disjun-Stae; plerumque autem illarum duae ad priorem partem sunt, eaeque propinquiores; tertia introrsum longius abscedit. Quandoque & contrario modo Superior duas, inferior tres habet. Quartis quintisque utriusque maxillae proximorum fere similes; sed breviores, & exiliores, rectioresque, ac minus discretae : utrisque saepe, maxime quintis, radices quatuor, accedente exigua quafi Qq

(306)

quasi radicula. Et molarium radicibus inprimis ludit natura. His magnas tribuit, illis parvas : aliis proceras, aliis breves; alus crassas & quasi teretes, aliis tenues & planas, aliis angustas, aliis latas. Dat acutas aliis, aliis obtufas, aliis ad extremum tumentes. Plerisque rectas, aliis incurvas, plurimis modis; modice a summo in alterutram partem inflexas, dupliciter flexas, contortas, aduncas, ad extremum hamatas. Et haec quidem vel fingularibus, vel fingulis plures habentium. Quibus geminae, iis vel rectae, & quafi parallelae, vel utraeque in eandem partem, maxime in latera, magis minusve flexae : jamque aliorum se tangunt, aliorum modice disjunctae sunt, aliorum ad se invicem incurvatae, saepe extremis suis coëunt: nonnullis, quo magis procedunt, eo magis in diversum curvantur: sunt quibus una radix recta, altera incurva : vel & utraeque diversimode incurvae. Tres radices habentibus eaedem radicum diversitates : duae autem plerumque minores; tertia ab his recedens,

(307)

dens, major. Nonnullis, quibus duae, aut plures, in unam, vel duas quasi confluunt; easque vel aequabilis superficiei, vel in uno, aut in pluribus lateribus, plus minusve quasi indicatas, & incili quodammodo distinctas: aliis connatae funt, aliis disjunctae quidem, sed media squama connexae, aliis mucro ramosus, & in duas tresve fiss. Atque horum iplorum magnae sunt diversitates. Quaedam plura ex dictis habent. Omnes suis in maxillis fossulis ex omni parte adamussim conveniunt, atque ita infixae sunt, membranisque ambientibus, & praesertim gingivis firmatae, ut dentes toti plane immobiles sint, & quasi maxillarum partes.

6. Dextri porro dentes sinistris, itemque superiores subjectis, etsi non toti totis, in universum tamen similes sunt. Continui praeterea utriusque maxillae omnes : itaque constructi, ut simul suis extremis partibus inaequabilem scabrumque faciant marginem; talem autem, ut, cum maxillam inferiorem ad superiorem adducimus, utrique margines illiaequabili-Qq 2

ter

ter coeant, atque in universum incisories res incisoribus, canini caninis, molares molaribus occurrant; & cum eadem maxilla ad superiorem, quantum potest, commodeque adducta est, inferior dentium ordo per superiorem quasi recipiatur, id est, superiores dentes a priori inferiorum parte nonnihil demittantur; maxime quidem incisores, minus canini, & ab his paullatim minus minusque priores molarium partes, donec postremi fere directo conveniant.

7. His igitur dentibus cum adversi maxillarum margines instructi sint, atque inferior ad superiorem stabilem firmamque diversimode mobilis sit, utraeque ad mordendum, retinendum, mandendumque aptissimae factae sunt. Sigillatim vero *incisoribus* apprehendimus stecamusque: qua de caussa in priori parte maxillarum infixi sunt, proxime oris aperturam. *Caninis* valide retinemus: ob id incisoribus adjutores dati, altiusque defixi. *Molaribus* confringimus, conficimus, conterimus, extenuamus, mollimus: itaque plures sunt, & opportu-

'(309)

tuniflime in lateribus maxillarum, atque in intima oris parte collocati : & cum mediis inprimis commode utamur, iidem quoque maximi, & prae caeteris fixi. Atque universe ad hosusus singulorum dentium, & magnitudo, & figura, & stabilitas, & positio, maxime accommodata est. Adhaec dentium coronac maximum oris ornamentum sunt: earundemque priores moderantur pronunciationem.

FINIS.



Qq 3

EMENDANDA.

In praef. p. 4. lin. 14. pro eorundemque l. earundemque.

§. 59. lin. penult, pro quarti, 1. quinti.

§. 79. 87. 184. pro quodvis l. quodque. §.93.97. 103. quodque eorum.

§. 106. in citat. n.º 2. pro z l. x.

§. 119. lin. penult. post asperoque, adde, & cartilagine quadam crustato.

§. 123. lin. 3. pro quintam 1. fextam.

§ 266 dele Sternothyroideis.

§ 318. ubi scriptum secundum, 1. primum : ubi tertium, secundum : ubi quartum, tertium : ubi quintum, quartum.

Perpauca alia, quae irrepserunt, cum leviora fint, non morabuntur Lectorem.







