

**M0001429: Reproduction of the first page of a handwritten manuscript of "Razon de las siete especies de Quina" by Hipólito Ruiz López**

**Publication/Creation**

21 November 1930

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/a9zcdmdx>

**License and attribution**

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>

(32)

Nacion de las Especies de Canchillos q. se hallan en las montañas  
de las Panataguan Provincia vecina à la de Apanuco, todas Especies  
~~entre ellas de las mismas~~ <sup>cinchona</sup> ~~son de un mismo genero aunque muy diferentes~~  
Especies J. Canchillo fina. o Juana superior.  
como guembrillo

Es la Arbores de un Arbol ~~bastante alto~~, de cuya raíz sale uno, dos, tres  
o mas Troncos, <sup>que se elevan de diez a quince varas</sup> ~~forma~~ esta Corteza de tres las propiedades, que debe tener  
una selecta Quina o Cascarilla; como son, El Embier o Color externo  
es interno, <sup>superficie</sup> olor, sabor, consistencia, grosor, encanutamiento, quie-  
bro, y parte gomoso-resinosa. El embier, es de un pardo obscuro casi  
negro, variegado de manchas pardas, y blanquizar con la superfi-  
cie escabrosa o aspera. El Color interno, es rojo mas subido que el  
de la Canela. El Olor agradable algun tanto aromatico. El Sabor  
bastante amargo, acido-astringente nada fastidioso respecto al  
genero. El peso grave. La Consistencia fuerte. El grosor de la  
carnosidad poco mas que una linea; y de la caña o Canubillo  
gerando mucho de pulgada y media en circunferencia basando  
tra el grueso de una pluma de ceciwir. El Encanutamiento ge-  
neralmente se loja mui bueno en esta Especie. El Quiebro es  
mui superior; pues de sa a veres mui cortas las barbillas, y algu-  
nas no se manifiestan. El succo gomoso-resinoso condensado en-  
tre epidermis exterior y carnosidad es bien abundante, y por es-  
to el quiebro bueno.

Se halla esta Especie con abundancia por las Montañas de los Panatahuas por los sitios de Cuchero, Casape, Casapillo, Cayumba, Chacahuani, Muña, Panao, Pampamarca, Pillao, Acomayo, y Sapani y por los montes de las Provincias de los Otumalies, Tarma y Tausa.

Es la misma Especie que la de dowa, y mas estimada en el Comercio que todas las siguientes.

Especie} 2.<sup>a</sup> Cacarilla fina de los altos de Pillao.

Es la *Cortezia* de un árbol el mas pequeño y delgado de todas las especies aqui infestas, como q. no se eleva arriba de cinco varas, y lleva un solo tronco, quando mas del grosor de ocho pulgadas en circunferencia. Sus *Cortezas* salen muy delgadas no exco-