

**M0001425: Reproduction of page 1 of a handwritten manuscript of  
"Causas por que las Calenturas intermitentes no cortandose en los  
primeros accessos pasan à malignas y contagiosas" by Hipólito Ruiz López**

**Publication/Creation**

21 November 1930

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/j3pfxd93>

**License and attribution**

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>

Causes por que las Calenturas intermitentes no cortan.  
Dose en los primeros accesos pasan a malignas y contagiadas.

Uno de los remedios mas eficaz y seguro, entre los que reconoce la iusticia, para cortar en los primeros accesos las calenturas intermitentes, es la buena Quina. Con muchas de las Especies de Quina, que giran en el comercio, es moralmente imposible cortarlas, por la debilidad de sus virtudes.

La mala reposicion y mal estado de algunas Quinas, y las infinitas mezclas que hacen los tratantes de todas ellas ó de las mas imposibilitan la curacion de las calenturas intermitentes. Para que cada especie de Quina, aunque sea de las superiores, obre con la debida eficacia propia su naturaleza ha de estar bien repuesta, profusamente concavada y sutilmente pulverizada. Faltando alguno de estos requisitos no es de extrañar que veces no correspondan los efectos con la eficacia de sus virtudes.

El saber la cantidad de Quina que ha de darse al paciente en cada toma, es de suma importancia para cortar las calenturas intermitentes. Los mas de los facultativos dividen la onza de Quina en ocho tomas y manda que cada una de esa se administre ~~de~~ tres en tres horas interpolando tazas de caldo y aun otros varios alimentos que impiden tal vez ó a lo menos retardan los buenos efectos que se prometen de la Quina. Otros Profesores suelen dividir la onza de Quina en seis partes, y finalmente hay algunos que la dispensan en cuatro tomas.

Todos los Profesores deben saber que hay muchos casos en los quales la mejor Quina debe subministrarse en cantidad de tres ó mas drachmas; especialmente quando