

Novae quaedam observationes circa structuram vasorum in placenta humana, etc / [August Christian von Reuss].

Contributors

Reuss, August Christian von, 1756-1824.

Publication/Creation

Tubingae : J.F. Heerbrandt, 1784.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/bguuu6tg>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

ps

Amphibian Leveling observations and.

various to 9320

1. 1st + 1st
II. 5 in

45733 18

J XXX C
18

D. AUGUST CHRISTIAN REUSS

REVERENDISSIMI AC CELSISSIMI PRINCIPIS EPISCOPI SPIRENSIS A CONSILIO
INTIMIS ET ARCHIATER, SOCIETATIS MEDICAE HAUNIENSIS,
SOC. REGIAE MED. EDINBURG. SODALIS ET SOCIUS HONOR.

NOVAE QUAEDAM
OBSERVATIONES

CIRCA

STRUCTURAM VASORUM IN PLACENTA HUMANA

ET

PECULIAREM HUIUS CUM UTERO NEXUM.

CUM TABULA AENEA.



TVBINGÆ, APUD JAC. FRID. HEERBRANDT,
MDCCLXXXIV.

D. AUGUST CHRISTIAN REUSS

REV. MAGISTR. V. C. REUSS, DIRECTOR, KÖNIGL. BIBLIOTHEK, KÖLN.
HIERIN ET ABHÄNGIG, SOCIETÄTIS MEDICINAE, BÄNNINGEN,
SOCIETÄTIS MEDICINAE, BÄNNINGEN, SOCIETÄTIS MEDICINAE, BÄNNINGEN.

NOVAE ADAM

OBSERVATIONES

CYCA

STRUCTURAM NASORUM IN FASCIA HUMANA


ET

REGULAREM HUIUS CUM UTERO NEXUM

CUM TABULA ANNAE

J. J. LANGE, A. D. JAC. J. J. LANGE, A. D. JAC. J. J. LANGE, A. D. JAC.





Ista nexum inter prolem atque matrem constituentium va-
 forum sanguiferorum atque membranarum congeries, quae
Placentae Uterinae nomine nuncupatur, adeo peculiari eaque
 mirabili sane conformata est fabricâ, ut solida ipsius, praefer-
 tim *humanae* placentae, peruestigatio maximis atque superato
 difficillimis prematur difficultatibus. Multa tamen omnino
 habemus, tam ex antiquiori, quam ex recentiori aevo, summo-
 rum in arte Virorum, qui certe solerter ac indefesse natu-
 ram scrutati sunt, circa placentae structuram observata & co-
 gitata. Verum adeo non inter se de ea conspirarunt scri-
 ptores, ut potius in diversas abierint partes, diversasque se-
 cuti fuerint in eandem inquirendi methodos. Nec in re adeo
 intricata mirandum, cur alii hanc, alii aliam indagationis
 quaesiverint semitam, vel denique alii hypothefibus tantum



vel praeconceptis quoque opinionibus suam superstruxerint theoriam. Inde etiam factum, ut permulta adhuc, Placentam hominis uterinam, praecipue autem *Vasorum* in ea *sanguiferorum nexum* sanguinisque peculiarem in iisdem circulum spectantia, ulteriori relictâ manserint scrutinio. Ista itaque accuratius perquirere, momento haud carebit, cum ad rectius intelligendam singularem istam rationem, quâ in utero materno suum fetus accipit nutrimentum, praecipuam id conferat symbolam.

Per tempus jam cum de peculiari isto nexu, qui inter placentae humanae vasa obtinet, cogitasset, collatis inter se istis, quae de eo apud scriptores exstant, strenuam ipsius naturae junxi lustrationem et observationem. Inde quoque nata sunt ea, quae nunc cum publico communicare visum est, confectaria ex iisdem observatis ab omni partium studio alienis profecta. A scopo autem proposito haud alienum erit, ex scriptorum circa hoc objectum versantium numero, eos duntaxat testes producere, quorum scripta praecipua appellari omni jure merentur, quatenus vel ad illustranda, vel confirmanda, vel et oppugnanda ipsa mea observata et cogitata faciunt.



SECTIO PRIMA.

§. I.

Eruditorum credo nostro aevo fore neminem, qui non concedat, certum inter matrem atque utero inclusum fetum obtinere commercium a.) ut hinc suum e matre proles trahat nutrimentum, idque teste jam ipso Hippocrate b.) per vasa tantummodo ista placentae ac funiculi umbilico fetus inserti; adeoque nonnisi mera esse commenta, quae circa nutritionem fetus in utero per os c.) vel per totum corpus sive cutis


A 2

poros

a.) *Haller* in *Elem. Physiol.* T. VIII. L. XXIX. §. 32. Ed. Bern. 1766. 4to. pag. 246. sqq.

b.) In ipsius libro *περὶ τροφῆς* VII. 4. & 5. „*Ἀρχὴ τροφῆς καὶ ὕλης καὶ ἔκτλης, στόμα, στόμαχος, κοιλία, ἢ δὲ ἀρχαιοτέρη τροφή, διὰ τοῦ ἐπιγαστρίου, ὀμφαλός.*“

c.) *Democriti Abderitæ* (in libro de carnibus, qui falsò scriptis Hippocratis adnumeratur, uti ex *Galen*i in *Lib. Hipp. de hum. nat. Comment.* I. in fine et II. ab init. et ex *Le Clerc* *Hist. Med.* P. I. L. III. Cap. 30. *Schulze* *Hist. Med.* p. 301. C. G. *Gruner* *Censura librorum Hipp.* Uratisl. 1772. 8. H. *Fischer* *Diff. de Hipp. ejus scriptis eorumque editionibus*, Præf. I. C. *Briegleb* *Coburg.* 1777. 4. p. 15. &c. videre est) sententiam hanc renovare annisi sunt alii, v. c. I. C. de la *Courvee* in *Lib. de Nutritione fetus in utero paradoxa*, P. II. Cap. XI. XII. Dantisci 1655. 4to. p. 130. sq. 137. sq. Guil. *Comper* *Anat. Corp. hum.* Ed. lat. G. *Dundas* *Lugd. bat.* 1739. fol. Tab. 55. *Rommel* in *Ephem. Nat. Cur.* Dec. II. ann. VII. Obs. 209. p.



poros d.), vel denique per hos, funiculum umbilicalem atque os simul e.), hariolati sunt alii. Lis tamen dudum jam inter eruditos agitata est de vera istius, matrem inter atque prolem, commercii ratione, sive de eo, quo *vasa placentae sanguifera jungantur cum istis uterinis, nexu.* f.)

Sen-

393. I. *Gibson* in *medical Essay's and Observations revised and published by a Society in Edinburgh.* 1734. 8vo. Tom. I. Art. 13. I. *F. Kessel* *Diff. foetum in utero mat. liquorem amnii deglutire.* Praef. *G. E. Hamberger* Jenæ 1751. &c.

d.) Ita sensuit primus inter Græcos Anatomicus *Alcmaeon Crotoniates*, vid. *Plutarch.* de *Plac.* *Phil.* V. 16. quod et alii adoprarunt: *Vieussen* *Nov. Vascor. corp. hum. Syst.* p. 24. *Sebelhammer* *Art. Med. Univers.* L. I. Sect. II. Cap. 17. *A. Levret* *l'art des Accouchem.* P. II. C. VI. Sect. I. &c.

e.) *G. Harveus* *Exercit. de Generat. Animal.* Ed. Amstelod. 1651. 12mo. *Exerc. de humoribus uteri* p. 537. *Ex. de Umbilico* p. 551. *Exc.* LVI. p. 363. sq. I. de *Diemerbroeck* *Op. Anat. C. H.* L. I. C. 29. 31. 32. Ed. Genev. 1679. 4to. p. 297. 315. Ed. Ultraj. 1685. fol. p. 177. et 223. sq. I. *F. Müller* *Diff. Genitalium fexus sequioris, ovi, nutritionis, fetus atque nexus inter placentam et uterum brevis historia* Jenæ 1780. §. 8. p. 29. sq.

f.) *Haller* *El. Ph.* T. VIII. L. 29. §. 28. p. 238. sqq. b. *D. G. A. Langguth* *Diff. de Nutritione fetus per solum Umbilicam, resp.* I. *P. Glafer* *Witenberg* 1751. *H. Boerhave* *Prælection. Academ.* Ed. *A. Haller* *Goettingæ* 1744. 8. p. 252. in not. h. plurimi hac de re scriptores antiquiores aequae ac recentiores uberrime recensentur. *Jac. Gregory* *consp. Medicinæ theoreticæ* *Edinburgi* 1780. 8. P. I. §. 731. p. 378. aliique.

Sententiarum autem, quibus a se invicem scriptores discrepant, præcipuæ ad duo potissimum reduci possunt capita g.); ut nimirum alii *canales* inter placentam atque uterum *continuos*, et quidem vel *anastomoses* vasorum placentæ cum istis uteri *immediatas* s. veras, vel *anastomoses mediatas*, vasis nempe uteri arteriosis nexis, ope membranæ cellulosæ, cum venosis placentæ per appositionem vel intrasusceptionem, sicque vice versa, statuunt: alii autem resorberi sanguinem contendunt, idque ita ut sinibus uteri (parenchymatosis) inhæreant orificia vasorum e placenta, quorum alia ex sinibus istis sanguinem maternum hauriant, alia autem uterina ex sinibus placentæ sanguinem regurgitent, in quos arteriosa placentæ vasa foetus sanguinem deposuerunt.


§. II.

Tanta itaque cum sit sententiarum de isto placentæ cum utero nexu diversitas, quæ *nonnisi* ex ipsorum in placenta vasorum et rationis, secundam quam ea inter se junguntur invicem, cognitione haud accurata vel et perversa ortum suum trahit; imo ut et ipsa horum in placenta vasorum structura atque nexus eo facilius et melius intelligi queat; necessarium erit, ut potiora, ad istarum opinionum unamquamque vel firmandam, vel impugnandam, accommodata argumenta breviter nunc perveſtigentur et expendantur.

A 3

A.)

g.) D. W. G. *Ploucquet* Skizze der Lehre von der menschlichen Natur. Tübingen 1782. 8. §. 1085. p. 271.



§. III.

A.) Theoria itaque, quam primo loco hic allegare placet, *Canales* Vasorum sanguiferorum, umbilicalium æque ac uterinorum, per placentam, *continuos* postulat, et quidem

I.) *Immediatum placentæ cum utero nexum*, five *veras* inter utramque partem *vasorum anastomoses* statuit.

Ab hujus sententiæ parte steterunt complures scriptores, de subtiliori Anatomia optime meriti, qui ad stabilendam et confirmandam theoriam hanc præclara allegarunt observata et argumenta, breviter nunc lustranda, junctis postea iis, quæ ab aliis in contrarium sunt prolata.

a.) *Hæmorrhagiâ uterinâ cum extinguerentur matres, foetus* inclusi pariter *sanguine vacui* fuere deprehensi. Talia exempla recensentur a variis scriptoribus fide omnino dignis: v. c. VIEUSSEN a.) HALLER b.) DENYS c.) MERY d.) MALOWIN e.) BONNET f.) HEISTER g.), aliisque.

His

a.) A Vieussen observatum ejusmodi exemplum citat *Merrie* in *Mém. de l'Ac. de Chir.* Paris 1765.

b.) *Elem. Ph.* T. VIII. L. 19. Sect. 3. §. 34. pag. 248. 249.

c.) apud *Trew* *Chylos. fet.* p. 18.

d.) *Hist. de l'Acad. Roy. des Sc.* 1708. p. 45. *Problem.* p. 19.

e.) *Thef. an.* 1724.

f.) *Sepulchret. Anat.* T. III. L. III. Sect. 39. Obs. 1. No. 5.


g.) *Compend. Anat.* T. II. p. 86.

His vero alterà ex parte opponi potest, quod experientia quotidiana, in animalibus necatis, testetur, foetus ut plurimum sanguine plenos imò quandoque vivos in uteris deprehendi, cum mactatæ matres certe hæmorrhagiâ decesserunt, quare nec, uti alii volunt, h.) convulsiones et spastici motus instante morte sanguinis effluxum ex placentæ vasculis, si cum uteri vasis veris anastomosibus necerentur, impedirent, cum eum etiam in minoribus matris vasis plerumque non impediant. Nec desunt quoque ejusmodi inter homines exempla i.) certe non adeo infrequentia. Ipse ante aliquot annos inspexi cadaver gravidæ, ex hæmorrhagiâ uterinâ gravi, orta a sponte soluta parte placentæ, repente mortuæ, antequam obstetricans vocatus præsto esse potuit. In hac femina, brevi post mortem tempore operationi dictæ Cæsareæ subiecta, vasa sanguifera uteri sanguine adeo vacua deprehensa fuerunt, ut totus uterus albicans apparuerit, nec eo dissecto sanguis amplius profluxerit, cum contra vasa placentæ, ipsius funiculi umbilicalis atque mortui foetus septimestris sanguinem sat magna copia continuerint.

En

h.) Müller Diff. cit. Genit. sex. seq. hist. §. XI. p. 34.

i.) I. B. Baltbasar Diff. de Commercio uterum inter et placentam foetusque nutritione. Præf. A. Westphal. Gryphyswaldiæ 4. 1771. §. XII. pag. 25. recenset hoc exemplum: „mulieri cuidam, postquam mēdium graviditatis terminum jam longe superavisset, sclopeto vulnus „fuit inflictum, quo haud ita multo post vita privabatur. Cadavere „cultro anatomico subiecto, foetus naturali sanguinis quantitate repletus, „licet demortua exsanguis erat, inveniebatur.



En itaque ex utraque parte exempla tam exsanguium foetuum, quam sanguine plenorum, cum ipsorum matres hæmorrhagiâ fuere extinctæ. k.) Quænam autem testimonia plus roboris habeant, certe tantum ex structura vasorum in placenta, inferius accurate demonstranda, erit determinandum, quare et lectorem hoc loco ad inferius dicenda ablegare me oportet.

b.) *Injectæ* in vasa matris sanguifera *materiae*, *propulsæ* sunt per placentam *in vasa foetus*, sic quoque ex vasis prolis in vasa matris. HALLERUS complures citat scriptores l.) quibus tales injectiones perficere contigit, et quorum numero addi quoque possunt alii. Ita W. COWPER m.) JAMES DRACKE n.) RAIM. VIEUSSEN o.) VERHEYEN p.) *mercurium vivum* vel

k.) Quamvis multa, tamen non omnia, uti Roedererus putat (in Comm. Goetting T. III. p. 398. in Icon. Uteri Grav. Goetting. 1759. fol. p. 26. et in tract. de vi imaginat. mat. in foetum negata, in ipsius Opusculis medicis Goetting. 1763. 4to. editis T. I. P. I. No. VI. pag. 110. et in Halleri Coll. Diff. Anat. et Physiol. T. VII. P. II. p. 313) ob hæmorrhagiam matris defunctorum et exsanguium foetuum exempla prorsus in dubium vocari possunt.

l.) Elem. Phys. T. VIII. L. 29. Sect. 3. §. 35. p. 250.

m.) Anatomy of human bodies, Oxford 1698. fol. T. 54. Anatom. Corp. hum. Edit. lat. Guil. Dundas. Lugd. Bat. 1739. fol. maj. Explic. ad Tab. 54.

n.) Anthropologia Ed. 3. Lond. 1727. 8vo. Vol. II. Cap. VII. p. 234.

o.) Nov. Vascor. System. Amstelod. 1705. p. 25. sq.

p.) Anat. L. I. Tr. II. Cap. 25. pag. 31. 32. 44.

vel ex arteriis matris hypogastricis in venas transiisse placenta, vel per arterias carotides canis injectum, in membranam alantoideam penetrasse, et per venam umbilicalem catuli profluxisse, testantur. *Air* quoque flatu in hypogastrica vasa matris missus, TURNERO q.) in umbilicalia usque foetus transiit. *Coloratos liquores* atque ceram similem viam transcurrisse testati sunt NOORTWYCK r.) HUMMEL s.) DE GRAAF t.) VOGLI v.) HOELLING x.) aliique. ALBINUS quoque sanguinem, quo in femina gravida defuncta uteri vasa plena fuere, premendo hæc in vascula placenta, utero adhuc adhærentis, sanguine vacua, facile propellere potuit, ut hinc ipse ita intulerit; „itaque dubium non erat, quin (ista vasa in uteri superficie inferiori arteriola) ad placenta pertinerent, sanguinemque in eam deducerent. y.) Nec hoc loco prætermittere fas esset singulare illud experimentum, quo b. MECKELIO Patri, Anatomico accuratissimo aequae ac dexterrimo, cum materiam cereaceam in vasa gravidæ morte extinctæ injecerit, eam in vasa
usque

q.) Force of imagin. conf. p. 141.

r.) Uteri hum. Anatome p. 11.


s.) Apud Stæbelin Thes. Anat. Ed. Diff. Ch. Haller p. 751.

t.) Oper. Amstelod. 8. Cap. XXV. pag. 296. & 327.

v.) Anthropogenie Bonon. 1718. 4to. P. II. p. 162.

x.) Diff. de officio obstetricantium in partu naturali. Argentor. 1738. §. 13. pag. 16.

y.) Annotat. Academ. Leidæ 1754. 4to. L. I. Cap. X. p. 35. Hæc vasa depingere curavit in ipsius Tab. uteri mulier. gravid. Tab. VII, lit. f. g.



usque foetus, utero adhuc inclusi, ita propellere contigit, ut hinc ipsa etiam foetus minima vasa a cerâ colorata fuerint turgescencia, uti ipse *Filius*, Anatomicus æque eximius, Halæ Magd. Anat. Prof. qui hoc ipsum præparatum secum servat, testatur z.) Sic Cel. apud Jenenses Anat. Prof. LODER quoque in thesauro suo Anatomico asservat cotyledones placentæ e vacca gravida desumptas, in quas per arterias uterinas materia ceracea felici successu fuit impulsæ. aa.) Sufficiant autem allegata hæc testimonia virorum, quibus materias injectas ex vasis placentæ propellere obtigit in vasa sanguifera matris, vel ex his in ista vasa placentæ vel foetus ipsius. Videamus nunc quoque ea, quæ ab aliis prolata sunt adversus hæc observata, et quæ cum isto immediato vasorum, per veras anastomoses, nexu, maxime pugnant.

Injectiones, tam mercurii vivi, quam alius liquoris vel materiæ coloratæ et ceracæ, non propelli posse ex vasis placen-

z.) v. *Baudelocque* Anleitung zur Entbindungskunst 1. B. aus d. Franz. übs. von P. F. Meckel Leipzig 1782. 8vo. p. 165. not. z. „Jedermann wird von mir erwarten, daß ich durch meines seel. Vaters „glückliche Einsprizung, wodurch er das Kind von der Mutter ber „angefüllt, und so angefüllt hat, daß auch die kleinsten Gefäße des „selben von rother Materie strozen, davon die voelligste Überzeugung „habe.“

aa.) v. I. F. Müller Diff. Genital. sex. seq. ovi, nutrit. foet. atque nexus inter placenta et uterum histor. Jenæ 1780. §. 11. pag. 35. In F. A. Weiz neuen Auszügen aus Diff. für Wundärzte, XIV. B. No. 12. p. 188. sq.

placentæ in vasa uteri, nec ex his in ea placentæ: multi, iique certe accuratissimi et ab omni partium studio alieni, Anatomici testantur ac obtestantur. bb.)

B 2

Varia

bb.) *Frid. Ruysch* Oper. anatom. medic. chirurg. Amstelodami 4to. Vol. 1-IV. 1737-43. Vol. II. Thesaur. II. Aff. IV. N. 2. n. 4. p. 23. N. 18. n. 1. p. 26. Thes. III. N. 38. p. 21. Th. V. N. 41. N. 57. n. 1. 2. 3. p. 15. Vol. III. Thes. X. N. 58. p. 12.

D. Alex. Monro in Medical Essays of a Society of Physicians at Edinburgh Tom. II. Art. 13. §. 16. Edit. germ. Altenburg. 1750. §. 16 pag. 181. sqq. T. III. Art. 13. p. 326. sqq. Id. Essays of a Soc. phys. and litter. T. I. p. 411.

I. G. Roederer Tab. de utero gravido p. 25. 27. sqq. id. Opusc. medic. Goetting. 1763. 4to. Diss. de vi imaginationis in foetum, pag. 109.


D. Guilielm. Hunter Anatomia uteri gravidi Tabulis illustrata. Birminghamiæ et Londini 1774. fol. reg. ad Tab. XXIV. Fig. 1. 2. not.

H. A. Wrisberg Edit. *Halleri* prim. lin. Physiol. Goetting. 1780. 8. §. 891. p. 488. sq. not. 185. n. 4.

Id. Exper. et Observ. anat. de Utero gravido, tubis, ovariis, et corpore luteo quorundam animalium cum iisdem partibus in homine collatis. Goettingæ 1782. in 4. p. 40.

Id. Observ. de structura ovi et secundinarum humanarum in partu maturo & perfecto collectæ. Goetting. 1783. 4to. §. 21. p. 28. sqq.

Aliique. v. *Halleri* Elem. Phys. T. VII. L. 29. Sect. III. §. 28. p. 239. 240.




Varia ipse quoque et multa hoc scopo in brutis animalibus, foetus uteris inclusos gerentibus, feci pericula; ast ne guttulam quidem, vel mercurii vivi, vel spiritus terebinthinæ colorati aut materiæ ceracæ tenuissimæ, (si quidem nulla vasa fuerant rupta, et liquidum injectum non extravasatum) ex vasis uterinis in ea, quæ placenta partem sic dictam foetalem constituunt, multo minus in umbilicalia, vel ex his in ista uteri vascula penetrasse unquam, armato quoque oculo, observare mihi licuit. Semper enim vel in parte placentæ uterina, vel foetali, (utrâque inferius accurate describenda) solummodo, vasa turgescabant materiâ injecta, cum contra vasa alterius partis istâ vacua deprehenderentur. Diversa quoque hæc vasa in placenta optime oculo sese manifestant, si per vasa uterina materia ceracea injicitur, et hac ratione placenta partis cum utero nexæ vasa replentur; alterius autem placenta dimidii, cujus superficies foetum respicit, vasa, cerâ adhuc vacua, a materia ceracea alio colore tincta et per arterias umbilicales injectâ quoque redduntur plena; nitide tunc apparet, ope ceræ diverso colore imbutæ, omnem in placenta vasorum congeriem, a duplici eoque diverso provenire systemate, nec hæc vasa (præter ramos ejusdem systematis) per veras anastomoses invicem jungi. Amoenum hoc spectaculum fisci potest in hominum cadaveribus non solum, sed et in animalibus, quorum foetus quisque unicam habet placenta propriam, atque hoc respectu habito inter ea atque homines intercedit similitudo,) qualia sunt canes, feles, mures,

res, cuniculi, aliaque, quibus pedes digitati et utrinque dentes cc.) Verum eadem quoque observarunt in cadaveribus feminarum durante graviditate defunctorum, in quorum vasa, uti et in ea foetus, diversimode coloratam materiam injecerunt summi, inter recentiores Anatomici, inter quos certe vix ullus toties felici gavisus est opportunitate, ejusmodi instituendi experimenta, ac in amplissima urbe Londini b. Dr. Guil. HUNTER dd.) et Cel. Dr. LOWDER, in quorum thesauris anatomicis splendidissimis præparata nitidissima, ex istis experimentis nata, satis superque lustrare et pervestigare, nunquam autem in iis veras anastomoses inter vasa uterina atque vasorum foetus umbilicalium productiones, observare mihi licuit. Haud ita pridem in magna Britannia bis iterum similia experimenta in gravidarum mortuarum cadaveribus sunt repetita, quæ prouti in litteris ad me datis sunt commemorata, breviter nunc recensebo. EDINBURGI grvida, æt. 30. ann., habitu maxime difformi, cruribusque adeo inflexis, ut vix ac ne vix quidem a se invicem divari- cari potuerint, et mirum fuerit, quomodo ea a viro im- prægnari potuerit, versus graviditatis terminum, ad par- tum facilitandum, auxilium imploravit obstetricantis *Dris.* SPENCE. Tactu cum difformem hanc feminam difficulter exploravit, diametrum conjugatam pelvis aperturæ supe-
B 3 rioris

cc.) *Aristotel.* gener. anim. L. 11. Cap. 7. *Harveus* l. c. p. 544. *Haller* Elem. Phys. T. VIII. L. 29. Sect. 111. §. 20. p. 224.


dd.) Qui nonnulla quoque talia præparata in splendido suo opere, *Ana- tomia uteri grvidi. Birminghami* 1774. fol. reg. depingere ac æri in- cidere curavit,



rioris nonnisi unum et dimidium pollicem æquare deprehendit. In fatali itaque hac pelvis angustia, instituendæ sectionis cæsareæ auctor fuit, quam vero femina fortiter repudiavit, et mortem certam omni operationi perficiendæ prætulit. Hanc non modo ob causam, sed potius ob vires feminæ mirum in modum jam fractas, graviore ejusmodi operationi sustinendæ non amplius pares, cum præterea nulla spes esset servandæ matris nec a foetûs mutilatione nec ope uncorum extractione, certe ob pelvis tantam angustiam atque crurum inflexionem difficillime et nonnisi longo temporis spatio instituenda, tristi fato reliquit miseram feminam. Postquam ea brevi post animam efflaverat, et nulla certa vitæ foetûs signa fuerant deprehensa, omisit sectionem cæsaream, et satius duxit, experimentum cum cadavere instituere, ad demonstrandum placentæ cum utero nexum suis in Collegio obstetricio auditoribus. Injecit itaque tenuissimam materiam ceraceam rubro et viridi colore tinctam in aortam feminæ atque venam cavam descendentem, omniaque inde vascula uteri, aperto ulterius abdomine, nitidissime cerâ plena apparuerunt, uti et, secto utero, vascula illius partis vel superficiei, quâ cum utero connexa fuit placenta, ast reliqua placentæ vasa, quæ umbilicalium productiones erant, omnia cerâ fuêrunt vacua, statim vero plena, cum per venam umbilicalem cera coerulea fuit injecta. LONDINI quoque, elapso anno, simile repetitum fuit experimentum. Femina adultior, 8vo mense gravida, ebria in flammam cecidit exstructi ignis, quem mox conceperant

rant ipsius vestimenta, ut miserrime inde fuerit exusta. In Nosocomium THOMÆ GAY delata, post paucas horas, fere toto corpore cuticula ab ustione nigra multisque in locis contracta vel divisa, intumuit, deliravit, et quamvis statim congrua remedia fuissent adhibita, tamen mors brevi fuit expectanda. Ad servandam itaque prolem de operatione cæsarea fuit cogitatum, quam vero miseræ feminae maritus prorsus noluit permittere, ut potius, subsecuta post 4. horas morte, defuncti corporis brevi futuram efflagitaverit sepulturam. Antequam vero in sepulchro id fuit conditum, D. KLEIN et Dnus MARTIN abdomen illius aperuerunt, et in aortam ac venam cavam descendentem, materiam tenuissimam ceraceam, diversi coloris, injecerunt; secto dein utero, hujus vascula (similem in modum ac in experimento prius relato) cerâ turgida, et ne guttulam quidem ceræ liquidæ in reliqua placentæ vasa, quæ umbilicalium rami sive productiones fuerant, multo minus in ipsa funiculi umbilicalis et foetus vasa penetrasse, observare potuerunt.

Utrumque experimentum eapropter fusius descripsi, ut clarius pateat, nullum adfuisse obstaculum, quominus in utroque subjecto materia liquida subtilissima ex vasis maternis propelli potuisset in omnia placentæ atque ipsius quoque foetus vasa, si inter hæc et ea matris intercessissent veræ anastomoses atque canales continui. Maxime certe cum vasorum anastomosi pugnant hæc allegata exempla atque testimonia, quibus multa adhuc addi possent




possent alia. Suspicio quoque surgit gravis, iis in casibus, ubi vel mercurius vivus, vel liquores colorati vel et ipsa cera ex vasculis uterinis penetrarunt in ipsa vasa placentæ, observatores ipsa hæc placentæ vasa non satis a se invicem distinxisse. Verum enim est, (uti inferius multis ex rationibus clarius patebit) transire liquidum per vasa matris injectum in certam vasorum placentæ congeriem, quæ placentæ partem utero contiguam constituunt, aut nequaquam inde omnia placentæ vasa, naturali ac communi viâ, liquido injecto replentur, multo autem minus vasa in fune umbilicali ipsiusque foetus. Idem quoque valet de supra allegata ALBINI observatione. Videre id quoque est in brutis animalibus, foetus in utero gerentibus, in quibus vasa cotyledonum (certe partem placentæ constituentium) etiam à materia injecta turgent, quamvis ea non in ipsos ramos vasorum umbilicalium transeat ee.). Nec inferri cum ratione potest, si quoque inter uteri superficiem internam et placentæ partem contiguam vasorum adsunt canales continui, hos ipsos per totam placentam ita continuari oportere. Sed quid proferendum contra eximium illud, superius allegatum, b. MECKELII experimentum, quo materia ceracea injecta in vasa matris, non modo vasa placentæ, sed et ipsa foetus replevit; uti in ipso præparato, quod ipsius *Filius* dignissimus adhuc asservat, mihi que ipsi ante aliquot annos benevole monstravit, adhuc satis videre est. Singularis omnino est casus, qui ipsi b. MECKELIO tantum semel contigit,

ee.) vid. *Alex. Monro*,

tigit, quamvis, uti novi, idem experimentum MECKELIUS Pater atque Filius ff.) pluries in subjectis quoque humanis frustra repetierint. Ast, si nullam quoque materię ceraceę injectę extravasationem inter diversa placen-
tę vasa, ratione peculiaris eventus, culpare volumus, an-
non potuit in istius subjecti placenta praternaturalis quę-
dam vel saltem inconsueta obtinere vasorum anastomosis,
aut sub ipsa cerę liquidę injectione, vasorum utriusque
systematis in placenta, aliqua adeo felix contingere ru-
ptura, ut hinc ex unius generis vasis cera transire po-
tuerit in ista alterius? Certe aliquam singularem et for-
tunatam rationem in isto experimento obtigisse oportet,
aliās enim in tot tantisque aliis, ante et postea factis,
conatibus idem sane accidisset. Inferius autem ex obser-
vationibus, circa peculiarem vasorum in placenta structu-
ram

ff.) Hinc et ipse l. supra pag. 10. cit. ita pergit: „Doch gestehe ich
„mit meinem unsterblichen Lehrer, Dr. Hunter, dass ich große, sehr
„große Zweifel habe, die sich durch eigne Versuche noch vermehrt
„haben. Nicht eher darf ich meines seel. Vaters Ausarbeitungen be-
„kannt machen, bis ich mehr eignen Vorrath an Erfahrung habe, die
„mir bei meiner hiesigen Verfassung wol noch eine Zeitlang fehlen
„koennte. Findet sich die erwünschte Gelegenheit, so hoffe ich auch,
„den Physiologen schon durch Bekanntmachung dessen, was ich hier-
„über besitze, einen Gefallen zu erweisen.“ Quorum observationum
acutissimarum communicationem ne in longum adhuc tempus reservare
velit cel. Auctor, commune omnium melioris notę Physiologorum et
Anatomicorum erit desiderium.



ram institutis, adhuc clarius patebit, *omnia* placentæ vasa materiâ injectâ repleri nequaquam posse, nisi per vasa matris et foetus umbilicalia simul injiciatur tenue liquidum.

- c.) Hæmorrhagia gravis, sive sponte exclusâ sive solutâ placentâ, hacque vel tota vel ipsius tantum frusto: dum vasorum uterinorum oscula hiant, utero scilicet non satis sese contrahente aut in statu atoniæ posito; qualis hæmorrhagia tam in partu maturo, quam in abortu, sæpius accidit. gg.)

Ejusmodi hæmorrhagia, quæ solutam vel ex parte vel totam placentam sequitur, imprimis si placenta vel ad ipsum orificium uteri adhærens vel prope id locata fuit, iterum anastomoses veras inter vasa in placenta atque utero evincere nequit. Eam enim plerumque quædam præcedit violentia, (vel a femine nixibus nimium editis, vel a rudis obstetricis manu, vel alia quacunque ex causa illata) ut hinc ROEDERERUS hh.) in ejusmodi hæmorrhagia semper uteri sinus accuset violatos. Obtingere igitur talis hæmorrhagia posset, quacunque ratione uteri vasa nectuntur cum vasculis placentæ. Præterea, uti CL. BALTHASAR ii.) recte monet, „si sanguinis fluxus ab anastomosi vasorum sublata oriretur, primis graviditatis

gg.) *Müller* Diff. cit. p. 33.

Balthasar Diff. cit. § XI. pag. 23.


hh.) in *Tract. de utero gravido*.

ii.) Diff. c. § XI. pag. 24.

„tis mensibus, sanguis per genitalia in abortu parcus
 „extillaret, copiosior autem flueret naturali partus
 „tempore uteri vasis magis distentis, et majorem san-
 „guinis quantitatem continentibus.“ Verum contra-
 rium potius nos docet experientia, cum in abortu
 (orto vel a quavis illata violentia vel a sola debili-
 tate, firmitatem nexûs inter vasa tollente, ut vaso-
 rum in utero, aliâs sese contrahentium, ostia nunc
 hient,) majus ut plurimum est sanguinis profluvium,
 quam in partu maturo, naturali, simulque facili;
 in quo haud necessariis edendis nixibus nec femina
 fuit excruciatâ, nec placenta rudis obstetricantis manu
 fuit soluta, sed potius omnia, quantum quidem abs-
 que matris ac prolis detrimento licuit, ab ipsis na-
 turæ, ad foetum et secundinas excludendas salutaribus
 moliminibus placide fuere expectata. Nonnisi modi-
 cum plerumque sanguinis profluvium experiuntur plu-
 rimæ istarum parturientium, quæ divulgatæ gravidita-
 tis infamiam timentes, absque obstetricum auxilio,
 partus terminationem et secundinarum solutionem spon-
 taneam solis relinquunt naturæ viribus.

- d.) Firma quandoque, et tunc difficulter solvenda, placenta
 cum uteri pariete interiori connexio vel et concretio,
 quæ obtinere non posset, nisi vasa ex utero ipsa propa-
 gata essent in placentam.

Si in partu maturo hoc accedit, certe inter casus ma-
 gis insuetos atque sic dictos præternaturales id collo-



candum, cum in longe plurimis partibus naturalibus placenta facillime et sponte ab utero sese contrahente separetur. Hinc et hac ipsa facilitate spontaneæ solutionis placentæ, nonnulli scriptores itali tanquam argumento, quod non possit obtinere vasorum eorundem continuïtas inter placentam atque uterum, utuntur.

Si fortior quoque placentæ ad uterum quandoque occurrit adhæsiō, ipsius tamen solutio, si nonnullarum horarum imo et dierum spatium expectatur (nulla nimirum subveniente hæmorrhagiâ graviore), plerumque absque ullo puerperæ detrimento sponte succedit, kk.) Vera placentæ, si obtingit cum utero concretio, certe nec uterus nec placenta in naturali constituta sunt statu, nec ad hunc inde quid inferri licet.

c.) Steriles esse feminas, quæ nondum fluxum menstruum passa sint, atque eas, quibus is vel fixo a natura tempore cessavit vel morbo fuit obstructus. Etenim si nulla vasa adessent continua ac veræ anastomoses inter vasa uteri atque placentæ, sed uteri parieti interiori sese applicaret ovulum per vascula sua libere in uterum germinantia vel huic tantum adhærentia; obtinere id quoque posset

kk) Joh. Melch. Aepi die sichere Zurücklassung der Nachgeburt in bestimmten Fällen mit Gründen und Erfahrungen bewiesen &c. Zürich 1776. 8vo. vid. Weiz N. Auszüge, aus Diff. f. Wundärzte, VII. B, Leipz. 1777. No. 7, p. 173. sq.

posset in qualibet femina, etiam si ea non persolvat lunare tributum.

Admodum omnino lubricum hoc est argumentandi genus. Experimentiâ enim quotidiana notum est, sæpius feminas, quibus variis ex causis menstrua obstruuntur II.), vel quæ durante lactatione ea, uti decet, non experiuntur, tamen concipere et partus edere mm.) Animalia quoque, quibus nulla menstrua fluunt, genus tamen propagant suum.

Cur autem puellæ ante pubertatis tempus, quo menstrua fluere incipiunt, atque Vetulæ, quibus fluxus menstruus prorsus cessavit, non concipiant: rationem, in illis in ovulorum immaturitate, in his autem in ovorum vel obliteratione vel flacciditate, forsitan positam esse solam, non repugnat. Antiquiorum enim ac recentiorum, si credere fas est, observationibus, ovaria certas circa menstrui fluxus in pubescentibus initium æque ac ipsius in vetustioribus cessationem experiri mutationes, constat.

f. Mensium in gravidis fueta suppressio. Sanguis enim ex imprægnato utero, vasis ipsius tunc multo magis turgescitibus, statim tempore profluere posset, nisi is in vasis uteri æque ac placentæ per canales circumiret continuos. nn.)

C 3

Præter

II.) *Astruc* Traité des Maladies des femmes P.I, pag 16. sqq.

mm.) *Balthasar* Diff. cit, §. IX, pag. 21.

nn.) *Müller* Diff. cit, p. 37.



Præter istas autem observationes, haud infrequentes, quod ipso durante graviditatis tempore quandoque feminæ plethoricæ quovis mense menstruum fluxum, et sat largâ quidem copiâ, experiantur, quamvis postea vegetos parturiant infantes: certe ex principiis physiologicis satis patet, sanguinis istam quantitatem, aliâs mensuris excernendam, in ipsa graviditate ad nutriendum in utero foetum esse necessariam, eam autem, uti ex infra allegandis theoriis reliquis clarius fiet, in foetus nutrimentum posse verti, quocunque modo sanguis ex vasis uteri in ea placentæ perveniat.

- g.) Relictâ in utero post partum placentâ, discissoque funiculo umbilicali nec ligato, mater quandoque decedit hæmorrhagiâ per funem umbilicalem. oo.) Patere igitur videtur, sanguinem libere fluere ex vasis uteri arteriolis ope canalium continuorum immediatorumque per vasa placentæ.

Huc revocari possunt ea, quæ supra adversus primum argumentum fuere prolata. Præterea autem, quod mater quandoque decedat hæmorrhagiâ per funiculum umb. non ligatum atque discissum, certe is unus ex rarissimis casibus, et forte nulla per funiculum obtinere potest hæmorrhagia gravior pp.), nisi
in

oo.) *Balthasar* Diff. cit. §. 13.

pp.) *Roederer* Diff. cit. de vi imaginat. p. 109.


in gemellis, qui unâ communi placentâ utuntur (cujus vasa, uti quandoque accidit, verarum anastomosis ope inter se nectuntur;) quæ vero hæmorrhagia non quidem matri, sed potius alteri in utero adhuc relicto foetui lethalis esse potest. Certe nulla extimescenda hæmorrhagia matri nocua, (nisi forsan in casibus prorsus singularibus ac præternaturalibus) si funiculus umb. ea parte, quæ placentam respicit, nulla circumvolvitur ligatura qq), ut potius quam plurimi circa scientiam obstetriciam scriptores hanc ligaturam, ne volumen placentæ vasis sanguine turgescitibus augeatur, rejecerint, eamque prorsus omittere multis in regionibus moris sit.

- h.) Observatum est quandoque, quum de utero placenta fuit remota, sanguinis e placenta pariter ac ex utero fuisse copiosum effluxum, licet nulla violentia fuerit adhibita. rr.)

Contraria hic iterum experientia sat frequens, quod in feminis repentine parturientibus infans neonatus humi procumbat atque placentam secum extrahat, nec tamen per eam hæmorrhagiâ pereat infans. Quoties hoc jam observatum constat in feminis, quibus pelvis iusto amplior fuit, et quæ vel clam vel repen-

qq.) *Bandelocque* l'art des Accouchemens, Paris 1781, 8vo. II. Partie. Chap. IV. pag. 288. *Meckels* Ueberf. p. 271.

rr.) *Haller* Elem. Phys. I. c. p. 249.



repentine absque ullo auxilio partum edidere et funem umbilicalem deligare prorsus neglexerunt? Idem valet de istis casibus, ubi feminæ, nec ruptis nec perforatis membranis, infantes ovo integro adhuc inclusos, cum placenta membranis nexa, absque infantum detrimento, pepererunt; ss.) id quod fieri non potuisset, si sanguis, matris atque foetûs in placenta vasis, tanquam canalibus non interceptis, circuitum absolveret. Nec ipsa quoque deligatio istius funiculi partis, quæ cum foetu adhuc nexa est, omissa semper foetui jam excluso noxia est tt.), ut potius nonnulli eam etiam supervacaneam putent vv.)

i.) Placenta in utero materno relicta per longum tempus ibi remansit, absque putredine xx.), id quod fieri non potuisset, nisi sanguinis liber inter utramque partem adfuerit circuitus yy.).

Certe placenta in utero relicta per tempus, non abibit in statum putrescentem, quamdiu ipsius vascula
novum

ss.) H. A. *Wrisbergii* Obs. Anat. Obstetr. de structura ovi et fecundinarum humanarum in partu maturo et perfecto collectæ. Goettingæ, 4to 1783. pag 8. sqq.

tt.) b. A. G. *Plaz* Progr. de non semper mortifera funiculi umbilicalis intermissa deligatione. Lipsiæ 1774. 4to.

vv.) *Baudelocque* l'art des Acc. l. c. *Meckels* Ueberf. p. 271. coll. not.

xx.) *Aepli* die sichere Zurückl. d. Nachgeb. cit.

yy.) I. F. *Müller* Diff. cit. Genit. sex. seq. &c. hist. p. 36.

novum e matre, ast quocunque id fiat modo, hauriunt sanguinem, quum aliquis omnino a matre in placentam continuetur motus. zz.)

k.) Exempla foetuum corde destitutorum aaa.) qui tamen incrementum assecuti sunt, ostendunt, sanguinem vi cordis materni per placentam in ipsa foetus vasa propelli, id quod contingere non posset, nisi inter prolem atque matrem obtinerent canales vasorum sanguiferorum continui immediati.

In ejusmodi exemplis, certe rarissimis, vel alius canalis amplior bbb.) cordis vices sustinet, vel isto deficiente etiam arteria, vi sua contractili insita, sanguinem in vasa quoque minora propellere et aliquem tamen in foetu sanguinis circulum sistere valebunt; ast gravissime dubitandum, ejusmodi foetus perfectum maturitatis terminum posse assequi. ccc.) Nec omnem sanguinis e matre in placentam motum sub-

zz.) *Haller Elem. Phys. T. VIII. L. 29. S. III. §. 36. p. 252. sq.*

aaa.) *Merry in Memoires de l'Acad. des Sciences 1720. tale exemplum describit.*

bbb.) Pulcherrimum talem foetum vidi Londini in thesauro Anat. Cel. Dr. *Lowder.*, in quo aorta ascendens, loco cordis, cisternæ in formam fuit ampliata. Foetus ipse tertio mense abortu fuit redditus.

ccc.) *Edinburgische Versuche und Wahrnehmungen, Altenburg. II. Th. 1750. Art. 9. p. 176.*



sublatum esse, etiam si non inter utramque vasa sint continua, ex præcedenti videre est argumento. In exemplo supra allegato, a MERRY relato, monstrum illud corde destitutum unus e gemellis fuit, cujus funiculus umbilicalis, uti auctor refert, cum alterius funiculo umbilicali junctus, atque inde sanguinem suum accipere potuit, etiam si nullus ad ipsum sanguinis materni fuerit motus.

Præcipuis his hætenus prolatis argumentis, tam ad evincendam, quam et oppugnandam vasorum tanquam canalium inter placentam atque uterum continuitatem usitatis, subjungam adhuc aliqua observata et argumenta cum istis vasorum anastomosibus veris maxime pugnantis, ast experientiâ satis superque stabilita.

- 1.) Lumina vasorum in placenta, quæ versus uterum diriguntur, adeo exigua sunt, ut, teste quoque ROEDERERO ddd.), ne oleum quidem Terebinthinæ vel alium liquorem in vasa matris injectum transmittant: cum e contrario vasorum uteri orificia, præsertim sub finem graviditatis, adeo ampla sint, ut ipsorum diametri aliquot lineas æquent, vel et digitum intrudere admittant eee.); anastomosis autem nonnisi inter vasa ejusdem diametri fieri constat.

Si

ddd.) in Diss. cit. de vi imaginat. p. 108.

eee.) Rob. Wall. *Johnson* neues System der Entbindungskunst, aus d. Engl. übs. m. Anm. von D. I. Chr. Loder. Leipzig 1782. 8, I. Th. Cap. V, §. 8. p. 40.

2.) Si excluso post partum foetu funiculus umbilicalis non ligatur, sed tota placenta illæsa exclusa est, per aliquot adhuc temporis spatium arteriæ in funiculo atque in ipsa placenta pulsare continuant, nec tamen sanguinem ipsa placenta fundit. fff.)

3.) Pulsationes arteriarum, in funiculo umbilicali prolapsæ vel et in foetu ipso per versionem protracto (antequam funis deligatur) facile percipiendarum, non respondent pulsationibus arteriarum matris ggg.). Etenim si sanguis ex utero in vasa placentæ, et ex foetu in vasa uteri, per canales propelleretur continuos, non interceptos immediosque, nulla ratio esset, cur arteriæ umbilicales non secundum ea temporis pulsarent intervalla, in quibus in corde matris perficitur systole ac diastole; quum, uti in brutis animalibus, dum vivunt sectis, facile sit observandum, etiam minimarum arteriolarum, in quibus motum adhuc percipere licet, pulsationes consentiant cum cordis diastole.


Eadem hæc observatio maxime contrariatur alteri, de vasorum inter uterum atque placentam canalibus continuis quidem, aſt mediatis, sententiæ paullo inferior recensendæ.

D 2

4.) Ma-

fff.) Roederer Diff. cit. de vi imag. p. 108.

ggg.) Roederer ibid. p. 110.



- 4.) Matre jam mortua adhuc durat arteriarum umbilicalium pulsus. hhh.)
- 5.) Animal gravidum radice Rubiæ Tinctorum si nutritur, foetus ossa rubro colore non tinguntur. iii.) Si non per totum, saltem in primis graviditatis temporibus hoc obtingit, ubi sc. nondum verus ac immutatus ex matre in placentam foetus pervenit sanguis.
- 6.) Diversus quoque in embryone sanguinis a sanguine materno habitus est, fluidior nempe atque multo tenuior, per subtilissima scilicet placentæ vasa colatus kkk.)

Mitto alia minoris momenti argumenta, præsertim ea, quæ ex statu præternaturali, v. c. vasorum umbilicalium coecitate, concretis tophaceis superficiem placentæ versus uterum obducentibus, &c. desumpta sunt.

En igitur varia pro et contra canales vasorum placentæ atque uteri, ope verarum anastomosis, continuos, prolata argu-

hhh.) *W. Smellie Treatise on the theory and practice of midwifery. Vol. I. L. L. Cap. II. Sect. IX. Edit. Edinburg. 8vo 1780 p. 81. „If the Child and placenta are both delivered suddenly, or the last immediately after the first, and if the child, though alive, does not yet breathe, the blood may be felt circulating, sometimes slowly, at other times with great force, through the arteries of the funis to the placenta, and from thence back again, to the child, along the umbilical vein“ In I. E. Zeibers deutscher Uebers. Altenburg. 1755. 8vo. T. I. p. 136.*

iii.) *Roederer l. c.*

kkk.) *id. ibid.*

argumenta et observata, quorum veritas vel falsitas ex ipsa vera vasorum placentæ structura inferius declaranda patefiet.

Properemus nunc ad pervestigandam alteram primæ Theoriæ partem.

§. IV.

II.) Alii a.) scriptores inter placentam atque uterum *canales* statuunt *continuos* quidem, *ast mediatos*, ita nimirum: ut vasa uteri arteriosa, ope membranæ tenuis cellulosæ, cum placentæ vasis venosis, sicque vice versa placentæ arteriosa cum venosis uteri sint nexa, vel *vasa* sese invicem *inoscuntur* aut *siſcipiant*, sive, uti alii dicunt, per *appositionem* invicem juncta sistantur.

a.) Probant hanc theoriam præcipue eo, quod adeo facilis sit placentæ ab utero solutio; dum sc. vasa placentæ ex vasculis uteri quibus tanquam vaginulis inhæserant, vel sponte erumpunt, vel levi tractu extrahuntur.

D 3

Certe


a) Halleri prim. lin. Physiol. § 888 891.

Edinb. med. Versf. u. Bem. II. Th. p. 175.

De la Motte Traité complet des Accouch. Paris 1765. 8. T. I. P. Ic
Ch. VII. not. pag. 05.

Levret Suite des Obs. sur les chang. des Acc. laborieuses p. 104.

Puzos



Certe hoc argumentum pro theoria quidquam probare nequit, cum omnino solutio placentæ æque facilis atque adhuc facilius futura sit, si vasa placentæ prorsus non cohærent cum vasis uteri per anastomosis, si ea quoque mediata sit, sed placenta solummodo membranæ cellulosæ atque sulcorum et eminentiarum sibi invicem respondentium ope cum utero cohæret.

b.) Hæmorrhagiâ, quæ sequitur placentæ solutionem, dum uterus non in statu contractionis positus est.

Probat autem hoc solummodo orificia vasorum uteri hiantia, non vero ipsam indolem nexûs inter placentam atque uterum.

c.) Ta-

Puzos Traité des Accouchemens, corrigé & publié par *Morisset Deslandes* Paris. 1759. 4. Chap. IX. Act. I. p. 98. „La partie convexe (du „placenta) qui est spongieuse & inégale, est reçue dans les inégalités „de la partie concave de la Matrice, à laquelle elle tient fortement, „tant par les artères, qui sortant de la Matrice, s'abouchent avec les „veines du placenta, que par les artères du placenta, qui s'anastomo- „sent avec les veines de la Matrice.“

W. Smellie Treatise on the theory and practice of Midwifery Vol. I. B. I. C. III. Sect. IX. p. 81. „The two arteries (of the funiculus) on their „arrival at the inner surface of the placenta, are divided and subdivided into minute branches, which at last end in small capillaries, „that inosculate with the veins of the same order.“ Ed. germ. Altenburg 1755. p. 136.

B. Guerard Anfangsgr. d. Geburtshülfe. Münster u. Osnabr. 1781. 8. 11. Hauptst. I. Abschn. III. Art. p. 33. &c.



c.) Talis intrasusceptio vasorum placentæ atque uteri obtinere potest similem in modum ac in vulnere consolidante, ubi vascula, antea discissa vel soluta, sibi invicem iterum associantur, et sanguinis per ea motus restituitur. b.)

Tali in casu ac in vulnere, vasculorum orificia, dum sese invicem osculantur, vera concretione, ideoque nulla intrasusceptione, junguntur atque veros postea canales fistunt continuos.

Mitto reliqua ad comprobendam hanc theoriam vi-
lioris adhuc momenti argumenta ab aliis prolata, at-
que ex contrariis pluribus unicum tantum, systema
hoc satis convellens, addam.

Si tales anastomoses mediatae vel intrasusceptiones vasorum inter placentam atque uterum obtinent, certe lumina vasorum placentæ æque ac uteri sibi invicem respondere, vel diametros consentientes habere oportet. Contrarium autem observatur in uteris hominum et brutorum animantium. In utero enim humano (uti supra §. III. p. 26. vidimus) nondum contracto post editum partum atque placentam orificia venarum sæpe adeo ampla deprehenduntur, ut calamus scriptorium vel et digitum c.) intrudere si-
nant,

b.) Edinb. med. V. u. B. 1. c.

c.) Monro in Edinb. med. Vers. u. Bem. II. Th. Art. 9. p. 162. Mor-
gagni Advers. Anat. I. §. 16. Santorini Observ. anat. Cap. XI. § 9.



nant; arteriarum quoque uterinarum lumina sæpe satis hiare conspiciuntur. Vasorum autem placentæ orificia adeo exigua sunt, ut nonnisi armato oculo detegi possint.

Qui credunt, posse vasculorum placentarium fasciculis impleri vasa uteri suis luminibus adeo hiantia, non ponderant, obtegi totam placentæ superficiem, quâ uterum respicit, membranâ tenui intermediâ d.), molli, a chorio producta, quam nulli fasciculi penetrant, sed in ea tantum minima vasculorum in placentâ hiant lumina.

§. V.

B.) Altera principalis theoria nunc recensenda, a cujus parte scriptorum recentiorum stant plurimi, e.) statuit: nutrimentum vel

d.) A. Haller Oper. anat. Argumenti minor. T. II. Lausannæ 1767. 4to. P. I. N. XXIX. §. 5. pag. 51.

e.) Baudelocque l'Art des Accouchemens P. I. Ch. IV. Sect. V. §. 452. p. 157. Edit. germ. Meckelii T. I. p. 165.

Sabatier Traité complet de l'Anatomie T. II. p. 431.

H. de Deventer Obs. sur le Manuel des Accouchemens, trad. du latin & augmenté par I. I. Bruier d'Ablaincourt Paris. 1739. 4to. Ch. XII. p. 62. sq.

I. G. Roederer Elem. Art. Obst. §. 70.

I. F. Henckel Abh. von der Geburtsh. Berlin. 1761. 8. §. 67. p. 32.
R. I.

vel sanguinem *resorberi* per lumina vasorum placentæ venosorum ex finibus uteri parenchymatosis, cum contra venæ uteri sorbeant sanguinem foetus ab arteriis placentilibus in sinus parenchymatosos placentæ depositum.

Magnum omnino probabilitatis gradum hæc sententia habet. Revera enim tales sinus sicuti in utero etiam in placenta deprehenduntur, ab ista membranâ intermedia cellulosa formati, qui respondent uteri finibus, nec nisi sub separatione placentæ ab utero conspiciuntur, ubi vero margines harum foveolarum statim collabuntur atque tantum rimarum formam relinquunt, f.)

Quan-

R. I. Steideler Lehrbuch von der Hebammenkunst. Wien. 1775. IV. Cap. I. Abschn. p. 67.


G. W. Stein Theoretische Anleitung zur Geburtshülfe. III. Aufl. Cassel. 1783. 8. §. 309. p. 98. I. I. Plenck Anfangsgründe der Geburtshülfe. Wien, 1774. Ed. lat. Ib. 1783. 8. Cap. IV. Art. II. p. 44.

G. A. Fried Anfangsgr. d. Geburtsh. Strasburg. 1769. §. 58. pag. 21.

R. W. Johnson Neues System d. Entbindungsk. Ed. I. C. Loder Leipz. 1782. 8. Cap. 8. p. 86.

Berdot Abrégé de l'Art d'accoucher. T. I. a Basle 1774. L. II. Ch. I. p. 51.

f.) Baudelocque l. c. Alex. Hamilton Treatise on Midwifery. Edinburgh 1781. 8. Ed. germ. Abh. üb. d. Hebammenkunst, übs. von I. P. Ebeling. Leipz. 1782. 8. p. 54. Aliique.



Quantum vero hæc theoria ad ipsam veritatem accedat, ex inferius dicendis clarius patebit, accuratius cognitâ prius ipsorum in placenta vasculorum structurâ.

SECTIO SECUNDA.

§. VI..

Cuilibet ex hætenus præmissis iisque præcipuis, quas varii Auctores de ratione nexûs inter uterum atque placentam sibi formarunt, theoriis, aliqua omnino inest veritas æque ac falsitas, ut hinc, sicuti jam vidimus, in utramque disputari possint partem. Illius autem incertitudinis ratio certe in ipsa duntaxat nondum satis perspecta *vasorum placentæ structurâ* est quærenda. Ex hujus itaque penitiori cognitione si sponte sequitur theoria, quæ solitis phænomenis atque eventibus prorsus respondet ac satisfacit, ea certe demum fide erit digna.

Multa quidem et varia a variis scriptoribus, antiquioribus non solum sed et recentioribus, habemus circa fabricam ipsorum in placenta vasorum observata et excogitata, majoris vel minoris momenti ac certitudinis, quibus tamen inter se invicem collatis et cum ipsa rei natura comparatis, facile patebit, haud pauca adhuc superesse ad veram istius fabricæ cognoscendam indolem.

Nume-

Numerosa cum mihi obtigisset tam placentas partu perfecto exclusas, quam ova abortiva inquirendi occasio, ea, quæ in istis observare mihi licuit, spero fore ut aliquam ad exactius intelligendam illorum vasorum structuram, sanguinisque in ipsis peculiarem circulum, conferant symbolam.

Mea itaque nunc traditurus observata et quæ ex iis sponte sequuntur corollaria, aliorum etiam, scriptorum saltem præcipuorum aliquot, cum iis conferam cogitata, meis observatis vel respondentia vel et contraria.

§. VII.

Præmittenda mihi sunt quædam observata circa *animantium quadrupedum* viviparorum *placentas*, quarum analogia omnino multum confert ad structuram placentæ humanæ facilius et rectius intelligendam.


Notum est, in brutis ruminantibus aliisque (quibus utrinque dentes sunt) v. c. equis, &c. quodvis ovum multas (in vaccis usque ad centum a.) habere placentulas *Cotyledones* dictas. Ex duabus autem hæ *Cotyledones* constant partibus sive substantiis, quarum una utero affixa a ROEDERERO b.) aliisque etiam ex antiquiori ævo scriptoribus *medullaris* vel et *uterina*, altera autem ovi chorio nexa *corticalis* vel *foetalis* no-

E 2

mina-

a.) *Roederer* Diff. de foetu perfecto Argent. 1750. §. VIII. in Opusc. med. p. 77.

b.) l. modo cit.



minatur. Levi inter se cohærent nexu, facile et sine laceratione ut plurimum, non vero semper c.) a se invicem solvi queunt; facilius autem in iis brutis, quorum foetus plures habent cotyledones, ægrius in illis, quorum foetus quisque unam saltem habet placentam, quales sunt cuniculi, canes, felles, &c. Levior quoque est illa cohæsiō in primis graviditatis temporibus, dum superficies, utriusque substantiæ, contiguæ adhuc planæ sunt; fortior autem est nexus, quo magis progressa est graviditas, quam nimirum tunc pars uterina majores et profundiores acquirit sulcos, quibus infiguntur eminentiæ partis foetalis respondentes. Utraque pars pressa fundit liquorem albescentem, et majori quidem copiâ circa medium tempus graviditatis, quam in hujus initio et finem versus. Non autem vere lacteus est vel lacti similis ille liquor, (uti nonnulli auctores d.) volunt) sed humor potius ferofus coagulabilis, ad indolem liquoris amnii accedens, a vasculis in substantia medullari ex utero materno advectus et a vasculis substantiæ corticalis resorptus perque vasa umbilicalia embryoni traditus. Similem talem liquorem albicantem quoque ex compluribus hominum placentis recentibus, tertio vel quarto graviditatis mense abortu exclusis, sæpius eâ copiâ, ut cochleare parvum repleverit, exprimere potui. Liquor hic videtur omnino ex matris sanguine secerni, et per
vascula

c.) uti *Roedererus* l. c. vult.

d.) *Roederer* l. c. de fetu perf. §. 8. p. 77. Idem quoque, & quidem semper se observasse testatur *Wrisbergius* in sua Edit. prim. lin. Physiolog. *Halleri*, Goettingæ 1780, 8vo. p. 489. not. 185. no. 3.)

vascula placentæ, in primis graviditatis temporibus adeo exigua et angusta, ut rubrum sanguinem, tenui isto liquore crassiores, vehere nequeant, tenero embryoni alimentum præbere subtilissimum ac blandissimum.

Uterina placentæ brutorum *pars*, *medullaris* dicta, tuberculum refert spongiosum, gestationis initio albicans, planum, postea magis elevatum, in renis formam, rubescens imo rufescens, multis sulcis atque variæ figuræ foveolis, appropinquante partu per gradus profundioribus et copiosioribus, notatum. e.) Constat ea ex convolutis productionibus vasculorum uteri arteriolis ac venosis, quæ in aliis animalibus v. c. canibus, cuniculis, &c. post partum subsidunt, in aliis autem v. c. vaccis, ovibus, &c. elevatiores manent, in quibus animalibus hinc cotyledonum vestigia in utero relinquuntur.


Fœtalis in animalium placenta *pars*, *corticalis* appellata, priori semper multo mollior est f.) in graviditatis initio ut plurimum rosacei coloris, magisque tumens, quam versus gestationis terminum, ubi colorem subrufum acquirit; inæqualis porro superficiei, similesque, ac in cerebri substantia corticali observantur, exhibens gyros, insinuantes se in istos partis medullaris sulcos atque foveolas. Tenuissima illi ramuli inter se nectuntur membranâ cellulosa, quâ per macerationem solutâ, apparent ea vascula tanquam flocculenta, pedunculorum ad instar filamentosorum nitidissimorum. Minime autem hæc

E 3

vascu-

e.) Roederer l. c. de fet. perf.

f.) id. ib. §. 8.



vascula veras sistunt anastomoses, vel canales continuos formant cum vasculis uterina in parte, ut potius cum his tantum per appositionem contiguam cohæreant. Hujusque asserti veritatem comprobant injectiones, cum mercurius vivus vel tenuissimi liquores colorati, aut in vasa uterina aut foetus umbilicalia injecti, nequaquam ex alterutra in alteram transeant partem, quamvis iis vascula minima quoque parti injectæ respondentia repleantur perfecte, nec, nisi diductione a se invicem solvantur istæ substantiæ, e vasculorum luminibus exsudet liquidi injecti guttula. Amoenum hocce spectaculum non solum mihi ipsi repetitis experimentis, sed et aliis, g.) iisdemque accuratissimis sane ac indefessis Anatomicis, idem observare contigit. Reliqua, quæ circa placentarum in brutis animantibus structuram, forsitan quoque nondum satis cognitam, possent proferri, hoc loco prætermitto, cum jam hætenus prolata satis ad illustrandam analogiam inter brutorum vivos, foetus parientium atque hominum placentas faciant. Propero potius ad ostendendam novisque observationibus stabilendam veram placentæ humanæ fabricam.

§. VIII.

Generaliora quædam circa placentam humanam, præcipue partu maturo exclusam, et quæ circa ipsius externam indolem, formam, &c. singularia observare mihi licuit, præmittam.

Forma-

g.) Alex. Monro in Med. Essay's and Obs. of a Soc. in Edinb. T. 11. Art. 13. Edit. germ. Altenburg. pag. 10.

Formatur ea nimirum innumeris vasorum sanguiferorum ramificationibus, quæ variis membranis inter se invicem ne-
ctuntur atque coarctantur.

Unicuique foetui in hominibus ut plurimum unica propria est placenta, h.) attamen quandoque plures foetus unam communem habent placentam i.) cujus vasa vel inter se veras habent anastomoses, vel quivis foetus in tali placenta proprium, cum alterius systemate non communicans, habet vasorum sanguiferorum systema. k.)

Figura plerumque rotunda, quandoque oblonga ovalis est, bis eam vero triangularem l.), pluries rhomboideam atque inæqualis figuræ observavi.

Crassi-

h.) Quandoque, ast rarius, unius foetus placenta in duas quasi partes divisa observatur. Talem materiâ ceracea injectam in suo theatro Anat. servat Jenæ *Loderus*, vid. *Müller Diff. cit. sex. seq. hist. §. 4. p. 17. not. 1.*

i.) *Haller Elem. Physiol. T. VIII. L. 29. Sect. 3. §. 20 p. 224. not. t.* plura ex scriptoribus allegat exempla.

Roederer Element. Art. Obstetr. Ed. Wrisbergii Goetting. 1766. §. 71. p. 34.

k.) *D. Lowder Londini* affervat placentam communem trimellorum atque aliam similem quadrimellorum, in quarum autem utraque quivis funiculus proprium suum habet vasorum sanguiferorum Systema. Talem gemellorum ipse inter mea præparata servo. Ita et aliam similem trimellorum affervat Jenæ *Loderus v. Müller Diff. cit. §. 4. p. 17. not. 2.)*

l.) Talem in suo apparatu servat *D. Lowder Londini*.



Crassities placentaë variat in feminis robustioribus et debilioribus vel emaciatis; variat ea quoque secundum robur prolis et locum cohaesionis cum utero, præcipue autem ratione temporis graviditatis. A tertio usque ad quintum mensem in placentaë peripheria, ubi firmior ipsius est cum utero cohaesio, atque juxta funiculi umbilicalis insertionem apprehendi crassitiem plerumque $\frac{1}{4}$ majorem, quam in reliqua placentaë substantia, a $\frac{2}{8}$ ad $\frac{5}{8}$ pollicis rhenani æquantem. Versus partum autem magis magisque ut plurimum disparet major illa ambitus placentaë crassities, juxta funiculi insertionem autem remanet. Maturi foetus placenta plerumque 12 — 15 lineas m.) crassa est, attamen nonnullas placentas, partu perfectò exclusas, 6. linearum tantum, alias contra 18. linearum apprehendi.

Similem in modum variat quoque placentaë *amplitudo*, ut diametri in matura et consueta figura rotunda placenta plerumque 7 vel 8, n.) in rarioribus autem exemplis 12. æquent pollices. Magis adhuc variat *pondus*, quod tamen in longe plurimis partu maturo editis placentis recentibus unius libræ o.) usque ad viginti uncias, nunquam infra decem uncias; in abortibus autem tertio mense exclusis non ultra tres uncias apprehendi.

Superficies placentaë *interior*, quæ foetum respicit, glabra tegitur plerumque membranâ chorion et amnion, et sub his
majo-

m.) Baudelocque cit. Anleit. z. Entbindungsk. I. Th. V. Cap. §. 5. p. 164.

n.) id. ibid. Puzos Tr. des Acc. Ch. IX. Art. 1. p. 98.

o.) Wrisberg cit. Tr. de structura ovi §. 9. pag. 10. G. W. Stein theor. Anl. zur Geburtsh. §. 300. p. 96.

maiores vasorum umbilicalium in ipsa, quæ vocatur, substantia placentæ delitescunt rami, in singulari autem casu semel membranam amnion in superficie ista interiori atque circa funiculum umbilicalem deficientem, atque a cingulo placentæ incipientem, minimeque dilaceratam, deprehendi. Ramos autem istos commemoratos productiones esse, partim venæ, partim vero duarum arteriarum in foetus fune deprehendendarum, satis inter omnes constat.

Superficies exterior, quâ cum utero jungitur placenta, inæqualior est, multis sulcis prædita, formatis a spongiæ similibus partibus placentæ, sive lobulis qui *Cotyledones* p.) vocari solent, innumerisque constituuntur vasculis sanguiferis, atque sibi invicem adjacent et membranâ tenui, in ovo media dictâ, obducuntur, nullis oculo sese offerentibus vasculis sanguiferis majoribus, totoque placentæ orbiculo texturam firmiorem referente. In nonnullis autem calibus, ubi nullam tamen placenta passa fuit lacerationem, superficies exterior hirsuta, fere abortivorum ovorum ad instar, sese mihi repræsentavit; in paucis aliis eam prorsus glabram, nullis sulcis vel gyris notatam, sed membrana densiori, maceratione difficulter solubili, tectam observavi. Quamvis in hac superficie oscula vasorum hient minimorum, tamen nunquam ex his ultra unciam unam vel sesquiunciam sanguinis, etiam non ligato in aliquot casibus funiculo, defluere vidi, aut absque laceratione exprimere potui.

In

p.) *Wrisberg* l. c. § 20. p. 25.



In reliquis secundinarum partibus, funiculo nimirum umbilicali, membranis chorion amnionque, et liquore amnii, spectanda, tanquam a scopo nostro aliena, hic prorsus intacta prætermitto.

§. IX.

Quæ de interiori atque vera placentæ humanæ structurâ habeo observata *specialiora*, jam commemorabo.

Vasorum in placenta sanguiferorum congeries non modo duplici isto vasculorum, arteriosorum sc. atque venosorum, absolvitur genere; sed utrumque ipsorum quoque vasorum, tam arteriosorum quam venosorum, genus a duplici proficitur sanguinis circumeuntis systemate, matris sc. atque foetus. Recte itaque eodemque jure ac in brutis animantibus *duæ* a se invicem diversæ *partes* ratione vasorum distinguendæ sunt *in ipsa placenta humana*, pars nimirum *foetalis* atque *uterina*.

Veritatem autem hujus distinctionis, indolem fabricamque utriusque partis monstrabunt sequentia.

§. X.

Quando placenta partu perfecto exclusa per vasa funiculi umbilicalis mercurio vivo aut alio liquido tenui colorato adhibita curâ injicitur, non omnia placentæ vascula replentur eâ materiâ injectâ, sed certa tantum vasorum congeries, nisi ruptura vasculi oriatur atque inde liquidum in placenta cellulas
extra-

extravasatio. Istam autem placentæ partem, in qua tunc vascula turgent materiâ injectâ, sub *foetalis* partis nomine comprehendimus, quæ ex vasorum umbilicalium productionibus constat. Multis autem institutis experimentis comprobatum id est non mihi solum, sed et aliis, e quibus aliquorum jam superius §. 3. pag. 13. feci mentionem.

Similem in modum, si per vasa matris tenue injicitur liquidum, vasa tantum reliquæ partis placentæ, utero contiguæ, eo replentur, ut hinc productiones vasorum uteri repræsentent. Pars hæc, quam congeries vasorum injectâ materiâ plenorum constituit, placentæ *partis uterinae* accipit nomen.

Utriusque hujus partis vasa perfecte repleri posse materiâ ceraceâ *diversi* coloris, exemplis firmant haud ita pridem Edinburgi & Londini in gravidis feminis mortuis instituta experimenta, superius §. 3. p. 14. sqq. recensita; in brutis enim idem obtinere satis jam constat et ex superius allegatis evictum est.

Hæc cum ita se habeant, sponte nascitur quæstio, quænam sit vasorum placentarium fabrica, quare nullos sistant canales continuos non interruptos?

Huc itaque omnino præcipuum rei momentum redit, quod novis quibusdam observatis, modo commemorandis, enodari posse spero.

§. XI.

Elapsis jam aliquot annis cum Lutetiae Parisiorum, Cel.



DESSAULT a.) *valvulas* detexerit in ramis arteriarum umbilicalium majoribus, quas in aliquot ab ipso preparatis speciminibus ficcatis contemplari mihi licuit, reputavi mecum, annon ejusmodi valvulae in vasorum extremitatibus occurrere possint potius, quam in ipsorum majoribus ramificationibus atque truncis. Nec defuit mihi occasio, multa hoc scopo cum placentis recentibus instituendi experimenta, quae meis quoque circa hanc materiem optime corresponderunt cogitatis.

Inter eas, quas hunc in finem inquisivi, *placentas* duas scrutinio meo subjeci *hydatideas*. Utraque harum non integra quidem ex hydatibus fuit conflata, sed, quod magis desiderio meo fuerat conforme, ex parte tantum b.), idque ita, ut rami vasorum umbilicalium majores naturalem suam retinuerint formam, minores autem, live istorum majorum productiones, in sacculorum diversae magnitudinis, serum coagulabile continentium, formam ampliatae fuerint. Accuratus autem haec vasa hydatidea inquirenti, sequentia sese mihi obtulerunt observanda.

Separavi a chorio et membranâ intermedia cellulosa, pia matri haud ablimili, vascula inde ab ipsorum truncis, atque reperi, ea plerumque in binis, a se invicem distantibus, locis in

a.) Consentit cum eo ex parte quoque *Baudelocque* l'Art des Accouchemens P.I. Cap. IV. Sect. V. § 457. pag. 159. Edit. germ. *Meckelii* pag. 167. & ib. not d.)


b.) Tales placentae hydatidae recensentur ex parte in *F. Ruysch* Thes. Anat. X. no. 65. pag. 13.

in bullulas oblongas hydatideas fuisse ampliata c.) Diffectæ secundum longitudinem aut latitudinem hæ bullulæ serosum liquidum facile coagulabile effuderunt, atque plerumque in ipsarum medio conspexi laminas membranaceas, figuræ quandoque ad triangularem accedentis, ut plurimum autem semilunaris, quales secundum naturam depictæ atque æri incisæ fiuntur in Fig II. litt. e. f. ee. g. Paullo accuratius cum inspexerim has lamellas, facile deprehendi, veras eas esse *valvulas*, valvulis semilunaribus cordis admodum similes. Ipsas autem has valvulas eum in modum conformatas deprehendi, ut, quoties idem vasculum duas habuit bullulas hydatideas, alterius bullulæ valvula versus unum inclinaverit latus, alterius valvula versus oppositum; manifesto indicio, diversi generis esse utramque valvulam, atque hanc liquido transfluenti viam aperire, illam vero huic præcludere. Nec in hoc me fefellit experimentum, cum sc. bullulas alias, præsertim minores, non ipsas secavi, sed prope istas vascula ipsa, idque juxta opposita latera, evacuato prius bullularum liquido contento, atque imposito in vasculum vulneratum alterutrum tubulo, unam tantum aëre immisso potui inflare, prorsus subsidente bullulâ alterâ. Manifesto hoc itaque fuit indicio, valvulas in bullulis hydatidicis aëri inflato contrariam viam prorsus præcluisse.

F 3

In

c.) Talis placenta hydatidea recensetur quoque atque incisa est in D. C. *Burdach* Diss. de læsione partium foetus nutritioni inservientium abortus causa. Lipsiæ 1768. 4to. Tab. I, Fig. I.



In his adeoque placentis hydatideis præter naturam ea fuere aucta atque ampliata, conspectuique magis obvia red-
dita, quæ in placentis naturaliter formatis observanda qui-
dem fuerunt, ast nonnisi difficulter et sæpius vix sine ar-
matis oculis.

§. XII.


Placentarum naturalium, partu perfecto exclusarum, sat
magnum numerum etiam scrutinio subjeci accuratiori, ut in-
teriore in iis vasculorum examinaverem fabricam. Juxta
scopum itaque propositum complures placentas macerationi
ad eum usque gradum exposui, donec omnia vascula in ea
nimirum superficie, quæ uterum respicit, a se invicem fuere
soluta atque distincta. Ex his autem placentis nonnullarum
vascula demum post macerationem mercurio vivo aut mate-
riâ ceraceâ tenuissima implevi, cum contra in aliarum vasa
ante macerationem ceram vel mercurium injecerim, semper
adhibita omni curâ, ne vasculum quoddam ab injectionis ve-
hementia rumpatur atque liquidi extravasatio quædam oriatur.
Verum in utroque casu semper observavi, ramificationes ne-
que mercurio neque cerâ per totum ipsarum tractum, sed ad
determinatum tantum gradum atque locum potuisse, absque
laceratione, repleri, cum reliquæ ramulorum exiguorum pro-
ductiones, sensim in majores trunculos eosque in multos ite-
rum ramulos dehiscences ampliatae, liquido injecto vacuæ
manserint. Inquirens in causas injectionis in his vasculis
exiguis impeditæ, propriaque cultello acutissimo encheiresi
secun-

secundum longitudinem dissecai ejusmodi ramulos eo præcise in loco, ad quem pertigerat injectum liquidum; atque tunc, sub microscopio, uti et sæpe nudis oculis facile deprehendi, causam obstaculi effecisse valvulas exiguas, quoad fabricam et figuram istis prorsus similes, quas, uti modo supra retuli, in vasis placentarum hydatidicis observare mihi licuit. Res ipsa ex delineatione, qualem in Fig. IV. subjunxi, adhuc clarius patebit. Sistitur nimirum in ea truncus vasis *A.* per Chorion *C.* transeuntis, et sub eo in varias ramificationes *a.* abeuntis. Hæ ipsæ ramificationes varias inter se habent anastomoses veras *b.* et sub chorio sese dispergunt *f.*; aliæ autem, idque eo in loco *c.*, ubi valvulae deprehenduntur, iterum capaciores fiunt, ut trunculos *B.* forment, multos quoque in ramulos tenuissimos *e.* divisos, quorum aliqui etiam inter se junguntur veræ anastomoseos *d.* ope. In placentis hydatideis quoque ramos vasorum ampliatis in minorum ramificationum fasciculos, quales in Fig. II. lit. *c.* conspici licet, delisse observavi *a.*)

Similia omnino in placentis quoque nullo liquido injectis, sed ipsorum vasculis plane *vacuis*, pluribus in casibus etiam nudo oculo observare mihi licuit. Cuivis quoque hæc obvia esse poterunt, dummodo vascula placentæ, sub chorio repentina, maceratione a se invicem probe separentur, rite incidantur et pervestigentur.

Quæri

a.) Eriam in *Burdach* cit. Diff. Tab. I. bullulas ovi abortivi hydatideas in complures ramulos terminatos fuisse indicatur.



Quæri hic jure meritoque potest, *quotnam valvulae* in uno eodemque vasculo vel hujus productione fuerint observandæ? In longe plurimis *unicam* tantum valvulam potui detegere, eamque semper eo præcise in loco, ubi vasculum ramosum angustatum iterum sensim fuit ampliatum in majorem trunculum etiam in fines ramificantes terminatum. In nonnullis autem vasculis etiam *binas* detexi valvulas, imo etiam in aliquibus, ast rarissimis, *tres*. Diverſæ autem hæ valvulae fuerunt structuræ tam in his, quam in istis vasculis. Semper quidem in omnibus vasculis valvulas ad latus angustius inclinasse deprehendi, ast, (sc. in iis solummodo vasculis, in quorum singulis unica tantum fuerat valvula) in his versus partem foetalem, in aliis versus uterinam nisum habuisse observavi viam angustiore præcludendi. Accuratius adhuc rem inquirens vidi, in *vasis venosis valvulas versus partem uterinam*, in *arteriosis* autem eas *versus foetalem inclinasse*, i. e. in vasis respondentibus ad angustiore canalem sese applicandi habuisse tendentiam.

In iis autem vasculis, quale in Fig. III. uti sub microscopio apparuit, sistitur depictum, in quibus binas detexi valvulas *c. d.*, alteram *c.* ad vasculi partem foetalem *a*, alteram *d.* ad partem uterinam *b.* sese applicare, canalemque pervium ibi occludere, deprehendi. In raris istis casibus, ubi tres detexi in uno eodemque vasculo valvulas, duas extremas observavi, modo descriptis prorsus similes, tertiam autem intermediam ad hoc vel istud inclinasse latus, in vasis arteriosis æque ac venosis.

Quatuor

Quatuor autem valvulas, aut plures, nunquam in unius vasculi ramosi productione conspiciere mihi contigit.

Ejusmodi valvulas in minoribus vasorum placentarium ramificationibus alii b.) suspicati quidem sunt, ast quantum equidem novi, eae antehac ab anatomicorum nullo fuerunt descriptae aut spectabiles redditae.

§. XIII.

Brevibus nunc videamus ea, quae circa structuram vasorum in placentarum primordiis, *ovis abortivis* exclusis, observare licuit.


Ova abortiva, quae hoc scopo examinavi, vel primo vel secundo, nonnulla tertio graviditatis mense a matribus fuerant edita.

Mem-

b.) v. c. *Guilielm. Cooper* in *Diff. de Abortionibus* Lugd. Bat. 1767.

4to Cap. I. Sect. IV. de Circuitu humorum in placenta. p. 21. 22.

inquit: „Probabilior igitur sententia per principia anatomica et „physiologica esse videtur, quod humores nutrientes per *vasa inter-* „*media* VALVULIS instructa, quæ forte lymphaticis adsimilari possunt, „resorbeantur, aut fortassis eadem ratione ac resorptio in vegetabili- „bus contingat; humores vero nutritii, semel ex vasis, a matre pro- „venientibus, suscepti ad proximos redeunt ramos venæ umbilicalis „amandantur, et sic porro ad fetum. Imo fieri etiam potest, ut „vasa multo tenuiora huic negotio destinata dentur, quorum tamen „structura multo subtilior, quam ut per repletionem, vel alio modo „possint reddi spectabilia.



Membrana illorum exterior flocculenta, Chorion fungosum a nonnullis a), filamentosa b), villosa c), vel caduca aut decidua d) ab aliis appellata praecipue mihi fuerat per-vestiganda. A congerie vasculorum tenuium, levissima membrana cellulosa inter se nexorum, seam perfici, inter omnes quidem constat, ast ipsorum vasculorum verus habitus nondum satis fuit cognitus.

Vascula haec sequentem in modum constituta deprehendi: Trunculi vasculorum cum Chorion (strictè sic dicto) praecipue istis in locis, ubi membrana caduca *reflexa* secundum *Hunterum* appellatur, arcte cohaerebant, & in alios truncos maiores, ex funiculo umbilicali provenientes, confluere, soluto paullisper Chorion, apparebant. Circa istos autem trunculos membrana cellulosa levissima, a chorion suum ortum petens, & vascula ipsa invicem uniens, (quae membrana postea, quando formata est placenta, eâ facie, quâ uterum respicit, placentam leviter obducit; sese applicabat. Ipsos hos trunculos hinc inde solitarios, alios autem quasi conglomeratos, nunquam autem admodum numerosos, ramulos exiguos versus chorion tendentes edidisse deprehendi. In progressu hi trunculi nonnihil attenuati nodulos habuerunt, bullulis exiguis simili-

a) *Albinus* in Annot. Acad. L. I. ad Tab. III. Fig. 1. c.

b) *Roederer* Elem. Art. obstetr. Götting. 1766 Cap. IV. § 68. p. 33.

c) *C. F. Reuss* prim. lin. Encyclopædiæ medic. Tübingæ 1783. 8. p. 488.

d.) *Hunter* Anat. Uteri Grav. ad Tab. XXVIII. fqq.

Wrisberg Ed. *Roedereri* Elem. Art. Obst. Cap. IV. §. 68. not. 34. p. 33.

similes e), unde iterum sensim parum ampliati numerosos dein ediderunt ramulorum fasciculos. Propria encheiresi tunc juxta longitudinem incidi haec vascula, atque deprehendi, illis in locis, ubi vascula attenuata in nodulos ampliata fuerunt, valvulas istis supra descriptis prorsus similes, parum tamen minores, inhaesisse. Unam in quovis trunculo communiter observavi valvulam, verum in aliquibus tamen binas valvulas. His itaque valvulis intermediis vascula filamentosa Chorii, quo ovum constituitur, in duo dividuntur systemata, unum vascula umbilicalia respiciens, alterum autem vasa uteri; sicque sistitur initium partis foetalis aequae ac uterinae in placenta adhuc formanda.

Ex his modo allatis facile quoque explicandum, quâ ratione ex membrana filamentosa formetur postmodum ipsa placenta; cum ex praecedentibus liqueat, jam in rudimento placentae vasa eandem quoque habere fabricam, iisdemque valvulis instructa esse, ac ipsa vasa in placenta jam formata & matura.

Rem vero ipsam ita mihi repraesento. Maxime probabile est, ovulum femineum sub impraegnatione non modo

G 2

rud-

e) *Albinus* jam de Ovo retulit, quod in singulari quodam casu, et uti inquit, „tanquam praeter naturam quiddam“ observaverit „vasa „placentulae soluta, libera, per intervalla contractiora, mediis locis „capaciora, et tanquam si inceperint in hydatides degenerare., v. Annot. Acad. Libr. I. Leidæ 1754. 4to. Cap. 18. pag. 69. Tab. III. Fig. 1. 2. explic. pag. 89. Certe is hæc vasa iis in locis, ubi valvulae fuerant, capaciora observavit.

rudimentum embryonis, sed cum ipso hoc etiam rudimentum funiculi umbilicalis acquirere; hocce autem rudimentum vaforum umbilicalium ipsum ovuli chorion perforare, et extra id ramulos edere tenuissimos, qui in initio visum etiam armati oculi fugiunt, at ad sugendum limpidissimum liquorem, ex glandulis in uteri superficie interiori excretum, tamen apti sunt f). Sensim dein cum ipso ovulo increfcere videntur haec filamentula vasculosa, numerososque edere ramulos, quorum latera cum superficie chorii exteriori junguntur, atque sensim sensimque membrana dicta filamentosa vel caduca sistitur, qualis in ovis abortivis primo, magis adhuc secundo graviditatis mense exclusis, conspicitur. Tertio autem graviditatis mense, (quandoque etiam sub initium quarti mensis) cum membrana caduca non amplius totum ovum circumdare potest sed nunc in formandam placentam abit, ramuli filamentosi, imprimis ii qui partem placentae uterinam postea constituunt, arcte nectuntur interiori membranae uteri vel potius laminae uteri membranaceae g) quam perforant, & ex

f) Haec quoque ea observatione probari possunt, quod in ovulis abortivis primi mensis major chorii superficies glabra appareat, quam in ovis abortivis secundi mensis, ubi filamentosa membrana in amplius spatium supra chorion sese extendit.

g.) *Hunterus* credidit, hanc laminam uteri interioriorem efficere caducam ovi membranam, dum fecundatum ovulum ex tuba Fallopii proveniens intra hanc laminam atque uterum ipsum descendit, et hac ipsa laminâ dein obvolvitur v. Anat. Ut. grav. ad Tab. XXVIII. sqq. Contrarium quoque probant foetus extrauterini, v. e. in tubis Fallopii,

ex sinibus uteri parenchymatosis suum nutrimentum, in initio quidem tantum lympham atque serum coagulabile h), postmodum autem, quando increverunt, ipsum rubrum sanguinem hauriunt. Tunc temporis, sub majori ab increfcente ovo ortâ uteri expansione, extra filamentosam sese in augustius spatium contrahentem lamina ista interior uteri solvitur i) atque cingulum circa filamentosa vascula efficit, atque inde ipsius placentae figura efformatur. Haec autem lamina membranacea, dum post fetus partum placenta ab utero solvitur, k) in uteri superficie interiori relinquitur l) atque *Cotyledonis* speciem refert, de qua seq. §. quaedam monenda erunt.

G 3

§. XIV.

pîi, vel ovariis, etc. deprehensi, qui tamen propriâ gaudent placenta, ortâ ex ramificationibus vasorum umbilicalium reptantibus atque in partem subjectam quasi radicanibus. Tale exemplum, ubi placenta partim cervici ac orificio uteri, partim extra uterum vaginæ parieti adhæsit, recenset H. A. *Wrisberg* in *Comment. de secundinarum humanarum varietate*, in *Commentariis Soc. R. sc. Goetting.* T. IV. 1774. 4to. pag. 67. sqq. §. 11.

h.) Id quod ova atque fetus abortivi primi mensis exsanguis probant.

i) Hinc, uti *Hunterus* jam observavit, si violentiâ quâdam hæc lamina tota ab utero separatur et cum ovo abortivo excluditur, tria orificia, orificiis tubarum Fallopii atque uteri respondentia, in ista lamina, ovum exterius circumdante, conspiciuntur.

k) Si cum placenta etiam hæc lamina membranacea vi quâdam ab utero abruptitur, certe uteri hæmorrhagia talem solutionem sequitur, sinibus uteri tunc prorsus hiantibus. In abortibus certe tales casus non infrequentes observantur.

l) Simile quid alii quoque observarunt vel suspicati sunt, v. g. *Albinus*

An.

Si partus humanus juxta naturae leges flato tempore et facilis absolvitur, atque post eum placentae solutio et exclusio uteri contractionibus expultricibus relinquitur, remanet in isto internae superficiei uterinae loco substantia quaedam membranacea, vasculosa, admodum similis isti substantiae tummenti in brutis ruminantibus quoque a placentulis separatis relictæ, quare ea congruo *Cotyledonis humanæ* venit nomine.

Percipi ea facile potest digito tangente statim post placentam exclusam, quando uterus nondum fortiter contractus est. Crassior vel tenuior eaprehenditur, prout vel ipsius vascula vel sinus uteri sub ea magis minusve sanguine turgent. In violenta placentae solutione & extractione ea ab utero separatur, plerumque sub magnis feminae doloribus a), & exteriori placentae superficiei adhaeret. Attamen quandoque etiam tali violentiae resistit, ita ut aliquoties eam in uteris

An. Acad. L. I. Cap. p. 35. „Leniterque — pertinebant.“

J. D. Mezger Grundriß der Physiologie. 2te Verbeß. Königsberg 1783. 8.

§. 883. pag. 191. sq. „Diese Haut (nemlich die zottichte) verbreitet sich über beide andre und hängt sich überall an den Seitenwänden der Mutter an, bei der Geburt einer reifen Frucht geht sie entzwey und bleibt groeßenteils an der Mutter hängen.“ Haec membrana relictæ autem non a caduca, sed ab ipsa, supra descripta, interiori lamina uteri membranacea provenit.

a) Quia interioris superficiei uterinæ lamina est, quæ nervorum uterinorum gaudet finibus, tali in casu non sensim (uti id in tertio graviditatis mense circa placentam accidit) sed violenter ruptis.

uteris post incongruam placentae solutionem protractis & in-
versis lustrare oculis vel tamen digitis percipere potuerim.

In Fig. I. fisto hanc substantiam delineatam, qualem eam
deprehendi in femina, quae quinta vice partum perfectum ac fa-
cillimum ediderat, aſt 6to a partu die ſynochâ bilioſa ex-
ſpiraverat. Placenta ipſa matura fuit, minimeque lacerata;
lochia per 4. dies poſt partum fluxerunt haud copioſa, tamen
absque doloribus; cadaver ipſum vero 24ta poſt mortem hora
ſecavi, nullamque in utero vel hujus partibus affinibus de-
prehendi inflammationem, & paucos tantum e vagina atque
uteri orificio extraxi ſanguinis grumos; nec praeternaturale
quid in uteroprehendi praeter aliquot tubercula ſcirrhoſa
in fundo uteri, et quod ipſe uterus non, uti poſt partum
naturalem ſolet, ſatis ieſe contraxerat.

Ipſa cotyledon ſuperficie ſuâ ſuperiori glabra fuit, uti
reliqui parietes uteri interiores, & latera fuerunt verſus me-
dium replicata, ut ſubſtantiam circiter lineam unam, nonnul-
lis in locis adhuc parum craſſiorem, retulerit. Conſtitit ex
membranâ cellulosa, fibrillis muſculolis; & innumeris vaſculis
minimis, quibus arcte nexa fuerat cum ipſâ uteri ſubſtantiâ,
ita ut mercurius vivus in arterias ſpermaticas injectus proſi-
luerit ex vaſculorum iſtorum oſtiis in ſuperficie ſuperiori
Cotyledonis hiantibus. Juxta haec oſtia in eadem ſuperficie
aperta quoque fuerant orificia ſinuum uteri majorum mino-
rumque venoſorum b).

§. XV.

b) conf. Expl. Fig. I.

§. XV.

Brevibus nunc complectar, quâ ratione juxta peculiarem vasorum in placentâ structuram sanguis nutritius ex matre per placentam proveniat in foetum, & ex hoc per eandem revehatur in uterum. Maternus sanguis ex arteriis uteri currit in vasa cotyledonis, atque deponitur in sinus cotyledonis parenchymatosos, in quos hiant ostiola vasculorum (cum cotyledone unitorum ope membranae cellulosae) minimorum ex parte uterina placentae. Sanguis ex his ramulis minimis a) sensim in trunculos ampliatis desinentibus vehitur lente usque ad valvulas vasculorum placentarum semilunares, quae aliquantum plicatae b) tenuiori sanguini adhuc viam parant in vascula alterius systematis sc. partis foetalis placentae, terminata in ramos majores venae umbilicalis, atque hinc in ipsas foetus venas. Similem in modum sanguis foetalis per arteriarum umbilicalium ramos in parte placentae foetali deducitur ad similes vasculorum valvulas, quae lentiores c) ipsius


a) vid. Fig. IV.

b) Si majori autem vi irruit sanguis, expanduntur ab eo plicatae valvulae, ut viam ulteriorem per vascula pracludant, ne foetus a nimio sanguinis in venam umbilicalem fluxu capiat detrimentum. In embryone autem, cui sanguis ruber nimis crassum jam foret nutrimentum, ille usus inde nascitur, quod tunc valvulae tantum tenuissimam lympham in vascula umbilicalia transmittant.

c) Hac ratione etiam sanguis optime resorberi potest a vasculis venosis, cum sanguis in arteriosis citius vehatur, quam in venosis; vera ergo oriri deberet sanguinis accumulatio atque stagnatio, si per arteriosa vasa sanguini via esset prorsus libera in vasa venosa.

ipsum reddunt cursum in vascula uterinae partis placentae, unde deponitur sanguis in sinus cotyledonis atque uteri venofos, ex quibus per vasa uteri venosa iterum resorbetur in matrem.

Haec de peculiari sanguinis in placenta circuitu theoria mihi tanquam verosimillima arridet, cum ex ea non modo usus valvularum in vasculis placentae sanguiferis detectarum elucescat uberrimus, sed exinde quoque facillime explicari queant sequentia: cur nimirum pulsatio arteriarum in funiculo foetus umbilicali non synchrona percipiatur cum pulsationibus arteriarum matris? cur injectiones neque ex valis matris progrediantur in vasa foetus, neque ex his in ea matris, adeoque non canales sint vasorum non-intercepti? cur simplex sanguinis in placenta resorptio assumi nequeat? cur nullam foetus per placentam (non ligato fune umbilicali) rite solutam sanguinis patiatur jacturam nocuam? cur denique ipsa placentae solutio in partu naturali adeo facilis sit, cum tamen antea sat firmus inter placentam atque uterum intercefferit nexus?



His vero jam filum abrumpe, reliqua, quae de Cotyledone supra descripta ulterius proferre, simulque etiam de necessariis ob ipsam hanc Cotyledonem in artificiali placentae solutione observandis cautelis propriis allegare potuerim, forsan aliâ datâ occasione cum publico communicare non deero.

TANTVM.



EXPLICATIO FIGURARUM.

FIG. I.

Uterus Puerperæ 6to die defunctæ.

In figura hac juxta naturam delineatâ omnia ad dimidiam magnitudinem imminuta repræsentantur.

A.) Uterus, hujusque superficies exterior, variis

1.) vasculis sanguiferis repentibus notata.

Uteri Appendices:

H.) Tubae Fallopii; o.) Antrum Roedereri. I.) Fimbriae.

K.) Ovaria, in quibus observantur p.) fissurae aliquot.

Q.) Hydatidis longo fune q.) dependens ab ovario dextro.

L.) Ligamenta rotunda, teretia, Peritonei N.) processu t.) tecta.

M.) Ligamenta lata, ramificationibus vasorum m. n.) spermaticorum plena.

In medio dissectus uterus sequentia observanda præbuit:

B.) Superficies a crassitie uteri pendens, in qua orificia s.) vasorum per uteri substantiam decurrentium et disciformum apparent. O. P.) Tubercula scirrhusa in fundo uteri.

C.) Superficies uteri interior, hujusque D.) latera.

E.) Orificia tubarum Fallopii, circa quae fibrae musculares circulares decurrunt.

H 2

F.) Sub-



F.) Substantiae vasculoso-membranaceae f. Cotyledonis humanae superficies superior, majoribus et minoribus a.) furculis vel finibus notata, lateribusque b.) filamentosis, quasi hirsuta. c.) Portio separata dependens.

In medio a se invicem distant latera Cotyledonis, praecipue in loco i.) superiore. Hinc apparet media Cotyledonis d.) superficies plana, glabra, (supra quam in utroque pariete quasi revoluta sunt latera Cotyledonis) ejus inferior pars e.) nonnihil ab utero separata, in medio h.) variis striis fibrosis notata est, superius autem k.) orificia vasorum atque finuum uteri hiantia habet. Latus dextrum f.) inferius nonnihil replicatum ostendit nexum firmum hujus substantiae membranaceae cum ipso utero multorum g.) vasculorum sanguiferorum ope.

G.) Orificium uteri cum suis lateribus, r.)

FIG. II.

Portio placentae hydatideae.

- A.)** Trunci vasorum hydatidicorum supra Chorion extensi.
- B.)** Bullulae vasorum hydatideae majores, vel secundum longitudinem vel latitudinem incisae.
- C.)** Interstitia inter bullulas hydatideas, vasculorum minimorum serpentium congeriem continentia.
- D.)** Bullulae majores, d.) minores, non incisae.
- bb.)** Vascula duplici in loco in bullulas hydatideas ampliata, attamen continua. Horum
- c.)** fines

- c.) fines in multos ramulos, quasi filamentofos, terminati.
 e. ee. f. g.) Valvulae, diverſi ordinis, fabricae atque uſus,
 in bullulis majoribus incifis conſpiciendae.

FIG. III.

Vaſculum, duobus in locis incifum, ut diverſae appareant
 valvulae, quale ſub microſcopio ſeſe offerebat.

- c. d.) Valvulae diverſi generis, unde in ipſo vaſculo ſi-
 ſtitur

a.) pars foetalis, atque b.) uterina placentae.

FIG. IV.

Vaſculum placentae ſanguiferum cum ſuis diverſi generis ra-
 mificationibus, maceratione a ſe invicem ſeparatis.

A.) Truncus vaſculi ſupra Chorion extenſus.

C.) Chorion membrana, interiorem placentae ſuperficiem te-
 gens.

a.) Ramificationes vaſculi ſub Chorio, quae tam

b.) anastomofes agunt, quam

f.) varias in plagas dehifcunt;

B.) Alterius generis ramificationes, quaſi productiones prio-
 rum tenuiſſimorum, ſenſim vero ampliatae, donec

e.) iterum in faſciiculos ramulorum minimorum dividuntur,

d.) ramulis lateralibus prius inter ſe anastomofes veras con-
 ſtituentibus.

H 3

c.) loci

- c.) loci, ubi valvulae deprehenduntur, quorumque ope ramificationes in diversi systematis vascula dispescuntur, quousque etiam propellere licet liquidum, vel per umbilicalia et his respondentia vascula partis foetalis A.), vel per vasa matris atque uterinae partis placentae B.) injectum.

ELENCHUS.

Introductio.

SECTIO I.

A.) *De nexu vasorum placentae cum utero.*

Formatae de isto theoriae praecipuae §. I.
 junctis argumentis eas tam confirman-
 mantibus quam oppugnantibus. §. II.

1.) Canales vasorum uteri cum istis placentae continui.

a.) Anastomoses inter ea vasa verae five
 canales immediati. §. III.

b.) Anastomoses spuriae five canales me-
 diati. §. IV.

2.) Canales inter vasa parenchymatosi ope
 sinuum, unde resorbent sanguinem vasa ute-
 ri aequae ac placentae. §. V.

SECTIO

SECTION II.

B.) De *structura vasorum in placenta*. - - - §. VI.

1.) Praemittuntur observata circa animalium cotyledones.

Divisio horum in partem foetalem atque uterinam.

Observata peculiaris circa harum partium fabricam. - - - §. VII.

2.) De ipsa *structura humanae placentae* peculiariter observata:

a.) generaliora quaedam: - - - §. VIII.

b.) specialiora:

Divisio placentae humanae, in partem foetalem atque uterinam. - - - §. IX.

Veritas hujus divisionis probatur:

a.) Injectionibus placentarum. - - - §. X.

β.) Ex ipsa *structura vasorum in placenta*, quae in duo diversi generis abeunt systemata mediantibus peculiaris indolis *valvulis*, detectis

1.) in vasis placentarum *hydatideis*, - - - §. XI.

2.) in vasis placentarum *maturarum* naturaliter formatis, tam

a.) liquido tenui injecto repletis,

b.) quam vacuis. - - - §. XII.

3.) in

3.) in vasculis placentarum immaturarum,
partu abortivo exclusarum. §. XIII.

C.) De membranâ inter uterum atque placentam
intermediâ vasculosa, *Cotyledone humana* dicta. §. XIV.

D.) De ratione circuitûs sanguinis per placentam ex
matre in foetum et ex hoc in matrem pecu-
liari. §. XV.

CORRIGENDA.

- pag. 3. not. 6. lin. 2. ἀρχαιοτέρη lege ἀρχαιοτέρη.
— 4. not. d. lin. 1. senslit — *sensit*.
— ib. not. e. lin. 5. fexus — *sexus*.
— 5. lin. 17. secundam — *secundum*.
— 8. lin. 1. exsangium — *exsanguium*.
— 17. not. ff. lin. 9. befize — *besize*.
— 24. not. 55. lin. 1. fecundinarum — *secundinarum*.
— 32. lin. 7. superficiem — *superficiem*.
— 38. not. g. T. II. Art. 13. — *T. II. Art. 8*.
— ib. pag. 10. — *pag. 180. sqq.*
— 40. lin. ult. etamnion — *et amnion*.
— 46. lin. 9. examinaverem — *examinarem*.
— 47. not. a. lin. 2. terminatos — *terminatas*.

