

M0003923: Calmette: Traitant de la vaccination tuberculeuse, October 1932

Publication/Creation

23 April 1934

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/mjvf9p5r>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

Sur la Vaccination BCG par voie buccale
chez les adolescents et les adultes non allergiques.

Intérêt que présente cette méthode
pour la prévention du personnel sanitaire
des établissements hospitaliers et les étudiants en médecine.
par A. Calmette

Après les premiers essais réalisés par B. Well-Hallé à la crèche de l'Hôpital de la Charité en 1926 en vue de prévenir les nourissons contre l'infection Tuberculeuse, nous avons eu pourvoir répondre au désir de médecins qui souhaitaient utiliser le BCG dans les familles, mais nous n'osions et ne recommandions l'emploi de cette méthode que pour la vaccination des nourveau-nés, telle que nous l'avons mise en pratique avec C. Guérin pour les jeunes veaux. Cette limitation nous était imposée par les deux considérations suivantes :

- 1° L'infection bacillaire est particulièrement grave chez le très jeune enfant, puisque presque tous ceux qui sont contaminés pendant les trois premiers mois de leur vie succombent au cours de la première ou, au plus, de la deuxième année. Il est donc nécessaire de faire en sorte que la prévention soit réalisée dans le délai le plus court possible après la naissance.
- 2° Il est établi par de nombreux travaux (C. Weigert, Dine, Behring et Römer, Ehrlich, Vallard, J. Ramon et Gruent, A. Boquet, L. Molis et Van Baeckel, G. Saenz etc.)