

**M0015389: Treatment of papillomas of the skin by diathermic coagulation:
before and after**

Publication/Creation

October 1956

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/r7qb2ney>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

d'une solution d'oxycy-
cure à 1 pour 1.000, de
tenir l'antisepsie de la

Lorsqu'on a à détr
verrues sur la même
préférable d'agir su
plutôt que de soumet
verrues à la diatherm
dans la même séance
coaguler 3 ou 4 dan
opération et attendre
escarres ainsi produite
les autres.

On opère exactemen
siégeant à la face ou





Fig. 91. — Papillomes de la
joue avant le traitement.

çon pour les papillomes

qui remplace chaque
eu apparente ou pas du
après un certain temps,
glor l'intensité du courant,
s termes, on n'a pas eu
burde. Les photographies
90, 91 et 92 montrent ce
enir avec la diathermie.

KANTHELASMA

ma est une tumeur bé-
u constituée par un amas